

1685

7-



G. IV, 5



J. H. Parry.



MIC

T

Om  
boru

Clari

Pulc

D



**MICHAELIS ETTMULLERI,**  
Philosophiæ & Med. Doctoris,

<sup>ET</sup>  
Quondam in Academia Lipsiensi Professoris  
Publici celeberrimi

**OPERA OMNIA**  
**THEORETICA**  
<sup>ET</sup>  
**PRACTICA,**

*In quibus universa Praxis medica*

<sup>SIVE</sup>

**Omnium totius humani corporis mor-**  
borum dilucida descriptio, eorumque causarum accurata  
explicatio & curatio per selectissima & optima  
medicamenta.

*Secundum Principia & experimenta chymica ac anatomica*

**Clariss. Viror. HELMONTII, WILLISII, SYLVII**  
**TACKENII**, aliorumq; Neotericorum exhibetur.

<sup>Accedit</sup>

**CHIRURGIA MEDICA.**

Pulcherrima methodo omnes affectus externos explicans,  
eorumque causas, restitutionem & curam describens.

<sup>Et</sup>

**METHODUS CONSULTATORIA.**

Per variorum Casuum exempla docens morborum  
resolutionem & curationem.

<sup>Annexi sunt in fine.</sup>

**De particularibus quibusdam materiis Tractatus ejus singulares,**

**L V G D V N I, M D C L X X X V.**

*Bibliotheca Gemmarum Camar. prope  
Warsaw. adscripta a. 1724.*



MICHAELIS BT MULLER

Philosophus & Med. Doctor

Quondam in Academia Lipsiensi

OPERA OMNIA

THEORETICA

PRACTICA

Opera omnia & c.

Omnium totius humani corporis mor-

borum & c.

CLAUDE VON HELMONTII, WILLISII

CHIRURGIA MEDICA

METHODUS COMBUSTORIA

Methodus combustoria





# PRÆFATIO

*Ad*

LECTOREM.



*Uanto studio, quanta  
industriâ, quamq; ac-  
curato ac limato judi-  
cio omnia sua scripta  
Clariss. Vir Michael  
Ettmüllerus, Professor, dum vive-  
ret, Lipsiensis Academiae celeberrimus,  
elaboraverit & conscripserit,  
multa prostant testimonia: Meum  
non est, nec possum, neque temporis  
angustia permittit, pluribus hic ex-*



PRÆFATIO ad LECTOREM.

*plicare. Edidit Clarissimus hic Vir suo tempore successive quosdam tractatulos, disputationum nomine, qui, quamprimum ad Eruditorum manus perveniebant, multis statim encomiis ornabantur; plurima verò & optima ejus scripta in paucorum manibus erant, & adhuc sunt, quamvis à multis, qui pro comperto habebant, varia illorum à nonnullis reservari, anxie desiderabantur. Sic multi sunt, qui ejus collegia M. S. ut vocant, magno pretio describenda curassent, si modo ab eorum possessoribus sollicitis precibus illa impetrare potuissent. Sunt alii quam plurimi, quos spes alit, nilque magis*

*exop-*



PRÆFATIO ad LECTOREM.

*exoptant, quam ut doctissimi hujus  
Viri prelo dignissima scripta tan-  
dem aliquando in lucem prodeant,  
& ab illo tempore, quò aliquoties  
in catalogis librorum semestralibus  
nundinalibus eorum mentio facta  
est, dici non potest, quanto desiderio,  
multi illa quæsiverint & expectave-  
rint, licet inanis spes, conceptam  
multorum opinionem usq; dum fe-  
fellerit.*

*Cum itaq; hoc observarem & a-  
nimadverterem, pluresque, qui ex  
magna illa, quam conceperant, spe  
fore ut proxime publicè prostarent,  
deturbatos se putabant, me iteratis  
verbis rogarent ac ad edendum uti-  
lissima*



PRÆFATIO ad LECTOREM.

lisima hæcce scripta instigarent, recusare id amplius non potui: Itaque cum ut ex hac parte incredibili, quo multi tenentur, desiderio satisfacerem; tum & ex altera parte unicum meum Erudito Orbi serviendi studium & officium ulterius exponerem, promoventibus & adjuvantibus hanc editionem quibusdam Amicis, qui quondam Authoris nostri beati auditores, ejusque viva informatione usi fuere, sepositis omnibus aliis negotiis, spretis impensis & sumptibus spretaque vana lucri cupiditate, celerè manum operi admovendo, onus hoc suscepi, & ex parte jam absolvi. Protrado igitur potius quam edo, tuisque

mani-



PRÆFATIO ad LECTOREM.

*manibus, humanissime Lector, officiosè trado eruditissimi hujus Viri desideratissima opera, quæ quidem hac vice perfici potuerunt; Omnia enim impressa hac una vice prodere temporis penuria non concessit, si verò hæc placuerint, (erunt autem sine omni dubio gratissima,) reliqua quæ restant, una cum indice locupletissimo proximè expecta. Tu interim vicissim benevola manu hæc accipe, iisque in tui cōmodum, proximique salutem feliciter fruire: Et si ex nimia festinatione, quæ in hoc opere adhibenda erat, varia, prout fieri solet, hanc editionem irrepperint sphalmata & errores typographici, (quam-*



PRÆFATIO ad LECTOREM.

*vis debita in iis corrigendis & remo-  
vendis non intermissa fuit cura &  
diligentia , ) Tu , humanissime  
Lector , pro tua , quam compello ,  
benevolentia gratiose id condones, &  
amicè ac benevolè corrigas , oro ro-  
goque, estoque triti illius, verissimi  
tamen , memor : Nemo ex  
omni parte beatus.*

*Vale.*







# I N D E X.

## P A R S I.

Prolegomena.	I
I. De Fame laesa	7
anorexia seu inappetentia.	ibid.
appetitu nimio, appetentia carina seu bu-	
limo	12
appetitus depravato.	15
Pica & Malacia	ibid.
Fastidio alimentorum	19
II. De siti laesa	20
III. De Masticatione laesa	25
maxillarum vitiis	27
dentium vitiis	28
IV. De deglutione laesa.	37
V. De chyloso laesionibus	41
VI. De assumptorum retentionis in stomacho laesione	47
VII. De Cardialgia seu cardiogmo	60
VIII. De contentorum in intestinis expulsionis laesa	68
alvi retentione	69
ileo siue volvulo	74
alvi fluxu seu Diarrhoea	83
Cholera	94
Lienteria	100
Fluxu chyloso, siue coeliaca passione	103
Dysenteria	104
Tenesmus	119
Fluxu epatico	122
affectibus haemorrhoidalibus.	124
IX. De variis intestinorum doloribus.	134
Colica	136
X. De situ intestinorum mutato.	152
Hernia	ibid.
ani procidentia	157
XI. De chyli distributione laesa	160
XII. De chyli sanguificatione, sanguinisque fermentatione laesa	169
XIII. De aeris inspiratione laesa	171
Dyspnoea	176
asthmate	
Orthopnoea	
Singultu	196
Incubo	201

XIV. De Laesa expiratione	205
Sternutatione	206
Vocis vitiis	208
Rauedine	211
Tussi	214
Tussi humida pectorali	223
stomachali sicca	225
stomachali humida	226
Catarrho suffocativo.	227
XV. De cordis & hinc arteriarum pulsu vitiat	
sanguinis motu per cor, adeoque huius pulsu laeso	234
Lipothymia	235
Syncope	ibid.
Virium languore	ibid.
asphyxia	ibid.
palpitatione cordis	242
Tremore cordis	243
Febribus in genere	248
intermittentibus	269
continuis acutis	298
continuis lentis	313
Hectica	315
malignis	341
petechiali	362
Variolis & morbillis	368
Febri purpurata	385
Morbo Hungarico	386
Peste	ibid.

## P A R S II.

I. De nutritione laesa	I
atrophia	ibid.
phthisi seu Tabes	4
aridura	19
cachexia	12
anasarca & leuco phlegmatia	27
Hydrops	28
Cachexia ictérica s. ictero	51
II. De sanguinis ex partibus refluxu vitiato	
to	62
inflammationibus	63
erysipelate	70
angina	71
inflammatione tonsillarum	72
)(	aphtis



# INDEX.

De aphthis	83	Vigiliis nimis	245
uvula morbis	85	Somno nimio	249
inflammatione ventriculi	86	Comate somnolento &	
intestinorum	88	Cataphora	250
ani	89	Comate vigili	251
mesenterii	90	Lethargo	ibid.
pleura sive		Caro	ibid.
pleuritide &		Noctambulis	252
peripneumonia	95	Catalepsi	258
inflammatione hepatis	112	VII. De spirituum in cerebro & hinc sensuum	
lienis	117	organis inordinata agitatione, in-	
renum	118	deque orta Vertigine	259
Ulcere renum	120	De spirituum animalium nimio & inor-	
Inflammatione vesicae	121	dinato subinde ac vitioso motu in	
cerebri	125	partes externas motui dicatas, inde-	
oculorum	128	que orta	
aurium	136	Convulsione &	
ulcere aurium	137	Epilepsia	259
Empyemate	138	Tremore	291
hamorrhagia	145	VIII. De spirituum animalium influxu abolito	
narium	154	indeque orta	
gingivarum	158	apoplexia	296
sputo sanguinis	ibid.	Paraplegiis	312
III. De urina in renibus secretionem laesa	164	Paralysi	317
ischuria renali	167	IX. De laesionibus sensuum exteriorum, in	
calculo renum	172	specie, de laeso tactu, indeque orto	
diabete	188	dolore	327
mictu cruento	193	dentium	337
IV. De Urina excretionem laesa.	197	cephalalgia	341
ischuria vesicali	198	dolore oculorum	356
Calculo vesicae	203	aurium	357
Urina incontinentia	205	arthritide	359
Stranguria	209	X. De variis visus laesionibus	367
Dysuria	212	ungue oculi	368
V. De lymphae in glandulis generatione & mo-		leucomate	370
tu vitiatas	216	cataracta	371
Catarrhis	217	gutta serena	372
Coryza	221	XI. De auditus laesionibus	373
Hydropibus particularibus	234	surditate	ibid.
Ascite	236	tinnitu aurium	374
Hydrope pectoris	238	XII. De laesionibus gustus & olfactus	375
Hydrocephalo	239	XIII. De sensuum interiorum & rationalium	
VI. De spirituum animalium generatione vi-		functionum laesione	376
tiata, indeque motus & sensus laesio-		Memoria	377
nibus in specie vigiliis & somno vi-		Delirio	378
tiatis	42	phrenitide	379
		delirio	



# I N D E X.

delirio melancholico	381	lipothymia puerperarum	52
mania	384	diarrhoea puerperarum	ibid.
rabie	386	incontinentia urinae puerperarum	53
philitris	388	suppressione urinae puerperarum	ibid.
malo hypochondriaco &		Febre lactea	ibid.
Scorbuto	392	morbis acutis puerperarum	54
XIV De seminis generatione laesa	413	purpura puerperarum	56
defectu seminis	ibid.	Lactis defectu	57
XV. De seminis excretionem & retentionem		redundantia	58
laesa	411	coagulatione	59
gonorrhoea vera	ibid.	inflammatione mammarum	60
nota, benigna	414	Faetu	63
virulenta	426	retentione excrementorum in faetu	ib.
nimis cita seminis ejaculatione.	428	vitiis lactis	64
nimis tarda seminis excretionem	ibid.	erratis pullis	67
XVI. De penis erectione laesa &		morbis infantum	69
impotentia virili	429	De Chirurgia Medica	81
nimia salacitate	431	luxationibus	82
depravata penis erectione.	435	Fracturis	86
		Vulneribus	92
		Ulcibus	103
		Ambustione	117
		Tumoribus	118
		De Inflammatione	122
		suffusione sanguinis	123
		Rosa	124
		Tumoribus criticis	ibid.
		Bubonibus	ibid.
		Parotidibus	ibid.
		Carbunculis	125
		Paronychia	126
		Peynionibus	127
		Tumoribus aquosis	ibid.
		Oedemate	ibid.
		Scrophulis	128
		Scirrhus	129
		Cancro	130
		Gummat. Gallic.	131
		Tumoribus recidivant	132
		Callo.	ibid.
		Ganglio	ibid.
		Sarcomate	ibid.
		Meliceride	133
		Atheroma	ibid.
		Stratamate	ibid.
		Verrucis	

## P A R S I I I.

I. De menstruorum vitiis	1
II. De mensium emanatione	2
III. De nimio menstruorum fluxu	9
IV. De menstruorum non debito loco effluxu	12
V. De Fluore albo mulierum	13
gallico mulierum	18
defectu appetitus venerei	ibid.
appetitu venereo acuto, sive	
Satyriasi vel salacitate	19
Febri alba virginum	21
Cachexia mulierum	23
Suffocatione uteri	25
virii admissione laesa	35
procidentia uteri	36
conceptione laesa	38
inflatione uteri	40
hydropis uteri	41
conceptione laesa	43
lochiis	44
retentis	45
lochiorum fluxu nimio	47
Doloribus post partum	49
tumore pudendorum	51
ruptura vulvae	ibid.



# I N D E X.

<i>Verucis</i>	134	XXI. De Febri continua Lymphatica iuxta	
<i>Clavo</i>	ibid.	<i>Sylvium</i>	175
<i>Fungo</i>	135	XXII. De Febri Hectica lenta simili ob absces-	
<i>Aneurismate</i>	136	<i>sum in mesenterio</i>	177
<i>Varicibus</i>	137	XXIII. De Febri maligna petechiali	178
<i>Gangrana &amp; sphacelo.</i>	138	XXIV. De Variolis	181
		XXV. De Febri lactea	183
		XXVI. De Pleuritide vera	185
		XXVII. De Cachexia cum scabia	186
		XXVIII. De Phthisi	189
		XXIX. De Hamoptysi	191
		XXX. De stranguria occasione podagra cura-	
		<i>ta</i>	192
		XXXI. De Hemorrhagia Vteri	194
		XXXII. De Nephritico dolore	196
		XXXIII. De Lochiorum retentione cum urina	
		<i>suppressione &amp; doloribus post partu</i>	198
		XXXIV. De Gonorrhœa virulenta cum tumore	
		<i>testis</i>	200
		XXXV. De Epilepsia.	203
		XXXVI. De Apoplexia	205
		XXXVII. De Delirio Melanchelico Hypochon-	
		<i>driaco</i>	207
		XXXVIII. De Arthritide vaga Scorbatica	209

## Collegium Consultatorium.

<i>Prolegomena</i>	141		
<i>I. De Apepsia</i>	ibid.		
<i>II. De inflatione stomachi cum asthmate &amp;</i>			
<i>cardialgia</i>	143		
<i>III. De Pica à scabie retro pulsa</i>	144		
<i>IV. De cholera biliosa</i>	146		
<i>V. De chyliificatione lasa ex cruditate nido-</i>			
<i>rosa</i>	148		
<i>VI. De Cardialgia seu spasmo orificii superioris</i>			
<i>ventriculi à fungis</i>	149		
<i>VII. De catarrho epidemio</i>	150		
<i>VIII. De Dysenteria</i>	154		
<i>IX. De Colica convulsiva</i>	155		
<i>X. De Diarrhœa biliosa</i>	157		
<i>XI. De chlorosi incipiente</i>	158		
<i>XII. De Colica humerosa hypochondriaca à</i>			
<i>pedum refrigeratione suscitata</i>	160		
<i>XIII. De Hemorrhoidibus cœcis dolentibus</i>	161		
<i>XIV. De Cacharro suffocativo</i>	163		
<i>XV. De Tussi ferina humida</i>	165		
<i>XVI. De Hernia cum passione hysterica</i>	167		
<i>XVII. De Asthmate convulsivo</i>	168		
<i>XVIII. De subluxatione, vertebrarum dorsa-</i>			
<i>lium</i>	170		
<i>XIX. De Febri Tertiana intermittente</i>	171		
<i>XX. De Febri ardente benigna ex iracundia</i>	173		
		<b>Appendix.</b>	
		<i>Valetudinarium Infantile</i>	1
		<i>De Virtute Opti diaphoretica</i>	52
		<i>Soralliorum Tinctura</i>	88
		<i>Præscriptione formularum</i>	112
		<i>parvis magnorum morborum initiis</i>	201
		<i>Usu &amp; abusu præcipitantium</i>	233
		<i>Morsu vipera</i>	305
		<i>Medicina Hippocratis chymica</i>	337

## F I N I S.





I. N. 7.

# DOCTRINÆ PRACTICÆ PROLEGOMENA.



**P**RAXIS est vel *vulgaris* sive ordinaria, vel *extraordi-*  
*naria*. *Vulgaris* sive ordinaria adhuc est manca, in  
quàm plurimis mutila, idque *duabus ex causis*.

I. Est defectus sufficientium experimentorum  
in macro- & microcosmo, super quæ solida theoria, h.  
e. aliorum, minus sensibus obviatorum, phenomenon ex  
illis sensibus notioribus observatis, eorumque fiendi  
modis, explicatio & fiendi ratio fundari possit. Ob  
id tam studiosè hodiè excolitur Chymia & Anatomia, ut ibidem ex observatis  
microcosmicis melior corporis humani operationum partium per anatomen de-  
tectæ etiam obtineri queat, Ex his Pathologia constituenda.

II. Est defectus genuinorum & generosorum remediorum in Praxi, tam  
universalium, quàm genuinorum specificorum, quæ nempe in se efficacia sint, &  
sine stomachi labore pharmaceutico, sponte sua vim medicamentosam exerant.  
Unde qui supra vulgatam & ordinariam praxin in Medicina excelluerunt practica  
hoc vel ope solidioris theoriæ, vel ratione generosorum remediorum præstiterunt.  
In quibus ultimis sublimiores Chymiatræ, achorum antesignani, *Basilius*, *Pa-*  
*racelsus*, *Helmontius*, *Poterius* excelluerunt.

Hinc in Praxi vulgari *ratione prioris*, theoriæ nempe defectu, vix circa ra-  
dicem morbosam, sed potius circa ejus producta versati datur. *Ratione po-*  
*sterioris* interdum anus aut empiricus melius maximè industrio & erudito cura-  
re observatur Medico, & tam sæpè affectus in se curabiles incurabilium



inscribuntur catalogo. Dixi praxis vulgaris vix circa radicem morbosam ut plurimum minus cognitam, vel à priori hæcenus imperfectam occupatur, sed vel circa causam occasionalem, vel circa productum morbosum tantum, hoc vel corrigendo vel tollendo, unde verò à posteriori, rarius à priori curare solemus. Rem exemplo declaro: Spina digito infixæ externè, internè vitiosum fermentum spinæ instar lædens parit, unde ibi externè tumor, inflammatio, abscessus in Chirurgia; hinc verò internè affectus chronici frequentius ex digestionem partis cujusdam vel publica, vel privata lasæ, acuti verò ex fermento peregrino, aut sanguinem aut spiritum inquinante, proficiscuntur. Hinc si spina maturè removeatur, omnia evanescent symptomata: Sin verò vel anodynis, vel discutientibus, vel maturantibus negotium tractes, naturæ quidem motum imitaris, & eam adjuvas, sed à posteriori saltem, quàm à priori, spinæ nempe evulsione, commodius levare potuisses. Sic in maligna febre contagium insensibile est, quod morbum infert: hoc vel sublato, vel appropriato remedio destructo cessat febris. Contagium est leve, quod in lue Venerea peccat, & fermenta digestiva hebetat: hoc sublato faciliè omnia curantur, quæ difficillimè & tædiosissimè per sudores aut salivationes aliàs mitigantur. Sic fermentum aut spina est exile, quod circa unum vel alterum nervulum, totum corpus convellit, non secus ac tantillum effluvium, acrius nares insigniter vellicans, impetuosum sternutationis spasmus facit; His sublatis, vel per appropriatum correctis, cessant effectus, qui per opium à posteriori saltem palliantur. Sanè frequentissimè in Praxi occurrit, ut nonnisi à posteriori productis morbis ac symptomatis occurratur, à priori verò causa sive spina intacta relinquatur, idque vel ob causæ genuinæ ignorantiam, vel appropriati remedii defectum, Medicis ignorantibus optimè se agere opinantibus, scientibus verò tacitè ingemiscuntibus & suos defectus adhuc deplorantibus. Hinc extraordinaria praxis differt à vulgari sive ordinaria duobus modis. I. Ratione remediorum. II. ratione modi. Illud dum administrantur remedia generosa, legitima tamen methodo: hoc dum magneticè sive transplantatoriè curatio instituitur. Hinc in talibus medicandi rationibus nec V.S. bus, nec fonticulis sive vesicatoriis, nec purgantibus tantoperè opus habemus, quia sola data vomitoria, & diuretica ac sudorifera applicata cum appropriatis utramque faciunt paginam.

Ut ergò reformetur praxis ordinaria, & theoria magis perficienda per repetita experimenta & observationes anatomicas & chymicas, & hinc remediis vel appropriatis particularibus, vel generosis universalibus, adeoque plurimis scopis satisfaciendis, sedulo opera danda erit.

Ordinaria imprimis quantum possibile correctæ praxis jam consideranda est, in qua circa quemvis affectum præter naturalem V. Capita observanda veniunt,



# Prolegomena.

8

I. *Historia morbi*, ubi diagnosis ejusdem simul insinuat.

II. *Subjectum* sive pars affecta.

III. *Causa* tam remotæ quàm propinquæ, tam materiales quàm formales, sive tam in se considerata, quàm respectu alterationis præternaturalis, quàm corporis cujusve partibus inducunt.

IV. *Prognosis*.

V. Circa quam tam methodus medendi quàm remedia & simplicia & composita, interna & externa unâ cum casibus, historiis & observationibus practicis tractanda & considerata veniunt.

Ubique observandum est, ut super fundamenta chymica & mechanica, adeoque experimenta negotium omne fulciatur, ut res difficilis & obscura, quantum possibile, dilucidetur. Nam corpus est machina, cujus movens liquor (lus per chymiam explicandus ac natura semper interim & ubique geometricat.

In genere probè discriminandæ sunt *binæ facultates* corpus gubernantes, *vitalis & animalis* harumque fundamenta, quarum *vitalis* in sanguine & visceribus, ac inde derivatis succis consistit, hæc *animalis* in spiritu animali & systemate nervoso fundatur.

*Ratione posterioris*, ad multiplices nervorum distributiones & varias partium cum his connexiones indeque natos consensus varios probè attendendum, & hinc natis malis dolorosis ac convulsivis maturè occurrendum. Ut res pateat clarius, in sanguine considerandus *duplex motus*, vel integræ massæ *circulatorius*, vel particularum ejus minutissimarum *intestinalis* sive *fermentativus*. In *circulatorio* consideranda *Plethora*, quæ immutationem postulat. Huc V.S. vel evacuatoria, vel ventilatoria, quoad alia media revulsoria, aversoria, derivatoria pertinet.

*Fermentativus* præsupponit duo *Elementa*, acidum & alcali. Fundamentum hujus motus est *crasis seminalis*, per usum rerum non naturalium conservanda, per remedia restituenda. Crasis vitiosa, *cacochymia* aliàs dicta, à vitio acidi vel alcali in subjecto nunc viscido, nunc aqueo dependet. Unde vulgata aliàs *quadruplex cacochymia*, biliosa, melancholica, pituitosa, serosa explicanda.

*Origo cacochymia* remota est præsertim ex vitiosis digestionibus, earum nempe relictis, transmutatis, transmissis, uno nomine retenta Helmontii.

Occurrimus huic I. alterando, II. evacuando.

Alterantia vel generalia, vel specialia sive specifica.

Evacuantia vel universalia sunt, vel particularia.

Alterantia specifica in quovis speciali casu evolvuntur, quoad generalia vero *acidum corrigunt* remedia tam fixa quàm volatilia. Ex *fixis & præceteris*, it. *o* præsertim in acido vinoso.

R. lap. *o* pp. corall. r. pp. CC. ust. an. *o* j.

*o* absynth, *o* an. g. xv. *o* destillat. cumini. caryophyll. an. gr. xii.

A 2

laud.



Prolegomena.

laud. opiat. gr. vj. M.

Ex volatilibus ℞. ▽ majoran, menth. an ℥ij. aq. vit. Matth. ℥iij.

Essen. castor. ℥ij. ☉ \*

liquor. CC. succinat. ℥j. syrup. fumar. ℥β M.

In specie pro corrigendo alcali volatili, acri sive bilioso

℞. ▽ acetos. rubi idæi an. ℥ij.

Succi citr. vel cydon. recent. ℥j. ꝑ diaphor. ℥j.

Syr. acetos. citr. ℥vj. spir. nitr. dulc. pro grato sapore.

Nitrosa nempe in primis alcali volatile figunt, non secus ac sulphurea fixa antimonialia, cum utraque temperent & corrigan, sulphurea oleosa ex omnibus tribus regnis, tam volatilia, quam fixa, hinc sulphura metallica fixa adeo sunt decantata & nobilia, simul nempe anodyna.

Viscidum sive pituosum alterant salsa, quo pertinent omnia, salia digestiva dicta, ꝑ ☉ lat. arcan. duplicat. &c. ☉ \* it. gummata; aromatica acriora.

Serum sive lympham corrigunt alterantia sic dicta.

Evacuantes universalis sunt vomitoria, purgantia, diuretica, sudorifera,

Hæc inter, quorum adeo larga seges est, saltem selectus instituat, v. g. Inter vomitoria vitanda vegetabilia, it. vitriolata ac mercurialia; antimonialia sunt optima, quorum tamen sufficiunt pauca, v. g. sapa vomitoria Sylvii, ꝑ emeticus Myns. in thes. p. 13. Syrupus emeticus Ludovici in Pharm. p. 212. Infusum emetic. Kerking in Basilium p. 144. 169.

Purgantia itid. pauca selecta sufficiunt, Pilulæ ex extracto catholico, variis additis determinantib<sup>9</sup>, in specie ꝑ io dulc. ubi mitius laxandum, M. P. de ammoniaco debito stimulo sufficiunt. Pro pilulis usualibus aloëticæ, ad imitationem Ludovici concinnatæ, vel Tilemanni præstant. Inter pulveres, pulvis jalappæ compositus sufficit. Infusa inter, Sennatum cum Rhabarbaro aut Helleboro est optimum.

Electuaria purganda optima subministrat Sylvius Prax. l. i. c. 2. §. 33. &c.

Mitius ubi alvus solvenda, passulæ laxativæ, vel decoctum passularum cum senna, pluribus aliis æquipollent.]

Quoad Diuretica usurpantur hæc tam volatilia quam fixa. Volatilia sunt in specie ex ꝑ. v. g. Spiritus carmin. polychrestus, sive Tinctura nephritica. it. sal volatile succini, terebinthina, juniperi, spiritus & sal volatile lumbricorum, & ubi fortius agendum, infusum cantharidum.

℞. Aq. Petrosel. ℥ij. alkekeng. ℥j.

malvat. juniper. ℥vj. spirit. lumbricorum. terrest. per putrefact. ℥jβ.

Syrup. sœnic. ℥iij. vel vj. M.

Diuretica fixa sunt imprimis vinum extinctionis silicum, it. testacea ac concreta lapidosa marina, vel

℞ ꝑ



℞ ꝑ vitriolat. Tachen. ʒ℥.

Sal stipit. fabar. genista. a. gr. xv. fimi columbin. ʒ℥.

M. F. Pul. Potest capi in vehiculo vini. Quibus & adde semen violarum.

*Sudorifera* etiam sunt *vel fixa vel volatilia*. *Fixa* antim. diaph. præfctim  
Oleæ Ludovici, salia quædam fixa, cornua & ossa animalium cum & sine Δ  
præparata.

℞. ʒ diaph. ʒj. sal card. ben. ʒ℥. laud. op. g. j. M. F. pulv.

*Volatilia sudorifera* sunt quælibet salia volatilia & eorum spiritus unâ vo-  
latiles; item quælibet extracta vegetabilium resinosa, aut olea destillata empy-  
reumatica rectificata. suo modo etiam spiritus vegetabilium inflammabiles, unde  
sufficient spirit. sal. armoniac. spirit. tartari rectif. extractum lig. Gujac.  
item Absinthium & carduus benedictus, mixtura siue Tinctura bezoardica  
camph.

℞. Aq. florum sambuc. ʒj. spir. bacc. Sambuci ʒj. sal. Armoniaci  
ʒ℥. ad ʒj. camph. gr. ij. Syr. Cardui ben. ʒ℥. M.

*Facultas animalis*, in spiritibus & systemate nervoso fundata, considerationi  
suggerit.

I. *Nutrimētum*, quod est chylus, qui istud immediatè nutrit, ob id la-  
bes suas in specie acorem facile illi affricat.

II. *Structura*, quæ constat ex subtilissimis & delicatissimis fibris, *nunc*  
coacervatis in nervos, *nunc* hinc inde distributis. Nam & ipsum cerebrum fi-  
brarum talium delicatissimarum, glanduloso tegmine induturum, est systema.

*Hæ fibra* in debito tono sunt *organon sensus & motus*. *Motus est vel natu-  
ralis, vel animalis*. Utriusque ratione imprimis spasmus & convulsivis moti-  
bus & hiis etiam paralyticis defectibus obnoxii sunt. Spasmi insequuntur  
præcedentem irritationis sensum, indeque provocatum concitatiorem spirituum  
impetum.

*Irritatio est vel à frigore externo, vel ab acido interno*, utraque nervis inimi-  
cissima; hinc acidum destruentia, penetrantia, simul tamen temperata oleosa  
nervis sunt amicissima. Hinc omnia nervina sunt aromatica. v. g. Rosmarinus,  
mentha, salvia, majorana, & omnia propriè sic dicta aromata, eorumque olea  
destillata, & cum his parata salia volatilia, vel oleosa, it. succinata, hinc liquor CC.  
succin.

*Sensus sunt vel interni vel externi*. Externorum ratione consideranda est  
systematis nervosi major vel minor sensibilitas. 2. Ratione sensus natus Con-  
sensus.

*Sensibilitas* specialissimè in stomacho & circa præcordia obvia est, unde  
anxietates, inquietudines, jectigationes, lipothymia, frequentia in morbis sympto-  
mata, circa stomachi orificia ut plurimum habent fomitem atque originem.



*Consensus* triplex est, ratio aliàs explicata. Omnis tamen fit ratione nervosi generis : Hinc non opusest, plurimis in casibus ad actionem ignotam regimini cum Helmontio confugere.

In genere itaque *nimiam sensibilitatem* nervosi generis, spirituum impetuosiores motum, & inde nata symptomata spasmodica optimè sistunt *opiata*, optimè per sal Tartari, vel per fermentationem corrigenda. it. *sulphura mineralium fixiora*, hinc antimonialia, cinnabarina vi singulari anodyna prædita: *Imminutam sensibilitatem verò & motus defectum* plus minus paralyticum spirituum adeoque animalium torporem *corrigunt* optimè *omnia acria aromatica*, ut castoreum, salia volatilia oleosa, succinata, vegetabilia aromatica, aquæ vitæ, cordiales, Apoplecticæ.

Respectu horum fundamentorum præ cæteris Tyroni practico legendus est *Sylvius*, & hinc *Willisius*. Ille in sua praxi, quam optimè acidi & alcali effectus, effervescentias, correctiones, adeoque humorum dyscrasias explicuit & mædendi iisdem docuit. *Willis* verò in morbis convulsivis in primis curiosissimus fuit, & legi meretur ejusdem Tractatus de morbis convulsivis, & hinc cætera scripta practica, præsertim utrumque volumen Pharm. rat. ubi hinc inde etiam de nervosi generis pathematis tractat. De cætero *in duobus locis Sylvius in Praxi cautè legendus* & quodammodo corrigendus.

I. Quod nimis multa effervescentiæ isti bilis & succi pancreatici tribuat, & ubi propior subindè causa sufficeret, eam in adjumentum vocet, ut nihil dicam de effervescentia in dextro cordis ventriculo ex bile ascendente & lymphâ descendente, nec demonstrata hætenus, nec facile demonstrabili.

II. Quod multa nimis tribuat vaporibus & halitibus ex effervescentibus succis in primis viis exhalantibus &c. qui ut plurimum tamen nihil habent in recessu, sed ubi hi ipsi deprehenduntur, motus sunt spasmodici & convulsivi nervorum ex irritatione partium sensilium abdominis, quibus inseruntur, in spasmos contractorum, unde & aliæ partes, cum quibus connexi furculi conjunguntur, continuato tali spasmo per consensum affici solent, v. g. *in Nephritide*, dum tormina intestinorum & vomitus superveniunt. Item in asthmate convulsivo mulierum hystericarum.

*Willisium* verò quod attinet, hujus copula elastica interea in medio est relinquenda, donec certior ejus ratio constet. Quin in affectibus spasmodicis acidum, aliudve dolorosum irritans, & mutuus nervosarum partium consensus interea sufficiant. Hi ex modernis in primis tyroni sufficiunt.

*Veteres quod attinet Scriptores*, horum omnium loco fit *Sennertus*, cujus libri practici loci communes sunt, ex omnibus Scriptoribus antecessoribus combinati, vel loco hujus fit *Forestus*, ejusdem nempe observationum libri, in cujus scholiis tota ferè praxis secundum veterum sententiam conscripta apparebit, per curationes plus minus illustrata.

Obser-



*Observationum Scriptores legendi sunt cum iudicio exacto, attendendo 1. raritatem & varietatem casuum. 2. effectum remediorum; Ubi circumstantiæ ponderentur climatis, ægri, vitæ generis &c. Si non sint notatæ, modò huc, modò illuc cogitatio dirigenda pro causa & origine casus cognoscendi. Ubi explicatio circumstantiarum & theoria simul notata adest, consideranda eadem, ex quib⁹ principiis procedat, & si possibile, cum probabilioribus concilietur. Hinc effectus probè considerandus, tam remedium ipsum & ejus efficientiam per se, quam quo modo adhibitum fuerit, æstimando: hinc circumstantiæ pensitandæ, quatenus vel promovere, vel impedire, vel immutare talem effectum potuerint: Quid aliud vel melius, vel succedaneum adhiberi potuisset. Hoc enim modo praxis habitualis fundamentum acquiritur.*

Quoad observationum scriptores sit instar omnium *Bornet* in suo thesauro Practic. *Hellmontius* sedulò, sed judiciosè legendus, experimenta ejusdem tam chymica quam medica optima, & quantum hætenus constat certissima. Theoria interdum nimis subtilis, subinde vix intelligibilis. Lectori saltem veterinum excutit, & nolentem volentem ad ulteriorem indaginem excitat. Imitatio practica impossibilis, quamdiu ejusdem sc. destituimur remediis. Interim quantum possibile, eam imitari conemur: Optimam autem suggerit methodum à priori curandi.

## CAPUT I.

De

## F A M E L Æ S A.

**T***Ribus modis læditur fames animalis; aut enim imminuitur, ac interdum fere penitus aboletur, nempe in Anorexia; aut augetur in appetentia canina; aut depravatur omninò, ut in Pica & Malacia.*

Quod attinet inappetentiam sive Anorexiam, *causa ejus generalis est defectus vellicationis in orificio stomachi sensili à fermento digestivo acido volatili. Causa est vel in orificio stomachi nervoso, vel in fermento digestivo.*

Quoad orificium sensile deficit sensus vellicationis in stomacho propter nervos, vel propter spiritus animales affectos, ita ut alterutro vitio non sentiat stimulus in orificio stomachi.

*Si Nervi sive per essentiam, sive per consensum malè habeant, anorexiam inferunt. Sic Nephritis appetitum deiecit, quoniam renibus affectis etiam reliqui nervi ex plexu Fallopiiano sive Mensenterii simul afficiuntur. Unde non tantum dolorem stomachi & vomitus excitant, sed præterea appetentiam deiciunt,*



ciunt, quod pariter usu venit *in colica*, & affectibus intestinorum cæteris, *Hernia* itidem &c. in quibus ratione continuitatis stomachus simul plus minus afficitur. Quoad *spiritus animales*, hi *in appetentia causa sunt*, quando narcoticis stupidiore redduntur, indeque nervi minus sensiles: *vel quando* motus eorum à fortiori objecto ita immutatur, ut vel non ferantur sufficienter ad stomachum, vel facta ibidem impressio non sufficiat determinando spirituum motui, à fortiori objecto perturbato. Sic notum est, *opiata & narcotica* appetitum prosternere, quatenus stupidum suo modo reddunt superius orificium stomachi, ut quasi insensibile fiat: unde & *fumus tabaci* solet obtundere famem. Hinc milites *fumum tabaci* usurpant pro fallendo & profligando appetitu. Facit huc inventum Indorum, quod refert *Sennertus lib. 3. Pr. part. 1. sect. 2. cap. 2. p. 97.* ex Monarde, dum ipsi ad fallendum appetitum utuntur medicamento, ex foliis tabaci & conchyliis fluviatilibus calcinatis facto, in pillulas redacto. *Pertinet huc, quod deliria, tristitia, terror, triste* ex inopinato allatum, *nuncium* subito appetitum dejiciant, non secus ac alia graviora pathemata quælibet, item *magni dolores*, quatenus hæc omnia conspirant, ut spirituum animalium motum immutent, ut *partim* non dirigantur ad stomachum pro supplemento fermenti digestivi, *partim* spiritus vehementius commoti in cerebro, non recipiant impressiones in orificio stomachi factas, utpote istis minus vehementes. Sic parili ex causa ex *subitanea pedis luxatione* optimus etiam Helmontii prostratus fuit appetitus.

Quoad *digestivum fermentum* hoc anorexiam infert, *quando vel deficit* in stomacho, *vel quando* acidum esurinum est obrutum à copiosa materia viscida, *vel redditum iners* à materia vel substantia pingui.

*Deficit* in stomacho *fermentum digestivum* variis ex causis. Hinc aer *astivus* calidus & squalidus minorem reddit appetitum: contra hybernus eundem auget: arbor ibi rariores & subtiliores spiritus magis absorbi, hinc verò eosdem magis concentrari, unde varia fermenti activitas. *Potus nimis* etiam appetitum prosternit, diluendo fermentum digestivum, in specie *seri lactis usus nimis* appetitum prosternit, observante *Timæo in casibus p. 111.* in sero nempe lactis alcali volatile est copiosum, plus minus oleosum, ratione cuius refrigerat & laxat, sed simul fermentum stomachale debilitat. *Calculus stomachi* etiam appetitum prosternit, teste *Höfero in Hercul. Medic. p. 137.* non secus ac *alcalia assumpta*, item *gialia* appetitum enervare solent. De quibus notissimum est, quod notabiliter appetitum dejiciant, obtundendo penitus activitatem ac acrimoniam fermenti digestivi. Præterea nil magis est, quod *pituitam acidam* in stomacho primisque viis *accumulet*, quàm *pinguia copiosius assumpta*, superingesto potu frigido. Hinc notabile est exemplum appetentia per decem dies penitus prostrata ex oleo violaceo cum cera & adipe in Emplastri consuetudine assumpto. *Vid. Senn.*

Senn. l. 1.  
gitantes  
viscida  
potus non  
cipitaris  
linæ, in fi  
tus ex se  
ercendo  
mutando  
mulierib  
exemplu  
duo ex  
Prax. l.  
machun  
teratur.

N  
tim exp  
phæ plu  
omnibu  
ventricu

Q  
si citra  
stomac  
malign  
perunt a  
cipio &  
ne rever  
est vel r  
bres rã  
quand  
recidiv  
bilitate  
in qual  
33. sect  
fastidic

In  
tollitur  
nervi a  
dum li



*Senn. l. 3. pr. part. 1. ſect. 1. cap. 1. p. 76.* Gulones pariter nimis unâ vice ingurgitantes appetitum dejectum poſtmodum aliquandiu experiuntur. *Saliva* itidem *viſcida & glutinoſa* ordinario appetentiam dejectam ſolet inferre. *Cereviſia & potus non probè defecatus* præſertim *recentior* appetitum proſternunt. Præcipitarenim ſolet & ac fœces in ſtomacho, quæ cum ſint naturæ terreſtris alcalinæ, inſigniter debilitant fermentum ſtomachale. V quoque copioſius aſſumptus ex ſe proſternit appetentiam, acrimoniam ſalsam fermenti temperando & coercendo. *Excernenda* denique *ſuppreſſa* alterantia contenta corporis, etiam immutando plus minus acidum eſurinum ſtomachi, anorexiam inducunt. Sic nempe mulieribus *ex ſuppreſſis menſibus* deſicitur & depravatur appetitus, ac notabile exemplum habet *Schenckius lib. 8. obſerv. p. 370.* de inſigni in appetentia in viduo ex Quis deſuetudine cum mœrore contracta. Fit etiam, (*vid. Sylv. Prax. l. 1. pag. 15.*) ut aliquando *bilis* vitioſo motu ſuo regurgitet in ſtomachum, unde & appetitus proſternitur, quatenus fermentum digeſtivum alteratur.

Notum denique eſt, quibusdam in febribus proſtratum eſſe appetitum, *partim* ex perturbato motu in corpore motu, *partim* ex humorum adeoque lymphæ plus minus facta alteratione & imminutione in univerſo corpore. Ex omnibus his *cauſis* inter internas *frequentiſſima eſt viſcidum qualecunque in ventriculo*, acidum eſurinum enervans, ejuſque aſtivitatem impediens.

Quoad *Prognofin*, nunquam bonum ſignum appetitus proſtratus, imprimis ſi citra cauſam manifeſtam aut citra oppreſſionem ſtomachi ex acidi naturalis ſtomachi defectu, vel ejus omnimoda extinctione oriatur, ut in principio febrium malignantium evenire ſolet, peſſimum eſt ſignum. Pejus eſt ſignum, ſi nihil appetunt ægri, quàm ſi appetunt alimenta, allata verò ſtidiunt. Appetitus in principio & ſtatu morbi deſectus non eſt adeò malum ſignum, modò in declinatione revertatur. Quod ſi verò in declinatione demum morbi proſternatur, ſignum eſt vel recidivæ, vel alterius cujuſdam novi morbi. Speciatim poſt quaſlibet febres tam continuas quàm intermittentes curatas bonus redire debet appetitus, quamdiu hic non redit, aut qui rediit, denud proſternatur, ſemper pertimeſcimus recidivas febres. Denique *fatale eſt ſignum*, quando ægri in ſumma virium debilitate ſubito alimenta, quæ antea ſtidiiverunt, appetunt. Alias veriſſimum eſt, in qualicunque etiam articulo verſetur æger, quod inſinuat ab Hippoc. Aphor. 33. ſect. 2. ad ea quæ offeruntur, rectè ſe habere, i. e. adhuc aliquantulum ſine ſtudio comedere, ſemper bonum ſignum eſt.

In appetentia dejecta *curanda* habeamus rationem cauſarum, his ſublatis tollitur effectus. Hinc ſi à cauſa externa ſpiritus turbentur, ſi per conſenſum nervi afficiantur, ad hæc ipſa ſcopus dirigendus venit. Inſpecie quod hic agendum ſuper eſt Medico, eſt, ut expurgentur ea, quæ vitioſa hærent in ſtomacho,



& hinc appropriatis plus minus aromaticis, item acrioribus membranas stomachi seosiles nonnihil stimulantibus, appetentia successivè revocetur. Evacuantiæ inter *Vomitória* sunt optima, utpote stomachum immediatè evacuantiæ, eaque ex *antimonio* desumpta: qui abhorrent à vomitoriis, purgantib<sup>9</sup> utantur, quæ inter præpollent *aloetica* omnia, v.g. *Pilula Francof.* seu *Angelica* dictæ (vid. *Hoffm. Clav. Schrod. p. m. 105.*) *Pilula usuales Ludovici*, quas vid. in *Ludov. Pharm. p. 179.* item *Pilula Aloephagina* cum Scammonio acuata, quæ pro scopo purgandi assumuntur manè cum custodia. Pro scopo verò stomachum saltem successivè purificandi, capiantur vespertino tempore una alterave hora ante cœnam. Ubi fortius agendum est, Veterum compositio nempe *Mass. pilul. de hiera* cum agarico convenit, addendo simul pro mucis stomachum obsidentis incisione vel gumm. Ammon. aut pro ejusdem correctione extract. absynthii &c. v. g. in muco viscido ex stomacho evacuando. *℞. Mass. pil. de hier. c. agaric. gr. xij.*

Extract. absynth. gr. vj. vel hujus loco

Gumm. ammon. in ✕ solut. gr. viij.

Scamm. ⚥ati gr. j.

Extr. troch. alh. gr. β. c. f. q. Elix. absynth. a. Propriet. Par. q. f. f. Pilul. D. S. *Laxirende Magen: Pillen.*

Quoad *alterantia* ad appetentiam dejectam restituendam sunt eadem tam *aromatica*, sed paulò acriora, quàm *blanda acida*, illa non saltem corrigunt pituitam mucaginofam in ventriculo, eamque sale volatili oleoso plus minus acri incidunt, attenuant, ac rugas stomachi blandè detergunt, quo facto sponte redit appetitus. *Acida* verò pro simili incidendi & attenuandi conveniunt usu, ac præterea blanda adstrictione tonum stomachi firman, plus minus per opiata, copiosa potulenta, spir. vini ab usum aliisve modis resolutum. Sed observandum, quod per *acida* provocare quidem seu irritare nonnihil possumus famem, sed genuinam pro stimulo digestionis præparare Medico impossibile est, adeoque optimum est, removere potius impedimenta: quo facto ipsa natura appetitu debito se refocillat si ve recolligit. Appetitus talis, per *acida* quasi arte factus, subinde plus nocet, quàm prodest. Nam hi occasione *acidi* stimuli plus ingerunt ægri, quàm naturali fermenti virtute digerere valent, unde cruditates *acidæ* sic colliguntur, mille malorum matres. Sanè vix, præterquam à tartaro, ulum proficuum in hoc casu observavi ab aliis, præsertim mineralibus, nisi forsan in atonia ventriculi, hanc restituendo, aliquid opis contulerint, adeoque *aromatica* præsertim acriora paulò imprimis proficua observavi: quæ inter excellit *mentha*, item *absynthium*, in genere omnia *aromata*, in primis *cinnamomum* & *piperata*, in appetitu dejecto sunt convenientia: non minus quoque *Zinziber* & *Zedoaria*. Hinc *Elixir mentha cum spiritu proprio* per infusionem paratum, addito pauco saccharo est egregium. Perinet huc & *radix acori*, quò acrior, eò melior, unde communiter *Behrwurzel* appellatur.



pellatur, siue recens usurpetur minutim incisa cum coehleati spiritus juniperi. Vel eadem in loco umbroso siccata, sed non præparata, in pulverem redigitur, seligendo saltem substantiam intermediam acrem, & cum dimidio extracti tormentillæ miscendo, egregium suggerit pulverem stomachalem contra Anorexiam. *Radix armoracia* recens merito etiam commendatur à *Gabelchofero Cent. 1. c. 14.* sicuti & *radix Helenii* recens singulare est stomachicum. item *radix acori veri.* Aliquoties observavi cum in declinatione morborum occasione salivæ viscidæ ac glutinosæ, quod ex infusione rad. acori & helenii recentium in vino optimè habuerint ægri, dum sic saliva correctæ & appetitus egregiè provocatus fuerit. Vel potest fieri nodulus compositus

℞. rad. acori veri ℥ij. helen. ℥j.

herb. menth. crisp. Minj. Zedoar ʒvj. M. pro nodulo.

De quo æger aliquot horis ante pastum, aut etiam in ipso pastu, haustum capiat. Extra hæc & *amaricantia acriora* parili ex causa appetitum provocant. Sic enim in observationibus Riverii communicatis prostat observatio decocti ex foliis *agrimoniae*, *absynthi*, & *cent. min. an. c.* paucis sacchari sumti, quod ad aliquot dies continua tum adeo auxit appetitum, ut etiam canina appetentia ferè secuta fuerit; non secus ac *Thoner. l. 2. obs. 1. p. 141.* fastidium ciborum ingens cum insigni amarore oris curavit, nempe ℞. rad. cichor. herb. absynth. Rom. carduiben an. M. i. cent. min. Mss. decoq. in vini & aq. cichor. ana Mss. ad tertiæ partis contumtum. de quo manè & vesperti bonus haustus capiatur. Similis verò observatio *Foresti l. 18. obs. 8.* Alias essentia *mentha*, *Zedoaria*, *pulegiæ*, ac similes in usu sunt. Quo etiam pertinet *Elixir stomachale D. Michaelis.*

℞. herb. menth. crisp. M. iiij. meliss. puleg. Salv. an. M. ij.

rad. pimpinell. ℥ij. calam. aromat. ℥j.

granor. mastich. ℥jss.

Zedoar. Galang. an. ʒjss.

Cubebar. nuc. moseh. cinamom. macis.

caryoph. zinziberis an. ʒß. Infundantur in spiritu menthæ acuat

spiritu esurino Oli Philosophici ad gratum saporem. Essentia probè extractæ additur extract. calam. arom. quantum potest in essentia dissolvi. Dos. gut. 30. vel. 40.

*Elixir. propriet. Par. c.* acido in trivio notum est, ad 30. guttas jejuno stomacho usurpatum. De cætero tinctur. tartari, i. e. sale alcali quasi caustica facta, ad 40. gutt. usurpata, & impedimenta stomachi remover, & acri stimulo appetentiam corrigit. Præter hæc etiam ☉\* egregiè incidit & attenuat mucilaginem viscidam in ventriculo hærentem, adeoque multum facit ad revocandum appetitum, præscribitur convenienti timè cum aromaticis.

℞. ☉\* ci ʒj. spec. diapipereon ʒß M. S. *Magen. Pulver* pro 3. vel 4. dosibus. Facit huc pulv. stomachal. D. Michaelis.

B 2

℞ rad.



## De Fame leſa, Appetentia canina, &amp; Bulimo.

℞. rad. aron. ℥. ij. Panaceæ Holſtein. ℥. j.  
 ſal abſynth. ℥. β. rad. calami arom. ℥. ij.  
 cinamom. caryophyll. an. ℥. β.  
 macis, piperis long. zinziber.  
 cubeb. cardamon, zedoar. an. ℥. j. M. F. pulv: Doſ. ℥. β.

Ad ſalia hæc etiam tartar. vitriolat. pertinet. Quoad acida ad appetitum provocandum interdum, præter tartarum primas vias ſimul blandè abſtergentem & relaxantem, mirè conveniunt cydonia. In his enim abſoluta q̄s. cura eſt appetitus proſtrati, imprimis cum alvi fluxu plus minus conjuncto. Hinc Zacut. Luſitan. non ſatis commendare poteſt quovis modo uſurpata. Hinc ſuccus cydon. per ſe aſſervatus, item pulpa cydon. plus minus aromatizata ſunt egregia.

℞. aq. menth. ℥. ij. cinam. ℥. ij.

Succi cydon. ℥. j. ad ℥. β. Syrup. cydon. arom. ℥. β. M. capiatur cochleatim. De cætero ſpirit. ſalis, item vitrioli à quibusdam uſurpantur ad Anorexiam, ſed melius conferunt tales ſpiritus, ſi cum ſpiritu vini dulciſcentur. Sic enim nonnihil temperatiora melius conducunt. v. g. ℞. ſpir. ſalis dulce. gutt. x. ad xx. vel xxx. pro j. doſ. in vehiculo præſertim calido.

Si oriatur appetitus deſectus ex vitio ſpirituum animalium & nervorum, v. g. in ultimo ſenio convenit ambra, item Baſſamus Peruvianus, ſi aliquot guttæ in hauſtu vini propineantur, quod Riverius ceu expertum commendat, unde tinctur. baſſam. Peruvianiſive eſſentia in hoc paſſu foret uſurpanda.

Quando pingua proſternunt appetitum aut bilis, conveniunt medicamenta ex abſynth. item Elix. Prop. cum eſſentiis amaris miſtum. In febris, præſertim intermittentibus, ad revocandum appetitum amara talia, v. g. præter dicta Elix. febril. Myſſ. ſunt optima, quod Elixir vid. in ejus theſaur. armam. p. 254.) ſi à narcoticis proſtratus ſit appetitus, acida eum revocant. Inter externa conveniunt cruſta panis probe ebria vino aut aceto, pulv. caryophyllorum aliorumve aromatum aſperſa, & ita inſtar ſcuti ventriculo applicata. Item Elixir mentha calidè cum fruſtulo intincto ventriculo impoſitum, applicando deſuper laterem calefactum, admodum convenit, præſertim in ſpirituum deſectu, Baſſamus Angelicus ventriculo illitus, mirè etiam appetitum provocat.

Appetitus nimius duplici appellatur nomine, nempe Appetentia canina, item Bulimos. Hæc inter talis eſt differentia, quod ii, qui laborant fame canina, avidè ingerant alimenta comminuta, eaque vel digerant, vel ſubito ingeſta denuò evomant. Bulimos verò eſt magna fames, in qua ægr, propter ſtomachi oriſicium ſuperius moleſtius affectum, per ejusdem conſenſum animi deliquium pariuntur, ita ut appetentia canina ſit ingens fames, qua copioſè alimenta ingeruntur, nunc cruda vomitu rejiciuntur. Non enim ſemper

cum



cum caninâ appetentia conjunctus est vomitus, ut testatur obs. *Sennert. l. 3. Pr. part. 1. sect. 2. cap. 4. p. 101.* *Bulimos* verò est ingens fames cum lypothymia sive animi deliquio conjuncta.

*Causa* appetitus aucti, tam in *Bulimo quàm appetentia canina, in genere est acidum potentius*, idque volatile vel penetranter activum, adeoque non à materia viscida irrititum sive fixum, sed subtile & qs. spirituosum, stomachi orificium sinistrum continuò morficans. In hoc ipso omnes Medicorum sectæ conveniunt, Veteres enim, dum accusant humorem melancholicum, hoc ipso acidum Hippocratis confirmant. Alii accusant bilem porraceam & aruginosam, sed in hac bile primario peccat acidum. Hermeticorum schola ad spiritum salinum esurinum & vitrolicum famelicum confugit, promptè quælibet, ceu forte menstruum, dissolvens, indeque stomachum rodens; Et hoc ipso itid. acidum insinuat. Nec deest experientia: Acida enim assumpta appetitum naturalem provocant, unde & à simili concludendum, similiter à tali causâ appetentiam caninam oriri. Illustrat hoc experientia illorum, qui laborant appetentia canina: Hi enim jejuno stomacho vomitu rejiciunt succos insigniter acidos, teste *Fonseca lib. 2. obs. 86.* Atq; hæc quidem ordinaria est appetentia canina causa. Extraordinaria canina appetentia oritur à vermibus, cujus exempla sunt rara, prostant tamen hinc inde; Exemplum *Tralliani* de muliere, immodica appetentia laborante, post excretum vermem 12. cubitos longum, ab hieræ usu curata. Vid. hinc imprimis *Zacut. Lusit. in lib. 2. Medicor. Princ. Histor. 68.* Memini etiam Dn. Michaellem aliquando curasse scæminam scorbuticam, appetentia canina laborantem, quæ post usum succi nasturtii aquat. rejecit lumbricum latum insignis longitudinis, ex quo appetentia canina cessabat. Verum an vermes soli inducere possint caninam appetentiam, dubitatur meritò, quia taliter appetentes promptè digerunt, quod à vermibus fieri nequit. Putarem igitur, potius cum vermibus simul adesse acidum esurinum, nimum, à quo & appetentia oriatur, & promoveatur digestio.

Cæterum, utut tales canina appetentia laborantes multa devorent, & citò digerant, rarò tamen pinguescunt, quia in talibus Massa sanguinea asperior & minus nutritiva est, propter acrius acidum in corpore luxurians. Nutritio n. fit objectivè seu materialiter à succo blando, subdulci, chyloso, unde eorum massa sanguinea, qui probe nutriuntur, est semilactea, ut videmus in infantibus.

Hinc & Scorbutici subinde atrophîa laborant, propter excessivum acidum, specifici tamè saporis, à quo alterata Massa sanguinea minus corporis nutritiva evadit. Unde rarum est, quod habet *Amatus Lusitan. Cent. 7. cur. 37.* de muliere melancholica cum ingenti fame multa devorante, & exinde pinguescente. Rarissimum est, quod observata fuerit fames canina periodica; item fames canina epidemice grassans, de quibus vid. *Schenskius l. 3. obs.* Ubi de fame canina agit.

Quoad *Prognosin*, affectus est citra periculum, nisi propter animi deliquium



interdum immineat morbus, aut exinde deficiat æger. Post morbos, inprimis febres, in ſtatu convaleſcentiæ ſubinde invadit appetentia, caninæ ſimilis, quæ tamen eſt ſine periculo, niſi ægri, nimis comedendo, recidivam ſibi accerſant. Bulimos ſuperſeſſens morbos chronicos, quartanas, hydropē, ſerè funeſti eventus eſſe ſolet.

Quoad *Curam*; *duæ primaria ſunt indicationes*. I. ut temperetur acidum illud volatile, quo acrimoniam ſuam amittat, II. Temperatum ita vel corroſivitate ſua exutum evacuetur: ſi enim humorem acidum velis purgare, antequam temperetur à ſua acrimonia, metus eſt, ne peſſima inferat ſymptomata. Si enim ſurſum vis evacuare per vomitum, metus eſt, ne cholera morbus excitetur, ut putat Hartmannus. Sin velis per inferiora purgare, metus eſt, ne exulceret inteſtina, & ita inferat affectum dyſentericiæ ſimilem. Quæ *temperant acre acidum*, ſunt I. *Alcalia dicta*, tam volatilia, quàm fixa, præſertim poſteriora. 2. *Corpora terrea*, quæ illud abſorbent & imbibunt. 3. *Pingua & oleoſa*, hiſque ſimilia, quæ obtundunt & hebetant acidum.

Ex dictis patet, quod *ſal abſynth. Bolus armena, terra ſigillata, & omnia ſilia*, convenient in appetentia canina corrigenda. v. g.

℞. corall. rubr. pp. limitatur: & minutiff. trit. a. ʒß.

lap. cancr. car pion. ana ʒj. croci orient. ʒß. M. F. pulv.

qui copioſe aſſumptus manifeſte appetitum proſternit vel imminuit; Eſt autem aſſumendus in juſculo pingui, additur etiam C. C. uſt. creta &c. hinc

℞. rad. jalap. ʒß. reſin. ſcammon. gr. v.

limitatur: & pp. ʒß. ſal Fri gr. v. M. pro ſcopo laxat.

Quoad *oleoſa*; quælibet oleoſa expreſſa, & potentiſſimè olea *deſtillata, carui, caryophyllorum &c.* convenient. Pertinet huc vitellum ovorum ad duritiem coſtorum, quod egregie prodeſt in canina appetentia, continet nempe in ſe multum olei vini acidum obtundentis. Præterea comedendæ etiam *cochlea, & fluviatiles, caro ſuilla, &c.* Talia enim difficiliſſimis paulò coctionis infringunt acrimoniam corroſivam acido-eſurini. *Oryza* quoque, cum multo butyro cocta, ex eodem puncto convenit. Sic ulterius *volatiles, vini, mentha aut ſalvia, vinum item generoſum infuſionis ſalvia & abſynth.* uſurpari poſſunt. Denique non ineptè hiſ vel ſociantur, vel ſubjiciuntur *narcotica*, ſenſum ventriculi ſtupefacientiæ: Cautè tamen uſurpentur, cum palliando ſaltem convenient: ut laud. opiat. item Theriaca, Mithridat. &c.

Quoad *purgantia ſive evacuantia* præter ſupra inſinuatam ꝑemimitandus venit *Foreſtus l. 18. obſ. 5.* qui appetentiam caninam Monachæ, in qua eſuriens cibum evomebat, ſimulque acida, & in fine vomitus ſentientis aliquid amarulenti, quod fauces vellicavit, curavit per pilulas.

℞. pil. hier. ſimpl. Gal. ʒj. rhabarb. opt. ʒß.  
cum ſyr. roſ. F. pilul.

quas



quas cum aliquoties mane sumfisset, vomitus morbusque cessavit, qua ratione & alius juvenis curatus fuit.

Quod attinet *Bulimum*, curatur optimè per *vinum*, quod quò generosius, eò magis satisfacit scopo Medici. *Vinum malvaticum* præ cæteris convenit: item *odor panis solis*, vel quod melius, vino intincti est proficius: loco vini simplicis vinum compositum Hippocraticum ex Nuce moschata, cinamomo, similibusque infusis præparari & usurpari potest.

*De appetitu depravato* (vid. *Sylvius Pr. l. 1, p. 16. c. 2.*)

Quoad appetitum depravatum, vocatur hîc ordinariò *Pica*, item *Malacia*.

*Pica* in genere est appetitus ita depravatus, quo quocunq; tempore inusitata penitus appetuntur. *Malacia* v. est appetitus nimius, usualium tamen, vel ita ut apperantur usualia, sed cum appetitu sive desiderio nimis intenso, undè & interdum plus quàm conducit, comedunt. v. g. *Pica* est, quando gravida appetit carbones. *Malacia* v. quando haleces, sed utrumque appetitu nimio.

Opponitur *Picæ & Malaciæ Fastidium determinatum*, quando determinatè sibi quidam fastidiuntur: uti v. g. a versatio casei quorundam &c.

Quoad *causam* appetitus talis depravari, sicut in genere appetitus oritur à fermento digestivo vitali, ita in specie etiam appetitus tam auctus, quàm depravatus in *Pica & Malacia*, ex illo originem ducit. Ex hoc videmus, quod omnia animalia, uti in suo genere determinatum habent fermentum digestivum, ita ab hoc ipso etiam determinatur eorum appetitus. Sic canis appetit ossa, felis mures, ciconia ranas, cujus nulla alia est ratio, nisi quod specificum in illis fermentum appropriatum suæ activitati postulet objectum. Unde simili ratione *Pica* vel *Malacia* oriri videtur, utut specificatio ista fermenti, ut nempe in singulis speciebus certo modo appetitum determinet, à priori adhuc imperferatibilis sit.

*Pars affecta primaria* ordinariò statuitur stomachus seu orificium superius: Ubi enim fundamentum est, & quasi residet appetitus naturalis, ibi quoque residet præternaturalis seu depravatus. Sed si ritè rem consideremus, manifestum evadit, affici simul phantasiam, gustum, odoratum, auditum seu horum sensuum organa. *Phantasiam* affici, ex eo certum est, quod homines, dum stomachus appetitu sensibili, ut sic dicam, afficitur, seu à fermento digestivo vellicatur, singulari affectu ferantur à tam varia, ut sunt creta, corallia, carbones, &c. nam fermentum præcisè non determinat hoc vel istud, sed phantasia, ergò & unque phantasia vitium habet. Si inter fermentum stomachi, ejusque in nervos ejus operationem, & inter appetitum hinc consequentem animalem intercedit intermedium phantasie opus, ut scil. appetitus depravetur, necesse est, ut prius phantasia, quæ id, quod à reliquis sensibus externis & interno communi susceptum fuit,

com-



componendo & dividendo, quasi actu perficit, pravè afficiatur, à quacunque causa occasionali fiat, quæ tamen frequentissimè in ventriculo fomitem seu nidum sibi eligit, adeoque *Picæ & Malaciæ sedes primaria* in facultate animali, i. e. subjectum in hæsiōis in animalibus erit locandum. *Quod gustus afficiatur*, certum est ex eo, quod cibi pessimi saporis cum insigni voluptate deglutiantur, ut dicant, tales cibos habere saporis elegantissimos. Sic *Salmuth. Cent. 2. obs. 62.* Picam refert, omnia candida, etiam calcem parietum ac cerussam singulari voluptate deglutientem. At *Borell. Cent. 4. obs. 2.* Virginem picantem refert, stercorea humana comedentem. Unde certum est, affici gustum, quia aliàs talia ingerere non possent. Res illustrari potest ex eo, quod suppressio mensium in mulieribus creberrimè det picam, quando sc. sanguis separatus in vasis uteri, indeque ad corruptelam sui tendens, ob denegatam excretionem sensim sensimque regurgitat in totam massam sanguineam, unde consequenter & afficitur lymphæ, quæ, uti per internam tunicam stomachi glandulosam transudando, ad supplementum fermenti digestivi concurrat; ita eadem Salivæ materia existit. Dum igitur saliva infecta est, non potest non lingua simul affici, & gustus depravari. *Fracassatus* equidem in *Epist. de lingua p. 255.* gustandi hanc in pica depravatam voluptatem à papillis nerveis vitiatis in lingua deducere nititur; Sed consultius puto, si fundamentum constitutur in saliva. *Afficitur etiam odoratus*: Sic enim *Salmuth. Cent. 2. obs. 63.* Virginem picantem refert, quæ mirè delectabatur fæore veterum librorum, à blattis & tinea exesorum, situque prorsus corruptorum, unde & totos dies in libros illos nasum immittebat. *Borellus cit. loc. aliam* memorat, quæ corii odore delectabatur, ut semper illud pro masticatione in ore teneret. Probant hæc, non simpliciter ad stomachum, sed phantasiam, spiritusque animales, & hinc cætera sensoria respiciendum esse. Id quod ulterius confirmatur ex eo, quod picantes non præcisè in alimenta ferantur, aut in talia, quæ alimentorum loco ab iis ingeri possunt, sed etiam in alia aliorum sensuum, non præcisè gustus aut tactus in stomacho objecta, v. g. dum pica impellit mulierem ad exsuctionem venti ex foliis, vel dum alia per picam appetit fragorem carbonum fossilium pedibus contritorum, qualia exempla cum præcisè ex stomacho secundum certam famis vel sitis modificationem affecto non oriantur, potius phantasie, suo modo aberranti, rectius tribuuntur. *Confer Acta Societ. Reg. vol. 1. p. 447.* Interim frequentior depravationis phantasie occasio est ex ventriculo, ob vitium fermenti digestivi alterati, unde & frequentiores picantes ad edulia varia, aut quæ horum loco ingerere possunt, declinant. Confirmat hanc fermenti in quibusdam casibus depravationem, *Exemplum Hildani Cent. 1. obs. 37.* Nempe ex ulcere faucium pica, quæ appetebat patiens haleces, pisces & carnes salitas ac fumatas, quæ optimè deglutiebat, res verò non appetitas, juscula &c. nullo modo deglutire poterat, illa tamen & deglutire poterat, & licet graviora, sine nullo nocumento benè dirigebat. Scilicet ex ulcere faucium destillans successivè in ventriculum acrior sanies acido-salsa al-

teravit



reravit in tantum fermentum digestivum, & tam singularem impressionem fecit in officio stomachi, ut exinde talis inordinatus, determinatus tamen appetitus fuerit insecutus. Sic ex *scabie* retropulsa picam creta observatam vide in *A. N. C. Ao.* 1. p. 199. sic cum *scorbuto* interdum malacia complicari solet, de quo *vid. Horst. obs. p. 395. l. 7. obs. 35.*

Ex haftenus dictis *definiri* potest *Pica*, quod sit appetitus variarum rerum absurdarum, ex phantasia corrupta, quacunque occasione vitiata, originem ducens. Adeoque sub hac latitudine *Subiectum picae* erant spiritus animales, vel vitiati, vel vitiati moti, quatenus exinde opus phantasiae depravatur, ut ut crebrior occasio sit ex ventriculo, & huius fermento alterato, ubi subiectum radicationis erit. *Causa proxima* erit vitiatus spirituum motus, quatenus phantasiae munia turbat. *Causa remota* occasionalis est multiplex, Mensium defectus, gravidatio, fermenti digestivi alienatio, & quae sunt aliae plures circumstantiae, semper hic probè observandae. Uno nomine videtur *Pica* revera esse species *Melancholiae Hypochondriacae*, in qua ad certum quoddam phantasma dirigitur imaginatio. Quod si vitio fermenti digestivi oriatur affectus, ad certum quoddam edulium, vel huius loco aliud quid inusitatum assumendi phantasia dirigitur, & inde tam depravatus appetitus supervenit; hinc &

Tali in casu I. Stomachus evacuandus. II. Fermentum vitiatum acrius factum, & c. vel per *Stomachalia* saturandum, vel per alia appropriata alterandum. III. Ipse ventriculus appropriatis plusminusus acidis roborandus. Sed *decidenda prius conversarum biga*, nempe I. An in *Pica* stomachali appetantur similia, an verò contraria, i. e. an ea, quae conveniunt cum fermento stomachali; an verò quae non conveniunt? Resp. Appetunt ea, quae sunt similia, siue in quae possit agere, tanquam appropriata objecta fermentum stomachi, eaque digerere, reliqua maximam partem rejiciuntur. Deinde,

II. Queritur, cum in *Pica* subindè extraordinaria ingerantur, hoc ne fiat cum aut sine nocumento aegri? R. Sicut in ordinario victu sobrietas est cardo dietae, & alimenta etiam optima moderatè assumpta conducunt, immoderatè verò nocent: sic pariter, modò non nimium unà vice ingerant, raro nocumentum exinde pati solent. Sic enim *Tulpius* observavit mulierem gravidam, quae tempore gestationis 1400. haeces devoravit, sine noxa. *vid. l. 2. obs. 24.* sic stupenda, quae habet *Plater. obs. l. 1. p. 223.* de puella, quae cepam, sub cinerib<sup>9</sup> coctam, theriacalem impletam, & bubonibus pestilentialibus impositam, posteaque remotam, devoravit, nec inde mali quicquam passa fuit. Scilicet *Forge in comment. super Cartes. de homine p. 285. 286.* refert, mulierem picantem lapides appetentem, qui tamen fuerunt gratiosiores, si prius *Uvae* expositi jacuissent. Ac sanè plurima talia prostant exempla absurdorum & noxiorum, sine incommodo assumptorum: sc. appetitus determinat assumenda, si igitur assumuntur ordinatè, nec una vice nimis copiosè,



non nocent. Aliàs optimi etiam cibi, inordinatius aut copiosius assumpti, in venena degenerant.

Quoad *occasionales causas* verum omninò est, frequentius *Picas* observari in mulieribus gravidis, à quibus ☒ suppressi sint. *Riverius* tamen exemplum habuit *Cent. 4. obs. 93.* de fele picante, non quidem gravida, sed etiam sterili, unde liquor genitalis, vel aliud simile excernendum corruptum, occasionem malo suggestit. Sic *Pica* simile exemplum de cane venatica gravida vide in *Act. Societ. Reg. vol. 1 p. 447.* Non tamen hoc universale esse, confirmant *Pica* puellatū adhuc impuberum; v. g. *pica* in puella 8. annorum observata *M. A. N. C. Ao. 4. p. 150.* Sic pueri, item infantes picantes subinde observantur, dum puer 3. annorum *picà* laborans, curatus refertur à *Fabro curat. 62.* Confer etiam *M. A. N. C. Ao. 6. p. 202.* Quinimò & viri interdum *picà* laborare observantur. Nam sicut certum est, laborare viros affectu *suffocationis hysterica* simillimo; ita & exempla prostant virorum *picà* laborantium, ut nil dicam de curiola observatione mariti, pro uxore gravida *picà* laborantis, de quo confer *M. A. N. C. ao 2. p. 216.* vid. *Marcellus Donatus in sua hist. med. l. 5. c. 1.* Plura exempla *Picarum* vid. in *Schenckio.* Quod si intensior sit picantis matris gravidæ appetitus, non rarò hæreditarium tolet esse malum, quale exemplum habet *Fonscal. 2. consult. 29.* de puella 14. annorum, ab infantia calcem parietum & laterum fragmenta læpe comedente, cuius mater quoque testas & calcem comedere solita fuit. Quo etiam facit *Historia* supra ex *Tulpio* relata.

Quoad *Prognosin* distin. & paululum pronunciandum, Nam citra noxam possunt comedi res appetitæ, sed sobriè, cū quoad alia objecta non edulia, in quæ feruntur mulieres picantes, difficulter ferunt eorum denegationem, cum notum sit de muliere, quæ bis virum dentibus invasit in pectore, qui primum quidem morsum pertulit, alterum verò recusavit, unde factum, ut duos filios in lucem ediderit, viventem unum, alterum mortuum. Jucundius exemplum est *Salmuth. Cent. 1. obs. 41.* de muliere picante, & summo desiderio vellicante barbam lanionis. Interim rectè *Panorolus Pentec. 2. Obs. 50.* inquit, Temperantia mulieribus *picà* laborantibus optimum remedium, ubi plura de regimine mulierum.

Quoad *Curam* supra jam formatæ fuerunt indicationes, & cū præsertim *Pica & Malacia* in stomacho fundata, remediis stomachicis curanda venit. Stomachus vomitorio evacuandus, in non gravidis, tutius, in gravidis, cautius, idque saltem secundo vel tertio gestationis ☒le, & saltem in iis, quæ faciliè vomunt, in aliis ☒sibus vel circumstantiis non sine periculo propinantur vomitoria.

Præmissio vomitorio alteretur vitium in ventriculo, ac corrigatur *labes fermenti digestivi*, quod non potest fieri, nisi removeatur causa istius. Hinc si ☒ses suppressi sint, provocentur &c.

Hinc dentur stomacho grata & appropriata; inter hæc succi cydoniorum, limonum, granatorum acidorum sunt egregii: Specificè commendatur à quibusdam



dam  $\nabla$  pampinorum vitis, vere ex vitium furculis stillans: convenienter possunt cum ea permisceri  $\nabla$  theriac. succus citri & aurant. in forma *zulepi*. Riverius Cent. 4. Obs. 93. specificè commendat pulverem stomachalem Querc. quem ut & Birckmanni vid. in Schröd. Pharm. l. 2. p. 266. Forest. l. 18. obs. 17. puellam picantem curavit. per syrupum de absinthio sæpius usurpatum, propinando postmodum infusum purgans ex foliis sennæ. Potus vini generosi non est inconveniens, quoniam vinum singulariter amicum est stomacho, imprimis si sit infusum super fol. menth. & herb. absynth. Lindanius super Hartmann. specificè commendat conserv. rosar. c.  $\ominus$  li acidulatam, pulvere zedoaria permixtam.

$\mathcal{R}$  Conserv. menth. crisp.  $\mathcal{O}$  lat.  $\mathfrak{z}$  iij.

pulv. zedoar.  $\mathfrak{z}$  iß. ad  $\mathfrak{z}$  ij.

syr. cydon. aromatiz. q. l.

F. Electuar.

Quæritur de V. S. an conveniat? equidem in iis, in quibus ex  $\boxtimes$ ium suppressorum vitio malum oritur, nullum dubium est, quin V. S. methodicè instituta conferat. Non tamen opus est, ut præcisè V. S. semper in tali affectu administretur, nec nisi plethora, aliave indicantia adsint, quæ venæ sectionem suadeant. Sic enim Rhodius in observat. refert de quodam malasiâ insigni laborante, hæmorrhoidum fluxu curato: Unde in tali affectu, ad naturam melancholia hypochondriacæ accedente, hirudinum ad hæmorrhoides applicatio interdum utilis videtur.

Aliàs in non gravidis cura ferè ad imitationem Melancholia Hypochondriacæ instituitur. In gravidis verò præter dicta blandis absorbentibus & stomacho gratis remediis successivè succurratur. v. g. præmissis præmittendis fiat mixtura stomachalis talis:

$\mathcal{R}$ . aq. menth.

meliss. ana  $\mathfrak{z}$  j.

Elix. menth.  $\mathfrak{z}$  j.

succ. cydon.  $\mathfrak{z}$  vj.

syr. cydonior.  $\mathfrak{z}$  ij. M.

de quo subinde aliquot cochlearia hauriantur.

*Fastidium alimentorum* v. Sylv. Pr. l. 1. c. 3. p. 33. Contrarium ferè vitium modò explicatis affectibus est *Fastidium alimentorum*, quod est nausea & horroris sive aversionis species. Avertatur autem ventriculus, quæ ipsi sunt nocua. Unde si ingentum, seu ex certa læsione superveniens sit fastidium, præsupponit semper præcedens nocumentum. v. g. fastidit & horret virgo cinnamomum, quia antea cum hoc larvæ fuerat pulvis purgans violentus, à quo stomachus admodum fuerat læsus. Horreat igitur ægri febricitantes carnem,



quia læduntur ab ejus assumptione, quatenus non digeritur, sed in cruditatem infusam & liquamen amarulentum degenerat, à quo offenditur ventriculus. Horrent igitur agri tales cerevisiam lupulata, partim propter amarorem, cum tales agri subinde de molesto amarore in ore, aut de rebus nidorulentis conquerantur, partim quod non digeratur, sed & ipsa facile nidore hostilem contrahat. Unde vel aquam vinotemperatam, vel cerevisiam secundariam desiderant, cum talia facile transeant, & suavi sub acido sapore amica sint stomacho. Observavi exinde, quibus agris adhuc cerevisiam bene bibentibus, crebrius propter urgentia symptomata, & repetitum exhibitum fuit opium, granulatim licet, quod exinde horrorem cerevisiae contraxerint, propter nauseosum opii amarorem, ventriculorum offendentem. Hiis quibus amara dantur purgantia, resinosa præsertim, ut si subinde urgentur; ita cerevisiam ferè horrent, aquosa vel acidula ferè appetentes. Ob id *fulpi aciduli* tam grati sunt talibus; ob id, quamdiu cerevisia bene sapit, quibusvis in morbis, præsertim acutis, bonum signum esse solet.

Ad restaurandam aut suavitatem & facilem assumptionem cerevisiae & carnis, nil melius observavi, quam Elixir propriet. P. propinatum, ab hoc enim appetitus taliam redit, eoque curatur fastidium.

## CAPUT II.

De

## SITI LÆSA.

Notum est, quod appetamus etiam liquida, eum in finem, ut inserviant instar vehiculi, tam nutrimentis intra corpus distribuendis, quam excrementis extra corpus eliminandis. Ille liquidorum appetitus, naturæ cursu, in solam ▼ fertur, inde & quælibet animalia solà ▼ pura sunt contenta.

Homines verò per artem nutrimentum simul cum vehiculo isto conjungunt, ut videmus in cerevisiis, dum simplicis cujusdam, v. g. hordei grana incoquantur aquæ, ut mucilaginem hordei nutritivam eliciant, sicq; pro potu aquam medicatam acquirant.

*Sitis talis læditur tribus modis.* Vel I. nimia est, vel II. rara seu deficiens, vel III. depravata.

Quoad *sitim nimiam*, ante omnia distinguendi sunt ejus gradus. Est enim vel moderata, vel intensæ seu clamorosa. Illa, v. g. ab exercitio, loquela diuturna, ariditate faucium; Hac in febribus, post assumpta purgantia, assumpta venena acra, &c. Illius subjectum sunt saltem fauces, vel speciatim dicta Pharynx; Hujus subjectum est simul orificium ventriculi sinistrum, seu vulgò dictus stomachus, seu radicalis sedes famis & sitis. Illa faciliè & breviter interdum uno haustu, vel repetita saltem calidâ faucium elutione, est corrigibilis; Hac repetitis etiam plurimis haustibus vix est extingibilis.

Quoad causas (vid. Croll, Pr. instit. p. 6. th. 7.) causa sitis in genere est

omnis



omne id, quicquid certo modo acrimonia plus minus intensi, salia, vel huic simili, fauces aut orificium stomachi sinistrum vellicat, unde prout causa talis vellicans in ventriculo plus minus glutinosa sive viscido hæret, indeque facilius sive difficilius eluitur, magis vel minus contumax esse solet.

Quoad causas remotas sunt hæc vel externa, vel interna. Externa, varia assumpta acria, aromata, salita, piperata, purgantia, arsenicum, Mercurius sublimatus, &c. Interna sunt ferè triplices. I. est acrimonia alcalina, plus minus amarulenta & glutinosa, à bilis, aut cujuscunque contenti fluidi, vel intra corpus congeneriti, vel ex assumptis in stomacho corrupti, & cruditate nidorosa, salia, acri infecti vitio. Hinc in febribus ordinaria comes toler esse sitis, eaque magis vel minus intensi, prout nidorulentum acrius magis vel minus infecerit stomachum, aut prout parciore salivæ tunc solet esse proventus. II. Est acrimonia salia, ut lymphæ in genere, ita lymphæ salivæ in specie, nempe in hydropicis, in quibus ordinariò admodum urgere solet sitis. Item in affectibus catarrhalibus, febribus catarrhalibus, non secus ac in scorbuticis, in quibus omnibus lymphæ salivæ salior, ac simul plus minus glutinosa existens, fomes est contumacis hujusmodi sitis. III. Est saliva pauca, glutinosa, plus minus acris, salia, in Nephriticis, Hemorrhicis, item febrientibus ac similibus, item ex morbis convalescentibus. In talibus enim talis salivæ constitutio, ut famem non leviter imminuit, ita & contra sitim pertinacem ex faucium ariditate, linguæ glutinositate solet inducere. Admodò enarrata salivæ vitia multum tribuunt sive influi, vel materialiter eam simul alterantes, vel ad secretionem ejus plus minus tribuentes. Hinc illorum defectus, vel absolutus in imbecillioribus, defatigatis &c. vel respectivus, dum inæqualis eorum in corpore sit motus, & ad quædam saltem loca specialius diriguntur, ut in magnis doloribus, iracundis, paroxysmis febrilibus imminutis, aut jam inchoantibus, sitis ordinariò ex saliva parciore, viscidior & glutinosiore, indeque cum faucium ariditate sive siccitate affligere solet.

Præter dicta probè etiam notandum, pulmones in promovenda siti multum simul conferre, id quod patet ex iis, qui pulmonum vomica laborant, vel empyematicis, in quibus aridiores fauces cum siti ferè semper observari solent. De cætero ad sitim vel augendam, vel imminuendam, multum facit consuetudo; Sitis enim, qui adfuerit sunt magnis potationibus, crebrius solent sitire, quo facit curius exemplum Deodati in valetudinar. pag. 226. qui refert, puellam septennem admodum sicciosam, ob nutricem bibaculam, à qua fuerat lactata. Observanda etiam est differentia sitis, quod nempe quædam affligat cum ardore febrili, quædam sine eo, ut in catarrhosis, scorbuticis, hydropicis, &c.

Quoad Prognosin, I. si æger sitiens, hæc, in quo omnes causæ, circumstantiæ & indicia sitis, ut lingua arida, os glutinosum aut exsiccum, æstus insignis corporis &c. non conqueratur de siti, malum; quia innuit adesse delirium, aut



omnimodam facultatum, corpus gubernantium, prostrationem, adeoque imminens fatum. II. Sitis in febribus ardentibus pauca, est admodum suspecta, unde non adeo sit securus Medicus. III. Cum naturaliter cum fame nulla sit sitis & contra, adeoque, quamdiu acidum esurinum in stomacho dominatur, deficiat sitis: Ob id in siti plus minus clamosa, illius nempe naturalis defectum semper concludamus; Sicut etiam sitis talis defectu illius aliqualem adhuc præsentiam, & plus minus dominium colligamus.

Quoad curam, I. Tollatur causa irritans. II. Augeatur lymphæ salivæ. III. Fallatur sitis.

Tollunt causam partim acida, partim temperata, acrimoniam salivam plus minus temperantia. Pro his scopis verum est,  $\nabla$  in simplicem appetit natura, sed in illa, præsertim frigida, propinanda sumus cauti. Prostant enim exempla eorum, qui ex nimio aquæ frigida potu fuerunt demortui. Tria recenset Amat. Lust. Cent. 2. cur. 62. Item Schenck l. 3. obs. Marcellus Donatus in Hist. Med. mirab. l. 4. c. 6. Sin v. non immineat mors, metus est, ne periculosum asthma inducat, idque propter coagulationem sanguinis in præcordiis ab aqua frigida factam. Tale observat Gabelchoferus Cent. 2. cur. 17. & 18. Rarissimum est, quod refert Bartholinus Cent. 2. hist. 89. de mulieribus Grönländicis, per aquæ frigida potum à Variolis curatis. Conveniunt igitur hinc potius acida, & hinc temperata. Acida plus minus austera in affectibus febrilibus sunt optima. Hæc inter sunt acetosa, semper vivum, pomacitr. cydon. horumque succi. Item Tamarindi, qui præter hoc, quod sitim compescant, in febribus etiam æstum impediunt, ac blandissimè alvum subducunt. Pertinet hinc dum acetum simplex atque rosaceum, vel violaceum, item phlegma  $\oplus$  li acidulum,  $\ominus$  li,  $\ominus$  is, in febribus æstuosioribus  $\ominus$  i, item  $\ominus$  minerales compositi acidi, seu clysti, potui in primis ordinariò instillandi. Facit etiam huc ipsum  $\oplus$ , præsertim  $\oplus$   $\delta$  iatum ad  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  ij. potui injectum, & ita assumptum, alterat egregiè, & simul sitim mitigat: quin etiam fomitem sitis plus minus glutinosum ac viscidum resolvit & abstergit. Ex his varia possunt fieri præparata, speciatim ex acetosa, cujus radix tingit colore rubro, & recens expressus succus vinum rubellum colore & suavi acidulo sapore elegantissimè refert: Hinc v. g.

$\mathcal{R}$ . decoct. rad. & fol. acetos.  $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$  j. adde  
succ. acetos. recent. expr.  $\mathfrak{z}$  ij.  
syr. ribium.

granator. ana  $\mathfrak{z}$  vj.

M. pro julepo.

Usitatè præscribuntur tales ita:

$\mathcal{R}$ . decocti hord. simpl.  $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$  j.  
succ. citr.  
cydonior. ana  $\mathfrak{z}$  j.

Tinct.



Tinct. flor. bellid.

rosar. ana. ℥j.

syr. acetos. citr. ℥i℥. M. pro julepo.

Julepi item, instar tincturarum per infusionem extempore parati, sunt gratissimi; ubi tamarindi adhibentur;

℞. Tamarind. conquass. ℥ij.

Coq. in s. q. aq. simplic. Col. ℞. ℥j. adde

Tinct. violar.

rosar. ana ℥j.

syr. berber.

ribium ana ℥j. M. D.

Conveniens etiam *decoctum Tamarindorum cum passulis*, egregiè temperans, ac simul alterans, præsertim istis in casibus, ubi aciditas Tamarindorum nonnihil, suspecta videtur. Ista, quæ temperando sistunt sitim, sunt inprimis *Lac*, ejusque in specie *serum*, item *passula*, ex quæ his parata *decocta*, quibus suo modo & *radix China*, item *lignum sassafras* pro circumstantiarum ratione addatur. Præ cæteris *serum lactis* ☉ volatili, sed & ☉so temperato turgidum, excellens est in siti *februm*, præsertim *cum scorbutico complicatarum*, sistenda, alvum simul apertam servat, ☉ia quævis acria corrigit, ac per ☐as expurgat. Usurpatur nunc solitario, nunc cum pauco *succo citri* acidulatum, quando nempe in Mensi feri lactis infunditur pomum citri, vel totum, vel dimidium in taleolas incisum, ac hinc colatur: Sic enim citri acidum, butyrosam ac superfluam caseosam partem ex se ro præcipitat, ut exinde potus admodum suavis emergat. Ex *seminibus* item *frigidis majoribus*, item *granis hordei*, *amygd. dulc.* & similibus, *emulsionem* quoque sunt, contra sitim non inconvenientes.

Dum loquor de *Siti scorbutica*, observandum est, quod, præter *serum lactis*, elegans sit *decoctum radicis china cum liquiritia*, ut temperet acrimoniam salis scorbutici, sitim inducentem. Modum præscribendi docet *Timans l. 3. Epist. 29.* ad ejus imitationem præscribi potest ita:

℞. rad. chinæ in taleol. incis. ℥i℥.

liquirit. ras. ℥vj.

santal. rubr. ℥iij.

Infund. in ∇comm. ℥vj. stent in M. B. per noctem, mane adde passul. minor conquass. ℥i℥.

Coq. lento igne in vase cooperto ad remanent. ℥iv. de quo quotidie subinde pro lubitu bibat, vel bis quotidie bonum haustum capiat, manè calidè, & à meridie frigidè. Vel.

℞. rad. chinæ ℥j.

liquirit. ℥iij.

rasur.



raſur. lign. ſaſſafr. ℥vj.  
ſantal. rubr. ℥iij.

Infund. in aq. comm. ℔vj. ſtent. in M. B. per noctem, mane adde  
paſſul. min. conquaſſ. ℥iij.

coq. lento igne ad remanent. ℔iv. Colatur. D. S. *Tranck gegen den Durſt.*  
Mentio facta eſt *liquiritia*: Hæc cum ſem. *fœnic.* decocta, temperat ſitum, quan-  
do hæc oritur præciſè *ab acrimonia ſaſſa*, quales affligere ſolet *phthiſicos*; *hecti-*  
*cos*, *catarrhofos*, in quibus caſibus non adeò conveniunt *acida*, aut ſaltim parciſſi-  
mè propinanda, ſed potius temperata talia *ex paſſulis, liquiritia, hordeo*, & ſimi-  
libus. v. g.

℥. hord. rec. Mj.  
paſſul. min. ℥j.  
liquirit. ral. ℥ß.  
cinamom.  
ſem. anit.

fœnicul. ana ℥j.

Coq. in ℔vj. aq. font. ad Conſiſtent. bibat pro lubitu.

Ea quæ pro ſecundo ſcopo lympham ſalivalem augent, ſunt *potus* *¶ ei*, plus minus  
*vinofi* &c. Sed de his aliſque Salivæ vitiis corrigendis conferatur *Sylvius lib. 1.*  
*prax. cap. 51. & 52.*

Ex omnibus, quæ ſalivam viſcidam ac glutinoſam attenuant & reſolvunt,  
inprimis excellit *ſal armoniacum*, internè ſubindè uſurpatum.

Quæ *tertio ſcopo* ſitum ſallunt, ſunt ea, quæ os abſtergunt, fauces gargarisan-  
do eluunt, ac ſimili ratione licèt non tollant, ſaltim minus torquere faciunt. Con-  
venit igitur *cereviſia ſecundaria calida*, pro faucibus crebrius eluendis, item liquo-  
res *gargarizatum* inſtar in ore volutandi & retinendi, præſertim quando lin-  
gua ſimul eſt arida, ſcabra, plus minus nigricans. In talibus caſibus *ſuccus ſem-*  
*pervivi maj.* *mucilago ſeminum cydonior.* *psyllii* &c. *Q. \** &c. inprimis conve-  
niunt. v. g.

℥. aq. ſemperviv. maj. ℥iij.  
ſucc. ſemperviv. maj. ℥jß.  
mucilag. ſem. cydon. c. aq. ſperm. ranar. extr. ℥j.  
ſal. ammoniac. ℥j. M.

liquor detineatur in ore aliquandiu, hinc denuò exſpuatur. Vel

℥. mucilag. ſem. cydon. c. *¶* ſemperviv. extr. ℥jß.  
ſucci ſempervivi ℥j. *o* ℥j. M.  
℥. mucilag. ſem. cydon. cum phlegm. *Q.* li extr. ℥jß.  
ſyr. viol. ℥vj. M.

Mixtura hæ linguæ impoſitæ, eandem denuò tractabilem reddunt, & fauces  
blandè



blande humectando, sitim sedant. Pauperculus sola  $\nabla$  1, *cerevisia secundaria*, in qua solutum sit  $\odot$ , sufficit.

Quidam sani interdum siti matutinæ sunt obnoxii: Hos optimè curare solet haultus *vinis absynth.* Qui æstuantes, aut intensius laborantes, aut nimis defatigati siticulosi existunt, levantur optimè per  $\vee$  assumptionem. Confer hic in specie *Aët. Soc. Reg. vol. 1. p. 405. & 578.* hujus loco & *vinum vetus generosum* non inconueniens.

Secundum in siti vitium est *sitis deficiens*, affectus<sup>9</sup> rarus, præsertim in adolescentibus. Prostant nihilominus exempla, tam in morbo, quàm citra illum, qui ad longum tempus ab omni potu abstinerunt. Quo facit *Borell. Cent. 2. obs. 68.* & abstinentia potus per 6. annos, *V. Rhodius Cent. 2. obs. 56.* Sed notum est ex *Hippocrate*, quod *spleneticis* sint *salvatores*, unde faciliè fieri potest, ut satis diu à potu abstineant: Confer *Panarol. Pentecost. 2. obs. 19.*

*Sitis depravata* rarissima exempla sunt, & ferè ad historias de *Pica* vel *Malacia* pertinent. Cætera ad *fastidia cerevisia* recensenda sunt, de quibus supra actum.

## CAPUT III.

De

## DE MASTICATIONE LÆSA.

**A**limentorum assumptionem & masticationem lesam accuratè & succinctè secundum theoriam pro more complexus est *Sylvius l. 1. Pr. c. 4.*

Primaria, quæ hîc occurrunt, vitia sunt, quando *imminuitur*, aut *deficit* plus minus, vel quando *depravatur masticatio*.

In *immutata* aut *deficiente masticatione* primaria vitia sunt vel *musculorum moventium*, (ad quos etiam musculosa congeries, linguam constituens, pertinet, de cuius tamen malis infra, ubi de *gustus vitio*) vel *maxillarum*, & cum his *dentium molarium*.

Quoad *musculos moventes*, primariò *musculi temporales*, & hinc *musculi genis & labiis communes*, sui considerationem merentur, eum in finem à natura magistra fabricati, ut præter ornatum decentem, movendæ maxillæ inferiori, & ad superiorem convenienter, idque validè, adducendæ inserviant.

Vitiatur hic motus, quando vel *spasmo* laborant, adeoque *convulsi*, sive pertinaciter eorum fibræ contractæ & rigidæ persistunt, adeoque inferior maxilla superiori constanter adducta persistit: vel quando iidem *paralyti* laborant, & fibræ eorum, relaxatæ & flaccidæ, inferiorem maxillam pondere proprio deorsum labi permittunt, absque reductione ad superiorem. *Convulsio ac Paralysis temporalis musculi* rara est, quin cum convulsionibus universalibus epilepticis & resolutionibus universalibus apoplecticis concurrat, quibus curatis, utiliter & particulariter horum affectus cessat, nisi interdum speciale musculi vulnerati, vel

D

alio



alio modo affecti, subit vitium, particularibus remediis externis, pro casuum varietate, & cum aliis similium partium similibus affectibus convenientia vel analogia, curandum. *Genis & Labiis* inservientium *musculorum* simultanea convulsio aut paralytis pariter non nisi aliis gravioribus hujus generis aliarum partium internarum affectibus superveniunt, & tunc speciatim utriusque faciei partis convulsio, & oris hinc facta utrinque diductio, tanquam in ridentibus vel potius canibus ringentibus, *spasmus cynicus* dicitur. Sin verò alterutra saltem faciei musculorum pars vel convellatur, vel paralyti afficiatur, & exinde recta oris figura in alteram partem distorqueatur, in convulsione quidem, pars sana ad agram convulsam, in paralyti, pars agra reloluta ad sanam, *oris tortura speciatim* dicitur, in qua modò dicta oris ad alterum latus distorsione oculus alter ritè claudinequit, nec eger debite exsufflare, quando expuere iussus, ex altero tantum oris latere id præstare potest. Quod si æger jubeatur ridere, vel literam O pronunciare, facile apparebit, alteram faciei partem liberè movere non posse. Quod si pars faciei dura sit, cum sensibili plus minus dolore, & hæc aliam, rectè se habentem, ad se qs. trahat, à convulsione illius lateris malum esse, palam fit. Sin verò pars affecta mollis, laxa & minus sensibilis, & ejus oculi inferior palpebra ferè decedit, ad sanam partem trahatur, à paralyti malum esse ostenditur.

*Causæ* tam *externæ*, quàm *internæ*, hujusmodi convulsionum & Paralytium suo tempore, ubi de his in genere tractabimus, evolventur. In specie nunc in radice ac principio nervorum, ad faciei alteram partem derivatorum, hæret malum; tumque dimidium faciei totius, quin etiam aliæ illius lateris partes, plures vel pauciores, simul afficientur. Sin verò specialiter vel in musculo uno alterove faciei, vel in nervi cujusdam surculo speciali, ad hos derivato, malum hæreat, illa saltem faciei pars, quam iste musculus regit, occupata apparebit. Sic v. g. *Torturam oris* à Paralyti tali particulari putat *Epiph. Ferdinandus in Hist. Med.* 12. natam, ex sæpius repetita applicatione *aceti acerrimi*, cui fuerat immaceratum *libargyrium*, ad foveas in variolis delendas. Non secus ac *Henr. ab Heer in obs.* 17. notat, quendam ex ebrietate sopitum, & tota nocte nive verberatum, *tortura oris maxima* exinde laborantem, dextra gena fenestra viciniore omnino resoluta. *Torturam verò oris ex spasmō* natam observavit *Platerus l. 1. obs.* 137 & 139.

Quoad *Prognosin*, *Tortura oris*, si per se extiterit, *malum est difficile*, aut *tardè curabile*. Si verò acutis morbis superveniat, eaque ex *spasmō*, *periculosissima*. Quo etiam pertinet *aphorismus Hippocratis* 49. sect. 4. *in febre non intermittente, si labrum, aut supercilia, aut oculus, aut nasus pervertatur, imbecilli jam corpore, in propinquo jam mors est*. In specie superveniens *spasmō* vel *Paralyti* reliqui corporis, *apoplexiam* vel *Epilepsiam*, mortem portendit.

*Cura*, præmissis *universalibus*, i. e. *primas vias laxantibus*, aut ulteriori effi-

cacia



Cacia fortius purgantibus, & sudoriferis ex aromaticis & volatilibus, quin & interdum decocto sudorifero ex lignis, per aliquot dies continuato, si quidē ex paralyfi fuerit malum, utpote frequentius, postea vesicatoria nuchæ, vel ad aurem affectam applicentur: ubi etiam cucurbita scarificata admoventi possunt. Hinc castoreum, tam internē quā externē usurpatum, est optimum. Extractum ejus in ore detineatur. Essentia castorei extrinsec<sup>o</sup> loco affecto crebri<sup>o</sup> illinatur, præsertim cum Tinctura asa dulcis sive Benzoes commista, quam commendat Timæus in casibus p. 73. Quin & essentia roris marini, salvia &c. similiter admoventi possunt. Nucha item & vertebræ colli aq. vitæ (i. e. spiritu vini) rectificatâ foveri, & illiniri ol. stillat. chamomill. succin. & terebinth. debent. In ore detineantur masticatoria, v. g. rotulæ Plateri:

℞. Nuc. Moschat. ʒij.  
rad. pyreth.  
angelic.  
sem. staph. agr. (vel sem. coriand.)  
sinap. ana ʒj.  
angelicæ (vel cumin.)  
Cubebæ ana ʒß.  
piper. ʒß.  
mastic. ʒiß.  
ceræ q. l. F. Rotulæ.

Aut castoreum in vini spiritū dissolut, aut fiat gargarisatio, vel diuturna in ore retentio decocti rad. pyrethrici cum semine eruce.

Ex Spasmo si fuerit malum, universalia ista similiter locum habent, uti & sudorifera, & hinc qualibet ex & cum castoreo parata remedia, speciatim observanda & fructuosè imitanda. Vid. cura Plateri loc. cit. per narcotica aromatica, mediante sudore & somno hujusmodi affectum curantis, v. g. Mithridatium, syr. papav. opiat. & similiter. Plura de hoc affectu vid. in Senn. l. 2. part. 1. c. 8. item in Timæo in casibus p. 73.

### Maxillarum & dentium vitia.

Maxillarum, & his mediantibus dentium molarium vitio læditur masticatio, quando maxillæ immobiles, vel in tantum, vel in totum fuerint, idq; vel ob luxationem, in qua os nimis hiat, à quavis violentia externa factam, interdum etiam ex oscitatione vehementiori, adeoque nimio oris hiatu inductam, facillè tunc per infusam alapam, per percussione sub mento tunc curabilem: vel ob tumorem, aut fangium, in tonsillis inflammatis, aliave ratione nimis tumentibus, in quibus vix os aperiri potest; aut parotidum, liberum in sua cavitate maxillæ processibus motum impediendum; vel quando nutritionis privata errore, aut universalis ex massa san-



guinea quasi decubitus ratione, lentus, tartareusve humor juncturam illam maxillæ cum ossibus temporum repleverit, adeoque motum liberum illius impediverit, quale in *scorbuto* interdum contingere affirmat *Sennertus*. Quæ tamen mala omnia facile patent, eorumque ex aliorum similium graviorum curatione medicatio manifesta est. Confer quoad maxillarum hos & similes affectus *Sennert. l. 2. Pr. part. i. c. 17.* His ferè modis *imminuitur* aut *deficit* maxillæ motus, ad assumptionem & masticationem requisitus.

*Depravatur*, quando tremulè movetur maxilla, unde sonus ex dentium crebriore collisione natus supervenit in affectu, ob id *stridor dentium* dicto. Oritur proximè à spasmo reciproco musculorum in genis, abductioni & adductioni mutua opera interservientium, qui aliquali convulsivo motu affecti, stridorem talem inferunt.

Specialiores hujus *causa* sunt vel *frigus externum*, vel *vermes* sive *lumbrici intestinorum*, ex qua causa *stridor dentium nocturnus* infantib⁹ familiaris existit. Sicut & ex causis aliis, convulsionibus communibus, oriri potest. Speciatim etiam *per consensum* fieri solet, in *febrium* nempe *rigoribus*, in quibus non rarus est stridor dentium. Ob consensum cum partibus circa præcordia membranosis.

Sine manifesta causa *supervenienti* adulto *dentium stridor*, malum protendit, aut *Apoplexia*, aut *Epilepsia* imminentis. In *febris* dentibus stridere, malum, præfertim si *deliranti* id accadat.

In *Cura*, *causis sublati*, & ipse affectus morbosus cessat, optimum tamen remedium est *Balsamus Peruvianus*, extrinsecus usurpatus.

### Dentium Vitia.

Dentium vitio masticatio læditur, vel quando *vel deficiunt*, *vel* præsentibus licet, *vacillant*, aut *stupore* affecti, aut *dolore* afflictæ fuerint.

Deficiunt dentes vel *proprio*, vel *alieno gingivarum vitio*, infra, ubi de *dentium vacillatione*, prolixius explicando. *Proprio vitio*, dum evelluntur, aut excutuntur à quavis causa externa, vel ita alterantur, ut tanquam minus viventes non amplius cum gingiva viva coherere queant, sed spontè sua decident. Ut enim mortificatum, v. g. cariosum os, cum vicinis partibus, vitâ communi & propria pro ratione spiritus influi & insui gaudentibus, uniri nequit, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quò cum vivo osse partes subjacentes molles, viventes, consolidatione debita, nutrimento mediante, uniri denuò queant; ita & dens minus vitalis non jungitur amplius gingivæ, sed ab hac separatus excidit, idque I. Si mortuus fuerit propriæ ætatis, adeoque senii sui ratione, de quo videatur *Hellmont. Alimenta Pri infantia §. 25.* II. Si ab externis nimis lædatur & vitietur, ut sunt *nimis frigida*, aut copiosius assumpta dentibus inimicissima, & quæ senium eorum



eorum accelerant: item *nimis calida*, dentes & gingivas quasi amburendo alterantia, eaque vel crebrius assumpta, vel dentibus admota, à quibus successivè ita penetrantur & arroduntur dentes, ut frustulatim tandem excidant. Quò facit perversa plurium consuetudo, dolores dentium vel aceto simplici, vel per octionem medicatam curantium, à quibus stupefiunt non solum omninò dentes, & insensibiles sic fiunt subtiliores illorum intimæ fibrillæ; sed & ipsi dentes simul mortificantur & corroduuntur.

III. *Nimis viscida & glutinosa* dentibus inimica sunt, ut sunt *canialdulcia*, *saccharum*, *sicis*, uti & *caseus* &c. Hæc ipsa enim, ut promptè & tenaciter dentibus adherendo, transpirationem eorundem propter necessariam nutritionem impediunt; ita & successivè acorem attrahunt, qui continuatâ sui adhesionem, successivè eosdem alterat, hinc & *lac*, & *qualibet lactificinia*, ob hanc rationem inimica dentibus observantur, eosque ad sui corruptionem sive cariem & successivam deficientiam disponere. Hæc ipsa gingivas simul plus minus alterando, & laxiores ac flaccidiores reddendo, indeque nutrimentum pro dente, per gingivas transmittendum, corrumpendo, ipsos dentes insigniter lædere valent.

IV. *Cariem* denique plus minus exesi dentes à lapide dentali sive lythodonto obfessi, seu sordibus variis inquinati, nigrique ac fatidiredditi, minus firmiter gingivæ coherent, sed successivè decidunt. Quæ posteriora vitia non nisi ex vitata dentium nutritione privata, undecunque primitus orta, originem ducunt. In quem finem noto, nutriri dentem, non solum per propria sua vascula, arteriolas & venulas, circa sui radicem implantatas, sed lateraliter etiam, ex adherentibus ipsis gingivis, unde & tam firmiter earum, quousque sani sunt, est nexus, ut dens sive osseum concretum, ex se indolens, quousque gingivis investitur, acutissimi tamen sit sensus: adeò mutua vitæ & nutritionis dentes sunt particeps. Ac sanè particularis, ac præ aliis partibus, propria dentibus est nutriendi ac augmentandi ratio, adeò ut, cum continua attritione necessariò imminuantur, nisi nova eaque continuâ augmentatione repararentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno evulso vel elapso, vicini utrinque se dilatare magis soleant, & ex oppositò ipsi respondens oblongari nonnihil, & in prioris spacium aliquantulum subintrare observetur.

*Cariem* igitur dentis quod attinet, est hæc *arrosio dentis*, nunc major, nunc minor, quâ insensibiliter substantia ejus absumitur, & nunc successivè excavatur, nunc altero latere pedetentim consumitur, donec successivè magis *corrosus frustulatim excidat*. Inchoat malum ut plurimum in parvo puncto extrinsecus, quod nigrescit primitus, hinc foraminulum aperitur, sicque ad interiora ejus penetrat, quæ quò teneriora ac molliora, indeque facilius dissolubilia, eò promptius absumuntur, & dentem cavum reddunt. Conjungitur tunc, ad interiora ubi penetraverit corrosio, dolor, nunc major nunc minor,



prout radicem dentis nerveam diversimodè simul arrosit. Ex corroso ita dente nata sanies, ubi per dentis foraminulum relictum, ceu per fistulam, liberum spatium effluendi haud nacta fuerit, sed interiora magis ac radicem dentis unum alterumve, speciatim in maxillaribus, vitiaverit, acrimoniâ suâ nunc gingivam, tunc ipsam maxillam rodit, & præsertim per illa hujus foramina, per quæ val. in dentes subeunt, sensim extra effluit, & tubercula, nunc in gingivis, nunc sub maxillis, excitat, quæ tandem exesa saniosum acre liquamen fundunt. Et licet curetur tale tuberculum & excitatum ulcusculum, subinde tamen, quoties ex carioso dente sub nutritione vitiata nova sanies generatur, recidivat, & interdum in fistulam, vel gingivæ sive maxillæ, degenerat, adeo ut talia curari tequeant, nisi dens læsus evulsus fuerit. *Factorem* etiam subinde dentes carior inferunt, halitum oris inficientem, præsertim si major fuerit eorum evacuatio, ut alimenta carnosa retenta in eadem putredinem attrahere queant; Imo ex nutrimento dentis cariosi proprii corruptione, aut alimentorum masticatorum in iisdem retentorum putredine, *vermes* in eorum cavitatibus generantur, gravissimorum dolorum aliorumque malorum auctores.

*Causa Cariei* est læsa dentis quacunque occasione nutritio, sive gingivarum vitiatarum, & à contiguo dente abscedentium, indeque ejus lateralem nutritionem impediendum, (unde *scorbutici*, gingivæ vitio, omnium frequentissimi *cariem* patiuntur) eveniat causa, sive ipse dens sub nutrimenti assimilatione, aut hujus successiva transpiratione frustratus ex illius corruptela, & in acidum corrosivum degeneratione, *cariem* pedetentim contrahat. *Acidum* itaque ex nutrimento dentis degenerato, tandem corrodens *cariem* inducit.

*Causa remota* rationem habent tam omnia dentes alterantia supra allegata, quam infra circa *gingivas*, quoad *dentium vacillationem* alleganda.

Quoad *lapidem dentalem* sive *Lithodonton*, (ut vulgò ex vana persuasione vocant Tartarum dentium:) hujus ortum & genesis optimè delineavit *Helmont. Tract. alimenta Tartari insontia* §. 22. nempe nutrimentum dentium laterale ex gingivis depravatum, sub sui perfecta cum dente assimilatione frustratum & vitiatum, sicque in excrementitiam plus minus naturam degenerans, adhærescit saltem superficietenus denti, ibique quia jam ad duritiem dentalem, ex aliquali sui pro nutriendo dente alteratione, determinatum fuit, ad indurescentiam quasi lapideam dentalem, coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen friabilem, duritiem acquirit, simulque quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibetis, simul secum fortiter indurat. Nunquam igitur sanæ gingivæ & quæ cuspiduli figura ad dentis medium assurgunt, hæcque firmo amplexu retinent, dentalem hunc lapidem

dem gene  
tibus ad  
permitte  
laudabile

Par  
rum den  
sum ex fr  
na illa sup  
nem sugge  
dentium  
scorbuti  
ciatim a  
frequen  
ti ex gin  
rentis ve  
scantur  
gressus,  
excreme  
curiali  
tiantur  
vantur

Qu  
ræ est,  
veolis si  
vorum p  
tes post  
num si  
cture de  
illos na  
te hypp  
gratia,  
quædam  
prios vel  
tanquam  
perfici p  
medio r  
Riverin  
Qu



dem generare solent, benè autem *laxa, flaccida, cruenta*, minusque aptè dentibus adherentes, adeoque externis injuriis ad sensilem dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed potius etiam laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Par omninò est ratio *sordidorum, nigrorum* aliore modo malè coloratorum dentium: quicquid enim hîc subest vitii, nonnisi productum morbosum ex frustrata ac depravata privata dentium nutritione enatum, sive externa illa supra circa dentium casum, speciatim viscida & dulcia primam occasionem suggesserint, sive gingivarum morbosus flatus, alterando nutrimentum dentium, & vitando lateralem ejus nutritionem, in causa fuerit. Sanè ut *scorbuticus* nil æquè familiare est, ac gingivarum varias subire passiones, speciatim *cruentam flacciditatem*, ita & in talibus *dentium nigrities & sordides* frequentissima est. *Nigrities* sanè dentibus adherens, quid nisi extra venati ex gingivis, plus minus corrupti, & acore infecti cruoris dentibus adherentis vestigium est, à cujus hostili præsentia, ut irritantur gingivæ, & inviscantur dentis pori, ita ex facili hinc acescentia erosio & cariei successivus progressus. Juxta læsionem gingivarum & dentium læsio, indeque sordium excrementitiarum pluralitas ac veritas æstimanda: Hinc & ab *inunctione mercuriali* pro cura *luis Venereæ* similive concitata salivatione, uti notabiliter vitiatur *gingivæ*, ita nigrescere subitò, & pluribus sordibus inquinari observantur *dentes*.

Quoad *Curas*. Dentes excidentes aut deficientes reparare, solius naturæ est, quæ in junioribus, per recentium dentium subnascentiam priores alveolis suis extrudit, & defectum ita restituit. Quamdiu itaque dentium novorum primordia & quasi semina intra gingivas reſtitant recondita, novi dentes post priorum defectum renasci facile possunt, id quod non tantum *genuini* sive *sapientiæ* dicti *dentes* comprobant, sed quod etiam interdum in senectute dentes renati observati fuerint. Arti quod relictum est, saltim defectus illos naturæ imitandos nonnihil supplere, *artificiales dentes, ex ebore*, vel *dente hyppopotami* fabricatos in istorum locum substituendo, pro loquelæ saltem gratiæ, non autem pro melioris masticationis beneficio. Equidem exempla quædam prostant dentium sanorum, ex homine recenter revulſorum, in proprios vel alienos alveolos denuò insertorum, firmiter cum gingiva coalitorum, tanquam si nunquam dens defuisset, ita ut etiam masticatio fortis hoc modo perfici potuerit: Sed quoniam adeò incerta res nondum confirmata est, eam in medio relinquo. Vid. *Obs. Schenckii* p. 202. ex *Paræo*, l. 1. c. de *dentib.* item *Riverium in obs. comm.* p. 357. vel 685. *Borell.* l. 1. obs. 10. p. 18.

Quoad *cariosos dentes*, equidem præsentissimum remedium est *carioſi evulſio*.



evulsio, interdum etiam necessarium, si longius processerit caries, cum facile aliàs contiguus dens contagio carioso infici, & hinc idem malum contrahere possit. Ut taceam, confirmatam cariem, alia ratione quàm evulsione, curari non posse. Quamdiu verò vel nondum eòsque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum observata, hæc nimis metuitur, remediis restendanda est, cariei sc. progressum ulteriorem inhibendo.

*Evulsio* appropriato peragitur instrumento, ac succedit eò melius, quò minus firmiter dens hæserit, & quò magis idem vacillaverit. Quò autem disponatur ad facilem, magis & minus dolentem, evulsionem, remedia quædam à nonnullis adhiberi solent, v. g. *Tithymali succus* denti inditus: aut si ex eo & *sale ammoniaco* formentur globuli, aut cum *farina triticea* fiat pasta, & cavitati dentis indatur. Præter *tithymali lac* alia ex simili lactearum genere, pari virtute pollent: ut *lac ficulneum* (*Seigen*) *farina* admistum, vel ex *lacte tithymali* cum *farina triticea* subacta fiat pasta, quæ frixa in *pinguedine ranæ*, facit dentes sine dolore cadere: vel *farina siliginis* misceatur cum *lacte cataputia*, instar pulvis, indatur denti cavo, sicque aliquandiu permittatur, brevi sic cadere affirmant. *Succus* pariter *chelidonii majoris*, cavis dentibus inditus, eos frangit & ejicit. *Pinguedo* item *ranarum viridium*, dentibus affricata, aut iisdem indita, dentium calum promover: nempe coquuntur ranæ in olla vitreata affusa aqua communi, & pinguedo quædam innatabit, quæ dentis evulsionem promover. Vel

℞. gummi ammon. Sem hyoscyam.

Succi ejusdem an. ʒiʒ. Mistis addatur

Pinguedinis ranæ viridis ac ceræ parum F. Ung.

denti extrahendo applicandum vel indendum.

*Cariet* verò *ulterior progressus* per artem & medicamenta inhibetur, efficacissimè in primis per *inustionem dentis cariosi* in loco carioso cum *cauterio actuali*, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem, ex argento vel auro facto, quo facto auro foliato dens cavus repleatur: præservatur enim sic à majori putredine & corruptione; vel ex *cera cum myrrha probè subacta*, vel potius ex *cera viridi*, propter admistam æruginem, impleatur dentis cariosi excavatio. Ipsa *myrrha*, denti indita, egregia est in hoc casu. Confer hîc *River. in observat communic. p. 309. l. 663.* ubi refertur, quod dentes terebinthinâ impleantur, & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potentiale adhibeatur: Sic aqua fortis denti carioso admota, vel spiritus vitrioli gut. j. vel ij. bombaci inditæ, ac denti adhibitæ, mirè corrosionem juvare & præservare dicitur. Item *zingiber* in *oxymelite* coctum, & in cavernam dentis immissum, præservat corruptionem, *Coralliorum pulvis* denti cavo inditus, vel *ossa sepia*, item *camphora* cariei,



rei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum cum melle rosato ad consistentiam linimenti crassioris redacto, dentibus illitum cariem inhibet.

Fœtorem dentium ablata caries sponte curat; sin minus gallia moschata, cum cypero & mastiche mista, denti cavo indatur. Tollitur & fœtor dentium, si abluuntur aqua, in qua ✱ solutum, post prandium & cœnam.

Vermes ex dentibus elicere subinde necesse est. Præstat hoc optimè Sabina in vino decocta, & in ore retenta, quæ copiosos vermes elicit. Fumus item seminis hyoscyami specificus est, per infundibulum susceptus ore, mirabiliter vermes expellit. Confer. Act. Med. Hass. vol. 1. p. 209. Suffitus item sive fumus ex fructu haliacabæ contuso, cum cerâ mixto, facta exinde pasta, in lamina ferream ignitam injecta, fumum suggerit, quò ore excepto, catervatim vermes cum spûto copioso rejecti, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris quoque dentibus cum bombace inditus vermes optimè necat, & dolorem inde oriundum placat, vel ex pulvere gallarum cum succo rad. pyrethri imprægnato paratur remedium, quod denti inditum vermes expurgat. Serum cervinum quantum contra vermes dentium valeat, vide Bartholinum Centur. 3. Histor. 96.

Quoad Tophes (live Lithodonton) dentium eorumque sorditiem & nigritiem, ne ab his tandem dentium caries, crebrior dolor, aut præmaturus casus superveniat, cura instituenda venit, per ea, quæ sordes dictas abstergere, vitiosum earum acidum, gingivis & dentibus hostile, absorbere & hinc blanda adstrictoria vi gingivarum tonum roborare valent: quod si longius processerit malum, & tenacior mucus dentes vitaverit, potenter incidentia & dissolventia, & quicquid heterogenei fuerit absorbentia, & qs. exedentia adhibenda erunt, habendo semper respectum ad scorbutum plus minus præsentem. Convenient igitur in leviore malo ossa sepiæ, C.C. ust. mandibul. luc. pisc. testa ovorum calcin. Cinis majoran. roris marin. urina calida, cum qua fricentur subinde dentes & gingivæ; Tartarus calcinatus aut parum salis Tartar. Oust. &c.

Duriora subjecta lapidea ex silicibus, pumice &c. vitanda sunt, quia crebriori usu gingivas atterere & absorbere valent, ut rectè monet Zruelferus in Pharm. Reg. pag. 101. nisi ubi fortius agendum; tunc enim paulò tamen rarius adhibita, talia minus nocent. Exempli loco sit farina virginea Mynsichti, egregiè dentes dealbans, & à Tartaro corrosivo purgans. Hisce modo dictis convenienter radix Irid. Flor. additur, præsertim quòd & ipsa conveniat propter odoris gratiam, propter quem ultimum finem non inepta. Paratis dentifriciis, aliquot gutta olei destill. caryoph. aut lign. Rhodii possunt addi. Quod si dictis pulveribus color purpurascens conciliandus, Cocciniglia in aqua aluminis solvamus, & soluto adspargamus pulverem, qui exinde rubescit, sed leni ad-



motus igni idem purpurascit. Quod si pertinacius fuerit malum, sordes tenaciores, obstinata nigrities firmitus dentibus impacta, ac firmitus conglutinata lithodontos, optimum remedium est *spiritus salis cum melle* ad gratiam saporis, vel quantum placet mistus, & ita gingivis illitus. *Spiritus vitrioli* suspectus est, cujus loco *oleum sulphuris* in *aqua communi* dilutum, vel *cum melle rosato* subactum, adhiberi potest. Pertinet huc *opiata Borelli Centur. 2. observ. 65.* ad gravius malum præsertim conveniens. Non incommodum est, si recipiatur vinum, cui permisceatur *spiritus sulphuris*, ut acescat, huic immitte *radiculam polypodii* per 24. horas, hunc sicca, & utere pro *dentifricio*, firmat, mundat, & candorem iisdem inducit. Etea, quæ de *spiritu vitrioli* refert *Riverius* in *lib. 6. prax. c. 2.* potius *spiritui salis*, quàm *spiritui vitrioli* applicanda veniunt. Quo etiam facit ejusdem *liquor ex Qusto*, hic egregie conveniens, citato loco.

*Pulvis dentifricius Principisse Altenburgensis.*

℞. off. sepiæ, C. C. ust. pumic. pp. an. ℥iij.  
moschi ʒj. M. F. pulv. cui adspargatur  
spir. rosar. ℥ss, & sicca. Interim  
℞. Gran. cherm. Santal. rubr. an. ℥ss.

— vini q. s. pro extrahenda Tinctura, qua irroa aliquoties prædictum pulverem, & sicca. Non incommodum est hujusmodi pulveribus dentifriciis \* subinde addere, dentibus, gingivæ, ac omnibus oris partibus imprimis conveniens.

Quod attinet *dentes vacillantes* sive minus firmiter gingivis connexos, hoc vitii contrahunt propriâ vel alienâ, gingivarum culpâ. Propria eadem est, sed in minori saltim gradu, quæ & dentes decidere penitus & cadere facit, de quo superius sufficienter actum. Aliena gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel mollis sive flaccida, vel simul tumida, vel etiam nonnihil exulcerata, adeoque omnibus his casibus plus minus cruenta simul evadat. Rarum est, quod in *Schenckii collectis observat. l. 1. c. de dentib. p. 200.* refertur, ex *defluxione in dentium alveolos*, hos gypsea pituita interdum impleri, ut dentes extrudantur. Suspico tamen non tam ex defluxione, quàm *lapidis sive trophi dentalis* uberiori incremento, potius vitium hoc ortum traxisse. Ista aerò mala gingivarum oriuntur frequentissimè salivæ, vel in genere *acrioris*, vel in specie *scorbutico* sapore, sive vitioso acri sale inquinatæ culpâ, à qua tonus fibrarum gingivarum resolvitur & emolli, penetrari eadem, & plus minus successive, non raro sensili admodum cum pruritu erodit assolent, vasculis sanguineis unâ per diæresin vitiatas, sanguinem paulatim fundentibus.

Postea & *Mercurius*, tam in *salivatione excitanda*, & hinc *acrioris* & præternaturalis ejusque copiosioris salivæ profusum, quàm faciei pro usu cosmeticis

metico ap  
mobiles

Quo  
fundius,  
Malum,

Quo  
hilominu  
ne, laxa,  
rum hinc

Ue

curatio

sorbenib

plus min

niunt igit

scorbuti

ria medic

lap. ʒj.

malve are

dentifri

fit decocti

est contr

paucod

Pertinet

givas rob

myrrba

lacca allo

contra sco

Conf. M.

bat ita :

infunde la

cum spirit

ra & putr

cant. In

gium quo



*metico* applicatus, ordinario gingivam valde perè laxare; & omnes dentes hinc mobiles quasi reddere solet.

Quod si ulterius procedat negotium, vitari magis gingivæ, exulcerari profundius, absumi eadem, vel corrupti etiam, & ad gangranam disponi a solent: Malum, quod in genere dicitur *Mundscdule* appellatur.

Quod si firmior paululàm gingivarum fuerit textura, relaxata eadem nihilominus sanguinem uberius in se recipit, & spuria intumescit & excrefcit carne, laxa, flaccida & sordida, & facile ad tactum cruorem stillante, in *Gingivarum* hinc dicta *excrefcencia* five *dentium super incarnatione*.

Ut igitur moveantur hæc mala, *premissa debita radice morbofa interna curatione*, *gingivæ flaccida, tumida, cruenta adstringenda, exulcerata absorbentibus & mundificantibus ac adstringentibus consolidanda, corrupta, & plus minus gangrenata*, ab ulteriori mali progressu *preservanda*. Conveniunt igitur *fl. ros. rubr. fl. aquileg.* & ex his paratum *unguentum de aquileg* ad *scorbutum oris* præsertim proficuum. *Descriptio* prostat in *Tilemanni materia medic. C. C. & ebur ust. Lacca & myrrha*, *O tam crudum, quam ustum, lap. S. fol. quercus, ligustri, radix ireos Flor. Bistort. tormentill. flor. malvæ arborefcens, nastur, aq. Ruta, Saliva, Rosmarin.* Ex his vel fiunt *dentifricii*, cujus exemplum vide in *Barthol. Cent. 6. lib. 54.* vel ex iisdem fit *decoctum*, v. g. *Ruta in vino decocta*, quo calidissimo os eluatur, egregia est contra hos affectus scorbuticos, *Saliva item Rosmarin, decocta in V.* cum pauco addito *alumine*, egregius est *Gargarismus* ad dicta dentium vitia. Vel

*℞. herb. Salv. opt. Mijß. flor. malv. hortens. rubr. Mj.*

*rad. polypod. ʒß. F. decoctio. in lib. 1. V fontan. Colatur.*

*ad demellis rosat. ʒß. alum. ust. ʒj.*

*lapid. prunell. ʒiij. terr. sigillat. ʒj. M. F. Dentiluvium.*

Pertinet huc *Gargarismus de Tormentilla Mynsicht. p. 403. Decoctum ad gingivas roborandas Poterii in Pharmac. p. 313.* Si quoque aliud quid, certe *myrrha & lacca* in istis gingivarum vitiis sunt præstantissima. Huic *Tinctura lacca* associari solet. Nam sola *myrrha* crebrius masticata profervat egregie contra scorbutum oris. *Tinctura lacca* prostat p. 46. *Armament. Myns. & Conf. M. A. N. C. Ann. 6. App. 26. B. D. Michaelis Tincturam Lacce* parabat ita:

*℞. phlegm. vitrioli q. v. in quo dissolve alumen q. l. soluta & mista infunde lacce pulverisatæ donec tingantur. M.* Porro ulterius *mel rosaceum* cum *spiritu salis* tantillo usque ad gratum acorem imprægnatum, omnia ulcera & putredinem partium in ore sanat, si præsertim ex scorbutico originem ducant. In specie si simul cum *decocto saliva* subinde abluantur gingivæ. Egregium quoque est *linimentum Harmani* ad hos gingivarum affectus, quod



describit in *Prax. Chymiatr.* p. 123. sed cui non incommode *myrrha* addenda venit, ad imitationem *Senn. in Prax.* l. 3. p. 5. s. 2. c. 7. p. 633. Cui simile est elegans *Linimentum contra oris & gingivarum scorbutum*, quod habet *Deskerus in comm. in Prax. Barbett.* p. 156. cuius loco possit etiam recipi.

℞. alum. crud. ʒij. flor. aquileg. fol. salv. an. ʒij.

rad. ireos Fl. ʒij. myrrh. elect. ʒij. c. s. q. mell. ros. F. *Linim.*

egregium ad vacillationem dentium scorbuticam. Vel:

℞. rad. bistort. ʒij. flor. ros. rubr. ʒij. Balauft. ʒij.

aluminis usti ʒij. Imprægnetur largiter *spirit. cochl.* qui ad oris

scorbutum est egregius. Hinc in excrecentia gingivarum scorbutica *succus cochlear. cum alumine usto* mistus perquam egregius est, Sicuti ad hæc ipsa gingivarum vitia ex scorbutico nulli cedit *vermicularis*, cuius decoctum cum alumine & melle nobile experimentum est, gargarizando usurpatum. vid. *M. A. N. C. Ann.* 6. p. 50. In *Digby Medic. Experiment. part. 2. p. 76.* itidem egregia est *mistura pro his gingivarum malis ex aq. calc. viv. cum alumine crud. & usto.* ac *rad. ireos Flor.* quod in mentem revocat aliam non inconvenientem misturam, efficacissimam in scorbutico oris, nempe *cremorem aqua calcis viva* supernatantem saliformem.

℞. huius cremor ʒij. gumm. lac. ʒij. Oli Cypr. gr. vj.

aq. rosar. - salv. an. ʒij. Solve calore leni, ut probè imprægnetur à *lacca*, eò laventur gingivæ, probatum est. Ac meritò extollitur usus, *laccæ*; Nam B. D. *Michael* aliquando putredinem gingivarum scorbuticam, tantam ut gangrænam minaretur, & propter infensissimum foetorem nemo iuxta ægrum commorari posset, per solam *Tincturam Laccæ*, præmissis internis universalibus, feliciter restituit. Juxta *laccam* hanc nobilissima est *myrrha*, v. g.

℞. fol. salv. alumen ust. maxill. lucii piscis calcinat.

myrrh. rubr. an. ʒij. mell. q. s. pro *Linim. ad fricandos dentes.*

Quod si efficacius postuletur, aliquot gutt. *spirit. salis.* imprægnetur.

In graviori malo ulterius procedendum est, atque sic, præter *linimentum Hartmanni*, supra laudatum, ad *Unguentum Egyptiacum*, melle rosato probè permistum, deveniendum, pro graviore exulceratione aut inde metuendis malis gingivarum curandis. Vel:

℞. alum. usti, salis armoniaci an. ʒj. mastich. thur. an. ʒss. M. F. &

Affricandus gingivis, posteaquam ante & post decocto *salvia, tormentill. ac ros. rubr.* os elotum fuerit. Imò interdum & gravior gingivarum luxuries sedanda. Conf. item *Linim. Sennert. l. 2. prax. part. 1. c. 16. p. 52.* Aut denique *aqua virides ex viridi aris*, paucis auripigment. alumine & quibusdam vulnerariis, addito melle in aquam infusis & decoctis, hæc commodè adhiberi possunt, quò affricatæ gingivæ à luxurie, stacciditate & putredine defendantur,

c. g.



e.g. sit vel  $\nabla$  virid. Hartm. Pr. p. 110, vel  $\nabla$  virid. Platers, cuius descriptio proficit in fine observationum ejus.

*Supore*, andem sive *Hemodia* affici dieuntur dentes, sicque masticationem impedire, quando speciali doloris genere afficiuntur, post acida vel assumpta, vel vomitu rejecta. Cui affine malum est *algor dentium*, dum frigoris actu notabiliter alterantur dentes, nempe acidum & frigus inimicissima existunt dentibus, unde illorum nimia impressione afficiuntur fibræ illorum interiores, & quasi irritantur, ut à cujusvis objecti actione specialis quidam dolor in dentibus percipiatur, masticationis negotium insigniter impediens.

Curat stuporem dentium portulaca recens masticata, caseus tam recens quam vetustus, adeoque alcali manifestiori dives. Siligua ceracea masticata. item calidum ovi vitellum, ad duritiem coctum, applicatum. Omnium optimum calida urina applicata. Algorem spirit. vini dentibus affricus, vel panis calens masticatus, vel vitellum ovi assatum, calidè masticatum; item the-riaca dentibus affricata huic malo medetur.

## CAPUT IV.

De

## DEGLUTITIONE LÆSA.

**L**æditur deglutio quando vel impeditur sive imminuitur & aboletur, vel quando depravatur. Imminuitur I. Oesophagi ex parte: II. Stomachi seu orificii ventriculi superioris culpâ.

Oesophagi vitium est, (I.) quando vel muscutorum 3. paria, fauces sui ampliatione efformantium, una cum sphinctere paralyti resolvuntur, (II.) quando ipsa musculosa ejus tunica simili malo corripitur. De posteriori vide Willis. Pharm. rat. vol. 1. p. 11. de priori Tulpus lib. 1. observ. 42. (2.) quando angustatur nimis, sive hoc fiat ( $\alpha$ ) vel à tumoribus tam propriis, quam partium vicinarum. Illud quando inflammatur Synanchi, aut quando scirrhuso tumore obsidetur, aut quando à caruncula excrecente vitiatur. Exempla quorum vid Rhod. observ. 46. 47. Cent. 2. Hoc quando tonsilla, aspera arteria, aut uvula intumescunt, inflammantur &c. Sive hoc fiat ( $\beta$ ) 2. ab arcta nimis clausura & strictura fibrarum ejus, idque nunc ex spasmō sive convulsione, quo pertinent hypochondriaci subinde, non secus ac mulieres hysterica, gulæ adstrictiōnem & contracturam per nervorum spasmos ob consensum patientes, quod alii ex vaporibus stypticis ex hypochondriis elatis fauces stringentibus malè derivant.



nempe pertinet huc *gula strictura ab Utero*, cujus mentionem facit *Helmont. Tr. Asth. & Tussis* §. 31. Hinc etiam in *Epileptico paroxismo* difficillima aut nulla tolet esse deglutitio. *Nunc ex illarum nimia exsiccatione in febribus ardentibus continuis.* Quo suo modo etiam pertinet *defectus saliva*, deglutitionem plus minus impediens; *nunc ex illarum ab assumtis constrictione & corrugatione.* quod *Hochsteteri* facit *observ. decad. 3. cap. 5.* adstrictio gulæ ex potu vini malvatici, in quo radix consolid. major. infusa fuit. Sive hoc fiat (γ) 3. *ab obstructione*, propter deglutita varia aut majora in faucium isthmum sive principio œsophagi hærentia, ut *boli majores, nux Persica, ovum gallinaceum, &c.* aut acuta gulæ infixæ, ibique tam sui insolita præsentia, quam propter dolorem, & hujus occasione inflammationem aut abscessum, deglutitionem impediens, v. g. *ossicula, spina piscium, acicula gula infixæ.*

*Orificium superius ventriculi* sive stomachus in culpa est, quando rite licet, per œsophagi iter demissa, nihilominus admittere debite recusat, id quod fit imprimis, quando quacunque occasione irritatus sive laceffitus, contumacius se stringit & claudit, adeoque assumpta ulterius progredi impedit, id quod fit. (α) quando *vel inflammatum, vel velut excoriatum*, aut plus minus exulceratum, *vel tumore quocunque*, à priori nullo modo cognoscibili, *obsessum fuerit*, quod facit curiosa & notabilis observatio *Willisi Pharm. rat. vol. 1. p. 45.* (β) quando copiosiores, plus minus aciores, *flatus* in ejusdem angustis inclusi fuerint, quorum inimica præsentia utrumque, speciatim superius, orificium ad pertinacem sui stricturam irritatur. Unde assumpta non nisi difficulter admittit, aut admittæ eadem copiosi flatus eructantes, insequuntur eaque plus minus simul una rejiciuntur, quo facit non inelegans *obs. Riverii II. de morbis in frequent.* item *Plateri obs. l. 1. p. 223.* (γ) Quando quacunque de causa nauseat, aut assumenda horret ventriculus, nam & sic orificium claudit, non assumpturus sibi hostilia. Hac ratione familiare est *febricitantibus*, quælibet liquida aut esculentia fluida deglutire, sed carnes, ova frixa vel similia pertinaciter respuere, & oblata nullo modo, aut non nisi difficulter admittere.

Pertinet huc *Amat. Lusitan. Cent. 6. cur. 49.* ubi post screatum sanguinis, & assumtorum vomitionem, deglutiendi omnimoda difficultas etiam  $\nabla x$ , sola vini assumptione salva. *Conf. Hildan. Cent. 5. obs. 34.*

*Depravata tandem deglutitio* est, I. quando liquida difficulter, solida facile & contra deglutiuntur, de quorum affectuum theoria in Philosophicis, ubi de deglutitione pluries actum. II. Quando in eodem assumtorum vel solidorum vel liquidorum genere quædam facile, quædam difficulter, quædam omnino non deglutiri possunt. De ejus ratione ex superioribus, speciatim ex *nausea ventriculi* jam constat.

Quoad *Prognosin* igitur deglutitio quod magis vel minus tollitur, eò magis etiam

etiam vel  
difficilis  
etiam  
acutis in  
cium, sic  
cidat ex  
in acutis  
terna cau  
omnino  
cancro  
cartilag

Deg

rem tar  
etiam inte  
vel lethar  
go infix  
grina cu  
obs. 32  
dem di  
tum sibi  
gramini  
Idem H  
abscessu  
modo d  
miles me  
injecto c  
fistula d  
Cent. 1.  
dum v  
comiten  
obs. 35. Q  
summo p  
frustula  
tan. l. 2.  
ex dictis

Cent. 1.

dum v  
comiten  
obs. 35. Q  
summo p  
frustula  
tan. l. 2.  
ex dictis

Cur

lylus par  
continen  
im, aut



etiam vel minus periculum vitæ imminet. A paralyfi musculorum faucium nata difficilis deglutitio periculosum & difficulter curabile malum est. Quod si obtutum moventium defectum, & adeo insignem virium resolutionem, prout in acutis interdum accidit, malum evenit, pessimum signum, & mortis futura indicium, si cum sonitu, quasi in lagenam vacuum, decidat potus. In vulneribus si accidat ex convulsione deglutitio laesa, periculosum, si curaliàs convulsiones faucium in acutis periculosa, in chronicis minus. Si à Tumoribus per se quidem, & ex interna causa naturali oriatur malum, pro tumorum vel facile, vel difficulter, vel omnino non curabilem natura, prognosis facilis est. Sic v. g. ex ulcere Oesophagi cancroso omnimoda, adeoque lethalis deglutiendi impotentia. Sic ob oesophagum cartilagineum factam deglutitio penitus abolita; Ann. 3. N. C. p. 26. adeoq; lethalis.

Degluta res aliena in faucium isthmo vel hærent, vel extra hunc, vel ad ventrem tandem descendunt. Dum in faucibus hærent, præter inimicam sui præsentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, iique vel lethales, de quo vid. Hild. Cent. 1. obs. 33. it. Cent. 5. obs. 35. ex officulo oesophago infixio, tumor, dolor, febris, inflammatio, mors: vel hoc rupto abscessu rei peregrinæ cum pure excretionem, aut descensum faciunt. Confer item Hildan. Cent. 1. obs. 32, ubi mulier officulum devoratum, quo penè suffocabatur, septimo tandem die, excitata suppuratione, egressa: vel per alia plus minus vicina loca, exitum sibi quarunt. Quo facit exemplum notabile Pareil. 24. c. 29. Chirurgia, de graminis ramulo deglutito, qui postea integer per intercostale spatium erupit. Idem Hild. Cent. 1. obs. 33, ubi spina piscis gutturi biennium infixæ, post, excitato abscessu, in extrema colli parte extracta. Dum verò ad ventriculum quocunque modo descendunt, vel inferius per anum successivè denuò excluduntur: dum v. g. miles metu, ne in itinere spoliaretur, 6. ducatos deglutivit, eosq; post aliquot dies, injecto clystere abstergente, sine noxa rursus reddidit, teste D. Michael. vel dum fistula deglutita tertio die sine noxa per alvum fuit reddita, autore Bartholino Cent. 1. hist. anat. 59: vel in stomacho pertinacius hærentes varia mala inferunt, dum v. g. pylorum obstruunt, quæ obstructio, si contumacior fuerit, mortem comitem trahit, autore Kerkring. in specileg. obs. 1. Confer etiam Hildanum C. 6. obs. 35. Quo etiam pertinent aciculæ, quarum quædam sine periculo, quædam cum summo periculo deglutita observantur, confer M. A. N. C. Ann. 4. p. 77. Vitri fistula aut annulus, cujus asperitate excitatam dysenteriam notat Zacut. Lusitan. l. 2. Med. Princ. hist. 84. Cæterorum huc facientium affectuum prognosis ex dictis facilis est.

Cura pro earum varietate, & mali inde nati diversitate, etiam variat. Paralyfis partium deglutioni inservientium curatur per decoctum saliva in vino, & continendo in ore V. infusionis thymi, vel decoctum sava & eruca gargarisatum, aut in ore contentum egregium est. Nux. moschata. masticata & deglutita

est



est egregia.  $\odot$  succini dest. aut  $\odot$  dest. anisi, salu. guttatim intra fauces assumpta, sunt efficacissima. *Essentia castorei*,  $\omega$  ceraforū nigrorum, liliorum cōvallium,  $\omega$  theriacal. cum essentia castorei juncti, it.  $\nabla$  *Anhalina* est egregia, illinatur collum ac nucha  $\odot$  lumbricorum terrestr. costino, destill. succin. anis. lavendul. &c. Tumores harum partium, si quidem cogniti fuerint, quales sint, more talium tumorum curari debent. *Clausura faucium & Oesophagi à spasmo aromaticis & nervinis, blandis opiatu* additis, tam internis quàm externis curanda. Si à vitio hypochondriorum, per acidum absorbentia & opiata, item castoreata. Sin ab excitatione in febribus internè mucilag. sem. cydon. cum sperm. ranarum extracta est egregia. Externè unguentum *Zacuti* ad hunc affectum, compositum ex unguento filii *Zachariae*, unguento rosato, resumtiv.  $\odot$  amygd. dulc. violar. & mucilag. inib. cū lacte muliebri. Saliva defectus potu præsertim vini vel cerevisia secundaria resarcitur: item *crystalli* frustula in ore circumacta salivæ copiam nonnihil provocant. *Assumpta* externa pro sui varietate oppositis curanda, ut in illo *Hochstetteri* exemplo, propinata aceto strangulatio & faucium angustia sublata fuit.

*Quoad res alienas deglutitas*, sed intra Oesophagi superiorem tractum adhuc hærentes, ea quantocyus iterum artificiosè ex menda veniunt, vnde ventriculū, si innocuæ sunt, deirudendæ, cui fini inservit vel *instrumentum Willis. Pharm. rat. vol. 1. p. 45. aut Hildani C. 1. obs. 31.* Quòd si verò foras denuo protrahenda res deglutita, vel tussis, vel artificialis sternutatio unà cum rerum dulcium plus minus lubricantium lambitione conveniunt. Quòd si his modis non succedat negocium, instrumentis res tentanda, in quem finem vel *forcipes rostris longis*, vel *instrumentum Hildani Cent. 1. obs. 36. aut hujus succedanea Cent. 6. obs. 34. vel candela cerea*, vel *spongiola cum filo*, item pro aciculis *hamulus. Hildan. Cent. 6. obs. 36.* adhibet *ol. amygd. d. & saccharum* in forma Electuar. ante pastum ut dolor per  $\odot$  leniri, per saccharum verò ulcus fortè præfens abstergi possit. Quòd si *acicula*, *vitri frustula*, *spina piscium*, aliavè acutiora per deglutionem in ventriculum penetraverint, opera danda, ut hæc sine noxa per inferiora tandem excludantur. In quem finem propinetur *puls* aliquanto spissior *ex oryza, vel milio, vel panico*, ita quidem, ut aliquandiu æger à potu abstineat, ut ita per hujusmodi spissiora involuta res deglutitæ acutiores sensim ex ventriculo per intestina ulterius promoveri queant.

*In Stomacho* si fuerit vitium, *priori ex causa*, vel mala ejus methodicè curanda, vel *instrumento Willis. Pharmac. rat. vol. 1. p. 45.* utendum. Si *ex secunda causa carminantia* interna & externa propinanda, infra de inflammatione stomachi propinanda. Quoad *tertiam causam* stomacho gratis & acceptis insistendum, ventriculus nondum cogendus.

*Depravata deglutitio*, cū quædam curabilis, quædam non curabilis sit, illa verò nervorum ex vitio spectatim oriatur, partim ex dictis pro suo loco dicendis curatio manifesta erit.



## CAPUT V.

De

## CHYLOSEOS LÆSIONIBUS.

**D**E chylosificatione notum est, quod fiat beneficio fermenti spirituosissimi acidi, quo & dissolvuntur & volatilisantur simul alimenta, quo motu alterantur, ita ut abeant tandem in liquorem plus minus spissum, lacteum, salum, volatilem, temperatum, *chylum* dictum, sub qua actione usus primarii efficientis mediante necessario organo acido esturiam locum obtinent. Hæc chyli productio lædatur, quando vel aboletur vel imminuitur ut non sufficienter aut nullatenus digerantur alimenta, aut insigniter depravatur; Unde innumerae fiunt alimentorum corruptiones. Depravationes hæc alimentorum alio nomine rectè *cruditates* dicuntur, quæ in genere sunt duplices, *acida* & *nidorosa*: in specie sunt innumera.

*Acida* est quando alimenta abeunt in succum acidum plus minus viscidum, nec sufficienter attenuantur & volatilisantur. *Nidorosa* quando eadem alterantur ita, ut abeant in liquorem saporis horridi plusminus putrilaginosum. Hinc corruptionem nidorosam optimè possumus intelligere, si contideremus istos ructus, qui ex ovis frixis cum butyro à nobis comestis solent eructari.

*In imminuta* ergò chylosi conquerruntur ægri de dolore stomachi post pastum, item de ructibus etiam post 5. vel 6. horas ab alimentorum assumptione molestis, sed genuinum assumptorum saporem adhuc representantibus, adest appetitus, inflatio stomachi. Speciatim in talibus subjectis post pastum adest phlogosis, quæ semper ortum habet ex stomacho, eoque præsertim muco copioso acido onerato. Conquerruntur etiam subinde de difficili respiratione, quando dorso incumbunt, item matutino tempore os muco plenum observant, qui revera ex stomacho videtur adscendere, cum per incubationem quasi regurgitat, sicque tempore matutino excernitur. Vitium *digestionis depravata* restantur imprimis ructus, in cruditate acida habent acidos, ita copiosos flatus, & quæ rejiciunt aut arte, aut natura per vomitum, sunt viscida & pituitosa, saporis plusminus acidi, alvus subinde contumax.

*Cruditas nidorosa* suggerit ructus fatidos, aut saltem horridos, similes illis, qui elevari solent post ova frixa assumpta, matutino tempore saporem peregrinum in ore accipiunt, quem non possunt sufficienter explicare. Quæ rejiciunt



ciunt vomitu, sunt liquida, subflava, aut insipido-dulcia, aut ex amarore dulcescentia: alvus plus solito aperta esse solet.

*Causam* chyloseos ut Veteres manciparunt calori, ita in ejus læsionibus accusarunt calorem debilem stomachi, sive intemperiem ventriculi frigidam, & hanc nunc simplicem, nunc cum intemperie epatis calida conjunctam. Sane lectio frequens Practicorum modernorum imprimis Italorum & Gallorum vos docebit, quod hi omnes accusent inæqualem intemperiem stomachi frigidam & hepatis calidam. Verum hæc in parte laudandus *Helmont*, qui prius caliginem discussit, & calorem non effectivè sed dispositivè digerere statuit, quando potius fermenta & fermentationum læsiones seu causas proximas digestionum læsarum introducit.

*Chyloseos ergò læsæ causa proxima* erit vel in fermenti stomachi vitio, vel in vitio alimentorum assumptorum. In fermento quidem; quando non potest sufficienter digerere; aut quando non legitimè digerit, sed potius alimentum depravat. In alimentis erit causa, quando eadem digestionibus sunt inepta; aut quoniam peccant quantitate, dum sunt nimis vitiosa & digestionibus inepta.

Hæc ut pateant, imprimis fermentum stomachi deficiens, spirituum animalium vel defectu, vel ad alias partes impetu, frustratur chylicationem: Hinc debilitati ut minus appetunt, ita minus etiam digerunt, spirituum defectu, aut quod in loco dolente, v. g. Nephritici; aut gravioribus animi perturbationibus quasi præoccupati, minus aut planè non digerunt.

Deinde id fermentum digestivum non satis volatile, sed acidius à peregrino acore in stomacho corruptum, ut fit in hypochondriacis & scorbuticis, dissolvit quidem promptè alimenta, sed eadem non debite fermentando, nec debite volatilifacit, sed nimio acore ead. in massam vitiosè acidam transmutat: undè imprimis cruditas acida provenit; sicuti ex ipsius fermenti defectu, speciatim acidi effusini inertia, cruditas nidiorosa solet supervenire, ad quam ipsam interdum confere perversus bilis motus, in stomachum per pylorum aliquantulum regurgitans. Ab hujus enim olei volatili & alteratum fermentum digestivum itidem cruditatem nidiorosam subinde infert. Par ratio est pinguium, obtundendo efficaciam fermenti digestivi, promptè cruditatem nidiorosam contrahentium. Quod si eveniat, ut quacunque occasione reliquæ ex præviis digestionibus vel rugis stomachi firmiter affixæ sint, vel intra ejus cavum etiam copiosiores aut parciores ut plurimum pituitæ viscidæ aut acidæ sub forma hæreant, & harum præsentia impeditur fermenti activitas, cessat appetitus, deficit coctio.

Verum in unoquoque subjecto peculiaris est fermenti digestivi varietas, tam in specie animalium, quam in unoquoque individuo humano, ratione cujus fit,

ut non



ut non tam appetitus variet, sed etiam ut ipsa variet alimentorum digestio, ita ut ea, quæ unus appetit avidè, & hinc facillè digerit, alius respuat. Appetitus est index, qui monstrat assumenda, quæ facillè assumuntur, facillè digeruntur, quoniam tantum appetuntur ea, quæ sunt appropriata vel amica fermento stomachali, & quæ consequenter facillè dissolvuntur & fermentantur. Hoc nobis inculcat Hippocrates in aphorismis, dum dicit: *Consuetas, licet deteriora, insuetis licet melioribus esse preferenda*. Siquidem per consuetudinem fermentum digestivum quodammodo modificatum est, ut ad consuetam saltim alimenta magis appropriatum reddatur. Hinc ii, qui certa quædam nonnunquam abhorrent, incipiendo à minimâ dosi, & successivè adscendendo ead. sibi familiarissima reddunt; qua ratione & venenorum victui quidam assueti dicuntur, quoniam fermentum stomachi successivè alteratum, talia olim hostilia tanquam amica facillè arripit.

Quod attinet *vitium chylofeos alterum ex alimentis assumtis*, frequentior hic causa est, quando copiosè nimis ingeruntur, & varia nimis assumuntur. Plura enim non possunt geri, quoniam unumquodque menstruum fermentativum proportionem requirit debitam, in quod agere debebat. Si ergò nimia alimentorum *quantitas* ingeratur, obruitur in tantum fermentum, ut eadem nec dissolvat sufficiens, quoniam non est sufficiens, nec convenienter fermentando volatilifcat; unde assumpta loco chyli in forma pastæ crudæ acidæ remanent.

Præter *quantitatem* in primis etiam *varietas* ciborum turbat digestionem, ut enim magna, adeoque alcahestica sit fermenti stomachalis potestas, quatenus semel varios cibos possit dissolvere & fermentare, certum tamen est, quod tam per consuetudinem, quam per idiosyncrasiam magis determinatum sit ad hunc, quam ad alium cibum. Si ergò varia ingeruntur pingua cum acribus, acida cum duleibus, & quasi quadrata cum rotundis, certum est, quod fermentum dum promptius agit in unum quam alterum, non leviter vitietur digestio, ac plura relinquuntur cruda. Hinc cum ea, quæ non ritè digeruntur, vix nec absque difficultate per pylorum transmittantur, inde copiosus mucus obruit ventriculum, ac ulterius vitiatur chylôsis.

Quoad *qualitatem* ciborum etiam delectus habendus est. De *Pane* tantum loquor, qui utut ex omnib<sup>9</sup> alimentis nobis sit familiarissim<sup>9</sup>, tamen ut omnis repletio mala, ita panis pessima, quia nimis exinde acor assumpta omnia imprægnat, & quia panis motus fermentativus est nimis, impeditur coctio, quatenus illius ratione non alteratur chylus in salum: huius v. ratione non subigitur debitè, & in subiecto tali debitam vitalem crasin s. characterem à fermento digestivo recipere nequit, impeditur adeoque notabiliter digestio, quin pasta viscida & cruda relinquatur subinde in stomacho. Ex hoc etiam decidendum est, quare quidam vinum copiosius ferre queant, alii minus, nempe quorum volatilius ac subtilius, adeoque minus potens est fermentum digestivum, ut v. g. in pluribus literatis.



Hi ut plurimum læduntur à vino, hujus acido prævalente acri fermentativo-  
roso, unde in talibus æstus facilis ab acido, ebrietas à pre, hinc plures hypo-  
chondriaci, item cordis palpitationibus laborantes tardius inebriati solent. *Po-  
tus nimis* turbat quoque digestionem, quoniam I. nimis diluitur fermentum  
rososum digestivum. II. Quia nimiam fluctuationem alimentorum in sto-  
macho facit, quæ nonnihil fermentativum motum impedit. III. Quia to-  
num stomachi lædit, eundem distendit, ejusque fibras tam flaccidas reddit, ut  
digesta licet, non adeò commodè per pylorum possint expelli.

Ex dictis patet, quid habendum de *Peterum intemperie inæquali, in qua  
neverà nihil aliud subest, quàm acidum vitiosum in stomacho.* Pressius jam  
paulò & accuratius *cruditas, nidorosa & acida* consideranda venit: *Acida crudi-  
tas* in acido plus minus viscido digestionis defectu enato consistit. *Nidorosa*  
verò *cruditas* nihil aliud quàm putredinis inchoatæ species est. Posterius hoc  
ut pateat, observetur I. *Cruditatem nidorosam* contingere in febribus, præsertim  
acutis, in quibus fermentum digestivum ejusque debitus acor deficit, unde  
appetitus cessat, & alimentorum nausea supervenit, & cerevisiæ consuetæ lu-  
pulatæ ceu nimis amaricantis horror adest; acidis è contra delectantur. III. Ori-  
ri eandem frequentius à *pinguibus* & *fixis* fermentum digestivum & ejus aci-  
dum plus minus obtundentibus, in specie ab ovis, lacte & lacticiiniis, & c.  
III. Quando assumpta qualibet in stomacho diutius morantur sive retinentur, re-  
ctè ob id monet *Helmont.* non putandum, quod chylus vitri instar in fornace  
subindè excellentius coquatur, quo diutius, sed morà nimia alienatur & cor-  
rumpitur. IV. *Nidorosa cruditas* emergit ex *horæis fructibus*, faciliè putresci-  
bilibus, unde postmodum *Diarrhæa* & c. V. *Dulcia* quæ sub diurno calore  
ad amaritiem prona sunt, v. g. passulæ, glycyrrhiza eadem in stomacho faciliè  
cruditatem nidorosam contrahunt, sub qua amarescunt, sive, ut aliàs dici solet,  
bilescunt. VI. *Cruditatis nidorose* præsentis sunt signa ructus, de quibus supra. Sic  
ægrî: *Sie haben einen wunderlichen Geschmack/ es steigt ihnen auff/ wie faul Hei-  
oder faule Fische: Es steigt ihnen auff ganz bitter und eckelich.* Ex his præsuppositis  
verè sequitur fieri *cruditatem nidorosam*, quando fermentum stomachi vel deficit,  
vel ab absumentis plus minus tendentibus ad dispositionē putredinalem, pro natura  
assumtorum sc. vel animalium vel vegetabilium ordinario faciliè putrescibilem.  
Unde pro putredinis natura alcali emergens, agens in pingue, saporem tetrum,  
vix explicabilem, subindè amaricantem repræsentabit. Præ cæteris hoc illu-  
strant ova, quibus vix citius quemcunque nidorem contrahere observatur. Hinc  
etiam eadem ad duritiem cocta brevi postea tamen nidorem eructant. Deinde fa-  
cillimè ova frixa cum butyro; alcalinempe ovorum copiosum agit non solum  
in proprium & c. sed simul in abundantius adjectum butyrum, unde & hujus ad-  
diti ratione & acidum stomachi magis obrunditur, adeoque ejus activitas hinc

enervatur.



enervatur: Ita ſimul parili ex ratione & nidoris vis intenditur. Hinc tætri ruſtus erumpunt, qui indicant quidem inchoatam fermentationem, ſed depravatam & in ipſa actione ex inertia fermenti digeſtivi deficientem. Unde ex putredine contentorum ruſtus tales tætri oriuntur. Accedit pylorus in furorem actus, qui portas tranſitus claudendo, irritatus ab hoſtili contento, dicta digerendo retinendo, magis magisque eorum putredinali corruptioni ocaſionem præbet.

Quoad *Prognofin*, certum eſt, in chyloſeos læſione conſiſtere fundum quàm plurimum morborum chronicorum. In ſpecie ſitis certi, quod ex *cruditate acida* & ejuſvariis differentiis oriantur omnes *febres intermittentes, malum hypochoondriacum, paſſio colica*: Item quod ſimilis acor, in ſtomacho vitians alimenta, ſit partim origo, partim fomes *morborum cutaneorum*. In genere omne *acidum vitioſum* in corpore oberrans fundamentum habet in *vitioſa digeſtione* ex corruptione acidi. *Arthridis* ipſa ex hac *acida ſtomachi cruditate* primos habet natales, ac omnes *chronici morbi* ex viſcerum obſtructione vulgo derivati, ex hoc *acore vitioſo ſtomachi* originem habent.

Quoad *Curam*, impoſſibile eſt arte promovere vel inſtituere *chyloſin*: Eſt enim opus ſimpliciter naturæ & dos vitalis fermentorum. ob id adjuvemus ſaltem naturæ opus: I. *Impedimenta quacunq; removendo*. II. *Aromatibus volatilibus ſtomachum extergendo & acrioribus eundem quaſi irritando*. III. *Acidis blandioribus ſtomacho gratis ejuſdem tonum & euphoriam conſervando*.

Ut ergo *removeantur impedimenta*, ſiquidem hæc in materiali vitio conſiſtunt, removenda ſunt vel *vomitū* vel *ſeceſſu*. Equidem *vomitoria* in primis *antimonialia* hic optima. Inter *purgantia* *M. P. de hiera c. agario*. in ſubjectis paulò robuſtioribus conducunt; Hinc *pilula maſſichina* ceu ſtomachis appropriatæ. item *pilule de aloephangin*. ex aromaticis paratæ uno alterove grano *ſcammonii* acuatæ, conveniunt, detergendo ſordes mucilaginofas ſtomacho ad hærentes. v. g.

℞. M. P. aloephangin. gr. xv.

Scammon. ꝑrat. gr. ij.

Extr. trach. alſand. gr. ſ. c. ſ. q. Tinctur. ꝑ. F. Pilulæ.

S. *Exptrende Magenpillen.*

Vel hæ ipſæ *aloephanginæ* ad imitationem *Zwölfferi* correctæ & paratæ ſtomacho conducunt, & in hunc finem, *impedimenta* nempe ventriculi *remove*, *pilule uſuales* in morbis chronicis adeo uſitatæ ſunt vel qualibet ſeptimana ſemel una alterave hora ante prandium, vel quovis menſtruo ſpatio ſemel uſurpandæ ex baſi *aloës* conſectæ, ut harum ope maturæ ſordes primarum viarum *removeantur*. Alii non incommodè *cremorem ꝑ* in hunc finem adhibent, à ꝑ. ad ꝑ.



in iusculo carnis vel pulli benè calido horâ unâ alterâve ante prandium quavis septimanâ semel usurpando.

Quoad *aromatica* in chylosi læsa convenientia, conveniunt inprimis *sem;* 4. *calid. majora*, & hinc zingiber cuius egregium usum in cruditatibus stomachi & primarum viarum pluribus confirmat *Platerus in observ.* *Nux moscbata* quidem etiam non est inelegans, sed quia nimis oleosa est, potius aliis utimur. Hinc cæteris palmam præripiunt *absynthium, acorus, rosmarinus, lign. sassafras. v. g.*

℞. *Elix. menth. ziiij. ag. cinam. Ros zvj. M.* In fine cuiusvis pastus cochl. j. vel ij. capiarum. Conducit etiam *essentiam p peris* cum *V. p. sato* parata. Hinc *Elixir. Prop.* cum & sine acido. *Elixir. Oli Myns.* à guttis xx, ad xxx. est egregium. Aut fiat *vinum medicatum*:

℞. *rad. Helen. zvj. Zingiber. vel Zedoar. ziiij.*

*herb. menth. crisp. absynth. an. Mj. sem. anis ʒß.*

*cinam. acut. ʒij.*

Incisa & contusa includantur nodulo, vel in eodem ceu vehiculo *Os dulcis* gtt. xv. ad xx. assumantur. Facit huc etiam *Os cum*, inprimis in *vino absynth.* assumtum, vel etiam in *vinio infusionis lign. sassafras*, it. *Quo* *Glatus* ad imitationem *Tachenii* paratus. it. *O. Glatum* & c. cum *aromaticis* mistum usurpari potest. *Ambra* optimè convenit senibus in vitio digestionis primæ, si cum saccharo in formam *ʒ.* redigatur, sive ejusdem *essentia* cum *tu mentha* sive *melisse* crebrius adhibeatur.

*Poterius* in usu habuit *specificum suum stomachicum*, quo plura præstitit in suis ægris. Descriptio nullibi prostat. Probabile est, quod fuerit remedium *ʒiale ex regul. ʒii ʒial.* paratum ad imitationem ferè *ʒii diaphoret.* Ad *specificum stomachicum* pertinet & *herba Thee*, non tantum stomachum roborans, sed & à calculo & arthritide præservans, & capiti inprimis conveniens, præservat ab ebrietate, & somnum arcet, & stomacho inprimis confert. Usus est, ut foliorum, quantum pugillus magnus capit, ebulliant in *∇* simplici fervida, tantillo sacchari addito, decoctum & colatum bibatur calidè, ac talis unus pugillus pro terna ad minimum vice sufficit.

In specie quoad *cruditatem nidorofam* ceu *incurrigibilem*, id quod corruptum, evacuandum est. Convenit autem *Rhabarbarum* & *Tamarindi*, pro ejus vel aliquali correctione *cremor Tartar. cum coralliis rubris*, *Os dulcis, raticum rubrum c. ebore sine Δ, it. conserv. rosarum Glata.* *Cruditatem* verò *acidam* corrigunt *Tinctura ʒ. acris, vinum & cerevisia absynth.* infusum *radicum armoracia, r.* & *essentia mentha, r. piperitidis*, per quam egregius est in corrigenda *cruditate acida*: *Os absynthii cum ocul. ʒ. & coralliis.*

Inter externa conveniunt præsertim *ʒa* quædam *destillata*, plus minus *aromatica*, speciatim *ʒa mastichis flavum.* Item



℞. ol. stomach. Craton. ℥ij.

destillat. menth. ℥℞. caryoph. Zedoar. an. ℥℞. M. Illinatur stomachi regioni, applicando desuper laterem calefactum. Hinc sentum stomachale de Syrace Hartmanni Praxi Chymiatr. 262. Item Empl. de Tacamahac. Schrod. Pharm. l. 2. p. 201. c. 53. N. 18. Simile empl. habet Myns. Thes. p. 504. Præterea spongia vino generosissimo vel V. cui simplicia stomachalia infusa fuerint, imprægnata, stomachi regioni imposita sive applicata, idque calidè, itidem in usu est.

## CAPUT VI.

De

ASSUMPTORUM RETENTIONIS  
IN STOMACHO LÆSIONE.

PRIMUM vitium alimentorum retentionis læsa in stomacho est, quando copiosis flatibus distenditur ventriculus, & exinde turbatur ingestorum receptio, retentio, coctio. Affectus à flatibus distendentibus dicitur *Inflatio Stomachi*, qui, si flatu erumpunt cum sonitu, dicitur *Ructus*: sin copiosè, *choleera*. sic ea quorum affectus inter se parum differunt. *Flatus* hi si in stomacho retineantur, satis sunt molesti, adeò interdum, ut pessima inducant symptomata. Sic *Bartolin. Cent. 2. Ep. 687. Ep. 81.* refert, ingentem ventriculi inflationem in femina exinde pro gravida habita. Si in inflatione Stomachi erumpunt ructus, sponte sua se prodit malum, verum quando orificium stomachi sinistrum est ocllsum, adsunt angustia in præcordiis, deinde præcordia sunt distenta, si tangatur locus præcordiorum, renisus quidam ibidem percipitur, ægri conqueruntur de difficili respiratione, cum distento stomacho impediatur diaphragmatis motus, præsertim quando incumbunt supinati, quod in hypochondriacis frequens. Subinde quoque percipiunt flatulentias quasdam in stomacho, quando se iucitant ex uno latere in alterum, seu ut describitur à *Foresto lib. 18. obs. 39. in schol.* gravitas & distentio quandoque non solum circa ventrem ipsum, sed extra totum pectus, aliquando verò retrò & juxta collum & dorsum ac ipsas vertebbras irruit, sæpè autem utrinque occupat, aliquando verò tumorem circa os ventris efficit, ructus inanes fiunt, modicè alleviantes; & inhibito flatuum, qui per alvum excerni consueverunt: Si verò ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur.

*Flatus* omnes fiunt in stomacho per vitiosam fermentationem, factam ab acido ex & in materia viscida, crassa & pituitosa. Hinc est, quod Veteres dixerint, oriri flatu à Melancholia, unde & *Hypochondriaci* abundant flatibus, propter acidum fermentans materiam pituitosam. Dico

fieri



## De assumtorum retentionis

fieri in intestinis & ventriculo per fermentationem ex assumtis. Quod enim non inhiat assumtis, patet ex eo, quod duo homines iisdem alimentis utentes, eorum unus generat flatus, alter non. Ratio est diversitas fermentorum in ventriculo; unde *Hypochondriaci* & *hysterica* ferè ex omnib. alimentis eliciunt flatus, quod alia subjecta non faciunt. Verum quidem est, esse multos cibos præ reliquis aptiores, ut ex illis generentur flatus: uti sunt *raphanus*, *allium*, *cepa*, quoniam tales sale acri volatili abundantes incidunt, attenuant mucilaginem stomachi, & postmodum cum acido concurrentes generant flatus. Nisi ergò occasione talium ingestorum nati sunt flatus, de subjecto materiae viscidæ seu pituitosis humoribus confirmatur suspicio. Quod verò adsit in talibus talis mucilago acida viscida, experientia testatur, quia vomitu excernunt copiosa, crassa, ac tenacia plus minus acida. Rara est observatio quam habet *Rhodius Cent. 2. obs. 52.* de subitanea ventriculi & abdominis inflammatione ex esu piscium, post usum dæti chinæ.

*Ructus* ab *Helmontio* rectè statuuntur *quadruplices*: I. est *ructus acidus*, ut in *Hypochondriacis* & *jejuno stomacho*. II. *Ructus vidorosis*. III. *Ructus specificus* sive is, qui simplicium assumtorum saporem refert, v. g. post esum *raphani*. IV. est *ructus insipidus*, quando adsunt flatus sine determinato sapore. Interdum sed rarò admodum observantur *ructus foetidi*, qui sunt pessimæ notæ.

*Flatus*, si per se oriantur mali; unde etiam *cruditates* multæ ac frequentes minùs bonæ, sed si è *malo hypochondriaco* oriantur, ordinarium sunt symptomata. *Inflatio ventriculi*, quæ in convalescentibus fit, recidivam morbi prioris significat. Inflatio ventriculi, si diu duret, ad *Hydropem siccum*, sive *Tympanitidem*, ut vocant, disponit. *Ructus* qui rejiciuntur *foetidi* sunt pessimæ notæ & à *Cabelcho-vero Cent. 2. curs. 15.* tanquam admodum funesti declarantur.

In *Cura* I. removenda sunt externa assumta, quæ occasionem mali suggerunt. II. Evacuanda materia viscida, pituitosa, in ventriculo aut primis viis hærens. III. Per medicamenta *aromatica*, *salina*, *volatilia*, *oleosa* discutiendi flatus, & temperandum acidum.

Ex *Purgantibus aloëtica* in primis conveniunt, hinc & *pilule mastichinæ* ad ventriculum crebrius eructantem ulurpantur.

*Vomitoria* si necessaria per se patent. Quæ alias conveniunt, sunt ulterius *Rad. Angelic. Gentian. Arist. rot. calamus arom. Galang.* exque his parata varia. *Chamonilla* tam vulgaris quàm *Romana* horumque olea destillata sunt optima. *Semina calida majora & minora*, horum olea destillata, vel eadem in vino bullita: *castorium* etiam, ejusque extractum & essentia. *Ambra* in ructu contumaciori optimum remedium cum saccharo & veris in forma usur-

patum



patum à Zacut. Lusit. l. 2. prax. adm. obs. 7. experta. Species omnes aromatica officinales hinc conveniunt. Sunt qui & commendant talos leporis aut suillos pulverisatos, C. C. preparat. corall. & c. Hęc nempe agendo in acidū flatuum efficiens tollunt. Grana piperis 5. vel 6. integra jejune deglutita experimentum sunt Riverii ad ructus acidos obs. 37. morborum infrequentium. Ulterius aqua stomachica usitata, tam simplices, quàm composita. Syrupus baccarum lauri, vel juniperi, de quibus Horst. l. 4. obs. 4. & l. 5. obs. 2. Q. E. chammon. Rom. Bals. 4. terebinthinat. & anisatus in contumacioribus ructibus est optimus. ☞ Di. etiam perquam egregium est carminativum, præsertim si cum flatibus sit conjunctus ardor sive æstus, & inde natæ phlogoses, quæ solent oriri ex bile cum acido in intestinis concurrente, & vitiosè effervescente, in quo casu est singularis ☞ Di. præsertim dulcificatus sum ☞ u anis. sive mentha; absinthium quoque sive vinum absinthites, quatenus corrigit causam materialem flatuum, conducunt. Conf. hinc Sylvium in praxi, ubi & mistura polychresta contra flatus; item ☞ vegetab. compos. carminativus habentur. Facit huc etiam observatio Foresti l. 18. obs. 39. ex usu ciborum multorum flatulentorum & potu musti ventriculi dolor intolerabilis cum ejusdem inflatione, ut tactu etiam tentiretur, curatus citò per chamom. Rom. & vulgarem concisis, addito momento sem. anis & carui in cerevisia coctam, quam cum bibisset, flatus copiosos per superiora & inferiora emisit, & ilicò sanatus est æger.

Externè olea tam destillata, quàm decocta aut infusa ex carminantibus; item Empl. de bacc. lauri, malaxatum cum ol. absinth. menth. & juniper. item spiritus vini infusionis aromaticorum, extrinsecè applicatus calidè, convenit. Notum est, quod omnis motus humorum per os sursum ex ventriculo fit præter naturam, cum verò post ructum variæ res aliæ, sanguis, pus, acida, pilosa, & c. rejiciuntur, dicitur vomitus, cui motui alius adesse solet, qui dicitur Nausea.

Quoad Vomitus, hic revera est nil aliud, quàm convulsio pylori & hinc totius ventriculi, concitata propter irritationem ejusdem gravem & nimiam. Dum enim pylorus fortiter se contrahit, fit, ut subito sequatur motus totius ventriculi peristalticus inversus, qui à pyloro progreditur ad stomachum, idque mediantribus fibris tam circularibus, quàm transversis, stomachi tunicas intertextentibus, post pylori constrictionem similiter contractis. Hanc pylori & stomachi convulsionem sequitur similis gulæ convulsio, indeque omnium contentorum in ventriculo per gulam, & sic per os consequenter, protrusio: Est enim pylorus, ut inquit Helmont. rector & præses retentionis in stomacho. Vera esse, quæ modo dixi, confirmat ocularis experientia. Vid. Olav. Rudbeck. in suis observ. Anaom. Hemsterhusii mæsi aurea annexis observ. 20. Confer; simul de modo Willis in Pharm. Rat. part. 1. p. 38. sect. 2. c. 1. ubi quo modo fiat vomitus explicat: Item quæ habet Helmont. Tr. Pylorus Rector & c.



Præcæteris dixi *Nauseam*. Hæc vulgò dicitur laxatio nimia orificii superioris, quod tamen omninò falsum est, quando potius pertinax & nimia stomachi, sive orificii ventriculi superioris clausura est, id, quod revera *Nausea* constituit. Quando enim ex re molesta irritatur ventriculus, & pylorus & stomachus se contrahunt, estque *nausea*. Sin verò continetur irritatio à re molesta, prævalet tandem fortior pylori contractio, & sequitur sic *nausea cum vomitu*: Nam quod in nausea sit talis adstrictio & angustatio stomachi, patet ex eo, quod *Nausea* sit revera *fastidii species*; in omni enim fastidio se contrahit stomachi orificium. Hinc est, quod in nausea et æ, non secus ac in omni fastidio, tam difficilis sit deglutitio, dum boli deglutiti videntur hære in gula, ac nolunt inferiora versùs descendere, propter stomachi contractionem. Deinde quando comedimus nauseantes aliquid, tunc sanè post deglutitionem rei molestæ sequitur ructus, non verò ante, quia nempe stomachus antea erat clausus, qui per intrusionem deglutiti aperitur, & hinc sequitur ructus. Hinc est, quando audimus res horridas, aut olfacimus res ingratas, quod hoc ipso nauseamus, dum totus ventriculus & orificia se contrahunt; Imò si nauseantibus rem ingratam intrudas, hoc ipsum sæpius per vomitum regurgitat, antequam ventriculum intret, ex pertinacissima stomachi clausura. Est igitur *Nausea stomachi quadam contractione, respuens rem ingratam*: Sicut in vomitu est pylori contractio convulsiva, quam sequitur totius ventriculi similis convulsio. Patet ex dictis, vomitum referendum esse inter actiones non voluntarias, adeò ut rarum sit vomitus voluntarius, quale exemplum memorat *Bartholinus C. 1. hist. 39.* & in his voluntariè vomentibus videtur esse similis contractio, atque in hominibus ruminantibus, de quo vtd, *Bartholinum Cent. 5. hist. 16* nempe in his ruminantibus ventriculus est solito fibrosior & carnosior, ut quasi vestimento musculofo sit indutus, ratione cuius, tanquam per musculos, voluntariè movetur stomachus, & fit regurgitatio cibi in os per ruminationem, aut voluntariè rejiciuntur penitus per vomitum.

Quicquid igitur vehementer irritare & molestiam creare valet ventriculo, causa est *nausea & vomitus*: Talis enim molestioris impressionis occasione, in nervos & fibras nerveas factæ, ventriculi concitatiore impetu elastico movetur. Ructus ad dicta loca, unde supervenit convulsivus stomachi motus.

*Irritatio talis est vel per essentiam, vel per consensum.*

Per *essentiam* ventriculus laborat, quando humores aut excrementa acia in eodem subsistunt, aut ex internis, in specie ex duodeno, ratione ductus pancreatici & biliosi, in ventriculum regurgitant; quando idem est inflammatus, aut ulceratus: In omnibus enim his casibus ventriculus facilè irritabilis est, ut ob id facile sequatur vomitus, & propter talem succorum quorumvis, speciatim salivæ acrimoniam irritantem vomitus sæpius adeò pertinaces infestant scorbuticos.

Cæterum

Cæterum  
lin rem  
hist. 20.  
continui  
corruptio  
contuma  
& mors  
urin prin  
creatis  
effervesc  
huc assu  
odorus  
ciunt hui  
ne: Ping  
unde non  
superius  
laxitate

Vomi  
ne colica  
intestina  
re colica  
mendi  
tus, non  
branas  
tinuas,  
sunt cupi  
obs. 32. l.

Dis  
to scilicet  
quem in  
nempe  
turalis,  
plematic  
mittenti  
nerat,

Ac  
nonnulli  
vel com  
singulis



Ceterum quando *diuturni* sunt vomitus, aut *continui*, ita ut nullis cedere velint remediis, vitium sæpe est in pyloro, ita ut hic omnino vel occlusus, *Cent. 1. hist. 20.* Item *Bartholinus Cent. 6. hist. 47.* ex pyloro callo obducto vomitus continui. Item *Barbette in Praxi. l. 4. c. 2.* ubi vomitus continuus lethalis ex corruptione & sphacelo pancreatis. Item *Panarolus Pent. 1. obs. 44.* Vomitus contumax lethalis ob pancreas lapidosum. Item *obs. 43.* Vomitus quotidianus & mors ab herpete ventriculi: Quibus adde *Rhodium Cent. 2. obs. 63.* Fit etiam ut in principio febrium intermittentium sit vomitus, dum scilicet succi pancreatis & bilis in intestinum duodenum effusi, impetuosius & præternaturaliter effervescono, pylorum irritant vicinum, ut irritatus vomitus inferat. Pertinent huc assumpta quæcunque stomacho inimica & ingrata, sicuti videmus, tantillum odoris & ialis, quod imprægnat vina emetica, stupendos inducere vomitus. Faciunt huc etiam pingua, aut crebrius aut copiosius assumpta, idque duplici ratione: Pingua enim, seu difficillimè digestibilia, relictantur fermento acido salino, unde non leves inferunt molestias, gravantque stomachum; Præterea orificium superius laxant, unde, dum ex irritatione supervenit pylori contractio, facile ex laxitate stomachi supervenit vomitus.

Vomitus per consensum est frequentissim⁹, uti notum est, quod ad sit in passione colica & iliaca, propter consensum continuitatis tunicarum, ventriculum & intestina componentium. Curabam aliquando Hypochondriacum, gravi dolore colico in hypochondrio sinistro afflictum, qui continuos vel vomitus, vel vomendi conatus patiebatur. Notum & Nephritide affectis supervenire vomitus, non secus ac cranii contusionibus, aliisve similibus lesionibus, propter membranas cerebri, stomacho & reliquis partibus, præsertim internis, plus minus continuas. Mulieres imprimis pertinaces patiuntur vomitus, tam quando virorum sunt cupidæ, quam dum non ritè fluunt menses. Conf. hic *Hildan. Cent. 4. obs. 32.* Item *Deodatus in valed. p. 172.* Item *Hoferus in Herute Medico. p. 134.*

Differentia vomitus sunt, dum est vel naturalis, vel artificialis, medicamento scil. provocatus. Naturalis est vel spontaneus, vel non spontaneus. Ille est, quem instituit natura à materia vitiosa irritata; item qui oritur à vitio externo, nempe ab assumtis. Hic, siue non spontaneus est vel morbidus siue præternaturalis, quando ea vomuntur, quæ vomini non debent, v. g. sanguis; vel est symptomaticus, qui occasione alterius morbi evenit, ut in paroxysmo febrium intermittentium: vel denique est criticus, quo natura seipsam cum salute ægri exonerat.

Ad vomitum spontaneum salutarem referendi & ii, qui periodicè infestant nonnullos, idque ferè ex viscerum abdominis, ventriculo plus minus vicinorum vel connexorum vitio. Tale exemplum refert *Schenck l. 3. obs.* dum quidam singulis mensibus per biduum bilem utramque & cum pituita conjunctam vo-



mere solitus, vitam ad multos annos produxit. Inprimis si hoc malo vexantur, qui vitio splenis sunt affecti, ut observat *Forestus l. 18. obs. 17.* de quodam, qui circa lienem subinde dolebat, atque per certa intervalla humorem melanch. saepe etiam atrum evomebat, idque certis ferè periodis. Vid. & *Borellus Cent. 3. obs. 93. p. 270. 279. Panarolus Pentec. 1. obs. 22.* Ubi habetur vomitus matutinus ordinarius, multa symptomata præservans. Item vomitus septennis salutaris in puella, ob mensium suppressionem. *Zacut. Lusitan. l. 2. Prax. admir. obs. 13.* de quodam, qui singulis mensibus duobus diebus 14. vel 15. libras per vomitum excernebat, humoris nigerrimi & pici liquidæ similis, qui exinde omninò salvus ad annum 80. perduxit vitam, & *observ. seg. refert*, quendam tribus quibusvis mensibus atrabilario vomitu periodico laborantem, usu chalybis curatum, apertis hæmorrhoidibus, per quas evacuabatur sanguis. Facit huc vomitus studio prolektus in hypochondriacis, si scilicet singulis mensibus, aut 6. septimanis semel largius vino se ingurgitant, & hinc vomitum artificialem instituunt: Notandum etiam venit, res, quæ vomitu rejiciuntur, interdum diutius in ventriculo hæsisse. Notatu dignissima est annotatio 6. *Kerkring. in spicileg. de 10. ovis*, postquam ultra 3. menses in ventriculo hæserant, integris & succiplenis rejectis.

Inter res varias, quæ evomuntur, etiam est sanguis, & speciatim Vomitus sanguinis sive vomitus cruentus dicitur, qui fit ex aperta quacunque ratione arteriolæ aut venulæ ad stomachum pertinenti, idque vel vitio suppressarum confluxarum sanguinis aliorumve humorum evacuationum, vel vitio splenis, ex aperto vase brevi, vel denique vitio pancreatis, in qua una alteravè vena à lymphæ ejus præternaturaliter acidior exela, non rarò vomitus sanguinis inducitur. Quoad evacuationes suppressas, notum est, quod occasione mensium suppressionis hi ipsi sub forma vomitus sanguinei rejiciantur. Exempla vide in *Ruland. curat. Emp. c. 3. cur. 4. Schenck. obs. l. 3. Hochstett. Dec. 2. cas. 6.* Quin & prægnantes ipsæ, ex mensibus retentis, interdum vomitu tali sanguineo affliguntur, idque ferè sine periculo. Est enim motus naturæ, quos non faciliè licet alterare. *V. Salmuth. C. 2. H. 54. Schenck. l. 4. obs. de gravida.*

Ad excretionem tales suppressas pertinet etiam ulcus consolidatum: Siquidem ex curato ulcere antiquo tibiarum, vomitum cruentum observavit. *Rhodius Cent. 2. obs. 65.* Ex Pancreat. vitio subinde vomitus fieri sanguinis, patet ex eo, quod interdum sanguinem vomentes conquerantur de dolore profundo sub hypochondrio dextro, locum scilicet monstrant infæci, ubi inseritur ductus pancreaticus in duodenum, qualem sanguinis vomitum sæpius & puris vomitus sequi solet, ex pancreate exulcerato, vel per abscessum vitiatò. Et tales vomitus pancreatis præ cæteris solet gravativus dolor concomitari in superiori lumborum loco, ubi situm est pancreas. Confer *Sylvium l. 1. Præc. 15.* Spleneticis valde familiares subinde sunt vomitus, tam cujusvis materiæ, quam in specie sanguinis,



guinis, nempe splen nonnihil infarctus admittit per arteriam splenicam sanguinem, qui tamen non potest propter obstructionis impedimentum, remeare convenienter ad venam splenicam lege circulationis; Impedito igitur sanguinis motu in arteria & vena splenica, stagnat quodammodo in arteria splenica, in specie circa vas ejus breve, ante nempe ingressum arteriæ in lienem, quod vas breve ad ventriculi fundum subrepat. Sub tali occasione stagnatio sanguinis impediti facta, per vas breve apertum sanguinem arteriosum in ventriculum, vomitu cruento rejiciendo, dimittit. Hinc sæpius ante vomitum sanguinis percipiuntur pulsationes circa dorsum propè latus sinistrum: Confer *Zacut. libr. 2. Med. Princ. Hist. 10.* ubi aliquot spleneticorum, sanguinis vomitu laborantium, prostant exempla. Item *Schenck. l. 3. obs.* Non tamen semper ex splene sunt cruenti isti fluxus, uti hoc communiter existimant, quin & ex hepate, citra lienis noxam, vomitus sanguinis fieri potest: de quo confer *Hochstetter. Dec. 1. cas. 5. p. 146.* Miræ sanè ut subinde sunt humorum metastases & translationes, ita & vasorum anastomoses & apertiones. Confer *de vomitu sanguineo, an ex splene, an ex hepate? Schenck. l. 3. observat. Thoner. observat. p. 140. Senner. l. 3. pr. part. 5. sect. 2. c. 2. p. 507. Barthol. Cent. 3. Hist. 36. Cent. 4. hist. 60. Horst. l. 4. obs. 5.* Rarum est, quod *Riverius* refert *Cent. 4. obs. 26.* de rusticis, qui cum aquam fluminis potasset, ac simul hirudinem deglutivisset, hæc lateribus stomachi infixæ, continuum sanguinis vomitum induxit.

Quoad *Prognosin*, ante omnia hæc considerandæ causæ vomitus cum ipsis vomendi conditionibus, ex quibus demum formetur prognosis. In genere vomitus omnis, si non nimius est, ut plurimum est salutaris. Is qui à causa externa, vel qui est à mensibus suppressis, qualis gravidarum vomitus: item vomitus in principio morborum spontaneus, non nimius, aut vomitus in declinatione morborum criticus, salutare potius sunt, quàm periculosi. Vomitus lividus, præsertim plus minus graveolens: item vomitus vermium, superveniens in morbis, præsertim malignis: item vomitus humoris fuscæ & obscurè nigricantis, mali, ut plurimum lethales. Vomitus spleneticorum tam cruentus, quàm non-cruentus, periodicus, nec nimius, est saluberrimus, cui supervenientes hæmorrhoides levamen morbi certum ac tutum afferunt. Excretiones sanguinis sursum & deorsum in exanthematis, variolis, morbillis &c. lethales, teste *Hochstettero Decad. 1. cas. 8.* Vomitus sanguinis diurni funestus.

Quoad *Curam*, in genere causæ occasionalis sive materialis irritans quæcunque I. removenda. II. Opiatis tam acutus ventriculi, speciatim pylori sensus sopiendus, & nimius spirituum impetus, ceu causa efficiens formalis, sufflammandus. III. Aromaticis volatilibus ventriculo gratis hic roborandus. IV. Adstringentibus admixtis fibrarum tonus firmandus, & labefactatus restitueendus.



Pro his scopis obtinendis observetur I. *somnus*, quantum fieri potest, concilietur, cum motum humorum quemcunque, tam progressivum quam intestinum sistat, adeoque & evacuationes quasvis cohibeat. II. in vomitu *scorbutico* calida & acria non conveniunt, quia malum exasperant; conveniunt potius mitigantia calorem & acrimoniam salis scorbutici, imprimis *lac caprillum* cum *succo nasturtii* & *cochlearia*. III. Vomitus sanguinis citò compescere optimum est, aliàs ob copiosam profusionem sanguinis ac spirituum sequuntur lipothymia ac syncopes lethales. IV. In *vermibus* semper procurandus, ne alvus sit astricta, sed alternis ad minimum diebus, vel arte, vel naturâ alvi dejectio promovenda. V. A *veneno* si fit vomitus, non est sistendus, sed potius tamdiu promovendus, quamdiu aliquid veneni in stomacho latitare suspicio est: Hinc tamdiu continuanda sunt remedia, donec in ventriculo remaneant: Exhibentur optimè pro hoc scopo in forma *pilularum aloeticarum*. VI. *Clysteres* in omni vomitione utiles, si injiciantur pauca quantitate, ne pars coli ventriculo adjacens repleatur, ac fundus ventriculi comprimatur vel irritetur. Confer *Gabelhof. cent. 2. cur. 43.* VII. In *Nausea*, *inappetentia*, sive *anorexia* & similibus stomachi humoralibus affectibus, maturè hîc evacuandum, nec diu cum vomitoriis cunctandum, ne, præternaturalibus humoribus aliorum raptis, frustra instituatür vomitio. Confer *M. A. N. C. Ann. 8. p. 71.*

Quoad *materiam medicam*, ista quæ causam irritantem remonent, si *per essentiam* sit vomitus, sunt *vomitória*, vel etiam *purgantia*: interdum ad modorum imitationem cum parca opii dosi usurpanda; si verò *per consensum* fuerit, curato primario morbo, etiam curabitur vomitus.

Quoad *Opiata*, conveniunt *essentia opii. laud. Opiat. theriaca, extractum theriacale, syrup. papav. crocus*, tam internè quàm externè adhibitus. Quoad aromatica ventriculo grata, conveniunt *mentha, absinth. radix zedoar. cort. citr. & aurant. caryophylli, nux moschat. macis*: Præ cæteris *cinamom.* Hinc *Elix. mentha, syrup. decanell. Mynsicht.* item *Tinctura castia ligna*, item *decoctum Joelis* ad quemvis vomitum præstantissimum, ex *caryophyll. & mastich.* quod vid. apud *Sennert. l. 3. Pr. de vomitu p. 155.* (℥. caryophyllorum crassiusculè concisorum ʒj. mastich. ʒß. ros. rubr. p. j. simul mixta cum vin. rubr. ℥ß. coquantur in vase clauso ad medias. F. Potiuncula Joel. p. m. 324.) ulterius *spirit. theriacalis*, tam simplex quàm *camphorat. Elix. propriet. Par. Balsamus Peruv. & ejus Tinctura* ad imitationem *Willisi* parata. Hinc simplicium istorum *extracta & ol. destillat.*

Quoad *adstringentia*, excellunt *cydonia*, eorumque tam *succus*, quàm *caro, Syr. de ros. sicc. Syr. corall. Querc.* hinc *acetum zedoar. decoct. & extract. rad. Tormentill. vitrioli*, præsertim *Ætis*, qui simul blandè adstringit, & vel *hujus*, vel *beneficio ex terra sigillata* paratus *liquor stipticus*, item *Tinctura*

Ætis



*Stis adstringens, alumen* misturis additum &c. *Conserv. ros. menth.* Olata, hau-  
stus *vini malvatici* cum gut. v. vel vj. *Ol* in vomitu diuturno admodum con-  
venit, imprimis experta est quorundam mixtura.

℞. aq. menth. ℥ij.  
succ. cydon. ℥j.  
aq. cinamom. ℥vj.  
spir. Vitriol. gutt. v.  
ol. cinam. gutt. iij.

M. capiatur cochlearim, cui interdum gr.  
j. vel ij. laud. opiat. addi possunt. Alii v.  
recipiunt.

Expertus etiam est bolus in Vomitu, sin-  
gulu & similibus:

℞. Theriac. ℥β.  
ol. destill. macis gutt. ij.  
laud. op. gr. j.  
cum succ. cydon. F. Bolus.

℞. aq. Cinamom. ℥ij.  
syr. menth. ℥j.  
ol. Cinamom. gutt. iv.  
spir. Oli rectif. ℥β. M.  
Vel ℞. syrup. menth. ℥j.

aq. cinamom. ℥ij.  
ol. cinam. gutt. ij.  
spir. Oli gutt. iij. M.

Capiatur cochlearim.

Vel ℞. aq. menth. ℥ij.  
cinamom. ℥β.  
spir. Vitriol. ℥β.  
ol. destill. macis gutt. vj.  
sal. alumin. gr. iv. M.

Vel saltem hæc simplex formula :

℞. aq. menth. ℥ij.  
spir. Theriac. vel simpl. vel camph. ℥jβ.  
laud. opiat. gr. ij.  
succ. vel syrup. cydon. ℥vj. M.

In vomitu, præsertim februm malignarum, remedium elegans est *sal. absinth.*  
℥j. cum cochleari *succi limon.* mistus. vid. *River. Cent. 1. obs. 15. & C. 2. obs. 99.*

Inter externa vomitum sistentia sunt *℞ N. M. expr.* tanquam corpus  
omnium oleorum destillat. *carui, caryophyll. macis, menth. zedoar.* in forma  
balsami vel litus applicati: *Bals. Peruv. ol. stomachale Cratonis,* cum istis destil-  
latis subactum. Item *Empl. de Caranna* malaxat. cum *bals. Peruvian. & ol. de-*  
*stillat. mentha* irroratum. Quod facit *Empl. Barbette* in sua *Praxi*, ubi de *Vomi-*  
*tu* pag. 158. vel 135.

(℞. specier. aromat. ros.  
mastich. el.  
ol. Nucistæ expr. ana ℥j.  
still. macis  
citr. ana ℥β.

gummi carann. q. s. M.

F. s. a. Emplastrum *Auff den Magen*  
*inlegen.*

Deckerus ibid. hoc addit :

℞. pulv. menth.  
ros. rubr. an. ℥j.  
mastich. ℥j.  
Nuc. Moschat. N. iij.  
caryophyll.  
macis.  
cinamom. an. ℥ij.

ferment. acerr. ℥vj.

cum s. q. acet. rosac. M. F. Empl.)

*Theriasa*



*Theriaca* etiam cum *bals. Peruv.* lubacta vel in forma litus inungitur, vel altera inducta emplastri forma admoveatur: *frusta panis* sive *panis tostus* in aceto maceratus, hinc pulveribus aromaticis, *caryophyll. cinam. macis* &c. conspersus, calidè applicetur. *Sacculus croci* applicatus, de quo vide elegantem historiam *Baconis in Histor. vite & mortis* p. 120. *Potus* pariter ex *decocto absinth. menth. mel ss.* in vino vel aceto commodè applicatur. Usitatum denique est *cataplasma* de fermento *Mynsichti*,

Vel  $\mathcal{V}$ . ferment. acerrim.  $\mathfrak{z}$ iv.

pulv. menth.  $\mathfrak{z}$ j.

zedoar.  $\mathfrak{z}$ vj.

Nuc. Molch. N. iij.

macis. - cinamom. ana  $\mathfrak{z}$ ij.

acet. rosac. q. s. F. cataplasma.

applicandum Ventrículo in vomitu nimio.

Hæc quidem in genere de vomitu curando: In specie tamen considerandum, quis & qualis vomitus curandus, in hunc finem:

I. *Artificialis* vomitus non est curandus, nisi per accidens sit nimius, tunc enim supprimendus. II. *Spontaneus* non est curandus, qui sit cum euphoria ægri, quicquid etiam rejiciatur, nisi sit nimius, adeoque debilitetur æger, vel nisi atonia stomachi ex crebriori vomitu metuenda sit; tunc enim curandus, causam irritantem removendo, aut ejus genesis præcavendo, aut genitam alibi revellendo & avertendo, per V. S. hæmorrhoidum, per hirudinum applicationem, aperitionem. III. *Non spontaneus criticus* non curandus, nisi quod rarum, sit nimius, tunc enim ut vomitus artificialis, sistendus. IV. *Non spontaneus symptomaticus* curandus est, observando præprimis, an sit per consensum, vel per essentiam. Si per consensum, primarius morbus, quantum possibile, curandus est, observando præprimis interea, ne alia mala à vomitu excitentur, opiatum irritatio stomachi sistenda, vel acutus stomachi sensus leniendus, & appropriatis roborandus; v. gr. Si ex *Nephritide*, à capitis vulnere, æger sæpius vomat, una cum primarii morbi curatione, misturis aromaticis, cum opio aut papaverinis mistis, nimius vomitus nonnihil compescendus. Sin verò per essentiam sit vomitus, considerandum, an vitium sit in ejusdem fibris, à nervis, supra modum undecunque irritatis, vel in ipso ejus corpore, quando exulceratur, exoriatur &c. an verò vitium consistat in causa quadam materiali sive occasionali, cum plus minus irritante. Hujus ratione consideretur, an sit per protopathiam, an verò per *autogonadetiav*, hoc est, an causa peccans materialis in eo generetur, an verò aliunde deteratur. Sin vitium est in ipso stomacho, hoc debitis modis curandum, & sensus acutior opiatum sopiendus. Sin causa materialis occasionem suggererit, sive humor peccans fuerit, sive fermentum saltem peregrinum, adeoque vitium,

vel



vel in stomacho generatum, vel in eo radicum, adeoque per *πυλὸν & θύλακας*; tale vitium materiale vel corrigendum, sive eliminandum: Hinc *opiat* & appropriatis *aromaticis*, plus minus *adstringentibus*, ventriculo succurrendum, & ulterior generatio præcavenda. Sin v. per *διεσπασμένην* sit malum, & aliunde transmissa materia peccans; hæc vel corrigenda, vel per alvum evacuanda, vel alibi avertenda, qua ratione gravidis nimium vomentibus venæ sectione in brachio interdum succurrimus.

*Non spontaneus morbidus* omnino quocunque modo curandus, v. g. sanguinis vomitus, causæ etiam ejus sollicitam habendo rationem. Confer hic pluribus *Willis Pharm. rat. vol. 1. pag. 76. & seqq.*

In specie *vomit* artificialis est sistendus, v. g. post assumptum vomitorium, vehementius aut diutius ægrum vexans; convenit fortis externè calidus adhibitus, ex *absinth. menth. & aromaticis* sacculo inclusis, in vino decoctis applicatus: Item haustus *vini generosi*, non nimis frigidi, supervomitiones s. hypercatharses ab antimonialibus sistit. *Theriaca* etiam, si vires ferant, aut pilula unica *laud. opiat*, aut parum *essentie opii*, in *Elixir mentha* propinati. Præsentaneum etiam remedium dicitur *potus lactis, cum pane cocti*, aut *panis vino generoso acido* intinctus & comestus. *Clyster* itidem ex lacte, in quo *theriaca* dissoluta, injiciatur: item *crusta panis tostæ, vino generoso* imbuta, cum pulveribus aromaticis inspersa applicetur. Si *nausea* aut *vomit* imminet ab assumpto medicamento vel ingrato s. foetido, convenit masticatio *corticum citri recent*: cui subinde de *pulpa* aliquantulum adhæreat, vel *panis tostus aceto intinctus*, & pulvere *caryophyllorum* inspersus, ori ac naribus admoveatur.

*Morbidus vomitus* in primis est *vomit* sanguinis: Hic consideratur vel absolute, prout est excretio sanguinis simpliciter præternaturalis, vel respectivè, respectu causarum antecedentium, quæ sanguinem vel coacervant, vel sanguinem in specie ad ista loca diffundi faciunt. In vomitu igitur cruento curando, posterioris hujus ratione, causæ antecedentes removendæ, idque extra paroxysmum, vel excretiones consuetas revocando, vel viscerum vitia corrigendo. Prioris ratione, idque in primis paroxysmo, sanguinis motus, ne nimis in ventrem effundatur, corrigendus, vel revellendo per V. S. vel avertendo per hirudines hæmorrhoidibus applicatas. Sanguinis vero jam effusi ratione, vala *adstringentibus* coercenda, & sanguis effusus, plus minus grumosus resolvatur & ejiciatur.

Inter remedia, quæ huc spectant, primatum obtinent *succus plantag. & portulacæ*, præ omnibus aliis *succus rad. urtic. maj. Syrup. it. de Symp. Fernel.* de quo vid. *Bartholin. cent. 3. obs. 61.* Sed expertissimum hoc in casu est remedium *Syrupus*, paratus ex *succis fol. plantag. & rad. symphyt.* quem non solum commendat in *Phil. experiment.* seu multiplici usu expertum, sed descriptio ejus videatur etiam in *Digby recept. vol. 1. pag. 175.* Aliàs ad supprimendum san-



guinem est optimū ☉. ☿. ☽. li, si nempe recipiatur *aqua plantag. vel urtica maj.* & aciduletur s. q. ☿. ☽. li, ut fiat mixtura, ac ita successive usurpetur, quæ, ut dicit *Rulandus*, miraculi instar profluvium sanguinis sistit, quam etiam potionē plures alii autores admodum laudare solent. Porro *crocus* ☿. *adstringens*, *Tinctura ☿. is adstringentes*, *Tinctura ☿. is* ☽. li. it. terr. sigill. lap. hamatus, præsertim cum blandē acidis propinata: *Trochisci*, it. de carabe ☿. de terr. sigill. sunt egregii. Unde ex his, cum aquis convenientibus dilutis, potionem expertam habet *Fonsus in lib. 18. obs. 18.* quæ præmissa V. S. illico juvit, adstringendo sc. & sanguinem concretum resolvendo, describitur etiam à *Sennerto l. 3. Prax.* ubi de vomitu sanguinis p. 158. ad hujus imitationem:

℞. aq. burf. pastor.

portulac.

plantag. an. ℥j.

acet. rosac. ℥ij.

trochisc. de carabe.

de terr. sigill. an. ʒi℞.

syr. myrtin. ʒvj. ad ℥j.

*Sylvius* misturam habet ad quamvis sanguinis excretionem admodum proficuum *lib. 1. prax. c. 9. §. 20.* quæ prima fronte quidem non adeo conducibilis apparet, revera tamen, & quod ipse testor, admodum est proficua. Ad hujus imitationem ergo:

℞. aq. plantag. ℥iij.

cinamom. usual.

acet. destill. l. rosac. an. ʒiij.

corall. rubr. ʒβ.

terr. sigill. gr. xv.

laud. opiat. gr. ij.

syr. myrtin. ʒβ.

M. capiatur cochleatim.

In hujusmodi misturis commodè & oculi ☽. possunt addi, quando nempe metus est coagulati sanguinis, adhuc in stomacho hærentis, aut etiam *sperma ceti* in jusculeo calido dissolutum assumatur, ad dissolvendos sanguinis grumos, ubi fluxus ritè fuerit sedatus. Siquidem si post vomitum sanguinis sequatur color faciei citrinus, aut lividus, debilitas pulsus, aut syncope, aut stomachi inflatio, hæc ipsa ostendunt, sanguinem in corpore concretum, coagulatumque hærrere.

Quoad vomitum cruentum spleneticorum, cujus crebriores recidivas, & inde metuenda plurima mala, remonent optimè *Alia*, & hinc *absinthium*. Ad talem sanguinis vomitum, in quo copiosiore aut æger tandem deficit, aut viribus



hūc licet reſumtis, in incurabilem aſcitum delabitur, à talibus periculis *abſinthium* agrum vindicare poteſt; ſi à vomitu reſectis, & utrunque reparatis viribus, multo tempore, quocunque libuerit modò uſurpetur, inquit *Dodonæus in hiſt. ſtirpium* p. 24. & *in obſ.* p. 47. ſuo conſilio huius uſu quosdam ſervatos meminit.

Præmittenda tamen, aut ſubindè ſocianda erunt *ſtrialia*, pro curâ magis tutâ ac fida. Externè ad vomitum cruentum ſentum ex *theriac. cum croco acorub. idæi* irroratum convenit ex *Höchſtet. dec. 2. caſ. 5.* vel panis toſtus, cui in *ma'vatico* vel *aceto intincto* ſit adperſus *caryophyll.* ⚭. autore *Harim. Prax. Chymiatr.* p. 177.

Præter vomitum variorum excretorum, non rarò etiam ebulliunt præternaturaliter in ſtomacho contenta varia, unde percipitur *Dolor & Ardor Stomachi*, quaſi copioſi fumi ſulphurei per gulam adſcenderent, malum hoc à primaria paſſione dicitur *ardor ſtomachi*, iis verò, qui germanizant, *Soda* vocatur. Cauſa eſt ab acido efferveſcente vitioſo cum quodam ſalino oleoſo. Salinum enim ſive alcalinum & acidum, dum efferveſcunt, acorem inducunt, quicquid major, quod plus olei vel ſulphuris adjunctum eſt. Unde ii, qui ſunt *vacundi*, à quibus promtè acrior bilis ex duodeno in ventriculum regurgitat, obnoxii ſemper huic affectui, propter efferveſcentiam bilis cum acido ſtomachi, tunc temporis vitioſi, obortam. Item *hypochondriaci* plures, ſi aſſumunt *dulcia*, in ſpecie *mel-lita*, aut *ſaccharata*, hunc ardorem incurrunt, quoniam *dulcia*, efferveſcendo & acorem nimium contrahendo, facilè has excitant turbas, imò etiam *aromatica & acria*, v. g. *allium & cepa* aſſumta copioſius, efferveſcendo cum acido, non rarò *Sodam* inducunt.

Facilè huic occurrimus, modò temperemus acrimoniam humorum efferveſcentium, aut invertamus acidum vitioſum per *abſorbentia*. Conveniunt igitur *lapilli cancrorum*, ebur uſt. *bolus Armena*, *corallia præpar. lapis carphon. cryſtall. præpar. Lac. Dæ.* ſpeciatim *creta*. Hinc morſuli ex *Creta Mynſ.* ſunt expertiſſimi. Quibusdam uſitatum eſt, *lateres pulveriſatos* propinare, qui potentèr præcipitant quamvis in ſtomacho efferveſcentiam. *Siligua ceracea* comeſta eſt egregia. *Syrupus ex ſummit. quercus*. Item *album græcum* ſive *ſtercus canis* oſa rodentis &c. *Portulaca* item ejuſque ſuccus & ſyrupus, aut ipſa planta recens comeſta experta eſt. Item *lapis prunella* in aqua *Sambuci* diſſolutus. Item *cremor Tartari* ad ʒſſ. datus, quo ardor ventriculi jam deſperatus fuit ſublatus. Conf. *M. A. N. C. Anno 3. p. 386.* Quod ſi temperata ſunt contenta, & ſedata efferveſcentia, evacuanda veniunt per decoctum aut infuſum

*Tamarindorum*, vel per uſum *rhæbarbari*,  
aliorumve ſimilium.



De Cardialgia.  
CAPUT VII.

De

CARDIALGIA seu CARDIOGMO.

**N**otum est, Ventriculum ex se nullo sensu nullaque molestia corpori esse molestum. Ceterum non raro contingit, ut in præcordiis, hoc est, ut explicat *Fernelius l. 4. de febb. c. 10.* regio circa ventriculum, diaphragma, jecoris cava, lienem, pancreas &c, in specie ventriculus, ejusque superius orificium, adeoque in eâ regione, quæ costis nothis, anteriora versus ad sternum se inflectentibus, circumscribitur, non raro sint *anxietates*, non raro dolores, ægris admodum difficiles, & quidem si ægri conqueruntur de quadam circa præcordia sive ventriculi regionem angustia, sive non explicabili molestia illius loci, unde inquieti sunt, & hinc inde se movent in lecto, dicitur in specie

*Anxietas.* Sin vero dolor sit, qui in ista regione vehementer affligat, & cum ægri intento digito monstrant in fovea istâ, quæ dicitur scrobiculus cordis, se pessimè habere, vocatur *Dolor Stomachi*, seu *Cardialgia*. *Anxietates* illas optime illustrat vomitus imminens ab assumpto vomitorio, qui uti maximè anxios reddit ægros. *Es ist ihnen alles zu eng; es ist wie Himmel und Erden auff ihnen legen; es will ihnen das Herz abdrücken; es sey eine rechte Todes-Angst.* *Cardialgiam* vero repræsentant dolores illi, qui post deglutitos grandiores bolos, aut duriora assumpta, nos sensibilissimè & interdum atrocissimè affligunt, *das Magendrücken.* In utroque casu malum semper oritur ab affecto plus minus orificio ventriculi sinistro. Præsupponenda nempe hic sensibilitas hujus orificii, & inde nata proclivitas ad sui contracturam, variosque spasmos. Conveniunt adeoque, & differunt *anxietates & cardialgiae*, illa quasi vagæ; hæ fixæ. Illa simpliciter ab irritante subindè, non commodè explicabili molestia: hæ à convulsiva constrictione. *Anxietates* istas dico *oriri* omnes, quibusvis in morbis simpliciter ab affectis præcordiis, seu speciatim vetriculo, uti non solum ostendunt angustia ista, quæ vomitum præcedunt, sed & mulieres hystericæ subindè de gravissimis anxietatibus, *von grosser Herzens-Angst* conqueruntur; In quibus simpliciter esse affectum orificium stomachi superius, testantur ructus subindè supervenientes, à quorum eruptione sensibile levamen percipiunt. *It. in febr. v.g. intermittentibus*, nunc præcedunt, nunc in ipso paroxysmo affligunt anxietates multiplices, quæ quod sint ex stomacho, confirmatur ex eo, quod à frigido potu ordinariò insigniter exasperantur. *In febb. malignis* gravissimæ anxietates, quæ frequenter affligunt ægros, itidem reverà sunt ex præcordiis. Et si enim sudor videatur levare in talibus malum, tamen reverà in stomacho est, & cessante sudore redeunt, nempe suppresso sudore effluvia ista, quo insensibiliter

aur



aut sensibilibiter alias diffantur retenta, affligunt præcordia & membranofas earum partes; undè anxietates. Parili ferè ratione atque in Diarrhæis, quo copiosiori diaphoresi gaudet corpus, eò minor erit Diarrhæa; sed quo minor est diaphoresis, eò copiosior alvi fluxus. Porro esse anxietates ex præcordiis, ostendunt gravissimæ istæ præcordiorum angustiae, & subinde lethales anxietates, cum hypochondriorum extensione, præcurrentibus lipothymiis, sudore frigido, &c. quæ superveniunt interdum contorsioni vertebrarum. Hinc est, quod ii, qui cenâ largiori se replent, noctem insequentem inquietam patiuntur, dum hinc inde se jectigare ob anxietatem coguntur, saltim propter stomachum, ex nimia repletione malè affectum. Certe ergo esse possumus, quotiescunque ægri vel anxii sunt, vel de anxietatibus conqueruntur, *es seythen so angst und bang umbs Herz*; semper vitium esse in ventriculo, speciatim sensibilibissimo ejus superiori orificio.

*Causæ*, quæ anxietates tales pariunt, sunt nunc manifesta acriora, vel stomacho hostilia assumpta, ut Mercurius sublimatus, Arsenicum, *lac coagulatum*, *fungi*, &c. nunc *alimenta* sub digestionem corrupta, ut *fructus horæi*; vitiosa nunc contenta peregrina, ut *status & humores aruginosi*, nunc *fermenta* aliunde suscepta, ut in peste, morbisq; contagiosis, nunc ipsi ventriculo impressum vitium, *inflammatio*, *eschara*, &c. nunc nervorum vitia convulsiva, orificium ejus, aut membraneas partes vicinas inficientia, ut in supra dicta *vertebrarum contorsione*: Pro quarum causarum varietate etiam cura hujus symptomatis subinde varianda est, tam in *morbi primarii* medela, quam *Symptomatis urgentis* interdum per *opium* mitigatione.

Quoad *Cardialgiam*, regio stomachi, præsertim in scrobiculo cordis, Veterib<sup>9</sup> vocata fuit *xagdia*. Quæ vox, utut propriè significet *Cor*, at quia exinde lipothymia, sudores frigidi, ac plura subinde symptomata oriuntur, propterea vocarunt hunc dolorem *Cardialgiam*, quasi dicere velint, *dolorem Cordis*. Et quidem dolor iste hujus loci admodum molestus, ac subinde, propter symptomatum gravitatem, toti corpori funestus est. Propter quam causam & *Helmont*, statuit, ibidem sedem esse animæ & duumviratum, hoc est, conspirationem Lienis cum Stomacho, ceu sede animæ, cujus duumviratus jus se extendat ad quasvis operationes animales. Nobilis pars est hic locus affectus: nam leve vulnus, si attigerit hoc orificium sinistrum, ferè est lethale: imò ex pugno, ibidem stomacho violenter inflicto, subortam mortem notat *Bartholin. Cent. 2. hist. 34*. Observandum autem, hanc *Cardialgiam* sive *stomachi dolorem* non semper affligere in parte epigastricâ sive anteriore abdominis, quin potius etiam sæpius è regione ventriculi dorsum affligat, circa ultimas vertebrae pectoris, imò sequitur subindè *Cardialgiam* dolor œsophagi, ita ut dolor talis sæpè intra scapulas sursum adscendere videatur. Interdum etiam in collo compressionis sensum in-



fert. Utinon solum hoc saltem rectè annotat *Forestus l. 16. obs. 27.* sed etiam observavit *Thonerus obs. p. 136.* Interdum gravior *Cardialgia cum colicâ* confunditur & contra, uti hoc refert *Schenckius obs. lib. 3. de Medicis deceptis*, qui pro ventriculi dolore coli cruciatum curârunt, qui error ex auxilio per clysterem patefactus fuit. Examinetur saltem exactè locus doloris affligentis: Nam ut plurimum magis sursum versus protenditur dolor in *Cardialgia*, qui in *colica* magis deorsum versus juxta lumbos vel renes descendit, & rarò etiam sola affligit *Cardialgia*, quin si paulò atrocior fuerit, horrenda infert Symptomata. Hinc *Amat. Lusit. cent. 1. cur. 20.* gravissima & ferè *epileptica symptomata* ob dolorem oris ventriculi, à *bile præsina* evenientem, nata observavit. Frequenter *imminentia deliquia, faciei livor, sudores frigidi* superveniunt, ægri interdum quasi *exanimati* jacent, interdum ex doloris acerbitate se mirè jectigant, nescii ferè quid agant.

*Causa proxima Cardialgia* est læsio insignis orificii ventriculi sinistri, qua ratione partis, sensilissimæ ratione nervorum ac spirituum animalium insigniter affectorum, facile totius microcosmi œconomia turbatur, ac gravia symptomata oriuntur, interdum totum genus nervosum in consensum trahitur. Quicquid ergò lædere potest orificium ventriculi sinistrum, dat causam huic malo, sive id fiat per *essentiam*, sive per *consensum*. Per *consensum* v. g. in *nephritide*, item in *contorsione vertebrarum dorsi*. Per *essentiam* verò, vel ipsius stomachi aut partium vicinarum subest vitium, vel in stomacho contentorum, & horum vel intus genitorum, vel intrinsecus assumptorum. In specie quoad *contenta*, ceu frequentiores *cardialgiae* autores frequenter sunt *status*, præsertim in ventriculo vacuo oberrantes. Hi namque ex potenti utriusque orificii strictura inclusi, insignes anxietates ac subinde *cardialgias* inducunt. Symptoma hinc tale frequens est *hypochondriacis* ac *hystericis*, in specie, si corripiantur *febre* quadam *intermittente*. Tunc nimirum in *principio paroxysmorum* talia mala se offerre solent. Semina flatuum sunt excrementa quæcunque in stomacho stabulantia, inter quæ primarium locum obtinet *pituita acida*, seu spontaneo motu effervescentiana flatulentam concipiat, sive occasione *bilis*, nec non *succi pancreatici* vitiosè effervescentium, & nonnihil per pylorum regurgitantium status nascantur.

Porro *contenta porracea*, à colore viridiusculo sic dicta, crudelissimas anxietates, & gravissimas *cardialgias* inferre solent. Oriuntur partim ex corruptione assumptorum sub digestionem, partim transmittuntur ex intestinis, in specie duodeno in ventriculum, quando nempe *pancreatica lymphæ* aut *biliosus succus* sunt inquinati, aut plus minus vitiiati, ex horum tam solitaria, quàm simultanea cum chylo miscela varii humores diversarum proprietatum solent generari, in specie in bile porracea & æruginosa peccat acidum, plus minus simul vitiosè austerum, ex quo cum bile amara concrevit liquor ventriculo inimicissimus, indeque anxietates,



xietates, cardialgias, choleram morbum, &c. inferens, seu per se vitata extiterint talia contenta, sive occasione vitiorum fermentorum ad motus, & excretiones præter naturales concitata fuerint.

Quoad *assumpta*, & hæc *vitiosa* similiter cardiacam inferre solent. Sic ex esu nimio *casei* inducta fuit cardialgia gravis; Ex *lacte coagulato* itid. gravissima cardialgia non raro observata fuit. *Conf. Amatus cent. 6. obs. 56. item Forestus l. 18. obs. 13.* Sane lac tale in stomacho coagulatum, venenis assumtis similia infert symptomata, unde & inter venena lac coagulatum à quibusdam relatum fuit. Sic *Rhod. cent. 2. obs. 72.* refert cardialgiam gravissimam ab hirudinibus, naribus pro hæmorrhagia artificiali applicatis, per nares & gulam irrepentibus, erudelem cardialgiam inductam, aquâ tamen salutâ propinatâ curatam fuisse. Parili nempe ratione interdum hirudines hæmorrhoidalibus applicatæ anum ingrediuntur, & gravia inferunt symptomata, mediante tamen clystere, ex aquâ salutâ denuò evocantur. Alia variè deglutita, v. g. arsenicum, scarabeum, anguillam vivam, cochleare, cardialgiam inferentia, vide apud *Platerum in observationibus.*

Quod ipsum attinet *ventriculi aut partium vicinarum vitium*, cardialgiam inferens, varium admodum esse potest. Sic *Hildanus cent. 3. observ. 20.* observat dolorem ventriculi, primò levem, hinc gravissimum, cum dolore capitis, tandem vagè omnes corporis partes vicissitudine mira affligentem, lethalem. In aperto cadavere *ulcus cavum magnum, & foetidum circa orificium ventriculi sinistrum* fuit inventum, non secus ac *Riverius cent. 1. observ. 90.* notat ventriculi dolorem diuturnum lethalem, ubi aperto cadavere, inventus *scyrhus, pancreas, mesenterium, jejunum & pylorum occupans.* Pertinent huc suo modo, & *luctus, mœrores aut diutina tristitia* ad cardialgias contumaces disponentes, qualia exempla videantur in *Plateri obs. p. 15.* Sic ex luctu ob mortem dilectorum, ex mœrore ob amissum processum judiciale, ex molestia ob vim pudicitiae clam illatam, cardialgias natas dicto loco recenset *Platerus.*

Tandem utut vagum sit symptomata cardialgia, interdum tamen periodum observans; quâ ratione dolorem alternis diebus affligentem notat *Bartholinus cent. 3. hist. 30.*

Cardialgia ex se leve malum est; si tamen sit atrocius, & diutius protrahatur, non contemnendum venit propter periculosa, quàm alias superveniunt, symptomata, unde magis periclitantur in cardiaco hoc affectu, qui os ventriculi admodum sensibile habent; it. qui raræ aut teneræ sunt texturæ, in talibus nempe, vel etiam in altis, si in cardialgia frigeant, aut lipothymia, aut syncope, aut convulsiones superveniant, res periculo non caret. Sic in febribus, præsertim acutis, tam benignis, quàm præsertim malignis, dum ægri de æstu insigni circa ventriculū, vel quæ alias dicitur *toda*, aut etiam de vera cardialgia conqueruntur, res meritò suspecta, ut



cta, ut plurimum admodum periculosa est. Pessima anxietas & anxiosissima cardialgia solet oriri ex bile porracea, vel æruginosa. Hinc est ista, quæ ex lacte oritur coagulato. Ista, quæ oritur ex pituita viscida plus minus acida, contumacior quidem est cæteris, minus tamen molesta, ac minus gravibus symptomatibus stipata esse solet.

In Cura inprimis *removenda causa lædens* stomachum, sive sit interna, sive sit externa: item sive per essentiã, seu per consensum fuerit. II. *Placandus est dolor*, tam appropriatis aptis, quam intermixtis opiat. Primo quidẽ *ad removendas causas* in affectu per essentiã, nempe humoralium contentorum seu assumptorum, seu intus genitorum vitia, per se planum est, quod optima sint vomitoria, ab omnibus autoribus, ubi necessaria videntur, commendata. Post vomitoria se offerunt purgantia: Sed quoniam purgantia, & ipsa ventriculo inimica, faciliẽ possunt exasperare malum, propterea convenientissimum, ut opiata iisdem addantur, quæ licet & omnes humorum excretiones sistant, indeque in hypercatharsi convenient, nihilominus tamen convenientibus purgantibus permista, hæc blandẽ & satis operari faciunt. De quo negotio videatur *Riverius in praxi, ubi de Vomitu, l. 9. c. 7. p. 415. it. de Cardialgia, l. 9. c. 10. pag. 433.* alique: *Siquidem veteres Electuarium diaphænicon ad ʒß, cum Philonii Rom. Dispropinarunt*, pro doloribus sistendis, ac alvo laxanda. Sed quoniam Electuaria talia fere sunt nauseosa, propterea alia in forma usurpanda veniunt, qualis etiam interdum in Colica proficua, v. g.

℞. ꝑi Olati, l. arcan. duplic. Myns. gr. xv.

scammon. ꝑt. gr. ij. l. iij.

laudan. opiat. g. ij.

ol. destillat. carui g. ij. M.

Vel ℞. MP. aloë phangin. c. scammon. gr. xv. ad ʒj.

Extr. troch. alh. gr. j.

laud. opiat. gr. j. ad ʒß.

c. f. q. essent. absynth. F. Pilulæ. D. S.

*Saxir- und Schmerzstillende Pillen.*

Observanda hic simul *cautela*, ut quando purgantibus admiscemus, *opiũ*, dosi purgantis respectivẽ nonnihil augeatur, ne supprimatur omnino minor purgantis dosi. Et tales mixturæ conveniunt imprimis iis, qui laborant intestinorum doloribus, aut mulieribus, quæ ex levi purgatione suffocationi uterinæ sunt obnoxia, it. qui facili, aliàs sunt solutionis alvi; it. iis, qui acidis succis abundant, ac lymphæ acriori salso acida turgent, ut scorbutici, &c. ne in talibus ex purgantis usu graviora abdominis superveniant symptomata. *Poterius* in suis observat. cent. 1. cur. 24. curavit cardialgiã, aliis omnibus irritis, per laudatissimas pilulas suas catholicas. Compositio prostat in ejusdem Pharmac. Spagica.



rica. Præcipuum ingrediens est magnesia Saturnina meteorisata, quæ videtur esse flores antimonii correcti, ita ut per inferiora saltem purgent: Magnesia Saturnina enim aliàs est Antimonium: Meteorisatio nil aliud, quàm in flores sublimatio.

Aliàs si Cardialgia oriatur à flatibus, aut exhalationibus ex effervescencia humorum in intestino duodeno, uti v. g. interdum in febribus intermittentibus, item in paroxysmis hypochondriacis contingit, conveniunt imprimis clysmata ex carminativis præsertim parata, v. g.

℞ rad. angelic. ℥ij.

fol. organ.

prunell.

menth. ana Mj.

flor. chamomill. Mss.

sem. anis.

fenicul.

dauciana ℥j.

bacc. laur. ℥ijss.

Coq. in s. q. aq. comm. & urinæ human. ana. Col. ℞. ℥ viij, adde

Elect. lenitiv.

de bacc. lauri ana ℥ss.

ol. still. anis.

fenic. ana ℥ss.

M. F. Clysma, quod vel una vice injiciatur, vel, si flatum obstitit præsentia, duplici vice adplicetur. Riverius in tali casu clysmata habet ex solo vino albo cum ol. destillat. carminativis parata.

Quæritur, an V. S. conveniat? Resp. per se nil adjumenti adfert in cardialgia delenda, adeoque quæ prostant exempla curatarum cardialgiarum per V. S. sunt potius vel casualia, uti est observatio, quam habet Riverius Cent. I. obs. 44. de dolore vehementi ventriculum & lienis regionem occupante, aliis frustraneis, V. S. curatam: vel propter alium affectum ex sanguine natum, & cum hoc suo modo conjunctum, ratione cujus phlebotomia indicata fuit, ut quando Thonerus in obs. p. 135. dolorem immanem ventriculi, aliis irritis, in plethorico, cum suspicio esset de inflammato ventriculo, subito per V. Sm. incantamenti instar, curavit. Aliàs quæ in Cardialgia conveniunt remedia, & quæ post purgantia ventriculum placant, ac dolorem sedant, sunt pro causarum ratione, vel aromatica blanda in casu, quando flatu aut similia adsunt, vel absorbentia, in bile præsertim seu recrementis porraceis, ut taceam, propria ventriculi vitia debitis modis curanda. Aromatica talia, ad cardialgiam usitata, præ cæteris sunt: Rad. enul. campan. angel. fenicul. præsertim specificum est chamomilla tam



vulgaris, quàm præstantiori cum effectu Romana. Hinc decoctum ejus egregium experimentum ad Cardialgiam, aut etiam essentia ejus ex floribus, vel cum proprio spiritu, vel cum spiritu carminativo vegetabili parata, à ʒß. usque ad ʒj. propinata. Eius etiam oleum destillat. saphyrinum commendatissimum est hoc in casu: *Act. Med. Hafn. vol. 2. p. 208. vel vol. 1. 213. Pauli Quadripart. Botan. p. 253.* In specie *Amat. Lusit. cent. 3. cur. 30.* Ulterius mentha, flores anthos & verbasci. ut cortices citri & aurantiorum, & Elix. cortic. aurantiorum, item vinum, in quo decoquitur Salv. commendata admodum à Deckero in praxi ad dolorem acrem. V. anisatus experimentum Lindani est.

Vel ℥. spirit. salis armoniaci anisat. ʒjß.

Essent. opii ʒß. M. pro 3. dosibus.

Quod si percipiatur simul ardor in regione stomachi temperatè his appropriatis temperata acida, & quæ ardorem refranant, quæ inter syr. granatorum acidorum, & præsertim ~ Qi dulcis, inprimis cum spiritu anisi dulcificatus, addenda sunt istis appropriatis

℥. aq. chamomill. ʒiij.

succ. cydon. ʒj.

elex. menth. ʒß.

ol. destill. chamom. gtr. vj.

laud. opiat. gr. iij.

syr. de canella ʒiij.

M. D. S. Schmergenstillende Mixtur auf eilich maßl. Dos. cochl. ij. vel iij.

Mixtura hæc diversimodè specificari potest. Hinc loco succi cydoneorum spiritus nitri dulcis, vel aliis in casibus spirit. sal. armoniaci, vel pro alia indicatione ~ absorbentes fixi, omnia in debita dosi, possunt addi.

Pertinent huc olea destillata, in Cardialgia subindè efficacissima. Sic Thonernus obs. p. 136. dolorem totius abdominis clamosum per ʒ. guttas olei destillati carni curavit, & solo hoc oleo à sævo ventriculi dolore curavit etiam aliam: Item ingens dolor ventriculi per intervalla, præsertim à cibo sumpto, ad scapulam se extendens, ex sympathia cum ventriculo, cujus orificium superius alligatum eprimæ dorso vertebræ, quinque guttis ol. destillati succini ab eodem curatus fuit.

Quod si oriatur dolor è contentis acerbis, acidis, perraceis & arginosis sive prassinis, commodè propinantur, quæ acidum destruant, ut sunt pulv. cochlearum marinarum, ac C. C. lap. & cryst. &c. v. g.

℥. Crystall. præparat. ʒj.

corall. rubr. ppt.

C. C. ust. ana ʒß.

laud. opiat. gr. ij. vel. iij.

M. pro aliquot dosibus.

Nempe

Nempe in  
crystallu  
cardialgia  
historiam  
cum crysta  
propinato  
lenilis do  
Exter  
Rom. &  
cataplasm

Pertinet  
circa regi  
lâ per vi  
dolores  
Se  
etiam ac  
Potenti

Sic etia  
gnissaff  
Quo  
caryoph  
Tacam  
curavit  
firmat



Nempe in tali bile æruginosa, terribilissima symptomata ventriculo inferente, *crystallus* ejusdem specificum alexipharmacum dicitur *Langio*. Pertinet huc cardialgia intensissima & periculosissima, nata ex *haustu* *Ærio sublimato*, cujus historiam & curam refert *Valeriol. l. 1. obs. 7*. Summa curæ internæ fuit facta cum *crystall*, præparat. *ʒj. theriacæ ʒij. & butyr. rec. ʒj.* in decoct. hord. q. s. propinato. Talibus scilicet obtunditur acidum corrosivum Mercurii sublimati, ac sensilis dolor ventriculi mitigatur.

Externè imprimis proficuum fuit fomentum, ex foliis hioscyami albi, absinth. Rom. & mastiche, in oleo rosato, violato, liliaceo & anethino coctis. Item cataplasma egregium anodynum:

℞. fol. hyosciam. alb. & malv. sub prunis coctarum & debitè pistatarum ana ʒij.  
farin. hord. & lentium, cum decocto malv. ad debitam consistentiam redact. ana ʒij.  
mucilag. tragacanth.  
sem. psylli  
cydonior. ana ʒij.

M. applicetur calidè.

Pertinet huc suo modo observatio *Thoneri obs. 2. f. 135*. de dolore pnnctorio circa regionem ventriculi, propinatis ʒijss. ol. anygd. d. in jure galli, & *aciculâ* per vias  $\square$  as intra 3. horas excreta, subito evanescente. Quo etiam spectant dolores similes, ex *virri frustulis* aut similibus oriundi.

*Senes* subindè doloribus stomachi gravioribus corripiuntur, ad quos, ut etiam ad alias Cardialgias cum virium prostratione junctas, egregiæ sunt *Pilule Poterii, quas habet Cent. 3. cur. 30.*

℞. Ambr. gryf. gr. ij.

Mosch.

Croci orient. ana gr. j.

Opii Thebaic. gr. iv.

M. F. pillul.

Sic etiam cura 31. diuturnum ventriculi dolorem sed continuato usu *decocti lili-gni sassafr.* curatum refert.

Quod attinet externa, hæc inter sunt imprimis *olea, chamom. destillat. macis, caryoph. item ol. stomachic. Cratonis*. Coctis externis quibusvis præferenda est *Tacamahaca*, qua sola Emplastri forma regioni applicata acerbissimos dolores curavit *Poterius Cent. 3. c. 32.* & hæctenus crebra experientia ejus usus fuit confirmatus, v. g.

℞. Tacamahac. part. iij.

Balsam. Peruv. part. j.



Liquefacta Tacamahaca subigatur cum Balsamo, & f. l. a. scutum stomachale. Est nobile remedium in huiusmodi cardialgiis.

Nec cedit Tacamahacæ *Gumm. Carann.* Easdem, si non maiores, obtinens vires. Unde *Emplastrum stomachicum de Tacamahac. Schröderi*, vel simile emplastrum Poterii circa finem *Pharm. Spagy.* hinc commodissime usurpari possunt. *Fotus* etiam externi in Cardialgia conveniunt, sive *sacculi* sicci, sive in vino bulliti, sive ipsum vinum decoctionis cum linteis multiplicatis. v. g.

℞. flor. chamom. Rom. M. ij.

Comar. absynth.

majoran. ana M. i.

sem. anisi

fanicul.

carui

dauci, an. ℥ iij.

bacc. juniper. contus. ℥vj.

Incisa & contusa includantur sacculo interpassato. D. S.

Quod si dolor stomachi & ventris sit occasione refrigerationis corporis exterioris, & inde natis flatulentis malis, conveniens est sacculus.

℞. milii tosti, M. ij.

furfur. M. iij.

sal comm. decrepit. M. j.

M. Calefiant in sacculo & applicentur.

Mulieres interdum vitio, ut putant, matricis, & ejus occasione impuritatibus injectis, contumaces dolores in orificio ventriculi superiori percipiunt, eosdem in tali calu tollit seq.

℞. Unguent. pomat. ℥ iij.

levihircin. ℥ j. M.

quibus inungatur scrobicul. cordis manè, meridie & vespere, aliquot diebus.

## C A P U T VIII.

De

### CONTENTORUM IN INTESTINIS EXPULSIONE LÆSA.

**E**Quidem tractanda prius veniret tam chyli à fecibus alvinis secretio læsa, quam succorum pancreatici & fellei effervescencia vitiosa, sed ne actum agam, videatur de his Sylvius l. ii. Prax. c. 10. & 11. Sufficiat annotasse, quosvis morbos chronicos propter cruditatem acidam stomachi vel oriri, vel saltem foveri à vitio horum duorum succorum, ac vitiosa inde chyli perfectione & separatione, Adeoque & isti morbi, qui ordinariis obstructionibus hepatis, lienis, aut mesen-



mesenterii &c. originaliter adscribuntur, revera vitio digestionis primæ, & hinc alterationis chyli in duodeno tribuendi erunt: Non secus, ac plura *mulierum circa menses vitia* radicem primam circa has partes figunt; unde, si quæ obstructions, tumores, aut similia mala viscerum abdominis in chronicis morbis subinde observantur, producta potissimum morbosa asserenda sunt.

*Expulso contentorum* in intestinis variis modis læditur. I. *Quando dimi- nitur*, ita ut rara sit, aut ad tempus omnino nulla, id quod fit in *alvi suppressione*. II. *Quando augetur in alvi fluxibus*. III. *Quando depravatur*, ita, ut contingat cum torminibus, dolore, aliisve symptomatibus præternaturalibus. Quoad

## ALVI RETENTIONEM

sive ejusdem majorem vel minorem suppressionem, *causa ejus est* vel in intesti- nis expellentibus, vel in ipsis contentis expellendis.

Quod attinet I. *Contenta expellenda*, hæc sunt *causa* alvi retentæ, quando non perveniunt ad intestinum rectum, ut idem possint stimulare, quò cessante stimu- lo, cessat alvi excretio. *Causa*, quare non perveniant ad intestinum rectum, est partim eorum *paucitas*, ex alimentis paucis assumtis; partim eorum *inepti- tudo ad motum*, unde in cellulis coli diutius subsistunt. *Pauci* sunt propter pauca assumpta; *inepti* sunt ad motum, tribus ex occasionibus. I. *Propter ex- siccationem & indurationem*; hinc est, quod in febribus ardentibus, aut in iis, qui crebriori exercitio utuntur, adeoque crebrius sudant, item in convalescenti- bus, dum uberior liquidi intra corpus fit distributio, fæces induratae, quia ex- siccatae, non possunt commodè expelli. *Assumpta* quædam itidem suggerunt fæces plus minus induratas, qualia sunt v.g. *spiræ*, quæ in magna copia assumptæ, propter visciditatem & tenacitatem suam, duriores dant fæces, indeque etiam lethalem alvi obstructionem, teste *Mæbio in Instit. p. 453*. Sic *ova ad duritiem coacta*, eadem ratione alvum suppressere solent. Pertinent huc *fructus horææ* nonnulli, tenaci *pellicula obducti*, ut *uvæ crispæ*, *uvæ vitis*, cum pelliculis come- stæ, quæ uti non digeruntur in stomacho, sed crudæ & acidæ insigniter ex sto- macho dilabuntur, contentas fæces sui permissione irretiunt, & hinc inde in glo- bos quasi cogunt, unde pertinax alvi obstructio. Præterea etiam *cerasæ*, ho- rumque *nuclei integri devorati*, fæces induratas inducunt, teste *Schenkio l. 3. ob- serv.* qui refert alvum ad tres septimanas obstructam ex copiosis cerasis cum nu- cleis comestis.

II. *Visciditatem fecum alvinarum*, ratione cujus pertinacius parietibus in- testinorum affixæ hærent, subinde impedimento est, quò minus possint excerni. Unde ii, qui utuntur copiosis viscidis alimentis, aut qui eadem in mucum visci- dum ex vitata digestionem transmutant, obnoxii esse solent alvi obstructioni. Item ii, qui subinde congeruat pituitam vitream, sive mucilaginem acidam



tenacem, unde interdum hypochondriaci obstructionem alvi incurrunt. Pertinent huc ii, qui parcè nimis potant. Item qui vitam agunt sedentariam: In talibus enim deficiente motu, minus quasi concussis intestinis, fæces retentæ pedetentim tenaciorem consistentiam acquirunt, indeque alvum clausam patiuntur.

III. Coagulata & condensata fæces alvi obstructionem inducunt, idque probabiliter ex vitio lymphæ pancreaticæ. Bilis enim & dicta lymphæ, ut separant cremorem nutritium à scybalis fæculentis; ita simul certam consistentiam excrementis tribuunt, secundum quam nunc magis, nunc minus sunt fluxilia. Unde à bile abundante diluuntur excrementa, & sunt fluxilia. A lymphâ pancreaticâ verò aut nimis acida, aut austera, fæces alvi nimis coagulantur, & indurantur. Hoc ita esse, commonstrat quædam icteri species, in qua ipsa, propter absentiam bilis in intestinis, admodum indurata & condensata solent esse fæces. Deinde plures hypochondriaci, mulieres itè hystericae ut plurimum adstricta alvo laborant, propter austeritatem nimiam succi pancreatici, quo sapore indurata fæces diutius in intestinis subsistunt. Et hæc sunt vitia, in expellendis contentis alvum plus minus supprimentia.

2. *Intestinorum vitio alvi excretio plus minus tollitur, sive quando eadem sunt nimis coangustata*, adeoque fecibus debitum non permittunt transitum; id quod fit, quando *intestina sunt inflammata*: hinc enim ordinariò alvus supprimitur. Quod si superveniat *gangræna*, malum est desperatum. Sic Barthol. Cent. 6. hist. 38. observavit Ileicoalitum, ex ejus inflammatione & gangræna, cujus causa obstinata alvi obstructio, Et Barbette in sua praxi l. 4. c. 7. lethalem alvi obstructionem notat ex gangræna coli, ubi rectè annectitur: Sic pariter *ulcus intestinorum* alvum supprimit. Conf. M. A. N. C. Ao. 2. p. 140. Pariter *excrecentia in intestino enata* alvi obstructiones infert. Vid. Rhodius Cent. 2. obs. 82.

2. *Quando intestina deficiunt in suo motu peristaltico*, ob affectionem vel *paralyticam*, vel *convulsivam*. *Paralyticam* quidem, dum resolutæ fibræ motui peristaltico sunt ineptæ, ut in *apoplecticis* non rarum est frustra, etiam clysmata tunc temporis, & sine effectu injici, propter intestina paralyti affecta. *Convulsiva* verò affectio est, quando irritatis intestinis sequitur pertinax fibrarum contractura, vel quando undecunque ipsæ fibræ spasmò contractæ exclusionem facum impediunt. Sic in *Colica* quavis, aliisque intestinorum doloribus alvus pertinaciter suppressa esse solet, fibris intestinorum ratione doloris irritatis, & speciatim plus minus contractis. Unde & verè tunc frustra acriora propinantur purgantia, lenioribus magis proficiunt, cum illa, irritandò suâ acrimoniâ, malum exasperent: hæc autem emolliendo, intestinorum sensum quasi demulcendo, magis proficua sunt. Sic Nephritici pariter obstinata sunt alvi, per consensum fibris intestinorum spasmò convulsis, unde & tormina tunc non rara sunt.

Quoad *Prognosin*, Alvi suppressio pro circumstantiarum conditione plus minus

minus per  
Licet aut  
symptoma  
semper sol  
in vulneri  
itidem m  
dum nim  
stro, ubi  
unde ibid  
lieni attri  
ex eo, q  
suum fa  
nuem, f  
notabilia  
2. obs. 95  
In C  
tarum co  
intestino  
sensibilita  
Ea, q  
cia, & h  
exulcer  
patent.  
aut hor  
lenientia  
Qua  
dul, rece  
ova sorb  
Copiosio  
maxime  
feces, A  
passulas  
unde hy  
passula  
larum l  
ctum pa  
est serv  
primis  
phlog



minus periculosa est. Contumacior si fuerit ratione ilei, mortem inferre potest. Licet autem non semper lethalis sit, pertinacior tamen graviora secum invehit symptomata, cum interdum superveniat animi deliquium, & alvus obstructa semper soleat augere capitis symptomata, ut continuò præmoneant Præctici, ut in vulneribus capitis, in cephalalgia, in melancholicis, alvus sit libera: quolibet itidem mali hypochondriaci pathemata ab alvo obstructa exacerbantur, interdum nimia alvi obstructio causa est, ut ægri malè habeant in hypochondrio sinistro, ubi colon sit angustius, & propterea intorquetur deorsum versus renem, unde ibidem locorum retenta scybala varia inferunt symptomata, ut hæcce mala lieni attribuantur, ægrique pro splenicis habeantur. Nec est, quod decipiamur ex eo, quod malum non sit in colo propter retentas varias sordes, quia purgantia suum faciunt officium; Fallunt enim, & utut educant propriam materiam tenuem, fæces tamen in intestino colo relinquuntur crassiores & viscidiores, cujus notabilia observata vid. in Senn. l. 3. p. 285. 202. Salmuth. cent. 1. obs. 24. & C. 2. obs. 98. Conf. simul Sylvium l. 1. pr. cap. 14. §. 51. p. 168.

In Cura ante omnia removenda est causa. Unde I. Ratione fecum contentarum conveniunt ea, quæ emolliunt, easque fluxiles faciunt. II. Ratione verò intestinorum ea, quæ vel eorum angustiam tollunt: vel eadem plus minus insensibilia stimulant: vel irritationem in iis, & inde natum spasmodum tollunt.

Ea, quæ emolliunt, & fluxilia faciunt, sunt  $\nabla$ osa,  $\oslash$ sa, mucilaginosæ, dulcia, & hinc gummata. Quæ intestinorum mala, vel curabilia, ut inflammationem, exulcerationem: vel incurabilia, ut coalitum, &c. levant, ex affectus ratione patent. Quæ eadem irritant, sunt acrida, tam  $\ominus$ ia, quàm specificè purgantia, aut horum instar intensè amara. Quæ irritationem sistunt, sunt anodyna, seu lenientia, mucilaginosæ & temperata  $\oslash$ sa, hinc narcotica & opiata.

Quæ dictis indicationibus satisfacit materia medica, ex internis est ol. amygd. dul. recent. expressum, ad  $\mathbb{Z}$ ij. vel  $\mathbb{ij}$ . assumptum, blandè alvum subducens, it. ova forbilia, de quibus vid. Höfer. Hercul. Med. p. 199. Barth. cent. 6. hist. 65. Copiosior potus alvum pariter aperit. vid. Barth. cent. 6. hist. 45. id quod vel maximè hypochondriacis necessarium, it. mulieribus, ut eo promptius exeant feces. Potus nunc est usitatus, nunc medicatus; Medicatio talis imprimis fit per passulas, egregium, temperativum, lenitivum, & suave laxativum remedium; unde hypochondriacis & scorbuticis tam egregiè conveniunt. Huc faciunt passulæ laxativæ, quarum descriptiones hinc inde prostant. Item vinum passulatum laxativum Timai in Ep. p. 224. Ad cujus imitationem paratum decoctum passularum cum senna aliud notum est. Post passulas imprimis egregium est serum lactis. Convenit tam in febribus ardentibus & malignis, quàm imprimis hypochondriacis & scorbuticis, si alvus horum obstructa sit, ac simul phlogosi ac æstuatione laborant: utrique scopo mirè satisfacit serum lactis, ratione



cione ☉ sitatis suæ, in alcali volatili ☉oso fundatæ, temperans egregiè & succi pancreatici vitiosum acidum, plus minus austerum saporem, ac demulcens acrimoniam ☉ is scorbutici, seu per se probè depuratum usurpetur; seu cum syr. rosar. solutiv. adhibeatur; seu in eodem parum de Tamarindis ebulliat, ut simul & saporis gratiam, & simul majorem laxandî vim acquirat. Aliàs notæ quoque sunt decoctiones ex emollientibus, v.g. ex *malva*, *parietaria*, *mercuriali*, & similibus in aqua decoctis, qualia decocta successivè hausta alvum leviunt. v.g.

℞. rad. alth. ℥ij.  
herb. malv. Mj.  
passul. min. ʒvj.

Coq. in l. q. aq. i. in fine decocti adde  
fol. senp. ʒiij. vel ʒβ.  
cremor tartari ʒjβ.

Colat. ℞. ʒviiij. ad ℥j. adde  
syr. de spina cervina ʒj. M.

Quod si *duriores feces*, aut *viscidior pituita* alvum clauserint, *gummi ammoniac*. est egregii usus, seu solitario, seu additis stimulantibus laxativis usurpetur. In graviore & contumaciori alvi obstructione notus est usus *Mercurii vivi* ad ʒij, iij. una vice, vel in sculo carnis pinguiori, vel in ol. amygd. d. propinatus. Alii commendant vinum, in quo per ☐em infusus, intercedente crebrâ agitatione, fuit Mercurius vivus, quod non tantum lumbricos enecet; d. insigniter simul alvum subducatur, si ad cochlear. j. vel ij. propinetur.

In pertinaciori alvi obstructione commendatur insigniter ☉ *fulminans* non adeo exactè edulcoratum, si à gt. vj. ad x. cum extracto helleb. nigr. in pilulas compingatur. *Conf. Rolfinck in Chym. p. 339.* Sanè in adulto quartanario, à gr. v. ☉ *ori fulminantis*, ante paroxysmum propinatis, effectum suavis laxationis observavi. *Sed observandum*, magis conducere, si non nimis sit edulcoratum, ut ☉ ina textura non nihil remaneat; ☉ *mirum est*, tam ☉ *fulminans*, quam ☉ cum ☐u ☉ is solutionem, feces adultorum etiam copiosas nigerrimo colore inficere. Aliàs in desperata alvi obstructione *succus rad. ireos recens ad ʒj.* propinatus expertus fuit teste *Schenckio l. 3. obs.* ubi de alvi obstructione. Sed cautissimus circa purgantium usum in alvi obstructionibus sis, ne præpostero horum, præsertim acriorum, usu ægri in morbum iliacum præcipitentur. Tandem *tartarea remedia*; *cremor tartari* ad aliquot drachmas in sculo calido, præsertim in quo herba quædam emolliens prius decocta fuerit, propinatus; *Item tartarus ☉-latus*, ad ℥j. cum gr. ij. scammon. præpar. acuat: item horum loco ☉ *essent. tartari* à ʒβ. ad ʒj. usurpatum, usque ad ʒij. invehic. calido.

Exter-



Externe usurpantur præsertim clysmata ex emollientibus parata, v. g. ex lacte cum melle, addito sale communi vel saccharo, aut

℞. herb. malv.

alth.

chamomill. ana Mß.

rad. lilior. alb. ℥iß.

Coq. in f. q. aq. simpl. vel feri lact. caprill. Colat. ℞. ℥ix, adde mell. rosac.

ol. lil. alb. ana ℥j. M.

Quod si ex Nephritide similive affectu alvus obstructa sit, clysteres emollientes terebinthinati perquam sunt proficui: item clysmata ex ol. oliv. vel:

℞. ol. sem. lin.

rapar. ana ℥v.

M. injice pro Clymat.

Sanè Prænotius alvi segnitiam gravem solo oleo communi bene maturo, ad ℥b. j. per clysterem injecto, levavit. Et Rulandus in thesaur. p. 233. alvum per tres hebdomadas adstrictam, ut nullis nec clysmatis, nec suppositoriis moveri posset, injectis singulis horis ℥iv olei, alvum istam emolliuit, ut multa scybala rejecta fuerint.

Quod si talibus non possit solvi alvus, alia quædam paulò acriora simul addantur & incoquantur, v. g. in suspitione induratarum fecum sal gemmæ ℥ß. ad ℥j. usque ad ℥ij. clysteribus addantur. Sic Pontanus in obstinatissima alvi obstructione clysmata ex jussulo carnis cum melle, cui addatur sal gemmæ, ℥j. commendat. His non sufficientibus, fiat decoctum emolliens ex foliis melilot. chamomill. & violarum, cujus viij. vel ix. uncis in coquenda est pulpa colocynth. in peria ligata, ad ℥j. & post hanc decoctionem addatur sal gemmæ, ℥j. benedict. laxat. ℥j. ex quibus fiat clysmata applicandum. Rulandus loco superius citato, rustici alvum, ob scybala dura constipatam cum ventre duro curavit per clysmata ex ol. sem. lini ℥v. nunc solo, nunc cum ℥ß. trochiscor. alhand. applicato. Ubi Colocynthidis non sufficit, ad infusa ℥ialia fiat accessus: si nempe Colocynthidis loco ℥i. croci metallor. decocto emollienti incoquatur, cujus usum crebriorem vid. in obs. Riverii: vel, quod magis approbo, fiat infusum ex croco metallorum, de quo ℥iij. de cocto emollienti jam facto addantur, e. g.

℞. decoct. emollient. usit. ℥v.

infus. croci metall. ℥iij.

bendict. laxativ. ℥j. M. F. Clysmata. Vel loco infusi talis syr.

emet. ℥j. ad ℥jß. permisceatur.

Post clysmata conveniunt suppositoria, quæ communiter ex sale & melle ac pulvere belleb. nig. preparantur, vel fiat suppositorium acre ex melle cum sale



*gemm. & troch. alband.* Aut etiam *frustulum aluminis* formetur in formam suppositorii, ac ita usurpetur ad imitationem *Angeli Sale* in append. p. 840. Vel *alumen pulverisatum cum gummi tragac.*, in aqua liliorum alborum soluto, compingatur in suppositorium, in alvo admodum adstricta *conveniens*. Ut autem eo melius operentur suppositoria & clysmata, medicamenta *emollientia sive lubricantia per os præmittenda sunt*, ne frustra iis irritetur alvus. Præter dicta, & *externo umbilico adhibentur linimenta*, ad concitandam vim intestinorum motricem. Sic *extracta purgantium cum oleo colocynthidos*, umbilico largiter illita alvum stimulant. Item *unguentum de aribanitia*, malaxat, cum oleo diacolocynth. alvum aperit. Vel

℞. ol. amygd. dulc. rec.  
pingued. anser.  
butyr. majal.  
unguent. dialth. an. ℥ij.  
colocynth. ℥j.  
spec. hier. simpl. ʒß.  
diacryd. gr. v.  
sal. gem. ʒß. M. F. unguent.

Tandem ex oleo populeon. & hiera picra factum linimentum, plantis pedum illitum, alvum emollit & solvit.

Quod si alvi feces in podice subsistant, ut nullo modo expelli possint, imitandus venit Platerus, qui mediante sternutatione & tussi, & fomentatione podicis cum oleo, scybalorum ejectionem promovit.

Alvus obstructa pertinacior non raro causa existit, ut per superiores vias ejiciantur excrementa, id quod fit in

## ILEO sive VOLVULO.

Aliàs *morbo Iliaco* dicto; In hoc morbo nil aut parum descendit per inferiora, & contra nauseant ægri, singultunt, & tandem per os contenta intestinorū excrementa vomitu rejiciunt; Adest simul ut plurimum febris lipyria, ubi nempe frigent extrema, interiora verò uruntur: Tormina itidem subinde crudelissima ægros vexant, & anxietates vix explicabiles eosdem fatigant: Tandem sudor advenit frigidus, convulsiones imminet, & sæpius in tali puncto mors supervenit. Et quidem imminentem ileum produnt alvus pertinaciter suppressa, intestinorum tenuium crudelia tormina, & nausea cum singultu, unde brevi post vomit⁹ supervenit, præsertim si podex adstrictus sive introrsum retractus, ita ut neq; specilli extremum, neque fistulam clysmaticam admittat, stercoris vomitus est prænuncius. Equidem & in Colica interdum analogia symptomata observantur; Quanta tamen hæc inter sit *differentia* (Nam sæpius gravior Colica pro iliaco



iliaco morbo à timidis Medicis habetur ) *vid. Senn. l. 3. prax. p. 247. ubi de ileo. Item River. in praxi l. x. c. 2.*

*Causa* hujus morbi dicitur rectè motus intestinorum peristalticus inversus, ita ut revera id, quod in ventriculo est vomitus, hoc in intestinis est morbus Iliacus; quando nempe incipit talis inversio motus peristaltici in quodam loco intestinorum, in specie in fine Ilei circa principium coli, ubi propter valvulam frequentior est sedes ilei morbi, Iliacus affectus est. Unus est continuus tractus ejusdem substantiæ membranosa similiter contexta, à summitate gulæ, usque ad extremum podicem, textura nempe membranacea, fibris circularibus nervis contexta, quæ nunc est angustior, nunc amplior: Amplior, dum stomachum; angustior, dum gulam & intestina efformat. Unde sicut in statu naturali unus continuus est motus, à summitate gulæ usque ad podicem, quo injecta motu peristaltico naturali protrudantur: Ita si quodam in loco invertatur hic motus, ut fiat contrario modo sursum versus, sit excretio contentorum per superiora, quæ excretio interdum est vomitus, si incipiat motus peristalticus inverti à pyloro: interdum est cholera, si incipiat inverti motus circa insertionem ductus pancreatici & choledochi: interdum est ileus morbus, quando incipit motus inverti in ileo, sive reliquis intestinis. Nam interdum podex seu extremum intestini recti est locus, ubi incipit talis motus inversio, qua ratione non tantummodo clysteres alvo injecti, sed & suppositoria per os suæ ejectionis. *Frequentius tamen in ileo magis convulso, & in quo magis viget motus peristalticus, sedes hujus morbi esse solet, speciatim eo in loco, ubi inseritur intestino colo.* Revera igitur ileus complicatus affectus est ex motu intestinorum inverso, & alvi obstructione, adeo, ut quicquid motum naturalem peristalticum sistere, vel plus minus impedire, & contra irritando ad motum præternaturalem inversum cogere potest, causa sit ilei, & vice versa. Sequuntur etiam hæc duo se mutuo, & nunc ex alvo obstructa irritantur intestina, ut ex contractura fibrarum sequatur inversio motus; nunc ex irritatione contrahuntur fibræ, sicque tollitur naturalis intestinorum progressivus motus, & contra præternaturaliter sursum invertitur eorum actio.

*Pars affecta sunt intestina, primario quidem eo in loco, ubi motus incipit inversio, qui est varius, frequentior finis ilei & principium coli. Sistitur naturalis motus nunc vitio contentorum, nunc vitio intestinorum; illorum collectorum sive retentorum induratorum, intestina infarciuntur; horum vel inflammatorum, vel gangræuatorum, vel ingressorum mutuo, vel coarctatorum, vel ulceratorum, vel hernia translocatorum, vel convulso &c. His nempe causis quibusvis irritantur intestina, plus minus sistitur motus contentorum deorsum, unde alvus obstructa, & provocatus motus contentorum sursum invertitur, unde ileus morbus.*



*Causa occasionalis* motus talis progressivi sive peristaltici inversi est irritatio quaecunque intestinorum in certo quodam eorum tractu, ita quidem, ut intestinum irritatum non possit benè deorsum versus se movere, siquidem irritatum in quodam loco intestinum naturaliter successivè magis magisque & item quasi deorsum versus istud deprimere solet. Ubi verò ex quacunque causa protrusio hæc irritantis versus inferiora impediatur, & nihilominus irritationis molestia continuetur, provocato hinc fibrarum spasma, sursum versus promoventur naturaliter contenta.

Ex dictis hæcenus plana sit natura sic dicti volvuli, sive Iliaci morbi, nempe rationem ejus formalem morbosam consistere in motu intestinorum peristaltico inverso, quem insequuntur cætera symptomata, speciatim excrementorū vomitus. *Causa efficiens prima* est spirituum animalium impetus, motum istum concitans. *Causa efficiens remota vel occasionalis* est partim pertinacior irritatio spirituum animalium, motum provocans, partim quaecunque remota, naturalem fibrarum deorsum versus motum impediens. In specie causæ hæc occasionales tam irritantes, quàm alvi obstructionem inferentes, sunt variae: Præter istas causas, quæ in superiori capite alvi obstructionem inducunt, & quæ, graviores factæ, ad hoc Milerere mei plus minus disponunt, notandum, *Herniam tam intestinalem, quàm umbilicalem* frequentissimam hujus mali matrem. Deinde *scirrhus & ulcus canerosum* in cæco, quod ileum oppleverat, ut nihil ad columnam penetrare possit, iliacam passionem infert, teste *Hildano cent. 1. obs. 61.* qui citato loco *præcipuam Ilei causam asserit constrictionem & coarctationem ilei circa* *intestinum cæcum*, cui non refragatur observatio *Fontani in Consil. & Respons. p. 84.* qui notat iliacam passionem lethalem, in qua, inspecto corpore sine ullo volvulo, circa intestinum cæcum apparuit *materia indurata lapidosa* intestinum extendens, & ita adherens, ut extrahi non possit. Hinc *Zacut. Lusit. ilei* rationem in obstructione consistere asserit. *Assumpta austera & similia* pertinaciter alvum ocludentia etiam huc faciunt. Hinc eum *ex usu malorum cydoneorum* observavit *Zacut. Lusit. l. ultimo Prax. n. 2. obs. 2.* curatum, aliis irritis, *stercore vaccino recenti*, toti abdomini ter illito: Idem loco cit. *dolorem iliacum*, ex fecibus induratis, *ob esum copiosum avellanarum*, per balneum oleagineum, & epotam omentarietini liquefacti *H. j.* curatum. *Pariter l. 2. Med. Princ. Hist. 97. obs. 16.* ex *pyrorum crudorum* ingurgitatione nimia obstructis intestinis *volvulum* observavit. *Forestus l. 21. obs. 23.* describit Ileum ab arsenico sumto per *ol. amygd. d.* concitato vomitu curatum. *Ulcera pariter intestinorum* pariter huc pertinent. Hinc recte *Kerckring spicileg. obs. 42.* iliacam passionem, interdum ab ulceribus intestinorum cum inflammatione potius, quàm eorum in-torta convoluzione oriri asserit.

Ulteriori itidem considerationi relinquo, quod *Peyerus de intestinorum glandulis*



*dalis* p. 79. affirmat: Interdum *lympham*, in plexu quodam glandularum intestinalium *austriorem & stypticam factam*, pertinacem stricturam efficere posse. *Panarolus in Pentecost. 2. obs. 50.* quatuor volvuli habet species, secundum varietatem differentes. I. Ex hernia. II. Ex convolutione intestinorum. III. Ex adstrictione Ilei ad instar farciminis lucanicae. IV. Ex descensu intestini unius in cavitatem alterius. Consideremus has causas. *Ista de convolutione intestinorum est falsa*: Quamdiu enim adhærent Mesenterio, impossibile est talem intestinorum convolutionem dari, demonstrante hoc ipsum *Helmont. Tr. de flatibus*; unde & nata hinc appellatio Voluti est minus congrua. Nec quemquam offendat, quod hinc inde apud Authores, etiam *Barbettum* fiat mentio intestinorum convolutorum, per anatomen in iliacis observatorum. Nam arbi-  
tror, subesse tum semper gangranam intestinorum, in qua corrugari invicem, ac complicari solent, & ita apparenter convolvi videntur intestina. Hinc *River. cent. 3. obs. 26.* notat passionem Iliacam lethalem, in qua ileum tribus complicationibus convolutum & complicatum, & quasi compactum in unam massam circa finem illius, & tota hæc portio gangrena affecta erat. Verum descensus intestini unius in alterum est satis frequens, & à *Sylvio* aliquoties observatus. Vid. l. 1. *Pr. c. 15.* Causa ejus nunc sunt flatus, nunc nimia ægri & inordinata commotio. Hinc nunc superior pars intestini descendit in inferius; nunc inferior pars ascendit in superius: Et sanè *ingressus hic mutus intestinorum est una ex frequentissimis ilei causis.* Ejus fiendi modum oculariter observavit *Peyerus de gland. intest. p. 83.* Inflammatio intestinorum, & hanc sublequens gangrena, corrugans intestina, *lethalis ilei est causa.* De cætero rarum est, quod refert *Schenckius in suis obs. l. 3.* Ileum interdum esse *contagiosum*, non secus quod *Amat. Lusit. cent. 7. cur. 93.* Ilei epidemici mentionem facit. Nec minus curiosum est, quod *Forestus l. 21. obs. 19.* refert *ileum periodicum*, tertio quovis die recurrentem, idque ex *Dodonæo*, cujus obs. vide in *Schenck. obs. 3. lib.* Aliàs in Jamaica insula *ileus est malum endemicum*, in quibus intestina se mutuo subintrant, Auth. *Barthol. cent. 4. Ep. p. 529.* Plures volvulorum causas vid. in *Bart. cent. 4. Ep. p. 542.* Ex supra dictis notum est, pertinacem ut plurimum alvum in Ileo esse causam, Fæ tamen interdum, ut observat *Rhodius cent. 2. obs. 79.* ut etiam in Ileo lethali, tandem *ante mortem alvi excretio superveniat*, quæ tamen malum potius est signum, nempe deficientis facultatis animalis, sive spirituum animalium, unde non amplius tam fortiter contrahantur intestina, sed hæc flaccida facta, toties antea irritata, facile excernunt, vel potius prolabi sinunt excrementa.

In *Prognosi* omnis ileus est periculosus, & peracutus affectus. Is, cui etiam *stercoris vomitus* supervenit, ut plurimum exitialis, & à quo pauci convalescunt. Si tamen ex hernia superveniat vomitus, non adeò desperatus est, quàm si ex aliis causis, vid. præter *Sennert. ubi de ileo p. 248. M. A. N. C. Ann. 2. p. 370.* Vol-



vulus mortis imminens signum exhibet, si superveniat *surditas*, teste *Sagona in decis. 24. pag. 62.* In ileo ex inflammatione & gangrana nato res desperata est. Ileus ex *Hernia* nunc plus, nunc minus periculosus, non secus ac iste, qui ex *scybalis induratis*. Qui ex *mutuo intestinorum* ingressu, est curabilis, si ingressus fiat per ascensum: sin vero per descensum, est incurabilis, teste *Sylvio*. Ex usu *opiatorum* succedens quies atque somnus, & doloris remissio, salva res est; si vero non, desperata. In ileo dolor iste acutissimus subito sine causa manifesta deficiens, gangranæ signum. Facit huc *aph. 10. Hippoc. sect. 7.* Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut desipientia, malum. *Arabes 5. gradus Ilei conscribunt:* 1. Periculosissimus is est, quando stercus vomitur. 2. si sudor ex toto sit foetidus. 3. cum spiritus, qui respiratione emittitur, est foetidus. 4. cum ructus est foetidus. 5. cum per alvum crepitus foetidus exit. De huiusmodi Iliacorum foetore conf. *Panazol. Pentec. 3. obs. 16.*

Cura consistit in eo, 1. ut irritatio intestinorum sistatur. 2. ut excretio contentorum naturalis, quacunque ratione promoveatur, unde prout causa irritans varia, & prout multipliciter alvus sisti potest, varianda subinde specialis cura.

In genere, quoad multiplices istos scopos, *tria urgent dubia*: I. An opiata convenient. II. An purgantia, & qualia conducant. III. Quæ horum præmittenda, seu legitima horum administratio. *Opiata* quod attinet, sistunt quidem irritationem, sed simul impediunt alvi excretionem: propterea considerandum est, quod magis urget, nempe si magis affectum inducat irritatio, præmittenda sunt opiata, & hinc subjungantur, quæ alvum stimulant, & feces educunt. Sin vero ex obstructione, undecunque orta, natum sit malum, hæcque adeo magis urgeat, præmittenda sunt, quæ alvum aperiunt, & subjungenda opiata, ad irritationis & motus inversi memoriam quasi tollendam, aut recidivam præcavendam. Deinde, quando omnibus aliis irritis, aut propter continuum vomitum nil intromitti possit, perpensis omnibus circumstantiis, ad compescendum stomachi furorem propinetur, non tamen expectetur, donec vires deficiant penitus, sed his utcumque robustis opium usurpand. Porro in spasmio intestinorum, à eo acri scorbutico, nervos aut fibras eorum inficiente, ad illius remissionem usurpari possunt, ut remittente spasmio, alia abstergentia aut evacuantia eo melius operari possint. Tandem in inflammatione intestinorum fugiantur, ne ad gangranam hæc disponantur. Confer quoad opii in Ileo usum, *Wedelium in opiolog. p. 120. It. in M. N. C. Ann. 2. p. 340.* Quoad purgantia. In ileo fortiora talia, aut etiam leviter stimulantia per os exhibita non conveniunt, nisi ubi jam sedata est omnis irritatio, & hinc motus intestinorum inversus. Subsistente enim irritatione, & durante aut imminente vomitu intestinali, purgantia & lenia & fortiora, semper evadunt vomitoria, malumque non leniter exasperatur. Unde rectè



rectè dicit *Sydenham Tr. method. curand. febres p. 68.* Non applicanda esse purgantia, nisi prius corroborato ventriculo, atque adeo ad motum naturalem deducto. Atque hæc imprimis de stimulantibus per os intelligenda sunt. Quæ enim clysmatum forma &c. injiciuntur, tutius usurpantur. Et in genere fortiora purgantia minus conveniunt; sed potius saltem laxantia. *vid. Dravvix von dem Schmersmachenden Scharbock/ p. 562.* Præter dicta, pro meliore observatione observandum. 1. Licet periculum præsens vitatum sit, metuendum tamen, nisi sequatur multa excretio, & revocetur omnino motus humorum deorsum, qui sursum ferebatur, non extra periculum esse ægrum. Nam quia totus venter inferior commotus est, non prius securitas concilianda erit, quam sequatur alvi profluvium, aut sponte, aut per artem provocatum. Unde mortui sunt nonnulli incuria ista, de quibus Medicus jam securus erat; ut dicit *Ballon. l. 2. conf. 24.* 2. In hoc morbo ægri laborant summa virium prostratione, & non raris animi deliquiis, uti & sudore exolvente seu colliquativo: Si quidem a fœtore plus minus inficiuntur spiritus, propterea Medicus semper cum theriacalem, cum vel sine camphora, aut vinum generosum, aut aquam cinamomi, præsertim propter ventriculi labem adhibere debet, aliisque permiscere, ut viribus simul consulatur. 3. Ubi stercora dura sunt, nil præstantius, quam emollientibus clysteribus primo educere. Nam si diu nimis expectent ægri sine præsidio, & stercora postmodum per superiora ejiciantur, raro, vel cum magna difficultate evadunt. Testantur hoc non solum curæ *Foresti. l. 21. obs. 22. & seqq.* sed etiam rustica, quæ cum per 5. aut plures dies ex ileo omnia per superiora rejiceret, nec quicquam retinere posset, clystere emolliente injecto servata est. In ipso morbo ægri vident frigida; quin calida intus & extra usurpentur. Omnis potus frigidus fugiendus, sed calidis ventriculus demulcendus. Jam convalescentes, tanquam puerperas tractabis, ne sese aëri frigido exponant, nec in victu peccent, &c. Quin in & post affectum victus tenuis ordinetur, ut non nisi cochlearia aliquot jussculi ex pullo gallinaceo sorbenda usurpentur: quando & ad motus externis studiosè se à frigore præservent ac defendant. Quæ igitur conveniunt in hoc morbo, ratione quidem alvi clausæ, sunt clysteres abstergentes, & emollientes, quos ex vino, urina pueri, & seminibus carminantibus paratos commendat *Zacutus.* Emollientia simplicia, & ex his parata & cocta, it. ol. lini, raparum, &c. clysmatis instar usurpanda, sunt cognita. *Ruland. in Thesaur. pract. p. 232.* qui vulvum periculosum curavit clyst. ex ol. sem. lini ꝑvj. troch. alhand. ꝑjß. parum bulliant; Hæc bene inunxit umbilicum, reliquum injecit; excretis copiosis, hoc solo curavit. *Riverius* commendat decoctum intestinorum & omenti vervecis, in quo butyrum & parum salis gemmæ dissoluta fuerunt. Quod si inflammatio intestinorum adfit, *Lindanus* adhibendum svalet clyσμα ex decocto *hordei, cum o. o.* Quod facit clyσμα *Zacut. l. 2. Med. Princ. 97.* de iliaco morbo cum



cum vomitu stercoreum, per clysterem ex oleo, cum ruta &  $\phi$  decocto, curatur. Ubi vel motus peristalticus inversus jam incipit in intestinis crasis, aut ab ipso podice, omnia injecta raro scopo satisfaciunt; quin tunc adhibeantur simul internè juscula emollientia, acrimoniam plus minus temperantia, & blande abstergentia, ut juscula gallinacea cum chamomilla decocta. Vel oleum com-mune, aut ol. amygd. sed recens ad  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . assumendum. Raparum decoctum, tam crudarum, quam prius assatarum, copiosius haustrum est laudatum; nec minus succus pomorum Borsdorffensium putridorum, mirabilis est in tali iliaco-rum casu. Conf. M. A. N. C. Ann. 6. p. 153. Et sane observavi in quodam iliaco, quod post injectum clyma, nempe

$\mathfrak{z}$  ol. rapar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

lini  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

diacolocynthid. Querc.  $\mathfrak{z}\text{vj}$ . M. pro clymate; idque sæpius repetitum, cum simul bina poma Borsdorffiana rasa comedisset, copiosi secessus fœtidi cum flatibus inde fuerint depositi. Sic in muliere, ex Bubonocèle utriusque lateris, cum gravissimis alvi torminibus, ac imminente ileo propter spasmus intestinorum, me frustra plura tentante, nihilominus ventula accedens, applicatione pulpæ pomorum Borsdorffianorum putridorum cum paucis croco, & super totum abdomen instratione, mulierem levavit, & alvum referavit. Quod si hæc non sufficiant, in pertinaci alvi clausura conveniunt globuli sclopetorum deglutiti, sed præmisso imprimis usu ol. amygd. d. expressi, ut hujus medio quasi lubricentur viæ. Commendat hos Helmont. de flatibus §. 31. qui fiunt ex amalgamate  $\mathfrak{z}\text{ij}$  &  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . vid. Velschium Hecatoft. 2. p. 19. sed notandum, quod conveniant hi tantum globuli, quando à fecibus remota-rantibus; vel quando ab ascensu intestini inferioris in superius oritur malum. Quando vero descendit superius in inferius; vel quando adest inflammatio, minus conducunt. Rarum est, quod ileus ex omphalocèle per dictos globulos curatus fuit, Auth. Velsch. l. c. sic Zacutus lib. 2. Prax. admirand. observ. 27. pilis plumbeis parvis primo 12. post 18. devoratis, ileum desperatum curavit, ex nimia castanearum crudarum ingluvie, ac fecibus inde induratis natum, sed usum horum globulorum superat Mercurius viv<sup>9</sup> copiosè ingestus. Refert Lindan. loc. sup. cit. iliacam passionem Mercurii tandem ope curatam, postquam tres bombardæ globi sine auxilio devorati fuissent. Usus Mercurii est, ut ad minimum  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . vel  $\text{iiij}$ . assumas, applicando simul externè fomenta blandè calefacientia, & quam primum per alvum effluxit, capiat æger ol. amygd. d.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cum ol. destil. anis.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . M. Ut autem melius operari queat, consultum est, agitare & movere in curru ægrum, de quo vid. Hist. Herbenii, in dissertat. de dolore Hypochondriaco. Vel immittatur æger in solium aquâ tepida plenum, postquam Mercurium ita assumsit, ut internus Mercurii usus promoveatur per externum istum fotum

forum. t  
Lyserus i  
tinacissim  
& doloro  
causa, C

Die 15. J

Die 16. J  
à mer

Externè  
Die 17. J

Po  
velperi  
tus in a  
ordinat

ando in  
infectus  
sistebar  
væ, vac  
faucibu

Pro ab

D  
in corp  
æro em



forum. *Conf. Riv. in Prax. Henr. ab Heer. obs. 2. Rhodius cent. 2. obs. 80.*  
*Lyserus* in observat. cultro anatomico annexis p. 244. Curavi mulierem, per-  
 tinacissima alvi obstructione laborantem, cum abdomine hinc indurato, tumido  
 & doloroso, & præsertim in hypochondrio sinistro tumore duro, unde mali  
 causa. Cum metuerem jam imminuentem ileum, die 14. Junii:

℞. aq. menth. ℥i.

Mercurii vivi bene depurat. ℥iij. M. capiatur.

una vice. Factum sine alteratione

Die 15. Junii: ℞. aq. menth. ℥i.

Mercurii vivi purgat. ℥iij.

aq. cinam. ℥iij. M. capiatur vesperi seq.

Die 16. Junii potio ead, Mercurialis denuo hausta, sed frustra.

à meridie: ℞. aq. menth. ℥i.

cinam. ℥ss.

syr. ros. solut. ℥vj.

Mercurii vivi purgat. ℥v. M. D. Haust frustra.

Externè ℞. axung. anserin. ℥iij. qua calidè crebrius abdomen inungat.

Die 17. Junii: ℞. lact. bubul. ℥viiij.

terebinth. in vitell. ov. solut. ℥iij.

⊕ ℥i ℥iij. M. pro clystere, applicetur pro 2. vicibus.

Potio Mercurialis proxima denuo hausta manè, & iterum de novo hausta  
 vesperi, ita ut ℥iij. medicinales Mercurii in corpore haberet, unde & varios mo-  
 tus in abdomine perciperet, sed alvus clausa manebat, unde & eodem intestus  
 ordinatus:

℞. herb. & flor. chamomill. Mvj.

Malvæ recent. Miiij.

fl. sambuci Mij.

bacc. lauri ℥iij. coquantur. Infideat ægra, continu-

ando interea semper litum abdominis cum axungia anserina. Die 18. Junii,  
 intestus idem ac clystma continuabantur. Mercurius pertinaciter in corpore sub-  
 sistebat, uti & 19. & 20. die. Hoc tempore dolebat collum, tumescebant gingi-  
 væ, vacillabant dentes, & Mercuriô retentô, salivatio superveniebat. Unde pro  
 faucibus & collo leniendis:

℞. mell. ros.

syr. viol. an. ℥j. M.

Pro abdomine verò ℞. unguenti de arthan.

ol. diacolocynth. Q. an. ℥ij. M. inungatur abdomen.

Die 21. cum eadem adhuc persisterent, & ultra octiduum Mercurius vivus  
 in corpore hæreret, pro fecibus duris, & tumore in colo sub hypochondrio sini-  
 stro emolliendo cum dicto unguento:



℞. Empl. de cicur.

Gumm. ammon. in aceto solut. an. q. s. malax, c. s. q.

℞ tartari destillat. inducantur supra alutam, & applicentur dicto loco.

Die 22. Junii: ℞. decoct. spec. emoll. ℥ viij.

sal. ciner. clavellat. ℥vj.

mell. depur. ℥iij. M. pro clysmate, sæpius iterando. His

& similibus factum est, ut pedetentim soluta alvus, scybalis lapidis instar induratis prædeuntibus, & io vivo successivè in pauca quantitate apparente: Continuantur clysmata, unguenta supradicta, donec die 29. Junii nocte ex improvviso lectum copioso & io vivo repletum observavit, unde pro alvo aperta servanda, & & io fauces adhuc affligente eliciendo, die 3. Julii:

℞. lact. vaccin. ℔. j.

mell. rosat. ℥iv.

sal. ciner. clavellat. ℥? M. pro clystere aliquoties applicando,

per 2. vel 3. vices.

Sed cum adhuc & ii superessent vestigia, die 23. Julii:

℞. pulv. bezoard. Senn. ℥j.

bezoard. Ols ℥ss. M.

Vomitus copiosæ materiæ viscidæ creberrimus supervenit ab hoc medicamento, & ita continuatis internè jusculis, externè clysmatibus successivè convaluit.

Præter hæc dicta, ratione irritationis plus minus intensæ, prosunt *anodyna*, ut: *decoctum malvæ*: Hinc *decoctum flor. chamomilla*: *Decoctum flor. anethi*: item *juscula decoctionis raparum*, quæ & leniunt; & simul blandè abstergunt. *Sydenham loc. supra cit.* usurpat pro sistenda irritatione, & compescendo vomitu, ℥j. *sal. absinth. cum succo limon. assumti*, superingesta subinde aq. menth. Ac sane remedium hoc non est contemnendum. *Observavi* in Iliaco, quod post hanc potiunculam, ad illius imitationem conscriptam, & vomitus cessaverit, & dolor abdominis multum remiserit.

℞. aq. menth. ℥ij.

sal. absynth. ℥. ad ℥ss.

spir. theriac. simpl. ℥ss.

styr. de spin. cervin. ℥vj. ad ℥j. M.

Hæc portio, mutatis mutandis, sæpius repetita, opimum effectum in Iliacis solet habere. Aliàs enim theriaca ad ℥j. in haustu vini calidi generosi, quando scil. malum non est ab inflammatione, multum præstat.

Hisce internis ad Iliaci curam usitatis, etiam simul *externa*, partim alvi excretionem promoventia, partim emollientia & suaviter lenientia usurpantur. Convenit igitur *oleum chamom. destillat. cum pinguedine tax. subactum*, & abdomini illitum: vel *Galbanetum Paracelsi*, cum unguento de arthanit. mixtum, &

℞ cha-



Chamom. comm. crebrius illinantur abdomini, lintea probè calefacta de-  
super applicando. De *stercore vaccino* recenti, abdomini imposito, superius  
dictum fuit: *Omentum vervecinum* recentissimè exemptum, & ita adhuc cali-  
dè abdomini instratum, mihi solet lenire dolorem, & mitigare symptomata.  
Item *exuvie serpentum* in oleo rosaceo decoquantur, & ita ventri toti illinantur.  
*Veteres*, in casu, quo intestina à copioso stercore fuerunt repleta, una cum præ-  
sentia flatuum, applicato *folle ventum copiosum in intestinum iniecerunt*, ut ab  
injectis flatibus intestina distenta abscedant, à scybalis hædem impactis, separata  
facilius per clysmata vel aliis modis possint elici. Modi hujus hæc mentio apud  
*Hippocrat. Confer Amat. Lusit. cent. 1. obs. 100. Item in Epiph. Ferdinand. hist.*  
74. Denique cum omnia videntur frustranea, deliberandum est, an audiendum  
sit consilium *Barbeui*, quod habet in sua Anat. Pract. dum abdomen aperite, &  
intestinorum litum manuali applicatione corrigendum suadet.

## DE ALVI FLUXU.

*Alvi fluxus* pro varietate excretorum varia sortitur nomina. Communis-  
simus est, qui vocatur *Diarrhæa*, quo nomine nihil aliud insinuat, quàm co-  
piosa materiæ variæ, plus minus naturalis aut corruptæ, diversimodeque consti-  
tutæ excretio. Unde pro excretorum varietate diarrhæa, *nunc* dicitur serosa,  
*nunc* purulenta, *nunc* biliosa, *nunc* pituitosa, &c. Adest simul ut plurimum ap-  
petitus dejectus, sitis è contra aucta, interdum aliqua sine vexant tor-  
mina, aut murmura, vel borborygmi, immediate scilicet excretionem antece-  
dentia.

Ante omnia considerandæ sunt *differentiæ diarrhææ, ratione causarum fiendi-  
que modorum*: nempe diarrhæa est *vel artificialis*, ut in purgatione per medica-  
mentum instituta; *vel est naturalis*, ipsa naturæ motu concitata. Hæc est *vel  
spontanea, vel non spontanea*. Spontanea fit I. *ob errorem externum*, ut v. g. ex  
fructibus horæ assumptis: Ex refrigeratione corporis nocturna &c. II. *Ob inter-  
nam materiam metastasin*, ut v. g. diarrhæa superveniens, pleuritidem in sexagena-  
rio sene solvit, de quo vid. *Panarol. Pentecost. obs. 36*. Vel quando pleuritidis sup-  
puratæ supervenit diarrhæa purulenta. Faciunt huc diarrhææ, quæ dicuntur  
oriri ab hepate, cerebro, liene &c. v. g. *Zacut. Lusitan. l. 2. prax. admir. obs.*  
20. refert fluxum diuturnum cerebralem. cauterio ad bregma indito curatum.  
*Id. l. 2. Med. Princ. hist. 76*. refert alvi fluxum, ex debilitate brachii unius sub-  
ortum, eo corroborato sanatum. Sic *Rhodium cent. 2. obs. 84*. observat, Diar-  
rhæam, ab urina suppressione natam. Sic *Meara in hist. Med. p. 131*. observat  
*diarrhæam*, ex capite oriundam, quæ suppressa, copiosi pediculi generabantur.  
Sic *Schenckius l. 3. obs.* Diarrhæam ex disrupto lienis abscessu notat. Et *Sylva-  
rius cent. 3. consil. 18*. refert diarrhæam saniosam, cum febre & jecoris abscessu,



ex bubone sub axilla. Omnes hæ diarrhææ saltem spontaneo naturæ motu, per metastasin nempe materiæ, & variam ex uno loco ad alterum translationem sive motum, originem duxerunt. III. *Ob spontaneum humorum motum*, sub quo vitium bilis ordinariò subesse, aut simul jungi solet. Tales sunt diarrhææ, quæ ex mutata diætâ in peregrinationibus: item quæ tempore verno aut autumnali, quibusdam sua sponte superveniunt. *Diarrhæa non spontanea* est vel morbus, vel morbi. *Diarrhæa quæ est morbus*, sunt istæ, quæ subinde ægròs affligunt, sive externæ, sive internæ occasione ratione: item quæ alterationi corporis post fructus horæos superveniunt &c. Hujusmodi diarrhææ sunt *vel epidemice*; Et talis iterum *vel accidentalis*, *vel est habitualis*, quando nempe diu & subinde per aliquot annos continuare ac persistere solent.

*Diarrhæa morbi est nunc symptomatica, nunc critica.* *Symptomatica*, v. g. in principio februm malignarum, aut in phthisicis, vel hecticis, quæ subinde supervenit. *Critica* est ista, quæ in declinatione morbi superveniens morbum solvit ac curat. *Symptomaticas* istas inter primariæ sunt *colligativæ* dictæ, sive fluxus alvi colligativi, quales, præter malignas febres, imprimis phthisicos & hecticos vexant: siquidem phthisicis ordinariò aliquandiu ante mortem supervenire; hinc & phthisici ab injecto saltem clysmate usuali, copiosas patiuntur dejectiones, & à levi etiam propinato medicamento insigniter evacuantur, sed simul admodum læduntur, ob id sumus cauti in laxandis phthisicis, sed superveniens talis diarrhæa phthisicos ab imminente hydrope præservat. *Colligativa* dicitur, quia ros partium nutritivus, ac ipsa M. S. ex texturæ mutatione, ita fatiscunt, ut instar liquaminis serosi copiosè per alvum evacuentur, cum juncta notabili corporis emaciatione, viriumque sensibili prostratione. Sanè quibuslibet tabidis, undecunque id mali contraxerint, de facili talis imminet *Diarrhæa*.

Quoad *Causas*, scrutabimur imprimis eas, quæ *Diarrhæam* morbum inferunt, utpote cum exinde cæteræ species faciliè judicari, aut earum fiendi ratio explicari possit. *Excreta ista*, quæ per *Diarrhæam* rejiciuntur, non sunt actu in intestinis, sed deferuntur eò, partim ex ventriculo, ratione assumtorum, partim ex M. S. per ductus, tam pancreaticos, quam choledochos, ac vasa excretoria glandularum intestinalium. Interim si per vasa choledocha nonnihil copiosius transcolèntur, fit *diarrhæa*, dicta *biliosa*: si per vasa pancreaticæ, dicitur *serosa*, &c. sicut ipsa excreta, si viscidiora, ac minus tincta fuerint, dicitur *pituitosa* *Diarrhæa*; quæ tamen, vel ex vitio chylicationis, vel ex vitio intestinorum, quibus incipiens imminet Dysenteria, originem habet. Cum igitur *Diarrhæa* sit quasi *purgatio quedam naturalis*, sive à causa externa, sive interna oriatur, sive contagiosa seu maligna sit, sive non, eodem modo se habebit, atque *hypercatharsis* à medicamento purgante oriunda.

Purgan-

Purgan-  
restina, un  
liter trans  
res purgan  
colliquefa  
languini a  
factæ, ser  
infusus, a  
gantur,  
lera oriri  
aqua for  
usu fruct  
acrimoni  
minus m  
que caus  
ab humo  
Ex  
occasiona  
ciente, fo  
rum, neu  
faciens  
Per  
videretur  
texturam  
imitatur  
Ac  
persuad  
Grisalia  
item pu  
tempera  
Ca  
ferment  
vel debi  
culpam  
spirituol  
prætern  
bitus co  
lam, sa



*Purgantia hypercatharsin* inferunt *duobus modis*, I. *Irritando* simpliciter intestina, unde uberior liquorum fluxus, eorum scilicet, qui in iis locis vel naturaliter transcolantur, vel transcolari apti nati sunt, v. g. Antimonialia, resinae aciores purgantium, Mercurius sublimatus, Arsenicum, &c. II. *Fermentando & colliquefaciendo* M. Sam, speciatim chylum quasi musteum, nec adeo perfectè sanguini assimilatum: unde colliquefacta substantia ista, & ita excrementitiæ facta, sero involuta per convenientes vias evacuantur, uti fit à laxantibus, venis infusis, aut quando odoribus purgantium aliisve similibus modis quidam purgantur. Ex utraque etiam causa & *Diarrhaea*, & excessivus ejus gradus *Cholera* oriri potest. Ab *irritatione* quidem: ut quando à Mercurio sublimato, aut aqua forti *Cholera* aut *Diarrhaea* inducuntur: A *fermentatione*; ut quando ab usu fructuum horarum idem contagium diarrhæam concitat. Ibi simplex acrimonia rerum irritando hoc malum infert: hinc simul fermentum adest, plus minus malignum, turbans & colliquefaciens humores. Adeoque in specie ubique *causa antecedentes* examinandæ, an aperto *errore externo*, an à *fermento*, an ab humorum *opparum* malum oriatur?

Ex dictis manifestum evadit, *causam Diarrhae proximam materialem* sive *occasionalem* (suppresso nempe ubique *spiritu impetum faciente*, seu *causa efficiente, formali proxima*) esse *humorè acrem*, sive potius minimum ejus *fermentum*, nempe *acre*, vel *irritans* intestina, vel *inquinans*, ac plus minus *colliquefaciens* massam sanguineam.

*Fermentum* istud *acre*, *volatile* atque *acidum*, specifici tamen saporis esse videtur, quod cum bile, vel in intestinis, vel in folliculo felleo commistum, talem texturam, saporem & naturam acquirit, quod purgantium naturam sive crasim imitatur, & ita similem cum iis effectum producit.

*Acidum* potius esse quam *biliosum* hoc *fermentum*, usitatissima juvenia persuadent, qualia præter *opata* sunt, *corallia*, *terra sigill. C. C. ast. hamatiz.* & *Crithalia*, *tormentilla*, ejusque *extractum*, *acre vinum absynthites*, *pastus oriza*: item *pulsam ygdalarum dulc.* cum lacte (*Mandelmuhs*) &c, talia nempe omnia temperando, ac in specie corrigendo acido inserviunt.

*Causa* interim *remota*, disponens corpus ad Diarrhæam, est ventriculi fermentum digestivum, non debito modo se habens, sed labefactatum, adeoque vel debile, vel vitiatum, ut nec cibos fermentet, nec bilem digerat; hujus nempe culpam subito alvus luit, ejusque fluxus excitatur. Unde quæcunque acidum spirituosum stomachale modò destruere, contra bilem augere, vel in orgasmum præternaturalem concitare valent, dant Diarrhæam. Multum simul confert habitus corporis constitutio: Nam ii, qui densæ sunt texturæ, & cutim habent spissam, sæpius quotidie egerunt, quam qui poros habent apertos, unde & illi *Diarrhæis*



rhæis magis sunt obnoxii, quàm hi, ut rectè notat *Gabelkoverus cent. 3. cur. 73. in Schol.* cujus rationem in glandulis intestinaorum quarere niti ut *Peyerus Tr. de gland. intestin. p. 86.* Hinc in qualibet Diarrhæa tam sedulo opera danda, ut vel copiosiori insensibili transpiratione, aut sensibili sudatione corpus perspirabile conservetur.

Ex his etiam *differentiarum* Diarrhææ essentialis patet ratio. Et speciatim *Epidemica* plus minus *maligna aut contagiosa*, ex fermento acri, maligno, stomacho hostili, vel cum aëre inspirato, vel cum assumtis ingesto, vel excretis ægrorum suscepto, se confestim multiplicat, & primitus oritur.

*Habitualis* fundamentum in vitio *fermenti digestivi & bilis* à naturali crassi alteratæ residet: *Illud* non ritè digerit & subigit, nec tali corpori appropriat assumpta: *Hæc*, nempe *bilis*, non ritè perficit & separat eadem ab excremento, quin hæc potius mutua miscela saporem, acrem intestina irritantem, & ad celestorem expulsionem stimulantem, acquirit: quibus occasionibus & ventriculus & intestina adeò irritabilia successive evadunt, ut à levissimo objecto, v. g. ab ordinario potu, ad excretorium motum sive suicontracturam irritentur.

*Colligativa* fundamentum habet in deficiente, plus minus acido stomachali, & aciori e contra reddita bile, unde partim chylus actis, falsus evadit, intestina stimulans, partim ista acrimonia falsa, massam sanguineam resolvit, liquefacit, ut in sua textura fuscens, in serosum salum liquamen deficiat, quod per glandulas intestinales & pancreas secretum, sub tali Diarrhææ specie excernitur.

Quoad *causas remotas*, Diarrhæam excitantes, sunt hæc nunc ipsa externè assumpta, facillè effervescebilia, aut corruptibilia, nunc ipse internus naturæ, per humores concitatæ, motus. Sic notissimum est, quod inter assumpta *fructus horæi*, item *cucumeres, melones, &c. pruna, uræ*, utpote facillè fermentescibiles, *Diarrhæam* inducant. Interdum fit, ut Diarrhææ per certum tempus affligant, quale exemplum habet *Forestus l. 22. observ. 2.* Diarrhææ nempe naturalis, cum serosis & liquidis humoribus, singulis ferè tribus mensibus recurrentis, præsertim si olusculis humidis, peponibus, &c. velceretur. Sic *Diarrhæam menstruam* recenset *Schenckius l. 3. obs.* Raræ admodum sunt etiam, quæ subinde excernuntur. Sic Diarrhæam *lethalem*, in qua ossa sæpè & copiosa excreta fuerunt, refert *Schenck. cit. loco.* *Diarrhæam pinguem & oleosam*, vid. in *M. A. N. C. Ann. 2. p. 35.*

Quoad *Prognosin*, observandæ imprimis *differentiæ Diarrhæarum*: Nam ex harum consideratione, & cum viribus ac statu ægri collatione, manifesta se exerit Prognosis. In specie, sicut *Critica* est optima, nec rejicienda sit ea, quæ, ob materiæ metastasin, vel spontaneum humorum motum accidit, utpote de quibus intelligendus est *aphorismus 2. sect. 1. Hippocrati*, dum dicit, in

turbatione  
confert. Et  
Symptom  
Diarrhæa,  
principio r  
concoctio  
lem humo  
febrilis co  
rimum fa  
ita cohibe

Me  
pervenit  
superveni  
per sum  
irritari, &  
diarrhæa  
mâ labor  
metastasi  
malum so  
gerenti si  
Scholzius  
ne malin  
tiones uso  
sanguinol  
modo sist  
termisit.  
57. it. sect.  
Excreta,  
tionis fue  
dum, aut  
mala sunt  
Extriosa ve  
diuturnior  
quatinus,  
bus phibit  
ea est coll  
In Cu  
fermenti p  
ginosa tem



turbationibus alvi & vomitibus, quæ sponte fiunt, si, qualia oportet, purgentur, confert, & facile ferunt. Sin minus, contra.

Symptomatica verò Diarrhæa, si non semper, ut plurimum est mala. Sic, v.g. Diarrhæa, superveniens peripneumonia, est passiva: Nam omnis talis fluxus in principio morborum superveniens, ut plurimum est malus, quia 1. impedit concoctionem materiæ morbificæ, seu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. 2. quia vires prostermit. 3. quia subsequens est febrilis colliquationis, id quod pater, quoniam excreta tum temporis sunt plurimum fœtida. Ergò talis diarrhæa symptomatica semper sistenda, aut saltem ita cohibenda, ne fiat præternaturalis.

Medici aliàs ordinariò putant, indicari tunc purgationem, quando supervenit talis diarrhæa: Sed rectè dicit *Lindanius*, ipsos tunc nescire, quid sit superveniens morbo. Nam cum superveniat talis diarrhæa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, eamque sæpius malignam, non debet sanè irritari, & exasperari purgantibus. Pertinet huc & sect. 6. §. 15. *Hippocr. Longâ diarrhæâ laboranti superveniens vomitus malum solvit. It. §. 17. §. 6. Ophthalmiâ laboranti alvi profluviò corripit, bonum est.* nempe fit tunc diarrhæa ex metastasi. It. §. 29. sect. 7. *Si Leucophlegmatiâ detento Diarrhæa supervenit, malum solvit*, ex dicta nempe nunc ratione. It. §. 34. sect. 5. *Mulieri uterum gerenti si alvus fluat, periculum est, ne abortiat.* Sed limitandus hic §. siquid. *Scholzius in consil. 340.* inquit: ubi videris fluorem ad sistendum inobedientem, ne multum urgeas. Ferunt autem nonnunquam prægnantes hujusmodi evacuationes usque ad partum citra noxam, ut contigit in uxore fratris mei, quæ 4. ☐ sanguinolentas dejectiones etiam cum rasura intestinorum passa est, nec ullo modo sisti poterat. Tandem, excluso fœtu sano, & incolumi sponte sua intermisit. Similem casum alvi floris & Dysenteria, vid. in *Ballonio l. 2. consil. 57. It. sect. 7. §. 6. In morbo diuturno cibi fastidium, & sincere dejectiones malum.* Excreta, quo magis à statu naturali recesserint, adeoque quo deterioris conditionis fuerint, eò, cæteris paribus, deterior habenda est. Hinc si crassa admodum, aut alba, aut purpurea, aut crocea, aut spumantia dejiuntur, hæc omnia mala sunt. Item mala est dejectio pauca, glutinosa, alba, subpallida, lubrica. Exitiosa verò est nigra, pinguis, livida, aruginosa, fœtida. Versicolor quidem diuturnior est, sed nihilominus exitialis. Omnium periculosissimus est fluxus colliquativus, & si talis tabidis aut heclicis superveniat, plerunque letalis, & quibus phibicis vel confirmatis, vel quibus capilli defluunt diarrhæa supervenit, ea est colliquativa, & in propinquo mors.

In Cura Diarrhæarum in genere, I. *Acrimonia humorum*, ac potius fermenti peccantis, nunc acida, nunc simul alcalina seu biliosa, adeoque aruginosa temperanda ac corrigenda, indeque nata Mæ. Sæ. aliorumque contento-

rum



rum *colliquatio fermentativa inhibenda*, & jam facta per *sudorem ejicienda*. Nempe huc faciunt *absorbentia*, vulgo *precipitantia* dicta, it. *adstringentia*, v. g. *coralliata*, C.C. *terr. sigill. it. Crystall. Smaragd. &c.* Sic nempe *Zacut. Lusitan. l.1. Med. Princ. hist. 22. & observatione annexa* diarrhæam diuturnam & ingentem refert, ex veneno ab amasia in cibo propinato, aliis irritis, per *Smaragdum* procuratam, ad gr. xij. in *conserva Cydoniorum*. Sic in Diarrhæis biliolis, nempe in bile æruginosa & porracea dictis, *Crystallum* laudare solet. II. *Irritationis sensus acutus opiatis*, vel similibus *sopendus*, adeoque hinc natus *spirituum impetus*, & efferus *contentorum motus* loculis iisdem *sistendus*. Hinc *opiata* qualibet *theriacalia*, & inter hæc speciatim *Diascordium Fracastorii*, tam veteris, quam correctæ à *Sylvio l.1. c. 58. §. 22. compositio* it. *theriacal. conducunt*. III. *Stomachus* simul probè considerandus, & *appetitus laesus*, ejusque tonus plus minus resolutus apprimè *restituendus*. Conveniunt hic *vinum*, & *vinosa cydoniata, mastiche, vinum absynthites*. Pro his scopis melius obtinendis sequentia probè observanda sunt *axiomata*: I. In quovis alvi fluxu, qualiscunque etiam sit, *ventriculi summa* semper habenda cura. Hinc *calidus potus & calidus fons* apprimè conveniunt. Ipsi sc. ægri observant, subito atque potum saltem frigidiusculum ingerunt, quod mox alvi stimulum sentiant. Item *parvus potus* in quavis Diarrhæa convenit, cum, *Foresto* annotante *lib. 22. obs. 4.* bibendi abstinencia omnem solvat alvi fluxum. *Calidi fons* sunt varii, tam *sacculi*, quales circa vomitum ordinati, quam *Emplastra*, præsertim ex *Tacamahaca cum aromaticis* applicata. II. *Diaphoresis*, quantum possibile est, conservanda, interdum promovenda, speciatim, si à fermento humores ipsi ad colliquationem disponantur. Nam si à simplici irritatione est Diarrhæa, non æquè necessaria sunt. It. in *Epidemica* pariter atque *contagiosa* magis, quam aliis speciebus conveniunt. III. In nulla Diarrhæa in principio evacuatio per alvum confert, sed *sufflaminato prius humorum impetu*, & *deleto irritationis sensu*, ubi necesse fuerit, vel *clysmatis* alvus eluenda, vel *blando Rhabbarino* intestina abstergenda. Conf. hic *Septalius in animadvers. & caution. med. lib. 7. §. 89.* Quin potius spectatores motus aliquandiu naturæ erimus, quandiu non excedit, & *morbifica causa* potissimum rationem habeamus. IV. Ubi *ventriculus* maximè laborat, *vomitus* est proficiuus. *sect. 4. aph. 17.* Adeoque cum maximè urgent stomachi symptomata, & exinde diuturnior evadit affectus, vomitus imperandus. *conf. sect. 2. aph. 15. & lib. 2. de ratione victus.* V. *Adstringentia*, qua talia non conveniunt in Diarrhæis. Quid enim juvat adstringere & arctare partes, & excernenda retinere, dum omnia adhuc sunt in motu? quin potius *Metastaseos* in aliam partem nobilem, aut supervenientium gravissimorum symptomatum abdominis ingruit metus? Sic enim ex Diarrhæa, *cydoniatis* intempestivè suppressa, *Ileon* lethale observavit *Ballonius. vid. Bonett.*

Pharos

Pharos M  
tono, no  
turna jam  
stringentia  
sapore sty  
saccharum  
porem ter  
potius vid  
cus, tam  
desperata  
arhæa p  
gregè co  
extractu  
tur ex ra  
Precellit  
ex hoc es  
naturum el  
rad, plan  
tim cond  
22. obser  
etiam ep  
unt. I  
rioris est  
qualiber  
nempe a  
lignum l  
hoc mas  
le, in Di  
tum, Pr

Potest e  
addi, m



*Pharos Medic. p. 413.* Nec stomachus aut intestina laxitate laborant, vel resolutio tono, non magis sc. quam in hypercatharsi. Non igitur nisi in Diarrhæa diuturna jam curata, pro primarum viarum tono redintegrando, propriè dicta adstringentia, cydoniata v.g. aut ex mespilis defunta, conducunt. Cætera, quæ sapore styptico plus minus imprægnata sunt, v. g. *Tormentilla, terr. sig. CC; ust. saccharum Saturni, &c.* non tam adstringendo, quam specificâ sui texturâ saporem fermenti, vel humoris peccantis corrigendo, absorbendo, &c. prodesse potius videntur. VI. *Vinum* est potus medicamentosus, quatenus ventriculo amicus, tam simplex generosum, quàm medicatum. Sic Diarrhæam trimestrem desperatam *vinum rosarum* curatam refert *Velschius Hecatost. 2. p. 29.* Sic in Diarrhæa post purgantia, post fructuum horæorum abusum, *vinum absinthies* egregiè confert. Ea igitur, quæ conveniunt in Diarrhæis, sunt *Tormentilla*, ejus *extractum*, præmisso, si opus est, *Rhabarbaro*, una alterave vice, hinc exhibetur *extractum Tormentill. c. V.* quadam factum, à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{z}\text{j}$ . in jusculeo calido. Præcellit omnib<sup>9</sup> aliis medicamentis, in Dysenteria etiam epidemica, vel *extractum* ex hoc *extracto* cum spir. vini paratum, cum *laudano hystero* aut *opiato* propinatum est egregium: quin imò solus  $\mathfrak{z}\text{ rad. tormentill.}$  hic convenit. Hinc *rad. plantag.* & speciatim ejus *semen*, it. *Portulaca herba*, it. *Mespila*, præsertim *condita*, aut quod præstat, *cruda*; quorum felicem usum vid. in *Forest. l. 22. observ. 1. Rob. sorbi*, speciatim *terminalis* est nobile *specificum*, in *Diarrhæis* etiam *epidemiciis*, it. in *diuturnis*, quæ ab usu fructuum horæorum superveniunt. In ejus locum etiam *rob. sorbi aucuparia* potest substitui; sed hoc inferioris est conditionis, utut egregiè etiam conveniat stomacho. Hinc *cydoniata* quælibet, item *Nux moschata* ac *macis*, it. *caput mortuum cinamomi*, ex quo nempe *aqua* & *oleum* destillata sunt, sunt ad Diarrhæam præsentia remedia. Itali *lignum lentiscinum* laudant, & *decoctum* exinde paratum: transfudat nempe ex hoc *masliche*, unde in ejus locum *decoctum masliches*, seu stomachicum nobile, in *Diarrhæis* usurpari potest, quod etiam quorundam Medicorum fuit secretum, Præscribi potest ita ad imitationem nempe *Tilemanni in materia medic.*

$\mathcal{L}$ . aq. plantag.

fol. quercus

rosar. an.  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .

Vel horum loco aquam simplicem.

Mastich. select.  $\mathfrak{z}\text{ii}$  ad  $\mathfrak{z}\beta$ .

Macis  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

Colaturam  $\mathfrak{z}$ . adde

aq. Cinamomi  $\mathfrak{z}\text{j}$ . D. ac usurpetur.

Potest etiam de succo cydoniorum  $\mathfrak{L}$ ato, aut hujus loco parum syrupi cydoniorum addi, majoris saporis gratia. Ovi vitella bina ad duritiem cocta, cum aceto rosarum.

M

tempe-

efficienda,  
ringentia,  
de Zacut.  
diuturnam  
per Sma-  
thæis bi-  
dare soler.  
que hinc  
dem sisten-  
cordium  
positonis:  
dus, & ap-  
us. Con-  
r. Pro  
ata: I. In  
er habenda  
psi sc. ægri  
d mox alvi  
um, Foresto  
i. Calidi  
Emplastrum  
si, quan-  
a fermento  
tatione est  
contagiosa  
principio  
, & delecto  
ando Rha-  
& caution.  
re erimus,  
amus. IV.  
7. Adeo-  
evadit af-  
one victus.  
enim juvat  
que sunt in  
remientium  
Diarrhæa,  
vid. Bonett.  
Pharos



temperata, & ita usurpata, euporiston sunt præstantissimum. *Helmont. Tr. Pylorus Rector. §. 22.* aliquoties à me expertum, etiam in Diarrhæa, quæ jam per 4. dies pertinaciter theriacalibus restiterat. *Conf. M. A. N. C. Ann. 8. p. 67.* *Decoctum granorum juniperi* stomacho gratum & diureticum laudatur à *Rivierio. Spongia salicis* exiccata, & ad ʒß. data, præstans habetur remedium ad Diarrhæas; sicuti etiam ʒj. *sem. Sophia Chirurg.* præstantius est atque *semen plantaginis* supra laudatum. Porro *bolus Armen. terra sigill. terra solaris*, & hinc *Œlia, crocus* ♂, *lapis hamatit.* speciatim *artificialis* egregia sunt in Diarrhæis, nempe non tam præcisè *adstringendo*, quàm *absorbendo* vitiosos sapes. Confer *Poter. cent. 3. c. 77. cent. 2. c. 39. & 81.* ubi gravia alvi profluvia *croco* ♂ prostant curata. Sunt qui recipiunt *boli armen. & nuc. moschata ana*, miscent cum uno alterove *vitello ovi mollis*, & ita sine *sale* assumunt contra Diarrhæas. *Gelatina C. C. it. Decoctum C. C.* pro potu ordinatio assumtum *corrigendo & temperando* egregiè convenit in quibusdam *Diarrhæis*, speciatim *epidemice grassantibus*, aut aliàs *contagiosis*. De *Theriaca*, speciatim *Diascordio* jam supra dixi, & considerationem meretur effatum *Foresti lib. 22. obs. 17. Theriaca* ad omnes ventris fluxus est mirabilis, maximè sistit *cholericos*, si sit *recens*: Compefcit enim mordacitatem humoris, & torporem inducit.

Ex hæctenus dictis plures concinnari possunt *formula*, v. g.

℞. aq. Tormentill. vel

plantag. ʒiij.

Diascord. Fracast. ʒij. vel ʒiij.

Extr. tormentill. ʒj.

♂. diaphor. ʒß.

Syr. cydon. ʒvj. M. pro 2. dosibus, expectando qualibet vice blandum sudorem.

Vel: ℞. aq. plantag.

portulac. an. ʒjß.

acer. rosac. ʒß. ad ʒvj.

Diascord. Fracast. ʒij.

terr. sigill. ʒij.

♂. diaphor ʒj.

tyr. ros. rubr. ʒvj. M. pro 3. dosib.

Acida nempe c. terr. sigill. ac similibus propinata, texturam aluminosam quasi acquirunt. Vel: ℞. aq. menth. ʒij.

cinamom. ʒij.

extract. Torment. gr. viij.

croci ♂ adstr.

laud. hysteric. an. gr. vj.

Syr. cydon. ʒß. M. pro 1. dos.

Mulier



Mulier quædam corripitur *Diarrhæa simplici*, sed tunc *epidémica*, cum varia & multiplici *phlogosi*. Prima die 8. vel 10. vicibus; secunda 40. vicibus deiecit: unde virium insignis prostratio, anxietas præcordiorum, inquietudo, &c. Vocatus à meridie *ordino*,

℞. ꝑ. diaphor.

Extr. Tormentill. c. V. an. ʒß.

terr. sig. ʒj.

laud. fermentat. gr. ij. M. divid. in 2. partes æqual.

Capiat unam vesperti, alteram post mediam noctem in vehiculo seq.

℞. aq. tormentill.

scordii an. ʒj.

℞. theriac. camph. ʒj. ad ʒij.

℞. cinamom. ʒi. M.

Cessant hinc dejectiones, sed tamen nox inquieta absque somno fuit. Manè

℞. C.C. sine Δ.

bezoard. ʒial.

Extr. torment. an. ʒß.

theriacal. gr. ij. M. capiat in isto vehiculo.

Cessarunt ferè in totum *dejectiones*. Sed, utut se cogeret, *sudorem* tamen nullum extorquere potuit. Vesperti

℞. C.C. sine Δ.

corall. rubr. præp. an. ʒß.

Extr. torment. gr. v.

theriacal. gr. iß. M.

Dormivit benè, nonnihil sudavit. Manè conquerebatur de insigni circa præcordia molestia, & dolore quasi compressivo: *Da legs und drucks htervorn*. Signò contentorum adhuc recrementorum circa primas vias, sed per ista remedia ab excretionem cohibitorum. Hinc ℞. ℞. *carminativi de vribus ʒij. Dos. gutt.* 40. bis in die. *Passiones hysterica* supervenerunt, ab istis nempe retentis occasionatæ, quæ tamen seq. mane per 3. dejectiones alvinas spontaneas fuerunt levatæ, unde continuato ℞. curata est.

Externè in Diarrhæa convenit *theriaca*, ventriculo & umbilicali regioni imposita, vel sola, vel mixta cum ana *bals. Peruv.* aut:

℞. theriac. ʒij.

ol. destillat. junip. ʒj.

macis

caryoph. an. ʒß. M.

Illinatur dictis locis, vel

℞. ol. destillat. macis

menth,



carui. an. ʒß.

nuc. mosch. expr. q. s. pro consistentia Bals.

Illinatur frequenter dictis locis, imponendo deluper linteamina calefacta. Item *crusta panis tosta, vino austero, vel aceto ebria*, pulv. nuc. moschat. insperso, ventriculo applicata est egregia. Cætera vide ubi de Vomitu fuerunt explicata.

Quum opus est *abstersione intestinali*, usitatum ferè est *habarb.* propinando illud crudum ad ʒj. cum *conserv. rosar.* vel *ejusdem tosti* ʒij. cum gr. vj. vel viij. pulv. nuc. mosch. usurpantur, vel in forma sicca, vel cum *syr. ros. sol.* *Decoctum* item *Tamarindorum* suaviter alvum laxat, & stomacho amicum est: Sed non conveniunt talia nisi in declinatione, pro reliquiis exterminandis, vel in principio, quando nempe excernenda varia, vel in primis viis congesta sunt, vel ad hæc loca aliunde moventur, vel quando ex fructibus horæis malum recens natum est, tunc, ut removeantur sordes istorum locorum, ne ab iis supprimatur vel retardetur vis appropriatorum remediorum, in principio blanda talis abstersio locum habet.

Atque hæc in genere Diarrhææ cura. In specie jam considerandum, quænam ex multiplice ejus differentia curanda in primis veniat. Ubi facilè patet (1.) *artificialem*: (2.) *spontaneam ab errore externo*: (3.) *ex humorum metastasi*: (4.) *ex humorum spontaneo motu*: (5.) *symptomaticas*, si agro commoda; (6.) *criticas*, non esse curandas, sed relinquendas, nec naturæ motum turbandum, quin spectatorum saltem agere, & si deficere videatur, moderatè stimulandum. Sin verò tales Diarrhææ futurae sint *nimiae*, aded ut ob ventriculi vitium hinc *læsa* ejus *fermentatio*, vel *bilis defectus*, aut ejus *corruptela*, vel *intestinorum atonia*, aut *facilis irritabilitas* hinc metuenda sint, sistendæ veniunt moderatè.

*Indicium*, quando curandæ vel non curandæ sint tales Diarrhææ, præter dicta, imprimis suggerit *ventriculi appetitus & coctio*, quibus salvis, nil nocet Diarrhæa.

Sanande igitur sunt I. Diarrhæa modò dictæ, si sint *nimiae*. II. Diarrhæa morbus tam *simplex* quàm *Epidemicus*. III. Diarrhæa *symptomatica*, præsertim *colliquativa*. IV. Diarrhæa *habitualis*. Quibus omnibus generalis ista cura applicanda venit. In specie Diarrhææ *artificiali*, si sit ex *hypercatharsis*, convenit internè bolus ex *theriaca Andromachi*, cum *aqua cinamomi* assumptus: item *terra sigill. ʒ diaphor. C.C. sine igne*. In specie *pumex*, de quo vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 526.* item *Opium*, ac inde *Theriaca & diascordium*. Hinc *vinum Rhenanum*, generosum; speciatim *vinum absinthites*. Ager in lecto calido imponatur: Abdomini, imprimis regioni epigastricæ, *Empl. ex theriaca* imponatur, vel *fotus ex decocto absinthii, mentha*, cum *aromatibus in vino decoctis*. Quòd si tormina aut alvum egerendi conatus adsint, *clysmæ ex lacte tepido*, in quo *Theriaca* dissoluta sit, injiciatur, aut etiam *Clysmæ ex vulnerariis* nonnihil



nonnihil *adstringens*, & blandè *abstergens*. Conf. *M. A. N. C. An. 3. p. 525*. Ac sanè non rarum est in aliis morbis, supervenientes alvi fluxus *clysmatis anodynus*, & ex *lacticiis* paratis, compesci, quorum tunc habetur *indicatio*, quando crebrius, & tamen *parcius* dejiunt ægri, peccante magis acrimoniâ, quàm copiâ excernendorum.

*Diarrhæa nimia ob errorem externum*, v. g. *fructus*, per *absorbentia* & *fi-  
gentia* sistitur.

℞. corall. rubr. præpar.

C. C. ust. an. ʒj.

nuc. mosch. gr. xij.

℞. opii gut. xv. M. pro 2. dos. in haustu cerevis. calidæ, vel vini absinthitis calidi assumendo.

Egregiam observationem talis *Diarrhæa*, *catarrhalis* vocatæ, per *vesicato-  
ria* curatæ vid. apud *Zacut. Lusit.* Sin ex *Metastasinimia* futura sit *Diarrhæa*, radix mali est evellenda, & præsertim cum *catharosi* tali *Diarrhæa* sint obnoxii, præsertim *nocturna*, ut rectè insinuat *Ballonius*. Vid. *Bonett. Pharus Medic. p. 411.* (unde & à cerebro Veteres talem *diarrhæam* derivârunt) *avertentibus*, & aliorum *derivantibus*, adeoque *vesicatoriis* aut *fonticulis* *Diarrhæa* talis erit levanda.

*Diarrhæa ex spontaneo humorum motu nimio*, pariter ut ea, quæ ex *errore ex-  
terno* oritur, tractanda, *ventriculo* imprimis succurrendo, ubi *amara*, ut *absin-  
thium* & *theriacalia* speciatim conducunt. In *Epidemica* appropriatis *alexiphar-  
maca* & *sudorifera* misceantur, v. g.

℞. ʒ diaphor.

terre sigill. an. gr. xv.

sal. vol. viper. gr. vj.

pulv. nuc. moschat. gr. iv. M. F. pulvis pro 1. dos. blandum

expectando sudorem, cui interdum unum alterumve granum *Opii* addi potest.

Vel

℞. C. C. f. Δ ʒß.

Extr. tormentill. gr. xv.

sal. volat. C. C. gr. vj.

laud. Op. iß. M. pro 2. dos. vel robustiori pro 1. dosi, ex-

pectando sudorem.

In *præcordiarum angustis* junctis

℞. Ol. destillat. macis ʒjß.

Junip. ʒj.

Caryoph. gr. vj.

nuc. moschat. expr. q. s. pro corpore Balsam. M.

*Diarrhæa habitualis* imprimis curanda venit *thermis*, usurpando internè *aro-  
matica* stomacho grata. Sic *Riverius cent. 2. obs. 47.* refert, *alvi fluxum* per 8. //

M 3

annos



// annos durantem, *thermarum usu* curatum; per quas etiam curatus fuit *alvi fluxus*  
 // cum ulcere, teste eod. cit. loc. obs. 49.

*Colliquativa Diarrhæa* vix, nisi curato primario morbo, auferri poterit, interim *temperantibus*, ac blandè *adstringentibus* ulterior ejusdem progressus, quantum possibile, cohibendus.

*Summus Diarrhææ gradus*, & qui rarò absque malignitate est, est

## CHOLERA

morbus, quando nempe *non absque impetu ac singulari violentia copiosa recrementa tam sursum per os, quàm deorsum per anum expurgantur*. Adest simul *ventris ac intestinorum dolor*, plus minus vehemens, *inflatio & distentio*, *cardialgia*, *sitis*, *pulsus celer & frequens*, interdum *parvus*, *anxietates præcordiorum* *insignes*, *inquietudo & jectigatio*, *animi imminencia deliquia*, *partium extremarum refrigeratio*, *sudor circa frontem*, tandem quoque adveniunt *convulsiones*. Omnia hæc symptomata eò sunt atrociora, prout causa efficiens occasionalis acrior & malignior extiterit. Valent hæc de *Cholera humida*. Nam præter hanc etiam *Cholera sicca* datur, *notha* nempe, in qua saltem *flatus copiosi* suprâ & infrâ per utrumque guttur eructantur, ac in *hypochondriacis* subindè observabilis.

*Humida Cholera* est, quæ modò consideranda venit, & in qua, ut in catharsi vehementiori ac *Diarrhæis*, etiam ad duo respiciendum est, vel *ad acre irritans*, istudque ut plurimum *acidum*, nunc *solitarium*, nunc *bili permixtum*, indeque cum hac effervescens, & ita *bilem æruginosam* omnium pessimam, ventriculo præsertim extremè hostilem, constituens, à qua etiam gravissima *Cholericorum* circa præcordia Symptomata: Vel *ad idem acre*, humores, præsertim *M. S. inquinans*, *dissolvens*, & *fermentativo motu* eosdem *colliquesfaciens & conturbans*, naturæ analogæ cum purgantibus vehementioribus. *Acre hoc*, sive irritans sive colliquesfaciens, sive (idque ut plurimum:) utrumque fuerit, nunc *humoris copiosi* facie se exhibet, ex assumtis nempe vel in se vitiosis, vel saltem intus corruptis genitum; nunc verò idque ut plurimum, in vehementiori affectu, & qui sponte sua ex interna oritur causa, sub mole minimâ existit, adeoque rectè *fermentum malignum* appellari potest.

Quoad *irritationem*, *locus irritationis* est finis duodeni & principium jejuni. Dum enim in isto loco confluunt acres plus minus & contrarii, plus minus vitiiati succi, non possunt non insignem excitare effervescentiam, indeque insigniter irritare & stimulare intestina & pessimo sensu affligere pylorum. Unde ex peristaltico dictarum partium motu, tam inferiora versus naturali, quàm superiora versus inverso præternaturali, contenta ista qualiacunque, plus minus vitiosa aut corrupta, sursum ac deorsum dejiciuntur. Quoad verò *fermentationem corruptivam* sive *colliquesactivam*, factam à fermento plus minus mali-

gno,



gno, cum contentis corporis permisto, à quo ipso alterata eadem præsertim M. S. partes sui vitiosas sero involutas, per ductum choledochum & pancreaticum ad intestina amandant. Hoc ex eo manifestum est, quod ut non raro *ab alimentis corruptis* occasionaliter inchoatur *cholera*, nihilominus tamen excrementorum quantitas est tanta, ut alimenta, aut quævis assumpta superet longè, quæ excrementa non oriuntur, nisi ex M. S. quæ communis fiscus & promus condus est totius œconomix animalis. Hinc enim est, quod *purgantia* non rarò *choleras* excitent, in istis scilicet, in quibus copiosa *salia contraria*, præsertim *acida*, per *medicamentum purgans* fermentante motu ad intestina detruduntur, ubi tam effervescente, quam mutuâ sui miscelâ *vitiosum saporem acquirendo*, tam violentè intestina stimulant, ut *Cholera* subsequatur, uti interdum in *hystericis*, *scorbuticis* & similibus observari assolet. Hinc etiam est, quod *fructus horæi*, aut ipso aëris vitio corrupti, aut in stomacho imbecilliori sub digestionem vitiiati, in talem chylum vitiosum ac fermentativum abeunt, ut & intestina irritando, & Mæ Sæ crasin turbando & colliquefaciendo, choleram excitent. Unde etiam non rarò *febrilia* ad sunt *symptomata*, ex præternaturali ista sanguinis commotione, tam ratione pulsus, quam ratione caloris. Quò facit observ. *Amat. Lusit. cent. 3. cur. 88.* ubi *pro fluxus mensium, vel alvi* varietate, *febris* juncta nunc imminuebatur, nunc augebatur: Sicut menses fluentes choleram imminuebant, quantum restricti augebant, idque in muliere cacochymica. Sic adjunctus *dolor ventris & intestinorum, inflatio eorum, ac distensio*, effectus genuini contentorum acriorum effervescentium, dicta confirmant. Fermentum istud in *cholera* sæpius est malignum: (quo nomine nil aliud concipere possumus, quam summam acrimoniam, etiam in minimo interdum efficacissimam, nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem, humoribus verò in singulari textura sua mutationem inferentem.) Id quod tetra ac periculosa restantur symptomata: item quod *theriacalia, sudorifera & malignitati resistencia*, primariò in *cholera* sunt attendenda. Unde & *Panazol. Pentec. 1. obs. 28.* choleram à *veneno* quasi *putredinali* oriri asserit & *Joh. Colle. l. 3. Med. Pr. morb. malign.* choleram inter affectus ventriculi malignos reponit, utut non omnem. In genere quæcunque symptomata deleteriam antimonialium purgationem aut helleborum album sequuntur, aliudve violentius catharticum, ea similiter obvia sunt in *Cholera*. Jam verò notum est, quod dicta rectè inter *venena corpori inimica* reponantur.

Hæc in genere *de causis ac sciendi modo*. In specie *causa remota* sunt vel *interna*, vel *externa*. Hæc assumpta varia plus minus præternaturalia: illa verò *interna* aut ex assumptis intus genita, aut spontaneâ contentorū corruptelâ nata fuit. Frequentiores tamen *causa* sunt, vel *assumpta facile fermentescibilia*, indeq; *promptè corruptibilia*, nisi debitè à fermento ventriculi subigantur; vel *medica-*



dicamenta assumpta acriora, plus minus maligna; vel denique certa quadam corpora, acrimoniâ sibi propriâ choleram inducentia. Inter alimenta se primum offerunt *Persica mala*, ex quorum esu choleram contractam in seipso observavit *Timaeus l. 3. cap. 8. p. 119.* *Raphanus* nimiusque ejus esus itidem subindè inducit choleram, teste *Amat. Lusit. cent. 2. cur. 32.* Speciatim *melones*, it. *cucumeres*, frequentius choleram inducunt. vid. *Zacut. l. 2. prax. admir. observ. 15.* Quo facit *Fontanus in analectis c. 35. exempl. 12. p. 102.* qui refert, anum septuagenariam ex esu *cucumerum*, superbibitâ cerevisiâ, cholera correptam, quâ 300. uno die vicibus pituitam per os rejecit, cum febre & delirio. Porro *lac* & ipsum, uti subindè remedium est cholerae, ita idem corruptum *cholera causa* existit, observante *Henr. ab Heer. obs. 15.* Pariter & ex *oryza cum lacte parata*, sed frigide assumpta choleram notat *Zacut. Lusit. l. 2. prax. adm. obs. 15.* Pariter ex esu *fructuum pracocium cum ovis frixis, superbibitâ frigida*, cholera nata, ita ut biduo 300. vicibus deiceret humorem aquosum, & 60. evomeret, idem *Zacut. refert lib. ult. prax. admir. hist. c. 1. n. 7. mustum, cerevisia novella, vinum non rûe defecatum* facillimè choleram inducunt. Ova piscium *Barbi & Luci* insigniter ad hunc morbum disponunt. Conf. *Timaeum l. 1. cap. 7. pag. 118.* item *Schenck l. 7. obs.* Post alimenta sunt *medicamenta purgantia*, vel acriora, vel in nimia dosi, vel subjecto, cujus contenta quælibet sunt acriora, propinata, unde frequens cholera, ita *Riverius cent. 2. obs. 19. Rhod. cent. 2. obs. 68. Forestus l. 18. obs. 44.* qui refert choleram ex infuso *hellebori albi* concitaram, curatam per 3 ij.  $\text{℥}$ . *flor. nymphae albae*, ceu proprii ejus antidoti. Faciunt huc *venena quadam acriora*, uti sunt  $\nabla$ ,  $\bigcirc$  & similia, it.  $\text{℞}$ , it. *fungorum* quorundam esus. Internas inter causas *febres maligna*, in principio sui subinde habent adjunctam choleram: Sic & *cholera epidemica* plus minus maligna subindè observata fuerunt, qualem refert *Sydenham Tr. observ. de morb. acut. p. 239.* Sic *Willis in pharm. rat. vol. 1. pag. 119.* choleram malignam refert etiam epidemicam, quam tamen sub nomine *Dysenteria non cruenta* describit. Notabile etiam est, quod *Fehr. Tr. de absinth. p. 107.* ob oclusam *Fontanellam* choleram natam observavit, ut nil dicam de singulari *idiosyncrasia*, cujus ratione ex audito tonitru cholera subindè enata. vid. *Aët Sic. Reg. vol. 1. p. 446.* Singularis est cholera, quam recenset *Panarolus pentec. 1. observ. 11.* nempe *cholera sanguineam*, ex nimio exercitio  $\text{Qeo}$  contractam, propinatis tamen  $\text{Hjv. pulv. hama-ritis in vino seu succo granatorum}$  curatam. Nec negligendus est *Fonscal. l. 1. cent. 84.* qui refert choleram, in qua evacuabantur sursum & deorsum nigra, vitio lienis obstructi ob  $\boxtimes$  deficientes.

Ex dictis facilis est *Prognosis*, cum ex symptomatum superius facta enarratione manifestum sit, acutissimum & periculosissimum esse malum *cholera*, periodum ferè observat tertianariam, ita nempe, ut de tertio in tertium diem



diem moveatur, seu plus minus exasperetur. Sæpius ægi jam convalescere, & morbus declinare videtur, superveniente nihilominus recidiva lethali. Sic *Horselius* l. 4. obs. 8. notat, Cholericam passionem ferè curatam, ex potu vini, non ruscè defacati, lethaliter recidivantem. Quò perturbatio ventris major est, & quò magis afficitur *ventriculus*, eò periculosius malum est; periculosior etiam est ea, quæ à bile aruginosa ortum habet, utpote interaneis quibusvis hostili. it. cum lotura carnis, simile quid excerpitur: & longè adhuc majus malum, si livida, aut nigra rejiciantur. Fœda etiam insigniter sunt pessimi ominis. Cholera, quæ supervenit principio febrim quatuorundam, si nempe per modum criseos fiat, potest esse salutaris.

In Cura eadem medendi methodus est ac Diarrhææ, nempe *Temperandum* I. Acre, ac destruendum fermentum malignum. II. Opiatis humorum motus sistendus. III. Appropriatis stomachus roborandus.

Pro his scopis melius obtinendis observandum: 1. Si magna adsit virium exsolutio, integra *laudani* dosis exhibenda non est, sed melius est, partitis vicibus, adeoque in minori dosi successivè propinare. Aliàs opiata nunquam omittenda sunt. Quin imò, si tardius accesserit Medicus, ita ut æger vomitu ac dejectionibus ad plures horas fuerit exhaustus, jamque graviora symptomata, v.g. extremorum frigus immineat, in tali casu, omissis quibusvis aliis auxiliis, mox ad sacram *laudani* anchoram est accedendum, sicuti aliàs opiata in cholerae cura nunquam omittenda sunt.

2. Ab adstringentibus in initio est abstinendum, atque cavendum, ne vomitus & alvi egestio statim in principio cohibeatur. Periculum enim est, ne recrementa evacuanda, seu talia in corpore præxiterint, seu à fermento maligno per colliquationem transmutata fuerint, seu ex assumtis genita in vita detineantur, unde inimico visceribus inclulo, facilè multa ac gravia symptomata supervenire possunt. Sicuti è contra, si cathartics excretionem promovère velimus, oleum igni adderemus; ita cum lenissimi cathartici operatio novos insuper excitet tumultus, Spectatorem potius naturæ agere debemus, aut saltem in principio acre istud abstergendum blandè ac diluendum, hinc demum opiatis morbi impetus frangendus.

3. In Cholera à veneno corrosivo lactis potus commendatur, cui appropriata misceri possunt. it. *amygd. dulc.* quod corrosivitatem demulcet. Illustrat hæc *Poterrus cent. 2. cur. 57.* ubi ex *pro vino bibita*, nausea, vomitus, dysenteria, febrisque continua oborta fuit. Hinc emulsionem *amygdalarum dulc.* cum gr. xv. *terra lemnis* propinavit, noctu v. *theriacæ*, cum aliquot granis dictæ *terra sigill.* propinavit. Sequenti mane lac chalybeatum, cum cere flavæ *3j.* panxillo *nuc. moschat.* & dictæ *terra sigill.* addito exhibuit. Extrinsecus *otum ex absynth. mentha, rosæ sicca, maceræ, nuc. moschat.* & aliis ordinavit.



Ad hujus imitationem semper primaria cura sit, ut appropriatis aliisque similibus acriter temperetur. Hinc vel in principio abstergentia, vel in progressu blanda anodyna melius operantur.

A potu, quantum possibile, abstineat ager, nisi pro scopo abstergendi ac temperandi, vel serum lactis, vel decoctum hordei cum syr. ros. vel decoctum pulli aquosius, aut simile, omnia tamen, quantum possibile, tepidè exhibenda sunt.

Medicamenta igitur, quæ dictis conveniunt scopis, sint in principio abstergentia, & blandè evacuantia, imprimis, si ex corruptione alimentorum nata sit cholera, in tali casu Sylvius prax. l. 1. c. 15. §. 29. propinat vomitorium Stiale admisto opio; Quod equidem propter vomitorii vim haud facile imitārim; potius ut temperatem, simulque abstergentem, serum lactis solum, vel cum ℥j. alterave syr. ros. solut. permittum, aut serum lactis, in quo ℥j. alterave tamarindorum ebullierit, exhiberem, vel infusum blandum ex Rhabarbaro, & bolum ex eodem cum conserva rosarum exhibenda sviderem.

Clysteres itid. lentientes in tali casu conducunt, quibus ℥j. ad ℥ij. theriac. addita sit. Speciatim Clysteres ex lacte cum ℥ij. vel ℥iij. theriaces conducunt. Internè conveniunt imprimis mentha, ceu egregium specificum, stomachum nempe suo modo pacificans, portulaca item & plantago, seu in decocto cum syr. cydon. & confect. de hyacinth. propinentur; seu eorum succum cum mentha propinatus. Pariter emulsionem ex seminibus 4. calidis maj. amygd. d. & similibus, quibus appropriata addita sunt, exhibeantur, imprimis terr. sigill. terra Stiales, speciatim Crystall. preparatus, ceu specificum bilem aruginosam temperans, sæpius in cholera convenit. Confer quoad Crystalli usum Långium l. 3. epist. c. 4. it. Zacut. Lusit. l. 2. prax. admir. obs. 15. it. Heer obs. I. Choleram ex usu acidularum, corpore non preparato seu purgato, natam, usu Crystalli montani in succo berberum propinati, unoque alterove clystere curavit. juxta Crystallum & Smaragdus est, qui acerrimi istius fermenti corrosivi vim infringit, speciatim ubi jam convulsiones imminere videantur. Ulterius Stialia, imprimis St. diaph. Stiat. est egregium: Hinc CC. ust. Ebur, s. Δ. corall. rubr. &c. in usu sunt.

Quoad opiata, quæcunque laudana opiata, & horum ratione & theriaca, & essentia theriacal. tam simplex, quam camphorat. adhiberi possunt. Hinc & Diascordium Fracast. it. opiata bezoardica Timai, in casibus p. 119. experti usus sunt.

Ex dictis facile est, varias formulas concinnare, v. g.

℥. aq. portulac. ℥iij.

cinam.

theriacal. simpl. an. ℥iij.

Diascord. Fracast. ℥iij.

St dia-



℞ diaphoret. Dial. ʒβ. M.F. potio pro aliquot dof.

Vel ℥. aq. menth. ʒiij.  
ebor. f. Δ. ʒij.  
cryst. præpar. ʒβ.  
terr. sigill. ʒj.  
laud. opiat. gr. iij. vel hujus loco  
essent. opii ʒβ.  
syrup. portulac. ʒvj. M.

Item: ℥. Theriac. ʒj.  
terr. sigill. ʒj.  
cryst. præp. gr. xij. c. f. q.  
syr. menth. F. Bolus. capiatur, & hauriatur desuper haustulus  
*vini absinth. calidi.*

Vel: ℥. Conserv. menth. ʒj.  
terr. sigill.  
corall. r. præp.  
crystall. præp. an. ʒβ.  
laud. op. gr. ij. c. q. f.  
syr. corall. F. Bolus. D.

Tandem ℥. Ebor. f. Δ. vel  
unicorn. ver. præp.  
crystall. præp. an. ʒj.  
bol. armen. ʒj. ad ʒβ.  
laud. op. gr. vj. Misc. f. ℥, qui propinetur in seq. vehiculo:  
℥. aq. menth. ʒjv.

cinam.  
ess. theriacal. ʒij.  
syr. corall. ʒvj. ad ʒj. M. in hoc capiatur ℥, subindè hauriatur unum vel alterum cochleare ejusd.

*Externè* in Cholera ea conducunt, quæ in primis stomachum respiciunt, quæ inter eminet V *camphorat.* cum panno vel linteis multiplicatis, quàm calidè ferre potest æger, regioni epigastricæ admotus. Vel ℞, ex tempore V *ab herbis cordialibus & aromaticis* rectificatus, cujus singulis addatur ʒiijβ. *camphora*, quo ipsum linteum multiplicatum calidum celeri manu humectatum applicetur. Hoc ipso æger, qui per quatuor dies pertinaci cholera suprà & infra etiam gravissima remedia rejecit, curatus fuit. Alia etiam suprà in vomitu laudata hinc sunt proficua, speciatim *panis tostus vino generoso intinctus*, & *pulveribus aromaticis adpersus.*



Quoad *differentias* causarum, choleram inducentium, si à veneno sit corrosivo, jam supra dictum fuit, quod oleosis & pinguibus, item absorbentibus curanda veniat. Si oriatur cholera ex hypercatharsi; tum solum laudan. opiatum, tanquam præsentissimum remedium confert: aut

℞. ess. Theriac. ʒij.

Opī ʒss. ad ʒi.

Mista propinentur ad gutt. 40. quoties necessitas postulat. Vel alium loco *theriaca* in haustu vini generosi calidi, aut vini absinth. confert. Dos. ʒj. ad ʒij. Sin à fructibus horais sit malum, præter blanda abstergentia, eorumque colluviem evacuantia, conducunt præcipitantia dicta, nempe terrea fixa, item C. C. ust. ac salia lixivialia, ad imitationem nempe cerevisiæ vel multi effervescentium impetuosi, dictis mediis cohibitorum.

## DE LIENTERIA.

Ad *Diarrheas* sive alvi fluxus pertinet etiam *Lienteria*, quæ est *Diarrhea assumtorum*, hoc est, quando assumpta, prout fuere ingesta, per alvum egeruntur. Jam verò, cum in naturali statu ad legitimam digestionem requiratur, ut fermentum digestivum debite dissolvat, & alteret alimenta, ut convenienter eadem retineat, sanè ex contraria causa necessario oritur *Lienteria*. Nempe I. quando fermentum digestivum stomachi aut omnino deficit, aut iners est, aut ex retentis variis impeditum. II. Quando tanta pylori est laxitas, & è contra reliquarum ventriculi partium irritatio, ita ut pylorus non debite retineat, quin potius assumpta dilabi ex se patiatur, quam revera excernat. Idque imprimis, si cum hac pylori laxitate vel lenissima conjungatur irritatio stomachi & molestia, *Lienteria* insequitur, adeoque causa ejus investiganda, vel in fermento non digerente, vel in pyloro non retinente. Hinc est, quod observata fuit *Lienteria* admodum contumax ab ulcere ventriculi. In hoc etiam non tantum notabilis alteratio fermenti digestivi, & ob id imminuta digestio; sed præter ea etiam ventriculus ulcere continuo irritatus, quolibet assumpta mox ejicit. Vid. *Forest. l. 22. obs. 30.* qui curavit hanc *Lienteriam*, ulcus primò mundando per aquam mulsam, & decoctum hordei cum melle rosaceo; postmodum idem adstringendo & consolidando cum decocto rad. symphiti, terra sigill. vel cum lacte vaccino, item pulv. equiseti &c. Similiter *Gabelhoferus cent. 2. obs. 47.* *Lienteriam* observat ab irritatione ventriculi, ab acriore humore in eodem retento natam, unde omnia porulenta in ea forma, quâ assumpsit, per alvum egressit, curatus tamen est imprimis per abstergentia & temperantia, imprimis sero lactis. Nimiis etiam potus ad *Lienteriam* disponit, idque ob nimiam pylori laxitatem, cujus fibræ relaxatæ non possunt sufficienter se constringere, unde assumptorum præmaturus effluxus, sicuti



sicuti refert *Deodatus in Valetudinario* p. 28. se istud in puella nimis siticulosa observasse. Denique *scorbutus* non raro conjunctam habet *Lienteriam*, uti primus quidem annoravit *Barbette*, cum tamen crebrius in praxi occurrat, ut talium excrementa referant antea ingesta: scilicet acriora salia, tam cum saliva, quam per membranam stomachi glandulosam ad ventriculum delata, eundem vitiosam impressione irritant, & hinc ad præmaturam excretionem stimulant. *Lienteria* igitur diu durans, uti tandem *atrophiam* & *tabem*; sic necessario *virium prostrationem* secum infert, ut taceam, ad *cachexiam* quoque eandem disponere. Deinde *Lienteria*, quæ supervenit *gravioribus morbis*, sive acuti, sive chronici fuerint, similiter ægrum ad *tabem* disponit, dum difficulter curatur.

In *CURA* stomachus vel roborandus est, & blandè adstringendus, tam aromaticis, quam moderatè acidis; adeoque pro hoc scopo conveniunt omnia illa, quæ tam in *anorexia*, quam *apepsia* fuerunt insinuata. II. Irritationem esse sistendam, tollendo causam vellicantem, præsertim temperando acrimoniam humorum quorumcunque, & sapiendo ventriculi sensum. Adeoque pro hoc scopo ea, quæ in vomitu, cholera, aut *Diarrhæa* fuerunt laudata, locum inveniunt.

Pro his scopis melius obtinendis notandum? I. quod in præsentia excrementorum ventriculi pituitosorum aliorumve vitiosorum retentorum convenient *vomitoria*, sed ea debent esse lenia: fortiora enim aut quantitate aut qualitate, v.g. oleaginositate, stomacho hostilia, tonum ventriculi laxant, aut certè malum irritant. Quod si minus purgatio per superiora locum habeat, fiat *evacuatio per inferiora*; blandiora nempe, & quæ, præter vim *abstersivo-laxativam*, simul non nihil adstringunt, & stomachum roborant, uti sunt *aloetica*, *Rhabarbarina*, *myrobalani* &c. Sic *Helidius Paduanus obs.* p. 126. puerum trium annorum, cibos nec quantitate nec qualitate mutatos excernentem, per *℥j. rhabbarbari* cum vino ante cœnam adhibiti curavit. *Pilula* pariter *masticina* ad gr. xv. vel *℥j.* tuto possunt ordinari.

II. Si metus vel suspicio *veneni* adsit, hoc per convenientem viam evacuato, *alexipharmaca*, aut venenum specificè corrigentia imprimis conducunt. Quod pariter observandum, si *Lienteria* ex *fungis*, vel *fructibus horæis*, similibusve occasionibus externis fuerit excitata, ut appropriatis obviam eatur.

III. Observandum monitum *Foresti lib. 22. obs. 22.* quod in hoc fluxu debemus cavere à fortioribus medicamentis, & etiam à magnâ dosi, unde præsertim loco purgantium in genere procedendum est, quantum possibile, cum iis, quæ participant stypticitatem aliqualem. Interim in principio debemus uti iis, quæ fluxum restringunt, quia talia subinde fiunt causa majoris fluxus.

Quod attinet remedia, conveniunt *stomachica* aliquoties citata, *absynthium*, *mentha*, *salvia*, *nux moschata*, *macis*, *zinziber*, *cydonia*, *messila condita* &c. Sic *Faber* refert *Lienteriam* curatam, præmissa purgatione, cum aqua cinamomi &c.



*syr. corall.* Hinc *coralliata*, & speciatim paulò elegantiores *corallorum Tinctura* in Lienteris sunt optimæ, cum ratione participationis substantiæ corallorum acre quodvis temperent; ratione menstrui stomacho ut plurimum grata sint. Item *nux moschata* in India condita; *Elixir propriet.* præsertim sine acido. *Spiritus mastichis* & *syrupus mastichinus Timæi* in *Epist.* p. 456. item *ἐν πόντισον Foresti* l. 22. obs. 28. qui ex Lienteria desperatè decumbentem, cum alia non juvarent, restituit. *℥. vitellum ovi*, & *unius nucis moschat.* inspersum, illudque supra regula ignita assando, cujus ulu æger convaluit. Unde *ἐν πόντισον Helmont.* ex *Vitello ovi indurato*, cum *aceto* etiam locum inveniet. Alumen legitimè usurpatum, ceu præsentissimum commendatur à *Platero in observ.* Unde *mistura* supra ubi de vomitu commendata, & hic notanda. *Vinum absinthites chalybeatum*, it. *vinum infusionis absinthii, melissæ, menthæ, &c.* legitimo usu erit proficuum. Item *panis biscoctus* in *V* maceratus, hinc *theriacà* illitus & comestus etiam convenit. Denique *miva cydoniorum aromatica*, cum pauca *terr. sigill.* mixta usurpanda venit. it. *Diascordium Fracastor.* Ex his facilè est plura componere. Eminent imprimis *Electuarium*, quod habet *Sennertus de Lienteria*:

Vel *℥. Conserv. rosar.* *℥ij.*

*Theriace.* opt. *℥ij.*

*℥. Ol.* gutt. viij.

cum *miva cydon.* aromat. *F. Elect.* de quo manè detur portio nucis juglandis instar, desumptum ex *Amat. Lusitan.* qui *cent. 2. cur. 56.* hoc solo senem Lientericum curavit.

*℥. Conserv. menth.* *℥. lat.* *℥ij.*

*Diascord.* *Fracast.* vel hujus loco

*Theriace* *℥ij.*

*terr. sigill.* *℥ij.*

*ol. destillat. cinam.* gutt. *℥iv.*

*fucci cydon.* q. s. *F. Electuar.*

Aliquando cuidam ex scorbuto affectu q. s. lenterico laboranti præscripsi:

*℥. Corall. r. præparat.*

*terr. sigill.*

*lap. S.* præp. an. *℥ij.*

*sal. armoniaci* gr. *xv.*

*rad. galang.*

*zinziber.*

*cubebæ.* ana *℥ss.*

*fucci cydon.* q. s. pro *Electuar.*

*Externè* convenit *sacculus* pro fotu in vino coctus applicandus, præsertim in laxitate stomachi:

*℥. Co-*



℞. Comar. absinth.  
 herb. menth. an. Mj.  
 flor. rosar. rubr.  
 chamom. an. Mss.  
 mastich. ʒij.  
 nuc. moschat.  
 caryophill. an. ʒj.  
 zinziber.  
 zedoar. an. ʒss.

M. insuantur sacculo, qui si non suffecerit, usurpetur *cataplasma ex fermento cum aromaticis*, supra, ubi *de vomitu*, laudatum.

Alia pariter externè contra *vomitum* hic cum fructu usurpari possunt.

## DE FLUXU CHYLOSO, five COELIACA PASSIONE.

*Ad alvi fluxus* ulterius pertinet *fluxus*, seu *Diarrhœa chylosa*, quæ communiter dicitur *Cœliaca passio*, seu *affectio*: quando nempe alimenta assumpta in chylum quidem mutantur, sed hic cum excrementis unâ per alvum egeritur.

*Duplex* hujus cœliacæ *fiendi est modus*. I. quando *chylus* non lecernitur à facibus in intestinis, unde excreta grylea, plus minus albicantia, invicem permixta apparent. II. quando fit quidem secretio chyli ab excrementis; cæterum, propter defectum distributionis chyli, hic cum excrementis confusis nihilominus excernitur. *Prims* fit ex *vitiio bilis*, quando nempe non deferitur ad intestina, ut ibidem possit instituere secretionem istam, uti obvium est in ista icteri specie, in qua obstructus est ductus cholidochus, quia succus pancreaticus non potest perficere chylum, aut debitam secretionem instituere sine bile, in qua maximum momentum situm est: aut licet bilis deferatur ad intestina, tamen hæc est iners, & in sua crassi vitata, inprimis nimis aquosa, unde nec tunc fit secretio excrementorum à chymo nutritio, hujusve debita perfectio. *Altera Cœliacæ* species erat quando fit quidem separatio chyli, sed nulla distributio. *Causa* est obstructio vasorum lacteorum in intestina hiantium, id quod fit inprimis à mucilagine viscida ac tenaci, dicta orificiola infarciante. In utraque hac cœliacæ passionis forma ventriculus videtur salvus, quia alimenta in chylum concoquantur: Interim tamen hoc non universaliter adeo asserendum, quin nunc magis, nunc minus salvus videatur, id quod docet curiosa observatio in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 63.* In hac nempe carnes, quia non bene in chylum perfectum digerendo transmutabantur, sed probabiliter nidoroso sapore corrumpebantur,

ciara



etiam inde factus chylus separationi ac perfectioni ulteriori in intestinis ineptus, fluxum chylosum concitabat, à piscibus vel aliis non idem patiebatur, quia melius digesti. Unde ipse chylus malè digestus, adeoque ineptus subeunda alterationi bilis, interdum ad fluxum cœliacum disponere potest: & quidem si vitio bilis, ejusve impedita actionis, fiat cœliaca passio, excreta per alvum sunt albicantia vel grylea; it. omnia invicem sunt permista, ut nullam secretionis cujusdam pateat vestigium: Sin vero obstructa officina vasculorum lacteorum malum inferant, excreta sunt tincta bile, flavescunt plus minus, & Chymus quidem separatus; sed cum excrementis hinc inde confusis apparet.

Quoad *Prognosin*, planum est, si diutius duret, ægrum atrophie metum & periculum incurtere.

In *Cura prioris speciei*, acuanda inprimis bilis est, iis quæ  $\Theta$  e volatili acris constant, adeoque plus minus amara sunt, seligendo inprimis stomacho similita vel accepta. In altera specie abstergendus est mucus, intestinorum partibus adherens. Utrisque his scopis satisfaciunt simplicia, aut aromatica odorifera, mentha, absinth. aut sapore acris prædita. Hinc ulterius agrimonia, radices aperientes dictæ, cichoreum, cujus amaror absterfivus hic est egregius. Conveniunt it. Tinctur.  $\varphi$  i acris, tam vulgaris, quam *Giata*, ex scoris nempe reguli  $\S$  ii parata: it. Tinctur.  $\varphi$  compos. locum invenient, cum alcali talis Tincturæ pluribus intentionibus hic satisfaciatur;  $\sim$  carminativus de tribus, in aq. mentha vel vino absinthit. usurpatus, vel  $\sim$   $\ast$  ci cum spir. cochlear. mistus, hic est fructuosus.

## DE DYSENTERIA.

Inter alvi fluxus depravatos primatum ducit *Dysenteria*. Hippocrates & veteres Scriptores, hoc ipso nomine semper intellexerunt fluxum alvi cruentum, & quodocunque per alvum sanguis fuit evacuatus, vocarunt *Dysenteriam*, exceptis saltem hæmorrhoidibus, quibus adhuc stat sua autoritas.

*Dysenteria* talis in genere ita dictæ 3. inprimis observanda differentia. I. Quando line intestinorum vitio, motu & impetu naturæ, ex quacunque causa sanguis excernitur. Quod facit, quando interdum splenetici aut melancholici sanguinem, tam per vomitum, quam per alvum rejiciunt. Pertinet huc Dysenteria Scorbutica notha, de qua vid. *Horstius in suis observ.* l. 7. obs. 35. pag. 393. Item, quando confusus sanguinis effluxus, suppressus in quibusdam locis, per alvum sibi viam quærit; v.g. quando in mulieribus ex  $\boxtimes$ ium suppressione Diarrhæa cruenta supervenit. Sic pariter ex ulcere mesenterii, it. ex ulcere pancreatis interdum diarrhæa cruenta oriri solet; cujus posterioris exemplum *Sylvius* in præxi refert.

II. Dy-

II. Dy-  
dicitur. &  
III. Q  
tione muc  
dicta Dy  
intelligat  
athæa fe  
Dysen  
torminib  
tormina,  
intestino  
scensu, a  
nuncint  
excernit  
cola sup  
vocatur.  
gine den  
tur, pro  
subinde  
id quod  
Nonnun  
aphthæ  
adhibiti  
unde do

Par  
nunc sec  
crement  
intensu  
dolor re  
nuia int  
magis er  
trinque  
3. Celer  
nuia int  
vicem se  
mutuo  
distin  
lant æg



II. Dysenteria species est iste fluxus, qui propter hepatis imbecillitatem fieri dicitur, & alias fluxus hepaticus dicitur.

III. Quando ob vitium intestinorum, cum torminibus & simultanea excretionem mucilabidi, plus minus purulenti, sanguis ejicitur. Et hæc est propriè sic dicta *Dysenteria*, prout hodiè id nominis venit, ita ut hoc ipso nihil aliud intelligatur, quàm Diarrhæa torminosa, plus minus cruenta, sicuti cæteræ Diarrhææ ferè semper sunt absque torminibus.

Dysenteria talisprehendit ægros cum insignissimis intestinorum doloribus & torminibus, antecedentibus plus minus alvi excretionibus; agmen tamen ducunt tormina, subsequuntur dejectiones, & quoties dejicitur alvus, ingens cruciatus & intestinorum depressio, cum dolore & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, adest. Dejectiones non sunt stercorosa; sed nunc simpliciter mucosæ, nunc intermixtis sanguineæ, nunc simpliciter sanguineæ; Quando sanguis simul excernitur, plus minus Dysenteria cruenta, *die rothe Ruhr* appellatur: si vero mucosa superabundent, aut solitaria sint, in specie Dysenteria alba, *die weisse Ruhr* vocatur. Adest subinde febris plus minus intenta, lingua subalbida, mucilagine densè obsita, & si vehementius æstuet corpus, nigra etiam & sicca observatur, prosternuntur vires insigniter, ægri sunt anxii & inquieti, sitiunt insigniter, subinde præcedente ulterius morbo, sanguis sincerus copiosus confestim effluit, id quod corrosioni majorum aliquot vasorum in intestinis argumentum est. Nonnunquam intestina inflammantur, indeque gangræna incurabili afficiuntur, aphthæ interdum fauces obsident, in primis, quando adstringentibus intempestivè adhibitis, suppressa fuit Dysenteria, afficitur successivè simul intestinum rectum, unde dolorosissimum tenesmus patiuntur ægri.

*Pars affecta* in Dysenteria sunt intestina, nunc crassa, nunc tenuia, idque nunc seorsim, nunc conjunctim: nempe dolor, locus doloris, tempus exitus excrementorum, & horum varia mixtio partem affectam denunciant. Tenuia enim intensius dolent, ac si cultis hinc inde discinderentur intestina, qui econtrà dolor remissior nonnihil, & obrusior est in crassis. 2. Locus doloris arguit tenuia intestina infecta, si nempe circa umbilicum, & in regione hypogastrica magis eminet dolor, econtrà in crassis affectis infra & juxta stomachum, & utrinque circa latera, secundum nempe coli ductum, magis tormina vexant. 3. Celer excretio post tormina, crassa intestina affecta; tardior vero excretio, tenuia intestina labefactata arguit. 4. Si tenuia afficiuntur, magis permixta invicem sunt excrementa, sanguis, mucus, &c. propter magnum iter, quod mutuo conficiunt: In crassis verò minus sunt confusa, ita ut aperta vestigia distinctionis à se invicem adsint. 5. Tenuia affecta magis ad vomitum stimulant ægros, præsertim quo propius respectu ventriculi afficiantur; crassa minus,



minus, unde & anxiosi magis sunt, & pejus se habent ægri in tenuibus affectis quàm in crassis.

*Causa* Dysenteriae est *velefficiens proxima formalis, vel materialis, seu occasionalis*. Illa est spiritus influus, sed occasione dolorosa ad praternaturalem impetum provocatus, & dolorum torminosorum, & excrementorum, & sanguinis ac muci profusionis primus autor & artifex.

Sed misso hoc ceu causa universali, *causa* imprimis *particularis seu occasionalis* irritationis talis consideranda venit: Hæc est *acre quodcumq; internum, velicans intestina*, ut propter irritationem continuam tandem & sanguis effluat. Hinc videmus, quod in hypercatharsi subinde sanguinis superveniat excretio. *Acre autem hoc in specie est acidum*, membranarum intestinalium nervis que inimicissimum: Unde v.g. hysterica purgat & facillimè dysenterias incurrunt, ob acres, acidos, erodentes succos. Et porro, ratione hujus causæ materialis, Dysenteria nunc morbus *particularis, nunc communis*: Hæc est *vel endemica, vel epidemica: hæc vel benigna, vel maligna*. Omnis autem *epidemica* solet esse *contagiosa, & nunc cum, nunc absq; febre* affligere. *Sporadica* Dysenteria *varias agnoscit causas, quodlibet nempe acre*, quod potentius irritat aut abstergit, aut plus minus ad excoriationem disponit intestina, talem dysenteriam infert. Sic, præter hypercatharses, præter hystericas, non rarum est, quod diarrhæis, si acutius affligant, superveniat Dysenteria. Sic ex uvarum esu, multi potu, & esu peponum, &c. facilis admodum est Dysenteria. Sic esus carniarum animalium cassâ fistulâ nutritorum ad talem Dysenteriam disponit. *Conf. Senn. in Prax. l.3. p.329.* ubi de Dysent. Sic *Æ*, pro cura luis *Æ* adhibitus per inunctionem, subinde alvi fluxum cruentum ac torminosum infert. Sic ulcus pedum diuturnum curatum Dysenteriam intulit lethalem. *vid. M. A. N. C. Ann.2. p.314.* Sic Dysenteria lethalis ex esu brassicæ capitatæ noxio rore infectæ refertur in *M. A. N. C. Ann.3. p.143.* Ufus aceti in plumbeo vase asservati, vel etiam aquæ in canalibus plumbeis diutius asservatæ: it. post diuturnam siccitatem, & inde hinc inde efflorescentiam candidam in canalibus plumbeis testorum superveniente pluvia, & flore isto ita abrafo, Dysenteriam in Belgio ortam observavit *Lindannus*. Cibi dulces, saccharati, melliti, dum vitiosa fermentatione impensè acescunt, quin & sui miscela bilis orgasmum excitant, Dysenteriam interdum inducunt. Ex Adamante devorato dysenteriam natam refert *Zacut. Lusit. l.1. prax. admir. obs.18. it. l.2. obs.16.* ex Adamante imposito devorato cruentam dejectionem, tabem & mortem *idem* annorat. Innoxie tamen deglutitos Adamantes, & eorum semper pro Dysenteriae cura adhibitum refert *Wormius in Musæo, p.103.* Scilicet, exacte figuratus adamas innoxie devorari potest, cujus sensilia frustula, propter angulorum acutiem incidendo & perforando intestina, revera nociva sunt.

Quoad



Quoad *Endemiam* Dysenteriam, nullibi hujus mentionem factam observavi, præterquam in *Sydenham, observ. circa morbos acutos* p. 247. f. 4. c. 3. qui talis endemicæ Hybernorum Dysenteriae mentionem facit.

*Epidemicam* quod attinet, hæc omnium frequentissima est, & autumnali præsertim tempore, aut hujus confiniis solet affligere. *Oritur ab acri acerrimo, intestinis specifico sui sapore insensibilissimo, eoque subinde minimo, efficacissimo, adeoque saltim fermento subtili tot mala inferente.* Hoc nunc acrius est, & gialis, aut helleborinæ, vel colocynthideæ quasi prosapiæ, nunc mitius; unde *nunc maligna, nunc benigna, utraq; insigniter contagiosa.* Mirabilis est & efficacissima hæc vis contagiosa, mirum in modum se propagans. Non enim solum per latrinas communes promptissime inficit; sed etiam notatu dignum est, quod observat. *Helidæus Paduanus in observ. 104.* per clysteres etiam eandem communicari. Dysenteriarum hujusmodi epidemicarum plus minus malignarum exempla frequentissima sunt, inprimis *vid. Tr. de fluxu epidemico la Moniere.* item *Willis in Pharmac. rat. part. 1. p. 119. & 125.* item *Schenckius l. 6. observ. Amat. Lusit. cent. 3. cur. 90. Bartholin. cent. 2. hist. 65. & c.* Rarum est, quod refert *Salmuth. cent. 3. obs. 55.* de canibus & felibus saltim dysenteria contagiosa & maligna laborantibus. *Oriuntur* hujusmodi *Epidemicæ Dysenteriae* præter aërem plus minus præternaturaliter alteratum, inprimis ex aquarum vitio, ac fructuum horarum corruptela & inquinamento.

Quoad *Symptomata*, horumque originem, *dolor* acerrimus, qui dysentericos torquet, non est promiscuè ex corrosione aut exulceratione intestinorum; sed maximam partem *consistit in spasmodica intestinorum convulsione*, quâ intestina irritata spasmò quodam correpta se contrahunt, aut motu quasi vermiculari se torquent, sub quo tam insignes sunt dolores, & quidem præcedunt excretionem, dum sub tali spasmò intestina simul propellunt & exprimunt contenta, & ita excretionem stimulant.

Quoad *excreta* Dysenteriae: *Sanguis* equidem ex vasīs, vel anastomosi, vel diarrhesi apertis profluit, *mucus* vero quid præcisè sit, controversitur. *Sanguis*, qui profunditur, non est præcisè ab excoriatione aut exulceratione intestinorum, ut vocant: Nam utut hoc in benigna, ab acrimonia succorum acido-corrosiva simpliciter oriunda, locum habeat, in maligna tamen, & in qua tantillum saltem miasma acre, contagii medio propagatum, causæ proximæ vices obtinet, non opus est tali excretionem. Sufficit, ab istius contagii acerrima, & intestinis inimicissima, acrimoniâ continuò & tam fortiter stimulari intestina, ut hac ex irritatione & crebriori contractione tandem proprium cruorem fundant & exprimant, simili modo, atque à pulvere sternutatorio fortius velliantur nares, & mucum crebriorem, & tandem largam hæmorrhagiam fundunt



fundunt, ita ut cruoris profusio sit saltem consequens, & effectus alterationis in intestinis, nempe spina alicubi infixæ, ex doloris occasione affluxum sanguinis uberiolem, indeque, ubi denegatur hæc excretio, tumorem facit. Similis spinæ est tantillum acré alicubi rodens in benigna, vel miasma virulentum intestino hostile in epidemica & maligna. Hinc vellicatis intestinis, & horum repetiti spasmi, & insignior sanguinis affluxus excitantur, unde tumenibus sanguine intestinis eadem rubent, & non raro inflammantur, & per aperta partim, partim erosa vasa cruorem profundunt. Nempe hoc est indignatio Archæi intestinalis, cruorem proprium furiose profundentis, ex irritatione ab occasionali fermento, uti loquitur Helmont. *Mucus*, qui unà excernitur, non sanies est, aut pus: ut utralia in graviore & diuturniori Dysenteria interdum observari soleant. Unde sunt, qui putant, quod nil sit aliud, quàm pituita, quæ naturaliter oblinat parietes intestinorum, quod tamen esse nequit, propter nimiam, quæ subinde excernitur, ejus copiam. Rectius igitur sentire videtur Helmont, qui dicit, destillare talem mucum ex intestinis læsis, ac nil esse aliud, quàm nutrimentum intestinorum proximum, intestinis non rectè assimilatum, sed quod successivè ex intestinis plorat, nunc sub forma muci, nunc feri cruenti, &c. prout diversi sunt gradus corruptelæ dicti alimenti proximi. Etenim in Dysenteria imprimis observandi tres gradus: I. Quando saltem adsunt tormina cum excretionem mucosa, cruenta incipiente. II. Quando copiosus mucus plus minus præternaturalis excernitur, idque vulgò dicunt esse abrasionem intestinorum. III. Quando in tantum malum augmentum suscipit, ut intestina ad perfectam exulcerationem disponantur.

In abrasione ista triplex gradus est observandus, secundum ista nempe, quæ unà cum muco interdum excerni observantur: 1. Abrasio bombycini velamenti. 2. Quando tunica crassa frustulatim excernitur. Hippocrates solet vocare ramenta, aphor. 67. sect. 7. 3. Quando ipsa substantia intestinalis eroditur, & tunc exeunt carunculae, ut dicit Hippocr. sect. 4. aphorism. 26. *Carunculae* tales, quarum passim apud Authores fit mentio, quid sint, explicatu obscurum est. Sanè substantiæ intestinerum membranosa non videntur esse; potius glandulae intestinales tumefactæ, & morbi progressu à substantia intestinerum separatæ, & ita exeretæ, carniarum seu molecularum carnosam speciem referentes.

Tandem, an sit exulceratio in intestinis Dysenteria affectis, uti vulgò asseritur, merito dubitatur. Et rectè hoc negat Holderhoff. *Tract. de Err. Med.* p. 33. ex eo, quod aliàs Dysenteria cura per specifica tam citò fieri non posset. Ut taceam, tantum non impossibilem curatu videri talem exulcerationem, cum aliarum partium membranarum exulcerationes ut laryngis, item fistula ani, sint ut plurimum incurabiles. Ergò non nisi in diuturniori Dysenteria, eaque graviore, tandem excoriatio, & forsan aliqualis exulceratio locum habebit, quæ in ordinaria non statim statuenda erit.

Quoad



Quoad *Prognosin*, hanc in pauca contraham; nempe quo magis *tenuia* afficiuntur intestina, eò periculosius laborat æger & contra. Considerandum etiam, an Dysenteria habeat febrem, it. an adsit vomitus. Sanè omnis Dysenteria, præsertim epidemica, cum febre juncta, periculosior esse solet, quàm quæ est sine febre, & quo *malignior* hæc fuerit: Siquidem & *Petechia* in febribus talibus observata fuerunt. In Dysenteria quasi *pestilentiali* eò periculosius laborat æger. Ista Dysenteria, quæ cum vomitu affligit, & qui ferè jungi solet cum *singultu*, est deterrima, cum periculum subsit, ne ipse stomachus simul plus minus affectus sit. Dysenteria, in quibus *excreta* sunt *viridia*, *nigra* aut *varia*, aut admodum *graveolentia*, sunt pessimæ. It. Dysenteria, quæ *ab atra bile* incipit, exitiosa est, teste *Hippocr. sect. 4. §. 22. & 24.* Si Dysenteria *ruetus* superveniat, vel *crepitus ventris*, bonum signum est, scil. redeuntis suo modo fermenti digestionis. *Convulsiones* ac *deliria* dysenteria supervenientia mortem significant. Si Dysenteria laboranti *veluti caruncula* deiciuntur, lethale est, teste *Hippocr. s. 4. §. 26.* Dysenteria *indolens* sæpe mali est ominis: *ægyptiorum* enim seu gangranam intestinorum, indeque inductam insensibilitatem ostendit. *Conf. de Dysent. epidemica*, quibusdam indolente *M. A. N. C. Ann. 2. p. 82.* it. *Art. Medic. Hafniens. vol. 2. p. 138.* *Rhodus cent. 2. obs. 88.* In Dysentericis vomitus *biliosus* in principio morbi periculosus. *Conf. M. A. N. C. Ann. 8. p. 106.* Dysenteria, si est *symptoma febris malignæ* aut *variolarum*, periculosa, & fere lethalis. Dysenteria *supervenientis febris*, aut quæ aderat, si *intenditur*, malum, quoniam inflammationem aut insignem intestinorum corruptelam ostendit. *Lienteria* superveniens Dysenteria admodum mala. *Aphthæ* Dysenteria supervenientes, ut plurimum lethale indicium. *Singultus* Dysenteria in progressu morbi superveniens, perquam malus, in principio non adeò funestus. Si in Dysenteria *post aurem sinistram*, vel dextram *nigra macula*, vel *tubercula* appareant, æger citò moritur. *Gravida* Dysenteria laborantes, in summo sunt abortus periculo. Sin vero partus superveniat legitimus, subinde Dysenteria liberantur. *Conf. de Dysent. gravid. Forest. l. 22. obs. 34.* it. *Amat. Lusitan. cent. 2. obs. 51. & M. A. N. C. Ann. 3. p. 22.* *Veneris exercitium* Dysenteriam curat, id quod *Riverius* in praxi notat ex *Amat. Lusit. cent. 2. cur. 47. qui refert quendam Dysenteria epidemica laborantem, celebrato cum uxore coitu, sanatum.* Quoties in Dysenteria *tenesmus* adest, cum *hiatu ani*, ita ut *clysteres* injecti statim elabantur; aut cum tanta *adstrictione*, ut nil intromitti possit, plerunque mortis signum; nempe hic *tumor*, illic *paralytica constitutio* ex virtutis animalis prostratione adfuit. Qui ex Dysenteria intereunt, præcipuam *mortis causam* habent *gangranam intestinorum*. *Conf. River. cent. 3. obs. 2.* Ac sanè quidam Dysenterici ante mortem absq; pulsu toti algidi, adhuc tamen de interiorum intensissimo æstu interdum conqueruntur. *Conf. M. A. N. C. Ann. 8. p. 106.* Plura quoad *Prognosin* vid, præter *Sennert. de Dysent. in specie in la Moniere de fluxu Dysent.*



Quoad *Curam*, in genere pro meliori medicationis ratione, atq; scriptorum Practicorum utiliori lectione observandum ante omnia, an benigna, an vero maligna fuerit Dysenteria. it. an à causa interna vel externa, & hæc vel assumtis acerbis, &c. vel contagio nata fuerit. Nempe epidemica non sunt præcise malignæ, id quod notatum in *M. A. N. C. Ann. 8. p. 106.* Et ex his considerationibus variationis Dysentericæ variat subinde apud Practicos medicandi ratio, uti patet legenti *la Moniere, Willis. Pharm. Rat. Sydenham in observ. de morbis acut. &c.*

Quoad *Methodum medendi* igitur I. irritatio intestinorum sistenda, tam acre vellicans corrigendo, quam opiatum sensum irritationis, indeq; provocatum tum impetum compescendo. II. Præcipitantibus seu absorbentibus ac blandè sudoriferis in maligna miasma contagiosum eliminandum, vel blandè abstergentibus, laxantibus in benigna intestina abluenda. III. Noxa intestinis illata vulnerariis adstringentibus ac similibus restituenda. *Methodus* hæc diversa est ab ea, quæ communiter traditur. Siquidem *vulgò* respiciunt tantummodo productum morbosum, nempe exulcerationem intestinorum, non autem respiciunt radicem morbi, seu id, unde morbus oritur. Unde communiter (1.) evacuunt intestina purgando. (2.) abstergunt clysteribus. (3.) sedant dolorem. (4.) purificant ulcera. Sed in hac methodo, qui evadunt ægri, naturæ non artis beneficio hoc obtinent.

Pro istis scopis obtinendis observandæ sequentes *Regule* :

I. Inter *remedia*, quæ acre vellicans corrigunt, sunt ea vel generalia, istud aut obtundentia, ut lac: aut absorbentia, ut corallia; vel specialia, specificum saporem dysentericum corrigentia, ut priapus ceti, &c.

II. *Opiata* utramque faciunt paginam, sed appropriatis debite mista. Multi equidem narcotica in Dysenteria proclamant, sed falso; quin potius *Lindannus* semper ab anodynis & narcoticis incipiendam curam suadet. *Conf. Willis in Pharm. rat. vol. 1. p. 128. & 300. it. Hoferus in Hercul. Medic. p. 194. Barbett. in prax. l. 4. c. 5. p. 180. Wedelius in opiolog. p. 121. Riverius cent. 1. obs. 64. & cent. 2. obs. 84.* Cæterum raro danda sunt sola, sed potius aliis, præsertim appropriatis, it. sudoriferis misceri, aut, si opus sit, leni abstergenti medicamento, Rhabarbaro v. g. jungi debent.

III. *Sudor* tam per se, quam diaphoreticis provocatus, in Dysenteria Epidemica, plus minus maligna, probe attendendus. Sanè ante aliquot annos, cum in tota regione grassaretur Dysenteria Epidemica, Pastores pagani suos rusticos curarunt sudoriferis, præsertim Tincturâ bezoardicâ, Eodem tempore quidam rusticus, & ipse laborans dysenteria malignâ, accepit balsam.  $\frac{\text{ss}}$  is gut. 20. ac sæpius repetito sudore fuit curatus. Hinc *Petrus in suis Dissert.* inquit: Hermetici dysenteriam non tam purgantibus, quam diaphoreticis extinguendam censent. Et ipse *la Moniere* refert, primis morbi diebus in ista Dysenteria Epidemica sudor spontè



spontè prodiens, vel debitò sudoriferorum usu prolicitus, plerunq; fluxus violentiam intercept, serosis humoribus foràs propulsis.

IV. *Laxativa* parum vel nil valent, aut si in principio morbi laxativum propriatum fuerit, mox ab hujus facta operatione opiatum subjiendum. Nempe quoad abstergentia primas vias ac blanda laxantia, habenda simul ratio tam subiecti patientis plus minus cacochemici, quàm causæ antecedentis, an sit assumta, an sit contagium, &c. idque tam propter impetum dysenteriae majorem vel minorem, quàm propter alia, in subjecto cacochemico metuenda, symptomata. Cacochemiam igitur in principio convenientibus laxare, non inconueniens est: uti & si à fructibus horæis malum ortum fuerit; contrà, si contra. Item minus purgandum est in contagiosa, magis in benigna. Quando itaq; primæ viæ abstergendæ, ac alvus blande laxanda est, fiat in principio, vel rhabbaro vel sero lactis, &c. de quibus infra. In progressu morbi penitus abstineamus.

V. *Clysmata* rarò usurpanda; omnia enim qualiacunque fuerint, ceu aliquid peregrinum, intestinorum sensum plus minus irritant, & sic facillè malum exasperant. Conveniunt igitur saltem (1.) in benigna, ubi eluendæ sordes. (2.) ubi temperanda acrimonia. (3.) ubi necessaria consolidatio. (4.) quando malum est in crassis. (5.) quando nimis affliguntur tenuia intestina superiora & pylorus, ut quasi per accidens revulsorio stimulo liberentur intestina superiora.

VI. *Stomachi in tota cura summè habenda est ratio*, non secus ac in quibusvis alvi fluxibus, cujus ratione vinum, præsertim in juncto vomitu, non nocet, absolute consideratum; acoris vero ratione nonnihil suspectum videtur. An. 1666, cum Dysenteria maligna epidemice grassaretur in Misnia, præsertim ruri, observatum fuit, potum vini conducibiliorem fuisse agris potu cerevisiæ, eumq; citius retentum, nec adeò subito per vomitum fuisse rejectum.

VII. *Venesectio* pariter exulet, adeoq; nemini auctor sum, ut imitetur Sydenham in observ. de morb. acut. p. 251. s. 4. c. 3.

VIII. *Adstringentia*, ut talia, nil valent, potius nocent. Siquidem non relaxata, sed irritata sunt intestina; inprimis nocentissima sunt intempestive, h. e. ante appropriata & alexipharmaca in maligna, & ante abstergentia laxativa in benigna exhibita. Sic etiam ex dysenteria intempestive suppressa Paræsin notat *Velschius de Agagropilis dissert.* 2. pag. 16. Sic ex dysenteria malè curata & suppressa, inflammatio & abscessus Mesenterii periculosus, auctore *Martini, de morbis Mesenterii*, pag. 47. Sic in quos morbos Dysenteriae, adstringentibus suppressæ, subinde desierint. vid. in *Hildan. cent. 3. obs. 42. & 46.*

IX. *Sedulo caveant agri, ne corpus refrigerent*, sed, quantum possibile, calidum illud, & blando madore irroratum conservent, præsertim pedes:

Nam



Nam quo calidiora conservantur extrema, eò melius habent ægri. Si vero tantillum refrigerentur, præsertim pedes, acerbiores superveniunt dolores. Eadem ex ratione à frigida potu, quantum possibile, abstineant: Simul enim atque potus non calidus ingeritur, subito tormina & alvi excretio crudeliter superveniunt; hinc juscula decoctionis gallinarum sæpius sorpta, licet minùs grata, sunt tamen summè proficua.

X. Ultimò *quieti sint ægri*, & omnem corporis jectionem intermittant. Sanè referente *la Moniere cap. 6. p. 104.* quies tantæ fuit utilitatis, ut, qui statim à morbi principio decubuerunt, nec designati sunt in lecto, vel in pulvinari, vel super lineæ deicere, morbi violentiam facilè superarent. Plures cautiones ad Praxin facientes vid. in *Willis. Pharm. rat. vol. 1. p. 131. 132.* item *Septalio in caution. & animadvers. medic. p. 220. l. 7.* it. in *Holderhoff. de err. Med.* ubi de Dysenteria.

*Remedia igitur specifica*, quæ in specie acre Dysentericum corrigunt, sunt varia: imprimis se offerunt *priapi cervi, Tauri & Ceti*, quorum *cetanæus* est optimus. Usurpantur tam in forma sicca, quàm in forma humida. Exiccati nempe raduntur & comminuuntur, ac ita in ꝑis forma ad ꝑj. propinantur in jusculo calido. In forma humida præparatur horum priaporum decoctum, quod ita crebrius haustum, tam pro potu & pro vehiculo remedium, quàm pro liquore, cum quo præparentur emulsionem ex amygd. sem. papav. &c. inservire potest. v. g.

℞. Decocti priapi cervi ℥j. jß.

Syr. corall. Querc. ꝑij.

aq. cinam. ꝑj. M. pro julepò crebrius hauriendo.

Jungantur etiam his alia. v. g.

℞. Terr. sigill. ꝑjß.

C. C. f. Δ.

rasur. priap. cervi an. ꝑj.

ꝑ rad. torment.

corall. r. præp. an. ꝑij. M. f. ꝑ. Dos. ꝑj.

Pertinet huc Gelatina CC. recens, tam in potu ordinario dissolvenda, quàm in Julepis propinanda. v. g.

℞. Decocti rad. scorzon. c. CC. vel  
priapi cerv. ℥j.

Gelatin. CC. ꝑj.

aq. cinam. ꝑvj. M. f. Julepus.

Quin & ex *Priapis* ipsis parili modo, ac ex *cornubus* Gelatina præparari, ac crebrius propinari potest: Sunt enim hi Priapi concretum quasi medium inter cartilagineas & ossa. Hinc decoctum CC. cum rad. pimpinell. pro potu quidam commendant. *Ossa & cornua animalium* quorundam etiam in Dysenteria sunt egregia,



gia, partim sine  $\Delta$  præparata, partim & usta: Usta quidem, qualiacunq; sint, coincidunt vi absorptiva, temperativa, & diaphoretica: Sed & non usta conveniunt. *Rasura cranii humani* ex homine violenter interfecto ad  $\mathfrak{zj}$ . propinata, & hujus ratione etiam *usnea cran. human.* ad gr. xv. nobilissimum habetur anti-dysentericum: Hinc *dens Hippopotami* præparatus, & hujus loco *unicornu verum* præp. ad  $\mathfrak{z}\beta$ . propinata curant Dysentericos. *Sanguis leporis* singulare est specificum anti-dysentericum, nempe lepus à vertagis agitur, & ita sub pavore mortis constitutus jugulandus est, & sanguis linteo excipiendus. Linteum siccatum potui infusum curat Dysenteriam. It. ipse sanguis ita collectus exsiccatus &  $\mathfrak{z}$  sat. à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . nobile est remedium. Post hunc sanguinem non minoris usus est *sanguis pavidæ agni*, in articulo mortis constituti, hinc enim pavoris idea sigillat sanguinem totum, ratione cujus remedium est contra Dysent. ut dicit *Helmont.* Usurpatur igitur  $\mathfrak{z}$  talis sanguinis à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . cum syr. cydon. addendo aliquantulum simul de lapide hæmatite. Ad specifica dicta & *hepar serpentum & viperarum*, præfert. in Dysenteria *epidemica maligna* egregium, si ritè exsiccatum &  $\mathfrak{z}$  satum, dos. gr. xv. ad  $\mathfrak{ij}$ . propinetur. v.g.

$\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$  hepat. viper.  $\mathfrak{z}\beta$ .

corall. rubr. præp.  $\mathfrak{ij}$ .

laud. opiat. ferment. gr.  $\mathfrak{ij}$ . M. pro  $\mathfrak{z}$ . dos.

$\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$  hepat. viper.  $\mathfrak{ij}$ .

extract. torment.  $\mathfrak{z}\beta$ .

laud. opiat. gr.  $\mathfrak{ij}$ . M. pro  $\mathfrak{z}$ . dos.

Anno 1669, Dysenterico, ex malo epidemico graviter laboranti, inter alia præscripsi cum successu.

$\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$  hep. viper. gr. xv.

cyst. præp.  $\mathfrak{ij}$ . M. F.  $\mathfrak{z}$  detur in triplo.

Prima dosis sumatur manè, secunda à meridie, tertia post mediam noctem in vehiculo sequenti,

$\mathfrak{z}$ . aq. tormentill.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

cinam.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ .

$\mathfrak{z}$  theriacal.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

Syr. de Symph. Fern.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . M. capiat cum dictis pulveribus, & aliàs etiam subinde cochleatim. *Hepata nempe Dysenterie maligne*, *crystalli vero præparati, acri*, ac speciatim bili porraceæ vel æruginosæ corrigendis *inerviunt.* *Hepata ranarum viridium* simili usu secretum Paracelsi anti dysentericum fuisse dicitur, cujus *fides sit penes authores.* *Ungula equina* exsiccata &  $\mathfrak{z}$  lata ad  $\mathfrak{zj}$ . propinata, vel, qui modus est *Helmontii*, ungulæ talis fragmenta in buryro frixa, & hinc  $\mathfrak{z}$  lata propinata, ceu nobilissimum habentur specificum. *Album græcum* deniq; seu *stercus canis* ossa rodentis egregium est remedium, pauper-



culis commendandum. *Uva quercina* singulare item est specificum, de qua videatur *Sennert. ubi de Dysent. p. 359. & Schenck. l. 3. observ.* in cuius defectu etiam *viscus quercinus*, & ab aliis *fungus quercinus* commode possunt substitui. *Pulvis granorum actes* est expertum à plurimis remedium. *Conf. Hartm. in Prax. Chymiatr. p. 191. it. Boreus cent. 2. obs. 40.* Optimus preparandi hunc sem modus est hic: ꝛ. Succi baccar. sambuc. q. v. ex quo & farina secalina conficiatur massa, è qua formetur panis. bis in fornace ad duritiem coquendus, ut in sem redigi possit. Ex quo pulvere ipso iterum cum succo baccarum sambuci formetur panis, ac priori modo coquatur, id quod tertia vice similiter repetatur. ubi tertia vice pulverisata fuit pasta, adde sanguinem leporis crudi ꝑ. jv. ꝑ. priapi celi ꝑ. ij. & succi granor. sambuci q. s. F. Massa, & ita denud in clibano coquatur & pulverisetur. Dos. ꝑ. in spargatur pani tosto vino intincto, & ita capiatur. *Pomum excavatum cum cera & gumm. arabico* repletum, assatum & comestum, itid. specificum antidysentericum. *Conf. Hartmann. in prax. chym. p. 196. item Horstium l. 4. obs. 20. item in problem. p. 70. decad. 6. q. 5. Sanè Amat. Lusitan. cent. 6. cur. 14.* multiplici *cera* usu curatam dysenteriam observat. Loco pomi communis melius est, si usurpetur *pomum cydonicum* maturum, idque non inconcinnum contra Dysenteriam remedium. *Conf. Valeriol. l. 3. obs. 4.*

Præscripti aliquando experimenti gratia:

℞. Gumm arab. ꝑj.

mastic. ꝑj.

laud. opiat. gr. ij. pulverisata indantur pomo excavato, ac murè assentur. Comestum pomum saporis erat admodum adstringentis, effectum tamen adeò singularem observare haud potui. *aq. suberata*, it. ꝑ. suberis combusti itid. huc pertinet. *Conf. Borell. cent. 1. obs. 57. & River. cent. 4. observ. 87. Tormentilla*, ejusque ꝑ. & decoctum. *Rob. sorbi* torminalis, & hujus defectu sorbi aucuparia, ceu ex Diarrhæa cognita præsuppono. *Unicornus fossile*, terr. Oli dulc. ex Glo Giali saltem desumta, quibusvis Gialibus longe præferenda. *Quæ Gialia juvant quidem*, ubi ab acido specialiter originem trahit Dysenteria, malumq; est levius, quia acidum saturant; In reliquis autem casibus, Dysenteria nempe contagiosa, aut maligna vel epidemica minus proficua videntur. ꝑ. huiusq; flores sunt præstantes. *Saccharum it. seu O B*, temperando specificè & corrigendo saporem dysentericum, non contemnendum. Tandem & alumin. contra dysenteriam cum aliis subinde usurpatur. v. g. ꝛ. Aluminis frustula magnitudinis pisi N. 3. propinentur in vino rubro calido. Alii ꝛ. Aluminis crudi ꝑ. cinamomi ꝑ. M. & hujus mixturæ ꝑj. in lacte vaccino. Tandem *opium* ceu universale nunquam in Dysenteria cura negligendum. Hinc etiam *Theriaca*, *Mithridat.* *Diascordinum* *Frascastor.* *Essent. theriacal.* *laudana*



landana quavis frequentem habent usum, quo pertinent etiam trochisci de carabe ad ʒi, mire prolunt in quovis sanguinis rejectu, adeoque in sanguinis sputo egregiu. Aliquoties admodum utilem observavi sequentem *misturam* (in Dysenteria maligna.)

℥. aq. plantag. ʒij.

cinam. ʒß.

aceti rosac. ʒij.

Dialcord. Fracast. ʒi.

Trochisc. de Carabe,

terr. sigill. an. ʒß.

ocul. ʒ. præp. ʒij.

syr. myrtini ʒvj. crebrius hæc cochleatim assumpta prodesse

solet. Vel ℥. Troch. de carabe ʒi.

ʒ hepat. viper. ʒi.

laud. opiat. gr. j. M. pro 2. dosibus.

addi possunt

ol. destillat. cinam. gut. ij. M.

Vel ℥. aq. plantag. ʒij.

cinam. ʒß.

Dialcord. Fracast. ʒi.

Troch. de carabe ʒij.

lap. hæmatit. præp. ʒi.

syr. card. bened. ʒß. M.

Hæc ferè sunt specifica. Progredior ad ea, quæ communiter solent usurpari in Dysenteria, qualia sunt omnia adstringentia, absorbentia, temperantia, ac aliàs in Diarrhæa, Cholera & vomitu usitata, it. quælibet vulneraria, inter dicta magis usitata sunt: Plantago, pimpinella, sanguisorba, lysimachia, fol. quercus, bursa pastor. millefolium, consolida maj. nymphaea, bistorta, roserubra, balauſtia, flores papaveris rhead. Bellidis, hyperici atq. dictorum folia, radices, semina, ac plurâ preparata. Hinc semen papav. plantag. it. mala cydoneorum, mespila, sponsia cynebat. nux mosch. &c. Hinc dictorum simplicium succi, syrapi, extracta, &c. In fine Dysenteria valde confert succus absinth. & mentha benè depuratus, & cum saccharo in syrupum redactus: Habet enim mentha cum absinthio mista miram vim corroborandi ventriculum. Imò si Dysenteria à multo fructuum usu contigerit, in ipso principio valdè conducit hæc syrupus de absinth. c. ʒ. cinamom. vel theriacali, ut dicit Riverius in praxi, ubi de Dysenter. Hinc essentia & syr. sympathi maj. essentia vulneraria, Extr. theriacale, Tinct. ʒis ʒli, Tinct. lap. hæmatit. it. bolus armen. terr. sigill. corall. succinum, crystall. præpar. ubi peccat bilis porracea, crocus & adstring. rubrica fabrilis, quæ multum de ore participat. Quidam



℞. Theriac. ℥j.

terr. Oli dulc. ℔℔.

ossium microcosm. calcinat. gr. xij. M. pro Bolo.

Itid. *Tinctura antiphthifica, thus, putamen ovorum, oss. sepia, &c.* Præ cæteris convenit lac crebrius usurpatum, in principio serosius, in progressu ipsum lac, præsertim chalybeatum, nempe tam medicamenti quam alimenti vices sustinet. De jejuniis ejusq; usu vid. *Holterhoff, loc. cit. p. 39.* it. quomodo in metu *coagulationes corrigenda*, & ne vitiosè concresecat, præcavend. vid. *Pharos Medicorum Bonetti ex Ballonio p. 426.* nempe in specie chalybeand. est, seu quinquies vel sexies ferrum ignitum in eo extinguendum. Mirè prodest tale lac in Dysenteriiis quibusvis, & eo efficacior erit hic potus, si singulis haustibus addatur ℥j. *stercoris canini*, M. exprimantur, & ita usurpentur. Sanè *Joël in praxi, & Mindererus in Medicin. militari* multis nominibus commendant hujusmodi *album Gracum*. Certum est, quod sit singulare in hæmorrhagiis quibusvis, etiam desperatis. Sanè rusticam mulierem, quæ ultra 4. septimanas hæmorrhagia uteri laboraverat, hujus stercoris beneficio curavi. Eò *præstantius evadit lac, si appropriata in eo decoquantur*; nempe lac chalybeatum, in quo radices symphiti maj. decoctæ, ter in die bono haustu propinetur ægro; vel lacti recenti chalybeato incoq. radix tormentill. & symph. an. ℥j. de quo ter ægro propinetur bonus haustus calidè. Si ipsum lac solitatum videatur incommodius, dimidio aquæ vel communis, vel cujusdam appropriatæ diluatur, invicem ebulliant, & ita crebrius propinentur. Qui *preservationis* gratia aliquid postulat,

℞. Theriac. Androm. ℥iij.

Rasur. priap. ceti ℥vj.

℥ rad. tormentill. ℥℔.

extr. ejusd. ℥iij.

unicorn. fossil. ℥iij.

℥ diaph. ℥℔.

laudan. opiat. fermentati gr. xv. c. f. q.

succy cydon. F. Elect.

℞. Diascord. Fracast. ℥℔.

ras. priap. ceti vel cervi ℥iij.

fl. æis ℥j.

trochisc. de carabe ℥℔. c. f. q. succy cydon. F. Elect. de quo

capiat æger manè, à meridie, &amp; sub introitu lecti, pro lubitu.

Quod si in principio morbi *primæ viæ abstergenda sint*, cautè hoc fiat, quandoquidem ii, qui in Dysenteria statim eunt ad purgantia, non curant, sed omnia deteriora faciunt: Qui vero prius sistunt spirituum impetum, ac tormina sufflamant, optimè curant, dicit *Lindannus*. Quando igitur ad incipientem Dysenteriam

teriam qu  
gationem  
xans, mil  
ter purgat  
præter vi  
cit. hinc

Laxant  
tius & c  
cuius ægi  
Fit inter  
compre  
cile ori  
cessibus  
In quoc  
entia, it  
compre  
Isti  
est male  
dia vul  
tum in  
Propina



teriam quis venit, dato anodyno, & hinc conciliato somno, eundem est ad purgationem, & blande saltem eluenda intestina, vel in principio detur blandum laxans, mistum cum opiato, vel præmisso laxativo, mox subjungatur opiatum. Inter purgantia solum est, quod tutum est, *rhabarbarum* & hinc *myrobolani*. Nam præter vim laxativam simul vim anodynam rhabarbaro tribuit *Holderhoff. loc. cit.* hinc

℞. Diascord. Fracast. ʒβ. ad ʒi.

Rhabarb. ʒlat. ʒj. ad ʒij.

c. s. q. Syr. de ros. sicc. F. Bolus. S. *Laxier, Zucker.*

Vel ℞. Conserv. ros. antiq. ʒj. ad ʒij.

ʒ rhabarb. ʒβ. ad ʒij. raro ad ʒj.

laud. opiat. gr. j.

Syr. ros. q. s. pro efformando Bolo.

Vel ℞. aq. plantag. ʒj.

cinam. ʒj.

ʒ rhabarb. elect. ʒβ.

Syr. de myrobolan. ʒβ. M. D. S.

*Laxier, Träncklein auff einmahl.*

Vel ℞. Rhabarb. elect. ʒij.

rosar. rubr. p. iij.

infund. in s. q. feri lactis, colatur. R. ʒij. vel iij. adde

Syr. de ros. siccis ʒij. ad ʒβ.

M. D. S. *Laxier, Träncklein.*

*Laxantia* talia commodius *manè propinantur*: *Somnifera vero seu opiata* tutius & consultius *sub noctem dantur*, quia raro de die agunt, noctu vero felicius ægri dormiunt. Ad hæc circa noctem ordinario exasperatur dysenteria. Fit interdum, ut Dysenteria correpti patiantur *dolorem gravativum obtusum, & compressivum sub umbilico*, quasi materia ibidem incuneata hæreret, unde facile oriri suspicio possit, quasi pathema hoc oriretur ex suppressis per opiata secessibus, quod tamen non est, quin potius *ex continuato spasma intestinorum*, in quodam loco pertinacius vellicatorum, *originem ducit*. Unde externe lenientia, item later calefactus abdomini applicatus molestissimum istum dolorem compressivum & gravativum in abdomine sistunt.

Istis hætenus recensitis, legitima methodo usurpatis, quando mitigatum est malum, pro restituendis intestinis *in declinatione morbi conveniunt remedia vulneraria*, quæ inter eminet *Bals. Peruvianus*, qui præter hoc, quod vomitum in Dysenteria molestum supprimat, etiam intestinis læsis mirè conducit. Propinatur in forma ʒis cum sacch. albo, coralliis mistus, vel in vitello ovi calide



lidè propinetur, in quo etiam dissolvitur, ʒß. pro dosi assumenda, sicuti etiam clysteribus felici cum successu addi solet. *Conf. M. A. N. C. Ann. 3. p. 127. & Ann. 8. p. 106.*

Conveniunt etiam *potiones vulneraria*, cum quibus commode & *bals. ʒi* tam terebinthinatus, quod juniperinus propinetur. v.g.

℞. Herb. heder. terrestr. Mij.

alchimill.

plantag. an. Mj.

summit. hyperic. florent. p. iij.

rasur. CC. ʒjß.

Cog. in f. aq. simpl. Colatur. ℞. Hb. i. adde  
syr. corall.

de symphit. Fernel. an. ʒj. M.

Assumatur subinde bonus hauustus, & cum hoc sæpius 6. vel 8. gutt. præterpropter bals. ʒi terebinth. vel anifat. Juxta hæc interna non negligenda externa, quæ inter imprimis subinde usurpanda veniunt clysmata, sed rarè. *Clysmata* autè talia sint temperantia acrimoniam humorum, adeoq; simul anodyna ac consolidantia exulcerationem seu intestinorum læsionem. *Ei quæ temperant*, sunt clysmata ex lacte, cui interdum, ratione doloris, incoquantur flores chamomillæ, & aliquot capita papaveris: vel clysmati ex lacte addantur Theriac. ʒij. it. Clyster ex lacte chalybeato, cui sevi hircini ʒß. plus minus additur, est egregium. Vel clyma ex lacte decoctionis rad. symphiti, cui pingved. caprill. ʒj. addita sit, in progressu confert. Speciatim clysmata terebinthinata ad imitationem Sylvii & Barbetti præscripta sunt egregia. v.g.

℞. Lact. recent. chalybeat. ʒvj. vel viij.

terebinth. c. ovi vitell. solut. ʒß.

mellis rosat. ʒvj. M. pro clysmate.

addi etiam potest Theriac. ʒj.

*Clysmata consolidantia* fiunt imprimis ex vulnerariis, & hinc propter eandem rationem ex cancris fluviatilibus, v.g.

℞. Rad. symph. maj. ʒj.

herb. plantag.

burs. pastor. an. Mj.

Cog. in f. q. ∇. simpl. Colatur. ℞. ʒvj. vel viij. adde

Balsam. Peruvian. in vitell. ovi dissol. ʒj. M.

Item ℞. Juris decoct. ʒ. fluviat. ʒviij.

sevi hircin. ʒj. M. pro clysmat.

Quod si dolor adhuc urgeat, Syr. papav. ʒj. addatur;

Vel,

℞. Juris



℞ Juris ☉. fluv. at. ℥vj.  
 succi ☉. fluv. contul. & express. ℥iv.  
 syr. de symph. Fern. ℥j.  
 vitell. ovi N. I. M. pro clystere.

Externè etiam *inunctiones* faciendæ, imprimis ex oleo hyperici, absinth. menth. nardin. nuc. mosch. &c. c. oleis destillatis subinde acnatis; it. theriaca, quæ tam ventriculo, quàm universo stomacho inunguenda sunt. Quidam externis talibus & terr. sigill. corallia, crocum & similia addunt, sed ridiculo conatu. Præter externam enim abdominis illinitionem nil operantur, cum ulterius penetrare nequeant. Par sit judicium de Emplastris ex talibus & similibus paratis. Uti est Emplastrum stypticum Myns. Empl. contra rupturam, &c. Potius *fomenta* adhibeantur *tub forma sacculorum*, quæ inter egregii sunt *sacculi, ex foliis quercus in aceto coctis*, abdomini & podici applicatis, *Rulando* in ejusdem praxi *usitati*, ad ejus imitationem fausto successu præscripti.

℞ Fol. querc.  
 furfurem an. Miij.  
 flor. chamom.  
 verbasci an. Mij.

Ex concisis F. sacculi duo, unus rotundus major, alter oblongus minor. Ille acetato calido incoctus applicetur umbilico, hic vero ano, sæpius repetendi. Prior intestinorum affectus, posterior tenesmum recti præsertim, coërcet. Porro *suffitus* egregii sunt, qui fiunt *ex rasura CC. vel suffitus aceti ex lamina ferrea ignita*, it. *suffitus ex zinzibere* ano excepti crebrius, & quoties alvum dejiciunt ægri, sunt egregii, quibus addatur *suffitus ex succino*. Porro notabile est, quod multum conferat, si feces cruentæ deficiantur super ☉ & li, id quod Knöfelii fuit secretum, per sympatheticam quasi curam Dysenteriam nonnihil sufflaminans. Quo etiam facit *persicaria* cum vino decies chalybeato in mortario contusa, & ad cataplasmatismis consistentiam cocta; applicatur lumbis & spinæ juxta renes, refrigeratum denuò applicetur; post aliquot horas in fimo equino sepellitur, sicque morbus curatur. Plura qui cupit de Dysenteria, adeat inprimis *Sennertium*, qui tam in prax. l. 3. quàm in peculiari scripto de Dysenteria fulsime de eadem tractavit. Dysenteria cognatum malum est

## TENESMUS.

Germanis *der Zwang*/ quibusdam *der Urstüßel*. Nam ordinariò Dysenteria etiam supervenit, adeo, ut quod in superioribus intestinis est Dysenteria, hoc in ano sit Tenesmus.

Tenesmus igitur in genere consideratus est assidua cupiditas egerendi per alvum



alvum, in quavis tamen aut parum, idque ferè saltem nonnihil mucosum, aut viscosum, aut nihil omninò excernitur.

*Causa proxima efficiens formalis est spirituum eo provocatorum impetus, cuius causa occasionalis est irritatio intestini recti.* Unde hoc ita stimulatum spirituum vi se contrahit, & egestionem urget. Si enim tantillum peregrini hæreat in intestino recto perquam sensili, subito urget excretionem. Stimulus hic sive vellicatio intestini recti *nunc* fit per essentiam, *nunc* per consensum. Per consensum etiam observatur interdum in *nephritide*, quia tunc temporis sub motu calculi contingit Tenesmus, propter nervos ad renes, & intestinum rectum ex ramulis plexus mesenterici derivatos. Sic *calculus vesicae* etiam, ubi imminet urethrae, non rarò tenesmum in viris pondere sui & irritatione inducit. *Conf. Horst. in suis Problemat. p. 70. Decad. 6. Q. 6. it. Timæus in Epist. p. 242. Mulieres etiam propinque parvi* interdum patiuntur tenesmum, propter uterum intestino recto incumbentem. *Tenesmus qui fit per essentiam*, oritur frequentius à mucosacido, vel pituita viscida acida, intestinum rectum plus minus rodente. Hinc in dysenteria tam frequens est Tenesmus, propterea, quòd quæ excernuntur, acrida, & simul glutinosa sunt. Item purgantibus violentioribus supervenit Tenesmus, partim propter excreta acridiora, intestinum rectum plus minus stimulantia; partim propter purgantium particulas resinosas, intestino recto pertinacius affixas, hoc continuo stimulant. Ulterius *anus inflammatus* pariter non rarò infert Tenesmum, unde & *hemorrhoidibus cecis*, indeque plus minus tumentibus aut dolentibus, tenesmus, seu frequens comes, se associat. *Ascarides* denique intestinum rectum rodentes & mordicantes, similiter interdum tenesmum junctum habent. *Excoriatio, exulceratio, aut fistula interna* intestini recti pertinacem etiam tenesmum junctum habent.

Quoad *Prognosin*, per se consideratus leve malum est, si tamen habeatur causarum ratio, variat Prognosis. Nempe qui *per consensum* est absque periculo, *per essentiam* vero subinde procidentiam ani infert, interdum degenerat in ulcus sordidum, quod faciliè in fistulam abit. *Pregnanti* si supervenit Tenesmus, abortus causa est, auctore *Hippocrate sect. 7. S. 27.* id quod confirmat *la Mo-nière de Dysent. cap. 5. p. 169.* nempe prægnans Dysenterica Tenesmo correpta semper abortum passa est, & cum periculo, si grandior fuerit fœtus.

*Cura* varianda est pro causarum ratione. Si *per consensum* fuerit Tenesmus, curato priori morbo & ipse evanescit, interea opiatas spasmodica vellicatio sistenda. Sin vero est *per essentiam*, in primis causa materialis humor acris, acidus & viscidus removeatur, & hinc facta excoriatio, aut plus minus exulceratio mundificetur, & denique consolidetur. Hinc conveniunt clysmata in pauca quantitate, tantum ad ℥ss. injecta, e.g.

℞. flor.

Coquantur  
materia pe

Iter  
egregium  
ter abster  
substitu  
tus, speci  
fomenti a  
pellit, ac  
cum  
facculi ex  
in specie  
pice lu  
bina ex a  
Tenesmu  
quibusd  
applicati  
nihil ex  
rum terr  
thargyri  
suppositor  
bus, quæ  
unguent  
parata,  
lintheis, v  
Pro  
ritus ani



℥. Flor. verbasci Mj.  
 ros. rubr. Mss.  
 lumbric. concis. ℥j.  
 sem. psyllii  
 fœu. græc. an. 3ij.

Coquantur in lacte recenti, ubi magis dolor leniendus; vel in sero lactis, ubi materia peccans abstergenda.

Colatur ℥. ℔j. adde  
 Sevi hircini ℥j. M.F. Clyst. pro 2. vicibus,  
 Vel ℥. Cicer. rubr. ℥j.  
 flor. verbasci. Mij.

Coq. in s. q. aq. simpl. colat. ℥. ℔j. adde  
 sevi hircini ℥jss.  
 mellis ros. 3vj. ad ℥j. M.F. Clyst. pro 2. vicibus infund.

Item *jus carnis aut capitis vervecini cum aliquot gutt. ol. destillat. cera est* egregium. Hoc etiam oleum destillatum in excoriationibus intestini recti potenter abstergit & consolidat. Loco hujus olei etiam *Balsamus Peruvianus* potest substitui. Præ cæteris appropriatum remedium est *verbasum*, sive rapsus barbatus, speciatim *decoctum ejus* in lacte, cum spongia vel linteis multiplicatis instar fomenti applicatum; nam dolorem lenit, acrimoniam temperat, fluxionem repellit, ac speciatim tenesimum dysentericum curat. it. *decoctum foliorum quercus* cum furture & ▽ chalybeata tam cum spongiis ebriis admoveatur, quam sacculi exinde parati admoveantur. Præter dicta & *suffitus* Tenesimum sistunt, in specie *suffitus aceti ferventis lateri infusi*, ano exceptus. Item *suffitus ex thure & pice* super carbones vivos projectis mirabiliter juvant. Tandem *decoctio Sabina* ex aceto & ▽, ferrea laminæ, aut lateri calefactis infusa pro suffumigio, Tenesimum sistit. Equidem & *suppositoria cum opio instructa* ad Tenesimum à quibusdam adhibentur. *Conf. Amat. Lusit. cent. 3. hist. 94. sed vereor*, ne sola applicatio suppositorii, irritando intestinum, malum exasperet. Quod si nihil *exulceratus est anus*, conveniunt *innunctiones* ex ol. rosac. & lumbricorum terrestri. probè in mortario plumbeo agitatis, vel etiam cum solutione lithargyrii in aceto subactis, & in linimenti consistentiam redactis. Item fiunt *suppositoria* in exulceratione ex sevo hircino cum pulvere thuris, tutia & similibus, quæ unguento diapompholyg. aut de cerussa camphorata illinantur; vel unguentum album camph. & diapomphol. una cum pauca terr. Olii dulc. ritè parata, subacta, & in consistentiam unguenti redacta, quocunque modo, vel linteis, vel aliis applicantur, vel intruduntur ano.

Propter materiæ cognitionem observandum, quod interdum adsit *Pru-*  
*ritus ani* admodum molestus, in quo, aliis irritis, expertus est *form ex aqua*

plantag.

Q

℥. flor.



*plantag. in quo modicum aluminis decoctum fuerit.* Item ad similem ani pruritus cum ejus exulceratione præstans est linimentum

℞. Tragacanth.

℥ citrin.

Lithargyr. an. ʒj.

c. aceto adjecto pauco ol. rosat. F. liniment.

Pertinet huc etiam iste dolor ani, qui accidit, quando à charta piperata, vel charta, cui involutum fuit O-lm, detergitur podex. Prodest tunc optimè forus lactis, c. addita pauca aq. rosac.

## FLUXUS EPATICUS,

Ad dejectiones alvi cruentas pertinet etiam *Fluxus Epaticus*, ita Veteribus dictus, quando sanguis aquosus, tenuis atque ut vocant, loturæ carniū similis, absque doloribus, per alvum copiosè excernitur. Appellationis ratio ex falsa hypothefi desumpta est, quod nempe hepar sanguificet, adeoque ex deficiente sanguificatione in hepate hunc fluxum oriri voluerunt. Sed talis fluxus hepaticus veterum est revera non ens.

Quod igitur attinet Diarrhæam cruentam, Dysenteria contra distinctam ea erit: vel I. Hæmorrhoidum internarum fluxus, uti hoc vult Barbette in suâ praxi; vel II. erit Dysenteria comes jam curatæ, in qua, propter depauperatam MmSm, ac nimis hiantia intestinorum vasa, subinde talis diarrhæa cruenta, & uti Sydenham vocat, Dysenteria habitualis restitare solet. III. Erit saltem hæmorrhagia intestinalis, easdem causas, quas reliquæ hæmorrhagiæ, agnoscens. In specie *acrimonia sanguinis, perforans plus minus orificiola intestinalium vasorum*, quæ causa eò est promptior, quo serosus magis sanguis simul existere solet, qualis affectus exemplum suggerit *Deodatus*, qui fluxum hepaticum ad Diarrhæam cum fluore uterino & profluvio quodam immodico in una fœmina simul observavit, in *valeind. p. 231. Confer. etiam Bontius de Medicin. Indorum pag. 24.* Qua ratione etiam huc pertinet *Dysenteria notha scorbuticorum*, cujus supra facta est mentio, nisi & hæc forsan ad hæmorrhoides pertineat. Ad hæc ex suppressione consuetæ cuiusdam sanguinis evacuationis etiam fluxus cruentus talis oriri potest. Quo pertinet observatio *Foresti lib. 22. observ. 20.* de fluxu sanguinis puri ex vita otiosa, & sanguinis narium usitato suppresso, Venæsectione in brachio curata. Tandem occasione *insignioris cujusdam, & confirmata obstructionis in quodam viscere abdominis*, propter impedimentum circulationis sanguinis, interdum arteriæ mesentericæ aperiuntur in intestina, & talem fluxum cruentum excitant. Quo pertinet *Bartholin. histor. 41. cent. 6.* ubi notat cruentas dejectiones supervenientes mesenterii obstructionibus salu-

tares,



rares. Sic sanguinis miros fluxus in lienosis vide recensitos in *Marcell. Donat. l. 4. hist. med. mirab. c. 9.* Quo facit *observ. 20. Foresti l. 22.* in schol. excretionis sanguinis viri in indurato splene factæ salutaris.

Quoad *Prognosin*, hæc eadem est, quæ in fluxu hæmorrhoidali nimio, aut aliis præternaturalibus sanguinis excretionibus, dum nempe tandem ad cachexiam, hinc hydropem vel tabem ægrum disponit, & propterea fluxus hepaticus dictus in juvenibus interdum difficulter, in senibus raro curatur. Præsupponit semper sc. aliud in corpore vitium, à quo ipso fluxus dependet, & cuius respectu magis vel minus curabilis evadit.

*Cura* pro causarum antecedentium sive remotarum varietate variat. Si sit hæmorrhoidum apertio, harum lege curetur, præsertim per *Malia*, in specie per Tincturam ꝯs Oli. Si sequatur Dysenteriam, eadem est cura, quæ Dysenterię levioris. In specie remedia ex tormentilla, plantagine, sanicula, corallis, imprimis ex agrimonia, cujus decoctum specificum est *Poterii in hoc casu, conveniunt.* Quin & opiata non negligenda, authore *Borell. cent. 1. observ. 99.* qui fluxum hepaticum post Dysenteriam imprimis laudano curavit. Sin acrimonia plus minus serosa dictum malum inducat, *Rhabarbarina*, item vulneraria & adstringentia cum opiatis conducunt. Hinc corallia, trochisci de carabe, unicornu fossile, &c. conveniunt. Item non inconsultum est, ad sudores & sudorifera, decurrere, ad imitationem *Varandæ*, qui specialem edidit Tractatum de Fluxu Hepatico, hepatitis, qui p. 173. dicit: Quidam putant, in progressu morbi non inutile esse, sudores decocto quodam, ut seminis milii, rad. chinæ vel sarsaparill. provocare, quia sudores alvi fluxum imminuere solent, raptâ aliò serosâ materiâ, & hepar calefaciunt, quod experiri non erit inutile. Si etiam æger sudet, & leviter id ferat, magna erit salutis spes, minoris, quando in hepate noxæ signum. Nam quicumque magna hepatis imbecillitate, scirrho aut obstructione tenentur, vix unam sudoris guttulam emit-tere possunt. Item Gelatina CC. cum aqua cinamomi parata, à quibusdam laudata, in tali casu locum habebit, non minus, quàm passula, quæ multum faciunt ad laudabilem sanguinis crasin & æquabilem fermentationem conservandam. Ac sanè passulæ ad discrasiam sanguinis corrigendam multum præstant. Facit huc *observ. 20. l. 22. Foresti*, ubi nil aliud ægrum vexavit, quàm talis diarrhæa cruenta ex sanguine acriori nata. Casus est hic: Quidam sanguinem purum rejiciens, adeoque excoriatione cum paucis ventris torminibus, & tussi valida, cum expectoratione humoris crudi, & urina suppressa, hac sola potione curatus, quæ lubricat, mitigat dolorem, urinam pro-



℞. Fol. malvæ  
 violar. an. Mj.  
 rad. Petroelin.  
 fœnic. an. ℥j.  
 hyssop. Mss.  
 glyzyrrh. ras. ℥jss.  
 prunor. Damalcen. N. xv.  
 uvar. passar. ℥j.

decoquantur in cerevisia, qua continuò utens æget sanabatur.

Nec abludit cura Petr. Joh. Fabri, qui notat fluxum hepaticum ex potu aquæ frigide & usu lactucarum, cum aceto multo curatum, præmissa purgatione ex extracto rhabarbari, Syr. corall. c. ∇. cinamomi sapius sumta.

Quòd si suppressa quædam sanguinis excretio malum induxerit, hæc in ordinem revocatâ, & interea Venæsectione revulsoriâ institutâ curetur. Quodsi tandem impedimentum sanguinis circulo ex infarctu aut tumore visceris injiciatur, hoc, quantum possibile sublato, & Venæsectione revulsoriâ administratâ, fluxus cruentus sufflaminandus erit.

Ad fluxus cruentos pertinent etiam

## AFFECTUS HÆMORRHOIDALES.

*Hæmorrhoides*, quoad vim etymii nihil aliud significant, quàm quemcunque sanguinis fluxum: propriè tamen usurpatur tantummodò de fluxu sanguinis ex vasis ani sive intestini recti. Dantur quidem etiam hæmorrhoides muliebres, seu evacuatio sanguinis ex vasis pudendi muliebris, sed hæ non sunt hujus loci. Hæc vasa Hæmorrhoidalia, ratione insertionis in intestinum rectum, constituunt vel *Hæmorrhoides superiores sive internos*, vel *inferiores hæmorrhoides sive externos*. Utræque constituunt arteriam cum ejus focia vena. Superiorum seu internorum hæmorrhoidum arteria oritur ex mesenterica inferiori; vena vero ex ramo splenico venæ portæ. Unde dixerunt veteres, mediante hoc ramo-lienem per hæmorrhoides evacuari, cui tamen repugnat lex inviolabilis circuli sanguinis. *Hæmorrhoides externa* oriuntur, arteria quidem ex trunco hypogastrico arteriæ iliacæ internæ; vena vero ex ramo hypogastrico, ex quo etiam vena pudenda, & modò dicta ad intestinum rectum derivatur. Cum itaq; ex his ramis hypogastricis etiam in mulieribus deriventur vasa ad collum uterinum, per quæ fit excretio menstrua, adeò ut vasa hæmorrhoidalia & vasa menstrualia orientur ex uno ramo, patet exindè, quare nonnunquam defectus menstruum compensetur per fluxus hæmorrhoidum; siquidem interdum in habitioribus post 48. annos ordinario menstrui fluxui succedunt hæmorrhoides, interdum mensuum obstructorum loco fluunt hæmorrhoides. Exemplum vide in

Herst.



Horst. obs. l. 4. obs. 52. & probl. decad. 6. q. 8. Conf. Bartholin. in Act. Med. Hafn. vol. 1. p. 165. Subinde etiam cum mensibus, sed raro, simul fluunt Hemorrhoides. Conf. M. A. N. C. Ann. 3. p. 39.

*Differentiæ Hemorrhoidalium affectuum* imprimis sunt attendendæ. Sunt nempe *Hemorrhoides* vel *furentes*, vel *fluentes*. Illa alio nomine dicuntur *Caca*, ex eo, quoniam non sunt apertæ, inde propter clausuram insigniter dolent & tument. *Fluentes*, alio nomine *apertæ* dictæ, sunt vel *spontaneæ*, vel *non spontaneæ*. *Spontaneæ* sunt beneficium naturæ, seipsam exonerantis. *NON SPONTANEÆ* sunt vel *criticæ*, vel *morbidæ*. *Criticæ*, quæ in morbo pro solutione morbi accidunt. *Morbidæ* sunt, quæ propter quamcunq; causam in perniciem ægri oriuntur. *Hemorrhoidum fluxus* præsertim viris est familiaris, imprimis *italis*: nempe huic sexui est quasi loco menstruationis muliebris, adeo ut prostant exempla virorum, per statas periodos hemorrhoidum fluxum patientium, ita ut interdum singulis mensibus, interdum singulis sex septimanis redeant. Ob id etiam dividuntur hemorrhoides fluentes in *erraticas*, quæ nullum certum recursus tempus observant; & *periodicas*, cujus exemplum periodi menstruæ in viro vid. in *Amat. Lust. cent. 5. cur. 3. Materia*, quæ ex apertis hemorrhoidibus fluit, est ordinario sanguis, similis cætero in corpore sanguini, adeoq; nunc floridus, nunc obscurus, nigricans, &c. Subinde tamen loco sanguinis etiam alius humor effluit, siquidem interdum albidus,  $\nabla$  fus, mucosus per has evacuantur. De quo confer *Senn. ubi de Hemorrhoid. p. 427. it. Schneiderus l. 3. de catarrh. p. 271. it. M. A. N. C. Ann. 1. p. 180.* Interdum etiam  $\nabla$  citrina aut similis aquositas effluit in istis hemorrhoidibus, quas vesicales appellant. vid. *Forest. l. 23. obs. 5.* Sic fluxum hemorrhoidum ichoroden ejusq; curam vid. in *Velsch. Hecatost. 2. p. 62.* Hemorrhoides *non fluentes*, seu *caca* nihil aliud sunt, quam incipiens aut inflammatio, ordinario etiam ferè insequuntur se mutuo, *dolor, tumor, fluxus*, nempe sanguis evacuandus, dum propter clausuram osculi istorum vasorum, & fibrarum vellicatarum structuram, nec excerni, nec remeare potest, necessario stagnat, stagnando in partis poros intrat, quam tumefacit, & ita inflammationem efficit. Talis cæcarum hemorrhoidum status est insigniter dolorosus, adeo ut in tali casu, quando ægri volunt excrementa alvi secernere, propter ingentem dolorem sæpius patiantur animi deliquia, aut superveniant convulsiones, præsertim dum *internis laborant hemorrhoidibus*. Scio exemplum mulieris, quæ quando volebat excernere alvi excrementa, in animi deliquium, cum faciei tumore, rubore & incallescencia incidebat, ex iisdem hemorrhoidibus cecis. Simul ac vero excreta fuerunt stercora, cessabant omnia talia symptomata. Conf. *Barth. cent. 4. his. 40. p. 320.* *Externæ* taliter affectæ, præter dicta symptomata, tam sessionem, quam ambulationem admodum molestant reddunt. Ita *caca* ex sanguine stagnante, & in hoc loco coacervato, sæpè insignem contrahunt tumorem, præsertim in externis, qui tumor sub-



inde ad insignem magnitudinem foras eminet, adeò ut referat *Lindannus in M.S. super Hartmannum*, se observasse hæmorrhoides cæcas in tantum tumorem auctas, ut pugni instar extra anum prominèrent.

Sub isto tumore subinde variam magnitudinem atque figuram repræsentant unde à figuræ varietate etiam varia nomina sortiuntur, & prout vel verrucas vel uvarum baccas, mora, ficus, &c. repræsentant, etiam *hæmorrhoides verrucæ, uveæ, ficales*, aliàs *mariscæ* appellari solent, quæ ne confundantur cum *verrucis ani, condylomatibus*, aut *cristis ani* vid. differentiæ in *River. prax. p. 417. l. 10. c. 11.* Cautio nempe opus est, ne hæc ipsa subinde confundantur. Imo tales hæmorrhoides cæcæ vel aperiuntur & fluunt, vel ubi sanguis stagnans non discutitur, aut dissolvitur, nunc ex inflammatione in *abscessum & ulcus* abeunt, quod sæpius *fistulas* post se relinquit, nunc ex interiori coagulatione indurantur, & in perfectos *scirrhus* abeunt. Item hæc hæmorrhoides cæcæ ex sanguinis inclusi constitutione nunc *mites* sunt & *benignæ*, nunc *malignæ, cancerosæ, gangranosæ*. Effluunt hæmorrhoides imprimis citra voluntatem, & sponte naturæ: nihilominus consuetudo ceu altera natura adeò est *potens*, ut etiam hæmorrhoides voluntariò fluentes reddere queat. Exemplum vid. in *Panazol. pent. 2. obs. 47.*

*Causæ affectuum* hæcenus recensitorum *hemorrhoidalium* sunt vel *internæ*, ita ut quasi sua sponte superveniant, vel *externæ*, dum variè afficiuntur ista vasa ab externis occasionibus.

Quoad *causas internas*, quocunq; modo accidunt hæmorrhoidalia pathemata, omnia sunt præternaturalia, cum per hæc loca nunquam evacuatio fieri naturaliter debeat, adeoque semper eorum affectus præsupponit statum præternaturalem & morbidum. Hinc non nisi *Hypochondriacis, scorbuticis, splenicis, mensium suppressione laborantibus*, uno nomine *affectibus melancholicis*, sive ab acido vitioso natis obnoxii contingere solent. Hinc rectè notat *Forest. l. 23. obs. 5. in Schol.* quod color faciei habentis hæmorrhoides ad viridem colorem declinet, teste *Avicenna*, id quod in multis aliquando animadvertentes, solo hoc signo inducti, eos hæmorrhoidibus laborare pronuntiavimus. Nempe semper præsupponitur vasorum illorum stimulus, vel irritatio, vel spina iisdem infixæ, h. e. *fermentum salinum*, in sanguine ejusq; sero præternaturale, quod quac. occasione vel hereditario ex vitio, vel ex præcedaneis causis morbois conjunctum, nunc externæ occasionis, nunc solennis cujusdam sanguinis evacuationis suppressæ causæ, ad ista loca delatū, vellicando loca ista sensilia, imò & fibrarum nervearum stricturnā, sanguinis stagnationem seu coacervationem, hinc tumorem plus minus inflammatorium, tandem dolorem intensissimum ac fluxum infert. Uno nomine, quæ sunt causæ, quare subinde crebriores & chronicæ hæmorrhagiæ narium, sive habituales aliæ sanguinis evacuationes quosdam affligunt, eæ etiam sunt causæ hæmorrhoidalium pathematum

tum, cum  
acri (ue  
lis in M.

Quo  
tatione v  
spolis,  
huc con  
sufflami  
sponens  
qui ad  
quod cr  
talibus  
niant,  
quando  
tæ, illud  
tione ac  
lores ex  
solet alo  
Arabum  
faventib  
bus mag  
in Epist  
viro, c  
tus in  
motio:  
dispositi  
rthoidal  
tatio, &

Qu  
tanea,  
vulgò a  
rhor aut  
tionis co  
morrhoi  
Hæmor  
M. A. N.  
fluxerint  
dem, qu



tum, cum non nisi excretionis loco differant. Confer de tali fermento vitioso, quod acri suo stimulo hemorrhoidales affectus concitet, elegans consilium Knöpheli in *M. A. N. C. Ann. 6. App. p. 1.*

Quoad causas externas sunt ex variæ; motio nempe aut agitatio sub equitatione vel vectigine paulò laboriosior, purgantia & similia, quæ tamen non dispositis, quàm in primis in dispositis, pathemata hemorrhoidalia inferunt. Facit huc conatus laboriosior in partu, sanguinis circulum circa ista loca nonnihil sufflaminans, hinc ad vasorum à sanguine distensionem, tumorem, dolorem disponens. Ut non observarim, ex tali casu natas hemorrhoides, nisi in istis, qui ad hypochondriaca sive melancholica pathemata sunt proclives. Ac sanè quò crebrius pariunt mulieres, eò magis hos affectus exasperant, adeò ut in talibus etiam ultimis gravidationibus quibus hemorrhoidales affectus superveniant. Purgationes non raro inducunt hemorrhoides, partim ac præcipuè, quando particula medicamenti purgantis resinosa, acres intestino recto agglutinata, illud stimulant, unde faciliè hemorrhoidales affectus; Partim quatenus purgatione acres & salini evacuati humores, circa intestinum rectum non raros dolores excitant, atque ita ad hemorrhoides disponunt. In specie hic accusari solet aloë, quasi venarum ora aperiat, & hemorrhoides cieat. Effatum hoc est Arabum; à Leonbardo tamen Fuchso & Joh. Jac. Manardo, minus Arabibus faventibus, hoc rejicitur. Sed revera commune hoc est quibusvis purgantibus magis resinosis, ut in dispositis hemorrhoides concitent. Sic Manardus in *Epist. Medicin. l. 12. Epist. 3. pag. 216.* ex potu Rhabarbari id observavit in viro, quod etiam de Sennatis & Scammoneatis à se observatum refert Scultetus in *Armament. Chirurg. observ. 76.* Intestina etiam nimia sanguinis commotio: v. g. nimia iracundia, uri quibusdam hemorrhagias natum; ita præ dispositis ex causa interna vel ex vasorum & intestini recti relaxato tono hemorrhoidales affectus infert. Externa etiam fortior motio, cursus diuturnus, saltatio, &c. si cilè in dispositis eosdem provocant.

Quoad Prognosin, certum est, quod Hemorrhoides Criticae aut Spontaneæ, non nimix, sint saluberrimæ, præservant & curant morbos, quos vulgò à melancholia derivant, Maniam, melancholiam, scorbutum, scirrhus aut tumores viscerum, vel similia mala. Item quando loco menstruationis contingunt, sunt salutare. Sic exempla virorum longævorum ex hemorrhoidum periodico fluxu. Conf. *M. A. N. C. ann. 4. p. 39. & 57.* E contra Hemorrhoidum fluxus suppressus in Scorbutico mortis causa observatus vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 543.* Hinc suppressæ Hemorrhoides, quod semel ac iterum fluxerint, nunc fovent, nunc exacerbant Chronicos morbos, præsertim arthritidem, quæ ab iisdem fluentibus non parùm levatur. Verùm ubi fluxus hicce est

nimius



nimius, quia diuturnior, vel quia copiosior, paria imminet pericula, atque quæ hæmorrhagiam nimiam quamvis sequi solent: v.g. *hydropes, tabes, &c.* Imò nimius hæmorrhoidum fluxus adeò subindè debilitat, ut reddat viros ad congressus *Quos impotentes.* conf. hic in *Prognos.* simul *Hippocr. sect. 6. aph. 11. it. 21. & aph. 12.* imprimis notandum est, quod diuturnas curanti hæmorrhoides incumbat, ut una quæpiam servetur aperta, quia aliàs varii morbi imminerent corpori. Conf. *Deo-datus in valetud. p. 93.* It. *Horst. in probl. decad. 6. q. 8.* Quod illustrat obs. *A-mati Lusit. cent. 5. cur. 3.* ubi ex menstruo hæmorrhoidum fluxu suppresso, copiosus sanguis per os effusus fuit, & aliud menstruum sanguinis spiritum exinde contraxit. Atque hoc imprimis evenit, quando simpliciter stringuntur vasorum ora, sine fermenti interni, sanguinem agitantis & dicta pathemata inferentis, correctione. In hæmorrhoidibus valdè dolentibus, nisi maturè suppurantur, facîle inflammationem contrahunt, quam apostemata, ulcus, fistula, aliæq; similia insequuntur. Quomodo hujusmodi cæca inflammata, & hinc exulcerata tractanda sint, præ cæteris vid. *Agricol. in Chirurg. parv. p. 594.* Conf. & *Velschius hecatost. 2. p. 61.* Et ad talem exulcerationem hæmorrhoidum nobile est unguentum. ex ol. amygd. dulc. cum auro fulminante factum, Authore *Boyleo in suis scriptis.* Conf. *Bartholin. cent. 4. epist. 523.*

Quoad *Curam*, in hac attendendus est *natura motus*, & constitutio sub-jecti plus minus, vel sana vel morbida, hoc est, Chronicis affectibus plus minus obnoxia. Natura enim sola, ut in subiecto vel statu minus naturali hunc motum & evacuationem instituit, ut nempe majora mala avertat: Nempe hæmorrhoides fluere consuetæ; ut (1.) suo tempore fluant, conservandæ. (2.) Suppressæ aperiendæ. (3.) Nimum fluentes, sistendæ. (4.) Nunquam fluere consuetæ raro, idq; in Chronicis saltem affectionibus, & in subiectis tantum tali evacuatione opus habentibus, aut eam facîle ferentibus aperiendæ, præsertim ubi suppressa solenni sanguinis evacuatione, natura quasi spontè eò inclinât. (5.) *Hæmorrhoides cæcæ sive dolentes*, si nunquam fluxerint, vel non ex usu sit, ut fluant, aut discutiendæ, aut si aliàs fluxerint, aperiendæ, semper verò eorum dolor sistendus.

Ex dictis patet, tria saltem remedium genera hic locum habere, nempe 1. vel quæ aperiunt. 2. quæ claudunt. 3. quæ dolorem sistunt aut discutiunt, anodyna, in specie appropriata.

Pro istis scopis ritè obtinendis, notandum in genere, quod procurandis hæmorrhoidibus nimis apertis omnia conveniunt illa medicamenta, quæ in *Diarrhæis* ac *Dysenteris* specificâ conveniunt virtute: Cæcis vero omnia illa exactè conveniunt, quæ vulgo in morbis *spleneticis*, ac referendis *viscerum obstructionibus* adhiberi solent: Nam hæmorrhoides in sua radice magnam habent cognationem cum affectu *hypochondriaco*: vid. *M. A. N. C. Ann. 3 p. 40.* hoc est: Hæmor-

Hæmorrhoides  
ficientis la  
remedii h  
tibus, arom  
nere Chr  
Scrophula  
p. 124.

Quo  
fluxum e  
Conf. Se  
litescant  
num ap  
74. Qu  
festandæ  
nonnihil  
liis frice  
requam  
aut fome  
expertus  
oppidò ra  
tertium u  
ceparum  
Supposi  
hiera pi  
cancr. fl  
rhoides  
si sub di  
vel alia  
rem ex  
Quoad  
myrrha  
quæ clau  
ternè co  
qualiber  
vi acidi  
syr. de r  
xum ad  
perimen  
sanguis



Hæmorrhoides corpore sanè constituto non apparent: Sunt ergò signum deficientis sanitatis, & hypochondriacorum affectuum quasi confectarii, adeoque remediis his appropriatis, in specie *Dialibus*, & hinc *vegetabilib<sup>9</sup>* aut *amaricantibus*, aromaticis eorum radicalis cura internè tractanda, eò ferè modò, ac in genere Chronici morbi tractari solent, quibus subjungantur appropriata: ut *Scrophularia*, *millefolium*, *crassula*, *pilula de bdellio*. Conf. *Wedel. Opiolog.* p. 124.

Quoad materiam medicam, inter aperientia hæmorrhoidum ora, & quæ fluxum earum movent, optimum sanè auxilium sunt *hirudines* ano applicatæ. Conf. *Senn. 1.3 Prax.* ubi de hæmorrhoid. quest. 3. Quòd si vero profundius delitescant vasa hæmorrhoidalia, ac præsertim superiora, ita ut commoda hirudinum applicatio fieri nequeat, imitetur *Zacut. Lusit. 1.2. prax. admirand. observ.* 74. Qui docet, quomodo hæc per *cucurbitulam* applicatam commodè manifestandæ sint. Præter has conveniunt etiam *folia ficus*, quando eadem nempe nonnihil fricantur aut contunduntur folia, donec eorum lac exeat, & tunc his foliis fricentur hæmorrhoides, donec aperiantur. Consultum interim est, ut antequam applicentur talia extrinsecus, prius vasa emolliantur *balneis emollientibus* aut *fomentis*, imprimis cum lacte paratis. Præter folia ficus *succus cyclaminis* expertus est ad eas aperiendas, externè applicatus. Vid. *Henr. ab Heer in obs. oppidò rariss.* observat. 6. Usurpatur vel solus, vel mistus cum *succo betæ*, præsertim ubi *inflammatio* vel *dolor* nimis urget: huic etiam alia acria, ut *succus ceparum*, præsertim cum *aloe* mistus, *succus ari*, *bryonia*, *centaur. min.* &c. *Suppositoria* etiam ex *rad. cyclaminis* insigniter stimulant hæmorrhoides, vel ex *hiera picra*, cum *pulvere colocynth.* & *melle* parata. Porro *Linimentum ex cancr. fluviatil.* in 80 coctis ad mellis consistentiam, quod & aperit hæmorrhoides, & lienis dolori, ac nimio inflammationis incremento resistit. Quòd si sub dictorum applicatione nimia inflammatio metuatur aut ardor ani, succi vel alia applicanda agitentur in mortario plumbeo probè, donec lividum colorem ex plumbi ramenti contrahant: Sic enim vim refrigerandi obtinebunt. Quoad interna remedia, quæ aperiunt, est *aloe*, & hujus ratione *Elix. propr. it.* *myrrha* quosvis sanguinis fluxus promovens, it. *resinosa purgantia*. Remedia quæ claudunt nimium fluentes Hæmorrhoides, sunt vel interna vel externa. Internè conducit *Rhabbarbarum* ac *Myrobolani*, præ cæteris *Tamarindi*, & hinc qualibet remedia, quæ internè ad hæmorrhagias habituales in usu sunt, ac ferè vi *acidi absorptivæ* simul instructa sunt. V. g. *Conserva foliorum quercus*, *syr. de rosis sic.* mediante quo *Borell. cent. 4. observ. 58.* hæmorrhoidum fluxum ad tñx. compescuit. *Syr. & succus portulac.* *succus urticae maj.* ad *3ij.* experimentum est *Riverii cent. 4. obs. 81.* *Succus & syr. stercoris asinini, decoctum sanguisorba* egregium etiam experimentum est. vid. *Bartholin. in actis Medic.*



*Hafniens.* vol. i. p. 165. *Dens equi marini*, seu *Hippopotami præpar.* fuit secretum *D. Michaël.* ex quo dente etiam paravit annulos pollicis pedum applicandos in nimio hæmorrhoidum fluxu. *Trochisci de carabe*, ac præsertim *pilula de bdellio* ad  $\mathfrak{zj}$ . usurpatæ egregium sunt experimentum contra hæmorrhoidum fluxum. Primus qui hoc notavit, est *Solenander cons.* 20 sect. 4. ubi plura reperies quæ ad Hæmorrhoidum praxin pertinent, quem postea securus est *Forestus l. 23. obs. 5.* Unde nonnulli non sine successu adhibent *suffitum ex bdellio*, qui egregiè solet conferre. De *Gialibus*, quod etiam pertinet *Hematites*; de *opiat*, quod pertinet *theriaca*, etiam interne contra hæmorrhoides fluentes usitatis taceo, cum per se nota sint.

Externè hæmorrhoidum fluxum sistit *spongia ista terrestris*, crepitus lupi dictus, qui siccatus, & venis fluentibus admotus, non tantum sanguinem fluentem sistit; sed & partes jam exulceratas optime sanat. *Fuligo furni conquassata cum albumi ovi*, & postea applicata cum *telis aranearum*, fluxum cohibet. De *pulvere sympathetico* ceu aliàs noto, taceo. Sunt qui recipiunt *sanguinem recentem excretum*, quem in lamina ferrea bene calefacta exsiccant, exsiccatum hæmorrhoidibus fluentibus inspergunt, & sic sistunt. *Pinguedo etiam anguille*, quæ, dum assatur, exstillat, non saltem egregium est contra dolores hæmorrhoidum remedium; sed & nimium fluxum optime sistit. *Pulvis ex mumia & subere usso*, it. terra  $\oplus$  *li dulcis* rûe edulcorata, & cum *succo plantaginis* in *Linimenti* consistentiam redacta: nem *unguentum de Luthargyrio vel tutia*, cum *cineræ ostrearum* subactum, compescit nimium hæmorrhoidum fluxum. *Venesectio* in brachio, quam quidam usurpant, non adeò necessaria videtur, ne forsan occasione solennis suppressæ sanguinis evacuationis hæmorrhoidum nimius metuatur fluxus.

Tandem illa, quæ *cacæarum dolorem* sistunt, easque discutiunt, *anodyna* ac *appropriata* sunt plura; præter *lac enim opiatæ*, *decoctum fol. hyoscyami in lacte chalybeato* ac similia, sub *fotus* formâ, vel cum *spongia*, vel cum *linetoljs* multiplicatis applicata conveniunt: Specificè *momordica*, ex cuius *potis* per infusionem in *ol. communi vel amygd. dulc.* paratum nobile *oleum*, est non saltem *vulnerarium*, sed imprimis ad hæmorrhoides *cacas* egregium experimentum, quod feliciter tentavi in muliere, quæ ex  $\boxtimes$ um impedito fluxu hæmorrhoidum patiebatur dolorem. Hinc eminet *verbascum* ejusque *flores*, per infusionem olei, imò tota planta appropriatissimum est ad hæmorrhoides fluentes, applicatur præsertim in *aq. ferrariorum* cocta pro fomento. *Floribus verbasci* non ineptè adduntur *flor. sambuci*, ut simul in *lacte* vel  $\nabla$ . cocti pro fomento applicentur, quibus in graviore dolore, ad imitationem *Foresti l. 23. obs. 6.* addendum est *sem. hyoscyami*, ut pro fotu eo melius experto sistatur dolor, vel *ex fol. & flor. istor.*

istorum sim  
Linaria  
tam  $\odot$  &  
in lacte co  
exaltanda  
198. vel 2

Bacca it.  
elegans,  
nerus, ac  
plicari p  
fufis, plu  
tumente.  
tur, vel  
additione  
in internis  
notis usu  
millepedi  
hinc fact  
consil. 20.  
specificu  
rhoidum  
ovi misce  
dolore,  
major, ac  
dium.  
in puerpe  
stra tenta  
26. Ciner  
si inflam  
tur etiam  
nes sem  
latile ipsi  
etibus, a  
remediis



istorum simplicium, in lacte coctis, cataplasmata pro eodem scopo parari possunt. *Linaria* herba unum est ex primariis specificis contra fluorem hemorrhoidum, tam ꝑ & unguentum de *Linaria*, quam *salculus ex linar.* & flor. *chamomilla* in lacte coctus & applicatus. Sanè unanimis est commendatio Practicorum in exaltanda *Linaria* contra Hemorrhoidalia pathemata, vid. *Hartm. in prax. pag. 198. vel 203. Horst. l. 4. obs. 50. item Hæserum Hercul. Medic. p. 195. vel*

℞. Unguenti de *Linar.* ℥j.

ol. hyoscyami expr. ℥j. vel ij.

lacch. ℥i (in ardore & inflammationis metu) ℥β. vel ℥ij.

M. pro Linimento.

*Bacca* it. *herba paridis* in oleo cum modico vini coctæ, dant linimentum revera elegans, quod in hemorrhoidibus cæcis ac furentibus in puerpera observavit *Gesnerus*, ac commodè *cancrosis hemorrhoidibus* quælibet ex bacis his remedia applicari possunt. Tandem cum *asellis* & *scarabæis stercorariis*, cum ꝑ lini infusis, pluribus permixtis sunt olea expertissima contra hemorrhoides dolentes & tumentes: Nempe in oleo lini coquuntur *scarabæi stercorarii*, quod ꝑ usurpatur, vel ꝑ *violæ.* ℥ij. adduntur *asellorum contusor.* ℥i. coq. invicem cum additione cææ, ℥β. vel ad formam unguenti, quod externis commodè illiniri, in internis vero hemorrhoidibus, in forma glandis immitti potest. Nec minoris usus est, si *millepedes* in ꝑ nuc. expr. coquantur, aut etiam sine coctione *millepedes* cum ꝑ misti digerantur aliquandiu, in cucurbita probè obturata, & hinc facta transcolatione pro usu asservuntur. Conf. de his *Solenander sect. 4. consil. 20. Borell. cent. 1. observ. 63. Fonseca l. 1. consil. 27. Cineres suberis usti* specificum sunt *Hartmanni cum oleo myrtin.* misti contra dolorem hemorrhoidum cæcarum. Melius si *suber combustus* cum oleo sem. lini & vitello ovi misceatur in consistentiam Linimenti. Quod si ingens adsit ardor sub dolore, commodè *suber cum oleo rapistri* misceatur, & aliquantum succi *sedii major.* addatur, certissimum erit ad hemorrhoides dolentes & ardentes remedium. Experientiam suggerit *Forestus l. 23. obs. 5.* dum nobilis mulier, quod in puerperio semper dolore hemorrhoidum valdè affligebatur, aliis multis frustra tentatis hoc linimento præsentaneum semper levamen percepit. Nempe ℞. Ciner. Suberis q. v. & cum oleo rosac. & vitell. ovi F. Linim. Quod si inflammatio adsit, misceantur probè in mortario plumbeo. Applicantur etiam contra dolorem & tumorem hemorrhoidum cæcarum *mucilagines semin. psyllii, cydoneorum, lini, &c.* Continent enim in se ꝑ volatile ipsius concreti, cujus ratione tam egregiè conducunt in pluribus affectibus, ac speciatim in hemorrhoidalibus. Siquidem in his etiam in externis remediis ea præpollent, quæ acidum istud, unde hemorrhoidalia pathemata



oriuntur, vel absorbent, ut *Hnina*, vel vi opposita alcalina corrigunt & temperant. Dictis mucilaginibus in ardore ac inflammatione commodè *succus portulacæ*, *saccharum Hi*, etiam *camphora* addi potest, vel

℞. Mucilag. sem. psyll.

cydoneor.

lini, an. ℥℞.

aq. ros. ℥j. bulliant lentè ad consumptionem aquæ, adde butyri recent. ℥j. vitell ov. N. ij. ol. rosac. complet. parum, postea tunde in mortario plumbeo cum pistillo *Hneo* ad colorem lividum usque F. l. a. *Linim.* perquam egregium in inflammatione ac dolore *Hæmorrhoidum*. Hinc aliquoties ad hujus imitationem cum fructu præscripti:

℞. Mucilag. sem. cydon. c. sperm. ran. extr. ℥j.

℥ camphorat. ℥ij.

sacch. Hi ℥j M. F. l. a. liniment. quo linteam humectatum applicetur crebrius.

*Rulandus* contra dolorem & tumorem hæmorrhoidum applicat *sacculum ex glandibus contusis & foliis quercus in aceto coctis*: quo ipso sacculo miraculi instar sistatur dolor hæmorrhoidalis. Unde & hunc sacculum tanquam expertum commendat *Lotich. in observ. p. 529.* *Camphora* non immeritò his additur, quæ efficacissima etiam est ad dolentes hæmorrhoides, si ℥℞. ad ℥j. subigatur cum aquæ ros. ℥j. & ita applicetur ad dolentes & ardentes hæmorrhoides. Inprimis *scrophularia* summum est specificum ad quosvis hæmorrhoidales affectus, in quocunque sint statu, usu interno pariter ac externo: sc. *radix scrophulariæ* autumnò collecta, per se sola lumbis alligata, ut cutim attingat, hæmorrhoides sanat, fluentes nimirum sistendo, dolentes & cæcas dissolvendo. Item ex hac sola recenti mundata & contusa fit unguentum, si cum butyro recenti in olla nova per dies 15. in cella aut loco humido reponatur, dein liquefacto sensim butyro lento Δe exprimatur; servatur Linimentum egregium contra hæmorrhoides. Item radix ejus in tessulas dissecta, & filo annexa, vino injiciatur, de quo 9. diebus patiens in nimio fluxu bibat, post radices siccantur, & eo modo, quo siccantur radices, etiam hæmorrhoides imminui & quasi siccati afferunt: Sin vero rursus aperire velis, vino vel aqua simplici rursus imponendæ sunt, atque tunc iterum nonnihil hauriendum. Quò facit, quod refert *Heer. ab Heer obs. 22.* sæpissime, inquit, expertus sum, si quis hæmorrhoidum cæcarum insano dolore torquetur, minimum quidem *scrophularia*, vel *radicis*, vel *foliorum*, cum cibo vel potu capiendo, statim dolore liberabitur, sive ipsam substantiam siccam, aut viridem, sive decoctum assumat. Conferatur etiam *Sculetus in Armament. Chirurg. tab. 42. p. 174.* Curavi mulierem juvenulam, quæ occasione primi partus difficilis, hæmorrhoidum cæcarum dolorosissima pathemata



mata contraxit. Duravit hoc malum integro anno. Post partum denuo gravida facta longè pejus habuit, non secus ac in subsequente puerperio, ita ut interdum ad plures dies alvum suppressere cogeretur, metu insani hemorrhoidalis doloris. Suppurabantur interdum & gravi cum dolore pus fundebant. Hinc tentandi gratia tempore autumnali totam *scrophularia* plantam transmissi, ut radices quasdam femoribus alligaret, alias radices unà cum foliis incisas, nodulo inclusas, cerevisiæ infunderet, & inde ordinariò biberet: Folia quædam minutim concisa omni matutino tempore cum pane butyrato assumat. Horum usu, per unam alteramve septimanam continuato, egregiè convaluit. Nec minoris usus *Crassula major*, seu *sedum Telephium* interno & externo usu, cum primum turgentibus primo vere foliis contundantur, & terantur *c. ol. rosæ*, hinc coquantur blandè ad humiditatis superflue evaporationem & consistentiam Lini-menti, ac applicetur: admodum convenit in dolore & ardore hemorrhoidum. Imò sola hæc radix, & aliquot ejus nempe nodi de collo suspensa, ut circa lumbos cutim attingant, egregium est in hemorrhoidum cæcarum malis, ex quacunque causa natis. Confer. *M. A. N. C. Ann. 2. p. 296.* Id quod probavi aliquando in studioso hemorrhoidibus cæcis admodum afflicto, qui, hoc usus amuleto, egregiè convaluit. Facit huc, quod refert *Solenander sect. 4. cons. 20.* Chirurgus quidam hemorrhoides dolentes, tumentes, fluentes curat per herbas integras *scrophularia* & *crassula maj.* c. radicibus, macerat eas in cerevisia, mane & vespere offert. Idem *Solenander cit. loco* nescit ferè, quibus verbis sufficienter commendare debeat ad quæc. hemorrhoidum vitia *Chelidonium minus*, ulu- tam interno quàm externo, fluentes sistit, tumentes aut dolentes sanat. *Herba siccata* cerevisiæ infunditur. Hoc modo Empiricus omne Hemorrhoidum vi- tium curabat. *Herba tusa* vel *succus expressus* extrinsecus admotus idem præ- stat. *Aqua destillata* adhibita eos curavit, qui ferè hydropici facti fuerunt, nimio profluvio. Tusa planta oleo incocta ad dolentes & tumentes prodest, flores etiam & herbae manè comeduntur. Hinc alii recipiunt *Æis rad. scrophular. cheli- don. min.* an. ʒʒ. cum *ol. verbasci.* F. *Linim.* Hisce tandem addatur, quod pro usu interno ad sedandum dolorem, & absumentas hemorrhoides profutur- coctum *millesfolii totius*, pulvis item *millesfolii* & *tormentilla*.

Quod si Chronici facti sint, & quasi habituales affectus dolorosi hemor- rhoidales, speciatim post Xium emanationem, convenit egregiè *fonticulus in tibis.* vid. *Velsch. Hecatoest. 2. pag. 50.* Item *Zacut. Lusit. lib. 2. prax. admir. observat. 71.*





CAPUT IX.

De

VARIIS INTESTINORUM  
DOLORIBUS.

Naturaliter siquidē alimenta distribuuntur aut egeruntur, nulli dolores in intestinis percipiuntur, nisi quod intestinum rectum saltim stimulum sentiat, quando fæces sunt excernendæ. Deinde adsunt interdū murmura & borborygmi, quando flatus naturalis intestinor. tenuium, speciatim ilei peristaltico intestinor. motu hinc inde agitatus ista phænomena infert. Verū praternaturaliter crebrius dolores patiuntur intestina, quæ dicuntur tormina, à torquendo, quod intestina quasi contorqueri & convolvi videantur. Ac revera formaliter omnes ferè dolores, paucissimis exceptis, à convulsivo spasmō intestinorum, in quem à spirituum impetu cientur, immediatè oriuntur. Utut autem causaliter sint varii, vix tamen quæcunque causæ dolores inferunt, nisi ad motus convulsivos per irritationem intestina disponantur, id quod non solummodò confirmat observ. *Helmont. de flatibus* §. 38. sed & ordinariò ferè alvus suppressa esse solet sub talibus intestinorum doloribus, dum spasmis istis impeditur, & plus minus retardatur naturalis motus peristalticus, & huius medio contentorum protrusio.

Ante omnia considerandæ *differentiæ dolorum intestinalium*, quæ omnes vel *ratione partis affectæ*, vel *ratione causæ* considerandæ sunt.

*Ratione partis affectæ* laborant intestina vel tenuia, vel crassa. Dum afficiuntur tenuia, jejunum & ileon, vocatur propriè *dolor iliacus*; quando vero in intestino crasso, colo, observabilis est, *Colicus* vocari solet, utut vulgò confundi, & omnis dolor intestinorum in genere *Colica* appellari soleat. *Distinguitur* autè iliaca passio à Colica, imprimis intestini utriusque situ. Nam *colon intestinum* à recto ingvine incipiens, supra dextrum renem sursum exsurgit versus hepar, & hinc ad hypochondrium sinistrum, ubi mox angustatur, & ad renem sinistrum deflectit, indeque porro ad ingven sinistrum, unde tandem ad os sacrum in intestinum rectum terminatur. Hinc isti dolores, qui in abdominis ambitu percipiuntur, sunt *colici*, utut nonnulli eum tantū hoc nomine appellent, qui partem abdominis superiorem & anteriorem instar circuli ambit, cum tamen sæpè dolor, usque ad umbilicum imò interdum usque ad vesicam insigni ambitu devolvatur, qui revera etiam sunt *colici*. *Tenuē vero intestinum*, ubi emergit ab intestino duodeno, versus hypochondrium sinistrum torquetur, & hinc recedens mediotullium ventris imprimis occupat, unde in & circa & infra umbilicum percepti dolores sunt imprimis *iliaci*. Ad partem affectam pertinet & *situs doloris*, ratione cuius dolor est vel *hypochondriacus*, vel *umbili-*

*calis.*



*calis*, vel *lumbaris*. *Lumbaris* est multiplex, nunc *nephriticus*, nunc *mesentericus*, nunc *pancreaticus*, nunc *intestinalis*. In specie, quod attinet DOLOREM HYPOCHONDRIACUM est iste, qui frequentissimè percipitur in hypochondrio sinistro sub costis nothis, dolor *pertinax* & frequentius *punctorius*, qui communiter adscribitur lieni affecto, unde vulgò quicunque dolores in ista parte percepti, mox pro augurio affecti splenis habentur. E contra qui considerat parenchyma splenis infarctum quidem sed per se minus sensibile, statim potest percipere, quod lien vix possit habere dolorem, nisi gravativum obtusum, in primis ex tumore & infarctu à contentis vitiosis productum. Deinde potest habere dolorem obscure tensivum, seu quasi distendentem ex distenta membrana lienem cingente, ab infarctu nimio enatum. Dolores vero *punctorii* & *terebrantes* nullo modo sunt in liene, cum ineptissimus sit lien pro tali dolore, & quando cum his doloribus in dicto hypochondrio concurrit tumor ad tactum renitens, aut quando concurrit istius hypochondrii insignis intumescencia, nullo modo talia conveniunt lieni, cum hic in profundo situatus nullo modo contingi queat. Dolor autem hicce *punctorius* & *terebrans* in hypochondrio sinistro observabilis, situs est in intestinis, partim quidem in intestino *jejuno*, partim vero & ut plurimum in *Colo*.

Quod attinet jejunum intestinum, duodenum ubi deorsum pergit à pyloro ad principium jejuni, contorquetur hoc ipsum jejunum mox ad hypochondrium sinistrum, ubi à lumbis & mesenterio liberius assurgens, contorquetur postmodum denuò in abdominis medietullium. In modò dicto angulo sæpius latet nunc *flatus*, nunc vero ut plurimum *mucilago acida*, quæ pertinaciter ibidem affixa, dolores istos acerbos in profundo hypochondrii sinistri sitos inducit. Verùm frequentius hi dolores sunt in *Colo*, id quod observat *Hildanus cent. 1. obs. 58.* idque quoniam in dicto loco sæpius *mucilago acida* deprehenditur, partim, quia in eodem nunquam deficiunt flatus: Et, utut dicant, medicamenta splenetica tam interna quam externa hujusmodi dolorem curare, tamen quoniam externa unguenta & emplastra ordinariò ingreditur *gumm. ammoniaci*, quod vim egregiam dissolvendi mucilaginem viscidam, ibid. hærentem obtinet, evenit ita, ut, quæ spleni conducere putantur, revera intestino colo à tali causa affecto conferant. Observantur etiam subindè similes dolores *punctorii* in hypochondrio dextro, qui non sunt ex hepate, sed revera ex intestino, ut superiori colo affecto.

Quoad *lumbarem dolorem*, *nephriticus* quidem est frequentissimus, sed sunt & alii, qui ut plurimum cum nephritico confunduntur; quidam pylorus, dum in intestina se dimittit, duodenum exinde genitum reperitur circa dextram lumborum regionem, unde in intestino duodeno circa principium jejuni subindè oriuntur dolores, circa dextram lumborum regionem observabiles, sed in isto duodeno perscrutabiles.



*Pancreas* itidem transversim lumbis incumbens, *obscurum* seu *obtusum* & in profundo delitescens, subindè *gravativum* dolorem infert.

*Mesenterium* porro lumborum vertebriis annexum, dum hoc convellitur, unde *dolores parturientium hysterici* subindè oriuntur, non minus ac *dolores scorbutici* abdominis, etiam gravem lancinantem dolorem in dorso circa lumbos exhibere solent.

*Altera differentia* doloris intestinorum fundatur in varietate causæ efficientis & fiendi modo, indeque dolores intestinales, seu uno nomine

## COLICA

dicuntur, quæ vel *humorosa* vel *convulsiva*. Nam ut semper *tormina à spasmis intestinorum*, vel in toto vel in parte oriuntur, tamen quatenus vel à contentis humorosis in intestinis hærentibus occasionaliter proritantur, vel quatenus sine his, ipsorum nervorum ad intestina distributorum vitio spasmodicè excitantur, ita dirimerelicet.

*Colica humorosa* doloribus variis, & pro causarum afficiendi modo distinctis affligit. Hinc *dolor in humorosa* est nunc *fixus* seu *perterebrans*, nunc *pungens*, nunc *distendens*, nunc *rodens*, nunc *contundens*, nunc *gravans*, nunc *pulsans*. *Terebrans dolor* est *fixus*, quando scil. intestina uno quodam loco perterebrari videntur. *Oritur à mucilagine viscida & acida*, in determinato quodam loco hærente, & agglutinata, in primis in colo, sub hypochondriaco dextro vel sinistro, in cujus cellulis aptum invenit diversorium. Et hic dolor est iste, qui *hypochondriacos* non tardè vexat, & est dolor colicus à materia viscida acida. *Dolor distendens*, & quasi *disrumpens*, *oritur* frequentius à *flatibus*, qui oriuntur ex materia viscida per fermentationem vitiosam ab acido productam. Et hic dolor à flatibus est unus ex frequentioribus Colicæ modis: Semper tamen necesse est, concurrat intestinorum *spasmus*, nunc in uno quodam loco fixus, nunc hinc indè vagus, cujus occasione flatibus exitus intercipitur, qui alias defacili, quâ datâ portâ, exitum invenirent. *Dolor gravis*, cui vicinus est *contundens* oritur ex muco copioso & viscido, absque acrimonia, in quadam parte infixo, ac præsertim pituita vitrea simplex dolorem talem infert; Quæ pituita, si parum sit acida, sive ex vitio stomachi, sive ex vitio pancreatis, præter gravativum dolorem, sensum infert contudentem. *Dolor rodens* à salso est acris, quasi muriatico vellicante, arrodente & fodicante intestina. *Dolor pulsans* ex arteriarum est spasmo, & frequenter inflammationem comitatur, ut patet ex inflammato digito propter infixam spinam, in quo mox pulsans arteriarum dolor percipitur. Præterea tamen & aliud quodvis inimicum objectum, gravius intestinum quoddam in loco quodam vellicans, facili ex superveniente spasmo arteriarum dolorem pulsantem inferre potest.



**COLICA CONVULSIVA** cum dolore contorquente, lacerante, lancinante & abdomen nunc contrahente, nunc in duritiem tendente, nunc vago, nunc quodam in loco fixo, à convulsionibus & contorsionibus intestinorum simpliciter oritur, adeoque quando contorsionis, aut vagæ lancinationis sensus dolorosus in intestinis vel abdomine percipitur, à convulsionibus eundem oriri certissimum. *Convulsiva hæc colica* est iterum vel *accidentalis*, vel *habitualis*. *Accidentaria* est, quæ à causa evidenti solitaria, sine certâ in corpore prædispositione ad colicam, oritur, & iis, qui nervos sensiliores obtinent, imprimis molesta est, adeoque frequenter à causa externa, vel aliena excitatur, & sic per consensum frequentius intestina affligit. Talis est v.g. *nephritica*, *dolores parturientium*, aut qui *post partum* affligunt, &c. *Habitualis* est illa, quæ certam in corpore radicatam dispositionem seu causam antecedentem aut fomitem agnoscit, quo leviter à causa procatartica seu occasionali quacunque commoto, atrocia tormina abdomen occupant, & aliquandiu ægrum excruciant, utur intestina, quoad contenta, rectè se habeant, & sensim denuò remittunt, subinde etiam in *epilepticos motus*, aut etiam *pareses* transeunt. Talis dolor est *dolor*, v.g. *abdominis scorbuticus*, it. qui in *suffocationibus hypochondriacis*, vulgò dictis *hystericis*, virorum & mulierum sunt obnoxii, item qui *febris intermittebus* malè curatis in cujusdam superveniunt. *Colica talis convulsiva*, dictum fuit, quod sit ista, quæ conjuncta est cum *doloribus nephriticis*. Non oritur propter contenta in intestinis, sed oritur ex plexibus mesenterii nerveis, qui diffundunt ramos partim ad intestina, partim ad renes, partim ad stomachum. Ubi igitur occasione doloris renalis, ratione nervi ad istos renes derivati, communicatur hujus dolorosus spasmus isti plexui radicali, tunc, in graviore malo, omnes ceteri nervi ex plexu oriundi, *similiter* convelluntur, & intestina convulsa infestat colicus dolor contumacissimus, nullis nec purgantibus nec evacuantibus cedens. Confer. *Willis in Anat. celebr. c. 27.* Colica talis convulsiva, sed subinde plus minus habitualis sunt *tormina fœminarum*, quæ vulgò dicuntur *suffocatio hystérica*, tuncque nihil aliud, quàm *convulsiones mesenterii*, & *plexuum nervosorum*, quarum partium vehementiorem contracturam ulterius insequitur *faucium constrictio* & quasi *suffocatio*. Nec rarum est, quod mulieres sub difficili fluxu patiantur tormina gravia abdominis ex similibus spasmis: imò ipsi *dolores parturientium in abdomine*, & *dolores post partum* sunt tales *convulsiones in mesenterio & intestinis*, quibus in partu accedit *convulsiva uteri contractura*. Pertinent huc etiam isti abdominis dolores, qui non rarò morbis diuturnis, & febribus intermittebus non ritè curatis superveniunt, qui nullis cedunt remediis evacuantibus, quæ frustra propinantur & potius malum irritant. Videntur oriri ex metastasi fermenti morbosus ad glandulas mesenterii & nervos istius loci, à quo vellicantur partes nervæ. Unde etiam non rara sunt similia tormina in mesenterii abscessibus mor-



bisque cognatis. vid. *Barth. cent. 1. epist. pag. 253.* Dolor *Scorbuticus abdominis* adeo est urgens, ut cætera species sint saltem risus locusque, de quo nemo melius scripsit quam *Dravvitz. vom Schmerz-machenden Scharbock. Sect 8.* rectè demonstrat, oriri hunc ipsum *ex convulsionibus intestinorum ac mesenterii*, cum percipiatur ab ægris, quod inchoet dolor in dorso ac regione lumbari, & hinc penetret ad interiora; inchoat scil. ubi annectitur mesenterium, & pertingit interiora versus usque ad umbilicum. Admodum vagus est & oberans: interdum in intestinis & abdomine convulsiones infert dolorosas, interdum hæc cessant, & superveniunt convulsiones artuum: quibus cessantibus repetit dolor abdominis, interdum pertinaciter abdomen afficit. Accedit quoque, quod sæpius in tali colica podex sit pertinacissime clausus, & tantum non retractus, ita ut nullum clyisma poterit applicari, propter spasmum, simul intestinum rectum occupantem. Fit non raro, ut ipsum abdomen excavatum appareat, & umbilicus introrsum versus retractus propter istas convulsiones, quibus umbilicus, & forsan etiam ipsum peritonæum, simul afficitur. Certum est, quod hi abdominis dolores sint contumacissimi, & nisi rectè tractentur, facillè degenerant in *pareses*, uti in locis vinosis, Austria, Moravia, Franconia satis experiuntur incolæ, vel *contracturas artuum*. Videmus hinc inde apud Scriptores Præcticos exempla talium dolorum, quos ipsi saltem ex humoribus, speciatim ex bile, derivare nituntur: Sed non possunt se explicare. Nunc dicunt oriri ab humoribus intra membranas intestinorum seu ipsam eorum substantiam contentis: nunc dicunt oriri ab humoribus biliosis vel acris in duplicaturam peritonæi effusis. Alii alias assignant causas. Conf. *Forest. l. 21. obs. 2.* præsertim in *Scholio. it. Riolan. in Enchir. Anatom. c. 3. p. 96.* Solus *Willis* primus hic aperit oculos, tam in *Anatomia Cerebri*, quam in *Tr. de morbis convulsivis*.

Omnes hæc colica ratione adjunctorum nunc cum ardoris & astuationis sensu, nunc cum algore juncta sunt, nunc vomitus adest, nunc abest, nunc, idque sæpius, contumax alvi adstrictio, nunc alvus fluida, interdum nimis aperta. Ardor & astus nunc universum corpus occupat, atque plus minus febrilis est, & verè in impetu spirituum, & concitatione sanguinis, cæterorumque humorum motu, occasione dolorum concitatus oritur. Interdum saltem in profundo sub hypochondrio dextro prope regionem lumbarem, ubi inseritur ductus pancreaticus & cholidochus in intestinum duodenum, perceptibilis est. Oritur ex bile acriori effervescente cum succo pancreatico acidior, ex qua effervescencia talis inducitur calor ac ardoris sensus. Exemplo rem illustrabo: notum est, quod ex confusione spiritus Oli acidî, & olei terebinthinæ oriatur intensissimus ardor, ita ut per vitrum manus insigniter incalescat; vel si confundatur spiritus O cum spiritu vini ex his duobus, celeri manu confusus, intensissimus oritur æstus. Parili ferè ratione concipiamus æstum oriri ex prædictis

causis



causis in intestinis. Quoad *algorem*, qui in abdomine perceptibilis, qualis est, g. etiam interdum in febribus intermittentibus obvius est, *oritur* dolor hic ex contraria causa, ex succo nempe pancreatico nimis acido aut austero, qui occurrens bili paucae, vel nimis oleosae, aut etiam obrutae ex materia viscida in intestino duodeno, ibidem cum eadem concurrens, effervescit quidem, dolorem tamen cum frigoris sensu junctum infert. Hoc frigus saepius quidem in regione lumbari, interdum etiam in aliis intestinorum locis percipitur, prout plus vel minus acidus existit talis pancreaticus succus. Revera autem vix videtur positivum frigus, quin potius spasmi membranarum ab acido vellicatarum frigoris sensum solent repraesentare; parili ratione ferè arque rigor & frigus febrile, nonnisi à tali membranarum circa praecordia, & hinc panniculi carnosissimi Spasmo tremulo oriuntur. *Vomitum* interdum abdomine dolentes affligit, praesertim in *colica convulsiva* crebriores observantur, uti in *nephritica*, *hysterica*, *scorbutica* notum est; minus in *colica humerosa*, nisi vel intestina superiora tenuia magis afflicta sint, vel occasione assumptorum in ventriculo corruptorum malum ortum fuerit. Interdum tamen à *colo male affecto*, quatenus ventriculo proximè subternitur, *vomitum* concitati solet. *Alvus adstricta* ut plurimum ortur ex intestinorum convulsiva, eaque pertinaci in quodam loco contractura, unde in convulsiva frequens est, & hinc etiam in humerosa, magis tamen in illa, & etiam si aperiatur alvus in convulsiva, parum commodi exinde percipiunt aegri; secus in humerosa: In hac enim si evacuetur, quod evacuari debet, melius ordinario habere solent aegri.

*Pars affecta* in his doloribus à *morbo* quidem semper sunt *Intestina*: *Pars affecta à causa* in humerosa sunt *eadem*. In convulsiva vero vitium est in *nervis Complexibus mesenterii nerveis*, vel per consensum affectis; vel acido acri, eo disposito & eo congesto irritatis.

Quoad *Causas* has in specie, in *colica humerosa* considerentur imprimis intestinorum contenta varia, plus minus naturalia, & multiplex eorum nocendi artificium, & crebrius tamen quoad causam antecedentem, respiciendum ad acidum plus minus austerrum, in subiecto plus minus viscido, vel ex stomacho ad intestina delatum, adeoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiosè digestis eò distributum, vel ad intestina ex pancreate derivatum. Hinc etiam *Colica flatulenta* dicta; hinc *Colica stercoraria*, à stercoribus induratis: hinc *Colica pituitosa*, item ab assumptis, praesertim fructibus horæis, fermentescibilibus: item à cerevisia novella, item à pinguibus, superingesto potu frigido vel acidulo, crebriores oriuntur Colicae. *Bilis* sanè per se inepta videtur ad inducendum dolorem colicum. Hujus enim volatilile oleosum abstergit potius intestina, & temperat acorem, aut si *biliosa* observetur *colica*, à bile porracea seu æruginosa originem eadem habebit. In specie sub *purgationibus* aegri saepius tormina patiuntur, partim à stimulis remedii



purgantis, partim ab acrioribus ad intestina commotis humoribus. it, ab *alimen-  
tis difficulter digestilibus*, aut quæ mucilaginem viscidam loco chyli suppeditant, oriuntur subindè colicæ, præsertim si *abdominis* nimia superveniat *refrigeratio*, nempe *mucus acidus, viscidus* hujusmodi tormina infert. Talem colicam ex *nimio ostrearum esu* aliquando observavit *Forestus l. 21. obs. 7.* Pariter post usum *fructuum horarum*, post potum *musti, cerevisiæ recentis*, it. *cerevisiæ triticeæ*, aliaque similia assumpta, facillè præsertim in digestionis debiliore stomacho acescentia, colica præsens est. Hinc rectè mulieres nutrices ab omni esu acido dehortantur, ne infantes in tormina ventris incidant. Uti enim acidum lac in stomacho coagulat; ita viscidam mucilaginem in intestinis exindè producer: unde tormina infantum. Hoc sensu interpretanda venit theoria *Paracelsica*, quæ pro causa Colicæ adducit *Etium resolutos*, aut etiam *tartarum nimis resolutum*, interdum *nimis coagulatum*. qui tartarus stypticis ponticis, acetosis *in*bus intestina & vicinas partes excruciat, nempe *acidum peccans* hoc ipso insinuat. *Hypochondriaci* crebrius patiuntur tormina colica, utpote in quibus notissimus est excessus acidi unà cum cruditate materiæ viscidæ. Unde & *flatuum* tantus proventus, & *colica humorosa* scaturigo. *Ictericorum tormina* huc pertinent, in quibus defectu bilis contenta intestinorum acida viscida promptè tormina inferunt. Item, *stercora* in intestinis nimis *indurata*, partim ex sui visciditate & crassitie, partim ex acido austero eadem coagulante, *colicam* dant *stercorariam*, subindè per quàm contumacem. Subsistentibus firmitus in intestinorum cellulis dictis stercoribus, & ita ad dolorem eadem irritantibus. Facit huc *dolor colicus in lue Gallica* interdum affligens, ex acido specifico natus viscido, qualem observavit *Zacut. Lusit. l. 2. prax. adm. observ. 22.* nullis nisi *Mercurialibus unguentis* succumbens. Facit huc, si *varia præternaturalia* deglutuntur. Sic ex *deglutitis nummis aureis*, indeque eorum subsidencia in cellulis intestinorum *pertinacem colicam* observavit. *Borellus cent. 4. observ. 25.* Item *Bartholinus cent. 3. epist. 69.* Pertinent huc *calculi* in colicis subindè observati, ac cum levamine ægrorum excreti. Qualia *colicæ calculose* exempla vid. in *Horst. l. 4. obs. 44. & seq. p. 232. &c.* it. in *Benivenio cap. 9. obs. p. 122.* Conf. hic *Schenckius.*

*Vermes* quoque subindè in intestinis gravissima pathemata colica inducunt. vid. *Amat. Lusit. cent. 1. cur. 5. & 33.* *Hildanus cent. 1. observ. 57.* & dolorem à lacertis ac bufonibus vid. in *Barth. cent. 5. hist. 94.* Tandem pertinent huc ipsi *intestinorum affectus præternaturales*, multiplices dolores referentes. Ut nil dicam de *inflammatione intestinorum*, ordinariò gravissimam dolorem inferente. Sanè colicum dolorem lethalem ex *intestinis à Dysenteria conglutinatis* observat *Rhodius cent. 2. observ. 77.* Sic pariter colicam lethalem notavit *Scultet. in Armament. Chirurg. obs. 61.* natam ex *obstructione occulta meatus, cholidochi.*

Pertinet

Pertinet h  
chondrio  
Pariter col  
notat Riv

Caus

sententi, v  
terna exci  
culo lym  
curatas co  
per æqu  
teste Bar

Ut rit

tur, obse  
genus, r  
2. adjunc  
rum par  
crementi  
deracis fa  
nem cogi  
vulsiua,  
scorbuto  
cum ista  
bolsa, on  
colica ne

Quo

adjuncto  
rum rati  
rum in i  
veteres  
pervenit  
inductar  
cam in g

Quo

roxysmu  
doloro  
morosa,  
Colica e  
sta, pro



Pertinet huc, quod observat *Horstius l. 4. obs. 47.* tormina continua sub hypochondrio dextro, à calculo vesicæ biliarium replente, & intestinum atterente. Pariter colicum dolorem à punita in externa intestinorum superficie hærente notat *Riverius in observat. communicatis.*

*Causa colica convulsiva* pariter est acidum, sed in plexibus nervis mesenterii, vicinisq; locis membranosis pertinacius hærens, à quacunque causa externa excitatum, sive cum nutrimento ad dictas partes deferatur, sive cum vehiculo lymphæ eò deponatur, id quod in scorbuticis, hysteriis post febres malè curatas certissimum est. Imò tormina abdominis contumaciora, utut non semper æquè atrocia, sæpè ab abscessibus in glandulis mesenterii & pancreate sunt, teste *Barth. cent. 1. epist. 253.*

Ut ritè cognoscantur hi dolores intestinales, & rectè à se invicem discernantur, observanda sunt 1. antecedentia, nempe constitutio ægri, victus ratio, vitæ genus, morbi consueti, & circumstantiæ plures, quæ morbum antecesserunt. 2. adjuncta, seu essentialiter inbarentia, ipsa doloris ratio, supervenientia aliarum partium symptomata. 3. consequentia, ut mutationes in urina, in alvi excrementis, juvantia & nocentia, &c. Ex his invicem collatis, sed probè ponderatis facile est, dolores dictos à se invicem discernere, & fiendi eorum rationem cognoscere. In specie attendendum, an sit colica humorosa, an vero convulsiva, & si hæc, an sit accidentalis, vero habitualis: & si habitualis, an sit scorbutica, hysterica, an alia. Speciatim sæpius confunduntur colica simplex cum ista, quæ supervenit nephritidi. Ut ita melius cognoscatur radix morborum, omnes circumstantiæ probè pensitandæ, & speciatim urina, in qua, si sit colica nephritica, notabiles mutationes observari solent.

Quoad Prognosin, colica ex se leve malum est, quæ tamen interdum ex adjunctorum aut supervenientium symptomatum, aut plurium circumstantiarum ratione periculosa, imò lethalis esse solet. Humorosa, & quæ à contentorum in intestinis est vitio, est mitior, nec adeò periculosa atque convulsiva, quam veteres practici sæpius colicam biliosam vocare solent: Nam huic non rarò superveniunt Epilepsia vel Pareses. Item Cephalalgiam & maniam ex tali colica inductam notat *Höferus in Herc. Medic. p. 185.* Thonerus obs. p. 93 notat Colicam in geminam visionem & Epilepsiam terminatam.

Quoad Curam. Cura Colicæ duplex est, 1. in Paroxysmo. 2. extra Paroxysmum. In Paroxysmo 1. irritatio causæ morbosæ, ipseq; sensus intestinorum dolorosus, eorumque motus convulsivus opiatu sistendus. 2. Si Colica est Humorosa, causa peccans materialis corrigenda, & hinc per alvum inducenda. 3. Si Colica est convulsiva, appropriata nervina, in specie *Θια vol. oleosa opiatu mista*, propinanda.



*Extra Paroxysmum.* Hoc sedato, *morbis primarius, fomes morbosus*, unde dolores pendent, idq; speciatim in *convulsiva, habituali*, variis appropriatis removendus, & crebrior aut consueta *recidiva* præcavenda. Pro scopis istis in *Paroxysmicura* obtinendis, observandum.

I. *Clysmata* in toto paroxysmo legitime applicata sæpius esse perquam proficua. *Conveniunt tamen magis*, ubi hæret malum in intestinis crassis, minus quando in tenuibus, idque speciatim pro evacuationis scopo. Deinde conveniunt, ubi ventriculus gravius simul affligitur, ut tanquam revulsorio stimulo tam causa irritans, quam motus spirituum ad intestina derivetur. Usurpantur *clysteres* tam mitiores, nempe ex *emollientibus*, aut *carminantibus* parata, vel fortiores *purgantes*, aut acrius *stimulantes*, præsertim in *humorosa* quando alvus præternaturaliter & pertinaciter obstructa, aut quando suspicio adest, fomitem materialem hære in intestinis crassis. Item quando post propinata purgantia non sufficienter respondet alvus, optimum est in talibus casibus, clysteribus acribus, plus minus purgantibus, naturæ motum promovere: quando vero malum hæret in intestinis tenuibus, potius *laxantia per os* conducunt. Quod si videamus clysteribus acrioribus malum non mitigari, iis ulterius non insistendum, sed præsumendum vitium hære in intestinis tenuibus. In *convulsiva Colica anodynæ*, & *leniter demulcentes* sunt optimi, it, accedendum est ad *clysmata terebinthinata*, quæ in quavis convulsiva optima.

II. Quoad *Purgantia* per os assumpta, curiosus horum selectus instituendus est, nempe in *colica convulsiva* propriè dicta *purgantia omnino nocent*, irritando etiam malum fortius exasperant, & ex aucta hinc intestinorum contractura minus laxant. *Lenia* igitur *humectantia*, blandè *abstergentia* sunt in hac optima, ideoq; eò magis notanda, si in Colicâ convulsiva vomitus simul gravius affligat. Porro si ex inflammatione est dolor intestinalis, caveat, ne ullo medicamento purgante, etiam levi, utatur. Ex irritatione etiam inflammatio augetur, unde ilei metus supervenit. In *humorosa* in specie, ubi intestinorum peregrini ac vitiosi hospites sunt exturbandi, *purgantia locum habent*, vario tamen pro circumstantiarum ratione, regimine, nempe si dolor non adeò urget, aut si ex errore externo, assumptorum nempe vitio malum enatum sit, *initio purgandum*, secus differendum, donec nonnihil mitescat dolor. In Colico tamen dolore *ex pituita vitrea vel acida* enato, si quis lenientibus solis contentus, à purgantibus veris absteineat, nil ager. Potius quàm primum *viscida materia* attendenda, & per purgantia, *attenuantibus mista* eadem evacuanda. Confer. *Septal. in animadv. l. 7. §. 72.* aliàs non nisi summa necessitate urgente in principio ad *anodyna*, ad *narcotica* deveniendum, sed intestina prius evacuanda, item, si *gravior vomitus* adsit simul, *purgantia* etiam *cautè propinentur*, ne humorum occasione colicam in ileum transmutet; In usu Vomitorum remediorum, qui interdum necessarii sunt



sunt, cauti sumus maxime: Si enim ventriculus & supernæ partes intestinorum repletæ nimium fuerint, ex usu maxime erit, ut medicamentis ad deiciendum ingestis, locus detur pertranseundi. Quod si totus dolor ejusque causa infernas partes obsideat, non solum frustra tentatur vomitus, sed aliquando fit cum certa ægrorum pernicie, cum *voluntosi* facili exinde fiant. Illustrat vomitoriorum usum observatio Plateri l. 2. observ. p. 451. seq. Adolescens quidam Nobilis ex inordinata victus ratione & nimio potu vini Muscari Narbonensis Cardialgiâ primùm, mox colico dolore laborans, postquam semel curatus, maturius quam par erat, ætæ frigido se credidisset, & quadrigis celeriter per urbem veheretur, recidivam passus, sex septimanarum spatio durante morbo, licet sæpius *clysteribus* & *narcoticis* usus fuisset, non tamen integrè sanari potuit, donec vomitorio *Gali* usus fuerit, à cujus usu mox magnam copiam *aruginosa bilis* aliquoties vomuit, uti & *pituita*, atque inde *urina*, quæ ex atro crocea diu permanserant, in naturalem colorem permutari ceperunt, ipseque sensim ad se redire.

III. *Opiata* sunt optima, conveniunt tamen magis in *convulsiva*, & in hac tutius, si ægri alvus aperta, & ipsa opiata propinentur appropriatis mista. In *Colica humerosa*, saltem ubi necessitas urget, locum habent: frequentius tamen in hac usurpari possunt, ubi materia morbifica est tenuior & acrior, minus vero ubi eadem viscidior. Nam opiata ferè acrimoniam temperant, viscidæ vero materiæ motum impediunt, & ita eandem magis figunt, siquidem intestinorum motum impediunt. Denique non sunt differenda eò usque, donec vires vitales jam collabascant, ne ægrorum vita dormiendo finiatur. Adeoque in *Colica humerosa* usurpantur *opiata post purgantia*, & hinc etiam *purgantibus mista*, non nisi in casu necessitatis, ante purgantia. Nempe ubi tanta est, siue ventriculi debilitas, siue vomitatio, ut nec pilulæ possint detineri, ibi primò *remedium anodynum* ordinetur. 2. paucis horis elapsis *Catharticum*, eo temporis spatio interjecto, ut catharticum à Narcotico tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas tamen in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam eidem communicandam sufficiant, ut suam demum exserat operationem cessante altero. Licet catharticum, modò id possit fieri, diu post anodynum rectissime propinetur, cum etiam ad horas 12. ab hoc assumpto alvus isti ægrius respondeat, atque non nisi operosius solvatur. Cum autem hic uti in aliis plerisque morbis, in quibus indicantur narcotica, catharticum semper dolorem intendat, (saltem finitâ jam operatione, qua quidem vigente mitius nonnunquam cum ægro agitur,) idcirco solenne est, anodynum ingerere, ubi primùm expiravit cathartici *æpyrum*, ut rectè loquitur Sydenham in observ. circa morb. acut. p. 297. Quod si cum *purgantibus* miscenda sunt *opiata*, non possumus imitari veterum morem, qui receperunt Elect. Diaphan. ℥y. vel vj. & Phil. Rom. ℥j. cum talia



ægri nostri nauseosi non bene ferant, sed possumus imitari *Riverium cent. 1. obs. 63. cent. 2. obs. 1.*

℞. Aloës opt. ℥j.  
Diagryd. gr. viij.  
laud. opiat. gr. iij. M.F. Pil.

Vel secundum *Stockerum*:

℞. Aloës zocotrin. vel  
pill. aloephang. ℥ss.  
opii

croci an. gr. j. vel ij. aut

pro croco ponatur castoreum. F. Pill.

Exhibeantur jejuno stomacho, dolorem etiam sedant, & postea alvum solvunt.

IV. In omni *Colicâ* fugiendum frigus, præsertim ventriculi & pedum. Hinc calidus potus est optimus. Et observavi in *colica convulsiva* cum copioso vomitu conjuncta, & aliquot secessibus, ex abdominis ab aura frigida refrigeratione nata, optimum fuisse remedium bonum haustum *Aq. Vita juniperina*, unde omnia mala celsârunt. Hinc rara est & vix nempe rarissimè imitanda observatio, quam habet *Septalius* loco supra citat. §. 82. *Colica* desperata copiosa aqua multa nive refrigerata potu curatæ. Sed arbitror accidentarium fuisse effectum, quasi occasione perfrigerationis intestinorum convulsorum spasm relaxati fuerunt. Unde mirabilis flavæ bilis copia evacuata fuit, unde non nisi cautissimè imitandus venit.

V. Si alvo relaxatâ, dolores persistunt, id quod in specie in *convulsiva* evenit, usurpanda sunt adhuc remedia appropriata, quæ nempe & acidum temperant, flatus resolvunt, ventriculo & intestinis grata sunt, adeoque aromatica temperantia imprimis usurpentur. Et hinc etiam remedia, qualia in passionibus hystericeis, locum habent: Unde ex his castoreum; ex istis chamomilla, semina calida, maj. & similia imprimis conducunt. Vinum simplex vix semper æquè tutum videtur, medicatum melius convenire arbitror.

Quoad materiam Medicam clysmata pro scopo variant. v.g. *Clyσμα emolliens*.

℞. Herb. malv. Mij.  
rad. lil. alb. ℥j.  
flor. verbasce.

sambuc. an. Mß.

Coq. in s. q. aq. simpl.

Colatur ℞. ℥viij. adde

Elect.



Elect. lenitiv. ℥ijß.

salis gemm. ℥j. M.

pro clysmate una vice applicando.

Quòd si flatus adsint, olea destillata simul addi possunt.

*Clyisma carminativum anodynum.*

℞. Fol. chamom.

summit. anethi. an. Mj.

rad. levistic. ℥j.

bacc. lauri ℥vj.

fem. fœnic. ℥iiij.

coq. in l. q. aq. comm.

Colati ℞. ℥ix. adde

Elect. de bacc. laur. ℥ijß.

ol. destillat. angelic.

rutæ

cumin. an. gutt. v.

Theriac. ℥j. ad ℥ij. M. pro clystere 2. vicibus injiciendo.

Impediunt enim flatus, quo minus totum una vice possit injici. Quòd si acrius stimulanda sit alvus, infusa *Galialia clysmatis* addenda sunt. Conf. *River. cent. i. obs. 58. & 67. it. cent. 2. obs. 12. it. cent. 3. obs. 22. v. g.*

℞. Juris pisorum ℥vij.

aq. benedict. ℥ij. vel iiij.

Elect. lenitiv. ℥vj. M. nempe ad imitat. *Rulandi*, qui tale usurpavit clyisma.

℞. Juris pisorum ℥viij.

sacchar. ℥ß.

℥. benedict. ℥iiijß.

℥ comm. ℥iv. M. de hoc injiciatur quavis horâ recrudescentis doloris.

Et simili clysmate puerperæ, per 24. dies alvum obstructam habenti, & stercora per os rejicienti, alvus mota fuit. Sed in hoc casu loco aq. benedict. extract. esula addidi.

*Clysmata terebinthinata* supra laudavi, & multum commendantur à *Deo-dato in valetud. pag. 247. v. g.*

℞. ☐ human. ℥bj.

terebinth. in vitell. ovi solut. ℥ijß. M.

pro clysmate applicetur.

Conf. hîc *Willis de anima brutorum*, ubi de colica p. 394. vel 42. p. 2. c. 15. & in specie in colica nephritica, proficui sunt terebinthinati clysteres.

T

Clysteres

Elect.



Clysteres ex fumo Tabaci in colica sunt præstantissimi; de quibus confer. Bartholin. cent. 6. hist. 66. cent. 4. epist. 523

Ubi flatus copiosi adsunt, speciatim clysmata ex urina puerorum conveniunt. v. g.

℞. Decoct. carmin. ℥vj.

urinæ human. ℥iij.

ferment. ℥j.

Θ comm. ℞j.

mell. rosat. ℥j. M. pro clysmate.

Quoad evacuantia in intestinorum doloribus convenientia, equidem blandissime emollientia & abstergentia in Colica convulsiva locum habent, qualia sunt imprimis potio passulata, & hinc pulveris salini cum stimulo Scammon. Item, leniens ista potio Plateri:

℞. Ol. amygd. dulc. recent. ℥j℥.

vini malvatic. ℥℥.

syr. de papav. ℥℥. M. pro haustu.

Sic in Colica ab errore externo.

℞. Lap. ☉ præp. ℞j.

laud. opiat. gr. j.

scamm. sulphurat. gr. iij.

ol. destillat. cort. aurant. gut. j. M.

Quoad Colicam humorosam, & hic nunc fortiora, nunc mitiora conveniunt purgantia. Fortiora hæc in specie, ubi ex Spasmo fortius contracta sunt intestina, aut motus eorum peristalticus minus fieri solet, non conveniunt, tunc enim mitiora interdum plus acrioribus operantur purgantibus. Sic referente Sennerto observatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum manna ℥j℥. cum ol. amygd. d. ℥iij℥. in jusculo Gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum à dolore liberâsse. Vel ol. amygd. d. loco butyri jusculis admisce, quibus etiam sperm. ceti ℥℥. commodè addi potest. Quod si vero tutius uti licet purgantibus, vel cremor ☿ cum resinis purgantium propineatur ad imitationem Willis cit. loc. pag. 396. vel 545. vel infusum rhabarbari cum senna adhibeatur. Vel ubi viscida ac tenax pituita primatiō peccat, potiones ex gummi. ammoniac. vel pilula ex eodem gummate, aut Mercur. dulcis usurpentur, qui Mercur. dulcis potenter dissolvit & detergit talem mucum. Imitari possumus Deodatum, qui declinante morbo ex hac causâ natō has pilulas præscripsit:

℞. Mass. pilul. cochiar. min. ℞j.

aquil. alb. dulc. seu ☿. dulc. gr. xx.

☉ destill. anisi gut. ij. M. F. Pilul.

In

In frequen  
vocat Calo

Opiata per  
laudan. by  
minus aro  
helenium,  
fuligo, m  
culi equin  
extracta,  
liquor. C.

In spec  
Chamom  
feruit, cu  
tum, in d  
comm. vel  
medium,  
stum. Sch  
essentia, f  
colica bys  
Conf. Sch  
vini optim  
tribus au  
☉ destill.  
stranguri

Imp  
radix cur  
thium qu  
torminib  
miscatu  
esse utu



In frequenti etiam usu est *Riverio*, in cuius *observat.* saepe occurrit *purgans* quod vocat *Calomelanos Turqueti*, quod nihil aliud est, quam

℥. ℥. subl. dulcis. ℥j.

scamm. ꝑ. it. ℥℞. M. F. ʒ

vel cum *mucilag. Tragacanth. F. pilul.* pro una dosi.

*Opiata* per se nota sunt, qualiacunque etiam adhibeantur, imprimis *essentia opii*, *laudan. hysteric. syr. papav. theriaca* & alia cognitissima. *Appropriata* plus minus *aromatica* contra dolores intestinales sunt *veronica, chamomilla, sclarea, helenium, allium, absinth. gentiana, cortices aurant. sem. 4. calid. maj. zedoaria, fuligo, mandib. luc. piscis, castor. stercora animalium* (speciatim *lupi & equi, testiculi equini, sordes aurium humanar. &c.*). Parata sunt dictorum *syrupi, essentiae, extracta, olea destill. it. spec. aromat. compos. & ea volat. & carmin. de tribus, liquor, C. C. succinat. & O. dulcis, sacch. Si.*

In specie *Veronica*, ejusque cum *myrrha* in vino decoctum multum extollitur. *Chamomilla* est instar omnium in *colica convulsiva*, alius irritis me nunquam deseruit, cujuscunque sint conditionis, ita ut in *colica nephritica, doloribus post partum, in dolorib. gravidarum, & omnibus aliis decoctum flor. chamom. vulg. in aq. comm. vel cerevisia* paratum, calide haurtum, saepius reiteratum, mirabile sit remedium. Hinc & ∇. ejus, it. ∞ destill. *sapphyrinum* ad aliquot guttas haurtum. *Sclarea seu hormonum* istud odoratum est egregium, sive decoctum, sive essentia, sive aliquoties abstractus adhibeatur, tam in *colica virorum*, quam in *colica hysteric mulierum*. *Radix allii* jam a longo tempore fuit commendata. Conf. *Schenck in observat.* Hinc *jusculum cum allio & ∞ calide haurtum cum vini optimi dimidia parte* saepe expertum est, auctore *Borell. cent. 4. obs. 92.* In *corticibus aurantium* vis est non vulgaris anticolica, sive pulvis, sive essentia, sive ∞ destill. *cort. aurant.* usurpetur, potenter *acida* quaecunque temperat. Unde *stranguria* medetur. Hinc sunt, qui commendant talem compositionem:

℥. Cort. arant. ʒj℞.

maxill. luc. pisc.

lap. ∞. an. ʒj℞.

talor. lepor.

succin. præp.

zedoar. an. ʒj. M. F. ʒ Dos. ʒ℞. ad ʒj.

Imprægnari potest *oleo destillat. cort. aurant.* item, *essentia opii. Helenii radix cum vino decocta*, egregium experimentum anti-colicum. item, *Absinthium* quocunque usu convenit, in specie iis, qui in peregrinationibus colicis torminibus vexantur, sive decoquatur, sive minutim dissectum cum *saccharo* miscetur & capiatur. Et in *colica ex febrium reliquiis* oborta, nil melius esse usu *absinth.* refert *Fehr. de Absinth. pag. 173.* Ob id *Mindererus* in



*Medicina milit.* contra colicam commendat *vinum decoctionis absinthii*, vel *radicis helenii cum cortic. aurant.* calidissime potum, addito paucio *theriacæ* vel *mithridatii*. *Gentiana* in forma pulveris à ʒß. ad ʒj. usurpata, si alvus est aperta, egregium est experimentum, tollens intestinorum tormina. *Semina 4. calida maj.* in vino ebullita & ita hausta rectè dicuntur ab *Helmontio* solamen pauperum. Virtus & usus in eo consistit, quod nempe aciditatem intestinis hostilem corrigendo, intestinis malè affectis exinde egregium solamen & levamen adferunt, indeque eorum *spasmos* & inde ad tactum sensilem *duritiem* remitti faciunt. Confer, *Helmont. Tract. de Flatibus* §.75. unde & eorundem *olea destillata* non secus ac *ol. destillat. cort.aurant.* vel *angelica*, vel *mentha* ad aliquot guttas propinata, sunt laudata. Et *Panarolus Pentecost. 2. observ. 8.* ad colicam ex causa frigida commendat *ol. bacc. lauri & cortic. aurant. per expressionem cum vinofactum*, quo bibito ægri per breve tempus sedato dolore somnum capiendo convalescerunt. Par fecit atque *Gentiana*, *zedoaria* est ratio, *carminativum* egregium, *statuum resolutivum*, & quod præmissis præmittendis, tam in substantia, quam tinctura & inde parato extracto est nobile. *Fuligo* pulverisata & cum acet. destill. mista ac bibita calidè dolorem statim pellit: pariter & *urinosus fuliginis* maximo cum successu propinatur. Quæ remedia & in casu ab alto & passionibus *hystericis* & *pleuritide*, &c. egregiè conveniunt, dum acidum in hisce malis potenter corrigunt. *Castoreum* in quavis colica, non tantum in ea, ubi adsunt *flatus*, aut ubi adest *pituita viscida*, sed etiam in *colica convulsiva* egregia est medicina, non secus ac in *passionibus hystericis*, item in *doloribus scorbuticis* proficiuus econtra est usus. Speciatim cum *salib. volatilib.* commodè propinatur in *colicis convulsivis*. Veteres *castorei* ʒi. ad ʒij. in haustu *vini calidi* propinârunt in pertinaciori colica, uti constat ex *foetis Prax. & Solenandri consiliis*. Nos *Tincturâ castorei* utimur parata cum *Tinctura tartari* acriori, aut etiam cum *sal armoniac. vinoso*, quæ solæ ʒß. ad ʒj. Dosi, vel cum *essentia opii* sociatæ optimè conducunt. Pariter *extractum castorei*, vel cum *laudano opiato*, vel cum *extracto theriacali* misceri, & ita cum *oleo destillat. chamom.* aut *succini* *pilula anti-colica* fieri possunt, vel simpliciter secundum *Hartmannum theriaca* cum *castoreo* & paucio *laudano opiato* propinetur. *Partes animalium dura* acidum absorbendo & corrigendo speciatim *mandibula lucii pisc.* vel *unicornu prapar.* vel *tali leporis* aliaque similia itidem locum inveniunt. In specie *stercus lupi* ab omnibus decantatum remedium est contra Colicam ex quacunque causa natam. Dof. ʒß. ad ʒj. Confer. *Panarol. Pentec. 3. observ. 36.* *Hartmannus in prax. Chymiatr. pag. 184.* *Forest. l. 21. observ. 15. in schol. Amat. Lusit. cent. 3. cur. 12.* *Riverius cent. 1. observ. 59. & 86.* Parabilis remedium est, idque inprimis in *Colica convulsiva* conferens *stercus equinum* recens

recens ex eo  
pressus suc  
& expectan  
succum ster  
toft. 2. pag. 3  
solent comp  
ad ʒj. cum  
ca lib. 1. co  
co croco ex  
q̄is flores a  
dolorem,

Inte  
Fernel. lib  
veris, &c.

Pulverisen  
infundant  
Mariæ Bal  
ex arena,  
cochl. j. ve

Specie  
Myns. ite  
& hinc liq  
chondriaca  
quibusdam  
culo appro



recens ex equo avenâ pasto. Ex hoc ipso recenti cum vehiculo quocunque expressus *succus*, & ita calidè propinatus, imperando, quantum possibile, quietem, & expectando sudorem, origine fordidum, sed usu nobile est remedium. Sic *succum stercoris columbini* cum *lacte* expressum, laudatum vid. in *Velsch. Hecatoest. 2. pag. 32.* *Aurium humanarum sordes* assumtæ in vehiculo calido subito solent compescere dolores in abdomine. Tandem *pulv. testiculorum equin.* ad ʒj. cum ʒß. *sem. anisi* laudatissimum est remedium, præsertim à *Fonseca lib. 1. consil. 57.* Idem *pulv. testicul. equin. in aqua liliorum alb.* cum paucis *croco* exhibitus experimentum fuit *Zvvetferi* contra *Colicam*. Tandem *Æis flores* ad ʒß. in vino calido dati, probè corpus contegendo, optimè sedant dolorem.

Inter preparata multiplicia ferè ex specialibus cognita sunt *syrup. de alib. Fernel.* ubi emolliendum, & temperanda acrimonia. *Syr. cort. aurant. papaveris, &c.* item *℞. & ∇. carminativ. & anticolic.* v.g.

℞. Flor. chamom. Rom.

sambuc.

fol. menth.

rutæ sic. an. Mij.

baccarum Juniper. recent. ʒijß.

lauri excort. ʒvj.

sem. cummi ʒj.

anis.

fœnic. an. ʒß.

calam. Aromat. ʒijß.

flav. cort. aurant. ʒiij.

cinamom. acut. ʒvj.

zedoar. ʒiij.

Pulverisentur omnia tenuissimè, adspargantur *℞. o. rectificat. ʒß.* ad ʒvj. infundantur *spiritui vini* non adeo exactè rectificato, stent per 12. horas in *Mariæ Balneo* digerantur lento *Δ*, vase bene munito. Tandem destillantur ex arena, vel cineribus per alembicum lentè, ut caveatur empyrevma. *Dof. cochl. j. vel cochl. ij.*

*Species diacumini, diacalaminthæ, diagalanga, diapipereon, diasulphuris. Myns.* item *salia volat.* quælibet, speciatim *spiritus carminativus* de tribus, & hinc *liquor C. C. succin.* sunt præstantissimi. Ille in *colicâ statulenta hypochondriaca*: hic in *Colica convulsiva hysterica, &c.* *Spiritus o dulcis*, quibusdam *anti-colicus* dictus, est egregium remedium à ʒß. ad ʒj. in vehiculo appropriato calidè propinatus, præsertim, ubi vagæ phlogoses aut æstu-



ationes corpus affligunt. Optimè paratur, si loco  $\Psi$  recipiatur  $\sim$  quidam *vegetabilis, carminativus*, sive abstrahendo à vegetabilibus paratus. Hujus duplum vel triplum cum  $\sim$   $\Phi$ . pederentim mistum, hinc prævia digestionē destillatum, ut exactius uniantur, dant egregium  $\sim$  *um anticolicum*.

Ex his variæ fieri possunt præscriptiones. v. g. ad *quosvis dolores intestino- rum* in genere.

$\mathcal{R}$ . Aq. chamom.  $\mathfrak{z}$ ij.

$\sim$  theriac.  $\mathfrak{z}$ ij.

laud. op. gr. ij. vel iij.

fyr. cort. aurant.  $\mathfrak{z}$ ß. M. capiatur cochleatim:

In *Colica humerosa flatulenta*:

$\mathcal{R}$ . aq. menth.

chamom. an.  $\mathfrak{z}$ ß.

carminativ. ult.  $\mathfrak{z}$ ß. vel  $\mathfrak{z}$ vj.

Elix. menth.  $\mathfrak{z}$ ß.

$\sim$ ,  $\Phi$ . dulc. anticolic.  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ ij. M. capiantur cochlea- tim, expectando, si possibile, aliqualem sudorem; & convenit in specie talis mistura c.  $\sim$   $\Phi$  i, quando æstuatio corporis quasi febrilis juncta est.

In *alia Colica humerali*:

$\mathcal{R}$ . Ol. destillat. carui.

cumin.

angelic.

chamom. an. gut. vj.

facch. albiss.  $\mathfrak{z}$ ij. M.F. Elæosaccharum, adde

ß.  $\mathfrak{z}$ ij.

mandib. lucii piscis.  $\mathfrak{z}$ j. M.F.  $\mathfrak{z}$ . Dos.  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ j. & ultra.

Addi potest cuilibet dosi

laud. opiat. q. s.

v. g.  $\mathcal{R}$ . Flor.  $\mathfrak{z}$ is  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ß.

elæos. anis.

zedoar. an. gr. viij.

laud. opiat. gr. j. M.F.  $\mathfrak{z}$ .

In *Colica convulsiva*:

$\mathcal{R}$ . aq. menth.

chamom.

veronic. an.  $\mathfrak{z}$ j.

essent. castor.  $\mathfrak{z}$ ij.

liquor. C.C. succin. vel hujus loco

$\sim$  sal armoniac.  $\mathfrak{z}$ ß.

essent.

tilia:

Quoa  
mom. ruta  
macis, &

terem cale  
Item

Pertin  
vulsva, u  
est ad gutt.  
ad mellagin  
si non sem  
cini, vel  
Hinc & E  
succini, ap  
Vel:

Empla  
substitui po  
subigatur  
ris, & illin



essent. opii. ℥j.  
 fyr. cort. aurant. ʒvj. vel ʒj. M. Aut quibus inimica sunt vola-  
 tilia: ℥. ▽. flor. sambuc.  
 chamæm. an. ʒjß.  
 essent. castor. ʒjß.  
 unicorn. ver. ℥j.  
 mandib. lucii piscis. ʒß.  
 fal vol. CC. gr. vj.  
 fyr. artemis. ʒiij. M.

Quoad externa, imprimis in usu sunt *linas* ex *ossis*, v. g. *aneth. cha-*  
*mom. rutac. laurin.* item, *olea destillat. lauri, juniper. ruta, cort. aurant.*  
*macis, &c.* v. g.

℥. Ol. laurin. comm. ʒß.  
 castorei ʒj. M. Illinantur umbilico, imponendo la-  
 terem calefactum, est egregium.

Item: ℥. Ol. chamom.  
 aneth. an. ʒiij.  
 destillat. chamom. ʒß.  
 cumini.  
 rutæ.  
 angelicæ an. ʒß. M. D. S.

## Zerthellendes Del.

Pertinet huc imprimis *Galbanetum Paracelsi*, nobilissimum in *Colica con-*  
*vulsiva*, umbilico illitum: cujus loco *oleum saponis* commodè adhiberi pot-  
 est ad gutt. iij. vel iv. umbilico illitum. Nempe dissolvitur *sapo in spir. vini*  
 ad mellaginem, *Massa* cum calce viva destilletur & cohobetur aliquoties. Quod  
 si non semper in promptu sit *Galbanetum* istud nobile, etiam *ol. destillat. suc-*  
*cini*, vel solitarium, vel cum *oleo spica* mistum commodè substitui potest.  
 Hinc & *Emplastr. de Galbano matricale* usitatum, malaxatum, c. l. q. *olei*  
*succini*, applicatur regioni umbilicali.

Vel: ℥. Galbani in aq. vitæ dissolut. ʒij.  
 ol. chamæm.  
 rutacei an. ʒß.  
 croci gr. vj. M. F. Linim.

*Emplastrum* etiam ex *gumm. tacamahac*, vel ex *gumm. carrann.* optimè hic  
 substitui possunt. *Paracelsus* feliciter usus fuit *zibetha* umbilico illita: Vel  
 subigatur *zibethum* cum *oleo nuc. moschat. expr.* adde parum *ol. destillat. ma-*  
*cis*, & illinatur umbilico, Vel: ʒ. *Balsam. zibeth. Myns.* ʒj. illinatur  
 umbilico



umbilico successivè. Talium loco & balsamus apoplecticus cum oleo destillato maris acuat, umbilico applicari potest.

## CAPUT X.

De

SITU INTESTINORUM  
MUTATO.

**S**itus intestinorum mutatur, quando ex loco naturali in alium transferuntur, quod sine insigni tumore fieri nequit, qui tumor ex iisdem extra locum prolapsis vocatur communiter

## HERNIA,

**en Bruch.** *Situs naturalis*, est hic: Mesenterium interius colligat intestina, eademque à vertebrae lumborum suspendit: exterius vero peritonæum eadem ambiendo, veluti in bursâ, continet. Quamdiu hæc bursâ peritonæi est integra, tamdiu in loco naturali permanent. Si vero eadem in loco quodam aut rumpatur, aut laxetur, necesse est, ut intestina prolabantur. Intestina hæc nunc sola, nunc junctim cum omento, nunc omentum solum prolabi observantur. Unde vel ἐπιπλοκήλη, vel ἐντεροκήλη, vel ἐπιπλο-ἐντεροκήλη oritur.

*Intestina omnia sunt vel tenuia vel crassa: Crassa* tam firmiter lumbis annectuntur & hypochondriis, ut citra vim insignis tractationis aut divulsionis situm mutare nequeant. *Intestina vero tenuia, jejunum & ileum* unâ cum omento in *Hernia* prolabantur.

Loca, in quibus vitiaur peritonæum, sunt varia: Frequentissima sunt ejusdem processus, per quos in scrotum descendunt vasa Spermatice, & post hos est umbilicus. Nam in his duobus locis facillimè laxatur aut rumpitur peritonæi membrana fibrosa. Unde etiam hæc duæ primariæ sunt *Herniæ* species, *Hernia umbilicalis* & *Hernia Scroti*. *Hernia scrotalis* est vel perfecta sive completa, vel imperfecta sive incompleta. Imperfecta est *hernia inguinalis* sive *Bubonocèle*, quando intestina saltem prolabantur in Inguina, & super osse pubis hærent. Quod si verò successivè ulterius descendunt, donec in scrotum perveniant, est *hernia scrotalis perfecta*. Duo hæc loca, *umbilicus* & *processus Peritonæi* sunt loca magis ordinaria, per quæ fiunt *Herniæ*: interim tamen etiam aliis in locis ruptum peritonæum dat *Hernias*. Primus hoc observavit *Barbette in sua Chirurg. p. 1. c. 7.* ubi observat, quod etiam aliis locis abdominis, juxta, infra & supra umbilicum: item à parte posteriori, viti



vizio peritonæi oriantur herniæ, quæ ab imperitis tanquam abscessus, non citra periculum ægri tractari solent. Sic cit. loc. Barbetre observat Herniam, dum intestinum non in scrotum, sed extra hoc in partem musculosam femoris reledit. Item, dum peritonæum prope spinam dorsii ruptum dat Herniam. Sic Bartholinus cent. 2. histor. 95. observat Herniam mox infra cartilaginem ensiformem ex ruptura peritonæi. Rarum est, quod utero rupto intestina prolapsa fuerint. Tale exemplum habetur in Schenckio l. 4. observat. Cæterum fit non ratò, ut præternaturalis testis sitis ignorantia tanquam herniæ possit imponere, quia interdum testiculorum alter retractus, versus abdomen super os pubis hærens, tumorem infert, qui à chirurgis interdum pro herniâ, interdum pro abscessu habetur. In huiusmodi Herniis tumor, ubicunque locorum sit, in stantibus accrescit & protuberat: in decumbentibus verò successivè evanescit, totusque ut plurimum disparer, imò resupinato ægro ac elevatis nonnihil cruribus ac natibus, interdum cum murmure intra abdomen relabuntur. Sine dolore etiam est tumor Herniarum, nisi vel fæces in intestinis induratae, vel in angustiori foramine intestina inclusa, occasionem doloris subministrant. Jubendus etiam æger, ut tussiat: Hoc etiam factò, quando aliquid in scrotum descendit, crepaturas observamus.

*Causæ Herniarum* sunt omnia ea, quæ aut laxare successivè, aut dilatare, aut etiam rumpere possunt in loco quodam peritonæum. *Ruptura* in *Omphalocèle* aut aliis speciebus est frequentior, in *scrotali* vero est rarior, quoniam rupto processu peritonæi, intra musculorum confinia intestina subsistunt, & ita saltem *ingrinali* herniam faciunt, cum eadem successivè per dilatatum peritonæum, tanquam per demonstrata vestigia, faciliè in scrotum descendunt.

Facile patet ex dictis, quòd tales *causæ internæ* sint *rarae* vel *paucae*; interdum subest vitium hæreditarium, ita ut herniosi parentes herniosum producant foetum. Vid. Hildan. cent. 6. observ. 73. Sic fiunt interdum herniæ intestinales ex nimia & violenta purgatione, quale exemplum suggerit Platerus in observ. Ut plurimum sunt *causæ externæ*, quæ hernias inducunt, v.g. *motus nimius*, *clamor nimius*, *fortior sternutatio*, *vomitibus violentior*, &c. Hinc ratione continuati clamoris faciliè infantes in herniam incidunt. *Tussis nimia* etiam ad Herniam disponit. *Partus difficilis* crebrius *omphalocèles* est causa.

Quoad *Prognosin*, omnis Hernia est curatu difficilis, præsertim in adultis, in quibus rarissimè absque Chirurgica operatione curari possunt. In tenerella infantum ætate facilius succedit negotium. Bina sunt pericula, quæ ex herniis ingruunt, nempe *morbus iliacus*, occasione intestinorum irritationis



in loco prolapso, siue irritentur à causa externa, frigore, contusione, &c. siue à causa interna, retentis fecibus, flatibus, &c. Deinde periculum est, ne *intestina prolapsa inflammantur, & inflammata gangranam* concipiant, unde mors: vel *suppurentur, & suppurata foras aperiantur*, ita ut stercora, & interdum ipsa assumpta, per aperturam egrediantur.

In *Cura* omnis *Hernia* duo primarii scopi sunt observandi: I. *Ut reponantur intestina prolapsa* insitum naturalem. II. *Ut reposita intestina firmantur*, ne denuò excidant, idque vel *subligaculis* partem affectam *comprimendo*, vel *peritonæum ruptum aut laxatum consolidando*. Pro scopis melius obtinendis observandum.

I. CLYSTERUM usus non improbandus, cautè tamen adhibendus. *Prolapsus* enim intestini, si sit recens, & nondum gravia adfligant symptoma, tunc clyster non proficuè infundendus, ne forsan unà cum intestino in scrotum descendat & malum augeat. Præstat igitur alvum obstructam *suppositorio laxare*, mox *sacculum emollientem & discutientem* in aqua coctum applicare. Quòd si jam *confirmatus* sit prolapsus, & *symptomata gravia* ægrum torqueant, in his *enemata* non tantum conveniunt, sed etiam necessaria sunt. Confer *Hildanum cent. 6. observ. 73.*

II. In *Hernia intestinali* cordatus Medicus semper *flatuum* rationem habeat, & proinde nobiliorum *carminantium & præcipitantium* usum quàm sedulò observet, cum talium causa & inde producti *status* mirè exasperent *Hernias*.

III. *Hernie à frigore* præsertim *subitaneæ* solent fieri lethales. Irritata nempe *intestina dolorem*, hinc *spasmodum & duritiem* concipiunt, quas insequitur *ileos*. vid. *Velsch. in Hecatoest. 2. p. 6. it. M. A. N. C. Ann. 8. p. 154.*

IV. Probè observandæ sunt *cantela*, quas suggerit *Panarolus* in repositione & cura *Herniarum* observandas in *Pent. 5. observ. 49.* quæ omnes perquam sunt laudabiles, excepta secundâ, ubi *frigida* intra & extra commendat, quod periculosissimum est, quin *repida* aut *subcalida* internè & externè usurpanda remedia. Conf. quoad *Herniarum curas Hildanum*, loco superius cit. *cent. 6. observ. 73.* & *Sculiet. in Arm. Chir. tab. 39.*

Ut ergò reponantur *intestina prolapsa*, *conveniente corporis situ resupinato*, etribus & natibus non nihil elevatis *adjuvanda sunt*, & *impedimenta*, flatus, stercora, & intestinorum ad tactum durities *removenda*. *Intestina prolapsa* sunt tenuia, adeoque eorum *durities non à fecibus duris*, quæ nondum sunt tales in istis, originem habet, sed potius *membranarum tensio & spasmodes intestinorum affectus* duritiem repræsentat. Ergò irritatio ista, duritiei occasio, *blandis fomentis externis* resolvenda, *internis aromaticis* intestinis



testinis amicis sistenda. Pro his igitur scopis internè inprimis conveniunt *semina 4. calida maj.* quocunque modo assumta, speciatim in vino bullita hausta, vid. *Helmont. Tr. de flatibus.*

Externè applicantur *fotus, unguenta & cataplasmata emollientia & discutientia*, ut & *anodyna*. *Emollientia* in læcum præsentia, & apparente crassitie: *Discutientia* in flatuum præsentia; *anodyna* in irritationis molestæ plus minus dolorosæ, & hinc duritiæ urgentia. *Riverius* applicat *V* calidè. Aliàs *omentum castrati tepidum* commendatur. Interdum *fotus ex lixivio acri, sem. cumini & pauco malvatico*, filo crudo exceptis, admoveatur. *Solenander sect. 4. cons. 13.* commendat *stercus ovillum*, si intestinum flatu distentum, aut induratis, ut loquitur, fæcibus infarctum vix reduci potest. Ex usu erit, quod in difficultate illa sæpius utile comperi, ut ex *stercore ovillo, dulci lacti* incocto, *fotus* exhibeatur, tum etiam idem *cataplasmatibus* modò imponatur & reiteretur. Fidem facio, me aliquoties isto fotu, cum res videretur in præcipiti esse, prolapsa intestina reposuisse, antea frustra tentatis aliis. Confer. *Hildanum cent. 6. observ. 70.* Pertinent huc ea, quæ *regioni lumbari* applicantur, ut ibidem vi quasi tractoriâ intestinorum repositionem promoveant; Quod facit *Emplastrum Hoffmanni in meth. medendi*, quod est tale:

℞. Gummi. de sagapeno  
ammoniac.  
galbano, an. ℥ij.

Terebinth.  
ceræ virgin. an. ℥v. ℥ij.  
magnet. arsenic. ʒ j. gr. xv.  
rad. ari ʒ j.

Gummata dissolvantur in  $\times$  q. s. & cocta in formam *Emplastri*, additis reliquis speciebus extendantur super alutam. F. *Emplastrum dorso & lumbis applicandum*. Aliàs *pinguedo ursina*, vel *pinguedo leporina* dorso illita ad reponenda intestina confert.

Quoad secundum scopum, ut, repositis intestinis, *peritoneum* iterum *conglutinetur*, usurpentur remedia tam interna quam externa. Ad interna pertinent omnia *vulneraria*, & ex his parati *pulveres, essentia & potiones*. Inter *simplicia* convenientia huic sunt *symphytum maj. perfoliata, herniaria, sem. nasturtii*, item *vinum decoctionis Betonica & sanicula alba*, præsertim *Herniaria* laudatissima est *Hollerii* planta, quocunque modo ad Herniarum curam usurpata. Sic *semen Nasturtii* nulli cedit interno & externo usu. Sic *Forestus l. 27. observat. 15.* idem *semen Nasturtii* eximie laudat, non secus ac *Fonseca lib. 2. consil. 36.* qui sequentem *herniarum* describit curam: ℞. Pulverem sem. *Nasturtii*, subigit cum album. ovi, hinc extensum super alutam appo-



natur ad Herniam, neque removeatur, quoad ex se decidat. Item ejusdem pulveris detur manè seroque ʒj. cum vino rubro per aliquot dies. Sic Medicus quidam pueros herniâ laborantes quam plurimos restituit, propinando interius sem. Nasturtii infusum vino, exterius vero applicando frustum pellis vel cutis anguille cum album. ovi oblitâ. Quod pertinet ceratum ad Herniam intestinale expertum.

℥. Gumm. Carann.

Sem. Nasturt. ana q. plac. præparetur cum album. ovi, F. l. a. Ceratum, quod impositum herniam brevi sanat. Maximè autem juvat, si sumatur singulis diebus ʒj. cum vino rubro. Posthac est radix sigilli Salomonis, cujus decoctum in vino per plures dies continuatum, egregium est contra rupturas. Cætera ut millefolium, plantago, Geranium Robertianum; item pulver. lumbric. terr. item ex plantis istis paratæ conserva & essentia internè crebrius usurpandæ, inprimis essentia hyperici ceu per se nota, transeant. Externa sunt similia adstringentia ac vulneraria, loco rupturæ imponenda, eaque pro intentionis varietate multiplicia. Sic ex vulnerariis istis fiunt cataplasmata, læsionis loco imponenda. Præ cæteris Faber commendat succum Herniarie cum farina fabarum subactum rupturæ applicatum. Cerata multiplicia, præsertim ex pice navali, thure, mastiche, visco quercino, terr. sigill. Oli dulci & similibus magna quidem promissione, sed sæpius expectatione fallacia prostant. Mulier quædam medicastra plures herniosos egregiè curavit emplastro, facto ex resina, pice & lateribus coctis pulverisatis. Hæc omnia probè permista ac subacta crasse inducuntur super alutam, & ita applicantur.

Pertinet huc Empl. dia. Item :

℥. Empl. contra ruptur. usit.

Picis navalis liquefact.

Empl. dia. & is Ruland. an. q. s. Malax. c. f. q.

Ol. hyperici, inducantur super alutam & applicantur, quàm calidissimè æger potest ferre, nec removeatur prius, quàm sponte decidat. Ubi deciderit Balsam. sulphuris eodem calido pars probè inungatur, & iterum Emplastr. recens imponatur, quamdiu necessarium fuerit. Mucilago symphyti maj. instar cataplasmati imposita meritò à Zuvelsero extollitur. Quod etiam facit ejusdem cataplasma mucilaginosum, in Pharmac. Reg. pag. 312. Porro Emplastrum ex gumm. ceraforum nigr. cum ol. hyperici subactum, adjecto pulvere thuris, mastich. donec fiat Emplastrum rupturæ applicandum. Tandem ol. hyperici, ol. terebinth. ol. spica, inprimis vitellorum ovorum oleum inunctum, multum à quibusdam laudantur. Quibus omnibus præfertur oleum lacertarum, cujus insignia encomia & usus vid. in Fonseca lib. 2. consil. 36. & hinc Zuvelff. Pharm.



*Pharm. Reg. pag. 266.* Sunt, quibus suspecta sunt hujusmodi externa pin-  
guia & oleosa, quod nimis laxent, & majorem peritonæi dilatationis occasio-  
nem suggerant; hinc non adeò inepto consilio jubent *℞. acet. destill. acerr.*  
in quo *lithargyrium* solutum, cui ipsi lintea intincta præpositis intestinis super-  
imponantur ac probè firmentur usque ad consolidationem. Cæterum cum  
his ipsis externis necesse est, ut simul usurpentur debita *subligacula*, *Bruch.*  
*Wänder* / quorum ideam & descriptionem apud *Paracum* in *Script. Chirurg.*  
& in *Hildan. observat. vid.* Cæterum nil æquè ad cujusvis *Hernie* profe-  
ctam curam utile est, quàm *quies corporis*, sine qua difficilimè, interdum nun-  
quam nisi per *Chirurgiam*, cum eadem vero facilimè interdum sine remediis  
curari possunt *Herniæ*, adeò ut continuus in dorso decubitus sit vera *Herniarum*  
*Panacæa*, etiam in senibus. Conf. hîc notabile exemplum quod refert *Hilda-*  
*nus cent. 5. observ. 54.* Specialis intestini recti prolapsus vocatur

## ANI PROCIDENTIA,

Quæ fit, quando sub excretionem fecum intestinum rectum multum prominere,  
& extra protrusum hæret, ut non possit rursus sponte in corpus retrahi. Nem-  
pe in omni alvi excretionem intestinum rectum aliquantis per protruditur, sed fa-  
cta excretionem idem intestinum à musculis levatoribus sursum retrahitur. Quan-  
do igitur ista protusio excedit, aut retractio deficit, oritur affectus, quem di-  
cunt *Ani procidentiam*. Ex quibus patet, *duplicem* ejus esse *originem*. I. est  
*nimia aut frequentissima aut violenta ani extrusio*. II. est *musculi* plus minus  
*resoluti* deficiens *retractio*, quæ nunc seorsim, nunc junctim accidunt. v. g.  
à *calculi vesicæ*, & irritari continuò per consensum intestinum rectum, ac ad  
continuam protrusionem stimulari potest. Quin etiam tali occasione à cre-  
briori excretionis conatu in tantum extendi ac relaxari possunt musculorum le-  
vatoriorum fibræ, ut pertinax alvi hinc sequatur protrusio, qualis procidentia  
in *calculi vesicæ*, diutius adfligente, ordinaria esse solet.

Nimiam & frequentem aut violentam extrusionem inferunt quæcunque  
acria & mordicantia, in intestino recto hærentia, quæ omnia intestinum  
dictum vellicando, & irritando indefinentem egerendi conatum, & ita con-  
tinuam intestini protrusionem inferunt, quod ipsum in tantum tandem ela-  
bitur, ut non possit denuo retrahi. Hinc *Dysenteria* ac *Tenesmo* non raro  
superveniunt *ani-procidentia*. Item, ob *acrimoniam clysteris* aut *suppositorii*  
procidentia ani interdum inducitur, autore *Panarolo*, *Pentec. 1. observat. 23.*  
*stercora dura* aut *excrementa viscida*, in intestino recto subsistentia, conti-  
nuo stimulo idem malum inducunt. Par ratio est, quando in *partem difficile*



parturientes, omni conatu & respiratione retenta, motum excretorium inferiora versus molliuntur, qua occasione & ani simultanea procidentia non rara est. *Hæmorrhoides dolentes* anum continuò stimulant; item *nimis fluentes* pariter ad hoc malum disponunt.

Quoad alteram causam musculi impedita retractio adeoque paralytica dispositio fit vel vitio fibrarum musculi motricium, vel vitio nervorum ad musculum protensorum. Sic percussio, sive casus ab alto supra os sacrum, aut spinas lumborum paralylin horum musculorum nervorum ratione inducit. Item *intestinum rectum protrusum*, si diutius extra hæreat, ita ut fibræ musculorum retrahentes nimis laxentur ac extendantur, *procidentiam ani* subindè *chronicam* inferunt. *Excrementa serosiora*, aut *aquosiora*, copiosius & crebrius per anum secedentia, intestinum rectum ac fibras musculorum relaxando, similem *prolapsum* inferunt.

Quoad Prognosin, ani procidentia pro causarum varietate vel facilius vel difficilius curari existit. Nunc etiam periculiosior, nunc minus periculosa esse solet. Si diutius prociderit anus, subindè tumorem insignem contrahit, in specie inflammatur, quam faciliè gangrena insequitur. Ani procidentia, à Paralyti orta, adeoque ex resolutione musculorum levatoriorum difficulter curatur, quia licet semel reposito ano, iterum tamen excidere solet.

In Cura sunt notanda: 1. Anus reponendus. 2. Repositus est firmandus. Repositio est talis, fitque imprimis manuum ope, quando indice digito intruditur anus, aut quando linteo decocto emolliente, vel adstringente ebrío circumvolvitur index digitus, & ita anus intruditur. Quando ita repositus est anus, patiens coxas & crura extendere, & ita extenso, quousque potest, corpore, vel supra ventrem, vel supra alterum latus, quamdiu potest, quietus jacere debet, ut ita repositus melius firmetur anus. Pro quo scopo ante repositionem ungatur anus cum *℞ hyperici*, quod infantibus præsertim confert, aut illinatur oleo rosaceo, superadperso subtilissimo pulvere gallarum pulverisatarum, &c. Atque ita quidem simplex ani procidentia reponitur.

Cæterum non raro incurrunt impedimenta, vel repositionem impediencia, vel recidivam minantia, quæ necesse est ut maturè ante repositionem removeantur. v.g. Si adsunt stercora dura aut multa in ano vel intestinis subsidentia, necesse est, ut prius enemate emolliantur alvus, & hujus medio evocentur excrementa ante repositionem: aliàs recidivat malum. Convenit ergo lac decoctionis herbe melilot. herb. verbasci, florum sambuci, &c. Si adsint sordes, aut quæcunque acria intestina stimulantia, prius abluendum est intestinum fomento abstergente & leniente. Eadem igitur quæ modo insinuatæ fuerunt, hinc conveniunt, vel horum loco decoctum fol. quercus, parietar. cicer. rubr.

rubr. florum  
matio aut  
num, qua  
vente atcea  
decoquant  
stringente,

Cog in  
tus fovea  
in diutur

Ut  
est Empl  
ex gumm  
tur dicto  
Kerleri in

Cont  
dum intest  
ctus, ma  
re insideat  
afferem in  
& ita inte  
modo inte  
untur Flo



*rubr. florum verbasci cum aq. ferrariorum* factum usurpetur. Si adsit *inflammatio* aut *tumor* intestini prolapsi, impossibile est, ut reponatur debite intestinum, quamdiu hæc durant, adeoque *inflammatio* *foetu discutiente* & *resolvente* arceatur ex *fol. & flor. chamomill. verbasci, sambuci, malva, violaria* decoquantur nunc in *lacte*, nunc in  $\nabla$ . *ferrariorum*, nunc in *vino rubro* adstringente, v. g.

℥. Flor. sambuc.  
chamomill.  
hyperic. an. Mß.  
rosarum rubr. p. iij.  
summit. absinth.  
melilot. an. Mß.

Coq. in *lacte* vel *vino rubro*, & hoc decocto anus tumefactus & inflammatus foveatur, donec *inflammatio* & *tumor* esset: hinc tandem intruditur. Vel in *diuturno malo* quasi *paralytico*:

℥. Flor. chamom.  
anthos.  
fol. salvia.  
balaustr. an. Mß.

gallarum paria duo: Coq. in *vino chalybeato*, quo foveatur anus, abluatur, & successivè reponatur.

Ut *intestinum rectum* plus minus repositum *firmius cohareat*, optimum est *Emplastrum* calidissime *osti sacro*, aut etiam *lumbis applicatum*, quod fit ex *gummi sagapeni, opoponac, ana q. s.* inducantur super alutam, & applicentur dicto modo. Item ad *firmandum anum prolapsum* egregius est *suffitus Kestleri* in suis *Cent. Process. N. 396. p. 463.*

℥. Asphalti,  
succini,  
mastich.  
thuris.  
myrrh. an. 3j.

Contusa super carbonibus ignitis inspersa, suggerunt *suffitum ad firmandum intestinum rectum*. Vel post repositionem: & *Affer* probè calefactus, *mastiche* illitus, cui quàm calidè ferre possit æger, per quadrantem horæ insideat. Alii cum *medulla cervinâ*, vel etiam cum *pinguedine cervinâ* afferem inungere solent; Siquidem *pinguedo cervina* aut *hircina* liquefacta, & ita intestino prolapsio illita, unâ hoc blandè reponendo, & hinc simili modo insidendo malum curat. Loco pinguedinum harum etiam recipiuntur *Flores verbasci* in butyro non salito frixi, ac probè transcolati, quo



quo ipso simili modo procedatur. *Sacculi* itidem facti ex *furfure*, *foliis millesfolii*, & *fol. verbasci* in *acet. destill.* vel *vino rubro* cocti ac calidè adplicati, firment anum, ut tam facilè non possit prolabi. Convenit imprimis, si *post partum difficile* malum natum fuerit. Si ex *hemorrhoidibus* sit malum natum, inungatur intestinum prolapsum ☉ *scarabeorum* in *ol. mastiches* bullitorum. Sicuti si in eodem *oleo mastiches* bulliant *flores verbasci*, egregium est contra *procidentiam ani ex Tenesmo*.

Quod si propter *musculorum levatoriorum resolutionem* anus denuò firmandus veniat, nervina sunt recipienda, v. g.

℞ Flor. chamom.  
anthos.  
balauft.  
fol. saly.  
lauri an. p. ij.  
gallar. contul. par. vj.  
malicorii ʒj.

Coq. in aq. & *vino chalybeatis*, ac applicentur pro *fortu*.

Quòd si post repositionem ano firmato remaneat calor vel *rubedo* in ano, ne superveniat inflammatio, &c. *Aq. plantaginis*, in aqua solutum est *sacch. Bi*, blandè fovendus est podex, aut locò hujus supra dictis *fomentis adstringentibus* utendum.

## CAPUT XI.

De

## CHYLI DISTRIBUTIONE L Æ S A.

Videatur hîc *Sylvius lib. i. Prax. c. 16. pag. 192. & c. 17. pag. 200.* ubi notabilia imprimis sunt ea, quæ de *Ascite* scribit, ita ut *Ascitis* propriè dicti, ceu particularis abdominis hydropis, & in quo pedes non simul intumescunt, (adeoque confirmatæ *universalis cachexia* proles non est,) speciatim, qui subitò interdum generatur ex *causis occasionalibus*, iis præsertim, quæ à *Sylvio* memorantur, frequentissimam occasionem existimem talem *chyli per lacteas effusi stagnationem*: Sicut non negârim, & aliis ex causis in aliis abdominis visceribus vel locis, lymphaticis ruptis, & lymphæ extravasationem, & hinc *asciticam abdominis intumescenciam* supervenire posse, simili ferè ratione curan-



curandam. Atque de illa *ex chylo effuso* differit *Sylvius*. Hoc saltem in loco, occasione obstructionis lacteorum vasorum, explicanda quædam, *De obstructione Mesenterii, Hepatis, Lienis, Pancreatis, & similibus vasorum abdominis.* Notum est, nil frequentius aut usitatius in morbis chronicis accusari, quam *anti-praxiam viscerum*, & dein *obstructionem viscerum in abdomine.*

*Anti-praxiam* rejecimus in *Pathologicis*. Et hæc ipsa non confundenda est cum *robore inæquali partium*, & deinde cum contrario quodam *visceris* cujusdam *fervere*: Scilicet debilius subindè ratione balsami sui, sive  $\pi$ . infiti observatur viscus unum præ altero, id quod & in partibus externis non rarum est, à quacumque occasione læsum, & hinc debilitatum fuerit viscus aut pars v.g. brachium, in quo diu gestatus fuit fonticulus, aut quod aliquando gravius lauciatus fuit, restitutum denuò, debilius ac minus robustum, flaccidius, frigidius, subtempestatum mutationibus irritabilibus præ altero observatur, hoc robur inæquale est, nulla partis anti-praxia. Quoad contrariam *visceris incalescentiam*, accidit interdum, ut viscus quoddam fervidius reddatur, quam naturaliter esse debet: Sic v.g. renes interdum æstare, aut hepar intensius fervere observatur, id quod fit propter præternaturalem quasi spinam acidam infixam, cujus hostili præsentia visceris incalescentia supervenit: Hinc impedimentum actionis propriæ, non autem cum alio viscere antipraxia aut contrarietas, unde & non refrigerantibus, sed spinam infixam evellentibus, hoc est, acidum vitiosum corrigentibus curandum; de quo vid. *Helmont. Tr. Retenta.*

*Obstructiones* quod attinet, sanè nil frequentius his ipsis in Scholis Medicorum occurrere solet: Unde & nec rusticus, nec vetula existit, qui nesciant loqui, von der Verstopfung der Gefäß-Adern; unde & *febres intermittentes* & *cachexia*, *mala hypochondriaca* & plura alia in Schola Galenica, *ex viscerum abdominis obstructionibus* derivantur, quod & usu venit in Schola Paracelsica, in qua nil usitatius, quam loqui de oppilationibus, factis à tartaro hinc indè coagulato.

Cæterum sicuti *qualitates occultæ* Physicorum meritò dicuntur *asyla ignorantia*, ita simili ratione dicendum, quod tales *abdominis viscerum obstructiones* sint *balneum causarum latescentium*. Duo sunt quæ imprimis fulcire videntur hanc hypothesin: unum, quod eam reddit probabilem; alterum eam facit inculpabilem. Probabilem reddit hanc opinionem, quod in istis chronicis affectibus quàm plurima abdominis symptomata aegris molesta sunt, ac præsertim circa hypochondria affligant, & si alia quædam pars videatur affecta, conjungi tamen aut subsequi abdominis passiones solent. Accedit,



quod & *scirrhi* & *struma* in mesenterii glandulis, item in aliis abdominis visceribus inventi sunt. Alterum, quod eam reddit inculpabilem, est, quod fons per anatonem non adeo possit detegi: cum enim præsupponant infarctum vasorum capillarium, quæ ordinariò post mortem connivent, ac clausa reperiuntur, nulla post mortem accurata satis inquisitio potest institui.

Res igitur ut pateat accuratius, tres concipiendi in primis sunt *meatus*, in quibus supponitur fieri *obstructionem*. I. Sunt *vasa sanguifera*, quæ invehunt & evehunt. II. *Vasa lymphatica*, quæ ex uno loco invehunt in alterum. III. Sunt *pori & meatus* partium continentium, per quos continua est liquoris trajectio, primariò quidem viscerum ac glandularum, ac secundariò partium carnosarum. Quod si in his locis fieri debeat obstructio, necesse est sanè, ut humor in motu impeditus stagner, hinc pars intumescat, & vel liquoris stagnantis coacervatio, vel ruptis vasis in vicina loca effusio. Et quidem in *vasis sanguiferis*, ubi est in aliquo loco obstructio, necessario impeditur sanguinis motus. Unde sanguinis in ista parte stagnatio, ex stagnatione partitis tumor; tandem vasorum capillarium ruptio, hinc sanguinis extravasatio, & sic inflammatio.

Ubi vero in *vasis lacteis & lymphaticis* fit obstructio, similiter impedimentum fiet motus lymphæ, ita ut per vasa lymphatica non aliorum commota, nec ab his resorpta, sed in parte solida coacervata det tumores serosos. Sin vero jam absorpta sit, & in motu per vasa ex horum obstructione impediatur, tunc à lymphæ stagnante fit vasorum distensio, tandem ruptio, ac necessaria tandem lymphæ effusio. Quæ effusio si fiat in peculiarem cavitatem, dat hydropem particularem: Sin vero effusio fiat in partem solidam, fient exinde tumores aquosi, pro lymphæ conditione varii.

*Obstructiones*, quæ dicuntur fieri in *ipsis visceribus* aut *partibus solidis*, dant etiam suos tumores, nec sine his contingere solent. Cum enim *meatus* ac *pori* in hunc finem sint excavati, ut fluidum exinde transeat; necessario ex istis obstructis liquoris transeuntis fiet stagnatio, unde pars necessario intumescit, ac tumor vel per suppurationem degenerat in abscessum; vel materia stagnans inspissatur ac indurefcit, fiuntque tumores duri, plus minus indolentes, & tactui renitentes, qui ex sanguine in partibus sanguineis dicuntur *Scirrhi*, ex lymphæ vero in partibus glandulosis *struma* sive *serophula*. Hæc coagulatio fit ab acido, à quo post successivam partium subtiliorum evanescentiam sive discussionem sensilem, restitans sanguis sive lymphæ inspissatur, ac firmiter coagulatur. Acidum hoc in *scirrhis & serophulis* patet ex eo, quod inconvenienter tractati hi tumores, ubi eorum acidum vitiosam contrahit effect-

velcen-

vescentiam  
moribus  
enim ab  
imaginati  
& ductus  
ctorum  
cum glan  
stant exer  
struction  
quarian  
dromus  
product  
tinet, in  
lantur,  
trajectio  
gi viden  
O  
infarctu  
ventricu  
borum el  
creatici  
bilis vel  
iplos aff  
rum mu  
propullu  
seroso ac  
origo it  
erratum  
libus sub  
te soleat  
variatus  
commoc  
fermenta  
lietes ad  
curam ul  
nempe a  
acuentia  
humoru



vescentiam, facillimè in caneros depascentes degenerent. *Ex his tamen tumen-*  
*maribus patet*, nullo modo universaliter negandas esse obstructions: Hoc  
 enim absurdum esset, sed abusus tantum tollendus, & obstructionibus istis  
 imaginariis superstructis morbis aliud quærendum fundamentum: Siquidem  
 & ductus cholidochus, ductus pancreaticus, tubuli renum, oicula vasorum la-  
 teorum sapius infarciuntur: mesenterii item obstructionum repertarum, unâ  
 cum glandulis ejus induratis cum subsequente corporis macie hinc indè pro-  
 stant exempla. Verùm in morbis istis chronicis causa radicalis non sunt ob-  
 structiones tales, aut si deprehendantur in talibus tumores viscerum. v.g. Si  
*quartana* supervenit *Scurrhus lienis*, aut *istero scirrhus epatis*, hydropis pro-  
 dromus, tunc quæstio de tali tumore oritur, an sit causa talis morbi, an vero  
 productum morbosum. Et quidem scirrhosus aut similes tumores quod at-  
 tinet, in his integer quidam ramus, & huic annexæ vilceris partes omninò oppi-  
 lantur, & in talem tophum coguntur: unde per eam cessat penitus contentorum  
 trajectio; unde successivè vicini rami pederentim dilatati ejusdem munere fun-  
 gi videntur.

*Origo* igitur *prima* omnium istorum *affectuum chronicorum* ex viscerum  
 infarctu derivatorum est *ex stomacho & primis vis*: nempe *digestio prima in*  
*ventriculo*, & *eius perfectio in duodeno* plus minus *lasa* sunt *ons omnium mor-*  
*borum chronicorum*, in specie, *cruditas acida*, & multiplex alteratio *succi pan-*  
*creatici & cholidochi* fecunda mater morborum talium esse solet. Speciatim  
*bilis* vel *parcior* vel *inertior* fovere, & contumaces magis reddere solet hos  
 ipsos affectus. Unde *ameiria chyli*, *dyscrasia sanguinis*, *parium nervosa-*  
*rum* multiplices *dolorosi affectus* originaliter *ex vitioso acido* primarum viarum  
 propullulare solent. Adeò ut *acidum* in subjecto seu vehiculo plus minus  
 seroso aut pituitoso, ipsam etiam magis vel minus *volatile* aut *fixum* sit *prima*  
*origo* istorum affectuum. Hinc ubi gravius fuerit ventriculi sub digestionem  
 erratum, aut notabilior cruditas acida, non rarum est, quòd sanguini, in ta-  
 libus subjectis, per phlebotomiam emissio, post sui grumescientiam supernata-  
 re soleat *mucus quidam albidus*, plus minus *lividus*, *spissus*, ac multis modis  
*variatus*, qui revera nil aliud est, quàm *chylus vitiose digestus*, qui cum non  
 commodè, fermentationis motu, assimilari possit sanguini, in eodem fluctuat,  
 fermentationis debitum negotium impedit, & hinc ad *cachexias*, peciatim mu-  
 lieres ad *chloroses* disponit. Confirmat hoc remedia ad horum morborum  
 curam usitata: Siquidem convenire solent remedia tam *generalia alterantia*,  
 nempe *acidum corrigentia*, *viscidum evacuantia*, & hinc *bilem aromatica vi-*  
*acuentia*; quàm *specificia*, speciales *sapores acidos enervantia*, & *specialia vitia*  
*humorum emendantia*.



In Minerali regno in specie Chalybs, ac hujus ratione acidula, item  $\text{H}$  in usu est: Chalybs tanè ac omnia  $\text{G}$ ialia per se semper adstringunt, unde & in alvi fluxibus quibusvis, hæmorrhagiis, viscerum atoniis, tam externè quàm internè sunt optima. Ergò quomodo convenient in hisce morbis ex obstructionibus suppositis, & quomodo aperire queant, dubium remansit. Primus hic oculos nobis aperuit *Helmont, in Paradoxis de Fontibus Spadanis*, cujus vestigiis laudabiliter insistit *Tachenius in Hipp. Chym.* nempe *semper se semper adstringere, per accidens* vero, quatenus ratione suæ texturæ terrestris promptissimè absorbeat in se acida, & cum his in concretum  $\text{G}$ licum absterisivum abeat, saltem conferre, ut absorpta ex eo acida, tanquam vinculis constricta, secum sub forma nigrarum sæcum è corpore evacuet, id quod sanè signum est rectè operantis  $\text{G}$ is. Qualis selectus in  $\text{G}$ ialibus sit observandus, pluribus actum fuit circa materiam medicam, in quorum tamen usu observandum: 1. ut corpus semper sit apertum. 2. motu corporis promovendam earum operationem. 3. Delectum esse habendum in ipsis  $\text{G}$ alibus, ratione constitutionis ægrotum: Nam quidam, quorum stomachus sensilior est, non ferunt crudiora; ob id talibus saltem *Tinctura  $\text{G}$ is liquida*, vel *Tinctura  $\text{G}$ li  $\text{G}$ is Zvvelfferiana* aut *vina  $\text{G}$ ia* usurpanda. Par ferè ratio cum  $\text{H}$ o, cujus saccharum & ex hoc cum  $\text{V}$  parata *Tinctura* reverà sunt egregia in *Melancholiis hypochondriacis*, affectibus *scorbuticis* ac similibus. Quibusdam *crystalli ex minera  $\text{H}$ i, cum  $\text{M}$ is  $\text{O}$  i parati, sacchari loco in usu esse solent.*

Ex Vegetabili regno conducunt *amaricantia*, vel *aromata, oleosa*, vel *acria volatilia*, vel *temperata diuretica*, & ex his artificialia parata remedia, præsertim *essentia*,  $\text{M}$ :  $\text{O}$  ia *fixa & volatilia*. v. g. inter amara *absinthium, centaur. minus, gentiana, helenium, cichor, tarax. endivia, &c.* Quibus addantur *gummata*, præsertim *ammoniacum* & hinc *Galbanum*. Inter aromatica oleosa *rosmarin. salvia, fœnicul. &c.* acria volatilia sunt omnia *anti-scorbutica*, temperata *diuretica*, diærad.  $\text{S}$ . *aperient. rubia tinct.* item *genista, &c.* Inter salia speciatim *salia fixa*, & cum his parata *salia salsa*,  $\text{M}$   $\text{G}$ latus,  $\text{O}$  *hypochondr.* & speciatim *sal volatile* ac *spiritus tartari* conducunt optimè, vel ex sæcibus vini exsiccatis, vel cum  $\text{O}$ o per retortam tubulatam præparatus. Item *cremor tartari* frequentis usus esse solet in chronicis hisce affectibus.

Animali ex regno præter *marina absorbentia*, præsertim *salia volatilia*, aut *spir. urinosi*, v. g.  $\text{M}$  *sal armoniaci, CC. lumbricorum, formicarum*, polychrestis & usitati esse solent, quibus & *sal. armoniac.* & alia plura addenda sunt.

Quoad *methodum medendi* horum morborum chronicorum ex obstructionibus vulgo derivatorum, revera ex acido vitioso natorum. 1. propinantur diger

digestiva.  
interpon  
ptærtim  
 $\text{O}$  *hypoch*  
 $\text{G}$  *Vo*  
nenda, sp  
conveni  
quavis se  
c. 14. §. 5.  
folius sen  
cunt.  
simul o

Rb  
gendi  $\text{G}$

Ve  
quamv  
tinuand  
R  
Item N



*digestiva.* 2. hinc vomitoria. 3. præparato sic corpore, *Chylia*, quibus 4. interponuntur per *inipaciv laxantia*, & 5. subjunguntur *alterantia, aromata*, præsertim *volatilia* plus minus *amaricantia*. *Digestiva* sunt v.g. tart. Plat. & hypochondr. terr. fol. tartari, *Tinctura tartari*, *Tinctura Oli Dis Zuvelf.* &c. *Vomitoria* ac *Chylia* jam per se nota sunt. Quod si purgantia interponenda, speciatim talia, quæ successivè, & ut vocant, per *epicrasin* hauriunt, conveniunt, inprimis *gummata cum laxativis acuta*. Hinc *pilula usuales*, quavis septimana repetendæ sunt optimæ, quarum exemplum suggerit *Sylvius* c. 14. §. 50. item *Mercurius dulcis* commodè aliis additur: Item, *infusa ex foliis senæ*, mista cum *gummate ammoniaco*, aut cum hoc *acuta pilula* conducunt. *Noduli* pariter tam simpliciter *alterantes*, quam simul *laxantes* optimè simul ordinantur, v. g.

℞. Extr. helleb. nigr.

Mercurii dulcis. an. gr. xv.

scamm. ꝥati gut. iij. vel ij. M.F. *Pilul.*

Vel ℞. Gumm. ammon. in ✕ solut. ʒj.

scamm. ꝥati. gr. iij.

Extr. troch. alh. gr. j. M.F. *Pilul.*

*Rhabarbarum* item, quod aliàs *Anima hepatis* dicitur, propter vim corrigendi & acuendi *bilem* commodè usurpatur, additis *stimulis* & *inis*. v.g.

℞. Rhabarb. elect. ʒj.

arcan. duplicat. ʒss. M.F. ʒ.

Vel F. *Elect.* ex pulpa *passular.* cum *rhabarb.* pulverisato, recipiendo ad quamvis ʒam pulpa *Rhabarb.* ʒj. & ita sub forma *Electuarii* aliquandiu continuando, Dosi nucis juglandis quotidie bis.

Remedium ad *cachexiam* & quasvis *litteri* species commendatissimum, Item *Nodulus ex recentibus*:

℞. Herbarum recent. cochlear.

nasturt.

fumar.

chelidon. maj. an. Mj.

radic. armoraciæ recent.

helenii an. ʒvj.

fol. senæ s. ft. ʒj.

rad. elleb. nigr. non præp. ʒvi.

esul. præp. ʒij.

zinziber.

cinamom.

zedoar. an. ʒj.



sal. tartari ℥vj. vel ℥℞. M.

Item *Nodulus alterans ex succis*:

℥. Herb. menth.

absinth.

rosmarin. an. Mj.

rad. galang. ℥℞.

zedoar.

zinziberis. an. ℥ij.

fœnic.

levistic. an. ℥℞.

cinam. acut. ℥ij.

cort. aurant. liccor. ℥℞. M. includantur nodulo.

*Alterantia aromatica* sunt partim talia *vina medicata*, partim *Elixiria proprietatis* absque acido, & *Elixir anticachecticum*:

℥. Aloës succotrin. ℥j.

gumm. ammon. ℥vj.

myrrh. ℥℞.

crocī ℥ij. infundantur c. f. q. *Tinctura* si actis, mediante digestionē diuturna extrahatur *essentia composita*, Dos. ad 30. vel 40. guttas, bis in die propinanda. Quod etiam pertinet *absinthii essentia*, *essentia vincetoxici*, præsertim ex succis inspissatis cum *cochlearia* parata.

Artificium *chronicos* hujusmodi *affectus* curandi ritē consistit in eo, ut temporī inservias, nec, nimis præcipitando curam crabrones irrites, hoc est, temperatis remediis successivē insistamus, ne acrioribus commoti acriores præternaturales succi, effervescendo, & partes nerveas irritando varia symptomata inducant; quibus imprimis moderatus corporis motus simul accedat. Hinc præmissis *digestivis*, & *vomitório* vel *blando laxativo* remotis impedimentis, *Martialia* usurpantur, ut promptius absorbere & imbibere queant vitiosa acida; quibus interponuntur non purgantia propriè dicta, quæ insigniter tales ægros & tandem frustra vexant, & subindè periculosa symptomata inferunt, ex acriorum & effervescentium succorum ad intestina provocato influxu: sed *blanda* potius *laxativa*, & quæ leni stimulo intestina mediocriter proritant, istis *Martialibus* interponuntur, aut junctis alterantibus vegetabilibus propinquantur.

Quod vero attinet *obstructiones* revera tales, tam *mesenterii*, quam *lienis* ac *hepatis*, ac inde supervenientes *tumores*, ut plurimum, præsertim in hepate ac liene in scirrhum degenerantes, nascuntur pariter hi ipsi ex acido vitioso, cujus hostili præsentia stringuntur fibræ, clauduntur pori, ac ordinarius fluidorum transitus plus minus impeditur, unde *Hippocratis magni lienes*, & *tumores viscerum*

scerum lupo  
ac tumori  
mirabilibus  
tidie varian  
tum sit, d  
tamen solet  
tumor, ex  
nus gravat  
videntur, t  
cognoscitu  
nem vero  
simulque  
quoque,  
distenden  
sed intesti  
rit, ac spl  
vitiosam  
tur, ex qu  
ponit.  
xerit, cum  
mala, ac  
nunc scer  
vero cons  
existunt.

Cura

morem sta  
tia primar  
Gialia er  
mentes lie  
rimum G  
Chym. clau  
banum, &  
quælibet v  
rach, flux  
aperientia  
facti, sive  
rimentoru



*scerum* superveniunt. Revera ex talibus, præsertim *mesenterii*, *obstructionibus* ac *tumoribus* subinde oriuntur, aut saltem pertinaciter foveantur *Chronici morbi*, mirabilibus, ac subinde difficulter explicabilibus symptomatibus, iisque quotidie variantibus, stipati. Et quidem *mesenterium*, si quadam in parte affectum sit, *difficulter cognosci potest*, cum in profundo ferè situm sit, supervenire tamen solet aliqualis, *mollis* tamen, & sine fluidi contenti indiciiis, *abdominis tumor*, *excreta alvi liquida*, subinde *varia*, *dolor obscurus*, interdum plus minus *gravativus* in profundo abdominis percipitur, & ægri successivè emaciari videntur, nec nisi, ubi longius processerit malum, tactu *tumor renitens* tandem cognoscitur, imò interdum vix ante cadaveris apertionem observabilis est. *Lienem* vero aut *Hepar* si affligant *obstructiones* & *tumores*, *dolor gravativus*, simulque *obtusus*, plus minus *tensus*, in eorum regione percipitur: interdum quoque, si majores sint, *tactui patent*. Dolores *punctorii* item *vagi*, nunc *distendentes*, nunc denno *evanescentes*, nullo modo his visceribus conveniunt, sed *intestinorum* sequuntur *affectiones*. Egrorum talium *floridus faciei color* perit, ac *splenetici*, *obscuri*, *lividi* & *quasi plumbei* adparent. *Hepatici* vero ad *vitiosam flavedinem* ferè declinant; *urina cruda*, subinde *variantes* excernuntur, eaque ferè pauciores; tandem *tumor hydropicus* sapissimè vitæ finem imponit. Deteriora hæc sunt mala, si *lien* affectus *hepar* in sui confortium traxerit, cum omnis ex splene refluxus sanguis immediatè petat *hepar*. *Recentia* hæc *mala*, ac indè successivè succurrentes *Chronici morbi*, nunc *hypochondriaci*, nunc *scorbucici affectus* symptomata imitantes, adhuc *curabiles* sunt: magis vero *confirmati*, ac præsertim ubi jam in *scirrhum* abierint *tumores*, *incurabiles* existunt.

*Curandi* ratio ex supradictis sponte patet, nempe *acidum corrigentia*, *humorem stagnantem* plus minus *viscidum attenuantia*, & per epierasin *evacuantia* primatum ducunt, quibus & *externa emollientia* ac *attenuantia* socianda. *Alia* ergo ante perfectum *scirrhum* sunt optima: hinc enim  $\nabla$  *a ferrata* tumentes lienes absumere dicuntur, sed ubi ad *scirrhum* degenerant, nocent plurimum *Alia*: Rationem imò idque exactè suggerit *Tachenius in Hippocr. Chym. clav. p. 181. & 188.* Hinc *gummata*, præsertim *ammoniacum* & *galbanum*, & plura ex his concinnata remedia sunt optima. Item *Tinctura*  $\pi$ ,  $\omega$   $\pi$ , ac alia quævis *etherea volatilia*, sed patienter & crebrius usurpata. Hinc qualibet vulgò *aperientia* dicta, v. g. *corlices ligni fraxini*, *scolopendr. ceterach*, *silix*, *absinth. rhabarb. marrub.* qualibet *antiscorbutica* & similia aliàs *aperientia*, item *hepatica* vel *splenetica* dicta locum inveniunt, cum quoad rem facti, sive experientiam omnes conveniamus, saltem quoad theoriam sive experientiarum per causas scrutinium differamus.



In specie quoad *externa*, ad huiusmodi partium abdominis *tumores*, plus minus *scirrhum* minitantes, primatum ducunt *gummata*, & hinc *vegetabilia* ad narcoticorum naturam propius accedentia, v. g. *Nicotiana*, *cicuta*, *hyoscyamus*, imò ipsum *opium*: quibus & alia istis tumoribus appropriata socianda sunt. Conter. *Doring. Tract. de opio c. 5.* Hinc *Emplastrum de Nicotiana* est egregium, Item, *cataplasma ex Nicotiana* ad *scirrhos splenis Zuvelff. in Pharmacop. reg. pag. 312.* Item, *Emplastrum de cicuta*, cum ana *gumm. ammoniaci in acet. destillat.* soluti mistum. In specie *Emplastrum carminativum Sylvii* præstantissimum est *Prax. l. i. c. 14. p. 58.* Item, *Emplastrum de ranis cum Mercurio* officinale potenter penetrat, & huiusmodi tumores dissolvit. Sic *Emplastrum ex cicuta & ammon.* compos. *Heurnii*, vid. in *Sennerti Praxi lib. 3. part. 4. c. 6. 492.* ubi de *Scirrho lienis*. Item facit huc non inelegans *Emplastrum de cicuta Sennerti.*

℞. *Cicutæ Mij.*

*flor. genist. Mj.*

*gumm. ammon. ℥jss.* ebulliant in *℥q. acet. destill.* donec ammoniacum dissolutum sit, postea colentur, adde

*Succi Nicotianæ veræ ℥vj.*

*esulæ ℥iiij.*

iterum bulliant, Tandem adde

*resinæ pini*

*terebinth. an. ℥ij.*

*styrac. calamit. ℥iij.*

*myrrh. ℥jss.*

℞ cappar. &

*ceræ, q. s. pro consistentia Emplastri.*

Vel: ℞. *Gumm. ammon. in ✕ sol. ℥j.*

*tragacanth.*

*Emplastr. de mucilagin. an. ℥ss.*

*sal armoniaci ℥ijss. M. F. Emplastrum applicandum loco af-*

*fecto calidè. Malaxari possunt talia Emplastrum usus tempore ℞ destillat.*

*succini, vel quod melius, utut ingrati fœtoris, ol. destillat. gummi ammoniaci,*

*aut ℞ tartari: nam quando destillatur gummi ammoniacum cum viridi*

*are, post spiritum volatilem prodire solet oleum empyreumaticum fœti-*

*dum, sed penetrantissimum: Loco huius tamen etiam*

*oleum Philosophorum potest recipi.*





## CAPUT XII.

De

CHYLI SANGUIFICATIONE  
sanguinisq; fermentatione læsa.

**M**eretur de hac ipsa materia, quilegatur, *Sylvius lib. 1. prax. c. 18. 19. 25.* Utur enim fundamentalis ejus *hypothesis de motu bilis* sursum, & hujus alcalinæ cum occurrente lymphæ acidula effervescencia sit dubia, aut verius manifestò falsa, tamen propter ea, quæ de mutationibus humorum, & alterationibus, ac nocendi rationibus *bilis, lymphæ & pituitæ* asserit, & in praxi quotidiana suum usum egregium habent, non negligenda sunt, modò mutatis mutandis considerentur, hoc est, exindè supposita vitalis effervescencia in dextro cordis ventriculo deleatur, sed saltem illorum mutatorum aut alteratorum operationes, chylo & sanguini plus minus immutatis applicentur, egregium usum pro faci-  
enda praxi habere possunt. Præsupposito igitur sanguinem continuo fermentari, & in istius fermentationis medio, chylum successivè sanguificari.

*Sanguificatio hæc & ipsa Massa sanguinea fermentatio læditur duobus modis: vel vitio Chyli, vel vitio ipsius sanguinis; Chyli, quando ineptus est, ut exindè fiat sanguis per assimilationem fermentativam; sanguinis, quando ineptus est, ut laudabiliter chylum assimilet. Primaria ferè causa quærenda est in chylo: hinc enim *ναροχυλία* mater *Cacochymia*. *Cacochylia* ista ex tribus dependet fontibus, 1. Quando non sufficienter fermentatur, aut attenuatur, aut volatilifatur in stomacho. 2. Quando non ritè perficitur à bile, ejusque sulphure oleoso. 3. Quando non ritè secernitur à scoris beneficio succorum fellei & pancreatici.*

Præter alia vitia ex ventriculo familiarissimum est, quando *cruditate acidâ* laborat chylus, unde imminuitur fermentatio ac *spirituascentia sanguinis*, & succo tali infarciuntur potius partes solidæ, quam nutriuntur. Item cum insigniter varient *bilis & succus pancreaticus*, facilè patet, variam quoque chyli in intestinis perfectivam esse alterationem. *Massa sanguinea* vitio læditur *sanguificatio*, quando deficit à debita crasi seminali, unicuiq; individuo propria. Inter ista principia crasin constituentia, *acidum*, & *sum volatilia* primatum obtinent, à quibus & fermentatio & *ascencia* & chyli assimilatio læditur.

*Fermentatio* dicta multis modis læditur. In genere vel quando *augetur*, vel quando *imminuitur*, vel quando diversimodè *depravatur*. Signa, quibus proximè cognoscitur fermentatio sanguinis læsa, sunt *pulsus & □*. Ille statum sanguinis in corde fermentantis, & exindè in arterias ebullientis ostendit, de quo

Y

vid.



vid. *Sylv. l. i. prax. c. 26.* Hæc v. □ statum sanguinis ex dicta ratione resultantis declarat. Fallit tamen utrumque interdum: Nam ut taceam de *febb. malignis*, *pulsus* subindè mutatur ratione *spirituum animalium* cor moventium. Hinc enim in quolibet *animi affectu* pulsus mutatio. *Urina* vero fallit, propter admistum urinae potum, urinam plus minus alterantem. Item propter admista varia ex læsione partium urinalium enata.

*Causæ* itaque à quibus vitiatur hæc *sanguinis fermentatio*, sunt omnia ea, quæ *salutem* istorum *proportionem & harmoniam* plus minus variare possunt. Talia sunt tum *assumta*, tum *inspirata*, quam *suscepta contagia*, quibus & *viscerum* sanguinis depurationi aut perfectioni interservientium *labes ac neglecta officia* accedunt. Ab omnibus his læditur massæ sanguineæ textura ac crasis, alterantur *salia*, quæ exindè novos quasi sapores adoleunt, & ita fermentationem turbant. Sanguine hinc ita vitiato, aut à vitiosis fermentis inquinato, non tantum *chylus* perversè assimilatur, sed præterea totum corpus, ac quælibet ejus partes exindè plus minus alterantur: Qualis namque sanguis, talis totius corporis est habitus vel status. Qui *sanguis* exindè nunc *frigidior*, nunc *calidior* consequenter redditur, ita ut exinde omnia ea derivanda sint, quæ vulgò de *intemperie* dici solent, aut quæ vulgò *temperamentis* superstruuntur, ut illorum ratione hic ad hunc vel istum morbum inclinet; v. g. nunc quidam ratione *temperamenti* ad morbos *melancholicos, chronicos*; alius ratione *temperamenti Cholericæ* ad affectus *acutos febriles* dispositus dicitur. Omnia hæc ex *sanguinis crasi* & hinc dependente *motu fermentativo*, & indè oriundis proprietatibus variis, tam sanguinis, quam corporis proximè deducenda sunt. Hinc enim dum sanguis nimium incalcescit, v. g. ex motu, vel febre, omnes partes intensius calent: dum is naturâ, vel senio, vel morbo tepidior existit, similem temperiem vitalem nempe influam quælibet partes experiuntur. Tanquam paradoxon *caliditatem sanguinis* nimiam, acutis præsertim in morbis notabilem, consideremus, quæ quidem ex *aucto motu fermentativo* omnino derivanda venit, sed primario ob *acidum volatile* intensius cum *alcali* *Osso* ebulliens, adeoque à *bile materialiter* sive subjektivè, ab *acido formaliter* sive effectivè: hinc & *aromata* & similia calefacientia, *vinum*, *Osso destill.* &c. calefaciunt corpus non nisi ratione *volatilis acidi*, communicabilis contentis corporis nostri, iisq; assimilabilis. *Acida mineralium* refrigerant, id quod *figendo* acido suo intensiori, nobis non communicabili, motum humorum & acidum volatile subjugando præstant; undè cessante debito fermentativo motu, caloris remissio observatur. Sed eo ipso, quo nobis non assimilabilia, aut contentis communicabilia existunt, remedia, imò sub inconcinna dosi veneni naturam assumunt, & hinc alterata in corpore nostro plus minus per vias urinarias eliminantur.

minantur.  
præternatur  
cientibus, p  
gidiores ob  
commiscibi  
plus attritu  
quod subigi  
motum plu  
istit. Certe  
particulari  
alcalinum  
incalcescen  
ex mutatu  
quo nego  
vitiatis, ut

N  
stru  
novo debi  
cordis veni  
est, dilate  
ma, quod  
dilatatos  
letur, ut i  
quentiori  
Sylvius l. i.  
tate sit, ut  
ABO.  
da fonte, q  
vitiis vian  
non admitt  
gitimè dila



minantur. Hinc in quibus *acidum fixum* quasi, adeoque constitutivis nostris *præternaturale* exsuperat, ut in *hypochondriacis, melancholicis, mensibus deficientibus*, præsertim cum concursu *pituita viscida, & defectu bilis acrioris*, frigidiores observantur, adeoque *volatile acidum spirituosum*, contentis nostris commiscibile, & quod horum fermentativum motum promovere potest, quod plus *activum* existit, eò intensius calere corpus observatur: Ejus *acidum fixum*, quod subigit & figit illud *volatile acidum*, & ita contentorum, fermentativum motum plus minus inhibet, *frigoris, & imminuti* in sanguine *caloris* autor existit. Certè omnis rerum calor spontaneus ubique sequitur motum intestinum particularum minimarum *formaliter*; acidi vero agentis in terreum plus minus alcalinum *effectivè*: in ipso igne *adurendi vis* ab *acido* revera oritur. *Calcis viva incallescencia* ab *acidi activitate* dependet. *Mutata igitur temperies sanguinis, ex mutata fermentatione nata, per vitiatam crasin corrigentia* curanda, in quo negotio inprimis observetur *sapor specificus*, crasin sanguinis plus minus vitians, ut proximè per *specificum remedium* curari queat.

## CAPUT XIII.

De

AËRIS INSPIRATIONE  
L Æ S A.

**N**otum est, *sanguis*, dum in eo est, ut ex dextro ventriculo abeat in sinistrum, circulari per pulmones, pro debita sui suscipienda perfectione, *ac* novo debita fermentationis suscitabulo, ita ut propter solos pulmones dexter cordis ventriculus sit constructus. Ad hunc transitum per pulmones necesse est, dilatentur pulmones. Cui usui inservit vesiculosum pulmonum parenchyma, quod facile expandi & complicari, denuò potest. *Aëris ista* in pulmones dilatatos *susceptio* sive *inspiratio* *tribus modis* læditur. 1. quando omninò *abolitur*, ut in *suffocatione*. 2. quando *augetur* adeoque fit frequentior, in *frequentiori respiratione*, quando nempe ordinaria non est sufficiens, de quo vid. *Sylvius l. I. prax. c. 82. §. 12.* 3. quando *depravatur* seu cum labore & difficultate fit, ut in *Dyspnœa*.

*ABOLITÆ respirationis sive suffocationis Causa* ex triplici haurienda fonte, quatenus respiratio sive aëris admissio & reciprocatio tollitur, vel (1.) *vicio viarum*, aërem non transmittentium: vel (2.) *vicio pulmonum* aërem non admittentium: vel (3.) *vicio musculorum ac nervorum*, thoracem non legitime dilatantium ac moventium.



Quoad primam causam, quando via clausa, non admittunt aërem, suffocamur: siue extrinsecus aliquid angustet vias; siue intrinsecus adhæreat. Extrinsecus se offert in specie strangulatio cum laqueis, quâ larynge constricta, aëri intercluditur transitus. Inflammationes pariter partium ad fauces pertinentium, tam inflammatio aut tumor tonsillarum, quam musculorum pharyngis aut laryngis. Item alii tumores aut abscessus in his locis geniti suffocationem inferre possunt. Pertinent huc varia deglutita, quæ vel in faucibus hærentia, ratione nimix molis, epiglottidis motum impediunt, vel in ipsam asperam arteriam ingredientia, ratione irritationis sensibilissimæ pertinacem ab epiglottide clausuram efficiunt, & ita suffocationem inducunt. Sic ex frusto carnis fumo indurata in gula hærentis; item ex intarctu gulæ à frustis pomorum non benè manducatorum suffocationem ferè enatam observat Forestus lib. 15. observ. 28. & seqq. Sic ex subito deglutito linguae bubula frusto suffocationem observat Bartolin, cent. 1. histor. 11. Sic ex deglutito phaseolo in asperam arteriam illabente suffocationem observatam vid. in M. A. N. C. Ann. 2. pag. 240. plura in Schenckij observationibus. In genere, quicquid motum laryngis & epiglottidis potest impedire, potest suffocationem inferre. Unde pili epiglottidi calu involuti, strangulatum inferre possunt. Conf. Forest. l. 15. observ. 29. Sic à musca in fauces involante Hadrianum Pontificem suffocatum historia memorant. Ex uræ acinis alii suffocati fuerunt. Facit huc etiam polypus narium, qui interdum nimis excrecens, crura in fauces etiam protendit, & suffocationis periculum infert. Sic à struma internè circa jugulum abscondita suffocationem observat Platerus l. 1. observ. 172. Pertinet huc rarus casus, dum ex prolapsu palati repentinam & periculosam suffocationem imminere notat Tulpus l. 1. obs. 38.

Secunda causa hæret in pulmonibus, aërem non admittentibus, id quod fit interdum, quando sanguis ex quacunque ratione vitiosè stagnat in pulmonibus, eosque nimis replet. Sic Panarolus Pentec. 1. observ. 13. suffocationem excitatam à venis sanguine turgentibus notat. Quò facit etiam obesitas nimia, à qua nonnullos suffocatos refert Schenckius. Stagnatio talis sanguinis, præter sui abundantiam; item præter viarum impedimenta etiam fit ab iis causis, quæ coagulationem ejus inferre possunt; v.g. ii, qui post nimium motum & exercitium, calefacto nimis corpore, subito ingurgitant potum frigidum, faciliè suffocationis periculum incurrere possunt, dum tali ex causa sanguis ad sui coagulationem disponuntur, id quod patet, quia à tali causa non rarè sunt pleuritides, unde suffocationis periculum. Exemplum curiosum habuit aliquando B. D. Michaelis in coquo, qui cum diutius & vehementius prope  $\Delta$  incaluisse, ex subito frigido haustu in tantam angustiam

angustiam  
cum succo  
gnem hab  
dererum i  
impedito  
pulmon. p  
peditum  
82. de si  
perra.  
Sic polyp  
Confer.  
propter  
tinent h  
partim e  
vones fr  
norum l  
va recen  
tallicis a  
ex formi  
Frum  
riolum  
Qua  
lantes a  
afficiant  
ficilis;  
præordi  
renebric  
hinc abs  
cent; ur  
vomitu  
ento regi  
feli. 2. c  
ex una p  
quam ci  
xiam; &  
refert sy  
vitam re  
focari a  
hinc



angustiam incidit, ut quovis momento suffocandus videretur, quem curavit cum succo expresso ex bellidis flore rubro, quæ præter vim vulnerariam, insignem habet virtutem dissolvendi sanguinem congruatum. Confer *Mindererum in Medicin. militar.* Pertinent huc alia exempla suffocationum ex impedito sanguinis motu per pulmōnes. Sic *Maurocordatus Tract. de usu pulmon.* pag. 88. ob calculum in arteria venosa enatum, suffocationem ob impeditum sanguinis motum notat. Facit huc observatio *Riverii cent. 1. obs. 82.* de suffocatione ex materia viscida pituitosa in dextra cordis auricula reperta. Confer. observatio parallela in *Mejorv. Tr. de motu muscul.* pag. 99. Sic *polypus cordis*, quatenus sanguinis motum intercipit, suffocationem infert. Confer. *Bartholin. cent. 2. epist. 66. pag. 273.* Catarrhus suffocativus itidem propter effectum ita dicitur, de cuius inanibus commentis infra suo loco. Pertinent huc sub aquis suffocati, in quibus partim ex impedita aëris admissione, partim ex aquarum irruptione fit suffocatio. Faciunt huc imprimis suffocationes frequentissimæ, quæ ex fumo carbonum, ex exhalationibus sive Gas virorum sive cerevisie fermentantium: item ex parietibus recentibus, à calce viva recentè incrustatis contingere solent: non secus atque quando ex fumis metallicis aut fumis cryptarum subterranearum, latinarum diutius oclusarum, ex fornicibus lithantracum diutius oclusis, item ex haustis odoribus sive fumis Finium, & is incensæ aut similibus vel suffocatio inducitur, vel ejus saltem periculum imminet.

Quæstio est de his: quomodo ægros interimant: an Gas sive fumi exhalantes afficiant immediatè pulmōnes, & sanguinem per eos circulatum, an vero afficiant caput ac cerebrum, & itaq; animales in iisdem habitantes? Res est difficilis: necesse est, considerentur symptomata? Antè omnia anxietatem circa præcordia, quandoq; respirationis difficultatem, & hinc vertiginem caducam seu senecbricosam experiuntur. Hinc statim vox, sensus & motus intercipiuntur, hinc absque pulsu, aut saltem vix sensili toti frigidi, quasi syncope correpti, jacent, ut plurimum cum spuma circa os, ubi non nihil ad se redeunt, plerumq; vomitu exercentur, & mucosa multa sponte, vel arte ex orenariis & ventriculo rejiciunt. Prolixius negotium hoc ventilat *Schneiderus de catarrh. c. 1. sect. 2.* cum quo conferantur *Schenck. in observ.* quas habet ex *Parao.* Revera ex una parte suffocationis subitanæ, ex impedito sanguinis tam fermentativo quam circulatorio motu, videtur species: Ex altera tamen parte revera apoplexiam, & quidem positivam, prout *Helmont.* eam in *Tr. de Lithias.* distinguit, refert symptomatum concursus, cum apoplecticorum instar & jaceant, atque invitam revocandi sint ægri. Probabilior tamen ferè videtur sententia, revera suffocari ægros tales, & ex alteratione subitanea sanguinis per pulmōnes circulati, hinc æmulum vitalium inchoata extinctione, & continuati radii cum



animalibus *interruptione* omnia ista mala oriri videantur. Id, quod hoc ipsum confirmat, est, quod in tali aëre quilibet  $\Delta$ is statim extinguatur: Jam vero ex experimentis *Majovv. Tr. de*  $\Delta$  i aëreo, & *Boylei in sua machina* constat, parilem aëris ad  $\Delta$ m & vitam animalium esse necessitatem; & ut aëris alteratio aut defectus subito  $\Delta$ m extinguit; ita etiam vitam tollit. Quod cum fiat *ob aeris vitium*, revera *ob respirationem* plus minus *vitiatam* tales *agros ladi* apparet. Percipiunt tales *ægri angustiam præcordiorum* quasi *suffocatori- am* mox in principio, non quasi aër crassus pulmones nimis repleat; aut ex crassitie respirationi ineptus sit; sed mox videntur suffocari *ægri*, quoniam ex hostili præsentia aëris vitiatum inspirati pulmones & thorax se stringunt, ac minus pro admittendo aëre se dilatare volunt: hinc mox sub primo talis aëris inspiratu *pectoris angustia*; vitiatum postmodum sanguinis fermentativo motu ac superveniente spirituum vitalium subita eclipssi, adeoque *syncope*, etiam *spirituum animalium* deficientia in motu, indeque *vertigo, sensus & motus abolitio*, propter interruptum summè necessarium radiosum  $\Delta$ uum nexum: pari ratione atque suspensis, eò ipsò, quo constringuntur carotides, mox eadem symptomata superveniunt, propter interceptam  $\Delta$ uum continuitatem. Interim tamen adhuc dubium restat, quomodo hic gas inspiratus sanguinem atque spiritus in pulmonibus alteret? Sanè motum fermentativum sanguinis instar motus  $\Delta$ ei mox extinguere  $\Delta$ us vitales figere manifestum est: Sed qua vi hoc præstent, quaeritur? nam *sanguinis coagulatio*, quam alii hic inculant, minus satisfacit: *Gas carbonum* equidem videtur acidum, cum in carbonibus sit  $\Delta$  simile minerali, beneficio lixivii eliciendum, (vel alcali fixo) qui dum in combustionem resolvitur, non dubito sic spiritum acidum eructare, à quo sanguis queat alterari. Minus plana res est de *Gas liquorum fermentescentium*, in quibus id, quod exhalat, revera est de  $\Delta$ e volatili. Dubium tamen est, an magis obtineat vim *sanguinem coagulandi*, an vero *spiritus* quasi *inebriandi & figendi*? adeò ut motus operandi talium *gas sylvestrium*, utut præsentaneus, sit tamen adhuc obscurus.

*Tertia causa* in musculis & nervis hæret. Hinc etiam forti *apoplexiâ* tacti instar strangulorum suffocati intereunt, propter deficientem thoracis & pulmonum motum: sed præterea quoque in *syncope*, deficiente sanguinis & spirituum in pulmonibus motu. Tandem propter nervorum cessantem motum ex  $\Delta$ uum animalium defectu lethalis *suffocatio* supervenit, qui modi sunt ex *nervorum resolutione*.

Contrarium vitium *nervorum* est, quando *suffocatio* fit ex *convulsione nervorum*, quales sunt, quas patiuntur *hysterica*, in quibus nervi paris vagi ac intercostalis spasmo affecti, ut pleraque viscera abdominis, ita in specie musculos

musculos  
percipian  
musculor  
vulsione la  
linu cent.  
ob id dict  
tur origin  
Facit huc  
catione in  
epilepsia  
nervi;  
talem su

Quo

Quando  
removen  
artuum in  
Conf. m  
plex. pag.  
Quodli in  
in dorso,  
ciat. suff  
oxymell.  
frustum  
nem ad v  
bita muc  
Platerum  
per confer  
applicatur

Sang  
plus minu  
tum motu  
Tr. de men  
bus inclina  
explicat A  
durch de  
den/offen  
focatis tali  
repetit, &



musculos thoracis ac laryngis constringunt. Hinc enim est, quòd *hysterica* percipiant *angustias faucium*, quasi laqueo strangulentur, ex *spasmo* nempe *musculorum laryngis*. Conf. *Willis. in Anat. Cerebri c. 10.* Sicuti ex *convulsione laryngis* nata *suffocationis* singularem etiam historiam refert *Bartholinus cent. 4. epist. 454.* Ex *venenis* nonnullis assumtis, in specie ex *fungis*, ob id dictis *strangulateriis*, subindè imminet *suffocatio*; quæ similiter videtur originem ducere & simili *convulsione laryngem* aut *diaphragma* afficere. Facit huc etiam observatio *Plateri pag. 171. l. 1. observ.* de imminente *suffocatione* in coitu. Notum vero est, quod *congressus* rectè appelletur *parva epilepsia*, propter quasi *convulsionem* quandam, quâ in tali actu afficiuntur nervi; unde ex simili *convulsivo impetu nervorum*, thoracem moventium talem *suffocationem in coitu* natam fuisse probabile est.

Quoad *Curam*, variat hæc, pro causarum antecedentium ratione. Quando *viz* sunt affectæ, ut non transmittant, eorundem *impedimenta* sunt *removenda*. Sic v.g. *suspensis laqueus* solvendus, *vena* secanda, *frustiones* artuum instituendæ, *rosa* liquida infundenda, in *loco calido* seponendi. Conf. *methodus revivificandi suspensos in Wepfero Tr. de loco affecto in apoplex. pag. 182.* Item *Barthol. cent. 2. epist. 96. p. 717.* *Herst. lib. 11. observat. 9.* Quòd si in *faucibus* hæreant boli, *descensus* eorum promoveatur *concussione in dorso*, ac propinentur *incidentia & lubricantia*. v.g. *Forestus loc. supra citat. suffocationem* imminet *ex frustis pomorum* curavit per lambitionem *oxymeli squill.* incis sic *frustulis*, & sponte ad *stomachum* delabentibus. Sic *frustum carnis fumo indurata* in gula hærens, per lentam *castiæ* deglutionem ad *ventrem* promovit. Item ex potu *Vitis* fauces ferè occlusæ, exhibita *mucilage Cydoniorum* in potu curatæ: vel in graviore malo imitemur *Platerum observ. p. 386.* qui ex *osticulo gula infixo*, unde dolor & ardor, & per consensum laryngis *spirit. angustia*, per *cataplasma maturans & suppurans* applicatum facta *suppuratione* & cum pure *osticuli excretionem* curavit.

*Sanguis stagnans* vel *venesectione*, corporis *quiete*, vel *internis sanguinem* plus minus *attenuantibus*, & *liberorem motum* ipsi *conciliantibus*, in debitu *motum* restituatur. *Sub aquis suffocati*, ut restituendi sint, docet *Helmont. Tr. de mens idea, §. 50.* Item *Bartholin. cent. 6. histor. 68.* nempe elatis pedibus inclinato corpore concurrendi sunt, ut *V* effluat; omnium optimè opus explicat *Albinus in Tr. peculiari.* Nempe ipse restitutionis deficit. 1. So sie durch die Nase oder Mund bluten. 2. So sie den Mund / wie die Greben den / offen haben / &c. Hisce *enchiridibus* addatur *methodus Borelli*, qui *suffocatis* talibus *panis assati micæ* *V* calidè imbutas admovent, easque sæpius repetit, & hinc, ubi *reviviscere* incipiunt ægri, pro *alteratione corporis interna*



interna corrigenda imitemur *Forestum l. 15. observ. 26* propinando decoctum flor. chamom. in cerevisia factum, evocando in lecto sudorem, qui ipse citato locopuellam. 2. annorum in aquam Saponariorum delapsam ferè morituram leni vomitu curavit.

Qui ex fumo carbonum, aëre cellarum aut puteorum, suffocati videntur, iis inprimis convenit vomitorium, tam præmittendo, quam permiscendo simul aquas & potus rosos, & quidem in majori longè dosi danda sunt vomitoria cum difficulter talibus exhibeantur ægris. Rosa tam præmittenda, quam intermiscenda sunt, V, theriacal. & apoplectica, & simul etiam sternutatoria insufflanda sunt naribus: item in aërem exportandi sunt ægri, os diducendum, continuò ventus faciendus, facies crebrò frigida adspargatur, acet. naribus admoveendum: Refert enim *Nardus in notis. Genial. p. 1. pag. 76.* à fumo carbonum, semi-mortuos solò calidò vapore acetis sulcitate. Item castoreum cum aceto admoveatur naribus, vel acetum ruscaceum, aut V, hirundin. c. castoreo. An larga venæsectio conducat ad imitationem Panaroli ferè dubito, nisi forsan in plethoricis aut obesioribus, in quibus naturâ tardior est sanguinis motus, pro hoc melius promovendo conducat, sive locum inveniatur. Vid. in *Panarol. cit. loc.* Plura de his vid. in *Sennert. lib. 1. prax.* ubi de Caro, p. 656. item *Schenk. ex Parao pag. 217. l. 2. observ.*

Denique in suffocatione convulsivâ eadem conveniunt, quæ in passionibus hystericis & epilepticis, in specie castorina & Oia volatilia. Sin ex fungis sit malum, horum alexipharmacum est oxymel. squillitic. vel solum, vel cum theriacâ propinandum, præmisso, pro circumstantiarum ratione, vomitorio. Confer. de fungorum medela *Timæus in casibus p. 311.* Item *Panarolus Pentec. 3. observ. 45.*

**Depravata inspiratio**, sive ea, quæ fit cum difficultate, & non raro insigni anxietate, ac in qua subindè imminere videtur suffocatio, dicitur **DYS-PNŌEA**, -cujus primus gradus dicitur *Anhelatio*, aliàs simpliciter secundus dicitur **ASTHMA**. Tertius **ORTHOPNŌEA**, quia tales corpore erecto, sublati alis, & admodum expanso corpore respirare nituntur. Quorum *Orthopnæicorum* erectam respirationem eleganter describit *Helmont. Tr. Catarrhi deliramenta §. 45. lit. P.* Nam simul ac tales *Orthopnæici* incumbunt dorso, suffocatio imminet, unde surrecti manent, quò levamen percipiant.

In genere **Causa** omnis *Dispnceæ* est deficiens admissio, & reciprocatio aëris, propter expansionem vesicularum plus minus deficientem, unde anxietas & suffocationis periculum, sive pulmonum, sive thoracis, sive aliarum partium

partium im  
secundum  
vocantur, n  
materia vit  
ab ejus ver  
quod citra  
tione cessat  
pulmonib  
In p  
rali, ac de  
vomica,  
undans p  
vel ob ab  
tiam, &  
& in prim  
item, si al  
fit vel rar  
grandines  
propter de  
& exsecat  
rationi ins  
tione fibr  
sicularum  
num Hel  
Special  
num, & u  
vel per me  
pulmonib  
sanguine  
• Per  
ratorum  
pulmones  
cervatio su  
torum, qu  
hærentes a  
quando ex  
tione nutr  
cum vitio  
Faber in



partium impedimento hoc ipsum eveniat. Melioris doctrinæ ergò *asthma* secundum Willis & Helmont. dividam in *humidum* & *siccum*, sive ut aliàs vocantur, *manifestum* & *occultum*. *Manifestum* sive *humidum* est, quod à *materia vitiosa* movetur, ita ut ab ejus præsentia, motu aut occasione oriatur; ab ejus vero remotione iterum cesset. *Asthma* vero *siccum* sive *occultum* est, quod *citra* præsentiam *materiæ* talis oritur, undè & sine sensilis materiæ excretionem cessat. *Asthmatis humidi* sedes est, prout materia vitiosa movetur, vel in *pulmonibus*, vel in *stomacho*.

In *pulmonibus* est vel *mucus viscidus*, ut plurimum, ex deficiente naturali, ac depravata præternaturali, pulmonum nutritione natus: vel *pua*, in *vomica*, *abscessibus pulmonum*, *empyemate*, *phthisi*: vel *serum copiosius*, inundans pulmones; vel *sanguis in motu* per pulmones plus minus *impeditus*, vel ob abundantiam, vel ab acido coagulationem, vel ob nimiam turgescen-  
tiam, & quasi ebullitionem, vel ob vitium cachecticum. In *stomacho* vero & in *primis viis* est vitium, si *mucro crudo* & indè natis *flatibus* obsideantur, item, si ab *hydrope* abdomen nimis occupetur. *Siccum* sive *occultum asthma* fit vel ratione *conformationis vitiosæ* in gibbosis: item, ob *cruda tubercula*, *grandines*, *calculos*, bronchia obsidentes, *deglutita* illa obstruentes: item, propter *deficientem* pulmonum *nutritionem*, indeque horum *corrugationem* & *exsiccationem*, sive ratione *convulsionis nervorum* & *musculorum* respi-  
rationi inservientium, diaphragmatis, laryngis aliorumque: vel denique ra-  
tione *fibrarum* propriarum *pulmonum* nimis strictarum, ac contractarum ve-  
ficularum dilatationem impredientium, idque coincidit cum *caduco pulmo-  
num Helmontii*.

*Specialius* paulò hæc explicanda veniunt. *Asthma*, quod fit ex *vitio pulmo-  
num*, & ut plurimum intelligitur sub *asthmatis* mentione, est vel per *epigenesin*,  
vel per *metastasin*. Per *ἐπιγένεσιν*, vitio nutritionis propriæ depravatæ: per  
*μετάστασιν*, vitio materiæ ex sanguine vel immediate, vel ex alio loco, mediante  
sanguine aut lymphæ ad pulmones depositæ.

Per *ἐπιγένεσιν* igitur fit *asthma*, quando vitio vel aëris, vel aliorum inspi-  
ratorum v.g. in metalli fodinis, fossoribus, vel alia quacunque ratione lædunt  
pulmones, ut vitietur eorum digestio præfata ac nutritio, ejus effectus est co-  
cervatio succorum crassorum, viscidorum, aut simili vitiosa qualitate prædi-  
torum, qui vel in proprio pulmonum parenchymate, vel in eorum bronchiis  
hærentes aëris reciprocum motum impediunt, undè *Asthma*. Par ratio est,  
quando ex *vitio lymphæ catarrhali* aspera arteria læditur, exoriatur, aut alia ra-  
tione nutritio ejus propria vitiat, undè alimentum ejus pervertitur, & in suc-  
cum vitiosum ac mucilaginosum degenerat. Nempe hoc est, quod *Petr. Joh.  
Faber* in *Patholog.* tradit, nempe, *excrementa* in pulmone ab ejus alimentis



sequestrata & abundantia esse causam grandinis vel lapidū, *Fig.* coagulati, si indurescant: quod si vero adhuc sint liquida, oriri *asthmata*, *tusses* & *carrhos suffocativos*, si scil. liquidum hoc excrementum in lentam, gypseam & vitream mutetur visciditatem, *verum* produci *asthma*. Fieri hoc solet in primis iis, qui in *mineralis metallicis* sunt occupati, aut qui mineralia, *Fles*, *Gialia*, *Galua* tractant, quorum inspiratum Gas sive fumi maligni cum aëre hausti ita depravant digestionem pulmonum, ut loco assimilationis alimenti proprii hoc ipsum degeneret in excrementa varii generis, vid. *Helmont. Tr. Tussis & Asthma. §. 44.* Pertinent huc simili ferè occasione geniti *abscessus* & *verrucae pulmonum*. Sic *Dodonæus*, & ex eo alii authores, refert in *observationibus* exemplum *asthmatici mortui*, cujus in pulmonum inferiori sede reperti sunt *abscessus* duo, à quibus inundati pulmones materiâ purulentâ, *asthma lethale* induxerunt. Hinc & *Phthisici* ut plurimum *Dispnoea* laborant, propter *pneum*, quod vel unum alterumve pulmonum latus occupat; vel in *empyemate* in thoracis cavo fluctuat.

Per *μείδισασι* fiunt *humida asthmata pneumonica* variis ex causis: v.g. dum *febres continue* interdum solvuntur per *decubitus* in pulmones materiæ in sanguine coctæ, cujus copiosa rejectione, præsertim mediante *tussi*, omnia postmodum levantur mala. *Serum* pariter, vel præternaturaliter in corpore retentum, vel ejus medio excernenda alia in corpore retenta, laudabili conatu intra pulmones seponuntur. Ipsum sanè *serum suppressum asthmaticum* dare originem luculenter patet ex *Rhodio cent. 2. observ. 27.* ubi refertur *orthopnoea ingens ex sero sanguinis* per excretionem 36. librarum urinæ intra 24. horas levata. Imò ipse sanguis non saltim quacunque occasione in *cauum pectoris effusus*; sed quacunque ratione in suo motu impeditus, ac in vasis pulmonum stagnans, aut etiam *impensus* subindè ebulliens aut turgescens *asthma* & *orthopnoeam* infert. Conf. *Villis. Pharm. rat. p. 2. pag. 239.* Hinc enim post motum vehementiorem quasi *naturaliter* sumus *asthmatici*, quoniam sanguis rapidius per vasa raptus, vix tam promptè per pulmones ex dextro ventriculo in sinistram cordis potest moveri, quin nonnihil subsistat in pulmonibus. Hinc observamus etiam, quod mulieribus, quibus *suppressi Menes*, viris item, quibus *suppressa hemorrhoides*, item *cachectici* quibuscunque ex levissimo corporis motu supervenit *Dispnoea*, quoniam in illis sanguinis excretio suppressa, sub levi corporis motu, circulum per pulmones sui quodammodò sufflaminat. Hinc etiam *talium suppressionum occasione* non raro *sputum sanguinis* supervenire solet.

In his verò *Cachecticis* nempe alia est ratio: Horum enim sanguis crudus, ex cruditate ventriculi acida, diutius in pulmonibus hæret, ob tardior-

rem

rem ab aëre  
tione quatuor  
lerius motu  
que dispo  
guinis in p  
lib. 16. obj  
In genere  
flaminat,  
stra coagu  
huc potius  
enim Ru  
ob ingen  
tem extr  
subito rel  
hydrops p  
Ex  
rum, aut  
ferunt, n  
lymphatic  
degenerat  
vel gravi  
aliave pu  
rit, ac  
Asthma  
iis, quor  
dis apra,  
scere, &  
gentia;  
phragma  
tim quia  
tatione v  
motus se  
sed malè  
fuere cura  
nullis ced  
Sylvatic  
focacioni  
spontè v



rem ab aëre alterationem, & propter glutinosiorem paulò consistentiam, ratione quorum non nisi lento motu per pulmones circulari potest: Unde, celerius moto sanguine sub corporis motu, facilius circa pulmones subsistit, atque *dispnoeam* infert. Fortan huc pertinent *terrores* propter similem sanguinis in pulmonibus stagnationem ad *asthma* disponentes. Sic enim *Forest. lib. 16. observ. 10. orthopnoeam lethalem ex terrore subito concitatam* notat, *In genere* quicquid sanguinis circulum per pulmones quocunque modo sufflaminat, *asthma* infert. Hinc ex *materia viscida* in auricula cordis sinistra *coagulata dispnoeam lethalem* notat *Riverius cent. 1. observ. 82.* Pertinet huc *potus subitaneus frigida*, aut *lotio corporis frigida* sub nimio æstu. Sic enim *Rulandus in thesauro pag. 112.* ob *copiosum haustum frigidissima aqua* ob ingentem sitim, ab intenso caniculari æstu excitatam, *spirandi difficultatem extremam jamjam suffocantem* observavit, per vomitum *¶ a benedicta* subito restitutam. Conf. etiam *Gabelhof. cent. 2. cur. 17. & 18.* Tandem & *hydrops pectoris* *asthmata* gravia inferre solet.

Ex modò dictis duo notanda veniunt: I. *Sanguinem, lympham, serum*, aut *materiam vitiosam quamvis*, quæ in pulmonibus talia *asthmata* inferunt, non destillare ex capite, sed solummodò ex vasis, vel sanguifluis, vel lymphaticis, eò inferri, siue fiat immediatè, siue mediatè, *alimenti* scil. vel *degeneratione*, vel *lymphæ alteratione.* II. *Asthmata hæc humida* eò esse vel *graviora*, vel *pertinaciora*, quò magis materia peccans acrimoniâ suâ, aliâve pulmonibus inimicâ impressione, hos, aut asperæ arteriæ ramos irritârit, ac ita eorûm fibras ad pertinaciores sui constrictiones stimulaverit, *Asthma humidum* vitio stomachi ac primarum viarum subindè reperitur in iis, quorum stomachus reperitur infarctus materiâ crassâ, flatibus generandis aptâ, quæ ubi fuerit quacunque occasione commota, ut incipiat turgescere, & quasi inflari, gravia dat *asthmata*, per paroxysmos subindè affligentia; partim quoniam nimia ventriculi distentione impedit motum diaphragmatis deorsum, ad pulmonum dilatationem summe necessarium; partim quia ipsum diaphragma quodammodò in consensum trahitur, ex irritatione ventriculi, unde illius convulsio, & hinc vitiatu sub respiratione motus sequitur, adeò ut frequentissima sint *asthmata*, *ex stomacho* sapius, sed malè *pectori* dicata. Sic pertinent ferè huc ista exempla, quæ vomitu fuere curata. v. g. *Timæus in Epist. pag. 122.* *asthma contumacissimum*, nullis cedens remediis, tandem vehementi provocato vomitu curatum refert. *Sylvaticus cent. 2. consil. 49.* refert *asthma* singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius æger fuit immunis, quàm succederet spontè vomitus assumtorum & materiæ pituitosæ: ut taceam alia exempla.



Et tales *stomachi vitio asthmatici & stertorem* in faucibus, & *tussim*, & huius medio *materia viscida excretionem*, subinde habere observantur, non secus ac ii, qui ex pulmone asthmatici sunt. Ac sanè verissimum est de omni asthmate humido pituitoso, tam pulmonali, quam stomachali effatum *Gabelchoferi cent. 4. observ. 20.* annotatum: Quicumque *asthmatici* sunt obnoxii, ferè habent ventriculum frigidum, imbecillum, flatulentum, hepar calidum, renes obstructos, quæ omnia ad asthma conferunt. In talibus asthmaticis ex vitio primarum viarum sæpius etiam conjuncti sunt *flatibus*, qui multum ad *dispnceas* conferunt. Sæpius in *scorbuticis & hypochondriacis*, post pastum præsertim vespertinum, difficillimæ oriuntur *dispnceæ*, quæ non nisi ex *vitio digestionis*, & indè *copiosis* genitis *flatibus* originem ducunt. Imò novi *scorbuticos*, qui quando post pastum vel haustulum vini capiunt, brevi *asthmatici* fiunt. *Asthma* tale à *flatibus* & ex *hypochondriis* dicitur *Riverio Asthma notum*, & existimo unum ex *signis* certissimis *malis hypochondriaci*, quando post pastus, & interdum etiam matutino tempore, conqueruntur de *difficili respiratione*, propter impedimenta circa hypochondria, quæ oriuntur partim à *flatibus*, partim à *materia viscida* in stomacho & vicinis regionibus hærentibus.

*Hydropici* deniq; *confirmati* tandem etiam fiunt *asthmatici*; *partim* propter liberum Diaphragmatis motum impeditum; *partim* propter distentos musculos abdominis, thoracis dilatationem & sursum versus elevationem sive sublationem impeditentes; *partim* propter copiosius retentum serum, crasin sanguinis vitians, & acrimoniâ suâ pulmones nonnihil vellicans. Hinc enim & *tussiculosi*, tandem redduntur *hydropici*.

*Alterum asthma*, ab *Helmont.* vocatum *siccum*, est, quod citra materiæ sensibilis cujusdam accessionem aut recessionem, aut excretionem paroxysmum & inchoat & finit. *Asthma* tale vocat *Helmont.* *caducum pulmonum Willis.* in *patholog. cerebri de morb. convulsiv. c. 12.* It. *Pharm. rat. part. 2. p. 240. & c.* vocat hæc *asthmata convulsiva*: *Lindanus* in *MS.* *asthma* tale *siccum crambum* sive *convulsionem diaphragmatis* appellat. Nulli latitudinem affectus debite exhauriunt. Sanè legi merentur observationes & historiae, quas habet *Helmont. Tr. Asthma & Tussis*: at apud Veteres altum est de his silentium, quoad theoriam: utut, qui attentè practicos legit, plurima inveniat exempla *asthmatum* tam *occultorum* quam *manifestorum*. Interim omnes Veteres Practici, *Helmontio* & *Willisio* excepto, suâ hypothesi falsâ præoccupati de infarctu pulmonum, in omni asthmate necessariò demonstrare nituntur, asthmata talia oriri ex flatibus in pulmonibus genitis, utut interdum videntes difficultates, ultro fateantur, se non posse sufficienter explicare. Asthmatum talium exempla inveniemus in *Pisene, Tr. de morbis à colluvie serosa*: Et nittur



titur eorum originem demonstrare ex sua hypothefi per *serum*, sed frustraneo conatu. *Platerus in observat. p. 361.* cum videret, quod non possit conciliare talia exempla cum infarctu pulmonum, dicit oriri ex *Catarrho*, qui subito ex capite in pulmones derivetur. *Joh. Colle Tr. Cosmitor Medicus, p. 159.* simile *Helmontianis* refert exemplis, ubi fateri tandem cogitur, oriri tale asthma à *pravo motu pulmonum & constrictione*, sive à *flatuum & fuliginum copia*. Ipse *Sylvius* talia asthmata ex *vaporibus & halitibus*, ex intestinis oriundis & pulmones replentibus, derivat. Multa & varia talium asthmatum exempla vid. in *Schenck. observ. p. 34.* item apud *Marcell. Donatum, in histor. medica mirab. lib. 3 c. 12.*

Jam ut pateat, quid sentiendum sit, liberè pronuncio, me nec præcisè facere cum *Helmontio*, nec cum *Willisio*. Notum est, hypotheseos *Helmontianæ* fundamentum falsissimum, quod pulmo nullo modo moveatur, sed saltem sit cribrum, per quod trajiciatur aër: unde tale asthma sicum vocat *caducum pulmonum*, id est, obstrui & occludi in eodem pulmonum poros, per quos aër transire debeat, quibus occlusis, tale sequatur asthma. *Willis* è contra in *Pathologia Cerebri, de morbis convulsivis* peccat in excessu, dum *propriis* pulmonum *nervos*, & *proprium* iisdem attribuit *motum*. Unde pulmonibus convulsis, inquit, & sursum ad fauces quasi protractis sequitur tale asthma; unde dum *Willis* à convulsione pulmonum hoc malum derivat, non admittendus est: Videtur tamen seipsum postmodum correxisse, dum in *opere posthumo*, nempe *part. 2. pharm. rat.* ubi de *asthmate*, de tali pulmonum motu nil memorat, sed saltem in nervis & musculis convulsis acquiescit.

Res ut pateat, consideremus *tria*, quæ ad legitimum *pulmonum motum* & hinc *aëris reciprocationem* faciunt. I. Legitima partium mechanica conformatio. II. Musculorum instrumentaliter moventium, & nervorum, musculorum motum, mediante *æuum animalium influxu*, dirigentium constitutio. III. Observandæ sunt fibræ ipsæ nervæ pulmonum, tam membranæ, undique pulmones cingentis; quàm aliæ ad ipsas vesicas pulmonales, pro istis ritè colligendis, hinc indè dispersæ, quæ fibræ, pro fibrarum natura, motu saltem contractivo erunt instructæ, adeoque constringere saltem & coarctare vesiculas pulmonales, sed nulla aliâ ratione movere poterunt. Nempe de his fibris in *Epist. ad amicum* refert *Malpighius* in pulmonibus unum observari non indignum consideratione. In ranis enim & lacertis exterius reticularis adest plexus ex carnis fibris, ita ut sit mirus musculus, comprimens singulas cellulas pulmonis, & in testudine, præcipuè interius, etiam hujusmodi reticularis musculus mirus observatur. Idem etiam plexus carnis circa pulmones in reliquis perfectis animalibus patet, si extremitates lobulorum



turgidæ adhuc & molles perlustrentur, tunc enim caro aliquantulum rubet & turget. Conf. etiam quoad has fibras *Lamzuvaerde Tr. de Respir. Suuam-merdam. expiration. p. 35.* Ac sanè ab his fibris caducus iste pulmonum *Helmontii*, vel eorum spasmus rectius derivari videtur.

Secundùm tria hæc considerata, etiam *triplex asthmatis siccæ oritur differentia.* I. Ea, quæ fiunt *vicio conformationis*: v.g. quando fiunt asthmata propter crudum *tuberculum*; aut propter *grandinem*, aut propter *calculum* in pulmonibus enatum; aut propter alia *concreta præternaturalia*, sive in parenchymate pulmonum, sive in bronchiis pulmonum hæreant. Conf. *Forest. lib. 16. observ. 10.* item *Helmont. tract. sæpius allegato.* Sic à *scirrhus pulmonum asthma.* *M. A. N. C. Ann. 3. pag. 474.* à calculis asperam arteriam externè comprimentibus *asthma lethale* notat *Kerkring. Spicileg. observ. 72. &c.* Notum porro est, quod *gibbosi* ut plurimum sint *asthmatici*: item *Sterni* ac *Costarum notharum* vitiosa conformatio, cujus rei exemplum vid. in *Schenck. observat.* Facit huc *deficiens pulmonum nutritio*, unde pulmones aridi & flaccidi redditi instar membranæ exsiccatae corrugantur, ut minus expandi queant. de quo vid. *Sylvius l. 1. Prax. c. 24.* item *c. 22. pag. 302.* Quò etiam disponit crebrior *Nicotiana fumus*, immediatè afficiens pulmones, eosque plus minus ad atrophiam disponens, non vero caput immediatè alterans.

II. Sunt *asthmata convulsiva* in specie sic dicta, quæ fiunt ratione *nervorum*, musculos respiratori intervenientes ad spasmos & convulsiones adigentium. Sanè sæpius miror, quare veteres non viderint thoracem moveri per tot & tam insignes musculos, nullumque respectum ad hos ipsos habuerint. Creberrima hæc sunt asthmata, eorumque exempla imprimis in *Helmont.* & hinc in *Villisi* cit. loc. possunt videri. Exemplum *Dispnææ* talis manifestum est, quod vexat eos, qui *subluxationem vertebrarum dorsi* patiuntur, qui quasi cingulo circa costas nothas constrikti, difficulter admodum respirant, propter *nervos* ex vertebriis subluxatis prodeuntes nonnihil compressos, & hinc *sensilius irritatos.* Pertinet huc observatio *Thoneri l. 2. obs. 1. pag. 94.* qui notat *orthopnæam cum suffocationis periculo ob faucium summam constrictionem*, cum aliarum partium *convulsionibus*, excitatam occasione *vermium intestinorum.*

Pertinet huc *asthma muliebre* sive *hystericum*, ac in viris *hypochondriacum.* Sæpius namque mulieres hystericæ insignem patiuntur spirandi difficultatem, quæ revera fiunt à *convulsionibus* vel *diaphragmatis*, vel *musculorum thoracem moventium*, vel *musculorum laryngis.* Partes hic affectæ revera sunt *musculi respiratori*, ac præsertim *inspirationi inservientes*; sive

sint



sint *diaphragma*, sive *thoracis musculi externi*, aut *intercostales*, sive *musculi laryngis ac faucium*. Vitium hic hæret in *nervis*, ubicunque etiam in suo tractu afficiantur, sive in exortu in cerebro & cerebello, sive in progressu circa plexus, sive denique in ipsis musculis, quibus inseruntur. Confer *VVillis. pharm. rat. p. 2. p. 241*. Illustre exemplum *asthmatis* talis *convulsivi* vitio *nervorum* circa suum exortum affectorum vid. in *Hobokenio* in *Anatome Secundine* pag. 214. Ex plexibus vero affectis, sive *superioribus* circa pectus, sive *inferioribus* in abdomine oriuntur *asthmata hysterica* dicta. Quæ denique ex ipsis musculis affectis fiunt, pro musculorum varietate diversa sunt. Puerum observavi 11. annorum, qui quavis vespere, præsertim à pastu, tam crebrâ ac violentâ respirationis inordinatione, præsertim creberrimâ sed immutâ inspiratione afficiebatur, in quo malum saltem oriebatur ex *diaphragmate affecto*; idque, ut videbatur, per consensum ventriculi; nam vomitorio propinato ferè in totum cessavit malum. Admodum autem *multiplex varietas* in huiusmodi *asthmatis convulsivis*, observabilis est, idque *duabus* imprimis *ex causis*: I. Propter texturam & tractum, sive distributionem planè singularem *nervi intercostalis & paris vagi*, qui præsumt membris ac partibus colli, thoracis & abdominis, qui nervi, ultra mirabilem sui distributionem, & pluribus plexibus hinc inde diversimodè sociantur, & hinc per consensum mutuum varios *Spasmos* etiam remotioribus in locis excitare valent. Quæ ratione & *Nephriticis* quosdam *difficiliore respiratione* laborantes, hinc non rarè *asthmata convulsiva* incurrere, quorum fomes later in abdomine, ibidem afficiens nervos, ex quorum consensu thoracis pathemata, ut in *hypochondriacis* notum est. II. Est *varietas musculorum* duplici motui *dilatationis & constrictionis* tam laryngis, quàm thoracis inservientium, & tam in anteriori, quàm posteriori thoracis parte situatorum unâ cum diaphragmate, qui omnes & variam structuram, & distinctum motum, & hunc vel dilatationi, vel constrictioni thoracis inservientem, cum obtineant, mirum non est, tam insignem varietatem circa *asthmata convulsiva* observari.

*Causa* horum *asthmatum convulsivorum*, quæ nervos afficiendo talia mala producit, est *acidum vitiosum* nervis inimicissimum, quocunque in loco nervos vellicarit. Hinc *hypochondriaci & scorbutici*, & similes crebrius talibus *asthmatis* solent affici, non secus ac ii, qui *inunctionibus Mercurialibus* pro cura *luis Quæ* malè sunt tractati, aut sub ipsa curâ aëri incautius se exposuerunt, his subindè nervorum impressionibus vitiosis *asthmata convulsiva* sunt familiaria.

Pertinent pariter huc *arthritis confirmati*, & in quibus vel rarius,



vel difficilius *paroxysmi podagrici* superveniunt: In talibus *hujusmodi asthmata* solent supervenire. Exemplum referam: Victor senex sæpius aliàs *arthruidæ* afflictus, cum *paroxysmi* hujus requiem concessissent, sensim *difficilis* supervenit *respiratio*, qui interdum erat tolerabilis: Edebat moderatè, satis interdum erat vegetus, sed post cœnam cum cubitum ivisset, nunc imminente somno, nunc cum unam alteramve horam dormivisset, ex improvviso *anxietates præcordiorum suffocatoria* superveniebant, unde, nisi suffocari veller, mox cogebatur è lecto assurgere, mensæque assidere erectus, ubi *altam, anhelam & densam* agebat *respirationem*, idque *per. 3. 4.* pluresque horas, donec malo successivè remittente, cum tantilla saltem *materia viscida* reiectione ipse lectum repetere, & securè postmodum dormire posset. Interrogabatur interdum exactè, ubi perciperet impedimentum respirationis: monstrabat regionem, quæ circumscribitur costis nothis, in specie hypogastrica, quasi ibid. fortissimè constringeretur. In ipso *paroxysmo* dicebat, se percipere ein *Gurren* in abdomine, tandem subito accidere sonitum quendam singularem in regione epigastrica; *Es schnarret*: quo facto, malum breviter remittit, & lectum reperere potest. Tragedia hæc omni nocte recurrebat, varia incassum fuerunt adhibita; optimum erat, ut post cœnam parcam, ingruente *paroxysmo*, *theriaca* vel *muhridatii*, quantum capit cultelli cuspis, caperet, quod *paroxysmum* vel sufflaminabat, vel insigniter levabat. Interim pro varietate tempestatis vel gravior, vel lenior erat. Tandem cum post aliquot septimanas *podagra brachii & manus* superveniret, modo dicto *paroxysmi* celsârunt. *Asthmata talia convulsiva* sæpius sunt *hereditaria*, non secus ac *morbi Epileptici*: Sunt enim ut plurimum *periodica*, certum tempus recursus observantes, & ubi cessaverint aliquandiu faciliè per multiplices *occasiones externas*, v. g. *per iracundiam, mutationes tempestatum, &c.* recidivam incurrunt.

III. Observandæ veniunt *pulmonum fibra nervea*, exque propter obscurum pulmonum motum, non tam sensiles, quam motrices, & speciatim *constrictoria*, propter quem finem & pulmo suis nervis instructus est. *Fibræ* dictæ prout stringuntur nimis, aut contrahuntur, diversimodè præsertim si irritatæ, convellunt vesiculas pulmonum membranaceas, stringendo angustiores, & pro aëre suscipiendo ineptiores reddunt, adeoque sui stricturæ *asthmaticum pathema* inferunt. Quò sensu ferè conciliari potest *Helmontii* structura pororum membranæ pulmonis aut saltem doctrina, quam huic superstruit, hoc modo intelligibilis explicari potest. Exemplum talis *asthmatis* quilibet experiri potest in seipso, dum & incensum naribus admovert, aut *butyri* § ij, vel *Vis* recentis odorem suscipit: in instanti enim halitum suspendi, fauces & thoracem constringi, ac spiritum intercipi præcipiet; Constri-

Constrictis  
fibris, &  
malè effici  
num, eas in  
ternus inc  
Asthmata  
conjuncta  
superveni  
scabie rei  
superveni  
mento sca  
stimulan  
tu ac text  
simul top  
vicis, inte  
est effecta  
ris & hun  
mæ textu  
ex crebrio  
tubindè co  
cum coit  
in omni a  
impeditu  
dam circ  
currit, ut  
opiatu in  
Non  
in statu,  
non solu  
quentissi  
indeque  
irritatione  
in talibus  
tussim co  
ne, quam  
opiatu, v.  
men obli  
respiratio  
cōpressio



Constrictis, nempe occasione inspirati objecti admodum sensilibus pulmonum  
 fibris, & inde difficili reddita inspiratione. Undecunque igitur irriterentur, aut  
 malè afficiantur dictæ fibræ pulmonum, siue sit acidum internum siue exter-  
 num, eas irritans, corrugans aut constringens, siue sint metallici, siue aer ex-  
 ternus inclementior aut impurius inspiratus, talè *asthma* exindè oriri potest.  
*Asthmata* hæc nempe *humida* & *convulsiva* nunc sunt *solutaria*, nunc subindè  
*conjuncta*: Ac sanè rarum est humidum *asthma*, cui non & subindè convulsivum  
 supervenire soleat. *Scabiosorum* huc pertinere videntur *asthmata*, siquidem ex  
*scabie* *retropulsa* ordinatiò *difficultas respirationis*, interdum *perfecta suffocatio*  
 supervenire solet, *malum* videtur tunc esse *complicatum*, natum partim à fer-  
 mento *scabiei acri*, pulmonum fibras vellicante, & ita ad fortiores contracturas  
 stimulante: partim *ex sanguinis crasi hinc vitata*, in debito fermentationis mo-  
 tu ac textura *depravata*, ac quasi *cachectica* reddita, unde & *asthma pituitosum*  
 simul supervenire solet. Hinc observandum, *materiam rejectam per os* in *asthma*-  
 ticis, interdum esse *causam mali*, nempe in *asthmate humoroso*; interdum verò  
 est *effectus*, nempe in *asthmate sicco* eorum, qui constitutionis sunt succulentio-  
 ris & humidioris, & quorum sanguis & lymphæ mollioris quasi ac minùs fit-  
 mæ texturæ, alterari faciliùs, & in variam formam mutari potest. In talibus enim  
 ex crebriori pulmonum agitatione, & aëris per asperam materiam reciprocatone,  
 subindè copiosior paulo lymphæ, per glandulas in asperam arteriam effusa, in mu-  
 cum coit, in paroxysmi convulsivi declinatione ejiciendum. Hinc ulterius  
 in omni *asthmate*, etiam *humoroso*, ad *motum thoracis* plus minus *liberum vel*  
*impeditum*, semper respiciendum. Nam ratione spirituum, ex irritationis ejus-  
 dam circa pulmones sensu, ut plurimum in paroxysmo aliquid convulsivi con-  
 currit, unde & pro hujus ratione plus minus malum intenditur, ac tali ex causa  
*opiata* interdum leniunt tales paroxysmos.

Notandum ulterius, quod *difficilis ista respiratio*, quæ tam in tussi humida  
 in statu, quàm etiam in tussis siccæ principio adest, non est semper, aut saltem  
 non solum, à *pulmonum infarctu aut catarrho*, aut simili quodam vitio, sed fre-  
 quentissimè oritur ex *irritatione pulmonis*, & hinc fibrarum eorum contractura,  
 indeque impedita plus minus eorù expansione. *Signum* mihi erat, adesse talem  
 irritationem, quoties æger vel loquens, vel validius inspirans, tussire cogebatur: Nam  
 in talibus calibus, propter crebriorem *aëris reciprocatonem* irritati magis pulmones  
 tussim concitabant magis, unde *difficultatem magis ex simplici pulmonis irritatio-  
 ne*, quàm materiæ peccantis coacervatione ortam judicavi: Hinc tali in casu ex  
*spatiis*, v.g. ex *spiritu salis armoniaci, anis.* cum *essentia opii*, misto, semper levi-  
 men observavi, non saltem minorem tussis violentiam; sed etiam liberiores mox  
 respirationem, vellicationis nempe sufflaminato sensu. Hinc etiam *sensus doloris*  
*compressivi*, siue *gravativi*, in pectore, siue profundo pulmonum, non semper à co-



*pia materia*, sed sæpius à *fibrarum pulmonalium* in particulari quodam loco *irritatarum constrictione*, quàm compressivus ac gravativus talis dolor subinde insequi solet. Observandum denique & hoc, quando *spasmi* vel *musculorum*, vel *fibrarum pulmonalium* dant *asthmata*, quòd tunc ut plurimum simul & tardior sanguinis circuitus per pulmones esse soleat, aded ut ex impedito plus minus ejus motu insignis in pulmonibus anxietas, & majus imminenti suffocationis periculum adsit. Ac tali in casu *malarum ac faciei rubor*, *vasorum in collo major intumescencia*, aut sensibilis etiam *arteriarum pulsatio* adesse solet.

Ut ritè dignoscantur *asthmata sicca*, vel *humida*, observandum ulterius, quòd in *asthmate manifesto*, si malum sit à *mucò in bronchiis pulmonum contento*, quod *respiratio difficilis* fiat cum *sonitu ex profundo*, eoque *stertente & iusti*, ac *pituita* plus minus *copiosa excretionem*, quæ quò magis excernitur, eò magis affectus minuitur. Si verò *materia peccans* sit in *substantia pulmonum*, vix talis adest *sonitus*, nec nisi successivè, idque non aded copiosè, per tussim aliquid rejicitur. Sin tamen est *vitium humorale*, in pulmonibus aut in ventriculo, *asthma* solet esse *continuum*, quod semel etiam curatum, antequam denuò repetat, successivi incrementi signa prodit. Utut autem sit continuum, subinde tamen exasperatur, idque præsertim vesperti ac nocte, quo tempore omnes ægri *asthmate humoroso affecti* pejus habere solent: quod tamen omni *asthmate* ferè commune est, ut vespertino ac nocturno tempore acerbius affligat; item quòd motu corporis semper exasperetur, item quod pro aëris mutationibus melius vel pejus habere soleant ægri.

Quoad *asthmata* verò *sicca*, speciatim *convulsiva*, sine talis *materia peccantis*, vel præsentis, vel antecedentis indicibus affligere solent, ac etiam cessare citra talis *materiæ manifestam excretionem*. Ex improvviso enim irruit in ægros, aliàs optimè respirantes, atque & evanescit citra sensibile respirationis nocumentum, utut debiles admodum, plus minus tamen ægri esse soleant. Saltem difficile est hariolari, ubi lateat fomes & fermentum, sive spina nervos hostili suâ præsentia irritans & ad spasmos provocans. Si vitium in capite est, *vertigo* aut alia capitis symptomata præcedunt paroxysmum, aut aliàs ægros adfligunt. Sin verò vitium sit in *abdomine*, in *plexibus mesenterii lienaribus* &c. alia symptomata abdominis vel antecedere, vel conjungi solent in specie, *sonitus*, *murmurationes*, *sensus vermicationis* in uno alterove abdominis loco, *tensiones hypochondriorum*, &c. Quòd si *diaphragmatis muscoli*, aut loca vicina sint affecta primariò, *sensus instar zone* in ista regione, ubi diaphragma costis annectitur, percipitur ab ægris; Sin *musculi thoracem moventes* afficiantur, conqueruntur ægri in paroxysmo de sensu, quasi universus *thorax* firmiter *constringeretur ac comprimeretur*; als wann die Brust zusammen geschnürt würde. Si *laryngis* & *fancium muscoli* affecti sint, *suffocationis*, quasi laqueo injecto, *sensum* habent



habent ægri. Sin pulmo constrictus primariò sit, inexplicabile quoddam impedimentum respirationis experiuntur ægri.

Quoad *Prognosin*. *Asthmata* omnia sunt *periculosa*, & quidem *inveterata*, siue sint *humorosa*: nam hæc ferè insignem pulmonum læsionem arguunt; siue *convulsiva*: nam talia *epilepticum* in quodam nervorum plexu radicatam *fomitem* præsupponunt. *Rarissimè* perfectè curantur, quod vel levissimo *diætæ* errore subito recidunt. Tandem omnes *Asthmatici* sub contumacia morbi vel *cachectici*, vel *hydropici* tandem fiunt & moriuntur.

Quoad *Curam*: Hæc vel *in paroxysmo*, vel *extra paroxysmum* instituenda. De *n le Asthma* est vel *siccum*, vel *humidum*. Et tertiò *asthma* est vel *morbus primarius*, vel *secundarius*, v. g. quod affligit *phthysicos* aut *hypochondriacos*, illud *primariò* in specie curandum venit: *secundarium* verò non, nisi *paroxysmus* aliquis gravius urgeat; Nam morbo sanato, vel sublato *primario*, & hoc symptoma cessat. In *Paroxysmo* igitur quantum possibile, libera & sufficiens *respiratio* procuranda. I. *Impedimenta*, aëri libero accessum & recessum per pulmones denegantia, *removenda*. (2.) *respirationis Organorum inordinati motus* plus minus *convulsivi compefendi*. I. *Ratione prioris* aëris ambientis *ventilatio*, erecta sessio, alvi subductio, V. S. potiones sanguinem attenuantes, ejus motum circularem promoventes, viscida pulmonem infarciencia incidentes, spirituosæ, blandè dulces, pulmones demulcentes conveniunt: interdum etiam *vomitiva* utiliter administrantur. 2. *Ratione posterioris* antispasmodica, anodyna, volatilia &c. sunt optima. *Extra paroxysmum* in *Asthmate humido* pro causarum varietate cura varianda. I. *Asthmatis humidi*, καὶ ἔξοχῳ & extraordinariè sic dicti, à viscido muco geniti, cura fit 1. per materiam peccantem *attenuantia* & *incidentia*. 2. per convenientes vias vel *tussi*, vel *vomitui ejicientia*; 3. *regenerationem*, & deinde *recidivam præcauentia*. In quo puncto stomacho inprimis sedulò succurrendum venit.

II. (α) *Pus*, si *asthmatis causa*, *evacuandum*, vel per *expectorantia*, vel per *paracentesin* thoracis. (β) *Abcessus* vel *ulcus consolidandum*, de quo infra ubi de *Phthisi*.

III. *Asthmata à sanguinis vitio* curantur hæc corrigendo: (1.) per ejus *copiam imminuendo*. vel (2.) *Coagulatum dissolvendo*, de quo, ubi de *casu ab alto*. vel (3.) *vitium cachecticum emendando*, de quo, ubi de *Cachexia*. vel (4.) *solitas evacuationes revocando*, v. g. *menes proritendo*, aut, si fieri nequeat, *fonticuli* in regione loci consuetæ excretionis vicini, *inurendi*. (5.) *Turgescentiam* quamlibet, *acidum efferverescens absorbentibus*, aut blandè *diaphoreticis*, aut *copiam sanguinis imminuentibus* corrigendo.

IV. Si *Asthmatis causa* est *serum*, hoc *evacuandum per urinam vel sudorem*,



vel *vesicatorium* confestim; vel per *fonticulum* pedetentim. Sin vitium sit in *stomacho*, *vomitória* & *carminantia aromatica*, ac digestionis vitia, præsertim cruditate in acidam *corrigentia*, conveniunt, ut plurimum *cura methodica* circa *scorbutum* & *malum hypochondriacum* instituenda.

*In Asthmate sicco*

I. *Conformationis vitia* difficillimè curantur, excrecentia tamen *tubercula* aut *grandines* beneficio *spiritus sulphuris per campan.* successivè absumi posse, sunt qui asserunt.

II. *Asthma convulsivum* ex *nervorum* & *musculorum* vitio curabitur, *radicatus fomitem* ejus *corrigendo*, respiciendo præsertim viscus, in quo lateat: in specie in *paroxysmo acidum* nervis inimicum *corrigendum volatilibus*; item *mineralibus antepilepticis* & similibus. 2. *Paroxysmus imminens* suspendendus per *opiata*. 3. *Recurfus paroxysmi præcavendus vesicatoriis*, vel *brachiis*, vel *nuchæ*, vel *femoribus* applicatis, pro *nervorum* vel *nidi* varietate, etiam *fonticuli* interdum inurendi.

III. Ex propria *fibrarum pulmonalium* strictura natum *asthma curatur*. 1. *Causam* irritationis, quantum possibile est, *corrigendo* & *removendo*. (2.) *Opiatis* solum vellicationis *sistendo*. (3.) *Appropriatis* simul *vulnerariis* & *balsamicis* pulmonibus succurrendo.

*Pro Scopis istis ritè assequendis observandum*

I. *Vomitória* ferè in quovis *asthmate* esse egregia, non saltem in *humido*; sed etiam interdum in *convulsivo*, tam *extra paroxysmum*, quàm in specie in *paroxysmo*. Hinc omnes cordati practici semper in *asthmate vomitoria* usurpant, & subinde gravissimorum *paroxysmorum*, *vomitiorum* *propinatorum* usu levatorum observationes prostant; nec est, quod exinde metuatur suffocatio. Inanis hic est metus, nunquam tale quid observatum. In *humido* sanè æqualiter haurit materiam *vomitus*, sive in pectore, sive in *stomacho* hæreat. Unde *phibiticorum*, quod in pulmonibus fluctuat, sæpius optimè & feliciter evacuatur per *vomitória*. Quin etiam *expectorantibus* remediis commodè remedia *vomitória*, sed in immutata dosi, possunt permisceri, ut saltem stimulent *expectorationem*, non autem vomitum inferant. *Exempla vomitoriorum* feliciter administratorum vid. in *Rulandi thesaur. pract.* p. 103, 109, 112, 116, 118. item *Plater. l. 1. obs.* p. 165. *Timæo in Epist.* p. 122. *Höferus in Hercul. Medic.* p. 118. *Horst. in Problem. Decad. IV. Q. 5. Poter. cent. 2. cur.* 16. & 46. *cent. 3. cur.* 22. *Harum. in Prax. chym.* p. 134. *River. l. 7. Prax. cap. 1.* In specie etiam convenit in *asthmate sicco*, tam in, quàm *extra paroxysmum*, ubi radix mali est in *hypochondriis* vel *abdomine*, nisi forsitan metuenda pathemata hysterica obstiterint. Hinc secretum est *Freytagii* ad *asthma* & *Empyema* in *auror. Medic.* cur. 20. & est vinum *Emeticum Heurnii* ex *Elleboro albo*, quod prostat in *Schrodero, lib. 4. p. m. 239.* Fit ex *elleb. albo*, si *radic.*



si *radic.* illius crasse contus. ꝯß. maceretur in lib. j. *vini Hispanici*, exponaturque soli. Hujus semicochlear cum aliis laxantibus exhibitum, alvum sine vomitu movet; cochlearis verò unius mensura vomitum excitat. *Linctibus* aliquot guttæ additæ *empyematis* expectorationes copiosè movent: Hinc præstantissimum ad *asthmata* & *empyema* remedium dicit:

℞. passul. mundat. ꝯiv.

liquirit. ras. ꝯj.

mell. despum. ꝯiij.

sacch. cand. ꝯv.

vini Hispanici. ꝯvj.

bulliant, ut fiant instar conditi, cui tantum admisce *spir. sulphuris per camp.* ut gratum acquirat acorem: Hinc aliquot guttula illius *helleborati vini* instillentur. Dentur in ore masticandæ *passula*, vel quoties eas in os recepturus est, guttas ij. vel iij. *hujus vini* instilla.

II. Quoad *Purgantia*, hæc in *asthmate convulsivo* minus conveniunt. Quoad *asthmata humida* in nullo paroxysmo conducunt, imprimis *proprie sic dicta*: Siquidem hunc potius exasperant. Facit huc monitum *Scholtzii* in *consil. 92.* In *Asthmaticis*, dicit, diligenter cavendum, ne dentur *fortiora evacuantia*, à quibus commoveatur & agitetur materia, ipsæque fluxiones augeantur: Videmus enim homines, alioquin sanos, post purgationem multum exspuere, & emungere nares sapè, ob motam materiam: quantò magis hoc illis accidere possit, quibus spontè & quidem continuo fluxiones ad pectus moventur. Post sedatum *paroxysmum* verò ad præcavendum malum, & reliquias exhauriendas *pilule* quæcunque, quibus semper *gummi ammoniacum* est miscendum, conducunt v. g.

℞. mass. pilul. de hier. cum agaric. ʒj.

gummi ammon. in acer. squillit. solut. ʒß.

Extr. troch. gr. j. vel ij.

c. f. q. spir. anis. F. Pilulæ.

Nec negligendus in tali casu *Mecur. dulc.* cum *scamm. sulphurato* acuat.

III. *Vena sectio* per se in *Asthmate* nullum habet locum: per accidens verò ad circulatorium motum sanguinis promovendum subinde necessaria est, v. g. si vel ex primario sanguinis vitio, vel ex accidenti in paroxysmo sanguis stagnat circa pulmones, adeoque plus minus in suo circulo sistitur, ad *venæ sectionem* properandum, pro liberiori circuitu per pulmones sanguini conciliando.

IV. *Sudorifera* in *asthmate convulsivo*, tam in fine paroxysmi, quàm extra paroxysmum non negligenda sunt. In *Asthmate humido* etiam suum locum habent quodammodò, id quod confirmat *Scholtzius* supra enato loco, inquit: Multum prodest *sudor*, qui & fuligines & aquositates collectas discutit.



Provocari potest decocto Guajaci calidè assumto; Facit quoque ad expectorationem & pituita in pectore incisionem. Scio quosdam decocto ligni ulos pro potu quotidiano in vigore hujus morbi, & alios id saltem loco vini in principio paſtus aſſumſiſſe, & exinde eximiam opem ſenſiſſe.

V. *Opiata* multum conferunt, præſertim reſpectu paroxyſmi: Quando enim nimius ſpirituum impetus, & hinc inordinatæ pectoris motiones, item quorumcunque in corpore contentorum fluidorum nimius motus ad pectus urgent, optimè his omnibus *opiata* ritè adminiſtrata, præſertim *appropriatis* permiſta multum conferunt.

In *Aſthmate humido*, quantum materiæ peccantis motum & excretionem ſuſſaminant, ſuſpecta videntur, cum magis incræſſetur & quaſi inſpiſſetur materia peccans. Ad nimiam verò paroxyſmi ferociam mitigandam, qui à concitatori ſpirituum impetu per accidens quaſi exacerbat, optima ſuat. Tutiora autem ſunt in *aſthmate ſicco*, tam ante paroxyſmum, eundem præcavendo, quàm in paroxyſmo eundem minuendo. Conf. *Willis. in Pharm. rat. part. 1. p. 299. item part. 2. p. 247.* Talia ſunt *eſſentia opii, theriaca*, ac *Mithridatium, ſyr. diacod. Montani*, &c. Nempe in quovis paroxyſmo aſthmatis, tam humidi, quàm ſicci, *ſpirituum impetus*, & hinc concitator *ſanguinis ac lymphæ motus* ad partem probè attendendus, & ſi nimius, *opiat* nonnihil ſuſſaminandus. Docuit hoc Veteres experientia Præctica. Hinc *Fonſeca. l. 1. conſ. 85.* inquit: *Arculanus* in paroxyſmo Aſthmatico & difficultate reſpirandi ſuffocativa, damnat communem curationem, quæ fit *avertendo materiam*, quæ fluit; quia hic modus curandi agit magis illam: eſſe potius *inhibendam fluxionem* iis, quæ *incræſſant*, præſertim, ſi fuerit *tenuis*. Quare exhibet *ſyrupum de papav. diacodion*, & devenit ad *opiata*: quale eſt *Philonium Rom. ad 51.* quam etiam *Galenus* videtur laudare curationem *catarrhi ſuffocantis*. Deinde adhibet *cucurbitulas* ad vertebraſ dorsi & ſuper ſcapulam, hac ratione (inquit) omnes evaſerunt. Illi verò in quibus proceſſit *evacuantibus, divertentibus, & materiam agitantibus* perierunt, quæ certè verè proſuſ proferuntur, ut mihi etiam experientiâ compertum eſt. Quoad *Philon majus ſive Roman.* vid. *Zuvelſſ. Animad. in pharm. Aug. p. 61.*

VI. Si oriatur *aſthma ex ſcabie retropulſa*, opera inprimis danda eſt, ut eadem ipſa iterum effloreſcere queat. Pro quo ſcopo uſurpari poſſunt *eſſentia ſumariæ compoſ. extractum & eſſentia helenii, extractum theriacale, decoctum helenii & ſenic. & diaph. cum ſalibus fixis*. Niſi enim fomes ſcabiei denuò ſub cute deſigatur, omnis cura erit fruſtranea. In quem finem etiam *veſicatoria* femoribus & brachiis applicata optima ſunt. Quod ſi nullo modo poſſit produci *ſcabies*, imitandus eſt *Zacutus Luſit.* qui talem ægum cum alio ſcabioſo in eodem lecto collocat, ut ab hoc fermentum ſcabiei hauriat, & ita denuò ſcabies introducatur.

VII. Si



VII. Si *Dispnoea* oriatur à subito frigida potu vel admotione, præsertim post astum, imprimis conducunt, quæ sanguinem grumofum resolvere valent. In quo puncto succus bellidis: acetarium ex bellide jam supra laudavi. Conf. item Deodatus in Panth. hygiast. l. 3. c. 22.

VIII. Si sit *asthma* ex fumis metallicis, mercurialibus &c. nil in ejus cura perfitur cum aliis ad hunc affectum appropriatis remediis, nec expugnatur, nisi mineralibus & metallicis, hinc Mercurius dulcis, Mercurialia fixa, cinnab. 8 ii, 8 diaph. &c. saltem in usu sunt. Horst. l. 7. obs. 25.

Remedia igitur, quæ ad *asthmata humida*, eaque ex pulmonum aut stomachi vitio, ac viscida plus minus serosa materia aggravata, utpote quæ ordinariò ferè nomine *asthmatis* intelliguntur, conducunt, sunt incidentia, resolutiva, expectorationem promoventia &c. In specie *Nicotiana*, cujus syrupus, à vi vomitoria liberatus, nobilissimum est remedium in affectibus pectoris, exscreatione opus habentibus. Inprimis Epiph'an. Ferdinand. in sua hist. medic. mirab. hist. 48. & 32. hunc syrupum ceu divinum remedium commendat, ad mucum in *asthmate*, ad pus in *empyemate* evacuandum, sed necesse est, ut vis ejus emetica mediante diuturna digestionem infringatur. Propterea Ferdinandus ita præscribit:

℞. fol. tabaci ʒj. bulliant in  
aq. dulcis ℥ij ad consumpt. medietatis, addendo in fine  
malvæ  
brancæ ursinæ

violarum an. Mj. coletur & cum sapa misceatur & calidiusculum detur pluries. ▽ item de peto destillata est egregia, essentia peti cum spir. vini extracta & melle excepta, egregium est expectorans. Item syrupus de peto ex multiplici infusione paratus, atque sic magis à vi vomitoria liberatus est perquam utilis. Hinc oxymel de Peto Quercet. admodum proficuum est. Hinc etiam Poterio est basis oxymellis sui *asthmatici*, cent. 2. cur. 45. Alii

℞. vini malvat. vel Hispanici,  
Melicrati cocti an. ℥ viij.  
fol. tabaci sic. ʒß.  
rad. enulæ ʒiiij.

polypod. ʒij. ebulliant. F. potus valdè *asthmaticis* utilis.

Imò solus fumus *Nicotiana* per tubulum haustus paroxysmum cohibere observatur. Hinc Gumm. Ammon. est egregium incidens & expectorans in *asthmate*. Hinc est decantatissima Brunneri, quam habet in consil. 34. In paroxysmo eandem laudat.

℞. aq. hyssop. ʒiiij.  
vini Rhenan. ʒiß.  
gumm. ammon. ʒj. M.

ingrata



ingrata est, sed admodum in paroxysmo asthmatis humidi laudata. Facit huc spiritus Asthmaticus D. Michaelis ex part. ij. viridis aris, gum. Ammon. part. j. sulphuris  $\frac{3}{4}$  partis, v. g. aris viridis  $\frac{3}{4}$  j. gum. ammon.  $\frac{3}{4}$  j. sulphuris  $\frac{3}{4}$  j. M. destillentur per Retortam, separetur spiritus ab oleo, rectificetur per alembicum, cui imponatur nodulus croci. Spiritus hic potenter incidit, attenuat, resolvit. Dos. gr. 30. vel 40. aut diluatur cum spiritu hyssop. essentia helenii, & fiat mistura cochlearum usurpanda. Nam D. D. Michaelis solebat recipere sui Elixiris pectoralis  $\frac{3}{4}$  B. & huius spiritus compositi  $\frac{3}{4}$  j. M. & dos. gutt. 40. propinabat. Porro radix raphani, ari, zedoaria, zinziber, bryonia conveniunt. In specie aqua ex raphano recenti in taleolas inciso, & saccharo adperso, inter duas patinas expresso, potentissimum est expectorans & mucum resolvens. Radix ari acris pulverisata pro expectoratione etiam egregia est. Aqua sive spiritus radicis zedoariae multum confert ad liberandum pectus a saburra, & liberiores spiritum procurandum. Bryonia radix, prater vim laxativam, specialem habet usum contra asthmata, dissolvit quicquid grumosum & coagulatum est in corpore, & pectus liberat. Conf. in specie Harimann. in sua praxi chymiatr. p. 95. His addatur Helenium optimum anti-asthmaticum, quocunque modo usurpetur, imprimis pulverisatum, & cum melle in Electuarii formam redactum, in asthmate stomachali multum confert. Hisce addatur Marrubium, Hyssopus, Calamintha, Rosmarinus tantoperè à Borello laudatus, cent. 4. obs. 46. Crocus item, uti & spermaceti, quod in paroxysmo à  $\frac{3}{4}$  B. ad  $\frac{3}{4}$  j. in vehiculo cerevisiae calida propinatum, mirabile est in eodem suffraginando. vid. Timaeus in Epist. p. 112. & 116. item in Casibus p. 97. Mirabilis huius est effectus in paroxysmo asthmatico, etiam atrocissimo, utut nondum adeò exactè de operandi modo constet. Notæ sunt aliæ aquæ pectorales & asthmatica spirituose, quas inter frequentior est aqua asthmatica Rudolphi. Veteres oxymel, acetum squillitic. in frequenti habuerunt usum. Hinc & Riverius cent. 3. obs. 8. item obs. 21. in paroxysmo asthmatico multum laudat.

$\mathcal{L}$ . aq. cinam.  $\frac{3}{4}$  j.

oxym. squillitic.  $\frac{3}{4}$  j. M.

propinetur cochlearum, præsertim senibus.

Ac fanè Oxymella talia præstant ferè syrupis de hyssopo, de helenio, de Erysmo Lobeli, de Marrubio &c. D. Schönfelder Hist. & curat. 44. p. 174. Vidi & præsens fui non infimæ notæ mulieri, paroxysmo asthmatico conflictatæ, de repente suasi, ut sumeret aceti ruta, quod statim supra januam cubiculi in promptu erat, cochlearia ij. & ita quasi miraculo quodam paroxysmus sedatus est. Hisce addatur & spiritus sulphuris per camp. qui in paroxysmo egregius est. Sicut aliàs extra paroxysmum crebrior florum sulphuris usus pulmonibus optimè confert. In paroxysmo nempe

$\mathcal{L}$ . aq.



℞. aq. hyssop. ℥iij.  
 syr. de helen. ℥ij. vel iij.  
 spir. sulphuris, q. s. ad grat. acid. M.  
 capiatur crebrius cochl. j.

Quin etiam solus spiritus sulphuris cum aq. appropriata propinatus ad attenuandum, abstergendum, & tussim expuitione promovendam, à quibusdam exhibetur.

Vel ℞. aq. flor. rapar. ℥iij.  
 cinam. — os. ℥ß.  
 syr. de Nicotian. ℥j.  
 spir. sulphuris q. s. pro subtili sapore acidò. M. D.  
 S. Suff. Franc.

Vel: ℞. aq. hyssop.  
 fœnic.  
 flor. rapar. an. ℥j.  
 spir. zedoar. ℥vj.  
 sulphuris q. s. ad grat. saporem. M. D.

Quibus misturis etiam gumm. ammoniacum addi potest, nisi sapor molestus fuerit. Flor. sulphuris extra paroxysmum pro pulmonum conservatione, atque si læsi fuerint, restitutione usurpantur, nempe.

℞. flor. sulphuris  
 sacchari an. q. v. D.

aut etiam balsamus sulphuris, terebinth. & anisatus nobile est in asthmatibus humidis, præmissis præmittendis, remedium.

Ex his haud difficile erit, plures concinnare formas. v. g.

Vinum pectorale.

℞. rad. Ireos Flor. ℥j.  
 helen. ℥ij.  
 imperator sive  
 zedoar. ℥ß.  
 herb. marrub. Mij.  
 comar. hyssop.  
 rosinar. an. Mj.  
 sem. anis.  
 fœnicul. an. ℥vj.  
 passul. min. ℥ß.

incisa infundantur vino, vel coquantur cum aqua & melle pro mulsâ pectorali.  
 vel cum aqua, aceto, & melle pro oxymellite squillitico. Pertinet huc decoctum foelis in Prax. l. 3. sect. 1. c. 4. quo in Orthopnœa facilitatem respirationis sæpius restituit:

℞. zedoar. ℥ß.

Bb

gumm.



gumm. ammon. ℥ij.  
 flor. sulphuris ℥ij.  
 croci ℥j. contusa coquantur in  
 hydromellis ℥b. j. ad medias.  
 de quo saepius patienti propinetur cochl. j.  
 Vel ℞. Rad. fœnic.

afari.  
 Ireos Fl. an. ℥iij.  
 glyzyrrh. ℥ij.  
 coq. in aq. font. ad casum tertiæ partis  
 Colaturæ ℞. ℥viiij. in quibus dissolve  
 gumm. ammon. ℥j.  
 oxymell. squillitic. ℥ß.  
 Syr. de prass. ℥ij. M.

Nec inelegansest *mixtura Lindani.*

℞. rad. Ireos flor.  
 flor. violar.  
 rad. glyzyrrh.  
 tussilag. an. ℥j.  
 imperator. ℥ß.  
 helen. ℥ij.  
 sem. fœnic.  
 anif. an. ℥ß.

omnibus crassiusculè concisis affunde aceti acerrimi ℥b. j. macera & digere per  
 niduum, Colatur. adde sacch. ℥b. ij.  
 spiritus sulphuris rectif. ℥ij.  
 vini malvatici, ℥b. iß. M.

& serva diligenter. Dof. manè & vesperi cochl. ij.

*N.*

Observandum autem, ne nimis abutamur *saccharo* & *saccharatis*, specia-  
 tim in affectibus pectoris. *Saccharum* propter facilem effervescentiam & hinc  
 flatulentiam, multos exasperat morbos, quorum radices in primis viis; in-  
 primis febres, scorbutum, malum hypochondriacum deterius reddit. Pectoris  
 mala, utut iis familiarissimè *saccharata* præscribantur, in nimia tamen copia  
 potius aggravant, viscidiora reddendo excrementa, & putrilaginem & corru-  
 ptelam pulmonum magis intendendo. Conf. hic *Gawencier. Tr. de Tabæ An-*  
*gliaæ*, item pro scopo expectorandi:

℞. aq. hyssop. ℥iij.  
 menth. ℥j.  
 asthmat, Rudolph. ℥vj.

spir.

*Millepe*  
 Commu  
 ad asth  
 asthmat  
 per Har  
 Vim hab  
 que cont  
 commen  
 utendi v  
 pulveris  
 cum syr.  
 mus præ  
 infusione

*Alii*  
 fundunt  
 periment  
 sueti qui  
 livato  
 nem sag  
 five tali  
 loc. lib.



spir. gumm. ammon. cum virid. æris ℥i℥.  
 syr. Nicotian. ℥vj. M. capiatur coctileatim.  
 Vel:

℞. aq. flor. rapar.  
 asthmat. Rudolph. an. ℥i℥.  
 oxym. squillit. ℥j.  
 spir. gumm. ammon. cum virid. æris ℥j. M.  
 Vel

℞. oxymell. squillit.  
 syr. de marrubio.  
 helenio an. ℥j.  
 gumm. ammon. ℥j. ad ℥iij. M. D.

S. Luffesafft auf eilich mahl.

*Millepedes* denique unum ex præstantissimis specificis sunt contra *asthmata*. Communiter quidem ad *asthmata humida* laudantur, non ineptè tamen etiam ad *asthmata convulsiva* adhibentur à Will. so, adeo, ut fomiti quorumvis *asthmatum* eradicando videantur convenientissimi. *Lindanus* sanè in M. S. super *Hartmann.* in solo hoc animalculo curam perfectam *asthmatis* esse asserit. *Vim* habent *anodynam*, & potenter *diureticam penetrativam, abstersivam*; hincque contra *arthritis vagam*, item contra *ulcera & fistulas* interno usu sunt commendatissimi, sale volatili nitroso admodum penetrantiturgent. *Modus utendi* varius est. Quidam eos pulverisatos in substantia ad ℥j. propinant; alii pulverisatos cum melle miscent, addunt etiam modicum *gumm. ammoniac.* & cum syr. *Nicotian.* ac *hyssopi* faciunt *linctum*, sive potius *Electuarium* &c. Optimus præparandi modus est, si *aselli* linteo inclusi infundantur *vino*, quod *vinum infusionis millepedum* expressum & filtratum singulare est ad *asthma* remedium.

Vel: ℞. vini infus. millepedum ℥viij.  
 syr. de marrub. & hyssop. an. ℥ij.  
 Extr. helen. ℥ij.

croci ℥℥. M. D.

S. Luffesafft klein auf eilich mahl.

Alii in *Asthmate puerorum* *millepedes* *vino* cum *croco* & *cinnamomo* infundunt, & modico *saccharo* cando albo edulcorant, certissimo, ut dicant, experimento. Ac *vinum* tale *macerationis millepedum* in *dieta* loco *vini* consueti quidam adhibendum suadent. Tentandum etiam aliquando quid *Salivatio Mercurialis* in *asthmate humido* contumaciori præstitura sit. *Occasio* nem suggerit *Thiermair consil.* 51. p. 146. qui refert *asthma* per *pyalissimum* sive *salivationem* ex *pilulis* cum *Mercurio dulci* curatum: Sicuti idem citat, *loc. lib. 2. p. 55.* refert, quendam *asthmaticum* ex *pediluvio cerevisie calide*



illicò factum *arbitricum*, & ab asthma liberatum. Quod ipsum confirmat *pediluviorum* usum revulsorium in asthma, quem quidam commendant. Vid. *Höfer Hercul. Med.* p. 119.

Quoad *asthmata sicca convulsiva* sive *occulta*, medendi rationem jam supra habuimus. Quoad *materiam medicam* observandum est dictum *Helmontii*, quod nempe id, quod *epilepticum adultum* sanat, sanat etiam talem *asthmaticum*, unde *remedia antepileptica & antihysterica* tam *fixa*, quam in specie *volatilia* hinc sunt convenientissima, ut rectè observavit *Willis. in pharm. rat. pari.* 2. p. 246. quibus subinde de *laudano* aliquid addendum; quod in talibus malis convulsivis nulli cedit remedio. *Vesicatoria* quoque *scapulis* aut *brachiis* applicata subindè multum opis præstant, tam irritatione molestâ *spirituum influentium motum divertendo*, quam *feri acrioris*, præsertim *scorbutici*, talis asthmatis crebriorem *fontem derivando* aut *avertendo*. Conveniunt igitur *sal volatile*, *succin. C. C. sanguinis humani* ac horum *spiritus*, *castoreum*, atque ex hoc parata remedia. Medicamenta ex *asellis & lumbricis*, *cinnabarina* & similia, *sulphura metallica* &c. His remediis utiliter interd. interponitur, interdum præmittitur *vomitibus*, imprimis ubi malum hæret in abdomine, nisi *hysterica pathemata* obstaculo sint. Certè refert *Boyle. in quo. experiment. part.* 2. p. 92 & 377. Asthma in veteratum & verè desperatum per usum *laudani opiatum cum spiritu sanguinis humani* alleviatum. item p. 270. *asthma convulsivum* refert per *salia volatilia* curatum.

Ad *inspirationum viua* pertinet quoque, quando *inspiratio interrupta cum impetu & sono ingrato* peragitur, quæ respiratio ita facta dicitur

## SINGULTUS,

& fit à *subitanea Diaphragmatis* deorsum versùs *contractione*. Percipimus omnes, quod singultiendo cum impetu inspiremus, & quod tunc simul regio ventriculi antrosum moveatur, sicut aliàs fieri solet in ordinata inspiratione. Dum igitur diaphragma violenter deorsum versùs convellitur, ventriculum & abdomen antrosum propellit, & ita cum subitanea inspiratione singultum efficit. Aliàs *singultus* statuitur *affectus stomachi*, sed parum consideratè. Nam ipse *Galenus in comm. super S. 3. sect. 7.* apertè statuit talem *stomacho* esse *singultum*, qualem *nervis convulsionem*. In ò hinc inde Autores Practici apertè comparant *singultum convulsioni*, sed cujus partis? nempe illius, quæ respiratori primariò inservit. Et hæc pars imprimis est *Diaphragma*, quod violenter deorsum convulsus singultum infert. Primus, qui hanc sententiam defendit, est *Platerius*, à cujus parte etiam stat *Sylvius*. Conferatur idem defendens *Majovv. de respiratione pag. 292.* nec desunt argumenta, quæ hoc persuadent, quod *singultus* oriatur à *convulsione fibrarum diaphragmatis versùs inferiora*. Omni tempore voluntariò possumus singultire: hoc innuit, necessariò affici partem, quæ



quæ voluntatis nonnihil subiacet imperio; & quidem cum singultiamus inspirando, innuit affictilem musculum, qui pro voluntatis imperio respirationem seu actionem mistam potest nonnihil mutare. Tum nullus talis est musculus, in toto respirationis negotio, quam diaphragma. Pro huius enim alteratione varia, possumus etiam pro voluntatis imperio respirationem mutare, quæ non possunt applicari ventriculo. Ergo pars in *singultu* affecta est *diaphragma*.

2. In omni singultu percipitur motus vehemens abdominis circa regionem epigastricam extorsum versus, quod non potest concipi alio modo fieri, nisi quod *diaphragma* ex convexitate nimia aliquantisper planius reddatur, & abdominis contenta deorsum aut extorsum premat, quod cum fiat saltem sub *inspiratione*, patet *diaphragma* saltem in *singultu* esse affectum.

3. Nullus potest fieri *singultus* nisi *inspirando*.

4. Sæpius curatur *singultus* sola *inspiratione continuata*, & quam longissime *inhibita expiratione*. Jam si esset motus ventriculi expulsi in *singultu*, *inspiratione* potius aggravaretur malum, quam curaretur. Ratio, quia *diaphragma* inspirando comprimit stomachum, unde magis ad *singultum* irritat.

5. Notum est, joco interdum curari *singultum*, qui innuit aliquid voluntarii in *singultu* affici, id quod in *inspiratione* est *diaphragma*.

6. *Sternutatio* superveniens *singultui*, hunc solvit, teste *Hippocrate* sect. 6. §. 13. quia forti *sternutatione*, adeoque sub forti *expiratione* concussum *diaphragma* ex se dispellit, non minus quam ex stomachi orificio, quod istud antea irritabat.

7. Nimii animi motus curant *singultum*, idque ratione spirituum animalium, qui à fortiori objecto commoti, minus vacant *singultui*: nempe *singultum* per errorem notat *Valeriola* in observat. p. 123.

8. Absque ventriculo hepatis inflammatio dat *singultum*, quia hoc immediate contingens *Diaphragma*, istud stimulat, ut convellendo *singultui*: hinc

9. observatur etiam non rarò *singultus* in morbis convulsivis, v. g. in passionibus hysteriis &c. *Singultus* ergo fit à contractione convulsiva *diaphragmatis* *inspiratoria*.

*Causa* est omne id, quicquid ad violentam, reciprocam tamen sui contractionem *Diaphragma* cogere potest. Hoc ipsum sæpius hæret in ventriculo, & speciatim afficit superius ejus orificium, quò pertinent imprimis assumta. Sic enim solum panem, nimia quantitate comestum, *singultum* concitare notat *Ferdinandus*, conf. 43. Sic in febribus, post intemperatum *juleporum* refrigerantium potum, non rarò sequitur *singultus*, vini potu curandus, auctore *Schenck*. l. 3. observat. Alia itidem ventriculum intensius alterantia, in specie refrigerantia, *singultum* inferunt. Sic enim *Timæus* in casibus p. 115. refert, *singultum* gravem & contumacem ex potu aqua frigida & Di. Alius loco *Balsami sulphuris*, af-



sumens *ol. vitrioli* in gravē incidit *singultum*, autore *Barbette in sua praxi*. p. 136. Sed præter occasiones tales externas, & ex internis *singultus* supervenit *stomacho affecto*, sive per *essentiam* afficiatur, sive per *consensum*. Per *consensum* v. g. in *vulneribus capitis*, in *nephritide*, in *imminente ileo*, in *Hernia* graviore &c. Quibus sæpius, utit in fausto omine *singultus* superveniat. Per *essentiam* afficitur *stomachus*, dum ab acriori quodam plus minus viscido succo, intra rugas propè orificium, superius hærente, originem ducit, cujus expellendi nixum *singultus* insequitur: Ratio, quod ex *affecto orificio superiori* superveniat *singultus* sive *diaphragmatis convulsio*, est, quia *stomachi os* superius sensile transit, non per *circulum nervum diaphragmatis*, ut fert communis opinio, sed per hujus musculum posteriorem. Conf. nova & accurata *diaphragmatis anatome* *Casp. Bartholini*, cujus epitomen vid. in *Act. Med. Hafn.* vol. 4. p. 14. Unde si aliquid pertinacius vellicat *orificium ventriculi*, facilè simul vellicatur *Diaphragma*, cujus fibræ musculares nerveæ, unde sequitur *singultus*. Præterea plures aliæ causæ, sive in *diaphragmate*, sive in *pectore* hærentes, aptæ natæ sunt, ut inducant *singultum*, modò irritent *Diaphragma*. Sic de *hepate inflammato*, *singultum* inferente, quò etiam pertinent *conformationis vitia*, dum *singultum continuum* ex compressa *thoracis vertebra undecima* notat. *Rhodus centur. 2. observat. 61.* item *costarum ad ventriculum detruso trimensis singultus causa*, quarum repositio ejusdem curatio. vid. *Schenck. l. 3. obs.* Ex *arthritis* non amplius artus visitante *singultum desperatum* observavit *Kelschius Hecatoest. 2. p. 20.* *Purgationes effrenes* subinde *singultus* malo omine sequuntur, ut notat *Hippocrates sect. 7. §. 41.* Siquidem non rarum est, *convulsiones acriores* insequi *purgationes*. Tandem *febris* sæpè *continuis*, aut in statu periculoso, aut in quibus jam *convulsiones* imminet, supervenit, partim ex *psimè affecto stomacho*; partim ex *spasmis* jam imminetibus, ceu ultimo naturæ conatu. Rara, item diuturna *singultus* qui vult exempla, adeat *Marcell. Donat. lib. 4. histor. medic. mirab. c. 5.* *Schenck. l. 3. observat. Barthol. centur. 2. Hist. 4. & Act. Med. Hafn. p. 2. p. 62.* *Singultus* superveniens *purgationi*, *diarrhææ* aut *Dysenterie*, aut *hernia contumaciori*, aut *ileo* imminenti, admodum periculosus est; item superveniens *inflammationi hepatis* periculum innuit, autore *Hippocrate §. 58. sect. 5. & sect. 7. §. 17.* In quavis *febre continua ardente* superveniens in *statu* & perseverans *singultus* revera periculosus est; mortis esse prænuncium asserit *Platerus lib. 8. observat. p. 203.* Quod tamen non æquè universaliter verum est, contratio apparente in *Horstio l. 1. observat. 25.* *Singultus* sæpè *diuturnum malum* est, ægrotumque subindè per plures dies, menses, annos affligit, interdum *penitus incurabilis* observatur, in quo casu occultum

occultum  
nervos aff

tollatur,  
specie ed,

Ad

ac opiata  
nacem ac  
rius citat  
lenus si  
storeo,  
& vom

Loco lig  
si, ejus  
in Ind. c  
rianda cu  
instituer  
orificio  
gatio,  
cis gr. v  
ut Rhod  
data exc  
ubilang

Pertinet  
zedoari  
ad sunt  
aliquot  
singultu  
propriet



occultum quoddam *conformationis vitium* os ventriculi, aut diaphragma, aut nervos afficiens ferè subesse solet.

*Cura* dirigitur 1. in genere eò, ut *irritationis sensus diaphragmaticus* tollatur, & consequenter ejusdem *conjectura convulsiva* remittatur. Vel 2. in specie eò, ut *causa occasionalis* removeatur.

Ad *irritationem* igitur & *Spasmodum* listendum optimum est *Opium* ac *opiata*, quorum felicem usum omnes deprædicant, sic *singultum* pertinacem admodum *febri continue* supervenientem curavit *Horstius* loco superius citato per *laud. op. gr. iij. theriac. ʒß. & conserv. ros. ʒi. M.* Hinc *Galenus* similiter commendat *opiata* cum appropriatis mista, nempe cum *castoreo, zinzibere, caryophyllis* &c. Pertinet huc *bolus Times* contra *singultum & vomitum* &c.

℞. Theriac. Androm. ʒij.

Lign. aloes ver. ʒß.

ol. macis destill. gr. iij.

laud. opiat. gr. j. M. F. Bolus.

Loco *ligni aloes* alia appropriata possunt addi, in specie *Castoreum*, *semen anisi*, ejus *spiritus & oleum*, item *spiritus salis ammoniaci anisatus*, uti & *zinziber in Ind. conditum*. Interim quoad causarum varietatem specialis nonnihil varianda cura, nempe ubi suspicio est, malum hæere in stomacho, optimum est instituere *vomitum*, præsertim quando contumacior *singultus* ex *pituita vitrea* officio ventriculi impacta oriatur. Quod si per inferiora instituenda sit purgatio, conveniunt *pilula aloetica* cum *laudano* mistæ. Item usurpentur & dulcis gr. vj. cum *diagryd. gr. viij.* ad imitationem *Riverii cent. 3. observ. 42.* Sicut *Rhodius cent. 2. obs. 60.* *singultum* septem dierum cum *hiera cum oxymelle* data excretis ʒxij. *pituitæ* sanatum refert. Peracta purgatione, vel vomitorio, ubi languet stomachus, propinetur *mistura*,

℞. aq. menth. ʒjß.

spir. theriacal. ʒiij.

conf. alkerm. ʒj.

laud. opiat. gr. ij.

syr. de menth. ʒvj. M. usurpetur cochlearium.

Pertinet huc etiam *mistura* sæpius ad *singultum* experta *cydoniata cum extracto zedoariae & laudano in M. A. N. C. Ann. 6. p. 210.* Misturis talibus, ubi adsunt *flatus* simul, subinde *singultum* exasperantes, *spir. nitri* vel *simplicis* aliquot guttæ, vel potius *dulcificati q. l. à ʒß. ad ʒj.* addendæ. Sin fiat *singultus à crudo cibo aut vituata digestionē, aloetica, pilula rosac. Elixir. propriet. conducunt.*



Si singultus fiat ab humoribus acerbis, corrosivis, aruginosis, plus minus effervescentibus, convenit Ebur ustum, vel C.C. ust. quod à ʒj. in omni singultu ceu expertissimum commendat Joël in Prax. item lap. cancr. terra sigill. lapis percarum, carptionum, in specie pellicula interna stomachi gallina exiccata & sedata, & in aqua & syrupo portulacæ usurpata. Forestus aliàs decoctum in singultu crebrius expertum laudat, ex semin. anisi, anethi, carui, portulacæ & papav. albi in cerevisia paratum & propinatum.

Externè in tali singultu egregium est cataplasma Mynsichti ad singultum; vel hujus loco

℞. baccarum lauri

ros. rub. sylv.

menth. an. M. j. pulverisata subige cum fermento acerrimo,

quantitatis ovi, impone patinæ, infunde. ✕ fervens & calidissimè cum linteo impone. Si exiccet, denuò cum ✕to irroretur & applicetur. Item panis calidus linteo obvolutus ventriculo applicatus efficax est remedium; efficacius, si irroretur vino malvatico vel alio generoso, & ita applicetur. Alii fotum faciunt ex ✕to calido, acri, cum castoreo, pipere, sinapi, ac pane calido cum spongia ventriculo applicato. Pariter ol. destillat. anisi umbilico & ventriculo illitum egregium est. Si suspicio sit, subesse in singultu malignitatem; aut si oriatur in febre maligna, tunc aliis addantur aq. cordialis Herculi. Saxon. aqua cinamom. syrupus citri, extract. theriacal. aut fiat emulsio ad imitationem Riverii, cent. 4. obs. 78.

Singultum ex assumpto acriori, v.g. Soli, lenit mistura à Barbett. in Praxi præscripta, ad cujus imitationem

℞. aq. plantag.

endiv. an. ʒij.

Succi semperviv. maj. depurat. ʒj.

C. C. usti ʒj.

terra sigill. ʒß.

lap. cancr. ʒj.

laud. op. gr. ij. vel iij.

syr. portulac. ʒj. M.

Ubi Singultus est symptoma alterius affectus gravioris, v.g. inflammationis hepatis, morbo primario curato, sponte cessabit, nihilominus tamen simul illi ipsi appropriatis, quantum possibile, resistatur.

Notabilis denique adhuc est observatio Riverii prima morborum infrequentium de singultu obstinato, per bimestre ex nimia frigida haustu post calorem, per balneum aquæ dulcis, in quo planta nervina cocta fuerint, curato.



## DE INCUBO.

Ad affectus vitiate inspirationis pertinet etiam *Incubus* sive *Ephialtes*: Nil aliud enim est *Incubus*, quam impedita & difficilis respiratio, in specie sufflaminata inspiratio, dormientibus in primis ac dorso incumben- tibus superveniens, cum somnio ponderis precordia prementis, ac suffocationis immin- entis, cujus occasio- nis varia subinde de persona aut recerta superincumbente narrare vigil- es, quia talia delirant somniantes, solent *Ephialte* affecti.

Est affectus complicatus *Incubus*, quem ipsi ægri ritè explicare nequeunt: Symptomata tamen ferè tali ordine sequuntur. 1. Læditur inspiratio. Hanc in- sequitur 2. sensus aut motus, interdum etiam imminens plus minus suffocationis. 3. est depravata loquela, dum loqui nequeunt incubo affecti, sed gementes, que- ruli &c. fiunt, aut sonum inconditum & interdum etiam boarum gravem profe- runt: unde & vocati parum, aut nihil respondent, sed ferè immobiles jacent. 4. adest anxietas precordiorum. 5. Supervenit insomnium rei aut objecti alicujus nunc certi, nunc incerti, thoracem prementis, & quasi constringentis, quibus 6. accidunt maculae rubee, livide, cœrulescentes, artus in primis pingentes & ma- nè postmodum apparentes. 7. Expergefactis, dum omnia cætera evanescent symptomata, corporis tremor, & non rarò diaphragmatis vibratio celerrima & violenta superest, unà cum totius corporis lassitudine, als wann sie geprügelt wären.

Quoad *Causam* & fiendi modum incubi, quæ vulgò proferunt, nota sunt, inculant nempe obstructionem meatuum cerebri ac principii spinalis medullæ, à vaporibus crassis ex abdomine eò exhalantibus: unde impedito spirituum ani- malium influxu ista symptomata superveniant, ob id ad affectus capitis ordina- riò referri solet. Vid. Sennert. lib. 1. Pr. part. 2. cap. 29. ubi de Incubo. Hic tamen int. Paralipomenis p. 113. hanc sententiam mutavit, & incubum esse affe- ctum respirationis læsæ cum insomnio gravi asseruit. Nempe jam olim Fernelius & Platerus istam Veterum hypothesein rejecerunt, qui asseruerunt, incubum esse primariò affectum thoracis & respirationis læsæ; secundariò capitis: nempe cau- sam proximam statuerunt, humorem crassum, melancholicum sive pituitosum circa precordia hærentem, quo, quacunque ex causa, turgescente & commoto, diaphragma & pulmones comprimantur: exhalantibus verò vaporibus vox in- tercipiatur, iisque cerebrum petentibus vires animales conturbentur, ac insomni- tale oriatur. Cum quibus ferè coincidit Petr. Joan. Fabri sententia in Patholog. c. 7. Sed adscensus iste vaporum ex primis viis ad caput usque hodie vix ad- mittitur. Inter modernos imprimis Schneiderus eminet lib. de Catharrhis spe- cialissimo, capite de Catharro narium p. 246. ubi incubum ad convulsiones refert, in specie talem, in qua thoracis musculi hominis somnum capientis ita afficiun- tur, ut respiret inde laboriosius.



Res ut reddatur paulò evidentior, certè *causa Incubi* est omne id, quod liberum thoracis respiratorium motum impedire potest. Hocnamque primariò quoad respirationis negotium impedito, cætera symptomata mox superveniunt. *Impeditur thoracis*, ac speciatim *reciprocus diaphragmatis motus*, vel *vizio obiecti* cujuscunque *externi* quasi, vel *vizio nervorum* motui muscutorum thoracis inservientium. Et ex hoc fundamento imprimis observanda *differentia incubi*, quod aliis sit *accidentalis* & quasi *levior*, aliis sit *habitualis* aut *gravior*, & qui firmiores egerit radices.

*Incubus accidentalis* fit, quando saltem *diaphragmatis liber motus* impeditur, propter *impedimenta* in primis viis ac abdomine motui ejus deorsum resistentia. Hæc inter imprimis est *stomachus*, qui infarctus materiâ viscidâ & mucilaginosâ, quæ ab acido fermentata in flatu abit; vel etiam si ventriculus copiosis alimentis infarciatur, vel etiam omne, quod stomachum replere & distendere potest. Propterea *Hildesheim* in *Spicileg. de affect. cap. spicileg. 4. p. 434.* inquit: Qui scire cupit, quid sit Incubus, is antefomnum comedat *castaneas*, & superbibat *vinum faculentum*. Unde etiam *dorso incumbens*, & quibus à dictis causis *diaphragma* magis sursum repelli, motus è contra inferiora versus impediri potest, incubus frequentior est. Ob id rarius afficiuntur incubo, qui laudabili utuntur diæta, sæpius verò *temulentia* aut *crapula deditis* ingruit. Ob id *pueris ex ad Ætæa* sive nimia ingurgitatione alim. entorum *familiaris est incubus*.

Cæterum utut ab his occasionibus possit excitari *incubus levior*, nihilo minus tamen in *vero incubo*, adeoque in *malo habituali*, ad *nervos* imprimis est respiciendum, qui respirationi inservientes, malè suo munere funguntur, adeoque ad *nervos paris octavi*, unde & *intercostales* progrediuntur, & qui ex cerebelli primas radices habent, hæc imprimis respiciendū, ut rectè asserit *Willis* in *Anim. brutorum part. 2. c. 6.* & notabili observatione fundamentum habitualis incubi in parte capitis postica circa cerebellum confirmat *Louverus Tract. de Corde p. 157.* Adeò, ut respectu causæ revera *nervorum affectus* sit *incubus habitualis*. Sed dubium est, an ad *affectus paralyticos*; an verò ad *affectus convulsivos* referendus sit? id est, an ex *denegato plus minus spirituum animalium influxu*, propter impedimentum quasi obstructionis; an verò ex *impetuoso nimis spirituum per dictos nervos propter iritationem quandam influxu*, & hinc *muscutorum spasmo* malum oriatur. Prius, suo modo *Veteres* asseruerunt, quibus etiam mutatis mutandis *Willis* cit. loc. item *Louverus* ad stipulantur. *Schneiderus* è contra cit. loc. ad *convulsivos morbos* refert, & ob id Arabibus *incubus* pro *parva Epilepsia* habitus fuit, quo nomine etiam vocatur à *Castro*, *Tr. de Epileps. cap. ult.* Ab aliis *epilepsia nocturna* dicitur, quasi similes ferè *convulsiones thoracis*, atque in paroxysmo Epileptico, in Incubo adsint; Sanè *Timæus* in casibus p. 42. refert *incubum*, cujus historia, prout describitur, ferè persuadet, ad *mala* quasi *paralytica* eundem esse referendum, nihilominus tamen in *Epilepsiam* tandem *lethalem* desit,



desiit. Econtra Rhodius cent. 1. obs. 54. refert exempla *incubi vigilantibus obvenientis*, qui in *apoplexiam* terminari observatus fuit. Econtra ex historia infra narranda patebit exemplum *incubi ad epilepticos morbos* referendi. Sicut *vermes* in abdomine stabulantes, in pueris *incubum* inferre solent, de quibus hostibus notum est, quod horrendas etiam *Epilepsias*, aut *affectus convulsivos* pueris inducant. Fortan utrumque, utut variis in casibus, nempe tam *paralyticum*, quam *convulsivum*, in *incubo* locum habet: Sicuti non rarum est, *paralysis cum spasms*, & contra, subinde permutari, ita quidem, ut *causa incubi*, *acidum* nempe peccans, lymphæ medio ad cerebellum delatum, nunc irritando nervos respiratori interviennes, ac cordis motui dicatos, *affectus spasmodicos*; nunc spirituum motum nonnihil sufflaminando, leviores *affectus paralyticos* inducat. Revera igitur *incubo* infestante laborant *musculi thoracis motui inservientes*, præsertim *diaphragma*, quorum reciproco impedito motu sequitur *respirationis difficultas*, & cum idem nervus ex intercostali etiam turculum pro motu laryngis subministrat, etiam affectus larynx strangulationis sensum, loquelæ impedimentum, aut saltem sonum inconditum subinde gemebundum infert. Impedito hinc sanguinis circulo plus minus per pulmones anxietas admodum molesta eos affligit, quod sit inprimis in somno; istis occasionib<sup>9</sup> varia somnia irritari possunt, concurrente simul *Anima rationali*, & ex percepta molestia, varia insomnia eudente: Nam quod in somno *anima rationalis* alterationes corporis percipiat, & somnia varia hinc fabricet, v.g. *pollutio nocturna* persuadet, nempe in quorum vesiculis seminalibus generatur turget, indeque genitalia nonnihil titillat, somnia & ærea cum genitali excretionem ordinariò superveniunt. [Pariliratione & *thoracis motus impeditus ad somnia & imaginationes* compressionis thoracis à se superimposita disponit.

*Somnium* tale *vagum* applicatur interdum *certo subiecto*: Unde *incubo affecti*, nunc à vetula ingrata se comprimi imaginantur, quam etiam videant & contrectent. vid. *Schenk obs. l. 1. de Incubo. Forest. l. 10. obs. 51.* qui putabat pectus suum à cane nigro oppressum fuisse, ut respirare non possit. Simile ferè exemplum habet *Zacut. Lust. lib. 1. Pr. admir. p. 41.* quod mediante *Jo* per superiora & inferiora curatum fuit. Hinc *Alfarius à Cruce* ex autoritate *Galen* dicit, quod *incubus* sit quasi quædam *in somno Epilepsia*, cum eadem, utut leviora perpetiantur in *incubo*, dum quiescunt, quæ patiuntur *Epilepsia* correpti, cum vigilant.

*Fundamentum Ephialtis* est in *nervis*, speciatim *intercostali*; cujus radix à *lympa acida*, subtili tamen afficitur, unde *respirationis symptomata*, hinc cætera consequentia. Adeoque *formaliter* ad *affectus nervinos partium respirationi inservientium*, nunc *paralyticos*, nunc *convulsivos*, referendus *incubus*. *Materialiter* sive *subjectivè* magis *subjecta constitutionis melancholica*, ut vocant, affligere solet. Nempe *hypochondriacis* inprimis familiare est *symptoma incubus*, & quidem jam *inclinantibus ad melancholiam hypochondriacam*, imò ex *hypochondriacis* talibus ad *scorbutum* declinantibus



derivandæ videntur *macule*, quæ eorum cutim pingunt. Hæ ipsæ enim ut *Scorbuticis* familiares sunt, ita etiam exinde dum declinante *Incubi* paroxysmo aliquis mador interdum prorumpit, illæ *maculæ* das *Aspnespen* originem habebunt. Rarum est, observatum fuisse *incubum epidemicè* Romæ sparsim grassantem, uti hoc ex *Cœlio Aureliano* refert *Sennertus lib. 1. Prax.* ubi de *Incubo*.

Quoad *Prognosin incubus accidentalis* parum refert. *Incubus* verò *habitualis* nunc *Epilepsiam*, nunc *Apoplexiam*, nunc *Melancholiam* portendere solet. Quòd si *incubo nocturno* jungatur *Vertigo diurna*, res ægri eò deterior, & quidam ex dictis affectibus certius imminet. Si *incubus*, dicit *Sennertus*, accidit partim *dormienti*, partim *vigilanti*, deterior est, quia *Epilepsia* propinquior, & rursus deterior, si post excretionem *sudor frigidus*, *tremor cordis*, *spasmus* aut *syncope* sequatur.

*Cura Ephialis*, si est *accidental*, consistit in eo, 1. ut *evacuetur* stomachus & primæ viæ. 2. Ordinetur benè *dieta*, & speciatim *lautior cœna* & *subitaneus post pastum decubitus* vitetur. 3. *Remedia volatilia oleosa* plus minus *antiepileptica* propinentur.

*Habitualis* verò siue *confirmatus incubus* ad modum *mali hypochondriaci* aliorumve *morborum Chronicorum* curari debet: nempe per *digestiva*, præsertim *Galia*, hinc per *evacuantia*, præsertim *vomitiva*, quibus subiungantur *volatilia* ac *antiepileptica*.

Pro his scopis assequendis excellunt inprimis *vomitiva*, item *evacuantia helleborina*. v. g.

℞. extract. helleb. nigr.

℞. dulc. an. gr. xv.

scamm. sulphurati gr. ij.

Extr. troch. alh. gr. j.

c. f. q. ol. destill. succini. F. Pilulæ.

Juxta fortiores hujusmodi *evacuationes*, etiam *purgationes blandæ*, aut primas vias per *epicrasin* evacuantes conducunt. Quòd facit *ὑπόκριον* Zacut. *Lusit. l. 7. Med. Princ. hist. c. 8.* cùm dicit, *medicamentum* hoc est, quod primas tenet in *vertigine* & *incubo*, præsertim ex sensu *ventriculi enatis*, *passula*, exemptis acinis, repleantur *aloes optima* granorum *ciceris parvi* magnitudine, quantitate ℞j. assumantur in aurora ante cibum, & post ad solita opera abeundum: vel *pilule aloephangina* num. v. vel vj. unâ vel alterâ horâ ante cibum assumantur: præservant non tantum *ebrietatem*, sed etiam assumpta ante cœnam *coctionem* juvant sine metu laxationis: quòd si laxare debeant, grano j. alterove *scammionii* acuari possunt. Quibusdam in usu est, dum cubitum eunt, ut *theriacam cum aq. pœonia* præservationis gratiâ ab *incubo* assumant. Item ℞. destill. rosis marin. succin. sal-  
via.



*via, lavendul. cinam. & similia cum saccharo in Eleosacchari formam redacta, & sub introitu lecti assumpta commendantur. Præ cæteris Pæonia mas, ejusque radix ac semina nigra, ceu specifica in cura incubi extolluntur, sive pulvis radice debito tempore collectæ; sive grana seminis num. xv. sive horum emulsio aliquandiu continuatim usurpentur. Hisce annumerandum etiam venit anisum, semen ejus aut ꝑ destillat. sub introitu lecti usurpatum, quod præterea etiam non contemnendum in somniis truculentis ac turbulentis, sicuti etiam pavores nocturnos puerorum curare solet.*

Observandum denique in *incubo habituali*, præmissis præmittendis seu *evacuantibus*, non negligendum esse, ut *sudoriferis volatilibus* universa sanguinis massa, & hinc universum corpus ventiletur.

Coronidis loco *historiam Incubi* magis ad epilepticos, quàm ad paralyticos affectus referendi subjungam. Puella 18. annorum *cachectica*, & cui nondum menses fluxerunt, indeque nonnihil *asthenatica* ex narrationibus crebrioribus conservæ sive famulæ primùm imaginatione *incubi* concipit, cum ab illa sæpius audivisset, se quavis nocte *incubo* corripitur, & istud mali ab alio concitari. Jam utur hæc ipsa dimissa fuerit, illa tamen mox ab hujus discessu *incubo* corripitur, nempe omni nocte præcisè horâ 2. incipit *quiritare*, hinc mox *sensu & motu* privata jacet, donec successivè ad se redeat, quo tempore *sudori* madet, & hinc inde in corpore *maculas magnas rubreas*, præsertim in femoris parte carnosa observat. Hæc quavis nocte eodem præcisè tempore redeunt. Ergo suspicabat *incubum* esse reverà *convulsivum*, in *subjecto hypochondriaco cachectico*. Dedit *Tartari emet. gr. iij.* qui parum operabatur, & hinc quovis manè de *pulvere cachectico* sive *croco* *ætis aperitivo* largam dosim, prohibendo *acida*. Successus fuit, ut post aliquot dies *incubus* tardius affligeret; horâ 3. hinc 4. tandem 5. matutinâ, tandem per biduum penitus deficeret, quo transacto horâ quintâ matutinâ malum redit, sed absque maculis. Propino *vomitivum liquidum*, cujus usu cum copiosa mucoſa. rejecisset, non rediit *incubus*. Suasi ut *Elix. Propr.* in posterum continueret, certus, modò primæ viæ à cruditatibus acido-pituitosis essent liberæ, & hinc menses comparerent, eam pancreaticè vixuram.

## CAPUT XIV.

De

## LÆSA EXPIRATIONE.

**D**ilatantur Pulmones propter thoracis per nothas costas ampliationem, quæ fit à musculis serratis posticis, superioribus & inferioribus, rhomboideis, levatoribus costarum *Stenonii* & cervicalibus descendens. *Diemerbroecii*, quibus & accedit Diaphragma, ex convexo per sui deorsum versùs contractionem, magis planum factum, spatium thoracis inferius amplians: comprimuntur

Cc 3

denuò



denuò à contractione thoracis, facta à musculis intercostalibus internis, sacro-lumbo & etiam musculis abdominis, quibus in supplementum spontanea diaphragmatis remissio accedit. Istud aërem intra pulmones admittit, sicque inspiramus, hoc emittit, sic expiramus.

*Aeris expirationis hæc læditur semper simul, & iisdem modis atque inspirationis læditur. In specie tamen læditur 1. Quando fit cum impetu in sternutatione. 2. Quando fit interruptum & cum sonitu in tuſſi. 3. Quando aër expirans non legitimam, sed vitiatam vocem profert.*

## STERNUTATIO

*nil aliud est, quàm motus convulsivus musculorum pectoris expirationi inservientium, in quo motu convulsivo, post aliquam inspirationis inchoatæ suspensionem subito & magnâ, sed mox iterum cessante vi, per nares & os aer una vice exploditur.*

*Pars proximè affecta sunt muscoli thoracis, ejusdem constrictioni dicati, in specie intercostales interni & abdominis. Percipimus nempe ipso contactu, semper cum impetu non solum constringi thoracem; sed & subito abdomen comprimi ab ejus musculis, & hinc à contentorum sursum motu diaphragma intra thoracem cogi; Unde & in partu difficili aut secundinarum retentione proficua est sternutatio, dum à musculorum abdominis subitanea constrictione exploduntur contenta, sicuti à contrario in herniis intestinalibus eadem nocet.*

*Causa occasionalis motus hujus convulsivi est in specie, quicquid valet irritare membranam narium internam superiorem, nulla enim fit sternutatio, nisi hæc ipsa membrana irritetur, & tali occasione simul pectus per consensum afficiatur. Fundamentum hujus consensus est quædam per plexus connexio furculorum quorundam nervorum paris tertii & quarti ad nares productorum cum pari nervorum vago & intercostali, thoracem imprimis moventium. Nervulis igitur istis ad nares derivatis occasione membranæ vellicatæ spasmus fortiori, adeoque secundum eorum ductum affectis, simili spasmò convelluntur & nervi thoracem moventes, & exinde diaphragma aliquandiu, propter inspirationem protractiorem deprimitur. Sicuti & cæteri muscoli inspirationi inservientes magis tenduntur, sed mox superveniente contrario spasmò nervorum & musculorum expirationi inservientium, sternutatio supervenit, adeò ut rectè Bartholinus sternutationem levem Epilepsiam nuncupet in Act. Med. Hafn. vol. 2. p. 49. Certè quo sensibilior est ista narium membrana superior, eò propter faciliorem irritationem promptius sternutamus. Hinc Itali ex crebriori pulveris sternutatorii abusu, & hinc membranæ crebrius irritatæ, sed à copiosiori lymphæ affluente minus sensibili factæ culpâ minus sternutare solent. Interim ultra præ-*  
viam



viam talem irritationem interdum & convulsivi quid lubesse, & etiam per consensum aliarum partium excitari posse sternutationem, videatur curiosa historia illustrata in *M. A. N. C. Ann. 3. observat 138. p. 247.* ubi referuntur sternutationes 300. in uno paroxysmo, eoque singulis 24. horis periodicè repetente.

Ea, quæ irritant narium membranam, sunt vel externa, vel interna. Externa sunt odores fortes, medicamenta inspirata, propter suam vellicationem & hanc insequentem affectum, sternutatoria dicta, v. g. *majorana, helleborus* &c. Quoad interna, est imprimis *lympa paulò acrior*, quæ aliàs naturaliter membranam humectat, quæ quando v. g. in *coryza* fit aliquantisper *salso acidior* sternutationes crebras provocat. Fit interdum ut coitus sternutationes stimulet: vid. *Barthol. cent. 5. histor. 99.* Quò facit, quod refert *Amat. Lusit. cent. 4. cur. 3. in scholio*, quod ii, qui à *§* abstinence, conspectâ pulchrâ muliere facillè sternutent.

Ex dictis hætenus patet, insons esse cerebrum in omni sternutatione, ut ut vulgò dicatur, cerebro concusso sternutationem fieri. Hinc quæ sternutationis motum ejiciuntur foras, primariò sunt ex *naribus & faucibus*, secundariò sunt ex *bronchiis pulmonum*. Ex *naribus & faucibus*, quando ibid. sitæ membranæ, à *Schneidero de Catharris* primitus descriptæ, continuò talem transudant lympham, ex contextu glanduloso post istas membranas excretam, quæ *lympa*, ubi copiosior, aut spissior fuerit, facillè ab erumpente aëre propellitur, & foras protruditur. Quòd si quid hæreat in *bronchiis asperæ arteriæ*, simul ejicitur: hinc in morbis pulmonum, *pleuritide & peripneumonia* sternutatio mala est, auctore *Hippocrate*. Ad pituitam verò in bronchiis pulmonum contentam potenter expellendam, quæ tussi rejici non poterat, sternutamentum conferre, docet *Galenus*. vid. *Riverius* ubi de sternutatione. Remedia etiam sternutatoria, quæ ex narium confinis humores serofos, plus minus viscidos, emulgent, nil ex capite educunt, sed tantùm ex membranis narium, præsertim pituitaria superiore, ac substratis glandulis hauriunt. Simili ratione, atque *apophlegmatismi* nil ex capite, sed immediatè ex glandulis palatinis sublinguaribus & maxillaribus; mediatè verò ex massa sanguinea emulgent ac hauriunt. Plura quoad sternutationis theoriam, qui cupit, adeat *Mari. Schoorckium Tr. de sternut.* Item *Schneiderum, Tr. de ossis cribri formi*, & in specie de *Catharro Narium*.

Quoad *Prognosin*, sternutatio, ut ut leve videatur malum, tamen interdum lethalis observatur, ut in puerpera hoc refertur ab *Hildano C. 4. obs. 12.* Sternutatio sine causa manifesta crebrò repetens mala. Aut n. epilepticos, aut convulsivos affert, aut apoplecticos & paralyticos infert. Ulteri⁹ sternutatio nociva est oculis. Sic n.



ex sternutatione nimia cecitatem observavit Hildanus, cent. 1. obs. 24. Item Rolfinck, in dissert. anatom. p. 1754. Potius ergo errhina in oculorum affectibus conveniunt, in quibus etiam sunt optima, minus sternutatoria. Conf. Aët. Med. Haffn. vol. 2. p. 243. 248. 251. 303. Sternutatio post usurpata sternutatoria non succedens, malum est signum, præsertim si id fiat in Paroxysmis Epilepticis vel apoplecticis: Totam enim vim animalem prostratam innuit.

**Cura sternutationis** consistit in eo, ut tollatur narium vellicatio, & hinc ortus impetuosus spirituum impetus ac musculorum spasmus. Removenda igitur 1. causa vellicans. 2. Obtundendus irritationis sensus. Hinc odor opii aliorumque Narcoticorum est optimus, vel oleum rosaceum opio imprægnatum interioribus naribus illigendum. Item ablutio sive elutio narium cum lacte tepido stimulationem sistit, præsertim ab occasione externa, inspirato scilicet aciori sternutatorio excitatam vid. Horst. lib. 5. obs. 51. item Forest. item Aët. Medic. Haffn. vol. 2. p. 166. item cremor lactis & mucilago, sem. cydoniorum vel psyllii cum aq. nymphææ extracta, naribus injecta conducit. Item semen feniculi & anisi aceto infusa naribus pro odoratu admoveantur. Plura de sternutatione vicia vid. in Amat. Lusit. cent. 4. cur. 4. Horst. in obs. l. c. & in specie M. A. N. C. supra allegata.

## DE VOCIS VITIIS.

Vitia vocum sunt, quando vel deficit vox, vel vitatur. Deficit vel vitio thoracis, vel vitio laryngis. Thoracis vitio deficit, quando non expiratur, ut fit in Apoplexia graviore, aut convulsione thoracis tali, ubi nulla respiratio contingit, ut hysterici subinde evenit. Vitio laryngis deficit vox, propter ejus rimulam, vel propter musculorum ac nervorum moventium causam. Rimula adest vitium, quando à tumoribus vicinis impeditur plus minus ejusdem apertio. Item quando epiglottis facta est ossæa, vel quando ab assumptis adstringentibus angustatur penitus & constringitur rimula laryngis, de quo vid. Barbett. in Anatom. Pract. l. 1. c. 14. ubi de Cartilaginibus. Vox deficiens musculorum & nervorum vitio in specie dicitur Aponia, quæ nil aliud est, quàm obmutescencia ex vitio laryngis: Sin vitio lingua fiat, dicitur loquela amissa, & linguæ tunc motus deficit, aut alia ejus vitia suis signis se exhibent, quæ in Aponia secus se habent, in qua nullum linguæ vitium, præsertim quoad motum observari solet. Aponia dicitur aliàs Anaphria, quæ Hippocrati sunt distincta, à modernis verò confunduntur. Aponi enim Hippocrati idem ac Apoplectici, cum Aponias nomine intelligat illos, qui ne motum quidem ullum præreticum sive voluntarium retinent: Anaphrios verò eos, quibus vitio laryngis vox deficit. vid. Gorraus in definit. Medic. p. 57. & p. 51. Aponia ista prout communiter accipitur, fit ex vitio nervorum & musculorum nunc paralytico nunc spasmatico. Quoad vitium paralyticum apho-



aphonia fit frequentissimè à *paralysi musculorum laryngis*; siue hæc vitio proprio; siue vitio *nervorum recurrentium*, ad eos distributorum accidat. Nam in canibus dissectis, vellicatis illis nervis aphonia in promptu est. Sic videmus non rarè aphonos fieri, qui magna *raucedine* laborant. Id quod fit probabiliter à *nimia humiditate* & consequenter *resolutione musculorum laryngis*, ut flaccidi fiant, & impotentes ad motum. Manifestum hujus rei exemplum est, quod refert *Tulpius* l. 1 c. 40. p. 78. Hinc etiam *tardior loquela* ob abundans *phlegma*, qui anno 12. demum loqui cæpit teste *Amat.* *Lusit. cent. 6 cur. 5.* Pertinet huc etiam *crapula*, subinde *aphoniam* inferens *paralyticam*. vid. *Höchstetter. Decad. 3. cas. 9.* Quò etiam facit *aphonia ex casu ab alto*, & inde contracto vitio *nervorum paralytico*. *Poterius cent. 2. c. 11.* & jam olim notata observatio *Galeni*, quæ vid. in *Senn. l. 2. prax. p. 354.* Sic ex terrore *nervorum vitio* oborta *aphona* pro *apoplectica* restituta. Vid. *Act. Medic. Hafn. vol. 1. obs. 101. p. 193.* Curiosa etiam est *aphonia paralytica*, ex *globulo plumbeo* per vomitum moto, indeque recurrentes nervos reprimente. De quo vid. *Deodatus in valetud. p. 97.* Ut taceam, *nervos recurrentes*, quovis infortunio *abscissos* vel *resectos*. Conf. *Sennert. lib. 2. prax. part. 3. c. 4. p. 355.* Observavi etiam *aphoniam* in virgine, quæ cubans noctu in hypocausto, ac suaviter dormiens, ob *extinctam lampadem ex oleo constructam*, & hujus fumo successivè inspirato, altero manè surgens, cætera sanissima, *aphona* erat. Videbatur subesse vitium quasi *paralyticum laryngis* ejusque *musculorum*, ex isto fumo inspirato latorum. Curabatur per *electuarium ex scordio pulverisato cum melle* excepto, crebrius assumpto & deglutito. Atque hæc *aphonia* ad *constitutionem nervorum & musculorum paralyticam* pertinent, si in *paroxysmo apoplectico* accedant, & hoc cessante, etiam aliquandiu affligant, siue sine eo, aliis functionibus omnibus salvis, ægros subito prehendant.

Quoad alterum *aphoniae* fiendi modum, hunc ex *convulsione musculorum & nervorum laryngis* fieri insinuavi. Observatur tamen crebrò talis in graviore *paroxysmo hysterico*, in quo *aphonæ* jacent ægræ pariter ac *Epileptici*, *convulsionibus* sæpius *aphoniæ* superveniunt. Speciatim videatur hic *epileptica aphona* per *venæ sectionem* curata. *Höchstetter. Decad. 4. cas. 1.* & conf. *casus Parallelus*, nempe *cas. 2. & 4.* item *ex vermibus in ventriculo & intestinis* subindè *obmutescencia* observatur Teste *Foresto l. 21. obs. 28. Schol. & lib. 14. obs. 33. Schol.* Noti nempe *varii spasmatice affectus* sunt, occasione *vermium* obvenientes. Pertinere etiam huc videtur curiosa observatio in *Act. Medic. Hafn. vol. 1. obs. 86. p. 170.* Nam ex *constrictionis sensu* in loco affecto *spasmus nervi recurrentis* adfuisse probabiliter concludi potest. Forsan & huc pertinet *aphonia ista mirabilis M. A. N. C. Ann. 3. p. 193.* Iponte sua ex improvise affligens & iponte sua denuò cessans ac recidivans &c. Nempe vix *paralyticum*, sed potius *convulsivum* quid subesse videtur. Forsan etiam huc pertinet *aphonia* subor-



ta ex retenta Gonorrhœa virulenta, fomiculis in inguine apertis curata, Zacut. Lusitan. lib. 1. prax. admir. obs. 97. Nempe acre luis venenum facile nervos recurrentes vel musculos laryngis irritando, ex spasmo aphoniam inferre poterit. Quoad aphoniam in febribus interdum supervenientem res dubia, an paralyticum potius, an convulsivum vitium sit. Sanè quantum colligere valeo, ad convulsiva vitia potius referrem: Nam & quæ in Variolis non raro observantur aphoniam. Vid. Hild. cent. 6. observ. 14. ex convulsione potius esse videntur, cum convulsiva path. mata non raro in illis observentur; dum scilicet acre variolarum venenum nervos recurrentes irritando, ad spasmos illos cogit: sicut in usum, raucedinem ac his affinia, aspera arteria ac laryngis mala eadem inferunt. Sed præter paralyzin ac convulsionem, etiam subitanea spirituum perturbatio ad aphoniam disponere valet. Sicuti videmus, quosdam nimio terrore percussos planè quasi obmutescere. Pertinet huc mirabile exemplum à Quæstus ex viscæneris, in M. A. N. C. Ann. 2. p. 229. & Ann. 3. p. 348. Pæ qua longè curiosior est subitanea ista aphoniam cum perfecta in toto corpore àvari&noia, omnibus cæteris, tam vitalibus, quàm animalibus functionibus salvis in M. A. N. C. Ann. 3. p. 434. quæ omnia tamen beneficio venarum varinarum sectionis breviter evanuerunt.

Quoad Prognosin Apoplexia iuncta Aphoniam difficilior curatur, ac interdum diuturna esse solet. Quæ cum singulis sunt aphonie, pessimæ sunt, auctore Hippoc. Bulbi profluvio alvi maxime corripuntur, teste Hippocr. sect. 6. §. 32. & hoc ipso ferè sanantur. Aphoniam per se & solitaria, modò rite tractentur ægri, successivè curabiles sunt.

In Cura ad primarium morbum, cujus symptoma est Aphoniam, aut saltem ad ejus causam antecedentem respiciendum, ut his remotis, facilius prædicti symptomatis fiat curatio. Pro quo curando ad laryngem & ejus musculos ac nervos recurrentes imprimis respiciendum tam eorundem paralyzin, undecunque natam, quàm spasmus ex nimia irratione removendo, interne per volatilia aromatica & nervina, aliàs cephalica dicta, subinde sudorem simul provocando, & etiam peralysmum masticatorum promovendo. Imò in contumaciori malo præsertim paralytico diata sudorifera ex lignorum decoctis insti uenda venit. Hinc externe sacculi ex nervinis, aromaticis, spir. vini irroratis, exterius collo applicandi, vel spiritus apoplectici cum spiritu lumbricorum vel formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis adplicandi, aut olea destillata nervina, succin. lavend. ruta, juniperi cum theriaca permixta, aut cum balsamo Peruv. subacta, ibidem frequentius illinenda, aut etiam essentia castorei vel solitaria, vel istis sociata, sedulo admovenda. Pro quorum omnium meliori successu, ubi circumstantiæ aliæ permiserint, & venæ sectio sub lingua interdum institui potest.

VITIA



## VITIA VOCIS sive VOX DEPRAVATA.

*Vitia* vocis sunt varia, quando nempe *diversimodè & non naturali modo* sonat vox. Præsuppono nempe hanc constitutionem fistulæ pneumaticæ ejusque capitis laryngis seu vocem formantis, h. e. *vocales*, qui sunt sonus ex larynge simpliciter emissus, & oris certa amplitudine, majori vel minori, absque nova allisione variatus, sicut, dum partes oris, speciatim lingua, vocem varia allisione & inflexione modificant, *consonantes* fiunt, & consequenter propriè sic dicta *loquela*, sive *vox articulata* efformatur. Jam, uti notum est, quod per fistulam pneumaticam in longitudine & latitudine, humiditate & siccitate, aliisque qualitatibus & circumstantiis varius formetur sonus; nunc clarus, nunc stridulus, nunc raucus &c. ita simili ratione cum nostra fistula pneumatica sive aspera arteria comparatum est, similibus ex causis vocem variante, speciatim quando est sicca & arida, profert vocem claram, quam speciatim in febris vocant clangoriam: ubi verò est nimis humida, vox fit rauca & obscura. Qua

## DE RAUCEDINE

In primis agendum cum aliæ *vocis depravationes* vix sub medici curam veniant. *Vox rauca redditur, quando Aer expiratur per asperam arteriam & laryngem nimis humidam.* Præsuppono hinc, continuam in asperam arteriam transudare lympham, item, moderatè glutinosam, quæ eam humectat, ac partim ab aëre inspirato, vel inclementiori, vel variis permulto, defendat, partim ut, ubique eandem planam reddendo, voci formandæ aptiorem reddat, & transudat hæc ipsa ex glandulis juxta annulos laryngis sitis, de quibus præter Bartholin. in Ep. vid. Schraderus in obs. p. 199. quibus addatur membrana glandulosa interius cingens asperam arteriam, de qua Willis. pharm. rat. part. 2. p. 11. Quod si lymphæ hæc copiosius effundatur, & nimis humectet asperam arteriam, *raucedo* oritur.

Observandum autem est *differentia Raucedinis* vel *recentis*, vel *inveteratæ*. Illa à lymphæ simpliciter tenui, nunc miiori, nunc acriori, nimis saltem humectante; hæc à crassiori, mucoso, regimine aquoso obducente interius bronchum nascitur. *Causa remota* est irritatio laryngis, ejus occasione copiosior lymphæ contingit irritatio, sive fiat irritatio à causa externa sive interna. Quoad externam, est inclementia aeris hybernæ, inspiratio fumæ sulphuris accensæ, aliorumve acriorum, quæ ad *raucedinem* disponunt: quibus & suo modo diuturna loquela vel vociferatio intensior, aut cachinnus diuturnior & vehementior addipossunt: nempe quo plus loquimur, eò copiosior emulgetur saliva per vasa salivalia ratione motus linguae: parli ratione per motum laryngis & annulorum asperæ arteriæ copiosior lymphæ ex hujus glandulis provocatur. Internæ ad *raucedinem* disponit sive irritat laryngem lymphæ acrior, salisior aut acidior: quacunque occasione vel viatiata, vel ad asperam arteriam delata, quæ utilando



& irritando uberiores lymphæ effusionem concitat. Ac talis *raucedo* vulgò *Calharro* tribuitur, & propriè *Bronchus* dicitur, qui nullatenus à capite destil-  
lare putandus est, contra vulgatam opinionem, sed ex propriis laryngis & asperæ  
arteriæ glandulis effunditur, & frequentissimè à causis externis provocatur.  
Interdum tamen etiam & ex vitio externo oritur. Facit huc excoctio partium  
asperæ arteriæ internarum ex lymphâ simili acri, id quod in lue & ea obtinet, quæ  
sæpius gravem & diuturnam *raucedinem* infert. Scorbutici etiam ob acris le-  
rum faciliè *raucedunt*. Tussis crebrior, præsertim in qua acrior plus minus ma-  
teria rejicitur, irritando laryngem, & hinc copiosioris lymphæ instillationem pro-  
vocando, ad *raucedinem* disponit: hinc phthisica item empyematici non rarò *rau-  
cedere* solent. Omnes hæ cause moderate, aut quæ faciliè corrigibiles sunt, levem  
inferunt *raucedinem*. Sin verò majori impetu aut diutius affligant, ita ut vel  
copiosior lymphâ continuò effusa, tandem spissescat, & in mucum degeneret,  
vel asperæ arteriæ ad sui successivam excoctationem plus minus disposita, simul  
nutrimentum proprium, sub assimilatione alienatum, cum lymphâ transmittat,  
& undique branchiarum caninis affigat, talia inveteratam *raucedinem*, & quæ  
muci spissi oris expectoratione solvitur, inferre solent. Quin & imprimis in inve-  
terata tali *raucedine*, aut in diuturniori malo, ad pulmones vel maximè respi-  
ciendum erit, cum talis occultam vomitam tunc insequatur pulmonum, ut rectè  
hoc observatum fuit in *Act. Med. Hassn. vol. 2. p. 295.*

Quoad *Prognosin* bronchi & coryzæ in valdè senibus coctionem non  
admittunt Hippocr. sect. 2. §. 40. item, *Raucedo* per annum vel duos confirma-  
ta vix sanatur. *Raucedines*, quæ ob suppurationem sive tabem fiunt, ferè sub  
mortem futuram fieri solent.

Quoad *Curam* attendendum ante omnia, ut causa remota, & hinc pro-  
pinqua removeatur. Unde attendendum imprimis, an *raucedo* ab externa vel in-  
terna causa inducatur. Deinde an lymphâ humectans mitior, an verò acrior fue-  
rit, id quod juncta Tussis ostendit. Ac denique an sit recens vel inveterata; hoc  
est, an simpliciter à lymphâ tenui, sed copiosiore, an verò simul à muco crassiori  
oriatur: Id quod partim ex sensu majoris vel minoris nullationis, partim ex  
excretis per os, quæ sereatu vel tussi rejiciuntur, manifestum est. In recenti igitur  
malo si sit à causa externa, hæc remotâ, opiata ac lenientia, temperantia irritatio-  
nem & hinc lymphæ effusionem, sistendo eam curabunt. Si verò sit recens à  
causa interna, temperantia ac opiata, acrimoniam irritantem demulcentia, sudo-  
riferâ, quælibet corporis contenta, atque etiam lympham mundificantia, & or-  
dinarium motum ejus promoventia conveniunt, præmissis, si opus fuerit, purganti-  
bus talibus, quæ sub leni formâ evacuare solent, in specie Jalapp. Esula, Elate-  
rium &c. Inveterata verò curanda venit per incidentia & hinc expectorantia,  
pro



pro quo scopo interdum vomitus etiam necessarius est. Quod si altiores in corpore radices habeat malum, v. g. *luem*, *scorbutum*, *vomicam pulmonum* &c. ad hæc primaria cura dirigenda, simul tamen symptomati *raucedinis* succurrendum. *Temperantia* igitur item *opiata* & similia sunt præsertim *papaverina*. Unde *syrup. de papav.* *Diacod.* *Mont.* *essentia opii*, *theriaca* conveniunt. Præterea *dulcia temperata*, v. g. *syrupus de glycyrrh.* *syr. violarum*, *de jububis*, quem *Rulandus* & *Dodonæus* valdè commendant, v. g. in *raucedine recenti* & *lymphæ tenui acri*:

℞. Syr. de jubub.

liquirit.

violar. an. ʒss.

de papav. alb. ʒiij. M. capiatur subindè lambendo.

*Rapa earumque decoctum*, præsertim *secundum cum saccharo*, perquam egregium est *temperativum*, ac quælibet ex *rapis dulcibus*, siue *recentibus*, siue *siccis* parata remedia. *Passula* elegantes etiam sunt, in specie *minores*, unde *rob passular. decoctum passul. cum aniso* egregium est *remedium in Raucedine*. *Flores sulphuris* quoque, item *balsamus sulphuris in raucedine* conducunt. *Isti* quidem in *recenti*, temperando *lympham*, & præservando partes *spiritalis* ab *erosione* vel *excoriatione*. *Balsamus sulphuris* verò *anisatus*, vel *terebinthinatus*, vel ita simpliciter usurpatus, vel *cum saccharo* in *pulveris* formam *reductus*, *convenit inprimis in raucedine inveterata* etiam si ad aliquot annos duraverit, curat simul *excoriationem* aut *incipientem plus minus exulcerationem partium spiritalium*. *Sperma ceti* itidem à ʒss. ad ʒj. in *vehiculo iusculi calidi* assumtum hic *convenit*.

Quoad *incidentia* & *expectorantia in raucedine inveterata* inprimis *convenientia*, excellit hic *syrupus de Erysmo Lobelii*, aliàs *syrupus ad raucedinem* dictus, mediante quo *raucedinem desperatam* se curasse asserit *Lindanus*. Confer etiam *M. A. N. C. Ann. 3. p. 275.* Descriptio ejus ubique prostat. Vide in specie *Senn. 1. 2. prax. part. 3. c. 3. p. 360.* Nempe *basis* dicitur esse *Erysimon*, cujus *semen* & *planta* sapore acri penetrante ad instar *antiscorbuticorum* egregiè *incidit* & *dissolvit mucû* in *raucedine inveterata*. *Syrupi* hujus loco *conveniunt passula minores*, aut earundè *pulpa cum sem. Erysimi* contuso probè *subacta*, aut cum *erysmo recenti* decocta. Convenit etiam *Electuar. ex scordio, foliis salvie*: item *rad. Helenii pulverisat. cum melle* ad *consistentiam Electuarii* spissioris *subactis*, quod *dosi castaneæ* aliquoties in die assumptum *dissolvit* & *expectorationem promovet*. Nam *mel simplex squilliticum* aliàs hîc in usu esse solet. *Rad. art acris* inprimis commendatur ab *Horstio*, propinando nempe *pulverem rad. aronis* cum an. sacch. candi cum *syr. violar. vel jububis*, instar *eclegmaris* Vel



℞. aq. lyltop. ℥. β.

alimmar. Rupolph. ℥. j.

Syr. de Erysmo Lobel. ℥. iij.

S. Gasse wider die Heiserkeit.

*Brassica* denique sive *caulis*, & in specie *eius succus*, admodum ad *raucedinem diuturnam* laudatur, vel solus succus nonnihil inspissatus & cum melle mistus admodum ad *raucedinem* extollitur. In specie videndus est *Codronchius de virtutibus & respirationis*, qui in primis duo habet remedia, quæ instar omnium commendat, & quæ etiam *D. Michael*, tanquam probata sæpius commendavit.

Primum est *decoctum* sequens:

℞. herd. opt. non excortic.

passul. minor. enuclear. an. ℥. j.

rad. liquirit. mundat. & concis. ℥. ij.

caric. pingv. N. 6.

herb. capilli. ℞.

hyslop. an. M. β.

sem. brassic. ℥. ij.

pinear. recent. ℥. β. F. omnium decoctio in *aqua fontana*.

Colatura servetur usui. De hoc ipso capiatur ad ℥. vj. ante somnum, & totidem in diluculo, vel etiam inter diu noctuque paulatim sorbendo. In primis in illa quæ fit ex *vociferatione*, v. g. in Concionatoribus & acclamatione, ita ut congeratur quasi *tensa & phlegmatosa dispositio*, hujus usu vox ferè amissa una nocte restituta fuit. Uno nomine *potio hæc* temperat mirè & demulcet acrimoniam lymphæ, ac irritationem asperæ arteriæ, adeoque in *raucedine recenti* imprimis conveniens est.

Posterius remedium est:

℞. Succ. brassicæ depur. ℥. ij.

sacch. penid. ℥. j.

oxymell. vel simpl. vel squillitic. q. s. F. *Electuarium molle* sive *lambile*. Loco sacchari penidiati potius *syrupus de Erysmo* recipiendus. Convenit in *pituita crassa & tenaci* incidenda, unde fortius *extergentia* adhibenda, in quibus casibus hanc *misturam* sæpius experientia conformavit. Uno nomine, in *raucedine inveterata* imprimis conducit.

Familiare *expirationis vitium* est

## T U S S I S.

opus quidem naturæ, h. e. *insensentia actionis*, excitata propter *materiam morificam*, i. e. *actio extraordinaria*, quæ non fit, nisi ad sit *materia naturam irritans*, adeoque est *bonum signum malæ causæ*. Est autem T U S S I S *motus convulsus expirationis thoracis*. Fit scilicet, dum muscoli thoracem cingentes & aërem sic expel-



lentes non blando nec naturali modo subident, sed potius violenter simul contrahuntur, contractione quidem momentanea, saepius tamen reiteratâ, ob id *ad motus convulsivos pectoris*, non autem veras convulsiones rectè refertur *Tussis*.

Adest aliàs complicata actio in tussi, ex strictura nempe aliquali laryngis ob irritationem, ex forti & vehementis aëris ex thorace elisione propter vehementem hujus contractionem. Utrumq; occurrit in tussi; exinde enim exsurgit ille sonitus, qui in tussi percipitur, si larynx non stringitur, uti vehementer experimus, non tussimus, sed si stringitur, sonitus ac vera tussis adest.

*Pars affecta sunt nervi ac muscoli, à spiritu impetu in motum convulsivum acti.* Afficiuntur igitur hi à *quavis irritatione*, quæ liberam respirationem impedit, in quocunque etiam sit *respirationis organo*, in *pulmonibus, faucibus, diaphragmate, ventriculo, epate inflammata* &c. Frequentissimè tamen occasione *irritationis asperæ arteriæ*, vel singuli occasione *prævia ex solis spasmis & motibus convulsivis*, tam ex primario affectu, quàm ex consensu cum aliis partibus nerveis, in tussi nempe *convulsiva*. Sic enim quæritur Anatomici, unde sit, quod auriculæ membrana interior vexata stylo, oriatur tussis inanis? ac rectè dicunt, fieri per *consensum* propter *irritationem*, & hinc aliqualem *spasmodicum plexum nervi auditorii*, cum *nervis intercostalibus* præsertim istis *ad asperam arteriam derivatis*.

Sic etiam observantur subinde *tusses convulsivæ præternaturales* sine vitio partium spiritalium per *simplicem nervorum spasmodicum*. Exemplum vid. in *Willis. Pathologia cerebri, de morbo convulsivo*, ubi de *Tussi convulsiva*. Quales tusses convulsivæ *hypochondriacis & hysteris* sunt frequentes, in genere iis, qui *vitii nervosi generis ex acido præternaturali* sunt obnoxii.

Sed misis his mere *convulsivis* illam in specie consideremus *tussim*, quæ *causam materiale* in respirationis organa afficientem agnoscit, præsertim eam, quæ ex *prævia irritatione asperæ arteriæ* originem ducit, adeoque tam laryngis quàm bronchiatum, cum appendicibus vesicalibus sive lobularibus, ut vocat *Willis. Pharm. rat. part. 2. p. 8.* affectionem sequitur, sive ut *Helmont.* loquitur, *tussis oritur sensu noxii, infestantis laryngem à sui principio usque ad pulmonum profunditatem*, sive mediâ sive imediâ eadem afficiatur. Ad quem posteriorem modum, & ventriculus ac lymphæ vellicatus, & *diaphragma* malè affectum spectant vel concurrunt. Quod facit historia *Bartholini* de tussi per annum inveterata in vacca, in qua salvis pulmonibus inventum fuit jaculum diaphragmati infixum. *cent. 6. hist. 57.* & epar inflammatum, quod siccam tussim comitem habet. &c. Adeoque pars adfecta à causa occasionali materiali est *aspera arteria* sensibilissima, cujus *causa occasionalis irritantis focus* sive fomes nunc in *pectore*, nunc in *stomacho* observatur. Jam verò considerandæ in primis *differentiæ*, dum *ratione modi Tussis* est vel *siccæ*, vel *humidæ*. *Siccæ* est, quoties magno labore nil excernitur, sed irritò tussien-

di co-



di conatu corpus universum fatigatur, quâ *tussi inani* non raro tam *capitis*, quàm *hypochondriorum* aliarumque partium *dolores contuentes*, plus minus *tacerantes*, oriuntur, imò quâ ipsa nunc *Hernia* excitantur, nunc in voluntarium *urinae aut alvi profluvium* subsequitur. Qualem *tussim* graviolem ac vehementiorem *tussim ferinam* secundum *Hippocratem* appellare solent. *Humida* verò est, quando concussione illius ope *humor, sanguis, pus, mucus*, sive *pituita* & similes liquores per os excernuntur, ex quocunque loco talia proveniant.

II. *Causa irritantis* ratione oritur *tussis* vel ab *interna* vel ab *externa causa*. Utrâque *tussim*, tam *siccâ*, quàm *humidâ*; & quidem pro foci *materiæ* occasionalis ratione vel *pectoralem*, vel *stomachalem* excitare possunt.

*Tussis pectoralis sicca* frequenter oritur ab *externis inspiratis*, quæ primò dant *tussim siccâ*, simpliciter ex *irritatione*, consequenter etiam *humidâ*, ex *maiore partis irritata læsione*. Hinc enim *aer inclementior præsertim hybernus*, *fumi acidi minerales* inspirati ordinariò nunc *asperam arteriam*, nunc *membranam pituitariam posteriorem*, propè *fauces sitam*, afficiendo & irritando *tussim* inferunt: quam aliquandiu *continuatam* & *pectoris angustia*, & quasi *compressus* ac *gravatus circa pulmones sensus* cum aliqua *respirationis difficultate* insequi solent, quæ omnia symptomata non *materia collectionem*, sed *irritationem bronchiarum & pulmonum* insequuntur. Ex horum enim aliqua *contractura* & *gravatus ille sensus*, & hinc *respirationis* aliquale *impedimentum* sequuntur, de quo supra, ubi de *Asthmate*. *Tussis* hæc aliquandiu *continua* & hæcenus *siccâ*, tandem evadit *humidâ*, ac *materia* primò *serosa*, tandem *mucosa*, expectoratio sequitur. Communis hinc fert fabula, destillare talem *materiam* ex capite in laryngem, quod falsissimum est, non enim saltem in larynge & bronchiis pulmonum, sed in ipso etiam pulmone successivè colligitur, & hinc evacuat. Nempe

I. *Uerior lympa* ex *irritatione* transudat in dicta loca, quæ pedetentim *condensatur* in *mucum* plus minus *crassum & viscidum*. Quod si *gravior ex irritatione* dictorum sit *læsio*, & *phlegmonodes* plus minus *dispositio*, vel etiam aliqua *excoriatio*, ipsum nutrimentum dictarum partium in debita *assimilatione* impeditum unâ transudat, & successivè alteratum, sub *muci pituitosi* formâ evacuat. Hinc ordinariò duo tempora in tali *tussi* distinguere solent: Quamdiu enim est *siccâ*, *tussim à catharro tenui* esse asserunt, *materiam* adhuc *crudam* evacuationi ineptam: Hinc *remedia coquentia* sive *incrassantia* dicta, *revera anodyna & temperantia* usurpant.

Deinde dum est *humidâ*, & *mucus* excerni incipit, *materiam coctam* asserunt: adeoque *incidentia* pro *facilitanda expectoratione* usurpant: Generari ista in ipsis partibus affectis, non verò ex capite eò transmitti, aut in tali *tussi à causa externa*, tanquam *saburram excrementitiâ* in pulmones deponi à natura ex *massa sanguinea* proprio exemplo didici.

Eram



Eram sanissimus, tempus erat æstatis suavissimum, ac parabam *cyssum* & *acidum*, sed dum rumpereetur e orta, inspirabam copiosè fumum ex *sulphure* & *antimonio*, ex quo acido fumo in vehementem *coryzam* & *tussim* per 4. septimanas incidebam, excernendo utrinque copiosa & mucilaginosà, quæ non destillabant ex capite, cum nullæ pateant viæ, nec in corpore aut massa sanguinea inerant, sed fiebant in summitate narium & aspera arteria, propter *acidum*, lædens has partes, unde primò copiosior lymphæ alluebat, postmodum superveniente dispositione *phlegmonode* & aliquali *excoriatione* dictarum partium ex degeneratione alimenti proprii copiosa mucilaginosà ejiciebam, donec irritatione cessante, indeque lymphæ copiosiore affluxu desinente, & sponte naturæ restitutaris partibus læsis, alimento non amplius degenerante, omnia illa symptomata cessarent. Hoc nempe est, quod suis custodibus tribuit *Helmont. Tr. Custos errans*, qui dictis partibus præsides, eas ab exteriorum inspiratorum injuriis defendunt, quibus læsis & hinc errantibus, privata illorum locorum digestio vitatur, & ros nutritivus in tale liquamen viscidum pervertitur. Quæ omnia facillè ex dictis conciliari possunt, per custodem dictarum partium spiritum insitum & hinc influentem intelligendo. Ex tali causa externa genitæ *tusses* nunc sunt propriæ, nunc verò *sparsæ* seu *epidemice*, prout quodcunque grave aeris vitium inspiratione plures læserit.

Oritur etiam non rarò *tussis pectoralis* ex vitio lymphæ acrioris & *salsacidioris*, & in specie *Tussis catarrhalis* dicitur, ut plurimum *febrim catharralem* junctam habens, sive prævia externa occasione, sive proprio naturæ motu lymphæ ita alterata ad laryngem, asperam arteriam ac pulmones feratur, & *tussim siccam*, successivè *humidam* inferat. Talem *tussim catharralem* ferè comitari solet *febris catharralis* plus minus intentâ, in qua ægri interdum satis commodè habent, à meridie & apparente vespere vagis horripilationibus vexantur, quas ingruente nocte insequitur *æstus totius corporis*, non tamen admodum intensus, sed plus minus moderatus, præsertim capitis, & hinc reliqui corporis, donec revertente aurora *febricula* denuò cesset. Hinc etiam non rarò accidit, ut etiam sub *æstu* illo *febrili arinum lancinationes* & *dolores vagi* unâ affligant, ex lymphæ acido sapore partes nerveas vellicantis oriundi. *Tussis* imprimis est *nocturna*, interdum parcius longè affligens.

*Tussis* talis *catharralis* originem ducit ex lymphæ vel *salsidioris*, vel *acidioris*, tam organa spiritalia irritante; quàm in massa sanguinea *febrim* talem plus minus *lentam* excitante. Non rarum quoque est, *tussim* talem *siccam nocturnam sine febre* affligere, pariter ex catharrali vitio lymphæ oriundam. Idem *Catarrhis* depluentibus à capite tribuunt authores eam; sed post *Helmont. Tr. Catarrhi deliramenta*, imprimis *Shneiderus de Catarrhis*,



his, caliginem excussit. Hic enim in eo est totus, ut dicat, *tusses* tales *cathar-*  
*ris* *tribuitas*, tam *siccas*, quàm quæ successivè superveniunt, *humidas* oriri ex ma-  
*teria* *transudante* ex *sanguine* per *membranas*, ceu colatoria. Verùm rectius  
*Steno* observavit, quod post tales tuniceas communiter *pituitarias* *Schneideri*, ac  
*alias* similes, per quas *serosa* *materia* fit *transcolatio*, *copiosa* sita sint *glandulae*,  
*quarum* *orificia* per *istas* *tunicas* hient, & ita *lympham* in *istas* *cavitates* effun-  
*dant*. Adeoque, dum dicit *Schneiderus*, in *coryza* *transudare* *mucum* per *tuni-*  
*cam* *pituitariam* *superiorem*, in *Broncho* verò *transudare* *membranam* *aspe-*  
*ram* *arteriam* *investientem*, potius cum *Stenone* dicendum, sub *his* *tunicis* *latitare*  
*glandulas*, *lympham* *sua* per *istas* *excernentes*.

*Lympha* talis *præternaturalis* *acrior*, *salsior*, *acidior*, aliòve simili plus mi-  
 nus corrosivo sapore imprægnata est, qualis in iis, qui ad *phthisin* inclinant, item  
 qui aliàs *adfectibus* *habitualibus* sunt obnoxii, item in *scorbuticis* observatur.  
 Talibus huiusmodi *tussis* in primis *nocturna* frequentior existit: Procedente tem-  
 pore ex dictis causis *tussis* fit *humida*, & dum excoriatur, ac procedente ulte-  
 rius malo exulceratur *aspera* *arteria* aut *pulmo*, *phthisis* *perfecta* *pulmonalis* eam  
 insequi solet, dum primò ex *nutrimento* *vitiato* *mucus*; ulterius ex *procedente*  
*corrosione* *materia* quasi *purulenta*, tandem in *perfecta* *exulceratione* pus genui-  
 num *tussiendo* *expectoratur*.

Radix mali, unde talis *lymphe* *vitiata* generatur, *tussim* talem *catharra-*  
 lem præsertim *nocturnam* inferens, est in *ventriculo*, errata nempe *digestionis* ejus  
 & hinc *deficiens* in *intestinis* *eiusdem* *perfectio*, quibus in locis *chylus* *viciosus*, *salsus*  
 aut *acido-salsus* *genitus* sui labem, mediante *lymphe* *variis* *partibus*, ac *spe-*  
 ciatim, quavis etiam occasione eò deriveretur, *pulmonibus* afflicat. Ratio, quare  
*tusses* tales *vespertino* & *nocturno* tempore magis exasperentur, adhuc intricata  
 est. Universale aliàs est, quod *morbi* à *seri* ac *lymphe* *vitiis* oriundi his tempo-  
 ribus magis exacerbari soleant. Ad quod ipsum non parum videtur ferre *prohi-*  
*bita* plus minus *transpiratio* *insensibilis*, velperi, ex remittente tempore diurno,  
 minus copiosè procedens.

Ad has *tusses* ex *lymphe* *vicio* genitas pertinent etiam *tusses*, quæ in princi-  
 pio *variolarum* & *morbilorum* solent affligere; item quæ *infantibus* ex male  
 curata *scabie*, aut ex *tinea* *capitis*, aut *achoribus* quovis modo *repulsis* nascitur.  
 Hæc tunc tractata curari possunt, ut non fiant *humida*; sin minus, *tussis* etiam *hu-*  
*mida* supervenit, ex supra dictis rationibus, imò & *phthisis* *variolis* successivè,  
 observatum fuit. Ad has *tusses* *pectorales* pertinent etiam *istæ* *humida*, quæ post  
*febres* *ardentes*, præsertim *minus* *acutæ* contingunt, dum, nullibi apparente cri-  
 si, natura materiam coctam in fine status, & sine declinatione morbi ex vasis san-  
 guineis in *pulmones* deponit, & ita *copiosa* *tussi* *humida* & *mucilaginosa* judi-  
 cat. Ad *tusses* *pectorales* pertinent & *istæ* in *Pleuritide*, quæ in principio sunt sic-

ca,



ca, procedente tempore ex lymphâ & sanguine mixtis, & mutua temperatura  
terrium mucosum constituentibus *humida*, quin & in *suppurata pleuride puru-*  
*lenta*, non secus ac in *pulmonum exculceratione*. Ne autem confundatur *tussis* //  
*pectoralis* cum *stomachali*, in specie consideretur, 1. *Locus irruationis* sive *irru-* //  
*lationis*, quæ ad tussim stimulat, quæ si in *larynge*, aut *aspera arteria*, aut *superio-*  
*ribus pectoris locis* percipitur, manifestum est, exinde excitari tussim. NB. Ju-  
beatur æger profundius respirare: Sic enim mox tussire incipiet, si vitium est in  
*pectore ac pulmonibus*; secus si in *stomacho*. 2. *Respiratio*, quæ quod magis affli-  
gitur, & quidem ita, ut *circa superiora pectoris loca* ejusdem impedimentum per-  
cipiatur, *tussim pectoralem* esse indicio est. 3. *Sonitus*, qui magis *superficialis*,  
item interdum quicumque *ex cavo thoracis* procedit, *tussim pectoralem* ostendit.  
Sanè tot sunt modi in sonitu tussis, quot sunt loca, in quibus materia latet, &  
quot sunt differentie materiæ excernendæ. 4. *Adjuncta* quoque *symptomata*  
simul consideranda sunt: Sanè ubi magis *noctu* affligit, aut ubi *febricula* simul  
adeft *nocturna*, *tussim pectoralem* ostendit.

Quoad *Tussim*, cujus *occasionalis fomes* in *Oesophago & Stomacho* latitat,  
& hinc mediata *asperam materiam* afficit, sive quatenus *diaphragma* ab affecto  
orificio ventriculi superiore vellicatur, sive quod simul *œsophagus vellicatus*,  
contiguam sibi *asperam arteriam* per consensum afficiat, ac in tussim proritet.

Paradoxon quidem videri posset, ex *ventriculo tussim* derivare velle; sequor  
tamen in eo *Lindanum*, qui in suis *Meletematibus*, ac præterea super *Hartmanni*  
*praxin Chymiatricam* expressis verbis dicit: Mihi compertum est pluribus ob-  
servationibus, plerumque *tussim* esse à ventriculo: *Ubi* autem materia latet, &  
*unde* procedat, ex sono dicere possum, qui variatur pro materiæ & loci condi-  
tionibus. Si *materia* est *tenuis*; *acutus* est *sonus*; si *salsa & tenuis*, & in *ventricu-*  
*lo deliteat*; *furibunda tussis* est, in qua vix aliquid egeritur, licet cum summo co-  
natu tussiant. Certum est quod dixi, *plerasque tusses fieri ex ventriculo*, cum  
materia vellicans est in rugis ejus & orificio superiori. Hanc *Lindani* sententiam  
illustri ac notabili exemplo confirmatam vide in *M. A. N. C. Ann. 6. obs. 6. p.*  
*16.* Quod etiam pertinet in *Schenck. observ. p. 237. Tussis nova* Luteriis grassans,  
*quinta dicta*, in qua etiam ventriculus affectus fuit. Ac sanè quotidiana illustrat  
observatio, quædam deglutita, etiam si non intrent *asperam arteriam*, tussim con-  
citare, quoties nempe bibimus aquam vitæ, aut aliud spirituosum acris, eo tem-  
pore, quo transit gulam, fiunt simul tusses siccæ, subinde satis vehementes.  
Hinc præter assumpta etiam ex causa interna frequentes sunt *tusses stomachales*  
tam *siccæ* quàm *humidæ*. *Siccæ* quidem speciatim *ferine à materia salsa, acri*,  
præsertim *tenui*, pertinacius orificium superius affligente.

Pertinent huc etiam *tusses illæ*, quæ in principio paroxysmorum *februm in-*  
*termittentium* una alterave hora paroxysmum antecedunt, quæ revera sunt ex



Stomacho, & sequuntur motum inchoatum fermenti febrilis tam in Stomacho, quam motum humorum in primis viis, à dicto fermento febrili agitatorum, ac tales ferè sunt *hypochondriaci*: Tales enim tusses sunt, quas quidam contrahunt, dum in lectis aëri liberiore se exponunt circa regionem stomachalem, exinde facile fit, ut pertinax *tussis stomachalis* superveniat.

+ *Humida* autem *tusses* ex *stomacho* oriuntur, interdum, sed rarius, ex prægresso errato diætæ, aut digestionis, undecunque facto, impedimento, & congesto hinc *mucosæ*, orificium vellicante, & mediate ac per consensum tussim provocante, cum materiæ viscidæ excretionem ex profundo, & ipsis ægris hoc fatentibus, stomachi regione elevata. Sed frequentior *tussis humida* fit per *devregowâduav*, quod sæpius fit ex *lesione membranae pituitariae posterioris*, sive ab aere externo inspirato malè afficiatur, qua occasione ferè *coryzam conjunctam* sequi solet, sive interdum *lymphæ acrioris*, per membranam hanc transcolatæ, eandem irritantis & plus minus exoriantis vitio accidat. Talibus enim occasionibus per hanc membranam copiosè *lymphæ spissior*, & junctim simul *nutrimentum ejusdem proximum* pederentim per œsophagum destillat, orificium ventriculi superius vellicat, & hinc primitus *tussim siccam*, hinc *humidam stomachalem* concitat. Sequitur hinc *tussis gravis* cum copiosa admodum *materia viscida* reiectione, imò non rarò superveniente vomitu, nunc *pituita*, nunc *alimentorum ingestorum*. Estque hæc *tussis* ista, quam communiter ægri dicunt esse *catarrhum ex capite depluentem*, cujus defluxum per fauces exactè sentiant.

Media, quibus hujusmodi *stomachalis tussis* cognoscitur, sunt 1. *Locus irritationis*, sive ubi primò sentiunt ægri tussendi stimulum. 2. Est *sonitus non adeò superficialis* ac in pectore, sed ferè quasi ex profundo loco erumpens. 3. *Vomitus* tussim hanc graviolem præsertim in inferioribus concitans. 4. Adjuncta, nempe *Anorexia*, *dysphagia*, *sensus stomachi gravationis* & similia. // Cum verò interdum sublit *catarrhale vitium*, ratione lymphæ per illam membranam pituitariam excretæ; etiam non rarum est, vespertino tempore magis exasperari hanc tussim, ut ut magis continuò affligere soleat.

Quoad *senam tussim*, variæ sunt hæc ipsæ; Nunc vitium est in *aspera arteria*, idque ferè contractum occasione *inspirati aeris*. Quod si citra tale erratum præcedens senes tussientes excernant *copiosa viscida*, ac simul conquerantur de dolore plus minus compressivo circa scrobiculum cordis, *tussis* est revera *stomachalis*, nata ac sustentata ex defectu digestionis præcipuè in senibus.

De *arthritis* *tussi* res etiam intricata videtur. Observavi aliquoties, *arthritis obnoxios*, si hæc aliquandiu inducias dederit, quod tales facili occasione *tussim*, eamque *humidam* incurrant, cum sensu molesto circa scrobiculum cordis, ac difficili plus minus inspiratione, quæ symptomata, superveniente podagra

grâ breviter  
cum faber

Obser  
ita ut in di  
habemus i  
ratione cel  
Epileptici  
vi, quod  
terix labo  
asthma c  
non sto  
stomach

cientium  
delumi  
brum af  
ac sang  
trahere  
etiam ad  
præserti  
præserti  
catarrh  
Hippoc  
partib  
clinatio  
fin min

Q  
primar  
Nam  
mater  
bus; at  
medic  
bus, in  
li  
vellic  
melior  
dentia  
tione d



grā breviter, & quasi sponte evanescent. Revera *stomachalis* hæc videtur *tussis*, cum *faber Podagra* revera in *stomacho* cudatur.

Observandum denique varias has *tussium* differentias subinde complicari, ita ut in dispositis *tussi humida* faciliè superveniat *tussis convulsiva*. Exemplum habemus in *infantibus*, qui interdum nimis tussiendo, pectore convulso, à respiratione cessant, quod vocant: *Sie bleiben aufsen*. Sic in *fœmina* gravida, aliàs Epilepticis pathematis obnoxia, gravem *tussim stomachalem* patiente observavi, quod aliquando per plures dies *tussi* huic *humida* propter visciditatem materię laboriose, validissima *convulsio pectoris* supervenerit, ceu genuinum *asthma convulsivum*, ita ut ægra subinde suffocanda videretur, quod adstantes non stolidè pro *catarrho suffocativo* habebant. Sic pariter *tussis humida*, tam *stomachalis*, quàm *pectoralis*, ferè complicari ac simul affligere possunt.

*Prognosis* facilis est. *Fundamenta* ejus ex varietate *causarum efficientium*, *subjectorum patientium*, & utriusque *adjunctarum circumstantiarum* delumi solent. Nempe *tussis* à *causa externa*, est absque periculo: si verò crebrius affligat in *subjecto*, quod debiles habet *pulmones*, aut quòd *lymphā*, sero ac *sanguine* *salsioribus* ac *acrioribus* est præditum, *phthisin pulmonalem* post se trahere potest, vel *hæmoptysin* inferre &c. *Tussis ferina* tam in *infantibus* quàm etiam adultis maribus *herniam*, prægnantibus *abortum* inferre potest. *Tussis* præsertim *capiti* & *oculis* nocet. *Tussis pectoralis* ex *vizio lymphæ catarrhalis*, præsertim *nocturna*, non contemnenda; prodromus enim *phthiseos*, quam ex *catarrhis* oriri putant, esse solet. *Tusses* *senum diuturnæ* non maturantur, dicit *Hippocr. sect. 3. aph. 40*. *Scorbuticus* frequentiores *tusses* sunt suspectæ, ne ex partibus affectis serolis *phthisin* contrahant. Interdum *febris continuus* in *declinatione tussis humida* supervenit, quæ si rectè procedat expectoratio, bona est, sin minus, *hæctica* periculum infert.

Quoad *Curam*: In hac ante omnia attendendum, an *Tussis* sit *morbus primarius*, an verò *secundarius*, qualis v. g. *phthisicorum*, *pleuriticorum* &c. Nam hæc, primario morbo sublata, vel sponte cessat, aut sedatur: Interim *motus materia* promoveatur, si hic deficiat, ut in *phthisicis*, sufficienter expectorantibus; aut in *beatur*, si sit nimis, ut in *tussi ferina* crebrius inani. Aliàs *materia medica* in *tussi* tribus ferè generalibus *Capitibus* absolvitur, nempe *incrassantibus*, *incidentibus* & *balsamico-vulnerariis*.

*Incrassantia* sunt opiata ac temperata, quæ irritationis sensum sistunt, ac re-  
vellicans mitigant, & ita materiam vellicantem ad consistentiam moderatam pro  
meliori expectoratione disponunt; unde ab effectu *incrassantia* dicuntur. *Incidentia* sunt, quæ in *tussi humida* *mucum glutinosorem* pro meliori expectoratione disponunt & attenuant, ac mobilisorem reddunt.



*Balsamico-vulneraria*, quæ noxiam *excoriationem bronchiorum* aut *pulmonum* aut *stomachi* emendant, ut ulteriores progressus maturè inhibeantur. His ita præmissis 1. *Tussis pectoralis sicca*, si fuerit *recens*, & à *causa interna* inducta, hac tantisper *remota* vel *correcta*, opiata eam sistunt.

*Præservant causas externas*, in specie *inclementioris aëris insultum*, *Balsamum ex oleis destillatis* v. g. *apoplecticum*, largiter naribus illitum: item *aërem mineralium fumis* inquinatum, ne corpori noceat, præservant panis comestus largiter butyro illitus; item *Theriaca* usurpata, præsertim si hinc expectetur sudor, mediante quo aliqualis noxa inducta promptè elicitur. Quod si ex his causis nata tussis fiat *humida*, eodem modo, ac aliæ tusses *humidæ*, curabitur. Quod si sit *tussis nocturna*, adeoque *catharralis*, curatur (nunc præmissis, nunc omissis vomitu, qui in quavis tussi est proficuum; in contumaciori verò præsertim stomachali, est necessarius) per *volatilia sudorifera*, opiatis mista, *lympham corrigentia*, blandè discutientia & vellicantis irritationem sistentia, vespere imprimis assumenda, v. g. *spir. salis armoniaci* præsertim *anisatus*, *Liquor C. C. succin.* cum *essentia opii* mistus, quæ præsertim conducunt, si *febris catharralis* juncta fuerit: si verò *citra febrim* fuerit *tussis sicca nocturna*, pro *lymphæ vitiis* corrigendis optimæ sunt *Pilule de styrac. Sylv. Prax. l. 1. cap. 20. p. 284.* Item *Pilule Schröderi N. 6. de styrace*, aut *Pilule ad tussim N. 7.* Item præter opiata ac *papaverina* temperata, *incrassantia dicta ex rapis, violis, jujubis, succino, benzoe, spermat. ceti, flor. sulphuris &c.* paratæ. item *ficus cum spiritu vini combusta*, *species diarræos usitatæ, pulveres pectorales varii &c.* v. g.

℞. aq. fœnic. ℥iij.

asthmat. ℥vj.

Diacod. Mont. ℥℞. M.

capiatur subinde cochleatim pro lubitū ægri. item:

℞. Syr. de jujub.

papav. simpl. an. ℥℞.

aq. papav. rhæad. ℥j. M. pro 2. dof. vespert. 1. bihorio ante cœnam. 2. sub introitu lecti assumenda.

Vel: ℞. spec. diatr. usit. ℥j.

flor. sulphuris ℥℞.

laud. opiat. gr. iij. M. F. pulv. pro 3. dof.

Vel: ℞. spec. diatr. usit. ℥℞.

flor. sulphur. ℥ij.

laud. op. gr. iv. vel v.

c. f. q. sacch. in aq. scabios. solut. F. Rotulæ,

S. *Rückstett*/ quæ crebrius sumendæ,

Vel: ℞. spir. salis armoniaci anisat. ℥℞. ad ij.

Essent.



Essent. opii ℥ss. M. D.

S. Brust spiritus, 40. vel 50. Tropfen auf einmahl/ bihorio ante cœnam, & si opus, ante introitum lecti.

℥. Tinct. sulphuris Willis. (Pharm. rat. p. 2. p. 113.) ℥ij.  
essent. opii ℥ss. M. D.

Dos. 40. vel 50 guttæ eodem modo usurpatæ. Vel:

℥. aq. scabios. ℥ij.  
papav. rhæad. ℥j.  
Tinctur. sulphur. ℥jss.  
diacod. ℥jss M. D. S. Hustensafft.

In tussâ verò sicca, cum febricula catharrali juncta

℥. aq. scabios. ℥ij.  
spir. sal. armoniac. anis. vel  
liquor. C. C. succin. ℥j. vel ℥jss.  
syr. papav. alb. ℥vj. vel ℥j M. D.

capiatur crebrò imminente paroxysmo & post mediam noctem, expectando blandum sudorem. Vel:

℥. Conserv. tussilag. ℥ss.  
laud. opiat. gr. ij. M. F. Bolus.

D. S. Abenducker auf einmahl. bihorio ante cœnam.

Possunt hic ad Tussim pectoralem siccam applicari omnia ea, quæ supra de recenti fuerunt monita.

## II. TVSSIS humida pectoralis.

Materia vel causa irritantis evacuatione, adeoque per incidentia, attenuantia atque expectorantia dicta, interpositis præsertim vomitorio vel moderato purgante, (nam tusses pectorales à purgantibus solent exasperari) deinde per pectoralia vulneraria, læsionem bronchiis & pulmonibus inductam tollentia, ulteriorem progressum, aut recidivam faciliorem præcaventia. Pro priori scopo gummata, in specie ammoniacum, spir. asthmaticus, syr. Nicotian. Oxynella, succus raphani, mel, & ex hoc & scordii & helenii pulvere paratum Electuarium. In genere omnia ea, quæ supra in asthma humido item raucedine inveterata fuerunt commendata. Pro posteriori scopo conveniunt potiones pectorales ex tussilag. hedera, terra sigillat. scabios. helenio, veronic, lign. jassaf. item sulphur, benzoës, bals. sulph. &c. v. g.

℥. aq. hyssop.  
tussilag. an. ℥ij.  
syr. de tussilag. ℥vj.  
nicotian. ℥ss.

Oxym.



oxym. squillitic. ℥j.  
 aq. asthmat. ℥ss. M. S. suffisafft.  
 ℞. aq. tœnic.  
 hyssop. an. ℥ij.  
 asthmat. ℥j.  
 oxym. squillitic. ℥j.  
 Syr. Nicotian. ℥vj. M. capiatur subinde cochleatim.

Vel quibus sapor non est molestus, *gummi ammoniaci*:

℞. aq. hyssopi ℥ij.  
 asthmat. ℥vj.  
 gummi. ammon. aceto solut. ℥j.  
 Syr. Nicotian. ℥vj. M. D.  
 S. Hust. und Brust. Safft.

Pro purgationis scopo, vomuoniaequidem nota sunt, quæ nunc per se, evacuationis scopo usurpantur, nunc supra dictis *potionibus pectoralibus* in minuta dosi adduntur, pro promovenda *expectoratione*. Pro scopo purgandi per *inferiora* convenit *massa pilul. de hiera cum agarico*, addito *gummi. ammon. v. g.*

℞. mass. pilul. de hiera cum agaric. gr. xv.  
 gummi. ammoniac. aceto sol. ℥ss.  
 Extr. troch. alh gr. j.

c. s. q. ol. destill. anis. F. *Pilule*.

Quin etiam his ipsis *Mercurius dulcis* commodè potest addi. *Opiata* ac similia in *tussi humida* ubi *expectoratione* opus, non conveniunt, ex retentionem enim impediunt, & hinc materiam evacuandam crassiores ac viscidiores reddunt. *In fine* tamen, ubi maximam partem evacuata est mucilago, & crebrior tussis inanis, sæpius repetens, antequam aliquid ejiciatur, superest, in talibus ad vestigia læsionis irritantis delenda, commodè cum aliis *papaverina* usurpari possunt, ut nempe his nimia irritatio ac crebrior frustranea tussis suspendatur, interea verò materia expectoranda præparetur, ut minori labore excernatur, v. g.

℞. aq. scabios. ℥ij.  
 asthmat. ℥vj.  
 flor. sulphur. ℥j. ad ℥ss.  
 Diacod. Mont. ℥j. M.

Pro posteriori loco *potiones vulneraria* cum *pectoraliibus* compositæ in usu sunt. v. g.

℞. lign. sassafr. ral. ℥j.  
 maceretur in aq. communi Mens. ij. adde  
 herb. heder. terrestris  
 scabios.

pulmon,

Ex his  
 hydrom  
 in die,  
 cœnam  
 gr. x. x

Nemp  
 medi  
 land. T

curatur  
 decoctio  
 sul. Ele  
 do præ



pulmonum an. M.ij.

sem. anis.

fœnic. an. ℥β.

liquirit. ras. ℥iij.

passul. min. conuass. ℥j.

coquantur invicem ad tertias. Colatura D. S.

Vel: ℥. herb. marrub. - hyssop.

tussil. - Pulmon. an. M.β.

veronic.

heder. terrestr. an. M. j.

flor. scabios.

helen. an. p. ij.

rad. Ireos Flor.

helen. an. ℥vj.

sem. carth. contus. ℥vj.

mechoacann. alb. ℥j.

passul. min. ℥j. incis. & contusa. D. S.

Brust. species.

Ex his in aqua decoctis potest fieri decoctum pectorale, vel possunt coqui cum hydromell. & per manicam Hippocratis aliquoties colari, & usurpari bis vel ter in die, pro urgentia affectus, manè haustum calidum, à meridie bihorio ante cœnam, & sub introitu lecti, vel de Balsam. sulphur. anis. in declinatione maligne, x. xij. semel vel bis quotidie sumantur.

Vel: ℥. rad. Ireos Flor. ℥ij.

fl. sulphuris ℥j.

ol. destillat. anis. ℥β.

fœnic. gt. xv.

sacch. opt. ℥iij. M. F. pulv. D. S.

Vel: ℥. pulp. passul. min. ℥β.

fl. sulphuris ℥β.

c. f. q. syr. papav. alb. F. Elect. de quo capiat æger pro lubitu.

Nempe jam à Celso contra tussim pectoralem à lymphâ acri commendatum remedium, ut fl. sulphuris ℥j. quovis manè in ovo sorbili accipiat. Conf. Ru-land. Theaur. p. 109.

### III. Tussis stomachalis sicca, ferina

curatur præmissio vomitorii parvi per opiatâ, parvi per temperantia, passulas, decoctum raparum, liquirit. ejus succum. fl. sulphuris, decoctum heleni cum passul. Elect. helen. cum melle, ac cætera supra in tussi sicca laudata. Sed hæc, modo præmissus fuerit vomitus, ut plurimum sponte evanescere solet, tantillis tem-

ff

pera-

pulmon,



peratis postea assumtis. Vel rad. *helenii* una cum *uvis Corinthiac.* coqui in vino dulci *Hispanic.* & post coctionem fortiter omnia exprimantur; tum *sacch. cand. rubr.* addatur pro lubitu, vel ad consistentiam aliqualem *Syrupi*, manè & vespere derur cochl. j. interdum etiam de *Diacodio* vel *essentia opii* cuilibet dosi aliquantulum addi potest.

#### IV. Tussis stomachalis humida

Curatur præmissio vomitu, aromaticis nonnihil temperatis stomachalibus reliquias attenuantibus, & stomachi tonum restaurantibus, v.g. *Elixir. menth. Elixir. propriet. sine acido*, *Tinctura Tartari acris* vel sola, vel cum spiritu salis armoniaci anis. *Diacod. Mont. Malvat. juniperin.* Ficus in spiritu vini macerata, hunc postmodum desuper deflagrando &c. Quin etiam, præmissis præmittendis, in tali tussi aliquando *liquorem terre fol. Tartari*; item *Tincturam vitrioli Martii Zuvelff.* pro debita rugarum ejus expansione proficua observavi.

Non omittenda est *sudoriferorum* utilitas, de quibus *Lotichius lib. 3. obs. 1. c. 1. p. 239.* Ad materiam pulmonibus impactam digerendam, attenuandam, & per sudores successivè evacuandam nihil utilius excogitari possit *decocto lign. Guajac.* quo, tanquam affectus hujus *Bezoardico*, tum alii Medici, tum ego ipse singulari successu usi sumus. Conf. de his *Willis. Pharm. rat. part. 2. p. 110. 117.* Certè in tussi *Chronica*, præsertim *sicca* pectus affligente, & à *lymphæ vizio* oriunda, adeoque *phibis* plus minus minitante, pro ejus correctela optima sunt hæc *decocta*; præsertim *sassafrata*; item *decocta sassafras* aut *china cum passulis*.

Cum fauces subinde sint læsæ, & ab acriori lymphæ plus minus excoriatæ, rubentes & quasi inflammatæ, ob id blandè temperantia, dulcia & similia conveniunt pederentim deglutienda, & quibus partim leniuntur fauces, partim etiam lubricantur, ut facilius sequatur expectoratio; id quod occasionem dedit terrori, quasi talia in asperam arteriam penetrarent, & ita expectorationem promoverent. Sunt autem *Syrupus de scabios. violarum, jujub. liquiritia*, imprimis *Diacod. Mont. cum baculo liquiritia* sæpius lambendo degustatæ.

Affectus ex hætenus dictis, nempe ex *Asthmate*, præsertim *sicca*, tussi & *raucedine complicatus*, diversimodè tamen ita ut nunc hoc, nunc illud symptomata magis observari videatur, isque vel subito irruens, vel ex improvise exasperatus, isque nunc continuus, nunc remittens, & vel periodicè vel incertis intervallis reperens, & quidem suffocationis periculum plus minus inferens, cum sterore, materia vel paucæ vel nullius rejectione.



## CATARRHUS SUFFOCATIVUS,

ein Stöckflus / vulgò dicitur, adeò, ut vulgus in genere quancumque respirationem subito difficiliorem redditam, & suffocationem plus minus minitantem, in specie si cum tussi conjuncta fuerit, nomine *catarrhi suffocativi* appellare soleat: es ist ein Stöckflus gefallen. Hinc fit, ut & *Asthmata occulta* interdum recurrentia, item *asthmata humorosa*, inprimis *vesperi* affligentia sub hunc censum veniant. item *tusses nocturna* gravius affligentes, inprimis cum excretionem copiosiori facta junctæ, huc à quibusdam trahantur. *Catarrhus* tunc dicitur, à præconcepta opinione, quasi subito, ex capite præsertim, fluat humor serotus plus minus pituitosus, qui bronchia & pulmones replens suffocationis periculum intendat: Sed paucis rem explicat *Lindanus super Hartmannum* dicendo: Maxima de nihilo nascitur historia, nil obscurius hac de *catarrho suffocativo* doctrina. Nam ipsa Anatome eam ostendit falsissimam, & quomodo potius in pulmonem, per rimam asperæ arteriæ, & epiglottidem obstantem transibit, quam per œsophagum? &c. Alii igitur verè cautiore per venas à capite deferri tales humores, hinc deponi in pulmones, replere hos & asperam arteriam, & suffocationem ita inferre. Sed ridiculas has de Catarrhis hypothesen non solum perstringit *Helmont. Tr. Catarrhi deliramenta*, sed in specie hanc de *Catarrho suffocativo* doctrinam exactè quoque rejicit *Vincentius Baronius Tr. de Pleuropneumonia*; & videri potest *Schneiderus de catarrhis l. 5. cap. 4. p. 276. & 296.* qui primus exactius paulò de *catarrho suffocativo* agere aggressus est. Ut supra ego monui, *complicatus affectus* est, qui vulgò *suffocativi catarrhi* nomine venit; Unde in vulgi judicio, præconceptis hypothesibus, per ignorantes Medicos confirmatis, præoccupati hîc non standum: Propterea *Triplicem catarrhi suffocativi putatum, asthmatis convulsivo* contradistincti, *differentiam* facio, prout in praxi observare eam mihi contrigit.

I. Ex pulmonibus affectis, & hostili acido inspirato vel intus genito, illis profundius se insinuante irritatis, hinc per proprias fibras fortius se stringentibus; unde *suffocationis* imminens *necessitas*, non prius cessans, quam lymphæ uberius irrigatione ablutum & abstersum fuerit irritans illud *præternaturale*, & ex eorum mutuo coalitu *concretum mucosum* factum, cujus expectoratione morbus solvitur. Remanet tamen subinde quasi vestigium in illis fibris, ita ut levi occasione renovatum, *spasmus* & *spirituum occlusionem* minentur. Mulier hoc *catarrho suffocativo* laborabat, principium mali erat, das viele Erchen braten / quarum sub afflatione & cum butyro irroratione & undique pinguedinis in carbones destillatione, & hinc fumorum elevatione



factum fuit, ut ipsa primò *tussim* aliqualem, sed *secam* & *profundam* sive ex imo pectoris, experta fuerit, quam aliquando ex improviso *arctior pectoris* & *fau- cium angustatio*, & post aliquot dies perfecta *orihopnaa* secuta fuit, in quo statu continuò ultra octiduum videbatur suffocanda, ita ut leni auræ commotione, aut januæ apertione mox suffocatio imminere videretur, donec successivè expectoratione & materiam glutinosam ac perquam viscidam ejicere, tali reje- ctione successivè liberius respirare, & sic tandem ad sanitatem redire cœpit. Mansit tamen vestigium in pulmonibus impressum, ita ut facilè à quavis exter- na causa angustiam pectoris sentiret.

Circa hujus affectûs *ætiologiam* observandum, (α) *causa remota* est *acidum viscidum*, ex *butyro* & *alaudarum* pinguedine incensis exhalans, cum aëre inspiratum, asperæ arteriæ cannis & hinc pulmonibus undique inhærens. (β) Hoc irritavit inimicâ suâ præsentîâ, idque tam acrimonia quàm adhæsione glutinosa, tanquam *fuligo camini*, undique in pulmonum ductibus adhærens ad bronchia & pulmones, unde primò *tussis* eaque *secca*, hinc ex irritatione illa *lym- pha uberior affluxus*, ab utrisque *gravior irritatio*, unde superveniens continua *fi- brarum nervearum* in pulmonibus *strictura* & *coarctatio convulsiva*. (γ) Dura- vit hoc tamdiu, donec tam *lymphæ*, quàm *nutrimenti proprii adfluxu fuligo* il- la absterfa, resoluta, & ex utrisque successivè *concretum novum*, ob moram & exactam miltionem sive subactionem, *spissum, candidum, glutinosum* genitum fuerit (δ.) Hujus medio *fuligo* sublata, *irritatio* sedata, *contractura pulmonum* hinc remissior reddita fuit, unde liberaliori paulò aëris accessu & recessu mate- ria ista sub paroxysmo genita, cum fuligine involuta, commota, protrusa, & sic bronchia sursum ejecta fuit. (ε) Mansit tamen *vestigium*, ex pulmonum *nutri- tione propria, seu privata*, plus minus *læsa*, adeoque *contracta* hinc *pulmonum debilitate* & *fibrarum* tali *constitutione*, quæ facilè in *spasmos* agi possit, unde vel leviori occasione externâ *pulmo* irritari, *fibræ* contrahi, & hinc affectus pristini memoria revocari solet.

Pertinere huc videtur *infantum quorundam* plus minus robustorum *catarrhus suffocativus*, cum *Epilepsia* motu junctus, dum v. g. simpliciter creberrimâ thoracis systole & diastole cum levi vel nulla tussi continuò suffocari videntur, idque ipsum etiam evenit subinde ita, ut tali *spasmatice affectione* pulmones con- stringi, & thorax coarctari ita videatur, ut & respiratio libera impediatur, & sanguinis per pulmones circulus impediatur: hinc *facies* eorum *rubicunda* esse solet, & præcedere talem affectum per aliquot dies vel *raucedo levis* vel *tussicu- la* &c. Confer de tali *infantum suffocatorio affectu Hildanum, cent. 3. obs. 10.* item *Schenck. in obs. p. 149.*

Ut itaque talem affectum in adultis *opiata* & *attemperantia*, vulgò *incras- santia* dicta optimè levant, etiam paroxysmos; ita & talibus infantibus thoraci-



ca, item *sperma ceti* &c. in *vehiculo calido* propinata observantur proficua: cum  
 e contra *asthmata humida*, item *tusses humorales*, præsertim ex *stomacho* in in-  
 fantibus non rari, imprimis per *Nicotianam*, item per *blanda emetica* curari de-  
 beant.

II. & III. *Differentia catarrhi suffocativi* revera est *Laryngis Catarrhus*  
 ad *Bronchum* pertinens: Nempe in quo *larynx* speciatim ratione *epiglottidis* affi-  
 citur, cujus irritatio & hanc insequens pertinacior strictura & clausura omne id  
 præstat quod dicitur *Catarrhus suffocativus*; siue in *larynge* hæreat malum, & sic  
 erit affectus simillimus *Broncho*: siue extra *Laryngis* & *Epiglottidi* incumbat,  
 eritque *Catarrhus*, qui pertinet ad *Catarrhum membranae pituitariae posterioris*  
*Schneideri*. Nempe notum est, si saltem aquæ vel cerevisiæ guttula, vel panis mi-  
 cula *laryngem* ingreditur, hanc admodum sensilem irritatam mox convelli, siue  
 pertinaciter ejus rimulam ab *epiglottide* occludi, nisi impetuosior *tussis* mox  
 insequens eam eliminet. Quò diutius autem ista irritatio sit, eò plus mucipi-  
 tuitosi postmodum excernitur, qui est productum quasi morbosum; Unde ex  
 quacunque causa, si similis fiat in faucibus irritatio, subito suffocatio immine-  
 bit. Causa, quæ eam irritationem infert, est respectu *laryngis* vel *interna*, vel  
*externa*. Illi ut plurimum est *affluxus seri* siue *lymphæ acrioris* ad *bronchum*:  
 estq; *raucedo subitanea*, hinc irritatur *larynx*, stringitur *epiglottis*, unde *suffoca-*  
*tionis metus subitaneus*. Periodicè hoc fit interdum, ut simile ferè exemplum  
 habet *Riverius cent. 3. obs. 15.* Hec nempe causa externa, est *lymphæ visci-*  
*dior, glutinosior & copiosior* cujuscunque saporis, ex membrana pituitaria po-  
 steriore ad fauces copiosius delata, & subito inviscans quasi *laryngem*, & *epi-*  
*glottidis liberum motum impediens*, unde jungitur *materia viscida sreatus*.  
 Affectus hic veliple subito ex *pregressa causa externa*, imprimis ab *aeris inclem-*  
*entioris facta alteratione*, vel ex *tussi diuturna & chronica* oritur, ut in ex-  
 emplo *Hildani cent. 6. obs. 8.* manifestum est. Subolfecit hoc *Platerus*, un-  
 de *Catarrhum suffocativum angustiam intra fauces ait*, & *Catarrhum non ad*  
*pulmones*, sed ad *fauces delabi animadvertit lib. 1. obs. p. 185.* Exempli loco sit  
 puer decem annorum, constitutionis ferè phlegmaticæ, facies naturaliter erat tu-  
 midior, dormiebat aperto ore & cum stertore, obnoxius subinde erat aliquali  
 tonsillarum tumori. Hic velex simplici aëris frigidi nudo capite susceptione,  
 velex refrigeratione extremorum, post corporis motum & exercitium proximè  
 insequente, aut certè alterà, in *Catarrhum suffocativum* dictum incidebat, ita  
 ut suffocandus omninò videretur, facies intumescibat, ex rubro cœrulescebat,  
 tussis crebra, sed inanis, & sub qua nil, præterquam tenuis & pauca *lymphæ*  
 evacuaretur. Interrogabatur, *wie ihm wäre im paroxylmo*? dicebat semper:  
 es kaele ihn in der unnechten Röhren; nempe erat *affectus laryngis* ex *lymphæ*



acri vellicante natus, occasione causarum externarum in motu debito impedita. Cum evanisset paroxysmus, febris aliquot dierum lenta supererat, tussis frequens, & pederentim copiosi muci, crassi & visci di per aliquot immediate in sequentes dies excretio, & sic morbi solutio. Redibat tamen sæpius paroxysmus, idque speciatim hyberno vel verno tempore, rarius æstate. In paroxysmo adstantes inungebant vertici *bals. succivi*, brachia fortioribus ligaturis constringebant. Præscribebam quod

℞. aq. scabios. ℥ij.

asthmat. ℥β.

Syr. Diacod. Mont. ℥vj. ad ℥j. M. nempe ut irritationis sensum & hinc laryngis contracturam sic lenirem.

Externè in regione laryngis, ubi patiens titillationis & constrictionis sensum percipiebat, cum linteis calidè applicari sæpiusque reiterari iussi.

℞. aq. articul. ad extract. ℥ij.

spir. ceras. nigr.

lill. convall. an. ℥j.

essent. opii ℥β. ad ℥ij. M. Applicetur. Hisce brevior reddebatur paroxysmus. Finito paroxysmo:

℞. aq. scabios.

serpill. an. ℥jβ.

asthmat. ℥vj.

fl. sulphur. ℥β.

syr. asthmat. vel potius papav. ℥j. M.

Potio hæc crebrius hausta crebriorem tussim & materiæ copiosioris rejectionem prævenit, quatenus irritationis in larynge sensum & fluxionis causam removet, & acrimoniam lymphæ temperando, læsionem laryngis, & hinc muci excretionem avertit. Tandem ob crebriorem nimis recidivam in subiecto phlegmatico, sero-chyloso abundante, inurebatur brachio sinistro *fonticulus*, unde nec crebri adeò, nec adeò graves postmodum redierunt paroxysmi. Circa annum 14. denuò claudere cœpit fonticulum, cum ipse esset, ex alteratione corporis & notabili habitus ejus immutatione, etiam hunc affectum immutatum iri. Ex dictis

*Curatio horum catarrhorum suffocativorum plana fit: nempe si est catarrhus laryngis à causa interna, curatur eodem modo ac rancedo recens sive tussis nocturna sicca &c. v. g. per opiata ac similia, incrassantia dicta, & acrem lympham temperantia, præmissa, si fuerit opus, vomitorio.*

℞. aq. scabios. ℥ij.

asthmat. ℥vj.

spir.



spir. sal. armoniaci anisat. ℥j.

syr. papav. alb. ℥j. vel hujus loco

Diacod. Mont. ℥j. β. M. Si asperior fuerit mistura propter spiritum salis armoniaci, omitti potest.

Si malum est à causa externa, curatur ut asthma humorosum vel tussis humida stomachalis, nempe per vomitum, & deinde per attenuantia & incidentia mucum viscidiorum, v. g. succum raphan. syr. nicotian. spir. asthmat. oxymel squillitic.

℥. aq. nicotian.

hyssop.

menth. an. ℥j.

asthmat. ℥vj.

oxym. squillit. ℥β.

syr. Nicotian. ℥vj. ad ℥j. M. capiatur cochlearium.

Ex dictis patet, Opiata, & his cognata anodyna, & hinc attemperantia alias incrassantia, in paroxysmo & sistendo & præcavendo primatum obtinere, etiam ex vulgata aliqua hypothesi: Cum enim nonnisi ex humoribus, motu & hinc loco peccantibus oriri soleant pathemata talia, humores verò locali motu nullo ferantur in corpore, nisi beneficio spirituum animalium, mediantibus organorum fibris eos moventium, non soleant autem præternaturaliter à spiritibus moveri, nisi hi promoveantur ab objecto molesto vel præternaturali, hoc est, nisi pars quædam sensibilis irriteretur; manifestum evadit, quod ea, quæ irritationis sensum tollunt, & spirituum impetum sopiunt, etiam præternaturales humorum motus refrenare, & partium inchoatos spasmos curare valeant, in quo puncto primatum ducunt anodyna, ut clarum est.

Quid ergo chylæres prosint in talibus catarrhis suffocativis supposititiis, usitatissimi, iique actiores? res elata est, quod nil valeant, per accidens saltem, primas vias evacuando, & sanguinis & abdominis viscera in motum concitando, & utroque modo pectoris angustiam nonnihil sublevando, saltem ex indirecto prodesse. Quid venæsectio? ad quam, ut sacram anchoram, mox confugiunt? Per se nihil prodest, nisi in graviore paroxysmo & pulmonum reciproco motu, plus minus impedito, metus sit, ne gravior circa pulmones sanguinis stagnatio superveniat, pro liberiori sanguinis circulo conciliando, hæc interdum instituenda veniat.

Uterius capiti, nuchæ, vertici balsama, emplastra, cataplasmata, suspensoria dicta, ex mastiche, succino, tacamahaca & similibus aliis imponuntur; item ex fermento, ex ovis ad duritiem coctis ac similibus pro suspendendo catarrho defluente. Sed conatu sanè inani vexantur agri sine fructu, cum in capite non sit mali radix: Item vesicatoria cervici, scapulæ & similibus



mil. b<sup>9</sup> locis, pro scopo diverso applicantur. Malè itidem, nisi interdum per accidens, ubi asthmatis convulsivi quidpiam adest, in quo calu vesicatoria brachiis applicari possunt.

Hic IV. loco affectus peculiaris annumerandus venit, & qui modernis, antiquatam istam de *sero catarrhalis ex capite defluxu* sententiam recipientibus, *catarrhus suffocativus* nomine venit, estque nil aliud, ut *Lindanius* loquitur, quam suffocatio subita, quæ fit à sanguine stagnante in pulmonibus. Quæ sanguinis satis occidit tam in *Syncope cardiaca*, Veteribus dicto affectu, quam in *syncope ordinaria* graviore, in qua tandem deficit movens spiritus. Plerumque ergo qui auctores *syncopen cardiacam* ignorant, ad *Catarrhum imaginarium suffocativum* delabuntur. *Syncope Cardiaca* quid sit, Veteribus sic dicta, optimè in lectione illorum versatus interpretatur *Casspar. Hofmannus Instit. Medic. l. 3. c. 80.* esse eam, cum, cerebro nil passo, sanguis ad cor tam vehementer adfluit, ut omnis spiritui via ad cerebrum intercludatur. Hinc infert, non omnes, qui subito moriuntur, apoplexiâ moriuntur, & sæpe causa frustra ab anatomicis quaritur in capite, cum sit in thorace. Hinc ex his fundamentis *Schneiderus de Catarrh. l. 1. §. c. 4. p. 297.* definit *catarrhum suffocativum*, quod sit ille *Catarrhus*, in quo sanguis plerumque pituitosus, tum de vena cava trunco adscendente, tum max. mo de ejusdem vena cava trunco descendente in cor, & hinc in pulmones confestim & celeriter fluit, nec non & interdum in musculos thoracis. Quemadmodum Apoplexiâ ingruente sanguis arteriarum in cerebrum; ita oriente Catarrho suffocativo venarum sanguis in pulmones, quâ supernè, quâ infernè tantò vehementius moventur. Conf. *Wepfer. Tr. de loco affecto in Apoplex. p. 163. 202.* item conf. *Schenck. in obs. p. 278.* ubi prolixius differtur, in *Syncope cardiaca* qua concreto in vena sanguine acri subito moriuntur. Similes nempe quoad externam apparentiam, affectus sunt Apoplexia & Catarrhus suffocativus, ita ut sæpius confundantur, aut etiam simul in ægris adsint. Hinc, ut in Catarrho hoc suffocativo fit sanguinis stagnatio in pulmonibus; ita similiter in his, qui Apoplexiâ moriuntur, similis supervenit sanguinis stagnatio in pulmonibus. Nam non tantum modò *Fracassatus in Epist. de Cerebro ad Matpighium* refert, quòd in his, qui Apoplexiâ moriuntur, vasa pulmonum repellantur distenta & rupta, ex sanguinis impedito motu, sed etiam *Cornel. Consennus in Progymnasmatibus* inquit, quòd is, qui moriuntur apoplectici, eo modo intereant atque strangulati. Nam in strangulatis, laqueo injecto collo subito perit sensus & motus, ex impedito sanguinis in carotides motu, & succedente respirationis abolitione.

In hoc igitur affectu catarrhi suffocativi adsunt, gravedo, doloresque pectoris, difficultas respirandi, vox fere amputata, periculum suffocationis, anxietas, interdum insus, non semper & satim, quando simul vasa laryngis lympham uberius

rius effundit  
oppressus  
levior, abo  
respirant,  
xatur.  
deficientis,  
tarrhus tal  
emplum v  
fert Plate  
tarrho su  
phuris p  
horam &  
catus int  
ma ex or  
parenchy  
guttur et  
runt in  
riori inq  
canis ex  
coagulat  
procation  
plevit ea  
Spa  
pervenit  
spumam  
calsonem  
quam ly  
stis, me  
Cau  
influxu  
rato alleg  
demicu  
Sec  
bitror.  
tenfior  
occupat  
sanguin  
tardioris



rius effundunt, *pulsus tardior & rarior*. Hinc qui Catarrho tali suffocativo oppressus est, ægerrimè spirat, & anima cum spiritu fertur. In Apoplexia verò levior, abolitis tantum actionibus animalibus cæteris, nihilominus plus minus respirant, arteriæ pulsant, utut pulsus sit durus, nec eà spirandi difficultate vexantur. In Apoplexia fortè verò vix vita ulla manifesta adsunt indicia, neque deficientis, aut exinde malè habentis, respirationis adsunt signa. Est itaque catarrhus talis affectus ad Peripneumonias suo modo accedens. Et ejusdem exemplum videtur repræsentare mulier catarrho suffocante interempta, quam refert Plater. lib. 1. pag. 187. Quin etiam illustrat eum exemplum canis tali Catarrho suffocativo mori, nempe per chirurgiam infusoriam injeci oleum sulphuris per campanam in aqua dilut. 3j. in venam cruralem, unde canis per semihoram & successivè anxie respirabat, sensimque difficilior, ita ut tandem suffocatus interiret. Antequam suffocaretur & etiam post mortem copiosissima spuma ex ore & naribus effluxit, imò facta apertione thoracis, totum pulmonum parenchyma, omnia vasa asperæ arteriæ, totus ejus truncus, fauces, nares & guttur erant infarcta hac spuma quasi viscida: extracta & asservata tandem abierunt in liquorem rubicundum, serosum, loturæ carniū similem. Factâ ulteriori inquisitione, pulmones erant repleti sanguine nigricante & crasso, ita ut hic canis exactè manifestârit tragœdiam Catarrhi suffocativi; Nam acido sulphure coagulatus sanguis subsistit, unde ab aëre violentius inspirato, crebriori sui reciprocatione, & sanguinis hîc facta concussione, mutatus fuit in spumam, quæ replevit eas partes.

Spuma ergò in iis, qui laborant catarrho suffocativo, & quæ tandem supervenit apoplexiâ graviore affectis, etiam ex pulmonibus esse videtur. Præter spumam in talibus apparentem, etiam interdum observatur mucus, qui dedit occasionem figmento catarrhi à capite depluentis, qui tamen revera nihil est aliud, quam lymphæ paulo viscidior, ex larynge tunc uberius emulsa, & in tantis angustis, mediante crebriori respiratione, cum aëre secum elevata.

*Causæ*, quæ talem sanguinis in pulmonibus stagnationem aut uberiores influxum aut subsistentiam inducere possunt, remotæ, à Schneidero loco citato allegantur variæ, præsertim aëris observandum vitium, ratione cujus & epidemicum ac malignum hunc catarrhum interdum esse pluribus deducit.

Sed propinquiores causas, catarrhum talem inferentes, triplices esse arbitror. 1. Nempe vel sanguis nimis abundans, & qui præter rarefactionem intensiorem & uberiores, undecunque concitatam, in pulmonibus majus spatium occupat, adeoque tardius circulatur, tandem vere stagnat. 2. Est vitium sanguinis viscidioris sive pituitosi, hoc est, chylo crudiori imprægnati, ad motum tardioris, adeoque stagnationi aptioris. Vel 3. est sanguis ab acido vitioso,



aut inspirato aëre nimis frigido, aut denique ex quacunque alia ratione *coagulatus ac inspissatus*.

Quoad *Prognosin*, res clara est, periculo esse plenissimum hunc affectum, propterea maturanda est cura, in qua *primarius scopus* est, ut promoveatur sanguis per pulmones, *id quod* vel imminuendo ejus quantitatem, *vel* resolvendo ejus coagulationem, *vel* denique eundem attenuando, sicque liberiores ipsi conciliando motum, perficitur.

*Ex remediis* ergo imprimis se offert *vena sectio* in catarrho suffocativo, ferè semper necessaria, cum nil citius ac potentius sanguinis circularem motum immutare, eundem accelerare, & stagnationem impedire queat, quàm hæc ipsa. Hinc etiam *cucurbitula cum scarificatione* hinc inde affigendæ. Clystere quoque acriori alvus eluatur. *Interna remedia* sunt *aque asthmaticæ ac pectorales* dictæ spirituosæ, imprimis temperatis & *anodynis mista* mitioribus. Item *sperma ceti*, ad 3ß. in haustu vehiculi calidi propinatum, est egregium & ab omnibus authoribus laudatum remedium, tam infantibus quàm adultis egregiè conveniens. Forfan etiam hic locum invenit *mistura Sylvi*, quam habet in *praxi* l. 1. p. 280. Quod si & *tussis*, & *materia per laryngem transudantis* superveniat *rejectio*, declinante paroxysmo, commodè etiam *leniter expectorantia* usurpari possunt. Sed de his & similibus videatur *Schneiderus* l. 5. de *catarrh. c. 4. seu ultimo*.

## CAPUT XV.

De

CORDIS & hinc ARTERIARUM PULSU  
VITIATO,

De sanguinis motu per cor, adeoque  
hujus pulsu læso.

**C**onf. hic in primis *Sylvius* l. 1. *prax. c. 26.* una cum *ejusdem Dissert. de sanguificatione & sanguinis motu*. Non enim alius est, qui magis perspicuè simulque accuratè negotium hoc tractavit. *Vitia cordis motus sive pulsus*, & hinc consequenter arteriarum sunt. 1. Quando plus minus deficit, estque parvus, tardus, rarus, in virium imbecillitate & animi deliquis. 2. Quando est auctus, nimisque impetuofus in palpitatione cordis. 3. Quando est præternaturaliter frequens, & hinc aliis modis depravatus, ut in Febribus.

Pulsus est parvus, debilis & rarus, in virium imbecillitate, languore, & hinc animi deliquis, de quibus optimè tractat *Sylvius* l. 1. pr. c. 34. Quoad virium imbecillitatem notum est, non saltem nativam hanc quibusdam contingere; sed etiam

etiam variis  
antecedentibus  
tum, mem  
parv' & d  
Concurre  
poris plus  
gros afflig  
tio, non  
Huj  
pothym  
Ino  
simul e  
& quod  
ferè nul  
Gr  
nullus c  
sus per p  
sponte e  
Om  
Etæ, quo  
Ma  
guine;  
tem fun  
bus & c  
torum c  
lis dicitu  
lis appel  
In  
effectiv  
hi vel d  
natè m  
mia ve  
in syste  
pulsu  
sanguin  
malis se  
O  
vicem  
fusi cy



etiam variis ex causis supervenire, atque non solum comitari morbos; sed etiam antecedere eos, interdum & subsequi. In hac languidi sunt ægri, tardi ad motum, membra ponderosiora videntur, torpent ad quaslibet actiones, pulsus est parvus & debilis, tardus, quandoque per intervalla certa aut incerta intermitteas &c. Concurrent simul sensuum tam interiorum quam exteriorum, item motus corporis plus minus defectus. Præter talem virium imbecillitatem, successivè ægros affligentem, observatur etiam nonnunquam subito ingruens virium prostratio, non tamen diu permanens, per intervalla tamen subinde recurrens.

Hujus subitanæ virium prostrationis tres statuuntur gradus, quorum 1. Lipothymia, 2. Syncope. 3. Asphyxia.

In omni LIPOTHYMIA, præter pulsum minorem & debiliorem, sensus simul externi & interni obfuscantur, & motus animalis tam voluntarius quam & quodammodo naturalis plus minus aboletur, ita ut respiratio aut obscura aut ferè nulla observetur.

Gravior species est SYNCOPÉ, in qua subito concidunt ægri, pulsus mox nullus observatur, uti & nulla respiratio, interdum sudor frigidus & glutinosus per poros erumpit, corpus friget & pallor; urina & alvi excrementa interdum sponte effluunt, imò tales syncopizantes mortuis quam vivis similiores videntur.

Omnia hæc eadem, aut ferè graviora, observantur in ASPHYXIA, ita dicta, quod nullum pulsus vestigium motusve cordis tunc deprehendi queat.

Machinæ nostræ corporeæ vis vitalis radicata est fundamentaliter in sanguine; exiret verò se formaliter per subtilissimam sanguinis substantiam sive partem summè activam & mobilem, quam Spiritus appellamus, qui in pulmonibus & corde adjumento aeris volatilisati, instar radiosæ & luminosæ texturæ per totum corpus distribuuntur, nunc junctim in sanguine per vasa, qui vitalis dicitur: nunc seorsim, trajiciendo per cerebrum & nervos, qui animalis appellatur.

In sanguine igitur remote & fundamentaliter, in spiritibus proximè & quasi effectivè, debilitas virium vel successiva, vel repentina investiganda: quatenus hi vel deficientes, vel minus mobiles, vel nimis dissipabiles, vel nimis inordinatè mobiles existunt. Adeoque repentina virium imbecillitas sive lipothymia vel vitio spirituum vitalium in sanguine, vel vitio spirituum animalium in systemate nervoso contingit. Unde & in omni virium imbecillitate pulsus notabiliter alteratur; in magnitudine quidem & parvitate vitium sanguinis & spiritus vitalis, in robore verò majori vel minori vitium spiritus animalis sequitur.

Observandus autem hic simul circulus, quatenus hi spiritus à se invicem dependent, ita ut vitalibus pessum euntibus ceu radice, inde diffusim evanescant & eclipsentur animales; sicut his evanescentibus cordis



dis ac sanguinis & spirituum vitalium motus itidem cessent: prius in suspensis, posterius in Apoplexia forti manifestum est.

Ex dictis planū est, quod *causa virium imbecillitas omnis* sit deficiens sanguinis in pulmonibus & sinistro cordis ventriculo turgescencia ac spiritua-  
scentia, unde hujus respectu pulsus minores & rariores, sicut hinc dependentis spirituum animalium moventium defectus, debiliores existunt.

*Causa remota* consistit in vitiata crassi massæ sanguineæ, speciatim in deficiente acrimonia particularum salinarum, in specie salis volatilis urinosi oleosi, cui e contra non raro supervenit acidi vitiosi exaltatio. Horum *causa* ex primis viis, adeoque ex cacochymia investigandæ veniunt, ita ut & hoc in puncto cruditas chyli, plus minus acida, etiam ferè primariam sui considerationem meretur. Consentit ferè *Sylvius, qui loc. cit.* languorem talem ægrorum propter sanguinis nimiam viscositatem & glutinositatem oriri asserit, unde partes ejusdem salinæ activæ obrutæ minus fermentare possunt. Malum hoc est eò deterius, quò magis acidum vitiosum simul peccaverit. *Hinc* est, quod post morbos acutos curatos, si tantillum in diæta peccarint ægri, speciatim in alimentorum assumptione excedant, languores adhuc superveniant. *Hinc* est, quod & in scorbuto vires subinde sint adeò imbecilles, quoniam ex vitioso acido massæ sanguineæ fermentatio non leviter imminuitur. Sanguine taliter constituto ex spirituaſcentiæ defectu, etiā spiritus animales pauciores erunt, vix sensuum functionibus, aut motui voluntario vel motui naturali, speciatim cordis sufficientes.

Quoad *Lipothymia vel Syncope causas, remotæ* nonnihil prius evolvendæ. Quod ab odoribus ingratis ægri concidant in Syncopen, non secus ac præsentia rei, quàm ex idio-syncrasia quidam horrent, eadem supervenit. Sic *Amatus Lusit. cent. 2. cur. 36.* ab adſpectu, vel odore rosæ graves lipothymias in Monacho quodam observavit. *Hinc* est, quod formiæ hysterica subinde ex odore zibethi, vel moschi, cum passione hysterica incidant in syncopen.

Speciatim *idio-syncrasia* attendendæ, dum quidam ignorantes præsentiam felis, tamen cum sudore frigido & anxietatibus animo deficere incipiunt. *Affectus animi* vel fortiores, vel magis subitanei etiam syncopen inferunt. De gaudio subitaneo, eoquenimio, res nota est ex *Livio, Lotichio in obs. & Marcell. Donato in hist. med. mir.* Terror item subitaneus ac nimius hoc facit. Ex timore gravem obortam syncopen, per venæ sectionem curatam, refert *Fontan. in Consil. & Respons. p. 63.* imò sola imaginatio & cogitatio rei horrendæ lipothymiam inferre valet. *Vid. Hildan. cent. Epist. 43.* De evacuantibus quibusvis nimis res nota est, quod v. g. sanguinis aut seminis &c. effusionem sequatur lipothymia & syncope, item nimia aquarum hydropicorum evacuatio, puris præsertim facta ex thorace emissio, nimius sudor &c. syncopen inducunt; subitaneæ

*muta-*

mutationes  
giā post in  
pla vid, apu  
cus applicat  
cus assumpt  
defatigatio  
præsertim  
biles habet

Facili  
ruptis sub  
cula vid  
quam h  
lipothym  
ventum  
apostem  
tio, quia  
rò coagi  
fatus, &  
culo imp  
guineita  
quā in  
mercium

Po  
etiam mali  
oloribus

Iap  
ficio ven

p. 157.  
hæc e

15. Ex

Lus. cer  
infestat

ris & r

Ta

item pr  
syncop

Uti fre  
machi,

simul pl  
ripit, qu  
plicabile



mutationes ex aëre calido in frigidum, ut etiam *ingurgitatio potus intense frigidi post insignem corporis incalescientiam*, lipothymias secum ducunt. Exempla vid. apud *Schenck. l. 2. De venenis* res nota est, quod eadem, siue extrinsecus applicata per mortuum aut puncturam animalium venenatorum, vel intrinsecus assumpta graves excitent lipothymias. *Nimius corporis motus ac extrema defatigatio* similiter interdum syncopen infert. Uti etiam *graviores dolores*, in iis præsertim, qui sunt rarioris texturæ, adeoque spiritus ratiore & facilius dissipabiles habent.

Faciunt huc *vitia cordis*, præsertim *abscessus ejus & partium vicinarum*, qui rupti subito dant periculosas syncopes. Sic ex ulceribus in sinistra cordis auricula vide lipothymiam in *Tulp. l. 2. c. 16.* Inprimis notabilis est observatio, quam habet *Sanges in obs. operum p. 372.* de Bibliopola, qui longo tempore lipothymia sæpe deprehendebatur, quo mortuo, maximum in corde apostema inventum fuit, mediam ejus partem occupans. Alius Venetus in eodem corde apostema habebat, dimidii ovi magnitudine. *Sanguinis* quoque habenda est ratio, quia aut nimis parvus, post copiosas excretiones, aut pure vitiat, aut subito coagulatus, v. g. ex haustu frigida post æstum, aut alia quavis ratione inspissatus, & ob id fermentationi ac spirituaſcentiæ debita ineptus, aut in debito circulo impeditus, v. g. in syncope cardiaca, lipothymias comites ducit. Hinc sanguine ita in corde stagnante, adeoque deficiente plus minus ejus motu, tam locali, quam intestino, intercipitur necessarium spirituum animalium & vitalium commercium, hinc ægri mortuorum instar corruunt.

Porro *Epileptis* paroxysmis subinde junctum symptoma syncope est, uti etiam aliis *affectionibus convulsivis* gravioribus, uti in suffocationibus hysteriis, in doloribus nephriticis subinde gravioribus, res nota est.

Inprimis sui considerationem meretur *syncope, stomachica* dicta, seu ex orificio ventriculi sinistro affecto superveniens, de qua vid. *Gorræus in def. medic. p. 157.* & quidem præ cæteris ex causis internis natis lipothymiis frequentior hæc est stomachica. Ex *lacte coagulato* lipothymiam observavit *H. Heer. obs. 15.* Ex *esu fungorum* syncopen notat *Zacut. Lusit. l. 5. Med. Pr. hist. 23. Amat. Lus. cent. 1. cur. 39.* *Acres succi, præsertim æruginosi*, orificium dictum gravius infestantes, præter anxietates, crebras lipothymias, præsertim in subiectis tenerioris & rarioris texturæ inferunt.

*Tales syncopici* præter pathemata, quæ circa stomachi regionem percipiunt, item præter inexplicabiles istius loci mutationes seu molestias, sub imminente syncope sentiunt vertiginem & caliginem oculorum, unde sic animo delinquant. Uti frequens est hæc syncope stomachica, ita etiam *nunc* per se, ex contentis stomachi, *nunc* per consensum, affectis partibus, aut nervis abdominis, stomachum simul plus minus afficientibus, accidere solet. In ò vix lipothymia quendam corripit, quin sub eadem imminente alterationem quendam notabilem, vix etiam explicabilem circa stomachi regionem percipiat.



His omnibus ita consideratis, facile est obſervare *cauſas ſyncopes proximas* eſſe, aut ſpiritus vitales, ſubito deficientes ob ceſſantem ſanguinis termentationem ac circulum, aut ſpiritus animales, ſubito in motu naturali deficientes, unde quaſi abrupti, vel ad alias *ἀταξία*s & convuſiones acti, movendo cordi minus inſervire poſſunt, unde ſpirituum conſortio abrupto, ſyncope ſupervenit. Hinc cauſa modò dicta omnes vel ſanguinem, vel ſpiritus vitales afficiunt, vel ceu objecta ſenſibilia ſpiritus animales in motu ſuo alterabunt, ita ut I. in motu debito, ſpeciatim cordis, vel deficient, dum oppreſſi, & quaſi concentrati, in ſua activitate impediuntur, v. g. in ſubitaneo terrore, vel diſſipati vel reſoluti evaneſcant, ac in operando deſiſtant. II. In motu quaſi *exorbitent*, & ex irritatione quadam & inde natis ſpasmis undecunque concitatis, *cor in continua ſiſtole detineant*: Sic *ſanguinem & ſpiritus vitales afficiunt* quælibet evacuationes, mutationes ſubitanæ aëris, ſanguinis quæcunque inſignes, aut in craſi, aut in motu locali, alterationes: *Vitio vero ſpirituum animalium, in motu deficientium*, orietur ſyncope, poſt odores graves ex objectis, & idioſyncraſia hoſtilibus, item quæ ſtomachi oriſcium afficiunt, ex cujus cum univerſa nervorum ſyſtemate conſenſu, facilis ſpirituum animalium in motu abruptio fit. *Dolores* item ſpirituum animalium ratione ſyncopen inferunt. Neque etiam hic negligendum, quod *Piſo de ſeroſa colluvie*, p. 166. ſcribit: ex obſtructis aut interceptis nervis cordis motoriis ſyncopes oriri, undecunque nervus iſte afficiatur, aut (verba ſunt Piſonis) ab aquila in eum è cerebro derepentè pluyente, ſpirituum motus impediatur. *Gaudium nimium* ſpiritus diſſipando, item *dolores diuturni* pariter ex dicto fonte ſyncopen inferunt. Quod verò *ſpasmus cordis ac convuſionem* ejus, à ſpiritibus animalibus inductam, attinet, ſanè in morbis convulſivis, præſertim partium internarum, non rara hæc ipſa eſt, unde in tali caſu ægri ad ſe redeunt conſequuntur, *es wäre ihnen geweſen/als wann jemand das Herz mit Süſſen hätte gerettet*; id quod innuit validam muſculi cordis contractionem.

In *Prognofi* ſine cauſa manifeſta languidi in morbos inclinant, Reconvaleſcentes, præſertim à morbis acutis, diu languidi, vel cachexiam, vel recidivam incurrunt. In morbo quocunque præter manifeſtas cauſas mox ſuperveniens, ſumma virium proſtratio maligni morbi ſignum eſt. Lipothymia quævis periculofa plus minus, prout magis vel minus aut durat, aut deficit motus cordis, item prout cauſæ antecedentes graviores vel leniores fuerint. Unde ſi ſyncopizantes poſt exhibitionem ſpirituoforum, poſt irrorationem faciei cum frigida, poſt ptarmica, ad ſe non redeunt, ſummum periculum portendit. Sudor frigidus ſyncopizantibus ſuperveniens, quò copioſior

fior ac frigidior  
mont, nil  
quæ ſyncopizantibus  
rum tonum

Quo  
acrioribus  
turgent,  
re, languor  
quenter  
aromatic  
duli ex a  
to, in ſp  
plethura  
lia locu  
introitu  
busuri,

In  
tamen ſer  
ratione  
ſpirituof  
rò ſpiri  
internas  
tum deb  
lius diſſi  
diſ ſiſtol  
impetum

Re  
rea, ac  
tionem  
poſiti,  
nihil ul  
queant  
propter  
nimis fu  
ficiant,  
hant.  
ducunt.



fior ac frigidior, eò status ægri periculofior. Sudor hic, ut rectè dicit Helmont, nil aliud est, quàm mucilago rorida nutritiva partium subcutanearum, quæ syncope resoluta, spontaneo motu per poros hiantes, ob resolutum fibrarum tonum, emanat.

Quoad *curam*. In *langnore successivo* conveniunt ea omnia, quæ acrioribus & subtilioribus particulis salinis volatilibus, præsertim oleosis turgent, adeoque acidum corrigere, bilem acuerè, ventriculū restaurare, sanguinis glutinositatem attenuare, ejusdem fermentationem ac consequenter spiritualescentiam promovere valent, id quod uno nomine præstant *aromatica*. Pertinent huc *Clareta*, sive *vina Hippocratica dicta*. Item *Noduli ex aromaticis* vino infusi, subinde usurpati, de quo vid. *Sylvius loco citato*, in *specie* p. 613. & *seqq.* Item *Essent. & Elix. stomachica*, *Aqua vite*, *apoplectica* &c. *Salia volatililia oleosa*. *Elix. Propriet.* sine acido, & sexcenta talia locum inveniunt, ter quotidie usurpanda, manè, à meridie, & sub introitu lecti: quin imò, *sed inconsultum videtur*, etiam sub ipso pastu talibus uti.

In syncope & lipothymia præstantiora paulò requiruntur remedia, habitâ tamen semper ratione causarum antecedentium. In genere tamen conveniunt ratione spirituum quidem deficientium volatililia ac penetrantia, & quæ spirituositate sua spiritibus deficientibus faciliè applicabilia sunt. Ratione verò spirituum animalium in motu deficientium, ea, quæ partes sensiles, tam internas, quàm externas, fortius vellicare, & ita spiritus animales in motum debitum revocare valent. Ratione verò eorundem spirituum aut faciliùs dissipabilium, aut in motus convulsivos, adeoque continuandam cordis systolen, pronos, ea quæ eos quodammodo figunt, ac convulsivum eorum imperum sistere valent.

*Remedia igitur ad tres classes revocari possunt.* I. Spirituosa, sulphurea, ac oleosa. Quo pertinent quilibet *spiritus inflammabiles* per fermentationem parati. *Spiritus & oleosa destillata aromatica* tam simplices quàm compositi, plus minus suaviter olentes. Quoad hoc punctum tamen *cautè* non nihil usurpentur, cum non solum mulieres omnes talia commodè perferre nequeant; sed etiam mares plures, præsertim literati, aut incubrationibus dediti, propter rariorem ac subtiliorem spirituum texturam, fortius odorifera, & quasi nimis fumosa, non commodè ferant: cum talia nimis spiritus vel sanguinem afficiant, unde cephalalgiam, vel capitis gravitatem quasi ebriosam inde contrahunt. Alias tam internè quàm externè sensuum organo admodum conducunt.



II. Spiritus salini, volatiles, acres, urinofi, quo omnia salia volatilia pertinent, eò præstantiora, quo magis oleosa prius reddita fuerint.

III. Acida volatilia, acria, vinum, acetum destillatum, &c. quæ partim sensuum organa potenter afficiunt, partim spiritus dissipabiles ne nimis exsolvantur, præcavent.

IV. His adduntur opiata mediocri dosi, in scopo nempe ultimo supra memorato, spirituum nempe aut dissipabiliorum, aut in impetus convulsivos priorum impetum sistentia.

*In specie in prima classe sunt aquæ spirituosæ, cinamomi ejusque oleum, spir. lil. convall. spir. theriacal. tam simplex, quàm compositus, aq. apoplectica quælibet. Q. E. Matthiol. spir. rosarum ambratus, Ess. ambræ cum spir. rosar. parata. Q. E. dictæ Meliss. Angelic. &c. Essentia croci, dicta Paracelso summa cordis lætitia.*

Quoad salia volatilia, in primis spir. salis armoniaci oleosus factus quicunque: item spir. C. C. & sal. volatil. viper, ac quælibet spiritus & salia volatil. sic Sachsus in *Ampelograph. p. 511.* Novi Medicum, inquit, qui frigidos, & calore nativo destitutos, haustulo Elixir. vitæ Matth. in quo grana aliquot salis viperarum volatil. dissoluta, se recreaturum confidat. Porro liquor. C. C. succinat. ac quælibet cum & ex succino remedia volatilia sunt egregia.

Quoad acida vinum generosum ac spirituosum, succus citri, succus aut syrup. rub. idæi, acetum simplex, acetum theriacal. caryophyllatum, rutaceum &c. in aceto infusum castoreum, usurpari possunt.

Quoad opiata denique præter Laudanum in parva dosi, theriaca, Mithridat. Extract. theriacal. ac his cognatæ compositiones administrari possunt, v. g.

℞. aq. meliss. cum vin. ℥ij.

syr. flor. tunic. ℥vj.

conf. alk. ℥j.

Q. E. Matth. ℥ij: M. D.

S. Träncklein auf eiltch mahls.

Vel: ℞. aq. cord. Herc. Saxon.

cinam. borrag.

meliss. cum vino an. ℥j.

spir. theriacal. simpl. ℥℞.

Elix. citr. ℥vj.

Ess. ambr. ℥j.

syr. de cortic. citr. ℥℞, M.

Vel: ℞. aq. rub. idæi ℥ij.

cord. Herc. Saxon. ℥j.

spir. salis armoniaci ℥j.

lil. convall. ℥ij.

syr. borrag. ℥℞. M.

Vel:



Vel: ℞. aq. meliss.

fœnic. an. ℥jß.

liq. C. C. succin. ℥j. ad ℥jß.

fyr. fœnic. ℥iij. M.

Vel: ℞. aq. rub. idæi ℥iij.

acet. theriacal. ℥iij. ad ℥jß.

℞. citr. ℥j.

fyr. rub. idæi ℥jß. M.

Vel: ℞. aq. flor. sambuci

borrag. an. ℥ij.

succi citr. recent. ℥j.

℞. ros. ℥ij.

fyr. rub. idæi ℥jß. M.

Vel: ℞. ambr. gryl. gr. vij.

solve in ol. cinam. & cardamom. an. gut. viij. adde

Extr. lign. aloes ℥ß.

margarit. præp. ℥j.

sacch. cand. ℥j. M.

Quoad externa, Naribus, temporibus & labiis affricandæ sunt ferè similia; vel Rosa, ▽ carbunc. lil. convall. Bals. apoplecticus, &c. Item admoventur naribus ℞. sal armoniaci, aut similis acrior, acetum vini, acetum florum tunicarum ac similia naribus adhibentur;

In specie quoad causarum varietatem & differentiam subinde varianda cura: v.g. in syncope stomachica interdum vomitus provocari potest, ubi nempe adsunt indicationes excrementorum evacuandorum, Sic Forest. l. 17. obs. 7. refert, syncope ex utero, ex defectu mensium, afflicto simul stomacho, per vomitum curatam, Faber cur. 86. refert, Syncope desperatam per vomitum cum aqua cinamomi copiosa curatam. Conferat ergo vomitus in syncope stomachica, ac ubi fomes mali circa primas vias hæret, præsertim ubi nausea & similia symptomata urgent. In casu, quo non tam resoluti, quàm oppressi, aut inordinatè agitati us videntur, excitat quoq; tales ægros vomendi conatus, ac quasi in vitam revocat. Hoc ipso vomitionis actu, ne animo delinquant, odores penetrantes, in primis vini generosi naribus admovent. Quod si vomitus non æq; tutus videatur, clysm paulo acrius injicere non vetabit. Si ex veneno sit syncope, præter alexipharmaca, aut remedia appropriata itid. convenit vomitus, ubi venenum in primis viis adhuc latuerit. Si ex evacuationibus quibusvis, speciatim purgatione nimia, imineat syncope, theriaca, it. extract. theriacale in aq. cinamom. & mistura ex aq. mentha, ℞. an theriac. & confect. alkerm. conveniunt. Sin ex terrore nata sit syncope, præter volatilia Rosa, in specie & ia volatilia oleosa, etiam graviore in syncope

Hb

venano



*venam aperire*, & aliquali sanguinis detractioe liberum motum huic conciliare, non inconsumtum est. *Nam non semper syncopticis nocet sanguinis detractio*, id quod confirmat *Zacut. Lus. l. I. pr. admir. obs. 135.* Ex mensium nempe suppressione syncope gravis *venæ saphenæ* sectione curata. A Gaudio e contra nimio syncope curatur per acida, vinum, succum vegetabilium, aut julepos acidulos. Sin à V. S. imminet syncope, imponatur ager supinus pavimento, ac sal commune ori indatur, vellabra ejus hoc ipso fricentur: defectu salis communis *urina* utiliter usurpatur, vel acetum applicetur naribus, & affricetur lingua. Ubi metus est lipothymia à V. S. optimum est præmittere jusculum ante administrationem Venæ sectionis, & hinc in dorso cubantibus vena aperiatur. Quod si ex nimia sanguinis excretionem, v.g. nimio mensium fluxu syncope imminet, opiata v.g. acidis sociata sunt optima, addito & corallorum: Sin convulsivis in morbis, hysterics pathematis, &c. syncope gravior adsit, & ia volatilia, liquor CC. succin, & carmin. de tribus, præsertim cum castoreis, si ferre queat ager, propinentur, aut etiam opiatis additis malum præcaveatur.

De

## PALPITATIONE CORDIS.

Contrarium vitium Pulsi cordis deficienti est *Palpitatio cordis*, ac huic cognatus *Tremor cordis*. Utrouque est motus inordinatus & convulsivus ejusdem, sed in Palpitatione fibrarum vehementia; in tremore vero crebritas earum in primis observatur, ut rectissime hæc distinguit *Willis. pharm. rat. part. I. p. 260.* Est enim revera *Palpitatio cordis* motus ejusdem convulsivus, quo fortisystole se contrahit, ut ut nunc vehementior, nunc mitior, nunc major, nunc minor. *Palpitatio hæc cordis expressu arteriarum vix ullo potest cognosci.* Sic enim *Timæus in Epist. p. 140.* observat palpitationem cordis mirabilem, in qua nullus in carpis pulsus percipi potuit: Inde ut plurimum necessarium est, lateri sinistro admoveere manus, ut ritè percipiatur, pulsu ipso in arteriis subinde vix, aut leviter, mutato, ut ut leviori in malo celerior aut frequentior soleat observari. Interdum est malum adeò vehemens, ut solo auditu & visu possit cognosci, imo exempla prostant costarum ex palpitatione cordis distractarum, ferè diffractarum. Vide *Horst. l. 3. obs. 17. Hochstett. decad. 9. p. 361. Et Piso de colluvie serosa p. 166.* notat, in qua indumenta quasi habello mota inæqualem cordis motum æmulabantur, & thorax & sternum ab illo motu à sede naturali dejecta, mediocriter extuberabant. Ex quo affectu pater esse convulsionem musculi cordis in tali palpitatione. Cognatum malum est

T R E-



# TREMOR CORDIS.

Talis est trepidatio, et *Inter* in qua fibræ musculorum cordis celerissime & quasi semi-contractæ systoles & diastoles vices obeunt. Confunditur communis hic cordis tremor cum Palpitatione, cum *multum differant*. Palpitatio enim est vehementissima contractio, impetuosissima systoles molestia, & rectè secundum Hippocrateam *sententiam* convulsio cordis vocatur, atque uberius à *Louvero tr. de corde p. 132.* confirmatur. Tremor cordis vero est, cum minores sunt pulsationes & crebriores & quasi tremuli.

*Causa* Palpitationis cordis est, quicquid quacunque ratione musculos cordis aut nervos moventes irritare potest, & hinc ex impetu *uum* convulsivam constrictionem inferre. *Causa* tales irritantes investigandæ sunt, *vel in organo*, nempe in ipso corde, *vel in medio movente*, nempe in nervis. Ratione cordis *causa irritans* est ejus respectu *vel externa*, eaq; frequentior, *vel interna*, eaq; rarior. Inter *externas* hinc inde fit mentio aquæ pericardii nimis abundantis, quæ aqua nihil aliud est, quam lymphæ, eò per certa vasa lymphatica derivata, qua abundante, fit hydrops pericardii, à quo cor irritatum palpitationem inferat. *Galenus* jam hujus causæ mentionem facit, & exinde natam palpitationem notat. *Amat. Lus. cent. 3. cur. 43. Confer. Piso Tr. cit. p. 168.* Sed dubium est, quoad hanc causam, annon acrior lymphæ potius impediatur motum cordis, undè lymphæ hujus ubertas non tam causa, quam effectus consequens palpitationem, vid. *Lowe. tr. de corde p. 104.* Siquidem in homine vivente paucior, quam in mortuo hujus reperitur quantitas, de quo vid. *Schneid. l. 2. de catarrh. p. 93.*

Inter *externas* sunt *vermes*, dictus vermis cordis, *der Hergewurm*; præcipuè intra pericardium cordi adhærentes, affectus rarus nec ubiq; cognitus. *Patiuntur* tales ægri Palpitationem cordis subinde recurrentem, rosiones, puncturas & dolores cordis, præsertim rosiones internas circa regionem cordis, facies pallet, ex improviso interdum lipothymia imminet, interdum etiam convulsiones supervenire observantur. *Curiosa est observatio*; quam excerpti ex dictatis MScr. *Petri à Castro Pract. Veronensis*, cujus verba hæc sunt: Mihi contigit, hoc dirum morbi genus in Cantabria oblerasse sub epidemica constitutione, in qua post ingentem agrotantium stragem, qui omnes convulsi cum frequentissima & fere continua cordis palpitatione moriebantur. Dissectis cadaveribus invenimus in singulis vermem, magnitudine ferè minimo digito æqualem, capsulæ cordis affixum. Non valuerunt præstantissima alexipharmaca vermem occidere, non bezoar orient. non theriaca, non confect. alk. non scorzonera, &c. nec allium, aut quotamen magis, quam ab omnibus aliis angebatur, & videbatur lædi, solus *succus scabiosæ* vermem occidit. Unde hæc experientia observata, scabiosa in posterum



// uti iussimus languentes, tam in iusculo excocta, quam decoctis & syrups ex ea  
 // fabricatis. Tandem nulla auxilia ægrotantibus apponebantur absque hoc spe-  
 // cifico alexipharmaco. Et certè mirum fuit, ab eo tempore nec ullum ægrotan-  
 // tium perisse. Itaque non cordialibus curari hic affectus potuit per aliquot ho-  
 // ras. Quis vivus, & dulc. ad gr. ix. exhibitus cum conserv. flor. scabiosæ ma-  
 // gnopere prodest. vid. etiam hujus Petri à Castro Tr. de Peste Neapol. Rom. &c. p.  
 // 137. & 138. ubi etiam vermis ejusdem mentionem facit. Aliàs medicamenta ad  
 // hunc vermem usitata sunt imprimis *Galina*, & hinc *succus allii, raphani, nasturtii*,  
 // &c. Conf. Hartm. in Pr. chym. c. III. it. Gabelhovers cent. 3. cur. 1. Externe  
 // expertum est *cataplasma* pro enecando verme pericardii, ex *foliis cinare, tanace-  
 // ii & absinthii* & *vini incoctis*, & cum paucis *mithridat. mixtis*, regioni cordis  
 // admotum. Experimentum Lovveri Tr. de Corde p. 107.

*Causæ internæ* respectu cordis palpitationem inferentes, ratiores sunt  
 ipsi affectus cordis, ut *abscessus in corde*, aut simile quid, sed potius omnia ea, quæ  
 sanguinis localem motum quacunque ratione per cor impedire valent, unde cir-  
 ca cordis basin & radices vasorum aggestus, crebriores & validiores contractio-  
 nes, adeoque palpitationem concitat, internæ causæ rationem obtinent: Cujus  
 sanguinis in circulo suo plus minus impediti non leve argumentum est, quod pul-  
 sus in carpo, minus cordis motui respondeat, sed languidus & diminutus subin-  
 de percipiatur, quasi sanguine non sufficienter distendente arterias. Has inter cau-  
 sas sunt tam ipse sanguis non rite se habens, quàm alia sanguinis, etiam rectè con-  
 stituti, motum impediencia. Sanguinem quod attinet, ipse vitiosus, minus turge-  
 scibilis & fermentescibilis, indeque ad stagnationem pronus, ad palpitationem  
 disponit. Hac ratione mensium suppressio mulieres ad palpitationem cordis  
 aptas reddit, quam levi ex motu tunc contrahunt, non secus ac *cachectici* alii  
 subinde hoc malo corripi solent; item sanguinis *grumescencia*, aut aliqualis  
 ab acido coagulatio, indeque in ventriculis cordis plus minus subsidencia palpi-  
 tationem cordis infert. Conf. M. A. N. C. Ann. 2. p. 298. item Willis in pharm.  
 rat. part. 1. pag. 262. Alia, quæ sanguinis bene constituti motum impediunt,  
 sunt imprimis conformationis vitia, v. g. pulmonum infractus, & obstructio.  
 vid. Willis cit. loc. item Truncus arterie magnæ prope cor offens palpitationem  
 gravem infert. vid. Willis cit. loc. pag. 264. Item vena pulmonalis aut cartila-  
 gine adnata ferè obstructa. Mayow de motu musculorum. pag. 97. item ex-  
 crescentia carnea in cordis basi inter arteriam magnam & aortam 3vi. pendens,  
 & alterum corculum representans. vid. Schenck. l. 2. observat. pag. 214. Polypæ  
 graviores in corde, aut etiam calculi seu lapilli in corde reperti. vid. Hofer. in  
 Hercul. Med. p. 89.

Quoad nervos affectos, hi ad cor derivati, ejusque aut viscerum insignium  
 motui



motui intervientes, undecunque irritati, vel spasma affecti, cordis palpitationem inferunt & convulsionem, abicunq; etiam causa occasionalis delituerit.

Res nota est, quod *animi pathemata, præsertim terror*, subinde soleant palpitationem cordis inferre: it. sunt, qui *ex infecto odore* mox cordis palpitationem sentiunt. In specie ad hujusmodi palpitationem ex nervorum spasmodico affectu contracta, *pertinet hoc malum*, in hypochondriacis & scorbuticis præsertim frequenter observatum. Non putandum est, vel status ex hypochondriis ad cor deferri, aut vapores ex splene ad cor ascendere, & ita palpitationem inferre; utut ægri dicant, se sentire præcedentem alterationem, dolorem pulsantem, aut similia pathemata, sub hypochondrio sinistro in lienis regione, unde concitetur cordis istud symptoma, nempe similiter *in hujusmodi subjectis spasmodica est affectio*, simpliciter ex affinitate ac intima communicatione, quam nervi splenici cum cardiacis habent. De quo & aliis huc pertinentibus *vid. Anat. nerv. Willis.* Sicut enim hujusmodi subjectis spasmodica pathemata aliarum partium per consensum viscerum in hypochondriis non sunt rara; ita etiam cordis superveniens palpitatione simpliciter per consensum nervorum explicanda. Siquidem ante insultum, vel cum eo percipiuntur murmura & rugitus in abdomine, præsertim circa sinistrum hypochondrium, præter symptomata splenis modo allegata, quæ non præcisè oriuntur à flatibus, spontaneo impetu has turbas cientibus; sed potius à partibus status continentibus, spasma vario affectis. Præterea dum afficiuntur paroxysmo tales, videtur cor quasi constringi, aut ambabus manibus comprimi. Concurrit etiam interdum sensus, quasi adscendentis fumi ex hypochondrio sinistro, qui spasmi membranarum istius loci indicium (vel comes) existit, ut taceam vertigines subinde complicatas, anomalum & perturbatum suum animalium motum ostendentes. Acido nempe vitioso hypochondriacorum utcumque commoto, & nervos, vel stomachi, vel lienis, potissimum irritante, & hinc spasmos eorum ac partium appensarum concitante, facile & nervi cardiaci similiter per consensum affici, & ita ad palpitationem cor adigi poterunt. Ut etiam nervuli, arterias cordi vicinas moventes, spasma affecti, & ita sanguinis circulum turbantes, & mediante vasorum arctiori stricture impediētes, consequenter ex sanguine circa cordis basin congesto, hujus palpitationem inferre possunt. Sed de his omnium optimè & prolixius agentem *vid. Willis, pharm. rat. p. 1. p. 268.* cui sanè multum debemus, quod in nervorum eorumque affectuum theoria tantam lucem nobis accenderit.

*Tremoris cordis*, in quo pulsus inæqualis & languidus, interdum quasi vermicularis percipitur, *Causa vel* in musculo cordis, *vel* in nervis investiganda, cum pariter convulsi quid sapiat. *Quod ipsos cordis musculos attinet*, equidem in his aliquid vitiosum, siue præternaturale contineri videtur, quod



fibras motrices parenchymatis eorum continuò vellicare, & hinc ad contracturas irritare valet, cum vero necessariò diastole cordis à sanguine influente superveniat, hæc vix sufficiens conceditur, quin ex dicta causa subito contractio repetita superveniat, & ita continuus, sed interruptus, adeò tremulus sic fiet motus. *Quoad nervos*, scorbutici etiam ac hypochondriaci, ex his ipsis affectis, & ab aliorum viscerum nervis, per consensum in spasmos coactis, leviores licet, tremores in corde pati observantur. Pauca aliàs de hoc cordis tremore prostant apud aucthores & scriptores Medicos, cum ordinariò cum palpitatione ejus confundatur, aut circa pulsum vitia, vel lipothymias, subinde tremoribus supervenientes, tractari soleat, & cum his ipsis confundi.

*Quoad Prognosin.* Si Palpitationi cordis superveniat pulsus sensim remittens, imminens syncopis signum est. Facit & huc, quod observavit jam olim *Galenus*, quod omnes, qui juvenes, aut in declinante ætate sani, subito sine ullo manifesto symptomate palpitatione cordis correpti sunt, omnes ante senectutem mortui fuerint. Quæ ex malo hypochondriaco aut scorbutico est cordis palpitatio, frequentior quidem est, ac sæpius recidivans, levior autem reliquis speciebus, præsertim per *idionadiaz* cordis, aut partium vicinarum accidentibus.

*Quoad Curam.* Hæc dirigatur eò in genere, ut saltem causa removeatur, quo ipso sponte cessabit dicta convulsio. *In paroxysmo fortius urgente, Vena sectio subinde necessaria est*, ut sanguinis stagnationi, ejusque impedito motui, aut præsentis, aut imminenti, afferatur aliqualis medela, ut depleto sanguinis quanto, facilior ejus circulus fiat, nec tam insigniter aut copiose, item in uno loco subsistere queat. *Eò magis hæc convenit, si subiectum sit plethoricum*, sive revera tale, sive apparens. Item *si ex terrore aut metu, aut suspicionem grumorum sanguinis malum ortum fuerit, aut si ex prægressa insigniori corporis commotione supervenerit*, in quibus omnibus casibus cum suspicio vel sanguinis circa cor aggesti, vel impetuosius circa vasa, moti, Venæ sectio locum invenit. *A conformatione quidem laesa si sit vitium*, ferè incurabile malum erit, ac saltem per exactam diætam, & minimum animi & corporis motum, quantum possibile, sustentandi tales ægri.

*Quoad ceteras causas*, sive sanguinis subit vitium, sive spasmodica per hypochondriorum contentum pathemata, pro his ipsis corrigendis tria remedium genera maxime proficua observantur, nempe *Martialia*, hinc *terrea*, quò in specie pertinent *corallia*. Item *salia volatilia*: quibus pro Vitium ac spirituum restauratione *analeptica volatilia* imprimis temperata conducunt. Nam *quoad volatilia sulphurea aut fortiter oleosa, attendendum*, non omni-

bus

bus talia co-  
genus ne-  
aliis affect-  
tus jam fu-  
v. g. cinna-  
tionis cor-  
Nihilomi-  
modo di-  
paroxysm-  
volatilia

Al-  
ex eadem  
rag. c. ac  
17. obse-  
pitatione  
videm &  
tas calid-  
ad palpi-  
Hinc eff-  
si usurp-  
ratione  
suspensu  
\*  
cta, per  
la & lin



bus talia convenire, sed hæc ipsa quibusdam hypochondriacis vel hysteris, genus nervosum fortius afficiendo, paroxysmum exasperare, quod pariter in aliis affectibus convulsivis observandum est. Et si à talibus forsitan exasperatus jam fuerit, *acida*, ac speciatim *℞* *O dulcis* eum denuò compescunt, v. g. *cinamomum*, & *omnia ex hoc parata*, excellunt in paroxysmo palpitationis cordis, non secus ac in lipothymis, & mirè in his laudantur à Lindano. Nihilominus tamen palpitationem cordis ex usu cinamomi concitatam, & per modo dicta *acida* denuò sedatam *vid. in M. A. N. C. Ann. 3. pag. 244. Extra paroxysmum* igitur, ut ista *absorbentia* imprimis conducunt; ita in paroxysmo *volatilia salia oleosa* præstantiora sunt. v. g.

℞. aq. meliss. cum vin.

fcenicul. an. ℥ij.

theriac. camphorat. ℥ss.

corall. rub. præp. ℥j.

syr. flor. tunic. ℥vj. M.

Vel ℞. aq. cinamom. cydoniat.

cordial. Hert. Saxon. an. ℥j.

flor. sambuc. ℥ij.

℞. CC. & e vol. acuat. vel

carminat. de tribus (qui speciatim in hypochondriacis, pal-  
pitationem cordis patientibus, est egregius,) ℥j.  
ad ℥ij.

syr. fcenicul. ℥ss. M.

Aliàs *melissa* imprimis laudari solet ad cordis palpitacionem, tam internè ex eadem parata remedia, quam externus fons, cum *melissa viridi* & *fl. borrag. c. aq. rosar. & acet. destillat. calidè applicatus*. Facit huc quod *Forestus l. 17. observ. 1.* refert, in thoracis vulneribus, ex sanguine concreto, ingentes palpitaciones cordis excitatas, curatas per Venæsectionem, & hinc *melissam viridem* & *borrag.* accipiendo, & has cum aq. rosar. & tantillo aceto irritatas calidè cordi admovendo. *Camphora*, *crocus*, *castoreum*, præ cæteris ad palpitacionem cordis laudari solent, sive internè, sive externè usurpentur. Hinc *essentia croci cum essentia castorei & ambre* mista, in paulo largiori dosi usurpata conducunt. *Castoreum* vero jam à Galeni tempore in quavis palpitacione cordis in usu fuit. *Nodus ex croco & camphora* circa cordis regionem suspensus itid. confert: aut *camphora* aut *crocus*, vel hujus loco *castoreum*, cum *urioso*, vel cum spiritu carminativo soluta, & in essentiaz formam redacta, per consensum hypochondriorum palpitantibus conveniunt. In quibus *corallia* & hinc *salia volatilia* in paroxysmo sunt optima. De rosarum, de remediis cor-

anar.



*cinnamon & citro, rore mar. & Elix. junip. Q. E. Matthioli, item de theriaca* & similibus, de quibus ubique Authores loquuntur, ceu rebus per se notis, non attinet plura dicere. Sunt, qui *remedia ex animalium cordibus*, v.gr. ex corde cervi, & corde vervecis & similibus parata commendant. *Sed revera nil valent*, quin præparata horum, speciatim spiritus & salia volatilia ejusdem valoris & usus sint, ac alia ejusdem generis. *Tinct. corallorum c. spiritu C.C.* egregia, & multi usus in tali casu *D. Michaëlis*. Externè ballami, & regioni cordis applicati, interdum aliquid præstant, sed parum saltem spiritus reficiendo graviora symptomata inhibent. Saltim ergò in malo ex passione hysterica nato, abdomini, aut per consensum splenis excitato, lieni emplastra, & in specie huic de Nicotiana cum fructu applicari possunt.

Observandum hic, præter cordis palpitationem, subinde etiam *particulares arteriarum palpitationes* molestæ sunt ægris, ita, ut modo in hac, modò in illa parte sensilis arteriarum percipiatur palpitatione. *Tres* imprimis *causæ* sunt particularis talis palpitationis, sive pulsationis sensus: 1. Inflammatio ejusdem loci, exinde enim arteriæ tenduntur, & ex fibrarum aliquali contractura dilationi renituntur, unde semper dolor pulsatorius supervenit. 2. Est impedimentum quoddam in sanguinis circulo: hujus enim nonnihil in quadam parte sufflaminato transitu, distentæ nimis arteriæ, manifestum pulsationis sensum exhibent. In specie hypochondriaci ex dicta causa pulsationem arteriarum percipiunt, nunc in toto corpore, nunc & in specie in dorso, in regione infra costas proximè, ubi nempe arteria cœliaca, & in specie insignior ejus ramus splenicus situs est. In his arteriæ per consensum splenis aut partium vicinarum aliquid *convulsi* patiuntur, unde rigidiores propter fibras sensibiliter pulsant, & talis pulsatio paroxysmi ejusdem hypochondriaci aut melancholiæ, aut sanguinis vomitus indicium esse solet. *Curatur* hoc malum per *Diæta*, sicut priores duo modi imprimis per *sudorifera*. Depravatur multis modis Pulsus tam cordis quam arteriarum in febribus. Qui communior morbus frequentiorque est

## FEBRIS.

Adeò ut in Proverbium abierit: Vis sine febre mori, eò intricatiorem ejus esse theoriam, & consequenter empiricam in plurimis esse praxin, confirmat Scriptorum Medic. dissensus, ita, ut ne binos quidem exactè sibi consentientes in hoc puncto invenias, ut propterea ab alio in iisdem erudiri potius, quàm sententiam nostram proferre, adeoque alios informare vellemus. Tamen nos ea, quæ fieri poterit, brevitate, seposito omnium partium studio, doctrinam hanc pertractabimus, & quæ nostra sunt, h.e. practica, imprimis considerabimus, pro theoria hypothese eligentes talem, quæ praxi facilius accommodari potest, adeoque præcæteris Medico utilis existit.

Inter



Inter omnia Febrim concomitantia symptomata immediatè nullum magis universale existit, quàm *pulsus notabilis mutatio*, & speciatim pulsus præternaturaliter frequentior, adeò ut rectè signum pathognomicum statuatur februm in genere à *Sylvio*, tam in dissertationibus de natura februm; quam in Praxi: quicquid in contrarium scribat *Deusingius Tract. Disquisitio Anti-Sylviana*. Accedit ut plurimum simul *celeritas*, unde celerem pulsus cum inseparabile cuiusvis febris signum, & quod nunquam abesse possit, statuit *Piens de febb. p. 1. c. 2. p. 12.*

*Magnitudinis & vehementie ratione variat.* Quo major, eò melius signum, laudabilis & æquabilis sanguinis fermentatione turgescentiæ & valcentiæ. Vehemens pariter spirituum influentium vigorem insequens, nunquam rejici debet, adeò ut magnus & vehemens pulsus semper animosum reddat Medicum, in quocunque febricitans statu fuerit: sicut *parvus ac debilis* non nisi vel periculosa sub ægri constitutione, vel maligna in febris adesse solet, & insignem virium labefactionem junctam habere solet.

*Durus* interdum observatur in febris, sed nunquam fausto omine, quin semper tensionem spasmodicam membrarum, in quodam loco plus minus læsarum aut infestatarum, & hinc in dilatatione arteriarum renitentiam aut fibrarum aliquali spasmò sequitur, unde in febris cum inflammatione partium membranarum junctis, v.g. in pleuritide ordinariè observatur. Deinde in febris quibusdam, præsertim malignis, in quibus vis animalis & genus nervosum magis afficiuntur, in quibus etiam citra sensibilem, de qua conqueri possint ægri, molestiam, pulsus durus plus minus observatur, pessimo ut plurimum omine, cum deliria, convulsiones, & mortem sæpius insequi observari.

*Semper bonus est pulsus mollis*, generis nervosi minus mutatum habitum, ac vitium animalium debitum morum ostendens, & fere cum madore aut loci sudore junctus esse solet, & tali ex pulsu sæpius fausta expectari possunt in febre, unde & *pulsus undosus* dictus, ex magno, vehementi & molli compositus, ordinarius imminens sudoris prodromus esse solet in febris, cum in pulsu duro, vel nullo, vel quod absq; *inopigia*, quasi per vim naturæ prodir, sudorem observari, sc. & fibras cutaneas in tali calore tendi, porosq; contractiores hinc esse arbitror, nisi pulsus talis insigniorem partis cujusdam inflammationem sequatur, tunc sudores enim proficui, & ut plurimum pulsu mutationes inferentes, eliciuntur.

Vulgò calorem præternaturaliter auctum signum februm pathognomicum asserunt, utpote in quo ipso febris essentiam positam esse autumant, definientes eandem calorem in corde incensum, & hinc in totum corpus per arterias diffusum. Malè. Non semper convenit febris calor, cum in principio continuarum februm & paroxysmorum intermittentium horror & frigus urgeat. Nec omni convenit febris. Dantur enim febres malignæ, in quibus nil minus, quam calor molestus est,



quæ tamen sunt pessimæ, quod Castrenses dictæ *Helmontio* pertinent, *Tr. de febb. c. 1. §. 4.* imò & frigida febres dantur, utur paradoxon videatur, quæ frigore aut rigore plus minus molestæ sunt, absque æstuatione superveniente. *Conf. Sylv. Dissert. 1. de febris §. 13.* frustra se opponente *Densingio in Disquis. Antisylviana, p. 52.* *Conf. de tali febre frigida, Barhol. cent. 3. epist. 293. 296. 302. Kergerus de ferment. sect. 3. pag. 229.* Nec rarum est, intermittentes diuturnas solo frigore & aliquali rigore statis temporibus invadere sine eo, ut nullus, vel levissimum vestigium ætus superveniat. Quia imò in lectione veterum jam exempla prostant observatarum febrium frigidarum, tam ab *Hippocrate*, quam *Avicenna*, vid. loca allegata in *Rolsinck de febris in genere c. 13.* Ac ipse *Galenus* observavit horrores febriles sine subsequente calore. Vide *Schenck observat. l. 6. pag. 757.* Exemplum febris talis frigida & mihi aliquando observare contigit. Erat hic artifex, qui laborabat perfecta tertiana, anticipando tamen semper duabus horis cum nullo subsequente calore. Patiens inclinabat ad phthisin, ac erat insignis scorbuticus. Paroxysmus ingruerat cum insigni horrore & rigore gravissimo, qui ultra horam integram durabat, postmodum, cum deberet succedere calor, nullus sentiebatur, sed loco hujus acerbissimi doloris totum corpus omnesque artus excruciant, imprimis regionem dorsi & femora, & in specie in regione dorsi lumbari circa locum connexionis mesenterii. Circa finem interdum materia viridissima amaricantis saporis vomitu rejiciebatur, absque ullo calore. Urina erat insignis turbida, crassa cum copioso sedimento. Paroxysmi observabant ordinarium typum anticipando bihorio. Vocatus ergo, cum jam ab uxore purgatus esset, proscripsi ad temperandum acidum.

℞. ☿ Olati

lap. ☿ præp. an. gr. xv. M. propinetur hora 1. ante paroxysmum qui nunc erat quartus; post hoc remedium & frigus & dolores insigniter remiserunt, & quidem blando sudore subsequente, absque tamen insigni corporis incallescencia, die intermissionis.

℞. ☿ sal armon. ʒij.

cochl. ʒi. M. capiantur 40. guttæ, bis in die intermissionis, & die sequenti paroxysmi tantundem bihorio ante paroxysmum. Paroxysmus eodem modo redibat, cum frigore absque calore, remittentibus doloribus. Die 9, intermissionis continuavit hunc ☿um. Ante paroxysmum ordinavi:

℞. Sal. absynth. ʒj.

lapid. ☿. ʒß. M. usurpetur bihorio ante paroxysmum, qui non rediit. Die intermissionis continuavit ☿um, & tempore paroxysmi adhuc semel præfatum ☿em, sicque curatus fuit.

Sub-



*Subiectum sive pars affecta* in febris sunt sanguis & humor influi, quoniam tam intell. nō, quam locali alterati omnia illa pathemata inferunt, quibus febricitantes corripuntur. *Sanguinem affectum*, præter alterationem pulsus supra notatam, & sudor, sine quo nulla febris perfectè judicata sive curata dici potest, & coctio ac cruditas materiæ in sanguine contentæ, perque urinam manifestatæ & icterus, febris facile superveniens, & alteratio insignis sanguinis, quæ post absolutas febres observatur, eò major, quo diuturnior febris extiterit, dum indolem acidam exinde acquirere rectè dicitur à *Majovæ Tract. de Oo pag. 159.* confirmat. *Spiritus vero influos* simul laborare, confirmat opii ulus, qui spirituum sistendo impetum, intermittentium paroxysmos nunc penitus sistit, nunc saltem postponere notabiliter, & minus hinc affligere facit. Tandem quod pariter in continuis obtinet, quorum ferociam & mitigare, interdum penitus extinguere notatum. *vid. Barthol. cent. 1. hist. 84.* Ut autem palliativum saltem subinde sit remedium; eò ipso tamen, quo insigniter febres mitigari ac mutari ejusdem usu, spiritus saltem alterante & afficiente, observatur, & spiritus simul affici in febris manifestum evadit. Adhæc, qui gravibus, etiam sanissimi, corripuntur undecunque natis doloribus, aut diutius perseverantibus, febrilia exactè patiuntur symptomata, qualia in continuis mitioribus contingere solent doloris occasione, in motum nimium adactis, & inde alteratis in suis proprietatibus spiritibus influis, à quibus solis tunc febris. *Nec obstat* ephemeram aut synocham sine putredine dicas tales febres, eo ipso enim, quo ephemerastales unius sive plurium dierum à spiritibus affectis, & undecunque alteratis, unice dependere concedis, spiritus in febris aliis quoque multò magis affici negare non poteris. *Id quod magis confirmant maligniores*, spiritus magis quam sanguinem alterantes, quæ tunc etiam, ubi urinæ sanorum similes exsunt, nec adèd insignis, pro ratione scil. pessimè habentis ægri, à statu naturali in pulsu mutatio observatur, adeoque sanguis minus alteratus notatur, tamen ægros facillimè trucidare solent, spirituum magis affectorum culpâ. *Imaginatio* tandem, quantum in concitanda febre valeat, cum meticulositate, aut horrore ægri, sanus sibi facile similem febrem contrahit, aut dum ludicris, aut ridiculis amuletis intermittentes subinde fugantur, ex sola imaginatione, spiritus saltem afficiente, per se novissimum est.

*Consistere ergò dicimus febrem formaliter in fermentatione sanguinis præternaturali*, eaque depravata, sive ut alii loquuntur, disproportionata, subinde simul insigniter aucta (adeoque plus minus quasi effervescente) cujus occasione & alterantur spiritus, & rarefacti magis impetuosiores & intensius intalescentes redduntur, inducta à fermento peregrino, nunc sanguinem,



nunc  $\sim$ , nunc utrunque immediatè afficiente, quò depuretur eadem, aut separetur, quod ipsi præternale & hostile existit.

Omnis igitur febris est motus naturæ, siue ut aliàs dicunt, quædam ejus lucta, quæ  $\sim$  plus minus alteratorum ope, & fermentativi in sanguine motus auxilio, id quod hostile seu inimicum œconomix animali existit eliminare satagit.

*Quatuor primaria sunt symptomata*, in quavis febre notabilia: 1. Mutatus pulsus. 2. Calor siue æstus plus minus intensus. 3. Frigus horror & rigor. 4. Urina mutata tam secundum liquorem, quam secundum contenta.

*Pulsus mutatus* sequitur vel  $\sim$  animalem, cor moventem, vel sanguinem in cordis ventriculis, præsertim sinistro turgentem, qui irritando cor, spirituum provocat motum, hinc Pulsus. Ex irritatione igitur frequentia & celeritas, ex impetu spirituum vehementia, ex sanguine irritante plus minus turgescence, magnitudo, de quibus supra. Vehemens semper bonus æstimandus, quia robur facultatis moventis ostendit, licet etiam nonnunquam ex irritatione facultatis fiat, conantis expellere, quod noxium est, ut initio dolorum & in conflictu critico, ut loquitur *Poterius l. i. c. 47. de febb.*

*Æstus omnis occasionalis fit ab acido*, crasin sanguinis immutante, & inde fermentativum ejus motum, hinc spirituum alterationem & majorem incalescentiam & fervorem inducente. Cum ipsi spiritus, forsitan certi volatilis ac subtilis acoris ratione, caloris sensum in animalibus undique distendant, quod tamen ulteriori considerationi relinquo. Et quidem ex febres, in quibus sanguis simul alteratur, & ad motum insigniorem fermentativum præternaturalem disponitur, intensiori æstu comitatæ esse solent, remissiori, quæ primariò ex  $\sim$  alteratione accidunt.

*Peccare autem in intensiori corporis æstu, adeoq; in febribus primariò acidum, probatur partim partim illustratur sequentibus.*

I. In vulneribus & ulceribus, & hinc dependentibus febribus symptomaticis, vinum & quælibet acida nocent, quia inflammationem in vulnere & æstum febrilem in corpore intendunt. Quæ omnia præservantur & curantur interne per lapill.  $\odot$ . & similia, & per externa Hina, acidum imbibentia. *Est enim Huius chirurgorum patronus*, vulnerum & ulcerum pathemata, ab acido nata, curans: non secus ac  $\odot$   $\odot$  li vulnerum corruptionem tollit, ut loquitur *Helmont*, acidum imbibendo & corrigendo.

II. Pleuritides, anginae, & quælibet inflammationes internæ, tam in principio, quam in progressu ad suppurationem tendunt, febrim continuam acutam junctam habent, h. e. æstum continuum intensum. Jam vero morbi hi extra controversiam ab acido originem ducunt, hinc per acidum absorbentia remedia promptissime curantur, verbi gratia dentem apri, maxillam lucii piscis,  $\odot$  ia volatilia quælibet, stercus equinum, &c.

III. Ery-



III. Erysipelaceæ aliæque, sponte sua, & à causa interna, enatæ inflammationes cum æstu & ardoris manifestis sensu, & non raro gravi junctæ febre cum externo ardoris & ruboris perquam sensibili indicio ab acido originem ducunt, hinc præter interna modò dicta similia externe conducunt, acidum istud absorbentia optima sunt remedia, verbi gratia cæta, cerussa, ☿ & ephhemata Hyalina, lac virginis, &c. ablato per hæc in Erysipellate acido, junctæ febris pariter evanescit.

IV. Intermittentes ex acida viscida stomachi cruditate originem obtinent, hinc *alkalia* etiam tam fixa, quàm volatilia, ut ☉ *absinth.* & ☿ *sal armoniaci*, quàm *testacea*, ut *ostracodermis*, ut *specif. Crollii* & *Strobelbergeri*, quæ illas curant, & paroxysmi fermentum acidum tollunt: in *quartanis* speciatim *Qualia* ☿ *Hyalina*, intensius acidum absorbendo conveniunt.

V. Febres, catarrhales dictæ, à lymphæ acrimonia originem ducunt, quæ quo acidior fuerit, eò intensiorem cephalalgiam, ferinam magis tussim, lancinationes artuum graviores, & speciatim intensiores astuaciones vespertinas, & nocturnas, & febriles infert. Unde & volatilibus, ☿ *sal armoniaci*, inprimis *anisato*, *liquore CC. succin.* optime curatur, acidam lympham corrigendo, it. *opiativis* vitium lymphæ motum suspendendo.

VI. Variolæ non secus ac Morbilli intensissimum æstum junctum habere solent, qui erumpentibus istis cessare solet. Acidum aut in variolis peccare, præter symptomata, ab acidi acrimonia & erosione nata, v.g. suppuratio cutis, in foveas erosio, interdum ossium caries, pulmonum exulceratio; cura per absorbentia, per invertentia salia volatilia, Tincturam tartari, &c. abunde confirmat.

Arthritis VII. quælibet, primariò vaga, & hinc etiam fixa, nisi hæc nimis inveterata fuerit, cum febrilibus symptomatis plus minus ingruit, & præter æstum, in vaga subinde admodum intensum, pulsum celerem & frequentem excitat: scilicet acidum, ut in arthritide dolores excitat, ita & æstum & ardorem infert febrilem; unde & acido devicto, dolores evanescunt, & ardores extinguuntur. *Confer. Tachen. Hippocr. Chym. edit. 2. p. 417.*

VIII. Febres istæ, quæ ex retropulsa vel scabie adutorum, vel achoribus infantum oriuntur continuæ, & subinde admodum periculosæ sunt, in infantibus etiam ut plurimum cum diarrhæa junctæ, ab acido salso, plus minus viscido, originem habent, adeoque superiora confirmant.

IX. Febris lenta quasi hectica, ex ulcere partis cujusdam internæ, speciatim pulmonis nata, & à sanie purulenta originem habens, idem confirmat. In sanie autem purulenta acre inprimis considerandum, & hoc non urinofum, sed acido salsum, hinc læsa sanguinis crasi, vitatur ejus fermentatio & astuatio.



X. Infantes verè tormina patiuntur ex acido lactis vitiatò, testes sunt excreta viridia, item semigrumosa: hæc si diutius durent, sequitur æstus febrilis totius corporis; Interdum satis contumaces quoque, iidem occasione acidi excitatæ, superveniunt convulsiones: sed destructo acido in primis viis per absorbentia & volatilia omnia ista cessant.

XI. Urinæ videntur idem illustrare. Hæ in febribus intensius tinctæ & perquam rubræ observantur, & quò intensior æstus vexat ægros, eò magis flammæum & rutilantem contrahunt colorem, nisi turbentur. Declinante febre, ac deservescente æstu, naturali citrino colore denuo apparent. Intensiorem hunc colorem ab acido esse, mechanica chymia docet, cum ab acidis instillatis  $\sim$  u  $\oplus$ -li,  $\odot$ ,  $\triangle$ ,  $\ominus$ , etiam aceto,  $\square$  intensius rubescant, quæ ab alcali,  $\odot$  o  $\overline{p}$  per deliquium, lixivio cinerum clavellatorum, aut nonnihil pallescunt, aut saltem nullam in colore mutationem patiuntur. Scorbuticorum urinæ subinde intensissimè tinctæ sunt, absque febrili æstu, ab acido saltem luxuriante urinam ita alterante.

XII. Symptomata, quæ à vini abusu, v. g. Rhenani accidunt, ex acido tartareo volatili imprimis originem ducunt, verbi gratia orexis, æstus corporis, cephalalgia, pulsus febrilis, &c. similia ferè symptomata febrium: hinc  $\sim$  sal armoniaci, vel pulveres præcipitantes, os sepiæ, vel lac ipsum ista compescit.

XIII. Æstuationes vagæ & phlogôses, quæ hypochondriacos sæpius affligunt, ex effervescentiâ in primis viis, ab acido primariò excitata originem ducunt. Hinc præcipitantibus dictis coralliis, ebore, alcalibus fixis, ferè cicurantur, & correcto acido emendantur.

XIV. Similia observare possumus in soda sive ardore stomachi, æstus ille ardorque, unde nisi ab acido: hinc, acido hoc præcipitantibus correcto, soda etiam evanescit.

XV. Considerationem etiam meretur, quod *Tackenius in Hippocr. chym. c. 13.* remedia vegetabilia calida, acido prædominante, frigida verò alcali superante dari asserit. Sanè calida omnia resinosa substantiam obrinent, eamq; acrem, in qua vis calefactoria residet: adeoque  $\odot$  aut substantia ab acido concentrata gaudent. Hinc resinosa vel liquefacta, vel destillatione resoluta in  $\sim$  ardentem, intensè calefaciunt: porro  $\odot$  destill. C. C. aut terebinth. in forma propria assumpta, calidissima sunt: per digestionem verò cum alcali fixo in sal volatile mutantur, quod macrum (purum) nec  $\odot$  sum, nulla caloris vestigia exhibet, calido, i. e. pingui acido in sale fixo remanente. Sane sæpius observavi in febribus intermittentibus æstum & ardorem ex usu  $\sim$  \*ci simplicis, ante paroxysmum adhibiti, multum remisisse.

XVI. Illustrat negotium nonnihil, quod ardoris iste sensus, qui post combustionem ab  $\Delta$ itis subjectis remanet, sit ab acidi spiculis, in parte læsa relictis, unde



unde per saturnina, per alcalia animalium, sperma ranarum, urinam humanam, & sal armon. &c. promptum levamen & refrigerium. Videtur ergo æstus oriri occasionaliter ex acido præternaturali, volatili sive tali, quod sanguini commiscibile, nonnihil naturalem ejus fermentationem turbare, & cum particulis alcalinis & O<sup>2</sup>is præternaturalem quasi effervescentiam constituere possit. Sub qua & ipsi spiritus geniti acriores, hincq; calidiores & fervidiores existunt, à quibus cum sanguine per universum corpus ex præcordiis calor diffunditur. Equidem plures ex bile ardoris rationem, tam naturalis, quam præternaturalis febrilis, derivare amant. Sed 1. An ex bile ardor oriatur iste, dubium. 2. Posito ex bile eum oriri, queritur quâ ratione fiat: an magis ab ejus O<sup>2</sup>o, in recessu acido volatili imprægnato: an verò ab alcali (si quidem id extra artis opem bilis formaliter possidet,) ejus origo sit. 3. Unde in febribus intermittentibus, quæ quasi tot continuæ sunt, quot paroxysmos habent, amara, resinosa, bili quasi analoga, & hinc alcalia volatilia tam proficua sint.

*Observetur hic caloris duplex in febribus differentia:* 1. vel humidus, vel siccus. 2. est vel mitis vel acris. *Humidus, sive vaporosus*, aliàs semper melior sicco: *Oritur* à juncta copiosa transpiratione, quæ ferè præsupponit cutim mollem, & ejus fibræ minus sint tensæ, & ostendit talem febrilem in sanguine commotionem, qua copiosè secedant, & mediante sero emittantur particulæ heterogeneæ separatæ sive coctæ.

Contrarium fit in *Sicco* calore, quo cutis arida, & quasi squalida deprehenditur, ac inordinatam particularum in sanguine fermentationem & insignem confusionem. Quum præsertim animalium, præternaturali impetu, fibras plus minus stringente, innitit. *Mitis calor*, vel *acris sive mordax* cras in sanguinis & spirituum sequitur, qui minus acrioribus particulis & inis, præsertim acidis effervescentibus turgidus, mitiorem, sin copiosioribus aut acrioribus iisdem sit imprægnatus, acrem, ad tactum mordacem, tanquam si igneæ particulæ tactui se insinuarent, calorem repræsentat.

*Frigus, Horror & Rigor*, non nisi gradualiter differunt. *Frigus* quod attinet, non rarum est, quod febricitantes conquerantur de frigore, & multo magis de horrore, utut ab alio calidi observentur, aut licet extremæ manus, pedes & nasus frigus actuale contrahant, item palleant ac ungues liveant, corpus tamen ipsum calidum plus minus observatur: Nempe membranosarum saltem partium pathemata hæc tria sunt, quæ ab acido febrili vellicatæ, motus convulsivos patiuntur. Unde pro horum graduali differentia, si leviores sint, & vix tali appellatione dignæ, in quibus saltem fit cutis anserina, frigoris sensu interdum imponunt ægro, si graviores

sint



sint, ita ut sensibili convulsione quatiantur membra, & per consensum simul non nihil afficiantur muscoli, Rigor existit, medio modo si se habeat, horror dicitur.

Sanè interdum tam gravis rigoris est insulcus, & tanta convulsiva membrorum extremorum ac totius corporis conquassatio, ut epilepticis similes concutiantur. *Afficiuntur aut sub hoc rigore qualescung, sesiles membranae*, non panniculus saltem carnosus; quæ plurimum est opinio, sed etiam aliæ quævis membranæ, etiam internæ, ventriculi puta, intestinorum, mesenterium, &c. & aliæ quævis. Cum enim sentiendi vi polleant exquisitâ, si ab acri, in specie acido, irritantur, rigores fiunt. Hinc in *colicis doloribus* rigores frequentes accidunt. *Abscessus* iidem quilibet interni, dum rumpuntur, & ita membranas, quæ eas ambiunt, perfodiunt, rigores superveniunt. De hoc vide pluribus agentem *Piens Tract. de febr. part. 1. c. 7. pag. 254. & seqq.* Sanè rigores & horrores, qui intermittentium inchoant paroxysmos, non nili ex præcordiis sive partibus membranosis in primis viis affectis excitantur, ut rectè docet *Fernel. Pathol. l. 4. c. 10. p. 248.* Quod etiam de iis asserendum, qui in principio continuarum contingunt.

Illi vero, qui in continuarum cursu, tam benignarum, quam malignarum accidunt, & præsertim circa statum morbi affligunt, ex irritatis, & hinc quassatis partibus membranæ externis; inter & subcutaneis ferè contingunt, & in *benignis*, sudoris præsertim critici ferè prænuncii existunt, in malignis vero excretionis intercutaneæ purpuræ, pustularum & similibus sunt indices.

*Urinas* quod attinet, *tinctura harum intensior* ab acido prædominante, & hinc cæteras particulas magis concentrante, originem ducere supra insinuatum fuit, ubi de ardoribus, & ab hoc acido plus minus exaltato, aut enervato & saturato, etiam coctionis & cruditatis materiæ morbificæ in sanguine ratio, ac in urina signa dependent. Nempe *coctio* in separatione, & quasi præcipitatione heterogenei ex sanguine consistit, quod cum sero dilutum per renes transcolatur & in urinae fundo confidet, in signo coctionis perfectæ. Sicut dum nil secernitur, & in sanguine intimè plus minus commixta sunt omnia, nil separari potest, & cruditas est, cujus signum urina clara, absque sedimentis excreta. Quod si verò mediante fermentatione & motu fiat successivè extrusio & separatio istarum quasi sæculentiarum, urinae crassiores, magis contentis saturatæ, & quæ spontè turbatæ prodeunt, adeoque inchoatam coctionem ostendunt: Quod si turbidæ maneat, adhuc ingentem motum, & inordinatam fermentationem & confusionem in Massa sanguinea innuunt. Sin vero turbidæ clarescere, & ad fundum contenta dimittere incipiant, signum progressus ulterioris in coctione ostendunt. Rem exemplo quasi simili non nihil illustrabo. In febre continua aut paroxysmo intermittentium Massa sanguineæ

sanguinea e  
content p  
rus, quo n  
disproporti  
recuperata  
existit.

In T  
ricula Ma  
earum pr  
ciuntur,  
tur, ve  
non sunt  
sub tum  
ta, ita  
tum, ex  
stum est  
utiles,  
liquis m  
mittent  
liquata p  
paroxys  
tia ferm  
quali cri

Q  
taliter ab  
fermentat  
insinuat  
teibiles,  
tionis u  
ex Massa  
corporis  
fæculen  
tione, v  
ticos, ti  
ritus, o  
nam secul  
per obse  
de, tan



sanguinea est similis vino aut musto generoso fermentantibus. Nam utut variis content particulis ex salibus, tamen ejus acido & alcali fit fermentativus motus, quo mediante separantur, & ad fundum successivè præcipitantur partes disproportionatæ, non benè miscibiles, sub fœcum nomine, quò factò ex recuperata debita particularum textura vinum quietum laudabile ac perfectum existit.

In Turgescencia febrili simile quid occurrere videtur. Nam & ibi particula Massæ sanguineæ, mediante tali fermentatione, separantur, & quædam earum præcipitantur, quarum quædam cum urinâ sub forma sedimenti rejiciuntur, donec superveniente critico naturæ motu uno impetu vel ejciantur, vel in locum quendam seponantur. Sed hæ ipsæ paratæ fœculentiæ non sunt solum recrementa morbosa; sed etiam partes ipsius Massæ sanguineæ sub tumultu isto fermentationis febrilis alteratæ, mutatæ, & simul præcipitatæ, ita unâ forâs emittuntur, non secus enim ac sudore artificiali per motum, exercitia, non serum purum aut recrementosis saltem particulis commistum est, quod emittitur, sed etiam ex ipsa Massâ sanguinea copiosæ particulae utiles, fermentationis auctæ motu attritæ, hinc in falsum mutatæ, & ita reliquis minùs sociabiles factæ, unâ excluduntur: ita etiam in sudore intermittentium Massâ sanguinea sub paroxysmo in tantum, siue plus minus, colliquata propriæ substantiæ unâ jacturam facit. In intermittentibus quot sunt paroxysmi, tot sunt febres quasi particulares, in quibus post horrorem turgescencia fermentativa, in qua materiæ coctio peragitur, accidit, hinc in fine quadam quasi crisi copiosus sudor supervenit.

Quamdiu igitur sanguinis crasis, unicuique homini propria, fundamentaliter ab acido & urinoso dependens, naturaliter proportionata est, tamdiu fermentatur & spiritaliscit sanguis: simul verò ac ista læditur, imprimis si se insinuent particulae facilè fermentescibiles, & non ritè cum integra massa miscibiles, ex primis viis, fiunt fomes pro febre. Ab isto negotio *cruditatis & coctionis universa crasis dependet ratio*, quæ in præcipitatione fœcum, subitaneæ ex Massâ sanguinea exclusione, & vel extra corpus excretionem, vel in quendam corporis locum congestionem in tumorem ac abscessum consistit, ipsis separatis fœculentis priùs circa exclusionis locum, ex factâ ibidem, aut in vicinia, irritatione, varia symptomata occasionaliter concitantibus; dum v. g. sudores criticos, rigores repetiti, hæmorrhagias criticas, agrypnix, deliria, narium pruritus, oculorum splendores, cephalalgia, obauditiones, præcedere solent; nam secundum Hippocratem, nòx, quæ antecedit crisin, gravis. *Hinc semper observari*, quamdiu in febris præsertim continuis, urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu consistit ambiguo: quando verò adsunt signa



coctionis, semper quolibet fausta possumus ominari, ita ut non meminerim, vel legisse me, vel observasse, cum coctionis signis quenquam interisse. E contra quæ coctæ jam plus minus apparebant urinæ, si recrudescant denuò, semper periculum portendunt, si nempe sedimentum, quod primis diebus subsiderat, deficiat: aut si urinæ crassæ intensius tinctæ pallescere, aut tenuiores excerni incipiant, id quod nunc per causas externas, vini generosi potum, iracundiam, pastum paulò copiosorem præsertim carnosarum vel similiarum; nunc per causas internas, ex deficiente naturæ motu & dominio causæ morbificæ evenit. Curabam puerperam purpurâ affectam, procedebant omnia mediocriter. Die 9. urina crassa, intensè tincta, turbata, & sedimentum deponere incipiebat. Interea etiam purpura utcumque erumpebat, coctionis signa augmentabantur, ipsâ ægrâ commodè se habente. Sed die 15. cum nox prægressa fuisset inquieta, manè urina exercebatur pallida, tenuis, vix citrina, ex improvviso delirium, convulsiones, circa meridiem mors: quod hic subitò factum, hoc interdum successivè & quasi aliquot dies evenire solet. Propterea rectè *Poterius lib. 1. de febris c. 42.* coctionem veram, continuam & universalem esse debere asserit; vera quidem, quia non rarò falluntur Medici, opinantes, veram esse coctionem in urinis, ex crudo humore in fundo earum subsidente, quasi verum sit sedimentum. Continua etiam debet esse coctio, ut fida sit: Fit enim aliquando, cum non ex toto humor à natura superatur, ut mane appareat cocta, vespere autem delitescat coctio. Debet etiam esse universalis & totius materiæ morbificæ: Frustra namque in parte quapiam coctio suscipitur, morbo in reliquo corpore crudo existente. Hæc Poterius.

Opus hoc coctionis solius est naturæ, & hanc insequens crisis, quam arte adjuvare non possumus, saltem impedimenta, naturam gravantia, remove vallemus. Motus hic naturæ circa coctionis negotium in eo consistit, ut acidum fermentativum morbosum, unde febris oritur, corrigatur, & temperetur, adeoque in  $\Theta$ sum, aliarum particularum additione mutatum, ex Massa sanguinea extrudatur, id quod mediante fermentationis motu accidit: *Cruditas enim*, & arctior omnium particularum in sanguine unio, & hinc procedens acrior effervescentia febrilis, *ab acido dependet*, quo dominante intensior fermentatio, nulla secretio fit. Dum vero per mutuam collisionem quasi acidum febrile fermentum successivè ab alcalibus arreptis saturatur, in  $\Theta$ sum mutari, & sic ex compedibus sanguinis solvi, i.e. liberari incipit, etiam aliæ particulæ heterogeneæ, nec sanguini debitè assimilabiles, ab acido tamen vitioso unà colligatæ & quasi concentratæ, simul ex sanguine extrudi, & hinc ex ejus liquore, fermentationis medio, (qua partes unibiles ritè coeunt, non unibiles secernuntur.) præcipitati solent, coctio, & copiosorum cum  $\square$ a contentorum excretio accidit. *Conf. Sylv. l. 1. Prax. c. 55. §. 14. & seqq.* Hinc etiam in febribus malignis, si

urinæ



urinae sanorum similis excernuntur, signum periculosum est, scil. spiritus in-  
fluos imprimis esse affectos, & ipsam massam sanguineam à fermento maligno  
citra insigniorem fermentationis ejus turbationem corrumpi, & in textura sua  
vitari significans; unde & cum minori ardore tales febres junctæ esse solent,  
summa vitium potius prostratio, & nervosi generis symptomata magis urgent:  
sin tamen in his etiam malignioribus coctionis veræ signa se exhibere inchoant,  
bene sperare Medicum jubent, & si salubres sunt tales, in fine coctione materiæ  
morbificæ ejusque signis in □a terminari assolent.

*Ex dictis hætenus patet, nec calorem, nec frigus esse de essentia febrium,*  
aut rationem earundem formalem constituere, sed saltem esse symptomata febri  
supervenientia, non secus ac sitis, aut cephalalgia, easdem ordinariò comitari  
soler. Idem autem est calor in statu sano, temperatus, qui in febribus nimis cor-  
pus calefacit, idem deficiens, idem fiendi motus, idem subjectum recipiens, sal-  
tem in majori gradu omnia.

*Patet deniq, quid de putredine, adeo à veteribus in febribus hinc putridis*  
*dictis decantata, habendum,* nempe quamdiu viventes corporis partes sunt, pu-  
treo propriè dicta locum nullum habere potest. Unde & veterum ista putredo  
non potest concipi, nisi per fermentationem explicetur. Hinc *Sennertus*, ut ut  
statuat, & explicet adhuc febres putridas. *Tr. de febb.* sæpius tamen vocabulo  
ebullitionis, effervescentiæ, &c. utitur *Conf. etiam Piens de febb. part. I. p. 236.*  
*& seqq.*

*Patet etiam non cor,* aliâve partem quandam solidam esse subjectum fe-  
brium primum, nec vasa, aut majora, aut minora, sed sanguis &c. Alia ta-  
men ratio est foci febrilis, cujus subjectum viscus quoddam esse potest. Sic cer-  
tum est, focus intermittens, ubi nascitur fermentum febrile, esse ventricu-  
lum: sic in febribus symptomaticis ulcerum, & vulneris, afficitur quidem in febrī  
MS, focus tamen est in parte ulcerosa vel vulnerata.

Non confundatur tamen focus morbosus cum receptaculo producti morbofi.  
Sic enim chronicis febribus superveniunt subinde tumores: v. g. Quartanis di-  
uturnis lienis tumor supervenire solet. Interim universalis est morbus febris,  
cum sanguinis & spirituum ratione totum corpus necessariò affligat, adeoque  
ratione partium solidarum ita denominatur, quas tamen, nunc æqualiter, nunc  
inæqualiter affligit. Hoc fit ratione circumstantiarum accidentalium, prout  
fermentum febrile, aut corporis humores, sub febrili motu plus minus alterati,  
aut etiam producta humorum morbosa, &c. aptiora sunt, ut unam vel alteram  
partem magis vel minus afficiant. Ipsæ etiam partes solidæ vel connato, vel ac-  
quisito ex vitio, quò imprimis partium robur inæquale pertinet, magis vel minus  
dispositæ sunt, ad suscipiendam ex causis prædictis alterationem sive immutatio-  
nem. Pro talium enim circumstantiarum ratione accidentales istæ febrium dif-  
ferentiæ



ferentia: continuarum quidem in Pemphigodem, Esseroden, Eloden, intermittentium vero in tussiculofam, deliram, asthmaticam, &c. oriuntur. Forsan etiam & huc referenda venit febris illa continua, in qua lateris sinistri totius æstus, & dextri frigus. *vid. At. Med. Hafs. vol. 2. p. 137.* Item febris ista brachii dextri particularis quotidiana in *M. A. N. C. Ann. 3. p. 381.*

Quoad *Differentias febrium reales*: Febris I. ratione conditionis causæ, & inde acquisiti moris, est vel benigna, vel maligna. II. ratione modi afflictionis est vel continua, vel intermittens. Continua ratione generationis est vel primaria, vel secundaria, hæc vel comitata vel symptomatrica. Primaria est vel continens, Synocha dicta, vel continua plus minus periodica, Synochus dicta. Eadem continua, ratione cursus seu motus febrilis, est vel acuta, vel lenta. Tanta tamen varietas in unaquaque febrium classe subinde observabilis est, ut certis eam cancellis includere impossibile sit.

*Causæ* febrium in genere erunt omnia illa, quæ crasin M. S. naturalem pervertere, & talem discrasiam, sive talem heterogeneitatem & disproportionatam texturam particularum componentium inducere valent, ut exinde salium activitate vitiatâ, fermentatio præternaturalis concitetur. Hæc ipsa in genere, qualiacumq; fuerint, *fermentum febrile* appellare placet, cujus occasione nempe sanguis, præternaturalem fermentationem concipit, & simul insigniter alterantur. Immediatè tale fermentum sanguinem, & hoc mediante spiritus afficit, seu è contra mediatè, & his mediantibus sanguinem inquinat.

Tale fermentum est, v. g. quod ex insensibili transpiratione prohibita & retenta febrim subinde accendit. Tale fermentum est, quod ex ulcere quodam interno, v. g. phthisi pulmonali febrim inducit. Tale fermentum est, quod in Erysipelate aut pleuritide febrim acutam infert. Tale fermentum est, quo scabies retropulsa febrim periculofam subindè excitat. Tale est lymphæ acidior febrim catarrhalem inducens. Tale fermentum est, quod ex fructuum horarum abusu subinde febre nos mulctat. Tale fermentum est, quod contagii sub tegmine nos inquinat. Tale fermentum est, quod ex usu rei horridæ, ac faciliè alterabilis, in primis viis, sæpius febrim intermittentem excitat.

*Fermentum tale nunc extrinsecus nobis communicatur* per assumptorum aut inspiratorum varietatem, quo & contagia pertinent; *nunc intus generatur*: vix tamen febrilem alterationem inducent talia nisi volatilis plus minus naturæ & v. g. bus aut sanguini commiscibilia fuerint. Sine hac enim conditione variam quidem immutationem, non tamen fermentativam turgescientiam febrilem in sanguine concitare valebunt.

*In specie, quoad intus genitum fomitem febrilem* speciatim ad primas vias respectus



respectus habendus, quarum errata fermento quidem digestivo acido volatili, ex ventriculo imprægnata, & interius sanguini commiscibilia, defectu tamen debitæ digestionis & perfectionis in primis viis, quæ in Æther volatile temperatum abire debebant, non adeo homogenealiter assimilabilia existunt, quin inordinatam fermentationem citius vel tardius inducant.

Notum hoc in primis est ex febris intermittentibus fomitem simpliciter in primis viis habentibus; continuarum vero præsertim benignarum plurimum par omnino est ratio, si erratum primarum viarum sanguinem sive lympham inquinat, & eatenus, fermenti instar, continuam fermentationem in sanguine efficiat. Siquidem intermittens febris paroxysmus quilibet integram quandam benignam, per crisis sudoris finientem, febrem continuam repræsentat. Unde non rarum est, ex intermittente tertiana continuam fieri, & contra ardentem continuam in intermittentem terminari aut complicari hæc duodenuo, ut in continuis periodicis obvium est.

*Fermentum* hoc in benignis videtur esse *acida plus minus natura* (ut ex iis, quæ supra de æstu corporis, rigore, &c. dicta sunt, probabiliter concludi potest:). Imò etiam in malignis, sed in his acrius, volatilius & penetrabilius, ratione quarum proprietatum & modis tam promptè communicabile existit, adeoque ad veneni naturam, quæ in intemperatura insigni simpliciter consistere videtur, propius accedit. Non autem humorum copia & moles, seu, ut vocant, saburra hanc fermentationis læsionem semper infert, sed sufficiunt interdum miasmata quædam fermentativa, vel inspirata, vel relictæ, quæ quatenus sunt activa, & undique per contenta corporis diffusiva (odorum ad instar) facile vel totam Massam sanguinis, motum salium æqualem pervertendo, vel spiritus influos, eorum texturam vitando, inficere possunt. Qualia fermenta v. g. contagia sunt miosa in malignis, quæ vel mibus vel sanguini se insinuantia, nunc citius, nunc tardius potentiam suam alterativam exercendo, febris occasionem suggerunt. Adeoque minimum subinde est, quod peccat in febris, seu materialis causa, quod tamen fermentationis medio multiplicabile existit, unde intermittentium insignis diuturnitas, continuarum vero malignarum copia contagia miosa.

*Causæ remotæ* variæ ac multiplices ex rerum non naturalium usu vario & abusu sunt derivandæ. Notabile tamen est, quod ii, qui laborant in quibusdā fodinis, raro febris affligantur. It. quod ii, qui quibusdā unguento peruncti fuerunt, ad longissimum tempus vix febris corripiantur, teste *Poterio lib. 1. de febb. s. 15.* Nec obstat, quod *Panarolus pentec. 5. obs. 39.* referat, febrem periculosissimam obhydrargiri inunctionem ad pectus & axillas contra pediculos, nam forsitan febris occasione inflammationis, in dictis locis enata, inducta fuit,




*Prognosis februm in genere* ex pulsu & urina desumitur, ille prout vehementior, major & æqualior, hæc prout coctionis signa laudabiliora ostendit, eò meliora sunt indicia, & contra; atque ex his etiam principaliter tempus & modus eventus cognoscitur.

*Cura februm in genere* consistit in eo: I. Ut fermentum febrile acidum volatile, specifici tamen saporis, corrigatur, alteretur & enervetur sive quasi figatur, & hinc in saporem & texturam minus activam mutetur. II. Ut materia vitiosa peccans fermenti talis, vel vehiculum, aut fomes (mediante quo v. gr. ex primis viis, fluidis corporis contentis, speciatim sanguini permiscetur, ut in intermittentibus aut continuis benignis,) vel productum ab isto fermento ex naturalibus corporis contentis fluidis, per horum fermentativam alterationem genitum (v. g. copiosus ichor in variolis) ab iis, præsertim à sanguine separetur. III. Utrumque, qua data porta imprimis per peripheriam cutis eliminetur. *Opus hoc est vel solius naturæ, vel solius artis, vel utriusque simul.* *Solius naturæ* opus est hæc cura, dum coctione materiæ morbificæ, & hinc factâ crisi expedit. Unde in veterum methodo medendi Medici agebant spectatores naturæ, observando coctionis signa & tempora, & hinc expectando crisin, quibus ritè se habentibus morbus judicabatur & salvabatur ager. *Solius artis opus est*, quando remediis specificis antifebrilibus fermentum febrile enervatur, & corrigitur, id, quod superest, sponte sua & absque morbofo conatu, curante natura. Talia sunt v. g. specifica febrilia intermittantium, ut febrifugum *Riverii*, aut (specificum febrile *Kergeri*, aut in quartana specificum febrile sive China Chinæ, (nempe  $\mathcal{L}$ . Chin. chin. 3ß. sal armon. 5j.) aut *Helmontii* diaphoret. Paracelsi quarumvis februm rhizotomos.

*Artis & naturæ opere simul curantur* in methodo hætenus communiter recepta, qua naturæ fermentationis sanguinis febrilis medio, laudabiliter agenti & coquenti, *auxiliatrices opes ferimus*, impedimenta illius, sordes & fomites primarum viarum removendo. Hinc aut temperantibus aut absorbentibus, aut diaphoreticis, vulgò præcipitantibus dictis, appropriatis aliis fermenti febrilis vim, & vitiosorum humorum orgasmum refrænando, mitigando & plus minus enervando, & hinc nata gravia symptomata, motum & impetum naturæ plus minus frangentia, mitigando. In quem finem in genere V. S. purgantium, opiatorum & diætæ usus observandus venit.

Auxiliatrices opes ferimus naturæ rectè agenti, h. e. quæ fermentationis medio coctionem ritè molitur pro futurâ excretionē. *Sed quid agendum Medico, cum vitiosè agit natura*, h. e. cum crudâ adhuc materiâ excretiones symptomatice in principio aut incremento instituit eadem irritata, sive turgeat plus minus materia peccans, ut aliàs dicitur, sive non? Coacta sanè agit natura, unde & debili-



bilant ægrum tales excretiones, & absque *evacuatione* fiunt, quas tamen ubi presseris arte, periculum est, ne impetu contentorum intra corpus coercito, fiat irruptio in partem aliquam nobilem, adeoque exitialem vitæ calamitatem inferat. v.g. pone febrim continuam insignem, sed benigniorem, (utut malignarum revera eadem sit ratio, in quibus tamen magis ad malignitatem, præsertim si  potissimum occupet, respiciatur:) cui, crudis adhuc existentibus urinis, die tertia, quarta & quinta supervenit diarrhæa, aut hæmorrhagia narium crebrius repetens. Excretio hæc revera est symptomatica, debilitatur æger, franguntur vires, periculum est, ægrum vix superaturum morbum, aut ad statum cum ista excretionem perduraturum. Quod si supprimas hæc ipsa, ex diarrhæa impedita febris intensior, sitis, cephalalgia, deliria, &c. metuenda erunt. Si hæmorrhagiam narium sistas eadem, ac præsertim deliria & convulsiones. Quid igitur agendum in talibus casibus? Variè decertant hæc Practici, an promovendus, an sistendus sit talis naturæ motus. Omnium optimè mihi videtur negotium decidisse *Stephanus Rodericus Castrensis Tr. Quæ ex quibus l. 2. c. 10. p. 119.* Decisionis nucleum paucis comprehendam. Inquit: Omnis evacuatio symptomatis ratione facta, in tempore peccat. Si enim debito fieret tempore, h. e. in die decretorio, non amplius symptomatica, sed critica diceretur. Nihilominus vel peccat in solo tempore, vel simul cum temporis vitio habet vitium qualitatis, aut quantitatis, aut utriusque. Si qualitate & quantitate simul sit vitiosa, omninò damnanda est. Si quantitate, tantum quantitas vel excedit, & tunc est inhibenda, vel deficit, & tunc an sit supplenda, Certant artis proceres, & adhuc sub iudice lis est. Si qualitate peccaverit, decreto *Hippocr. sect. 1. aphor. 2.* damnabitur. Nam cum non purgantur talia, qualia purgari oportet, (quod idem est, ac si diceret, quæ peccant in qualitate,) nec conferre, nec leviter tolerari. Profectò si non conferunt, non sunt proficua, si non tolerantur, non fiunt cum virtutis tolerantia. Si tandem solius temporis peccatum sit, non autem omnino qualitatis, neque valdè magnum quantitatis, tunc posse aliquando judicare, tam certum est, quam quod certissimum. De deficiente ergo ex quanto excretionem symptomatica sub iudice lis est, *Hippocratis consilio sect. 2. aphor. 29.* cum morbi inchoant, si quid movendum videtur, move. Ubi *Galenus* melius esse ait, in principiis evacuare, quo minorem jam factam materiam faciliùs natura possit concoquere. Si igitur evacuatio in principio confert ad futuram coctionem, sanè isthæc evacuatio ante coctionem fit. Si autè fieri potest cum utilitate ab arte, à qua maiorem agitationem patitur corpus, multò melius fiet à natura, à cuius operibus minor contingit agitatio. *Hactenus Castrensis.*

Hinc & excretiones symptomaticas interdum morbum solvere observatum refertur, in *Act. Med. Hafn. vol. 4. pag. 104.* Interea, *Medicus*, sive sistendas, sive promovendas observavit huiusmodi evacuationes, *semper acre peccans tem-*  
*perans-*



perantibus & invertentibus enervare, sedulus infestat. Siquidem tam materiæ morbificæ turgescencia, quam excretiones symptomaticæ semper sequuntur nimiam materiæ occasionalis, sive fermenti ejus vehiculi acrimoniam tam benignam, quam malignam. Sive enim ex aucta effervescentia, sive ex irritatione partium sensilium, & hinc nato motu contentorum vitiatum, sive ex utroque oritur turgescencia & excretionem symptomaticam, sanè ubique principale peccans erit acrimonia nimia. Pertinet ad hujusmodi dubios naturæ motus Icterus de quo *Hippocrates sect. 4. §. 62.* Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum. Minus universale hoc esse, non solum *Sennertus annotat Instit. l. 3. part. 3. c. 7. p. 740.* Sed etiam *ex Horstio l. 1. obs. 23.* patet, ubi Icterus salutaris quarta die in continua obvenit, & *Barthol. cent. 3. histor. 4.* Icterus salutarem in quartana ante septimum supervenientem notat. Ergo præter signa coctionis plus minus jam prægressa optimè negotium hoc decidit *Castro supra cit. lib. 3. c. 20. p. 220. & seqq.* nempe etiam die quarta ictitiam cum rigore esse bonum signum, quia quasi critica sit. Item ictitiam sine rigore ante septimum accedentem, utur symptomaticam, si sequatur evacuatio aliqua, per alvum, v.g. aut urinam, ægrum liberare: quæ pluribus citato loco explicata videantur.

In specie superius insinuata *auxilia generalia* quod attinet, ex fonte Chirurgico se offert inprimis Venæsectio, de cujus usu quæritur. Ex supra jactis fundamentis, per se patet, insignem hîc intercedere abusum, cum per se nil in febre curanda conferat Venæ sectio, utrunque ejus effectus explicentur. Per accidens igitur in plethoricis tam veris, quam apparentibus, quod pertinent & ii, quibus consueta quorundam sanguinis evacuatio suppressa est, item, qui consueti sunt aliàs sanguinis detractionibus artificialibus, aut qui ad nimias sanguinis ebullitiones & fermentationes, indeque ortas spirituum excalescencias proni sunt ut adolescentes, & qui laudabili, euchymo ac generoso victu præsertim in potu utuntur, interdum Venæsectio concedi potest, idque in morbi principio, magis tamen in benignis, minus in malignis, præsertim ubi jam aliquo usque progressa sit febris, in quibus non nisi cautè & circumspectè eadem locum habet, & quo malignior fuerit febris, eò minus locum habet.

*Ex fonte pharmaceutico* in genere se offerunt evacuantia, sive sint purgantia in specie sic dicta, sive sudorifera, sive diuretica, & hinc symptomatum urgentium sedativa opiata. Equidem & horum omnium usus sponte patet.

*Evacuantia quidem purgantia* nulla sanè per se febribus conducunt,



eunt, nisi in declinatione, adeoque correcto fermento febrili, & coctâ materiâ ac sedatâ ebullitione. Frustra enim aliâs propinantur, turbabunt magis massam sanguineam, irritabunt partes solidas, & quicquid evacuabunt, absque *avopla* erit, cum non evacuetur, tunc temporis, quod evacuandum esset, nullâ factâ inutilis ab utili segregatione. Confirmat hoc experientia, quæ ostendit, post repetitas etiam purgationes eodem tenore pergere, interdum gravius affligere intermittentes. Continuae vero magis exasperantur iisdem, id quod manifestò ostendit, non attingere purgantia radicem morbosam, sed Medicos & ægros deludere. Quod si aliquando à purgante remedio cesset febris, hoc uti rarum, ita summè accidentarium erit, sub liquaminibus istis, quæ faciunt & evacuant purgantia, unâ forsan exhausto fermento febrili, aut ab acrioribus amaricantibus solutivis, v. gr. scammonio, aut colocynthide vi alterante correcto eodem, vi solutivâ propriè nil operæ conferente. Sanè in omni purgatione in febribus instar cynosura *aphorismus Hippocratis* observandus: Cocta medicari oportet, non cruda. Hinc si in principio præscribenda propriè purgantia, vomitus saltim tunc convenit. Natura hoc monstrat, quæ nunquam, ubi sui juris est, instituit evacuationem, adeoque nec crisin, nisi cocta sit materia, hanc imitemur magistrâ. Interim blanda, primas vias abstergentia, & hinc præsertim diaphoretica, quovis ferè febris statu & tempore, nisi forsan crisis quædam instans aliud moneat, optimè adhibentur.

*Primas vias evacuantia*, in quibus ferè stibulatur fomes morbosus, sunt *vel vomitoria*, vel *per inferiora laxantia*. Illa tam in omni febris locum inveniunt, imprimis in principio, sanè iisdem vomitoriis interdum radix morbofa quasi una falce, demeritur, id quod restitat febrile, facilius dehinc curatur. Intermittentes sine eo difficulter curantur. In continuis acutis & lentis, ibi in principio, hæc etiam in progrefsu sunt optima: imò non rarum est, quod maligna exinde, sed in principio adhibito, multum levatur. Ergò qui apti sunt ad vomendum, nec in quibus aliquid obstat, item quibus vel hypochondria suspensa, aut rugitus in iisdem est, aut nausea, vel ructibus tetris amaricantibus: item cephalalgia vel aliquali vertigine vexantur, in febrium principio optimè, imò sæpius necessariò vomitu, evacuantur.

Quæ vero *per inferiora laxant* alvum in febribus, sunt *vel injecta clysmata*, vel *assumpta pharmaca*. *Clysmata* familiarissima in febribus locum habent, & imprimis pro levando æstu, & aliarum, præsertim capitis, per consensum ut plurimum partium symptomatis, & hinc abdominis pathematis



propriis mitigandis conducunt. *Bina* saltem *conditiones observent*, eorum usum prohibentes. I. Quando natura aliorum vergere, & evacuationem, præsertim criticam, vel huic saltem analogam, per alias vias instituere tentat, unde v.g. in paroxysmo, in intermittentibus, naturâ criticum quasi sudorem tunc moliente, præposterè injiciuntur.

II. Quando excretio cutanea in febb. malignis vel expectanda est, vel imminet, vel jam adest & facta fuit. Hinc in variolis, morbillis, purpura, petechiis minus conducunt, nec nisi summa necessitate urgente ad eadem, eaque saltem lenissima, & tamen cautè, fiat accessus: potius, quantum possibile, dictis in affectibus vitentur.

Per os assumpta sunt *blanda laxantia*, præsertim salibus digestivis sociata, & acuta, & ultra primas vias haud penetrantia, ex tamarindis, rhabarb. infuso lennato, &c. & hæc speciatim in principio locum inveniunt.

*Sudoriferorum* usum ipsa nobis natura monstrat. Cum enim in febrium fine natura sua sponte copiosos sudores, movere soleat, ita ut absque sudore nulla febris perfectè judicata dici possit, ob id declinantibus febribus sudorifera sunt optima, sicut in toto illarum decursu diaphoretica sunt utilissima, quæ cum liberam & copiosam transpirationem promoveant, æqualia non solum sunt effectui sudoriferis, sed propter operandi modum illis etiam præferenda: dum sine insigni virium jactura successivè, & citra vel contentorum graviolem agitationem, vel continentium partium molestam irritationem operantur, ac heterogeneas fermentativas particulas, in M.S. hærentes, discutunt, & excludunt. Nempe ut supra insinuat, minus periculosè illi decumbunt, quibus in febribus cutis humida aut madida percipitur, quàm quibus arida aut sicca est. Certe vulgus indoctum non rarè imminentes, aut jam incrementales febres, etiam continuas, repetito sudoriferorum, eoque promiscuo usu non rarè curat. Eligenda autem temperata, non acria, nec aromatica aut resinosa, sed vel fixa absorbentia, communiter præcipitantia dicta, vel volatilia macra non ossa aut calida. In malignis semper alexipharmaca, eaque sudorifera, usurpanda, sequendo nempe naturæ ductum, quæ ferè quarta quintave die erumpere facit petechias sive pustulas. Hinc alexipharmacis semper socianda sudorifera in malignis, in principio quidem temperatiora, in incremento & statu fortiora. Sed de hæcenus dictis remediis videatur *Holterhoff. Tr. de Error. Med. c.1.*

*Opiata* per se non conveniunt, per accidens interdum, ad mitiganda atrociora symptomata, in primis subinde urgentia, usurpantur, aliàs naturæ morum impediendo, febres quidem interdum sistunt, sed aut gravioris cum recidivæ, aut chronici alicujus morbi supervientis metu. Unde quando adhibentur, saltem in incremento fiat, non in statu, ne motus critici plus minus impedian-

tur,



cur, non in principio, ne naturæ conatus inchoatus sufflaminetur, & hoc continuis. In intermittentibus vero præmissis præmittendis, vel ante paroxysmum ad inhibendam febrem, vel in paroxysmo ad sopienda graviora symptomata: utrinque non nisi appropriatis vel absorbentibus, vel diaphoreticis permista.

Denique ex *fonte dietetico* petita præsidia quod attinet, dum *suis* frequentius urget, *potus tenuis, facile transiens, ventriculo amicus, nec eum ledens est optimus.* Aliàs aliquot *spiritus sive stigmatis* ☿, *acidi gutta*, plus levant sitim, quam integra mensura potus cujusvis. *Vinum* pessimo consilio febricitantibus interdicitur. In intermittentibus enim vinum non nocet, saltem die intermissionis, vel post paroxysmum assumatur. In febri maligna vini haustus in conservandis & restaurandis viribus est egregius: id quod etiam in febribus continuis sub nimia virium prostratione obtinet. Quoad febres vero continuas benigniores in Causo, tertiana continua, hæmorrhæo, &c. vino abstinere tutius est, nisi adsit vomitus, summa virium prostratio, ut & syncope. *Hippocrates* in omni febre vinum porrigit, tamen animadvertere licet, vina generosa non habere locum: alba, debilia & aquosa probamus, ut loquitur *Poterrius de febb. part. 2. c. 26.* Nempe vis fermentativa vini, ejusque acidum ardentibus in febribus non nihil suspecta sunt, nisi in casu, quo medicamenti vires subit. Est scilicet vinum naturæ amicissimum, præsertim ventriculo, prætereaque non rarò sanguinis motum ita promover, ut per vias urinarias, vel per poros cutis sequatur larga excretio. Sanè quibus nocet vinum in febribus, mox ab ejus usu nocumenta percipiunt, nempe mox phlogosin & æstuationis incrementum, non ob *vinum* ejus volatilem, inflammabilem, sed ob acidum. Talibus igitur interdicens vinum, vel mox superingestis absorbentibus vis ejus refringenda. Quoad potus alios, *Cerevisia* lupulata non rejicienda, nisi propter amorem molestum. Hinc ut plurimum febricitantes, in specie in continuis, recusant cerevisiam, quia tunc cessat in stomacho plus minus digestio prima: Ob id cerevisia talis assumpta corrumpitur ac cadaverisatur, ac nidorem stomacho molestum contrahit, indeque molestiam ipsi excitat, unde mox nausea ejus & abhorrentia sequitur, unde vel cerevisiam secundariam, vel *Reuterlingi* vel alios simpliciores aquosos potus subinde appetunt. Non denegandi sunt hi ipsi, saltem quoniam facile status generant, & stomachi tonum lædunt, propterea ad præservandam atoniam ejus ac inflammationes, vel *o* *stomatium*, vel parum *vinum* *stomatium* *acidum*, vel cum hoc paratæ Tincturæ vegetabiles, aut parum *vinum* *stomatium* *dulcis* instillantur. In continuis febb. cum aqua vel cerevisia secundaria mista pars tertia vel quarta vini, ac additum pomum citrium in taleolos incisum, suggerit porum ægris talibus convenientissimum. *Serum lactis* aliàs bene depuratum, & succo citri non nihil acidulatum in febre continua,



item in intermittente scorbutica potus est optimus, nisi laxior alvus inhibeat. Sed depuratum esse debet, ne pars caseosa remanens exasperet malum. In specie *sulphuris* sufficiente quantitate aquæ communis propinetur: quod præter alia commoda & copiosum sudorem movere solet. vid. *River. cent. 1. observ. 19. Piens de febr. part. 2. pag. 21.* De cætero sitientibus ægris non denegandus potus, modò fiat cum regimine, nempe dum in continuis continuò sitiunt, crebrius quidem, sed parcius, nec nimis frigidus porrigendus potus. In *intermittentibus* non prius potus propinandus, quam sub æstus vigore, tunc primum potum calidum, plus minus medicatum assumat, cætera moderatè frigida largius superbibant, ut largior provocetur sudor.

*Quoad victum*, parùm in febribus quibusvis appetitur, unde nec ad cibum cogendi ægri, ac nil, quod ipsi nauleant, porrigendum. Semper ruminandum illud *Hippocratis*: corpora impura (qualia primariò sunt febricitantium,) quo plus nutritur, eò magis læseris. Venter enim in febricitantibus languidior est idcirco cibus non concoquitur, sed potius corrumpitur, sicque febrili causæ fomitem præbet. Laudatissimus est *Hippocratis aphor. 65. section. 7.* Si quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus sit. Unde in febribus, præsertim continuis, tenuis victus est optimus; & quò magis acuta est febris, eò tenuior ac strictior convenit diæta, utut etiam ad aliquot dies nil comedant tales ægrotantes, perinde erit, nam appetitus & quantum, & quale, & tempus alimentorum præscribit. In specie *carnium* esus ut averlatur febricitantibus, ita nocet his: *juscula, leves pulicula* & ad summum *ova sorbilia* abunde sufficiunt, juscula inter avenacea, & pulres ex pane & cerevisia magis conducunt. *Saccharata* ac similia *dulcia* quæcunque in omnibus febribus nocent, cum talia sint admodum fermentativa, adeoque malum exasperant. *Conf. Heinebr. ab Heer. obs. 5. Panaroll. pent. 2. obs. 12.* *Fructus* omnes, vel ex his parata quælibet facillè fermentescibilia sunt nociva. *Nam omnia, quæ augere aut inducere possunt fermentationem præternaturalem in febribus, nocent.*

*Quies corporis* tam externa in vigilantibus, quam interna in dormientibus est optima; sanè quò quietiores sunt ægri, (nisi hoc ex omnimoda virium prostratione fiat) & minus anxii, eò melius est signum, & eò mitior est febris, ac benignior ejus conditio. Econtra, si anxii sint ægri, jactabundi, membra inordinatè agitant, &c. suspiciosi, eò pejus.

*Somnus* semper bonum signum est naturalis, præternaturalis, nempe comatus, qui malignis interdum supervenit, malus, & curandus. Aliàs nunquam arceus somnus ab ægris est; sibi enim in somno relicta natura, nec perturbatus, optimè suo funguntur munere, & coctionem materiæ eò citius absolunt, unde & arte in incremento morbi, moderatè tamen pervocari potest; uberio-

rem



rem ferè esse insensibilem transpirationem, ac interdum sensibilem sudationem sub quiete somni, constat.

De

## FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS.

Intermittens Febris est, quæ per intervalla diversis redit paroxysmis, tempore intercalari ab omni febris penitus vacuo. Hinc pro interstitio diverso, febres diversa sortiuntur nomina, ut quotidiana, tertiana, quartana, &c. sic & porro quintana, sextana, octana, &c. videatur *Sennertus de febb. l. 2. c. 17. pag. 250. Piens de febb. p. 2. pag. 99.* Observavi aliquando febrim octanam, omni die Quis circa vespere redeuntem, quam præmissis vomitorio per spiritum salis ammoniaci curavi. *Vid. etiam Schenck. l. 6. obs.* Quin & dantur febres menstruæ, sive in quibus singulis  $\square$ lib<sup>9</sup> redit paroxysmus, quale exemplum citavit *Schenck. cit. loc.* Idem observavit in muliere, quæ toties, quoties menstruum patiebatur purgationem, ordinario per triduum febricitabat. Imò dantur febres anniversariæ, imò febris, quæ die natali quotannis affligebat, & tandem eosdem extinguebat, vid. *Schenck. cit. loc.*

Febres tales nunc sunt simplices, nunc compositæ, duplicatæ, triplicatæ, quadruplicatæ. De his videatur *Sylvius l. 1. prax. c. 27. §. 13. & seqq.* Ex his omnibus de quotidianis dubium est imprimis, an dentur, h. e. talis febris intermittens, quæ quotidie simili typo recurrit, ita ut tertius paroxysmus secundo, quartus tertio exactè sint similes, sive in incremento accrescant, sive in statu similiter consistent, in declinatione similiter decrescant. Paroxysmi horum ut plurimum sunt horæ 8. intermissio sex. Imò sunt qui affirmant, subinde ad horas 24. extendi paroxysmum, ita ut continuæ similis appareat. Multi tales affirmant, plures negant. Cum rarissimè observatæ fuerint tales febres. *Rhodus* tamen ejus exemplum allegat *cent. 1. obs. 4.* item *Gabelchofer. cent. 6. p. 132. & seqq.* Verùm sæpissime decipiuntur Medici, dum febrem quotidie recurrentem, putant esse quotidianam, quæ tamen sæpius est tertiana duplicata, cum vel tertiana prius simplex fuerit, vel sub declinatione in tertianam desinat. Interim non arbitror, simpliciter negandas esse quotidianas, cum multa appareat contrarietatis ratio, quin potius, sicut tertianæ in quartanas, ita & hæ in tertianas faciliè mutari possunt, sed negotium totum penderet à controversia, unde ordinata ista februm sit periodus, quæ quamdiu later in obscuro, etiam præsens de quotidianis controversia ferè in suspenso manet.

Præter has febres periodicas dantur etiam quæ nullam periodum observant, & tales sunt, vel erraticæ, vel vagæ, quæ *Hippocrati* planetæ dicuntur.

*Erraticæ* sunt, quæ quidem aliquam periodum habent, sed ita ut videantur non habere. Sic v. g. hodie invadit hora 12. perendie 6. matutina, rursus



perendie vesperti octavâ, rursus perendie hora 10. &c. *Paga* sunt, quæ planè nullam periodum observant, neque tempus accedendi vel recedendi habent, quin aliquando per dies aliquot in septimana remittit, & tunc redit, tum fit mox tertiana, mox quartana, &c. utut communiter hæ duæ promiscuè usurpentur.

In Febris intermittentis paroxysmo ordinariò *frigus ac horror vel rigor* præcedunt, subsequente calore plus minus intenso, quo in sudorem largum desinente, paroxysmus cessat. Hæc tria primaria constituunt symptomata paroxysmorum, quorum accuratam & exactam delineationem vid. in *Sylvii Prax. lib. 1. c. 30. §. 13. ad §. 26.* Rarum interim est, inveri horum in paroxysmo ordinem, ita ut calor præcedat, sequatur frigus, &c. vid. *Primerosius de febr. l. 2. c. 4. pag. 98.* observare & hoc licet, mutare subinde febres symptomata paroxysmorum. Observavi enim intermittentes ordinario modo affligentes, quæ post aliquot paroxysmos absq; frigore prævio, solo æstu vexant ægros; e contra occurrerunt tertianæ, solo calore in paroxysmo affligentes absque frigore, quæ post aliquot paroxysmos in ordinarium suum typum deflexerunt: Sicut frequenter occurrit, ut intermittentes chronicæ mutant formam, & declinantes solo horrore aut rigore crucient ægros, absq; æstuationis superventu. Unde pro hujusmodi symptomatum variationis ratione in paroxysmo plures accidentales intermittentium differentia emergunt, in ardentes, algentes, vomitorias, cardiacas, &c. quas enarratas vide prolixius in *Sylv. l. cit. cap. 30. §. 7. & seqq.*

[Ratione symptomatum graviorum nomina diversa sortita sunt febres intermittentes. Nam 1. *algida* observantur, non tantum frigore præsertim, sed aliquando frigore tantum molestæ, ita ut frequentius levis, aliquando & rarius nullus sequatur calor. 2. *ardentes* in primis Tertianæ, in quibus breve ac levè duntaxat, vel nullum ferè notatur frigus, vel horror tam mediocri præcedere calorem ardoremque summum, eundemque post finitum paroxysmum, sæpe numero diutinè permanentem, ac semper molestum: adeò ut nonnunquam novus paroxysmus prius revertatur, quàm præcedentis calor auctior in totum remiserit. 3. *epialæ* in quibus simul ac ubique frigus & calor vehementer urget. 4. *siticulosæ*, à siti valde importuna, & inextincta, adeò ut licet continuo bibant ægri, nihilo tamen sitiant minus. 5. *famelicæ*, à fame rabida & inexplibili etiam tempore paroxysmi. 6. *cardiacæ*, dolore inexplicabili, circa ventriculi orificium superius comitatæ. 7. *torminales aut colicæ*, dictæ à torminibus ventris gravissimis, ejusdemque distensionibus



nibus mirè argentibus, & unà cum intermittētis febris accessu accedentibus, ejusdemque discessu discedentibus. 8. *syncopales*, à syncope ægros una

cum febre invadente nomen sortitæ. 9. *præfocantes*, à comite suffocatione hypochondriaca, vulgò hysterica dicta, cum paroxysmo febrili gravius (fœminas præsertim) afficiente, nominandæ, cum revera nonnunquam ægras tunc suffocent ac interimant. 10. *anhelosæ*, à difficili & anhelosa respiratione nominatæ, & mirè misereque, cum vel sine cordis palpitatione ægros argentes

11. *asthmaticæ*, à comite asthma nunc graviore nunc leviori: in quibus itidem abdominis anxietas & distensio præcedere solet, atque illis remittentibus difficilis respiratio & verè asthmatica sequi, quæ unà cum paroxysmo, ut plurimum satis diu, & aliquando ad unum vel plures dies durante, minuitur, & tandem cessat, nonnunquam illo sublato perseverat. 12. *tussiculosæ*, cum vel

sine asthma, in quibus mox atque ingravescit paroxysmus febrilis, urgere quoque incipit tussis, ut plurimum sicca, rarius, nec nisi per accidens, humida. 13. *catarrhales*, à catarrho non tantum ad pulmones, verum ad alias partes, quoque ruente, atque unà cum paroxysmo febrili moto ac cessante. 14. *arthritica*, in arthritide notandæ. 15. *insanæ aut deliræ*, à delirio, rarius quidem durante frigore, crebrius urgente calore, post capitis dolorem Vigiliæ, temporum pulsationem, ipsis superveniente, atque unà cum paroxysmo iterum, & quidem post somnum vel placitum, vel insomniis tumultuosum, sensim cessante.

16. *vomitivæ aut emeticæ*, à vomitu, (symptomatico) aut mox incipiente durante adhuc frigore, aut mox incliante accrescente calore, nunc continuò, nunc per intervalla multum molesto. 17. *cacatoriæ seu catharticæ*, ab alvi dejectione multa vel frequenti, & quandoque simul torminosa, diverso accessus tempore ægros valde molestantes ac debilitantes. 18. *sudatoriæ*, à sudore, qui nonnunquam durante bonâ vel maximâ cujusvis paroxysmi parte multus, ægrisque noxius, ideoque symptomaticus, sæpius calidus, rarius frigidus, ex universo corpore aut parte privata, capite, thorace, abdomine, artubusve manat.

19. *ureticæ*, quæ continua ferè mictione, & quidem symptomaticâ, ægros infirmante, non critica & ipsos levante, moleste. 20. *sputatoriæ aut ptyalodes*, quas durante paroxysmo sputatio & salivatio gravis & molesta comitatur. 21. *odontalgicæ*, in quibus odontalgia, ab humore acidior natæ, affligunt. Ha-

tenus Sylvium cujus verba transcribere, & huc referre placuit.] Et hinc inde plures



plurestales, aut etiam aliæ in Practicis occurrunt. Sic quoad *Tertianam hysteri-*  
*ricam* vid. *M. A. N. C. Ann. 2. p. 295. Tertianam soporosam M. A. N. C. Ann.*  
*4. append. p. 45. Quartanam, in qua delirium melancholicum* mox in principio  
paroxysmi adest, eodem vero remittente & ipsum remittit. vid. *Marcell. Donat.*  
*Hist. Med. mir. l. 3. c. 14.*

*Dubium* hic occurrit: *An dentur intermittentes malignæ?* quæ istarum  
malignarum continuarum cum summa virium prostratione, interdum exanthe-  
matum aut petechiarum eruptione summa cordis anxietate, corporis inquietu-  
dine, & similibus funestis symptomatis stipatæ sint: In specie malignitatis su-  
spicio est, ubi sub æstus vigore parvi & debiles observantur pulsus. Revera  
non negandum videtur, cum observationes, malignitatis in intermittentibus  
indices, non raro in Practicis occurrant, utut ab his mutato nomine pernicio-  
sæ appellentur. *Conf. Sennertus de febris.* ubi de tertianis. Exempla  
talium tertianarum & aliarum intermittentium malignarum videbis in *Epiphan.*  
*Ferdinand. hist. 85. item in Rhodii cent. 1. obs. 9. & 10. item Tertianas conta-*  
*giosas epidemicas primò duplices, deinde simplices, sudoriteris curatas, in Sal-*  
*mutb. cent. 3. obs. 51. Tertianas, malignas, Riverii cent. 4. obs. 2. it. obs. 36. ter-*  
*tianam intermittentem petechialem malignam, in Febr. de Scorzonera pag. 72.*  
*Quartanam malignam habet Horst. l. 1. obs. 15. & Marcell. Donat. l. 3. c. 14. & l.*  
*7. c. 6. Denique interdum epidemicè grassari solent febres intermittentes, siue vi-*  
*tio aëris seu vitio alimentorum, contrahantur. Exempla vid. in Willis, de febr.*  
*c. 16. it. Bartholin. cent. 2. hist. 56.*

*Omnes hæ febres intermittentes, cujuscunque fuerint typi, sunt omnino ejus-*  
*dem naturæ & essentia in radice.* Oriuntur ab eadem causa, diversificantur tam  
pro subjectorum, & hinc pro rerum naturalium, nonnaturalium, & præternatu-  
ralium varietate; à quibus etiam causis tanta diversitas symptomatum in his ipsis  
emergeat, unde etiam una eademque medendi in genere est ratio. Patet hoc ex eo,  
quia sunt invicem permutabiles, qualis permutatio non deprehenditur, nisi inter  
habentia symbolum, siue quæ invicem symbolizantur, h. e. essentiâ conveniunt. Sic  
quotidianæ succedunt tertianis; quartanæ quoq; in tertianam subita mutatio, &  
vicissim tertianæ in quartanam, iisdem utrobq; permanentibus symptomatis, ur-  
gere videtur, utramq; ab eodem humore generari, ut loquitur *Piens, part. 2. de fe-*  
*brib. p. 96. & 234.* Nempe præsupposito æquum motu & impetu, seu universali  
efficiēte motuum, tam animalium, quàm præternaturalium morborum, adeoq;  
februm, causa proxima materialis seu occasionalis investiganda, quæ ratione radi-  
calis originis & foci, ventriculum & primas vias; ratione vero alterationis prima-  
riæ & inhæfionis, M. Sm. speciatim afficit.

Arbitror ergo *causam hanc proximam* esse fermentum præternatura-  
le, in ventriculo genitum, quod subinde Mass. sanguineam alterando, ratione  
motus



motus fermentativi immutati, & partes nerveas primarum viarum vellicando, ratione acrimoniæ hostilis, occasionem & præternaturali spirituum motui, & hinc cæteris omnibus symptomatis, quorum complexus paroxysmum constituit, suggerit. *Fermentum hoc*, ceu admodum activum, *salina erit pro sapia, ejusque acida*: conspirant enim in hoc & supervenientia symptomata, & una eademque intermittens cura. *Origo ejus* est ex læsa ventriculi digestionem immutata vel depravata, qua occasione ex acido fermentativo naturali facilè præternaturale fermentativum emergere, seque in alimentorum reliquiis, stomachi rugis inviscatis, inserere, & ita fomitem intermittens pro pluribus paroxysmis recurrentibus suggere potest. Notum enim est, nonnullos antea sanos, ex usu rei adversatæ, vel ipsis horridæ, incidisse brevi post in febrim: Sicut è contra ex usu rei intensius appetitæ, utut apparenter etiam noxiæ, nonnulli in talibus febribus sanentur.

Confirmat hoc vel levis error in diætâ taliter febricantium commissus, vel exasperans, vel duplicans, vel recidivas faciens has febres. Nec rarum est, curare se quosdam in his febribus sola pertinaci ac statuta inediâ, cum alii è contra currentur excessivo potu, insequente sive vomitu, sive largiore & profusiore sudore. Exempla passim sunt obvia.

Novi mulierem, quæ ultra tres menses conflictata fuerat tertiana, sub continuo medicamentorum abusu, tandem ipsa corripitur appetitu halecis, quem, Medico licet prohibente, avidè devoravit, & exinde curata fuit. Novi aliam, quæ naturaliter aversebatur caseum, cui cum clam tantillum casei cum aliis cibis fuisset oblatum, ipsa brevi post, nausæa correpta cum insequente vomitu, febris tertianâ per 17. hebdomadas correpta fuit, quæ tandem comesto halece, intensius appetito, sanata fuit. Virum novi, qui esu anguillæ, quam nonnihil invitus comederat, in febrim tertianam ultra quadrantem anni durantem incidit.

Non igitur putandum est, ex distinctis visceribus affectis, distinctas etiam exsurgere febres, dum tertianas ex vitio hepatis ac bile, quartanas ex vitio splenis ac succo melancholico oriri volunt. Nam in principio talium febrium viscera ut plurimum sunt sana diuturnis autem his febribus, vel iisdem malè curatis, nempe per figentia nimis, sive paroxysmum cohibentia, subinde viscerum talium tumor plus minus scirrhusus supervenit, nempe tanquam productum morbosum. Facilis interim concedo, infarctus tales quorumvis viscerum, aut alia eorundem vitia, item menstrua v. g. suppressa subinde sanos disponere ad febres posse, vel aliunde natas febres fovere & obstinatiores reddere, aut crebriori ac faciliori recidivæ occasionem subministrare, prima tamen radice & talium morborum authore in ventriculi digestionem fundatis. Fermentum hoc delitescens dum exerere se incipit,



ratione aciditatis hostilis partes nerveas primarum viarum vellicat, hinc earum spasmi, hinc suecorum, fellei & pancreatici quocunque modo constitutorum, nimiae effusiones: hinc quam plura abdominis symptomata: hinc & patoxysmorum in primis viis prodromi. Idem fermentum, sanguini permixtum, activitate sua naturalem ejus motum fermentativum pervertere, hinc debitam incalescentiam ejusdem primitus impedire: hinc spirituum vitalium debitam emersionem & volatilisationem aliquanti per sufflaminare potest, (instar vini denuo fermentationem molientis, turbari tunc videtur M.S. hinc n. in tali statu *pulsus parvi*, minusque vehementes esse solent) donec ipso fermento cum tale volatili oleoso sanguinis ad praternaturalem effervescentiam concitato, oriatur hinc incalescentia cum sanguinis turgescencia, cum pulsu magno, celeri, frequenti, plus minus vehementi &c. donec dictæ nimiae ac inordinatæ fermentationis motu separatis & quasi præcipitatis heterogeniis particulis, seroque involutis, sudor quasi criticus superveniat: hinc etiam in *paroxysmo collecta urina* sanorum est similis vigente adhuc fermentationis motu, quæ post paroxysmum collecta crassa, turbida, aut copioso sedimento onusta solet excerni.

Ex acido igitur cum sale volatili urinoso in sanguine quasi effervescente, tota patoxysmi historia explicanda venit. Ex acido nempe vellicante membranas abdominis particulas, speciatim stomachum ac intestina tenuia, hæc ipsa convulsivo impetu quatuntur &c. unde *frigus, horror & rigor*. Confirmat hoc 1. Cura per *alcalia vel absorbentia*, rigorem sensibilibiter imminuentia. 2. *Oleosa destillata*, tam intrus propinata, quam extra stomachali regioni illita, mirabiliter rigores sopiunt, corrigendo peccans acidum, & blando sensu afficiendo membranas partes. 3. *Opiata* sensibilitatem partium, & inde dependentes convulsivos motus sopientia, eosdem rigores placant.

Dum vellicantur ita primæ viæ, & spasmis concutiuntur, copiosius effunduntur hepatici ac pancreatici latices, à quibus plus minus naturaliter constitutis, adeoque plus minus in intestino duodeno effervescentibus, & ex mutua miscela texturam ac saporem plus minus praternaturalem acquiruntibus, quam plurima abdominis symptomata, v. g. *anxietates, vomitus, tussis clamosa, hypochondriaca symptomata, tormina* oriuntur, & à Sylvio optimè per dictorum succorum vitiatam miscelam explicantur *cit. loc. c. 30*. Nempe ab utrisque acrioribus *vomitibus* crebrius repetentes originem ducunt. A succo pancreatico acidior intenditur *frigus abdominis & circa lumbos*; Ab utrorumque acriorum intensiori effervescencia *astus ac ardor in abdomine* molestus nascitur, ut agri subinde dicant: *Es brenne sie im Delle*: Ex iisdem fontibus *flatus hypochondriorum, intumescencia, inquietudines & præcordiorum anxietates*, & distentis plus minus hypochondriis *difficiles respirationes* nascuntur.

*Astus* quod attinet, in febris ordinariò ferè urgentem, quod oriatur hic



hic ab acido fermento in massa sanguinea per vitiosam & inordinatam fermentationem cum ejus sale volatili oleoso, confirmant inprimis  $\phi$  lata, ut  $\phi$  antimoniatum,  $\phi$  vitriolatum, id est, arcanum duplicat.  $\phi$  dulce. &c. quæ optimè æstuationes compescunt, figendo & corrigendo tam acidum volatile, quam sal volatile oleosum, & ita nimios tumultus compescendo. Verùm quare tam statutis horis recurrat paroxysmus, h. e. quod à nemine hucusque convenienter explicatum fuit. *Fermentum* dum dixi occasione febrium intermittantium; in quo hoc ipso non magnam materiæ molem, sed interdum minimum quoddam miasma, activum tamen & penetrans, indeque efficaciter alterans. Hinc, præsertim in febribus diuturnis, non videtur adesse semper talis materiæ morbificæ moles, utut in principio interdum contrario simul præsens esse possit, id quod *Celsus* subolfecit, cui natura interdum ex consuetudine videtur febrem continuare. Unde etiam *Sennertus* vult, quod quoddam miasma fermentativum hæreat in massa sanguinea, quod revocet paroxysmos febriles, & quod à *Poterio* dicitur Seminarium febrile, utut genuinus focus non sit in massa sanguinea. Illustrat hoc experientia, cum tales febres diuturnæ sint subinde levissimæ, inprimis quartanæ, ut paroxysmus admodum tolerabilis ultra unam alteramve horam vix duret, ipsis febribus per plures annos durantibus. *Spigelius* l. 2. de febre semitertiana cit. 3. recenset tertianam 30. annos durantem; quales etiam observat *Wierus* in observat. Quis ergo ex fomite adeo copioso tantam febrium diuturnitatem velit derivare, unde & interdum curari solent citra excretionem notabilem, per terrorem, v. g. aliamve similem subitam alterationem. Sic *Boyle in Philosoph. Experim.* p. 219. Quartanam aliquot annorum fere incurabilem subito terrore curatam refert. Et quomodo amuleta, aut acriâ rubificantia extrinsecus admota tales febres subinde tollant, nempe fomes in stomacho fermentativus delitescit, in massa sanguinea verò post paroxysmos inquinamenta quædam, licet minima, superesse videntur. Unde fermento isto in fomite tantillum saltem odorẽ quasi spirante, reliquiis his commotis paroxysmi recrudesunt.

Observanda etiam hic venit trita ista *intermittentium differentia*, præsertim *Tertianarum, in nothas & legitimas*: *Legitima* sive *exquisita* ex pura & sincera bile fieri dicitur, rigor insignis, corpus veluti pungens, sitis & æstus magnus, vomitus biliosus, accessio longissima, est 12. horarum, septeni circuitibus ad summum judicatur. 1. igitur est debilis, 2. fortior &c. 4. us fortissimus, postea paulatim remittit. *Tertiana* verò *notha* dicitur, quæ ex bile cum pituita mista oritur, accessiones ultra duodecim horas extenduntur, raro 14. circuitibus solvitur, sæpius longius excurrit, calor in ea minus pungens est, vid. *Poterius de Febr. l. 1. c. 27.* Uno nomine *tota differentia residet in fermento febrili, plus minus libero aut impedito.*

Liberum enim nec impeditum, adeoque acrius, potentius quidem agit, gra-



viora infert symptomata, sed citius saturatum & enervatum febris finem imponit. Impeditum verò vel propter vehiculum aut fomitem, cui inhaeret, viscidius atque tenacius, adeoque, ut vulgò vocant, pituitosum, vel in subiecto, cujus massa sanguinea, alique ejus humores temperatiores, chylosiores, adeoque quasi viscidiores existunt, minus se exereere potest, adeoque mitiora quidem symptomata, sed diuturniores paroxysmos, febresque etiam magis chronicas solet inducere.

Cetera symptomata, *cephalgia, agrypnia, deliria, respiratio difficilis &c.* ex sanguine aestuante, spiritibusque animalibus intensius calefactis, indeque fortius agitis, originem ducunt.

Quicquid sit de *differentia februm in nothas & legitimas*, saltem ex diversitate paroxysmorum modò enarrata colligere possumus, quod quo acrius est & volatilius, adeoque activius fermentum febrile, eò acutiorem, hoc est, breviorrem, sive gravioribus symptomatis stipatam inducere febrem: è contra quo inertius est, ac minus activum fermentum tale, id quod in specie evenit, quando pro fomite, in quo nidulatur, habet humorem viscidum & glutinosum, eo minus acutam, sed diuturniorem, & mitioribus comitatam symptomatibus fore febrem. Ex quo etià quotidianarum præ tertianis & quartanarum præsertim diuturnitas æstimanda, ita ut quò diuturnior sit febris, eò viscosum magis ac glutinosum fomitem fermenti in primis viis existere putandum est, *indeque in acutioribus magis absorbentia, vulgò præcipitantia dicta; in diuturnis verò sive chronicis incidentia & abstergentia magis conveniunt.*

*Scorbutus*, uti est Protheus, ac quibusvis ferè se associat morbis, ita etiam non rarò febribus intermittentibus se jungit, easque exacerbat, ac sæpius periodum erraticam infert, adeo, ut ubi adest febris erratica intermittens, semper scorbuti suspicio adeste debet, præterea dolores lancinantes artuum, item dolores vagi in paroxysmis vel præsentis, vel eundem antecedentes, scorbutum ferè monstrant: interdum plures maculæ corpus in statu paroxysmi pingunt, post sudorem denuò evanescentes, scorbuti indices: arenulæ quasi rubræ, facillè tamen friabiles, & undique matulæ parietibus adhærentes, eundem quoque prædicunt. Nempe salia sunt subtilia acido salsa crystallifata. Contumaces verò solent existere propter scorbutum, imò non nisi hujus simul habeatur ratio, in cura creberrimè recidivare solent.

Febres hæ periodicæ nunc statâ redeunt horâ, nunc anticipare, nunc postponere solent, idque ferè æqualiter, nisi ægri aut Medici culpa, turbato nonnihil naturæ motu, inæqualitas inducatur.

*Anticipatio talis vel postpositio tres ferè habet causas.* 1. Robur naturæ validius vel debilius. 2. Fermentum febrile magis vel minus activum in volatilitate

tilitate & ac  
scidum, ma  
que pro ca  
postpositio

Quo  
plicatur  
diata.  
stivè spec  
Crollii.  
multiplic  
gantium  
ctionis  
resolven  
ferum in  
cipio bla  
continuu

Er  
non hab  
bunt: ve  
vel quan  
horæ  
sumunt

Qu  
ctionis  
propter  
da. N  
ac etiam  
signa se  
divæ, ve  
tur hæc  
paroxyl  
mentati  
termitt  
præter  
eunt, au  
successi  
lè curat  
Curan



tilitate & acrimonia. 3. Fomes five vehiculum materiale magis vel minus viscidum, magis vel minus copiosum &c. Ex his recursus varietas deducenda, atque pro causarum modò dictarum ratione etiam prognosis anticipationis aut postpositionis instituitur.

Quod attinet *multiplicationem februm*, quando duplicantur aut triplicantur &c. *funi* hi ex duplici fonte. Vel 1. ex errore curæ. Vel 2. ex errore diatæ. Ex errore curæ 1. Quando Medicus vel adstantes propinant intempestivè specifica, præsertim sigentia, v. g. specificum febrile Strobelbergeri & Crollii. 2. Inconsideratus opiatorum usus ante paroxysmum, etiam febres multiplicat. 3. Acriorum, præsertim aromaticorum resolventium item purgantium acriorum, aut vehementiorum præsertim vegetabilium usus ante coctionis signa, quæ ipsa movent quidem causam materialem, sed non promovent, resolvendo exsuscitant, sed non enervant fermentum febrile, talia faciliè, præsertim in quartanis, multiplicant febres. Verissimum est, quartanam in principio blandè esse tractandam, ne simplex in duplicem aut triplicem aut etiam continuam lentam mutetur.

Errore diatæ multiplicantur febres, quando agri imminente paroxysmo non habent stomachum vacuum: vel quando ante paroxysmum lactinia bibunt: vel quando ante absolutum perfectè paroxysmum præmaturè comedunt: vel quando intermissionis die copiosiora alimenta assumunt: vel quando fructus horæos, aut alia similia faciliè fermentescibilia quocunque morbi tempore assument.

Quoad *Prognosin*, in genere urinæ inspectio, inque ea cruditatis ac coctionis observatio, utut non adeò necessaria sit, ac in continuis acutis, tamen propter evacuationem, & hinc specificorum legitimum usum, in primis observanda. Nam quò citius aut perfectiora coctionis signa se exhibent, eo securior ac etiam brevior febris innuitur: sin verò vel pauca, vel non perfecta coctionis signa se offerant, præter febris longitudinem, invita solutio cum metu nempe recidivæ, vel febris in alium morbum diuturnum generatio metuenda. Observantur hæc in urinis aliquandiu post paroxysmos collectis. Nam omnes, quæ in paroxysmo excernuntur, crudæ esse solent: in paroxysmo enim mediante fermentatione fit coctio, quæ eo finito, ceu facta, in urinis se exhibet. Quod si intermittenibus juncti sint scirrhi viscerum quorumvis, vel tumores his cognati, præter febris diuturnitatem, ferè lethale signum esse solent, dum aut febre intereunt, aut superveniente hydropo moriuntur, aut chronico quasi cachectico vitio successivè enervantur. Intermittentes vel perfectè successivè curantur, vel malè curatæ abeunt in febrem continuam acutam, vel hecticam.

Curantur probè per sudores, quæ solutio omnium tutissima. Interdum superveniē-



resisteri has febres solvunt. Quò etiam suo modo pertinent ulcuscula labiorum, utur non solventes febrim, fausto tamen ut plurimum omine erumpentes, Sanè *Salmuth. cent. 2. obs. 2.* refert, tertianas intermittentes per inflationem labiorum criticam solutas.

In specie *Tertiana benigna* ferè sunt absque periculo. Dantur tamen etiam *tertiana maligna & pestulentes*, quæ quamvis evidentes habeant intermissiones, agrotantes tamen non rarò è medio tollunt, dicit *Riverius in Prax. de febr. Benigna* exquisitè tutissima sunt, & septem circuitibus ad summum finiuntur, teste *Hippocr. sect. 4. §. 59.* *Notha* verò uti sunt frequentiores, sic magis periculosiores & curatu difficiliore, quæ subinde ultra 14. periodos extenduntur. utur autem benignæ periculosa non sint; si tamen vel ab agro, vel à Medico error committatur, in lethales morbos degenerare possunt, ut rectè dicit *Willis de febb. c. iv. p. 139.* Speciatim tamen tempus durationis ex urinis aliquo modo & præcognosci potest.

Quoad *quotidianas*, cum longæ sint, & à fomite pertinaci foveantur, interdum non vacant periculo. Nam cum ventriculus ferè insigniter afficiatur in hac febre, & ipse sanguis crudus & aquosus pravè constitutus sit, facillè qui eà detinentur, in cachexiam, hydropem, ac alios periculosos affectus, item in Carum & Lethargum dilabuntur. Diurna nocturna est periculosior, cum tempus medium deficiat.

Diurna est hæc febris, & durat dies 40. nonnunquam ad aliquot menses, quò citius tamen signa coctionis se exhibent, & paroxysmi breviores sunt, ac in principio eorum vomitus adfit, brevior ac salubris promittitur eventus. Si vires & appetitus valde deiciuntur, accessiones sunt longæ cum nullo sudore, parva salutis spes superest. Solvuntur frequenter vomitibus & dejectionibus viscidis seu pituitosis, tum per dolores articulorum, metastasi ad articulos factâ. Si æger quotidie somnolentior evadat, ac gravitatem quandam circa caput sentiat, carum seu lethargum affuturum notat. Vid. *Forest. l. 3. obs. 21.* ubi plura de hoc argumento. *Quartana* omnium quidem est tutissima, propter longa intervalla: ex accidente tamen quando multiplicatur, vel quando ob errorem ægri aut irritationem medicamenti exasperatur, degenerando in alios morbos, periculosa esse solet. Duo in primis post quartanam morbi sunt perimeleendi, *Melancholia hypochondriaca & Hydrops*, quibus & adde *icterum nigrum*: *Senibus* plerumque est lethalis, iis præsertim, qui 60. annum transgressi sunt. *Dejectus appetitus* malum est signum, & rarò tales evadunt. Longissima est omnium februm, & sæpè ad aliquot annos extenditur. *Massartas* vidit Romæ Matronam, quæ 22. annos eà laboravit. Ut plurimum tamen ultra annum non exportigitur. *Æstivæ* sunt breviores, autumnales longæ, præsertim si non longè absint ab hyeme. Primus terminus est proximum solstitium, seu initium quarti mensis,



mensis, quo si non solvitur, extenditur ad proximum æquinoctium sive septimum mensem. Quartana inveterata rarè nisi verè solvuntur, aliisque anni æquinoctiis. His enim anni temporibus facillè curantur, tam spontè, quàm arte. Mulieres etiam quartana diuturna correpta, dum gravida sunt, sponte ferè liberantur. Diuturnior talis quartana, si ægri non exactum observent regimen, præsertim quoad potum, aut si conjunctus sit, aut superveniat pertinacior cujusdam visceris affectus, ægrotos in hydropem, aut contumacem scorbutum conjicit; Sicca corpora ad hecticam & tabem deducit. De urinis quartanarum refert Joel, quod extra paroxysmum sint aquæ & tenues ac pallidæ, sed die paroxysmi magis ad obscuram flavedinem vergent, & ante solutionem febris ut plurimum turbidæ & nigra excernuntur, adeoque nigrae urinas in quartanis esse salutare signum, ut in aliis morbis periculosum.

In cura februm intermittentium 1. fomes materiæ morbosa in stomacho & primis viis resolvatur & removeatur incidentibus, abstergentibus, evacuantibus &c. 2. Fermentum febrile & inde nati paroxysmi appropriatis, aliis dictis specificis, enerventur & tollantur. 3. Symptomata urgentia removeantur aut mitigentur, in specie rigor, calor & sitis. 4. Dyscrasia sanguinis, reliquorumque corporis fluidorum, ac atoniæ viscerum, sub cursu morbi supervenientes, alterantibus debitis restituendæ.

Hisce scopis ferè ita satisfaciamus, dum præmissis salibus digestivis, v. g. ʒo Delato aut sale hypochondriaco, propinatur vomitorium, aut purgans per inferiora; quibus præmissis diaphoretica tam vulgaria, quàm appropriata specifica ante paroxysmum propinantur: intermissionis diebus eadem digestiva & primas vias abstergentia, & postmodum alterantia aromatica, vulgò aperientia dicta, v. g. essentia absinth. Elixir. febrile adhibentur.

Sed pro meliori curæ directione observandum I. *Maturandam esse curam.* Nam quò diutius perstant, eò contumaciores fiunt, eò magis ægrum ejusque humores ac viscera lædunt, & eò graviora mala post se relinquunt. Maturetur autem cura secundum dictam methodum, motum naturæ promovendo, non autem eundem impediendo, quod fit, si paroxysmi inhibeantur, seu febris supprimatur. Wann man das Fieber flugs verreibt. Sanè nil est, quod nocentius possit contingere ægro, quàm ista paroxysmorum inhibitio. Id quod fit si gentibus aut similibus fermentum febrile obtrahendo, & in suo fomite quasi concentrando, unde quidem paroxysmi cessant, sed fomite isto febrili cum fermento concentrato, ad alia loca successivè delato, nunc colicæ convulsivæ contumacissimæ, nunc tumores pedum œdematosi ac subinde hydrops; nunc tumores & scirrhii viscerum; nunc icteri difficulter curabiles; nunc cachexiæ; nunc febres continuæ lentæ, tanquam hecticæ, supervenire solent. Vide Gabelhof.

cent.



cent. 6. cur. 109. & III. item *M. A. N. C. Anno 3. p. 145. 155.* Ubi tertiana per amuletum curata in gravem passionem colicam & hinc iliacam degeneravit.

**II. Venæ sectio** in febribus intermittentibus inutilis est, præsertim in nostris regionibus. Nam febres tales verè diurnæ magis sunt, ac certè paroxysmus venæ sectionem insequens, ut plurimum gravior esse solet & diuturnior reliquis antecedentibus. Et cui usui instituetur eadem? Sanè quo magis urget æstus, eo magis promoveatur naturæ opus in sudore, remittet sic æstus, ægerq; percipiet levamen. Interim prout casus variant, contingere potest, ut aliquando per accidens necessaria videatur venæ sectio. Siquidem *Ballonius l. 2. Epidem. & Ephemerid. constit. Æstiv. ann. 1579. p. 269.* & ex illo *Bonettus in Pharo Medicor. p. 196.* tertianam ob intermissam venæ sectionem lethalem, supervenientes sponte nimia excretionem observavit. *Salvatellæ* sectio à quibusdam ad quartam commendatur, incerta tamen ex ratione, interim tamen *Ballonius cit. loc. p. 194.* quartanas diurnas per *salvatellæ* sectionem curatas observavit.

**III. Vomitus ac Vomitoria** in omni intermittente sunt proficua, non in sola quartana, in qua tamen præ cæteris auxiliantur, ita ut radix curandæ quartanæ vomitum esse dicat *Freitagius.* Propinanda sunt vel ante paroxysmum, duabus vel tribus horis ante eundem, vel ita, ut ante paroxysmum negotio suo fungatur. Quod si verò vires ægri bino febris & vomitus labori non videantur sufficientes, die paroxysmum proximè antecedente propinentur. *Conveniunt* præsertim in principio febrium, nec nocent subinde in progressu, vel ipsa etiam declinatione, quando nempe contumacior videatur febris. *Indicantur* in specie, si conquerantur ægri de saporibus amaris aut nauseabundis in ore, præsertim dum manè evigilant, aut quando persentiscunt angustias, aut molestias quasdam circa præcordia, *wann es ihnen so angst und bang umbs Herz ist/* & monstrant regionem epigastricam, aut quando nausæ vel vertigines tam in, quàm extra paroxysmum ægros vexant &c. Interdum in principio paroxysmi moventur humores vitiosi in primis viis ad os ventriculi. Et refert *Primerosius de febb. l. 3. c. 2. p. 195.* Vidimus convulsiones & cardialgias singulis paroxysmis enatas ex bile æruginosa, quæ ejusmodi bilis vomitu sedabantur. In his & similibus causis vomitoria in specie sunt necessaria. Nec quæquā deterreat, quod ægri sponte sua in tertianis subinde vomant. Nam talis vomitus ferè est symptomaticus, acrimoniam succorum in primis viis commotorum & effervescentium insequens, adeoq; verè est symptomaticus, ac rarò sufficiens. In quo casu, si cætera respondeant, etiam vomitorio, sed blando sufficiens vomitus promovendus. *In primis utilis est vomitus in quotidiana,* ita ut vix sit febris, in qua sit utilior, & quidem si necessarium videatur, per intervalla instituendus. Cautione tamen opus est, ne

ventriculus

ventriculus  
tante aliquo  
stomachus

Vel: 2.  
per nocte  
In Q  
3j. prop  
bened. C

IV.

tente cor  
turbat m  
gat, sed  
nuam pe  
purganti  
tanda. C  
piofa led  
bilitat æ  
niorem r  
dum vel  
declinatio  
evacuet.  
febris, in  
spicionem  
tior vel  
est. Genu  
Nam hæc  
que app  
nata &  
Quarta  
quia hæc  
observat  
maiores  
convalesc



ventriculus aliàs debilitatus adhuc plus debilitetur. Peractâ vomitione, confortante aliquo vino generoso, aqua cinamomi, aut simili extra vel intra usurpato stomachus roborandus. Vomitoriorum formula convenientiores sunt.

℞. sal armoniaci gr. xv.

Tartar. emet. gr. ij. vel iij. plus minus. M.

D. in vehiculo calido vel

℞. aq. card. bened.

syr. emet. Angel. Salæ ad ℥iij. vel ℥ß.

syr Nicot. ℥j. ad ℥j. M. capiat pro dosi.

Vel: ℞. vitæ gt. v. vel vj. in fund. in vini ablinth. f. q. stent in loco tepido per noctem, manè. ℞. filtratura ℥j. ad ℥x. ℥ß. D. S. Brech. Wein.

In Quartanis extollitur in specie radix asari. ℞. ejusdem pulverisat. ℥ß. ad ℥j. propinando ante paroxysmum cum aqua vel decoct. centaur. min. aut card. bened. Quod si post vomitum simul excitet sudorem, eo melius est.

IV. Purgantia fortiora, præsertim vegetabilia, in nulla febris intermittente conveniunt, præsertim in principio, Paulò efficacior purgatio est nociva, turbat massam sanguineam, & dum cruda adhuc est urina, nihil noxium expurgat, sed vires debilitat, & febrim efficaciorē reddit. Imò intermittens in continuam per ineptam purgationem degenerare potest. Adeò in genere potenter purgantia, præsertim actiora vegetabilia in febris intermittentibus sunt vitanda. Conf. *Septalius in animad. l. v. p. 104.* Imò in statu etiam, ubi copiosa sedimenta onerant urinas, si violentior eadem fuerit instituta, insigniter debilitat agros, & paroxysmos insequentēs aut graviores, aut certè febrim diuturniorem reddit. Possunt hæc febres curari sine ullis purgationibus per inferiora, dum vel vomitus in principio ex primis viis, vel sudor post paroxysmos aut in declinatione universali erumpens, ex massa sanguinea sufficienter heterogenea evacuet. Quod si in principio aut progressu morbi, ubi contumacior videtur febris, instituenda sit purgatio, idque vel ob vomitionem impeditam, vel ob suspicionem excrementorum, in primis viis stabulantium, sit ea levis, ultra quatuor vel sex sedes non proritans, idque specialiter in Quartanis observandum est. *Genuina purgantia ex Antimonialibus aut Mercurialibus desumenda sunt.* Nam hæc dum evacuant, simul corrigunt fomitem & fermentum febrile, adeoque appropriatissima sunt, quorum defectu mitiora vegetabilia, in specie *Sennata & rhabarbarina* substitui possunt. In primis ab initio leviter tractandæ sunt *Quartane*, nullumque ferè medicamentum in earum principio adhibendum, quia hæc ex simplici non rarò duplicem aut triplicem faciunt quartanam. Imò observatæ fuerunt quartanæ, quæ ab exhibitis remediis diuturniores & contumaciores redditæ fuerunt, iis, qui absque medicamentis relictæ fuerunt, citius reconvalescentibus, *Vid. Ballon. in Pharo. Med. Bonetti p. 198.* Optimè usum



purgantium in *Quartanis* determinat *Ballonius cit. loc. p. 196.* nempe levioribus in initio utendum. Cocta quando est materia, ac jam aliqua ex parte mitigari cepit, locus valentioribus esto, quoniam humores tenaces, crassi, viscosique leniorem vim effugiunt, &c. qui prolixius hoc negotium explicat. *Tempus propinandi* purgantia convenientissimum est die ante paroxysmum, vel etiam purgans propinetur ipso paroxysmi die, sed ita, ut effectum suum ante paroxysmi invasionem compleat. De quo videatur notabilis locus in *Deckeri comment. in Barbett. Prax. p. 106.* Imò in contumaciori febre etiam appropriatis salinis incidentibus & abstergentibus remediis permista purgantia ante paroxysmum propinari possunt, in specie *Scammonium*, quod tunc ferè alterantis simul vicem obtineat, speciatim in quartanis ante paroxysmum simul cum aliis propinanda purgantia. Vid. *Ballon. cit. loc. p. 195. Höfer. Hercul. Med. p. 291.* Hic enim in recidivis appropriatis absorbentibus & abstergentibus scammonium additum felici cum successu usurpavit. *Purgantia talia sint, ut dixi, mediocria; fortiora, aut acriora nocent,* v. g. usurpetur infusum *Senæ* vel solitarium, vel cum *Helleboro* in quartanis aut cum *rhabarbato* in tertianis sociato. Quod si pulveres placant.

℞. Tartar. vitriolat. gr. xv.

scamm. sulphurat. gr. iij.

Troch. alb. gr. β.

ol. destillat. caryoph. gr. j. M. F. pulvis.

Sin Pilulæ ℞. Mass. Pil. de ammon. Querc. vel

Tartarear. ejusd. ℥j.

extract. absinth. gr. iij.

scamm. sulphurat. gr. ij. M. F. Pilulæ:

Omnium optimum purgans, præsertim in chronicis:

℞. conserv. ros. ʒ β.

Mercur. dulcis ℥j.

Scamm. sulphurat. gr. v. M. F. Bolus.

Egregius hic est Mercurius dulcis, viscida, pituitosa, cruditates chylosas & inde lymphæ vitia in primis evacuat. Scammonium verò actioribus, & uti vocant, biliosis, expurgandis in primis conducit. Pertinet huc præsertim contra quartanas contumaces, Mercurius dulcis cum Mercurio vitæ mistus ad imitationem *Hartmanni Prax. Chym. l. i. c. 4. §. i.* Vid. *Cardiluc. officin. Sanit. p. 25.* Pertinet huc specificum empiricum pro intermittentibus, præsertim in intermittens tertianis vel simplicibus vel compositis.

℞. mechoacann. alb. ʒij.

granor. piper. alb. gr. vel no. xxj.

lap. cancr. ℥j. M. divid. in tres partes æquales, propinand. in haustu



haustu vini calidi, imminente paroxysmo, expectando semper largum sudorem. Plures diuturnæ hoc ipso curatæ fuerunt.

Pertinet hæc *pulvis Comitæ de Warwick*, præsertim additione *ortis* correctus, ante paroxysmum usurpatus, optimè conferens. Vel :

℞. corall. rubr. præparat.

sal absinth. an. gr. xij.

scamm. sulphurat. gr. ij. vel iij. M. & D. ante paroxysmum.

Egregiè confert, præsertim si mox in recidiva capiatur.

**V. Clysteres** ad alleviandam paroxysmi ferociam, ubi copiosi flatus, aut borborigmi, aut ardores abdominis, aut dolores in centro mesenterii circa vertebrae lumbares percipiuntur, sunt insigniter proficui; item in ventriculi symptomatibus, ante vel in paroxysmo, v. g. vomitu nimio, anxietatibus; item gravibus aliis symptomatibus ex acrioribus & mordacibus æruginosis succis ad ventriculum delatis, in difficulter vomentibus, hoc est, orificio stomachi superiori robusto instructis, id quod eò magis observandum, quando alvus aliàs est contumacior, aut excreta indurata fuerint, uti istud subinde evenit in hypochondriacis & similibus. Fiant saltem ex leniter abstergentibus aut carminantibus. v. g.

℞. spec. emoll.

carminat. an. M. j.

sal. ciner. clavell. ℥ij. ad iij.

coq. in l. q. aquæ simplicis.

Colatur. ℞. ℥viij. adde

Elect. de baccis lauri ℥j.

scor. reguli antimon. ℥j.

ol. destillat. terebinth. ℥j. M. pro clystere.

Vel: ℞. rad. levistic. ℥vj.

flor. chamom. Mj.

sambuci

fol. lauri an. Mß.

sem. scænuigr. vel lini ℥ß.

coq. in l. q. aq. comm. & urinæ human. an.

Colatur. ℞. ℥ix. adde

Elect. hieræ cum agaric. ℥vj.

de bacc. lauri ℥iij.

ol. destillat. angelic.

rutæ,

carui an gut. iv. M. pro Clysm.

Injiciuntur imminente paroxysmo, horâ una alterave ante ejusdem invasionem.



In *Scorbuto*, ubi dolores abdominis aut lumborum graviores adfunt, ex lacte salubriter fiunt, v. g.

℞. lact. caprill. ℥ j. in qua dissol.  
mellis rosat.

rutac. an. ℥ j. ad ℥ jss.

vitell. ovi N. ij. M. & applicetur pro 2. vicibus.

Non rarum est, quod febres diurnæ, præsertim quartanæ, aut junctam habeant *colicam*, aut in *colicam* terminentur, quo in casu emollientia ac temperantia clysmata sunt optima.

VI. Rarius, aut ferè nunquam, nisi interdum per accidens, solis purgantibus ac V. S. cedunt intermittentes, quin aliæ insuper requirantur, quæ fermentum febrile corrigere, fomitem febrilem alterare & massæ sanguineæ vitiatam erasino emendare valeant, eaque in specie sunt *Diaphoretica*, quæ sanè in omni intermittente sunt optima, sed ea partim communia, partim salina tam fixa quam volatilia, quam appropriata, quorum vis in destructione febrilis fermenti ejusque per sudorem expulsionem ferè consistit, uti est v. g. *China China* contra quartanas, item *Mistura Crollii* contra tertianas &c. *Sed hæc ipsa diaphoretica* item *specificæ* nunquam usurpari debent, nisi prius purgatum fuerit corpus, aliæ debita universalia præmissa fuerint, alias febres reddunt compositas. *Assumenda autem sunt* semper instante febre, una, duabus, vel tribus horis ante paroxysmum, ut ita junctis viribus cum natura operentur. Eligenda autem sunt diaphoretica pro varietate symptomatum in paroxysmis distincta. In specie calida nimis, siue aromatica; etiam theriacalia vitanda sunt, ubi intensior æstus affligit ægros, utpote in quo casu fixa magis conducunt. vid. *Beech. Physic. subterr. l. I. p. 393.*

Ac sane febris intermittens turò curata potest dici nulla, nisi per sudorem successivè finierit. Interim observandū, in declinatione paroxysmi, si sponte sudet æger, cooperiatur leviter; alioquin si beneficio naturæ non erumpit sudor, ante paroxysmum quartum non provocetur, idque in tertianis, post quem, apparentibus coctionis signis, in fine accessionib⁹ commodè cieri potest. In Quartanis ante coctionis signa nec profunt, nec arte proliciendi sunt. Quod si ante talia signa sudent quartanarii, equidem non suprimendus est, aliàs graves dolores Osteocopos inferre solet, de quo videatur *Ballonius in Bonetti Pharo Med. p. 199.* Et sane quælibet specifica mediante sudore febrim profligare solent.

VII. In Tertianis perniciosis siue malignis alexipharmaca semper misceantur cum specificis diaphoreticis, quia magnum periculum subest, dum febris maligna tertianam simulat, propterea cautus sit Medicus, præsertim cum lingua sit aspera, omniumque virium prostratio. Forlan huc respexit *Job. Toll. in prax.*

*Schen-*

*Schenckian*  
bus & debili  
in paroxysm  
Nempe En  
non foret i

VIII

tollit miti  
vis & evac  
ex consue  
2. Quanc  
xylmo,  
cunque  
plices fe  
postmo  
An

fuit, rect  
ctionem  
probl. p.  
cum 3i.  
mittentes  
pinetur  
Hincali  
fugavi.

IX.

xylmum  
cuus. C  
xylmo p  
servient  
jecto cl  
finitur  
vel die  
etiam a  
nihil de  
lior: pro



*Schenckian.* p. 290. dicens: Cum paroxysmus tertianæ est cum malis accidentibus & debilitate corporis, ita ut putetur à materia venenata esse, dentur infirmo in paroxysmo sem. citri aliquot grana, & videbis effectum mirabilem &c. Nempe *Emulso sem. citri* additis appropriatis alexipharmacis & absorbentibus non foret inutilis.

**VIII. Opium ac Opiata** lenissimo usu omnes febres intermittentes tollit mitigatque continuas. Sed usurpandum præmissis universalibus digestivis & evacuativis, idque *salt em duobus in casibus*. 1. Quando paroxysmi potius ex consuetudine naturæ febriendi sæpius recurrunt, quam ex fomite morbofo. 2. Quando graviora quædam, aut etiam molestiora, symptomata, durante paroxysmo, affligunt ægros. Interim *nunquam solum*, sed febrifugis usitatis, quacunque formâ, admisceantur. Metus est, nec citò nimis, aut solum usitata, simplices febres reddant duplicatas: aut sopiendo febrim, graviores recidivam postmodum inferat. Hinc quæstio oritur:

*An Theriaca concedenda in Quartana?* id quod à Galeno olim factum fuit, rectè cum cautela hoc faciendum monent Practici, ne intempestivè ante coctionem data febrim multiplicet. Confer. *Ballonius Phar. Med.* p. 200. *Horst. probl. p. 15. Decad. 1. Q. ix.* Nam modò ritè procedatur, *succus absinth. ad 3ß. cum 3j. theriacis* in haustu vini ante paroxysmum propinatus, quasvis intermittentes abigunt. Quod si nimius æstus theriacæ usum videatur respuere, propinetur 3j. in moderato haustu aceti, & mediante sudore febrim profligabit. Hinc aliquoties, ubi omnia ritè præmissa fuerunt, sequenti bolo aliquot febres fugavi.

℞. theriac. ʒij. ad 3j.

specif. febril. Strobelbergeri 3ß.

ol. destillat. caryoph. gr. iij. M. probè, capiatur bihorio ante paroxysmum.

**IX.** In omnibus intermittentibus aliisque periodicis febribus *ager ante paroxysmum neque cibum neque potum assumat*, sed necesse est, ut stomachus sit vacuus. Quidquid enim ingeritur, aut ingestum est, digestionis primæ, in paroxysmo penitus deficientis, errato in recrementa cruda abit, novo fomiti febrili infervientia, è contra utilissimè ante paroxysmum alvus exoneratur, vel per se, vel injecto clystere. Interim *pro potu in febribus* optimum est *vinum, & cerevisia absinthites*, vel etiam vinum quoddam ex alterantibus aromaticis medicamentum, vel die intermissionis, vel declinante paroxysmo, usurpatum. In ipso paroxysmo etiam à potu abstinendum est; nisi in ipso caloris vigore, & paroxysmo jam non nihil declinante, potus sed calidus concedi potest, isque quò calidior, eò liberatior: promptissimè enim sudorem promover. In *Quartanis parcissimè bibendum*



est, cum nil hanc febrem magis contumacem reddat, quam nimia potus in paroxysmo copia. Crato planè in paroxysmo quartanario potum interdicat, quod maximè curationi conferre asserit. Certè crebrior, præsertim cerevisiæ potus diuturniores reddit has febres, in paroxysmo febris ingurgitatus, mucum in primis viis, & hinc fermentum febrile in fomite augens, adeoque consultum est, ut à potu abstineant, quamdiu possibile, aut saltem non prius bibant, quam æstus invaluerit. Et quidem bibant potum calidum, & si melius suis rebus consulere volunt, huic primo potui, aut saltem sequenti, uni alterive minus calido instillent spiritus salis armoniaci simplicis ad gutt. 40 ut hujus usu quasi corrigatur noxa à potu illata, ac simul largior promoveatur sudor. Potus sit vel aqua, vel cerevisia tenuis, siue secundaria cum vino absinth. medicata aut saltem cum simplici vino ita correcta, vel quod his præferendum, serum lactis probe depuratum, præsertim in scorbuticis, cui etiam commodè de succo citri aliquantulum instillari potest, aut loco horum Decoctum Tamarind. cum passulis egregiè convenit. Quod si nimius sitis urgeat, simulque æstus gravior incensus sit, commodè potui nitrum addi potest, ita, ut aliquot drachmas ebibere sit licitum.

X. Salia fixa vegetabilium; item volatilia salia animalium, adeoque quælibet alcalia omnes febres intermittentes tollunt: v. g. sal absinth. cent. min. carduiben. &c. & his additum vel antimonium diaph. vel lapill. S. vel corallia tanquam optima specifica subinde paroxysmos fugant, præsertim ubi nimis urget frigus, salia fixa sunt convenientiora, contra ubi æstus excedit, & \*ci convenientior est, aut hujus loco \*cum. Certè salia volatilia, v. g. \*ad ʒj. pro dosi, ante paroxysmum propinatus, est universale intermittentium, & repetito usu, præmissis præmittendis, rarò fallens remedium. Ipsas enim scorbuticas mitigat cum \*cochl. mistus loco cujus \*convenit, v. g.

℞ \*ci ʒj. ad ʒss.

corall. rub. præpar. gr. xv.

ol. destilat. junip. gutt. ij. M.

F. ☿ ante paroxysmum exhibendus.

Vel: ℞ corall. rub. præparat.

☉ absinth. an. gr. xv.

☿ dest. caryoph. gt. ij.

laud. op. gr. ʒ. adj. M.

F. pulv. detur ante paroxysmum.

Vel: ℞ sal card. ben. ʒj.

☿ diaph. gr. xij. vel xv.

laud. op. gr. j. M. F. pulv. ante paroxysmum in vehiculo cam-

lido assumendus, expectando post paroxysmum sudorem.

Vel:



Vel: ℥. ♂ is absinth.  
 arcan. duplic.  
 lap. ♂. an. gran. xv. M. F. pulv. D. ante paroxysm.

Vel: ℥. aq. card. bened. ℥j. ad ℥ij.  
 spir. falis armoniaci simpl. ℥ss. ad ℥j.  
 ess. opii gt. viij.  
 syr. Card. Bened. ℥ij. M.

Vel: ℥. ▽ card. bened. ℥j.  
 — sal. armoniaci ℥ss.  
 lap. ♂. præparat. ℥j.  
 ol. destillat. caryophyll. gt. ij.  
 syr. Card. Bened. ℥ij. M.

Item contra Quartanam

℥. sal. absinth. ℥ij.  
 lap. ♂. præparat. ℥ss.  
 ♂ diaph. ℥ss. M. pro 2. dos.

Vel: ℥. corall. rubr. præparat.  
 sal. absinth. an. gr. xv. ad ℥j.  
 ♂ fulminant. gr. vj. M. dentur ante paroxysmum.

De ♂ fulminante vid. Höferus in Herc. Med. p. 292. item

℥. spir. falis armoniaci ℥j.  
 essent. opii gt. xv. M.  
 capiatur unâ vice ante paroxysmum.

Vel: ℥. ▽ card. bened. ℥j.  
 sal. absinth. ℥j.  
 cent. min. ℥ss.  
 Julep. rosac. ℥ij. M. pro dosi j.

Pertinet hæc mixtura specifica febrilis Crollii, quam toties usurpat Riverius.

℥. ▽ cichor. ℥ij.  
 sal absinth. ℥ss.  
 — ♂ is vel ♂ li. gr. xv. ad ℥j. M.  
 capiatur 2. horis ante parox. Vid. River. cent. 1. obs. 20. & 26.

Vel: ℥. ▽ cent. min. ℥ij.  
 cinam. ℥j.  
 — \* ci simpl. ℥j.  
 syr. debeton. ℥ij. M.

XI. Fixa & imprimis calcinata optimè quidem curant: sed revera potius sup-  
 primunt febres intermittentes, adeoque non æquè turò semper usurpantur,  
 quin recidiya superveniat, vel febrem multiplicent, nisi universalia ac primas



vias probe abstergentia exactè præmissa fuerint. Talia sunt *specif. febrile Strobelbergeri, Crollii, Mynsichtii* à ʒß. ad ʒj. item *ʒ. diaph.* Quò pertinet *pulvis febrilis perlatus Timai.* Certe aliquoties observavi, ab horum usu si febres curatæ fuerint, vel diu languidos fuisse ægros, vel tumoribus abdominis hinc facile fuisse obnoxios. Usurpandi modus est:

℞. aq. taraxac. ʒiß.

specif. febrile Strobelberg. ʒj.

syr. de succ. carduiben. ʒij. M. D.

S. Zieber Milch auf einmahl.

Vel: ℞. specif. febrile ʒß.

sal. absinth. ʒj. M. D. pro 1. Dos.

Unde, pro his incommodis præcavendis, post febrim profligatam dandum est blandum laxans die illo, quo alias paroxysmus redire solet, v. g. ex mass. pilul. de ammoniac. addito extracto absinth. cum debito stimulo, vel si recidiva forsitan supervenerit, hanc præmissis prætermittendis levat *sal armoniaci: vel solum, vel cum coralliis præparat. aut antihæctico Poterii* multum, ante paroxysmum usurpatum. Propterea præfero hujusmodi Calcinatis alcalia supra laudata. Pertinet huc alumen, à non paucis tanquam singulare febrifugum intermittentium commendatum, in specie *Magisterium aluminis Schröderi in Pharm. p. 324.* De quo conferatur etiam *Hoffmannus p. 349. Dos. ʒß. ad ʒj. bis vel ter ante paroxysmum propinatum eas profligat: Novi hoc remedio empirico diuturnas in Medici opprobrium febres curatas.*

℞. nuc. mosch.

nitr. depur.

alumin. an ʒj M. divid. in 3. part. æq. & tribus successivè paroxysmis, dum ingruunt, assumatur, expectando odorem, febrim solvit. Sed stypticâ vi condensando humores, & figendo fermentum febrile, vel palliativè curat alumen, vel non sine metu alicujus succurrentis morbi. Facit huc & saccharum Hi, in quartanis non inelegans *εὐπρόσιτον.*

℞. lap. cancr. ʒß.

sacch. Hi ʒß. M. F. pulv. propinandus ante paroxysmum.

Sicut continuo pul. ocul. ʒ. usu ad 14. dies in decocto carduibened. propinati contumax aliquot mensium quartana aliquando curata fuit.

XII. *Salix fixa, ut Tartarus vitriolatus, sal. hypochondriac. Arcan. duplicat. &c.* mirè in omnibus intermittentibus conveniunt, inprimis in principio morbi ante universalia utiliter propinantur. Diebus enim intermissionis pro abstergendis primis viis, & removendo paulatim, si quis subsit, fomite febrili, multum valent, bis quotidie usurpata: ita ante paroxysmum etiam commodè propinari possunt, præsertim *arcan. duplicat. Scorbuto* præ cæteris infestum, quam feliciter etiam tollit. v. g.

℞. Ar-



℞. Arcan. duplicat. gr. xv.

lap. ☉. gr. xij.

ol. destill. junip. gut. ij. M.

Vel ℞. Arcan. duplicat. gr. xv.

salis absinth.

corall. rub. præp. an. ℞.

laud. op. gr. j. M. F. ☿.

XIII. *Acida*, an qua talia in intermittentibus ut sic convenient, dubi-  
ro. Sanè ex iis commodum adèdè singulare haurire vix potui, nec nisi inter-  
dum, dum nimis urget æstus, pro hoc nonnihil compescendo, mediante fi-  
xatione humorum effervescentium, convenire solent. verbi gratia: Si in febre  
intermittente rigori intensior superveniat æstus: vel cum clamosa siti junctus:  
vel cum difficili sudoris eruptione: vel quando ipsa intermittens tota est ar-  
dens: vel quando intermittens plus minus ardens in continuas degenerare velit,  
optima sunt, declinante nonnihil paroxysmo, aut saltem non ante ejus statum,  
tunc sequens mistura confert:

℞. Aq. rubi idæi ℥ij.

succi rubi idæi ℥ij. ad vj.

☿ diaph. ℥j.

syr. rubi idæi ℥ss.

☉ dulc. q. s. pro grato sapore M. capiatur subinde co-  
chlearim. Mirabiliter ardorem compescit, sitim minuit, sudorem provocat, &c.  
Item proficuum observavi sequentis mixturæ usum.

℞. Aq. menth.

fumar.

acetos. an. ℥j.

✕ sambuci vel rubi idæi ℥vj.

☿ theriacal. simpl. ℥ss. ad ℥ij.

lap. ☉ præp. ℥ij. ad ℥j.

syr. cort. aurant. ℥ij. M. F. potio cochlearim usurpanda;

item proficua, quando *angustia & anxietates præcordiorum*, ut *flatulentia &*  
*hypochondriaca* abdominis symptomata nimis urgeant. *Frigus* febrium atque  
*rigorem* omnium optimè compescunt *aromatica*, præsertim sub ☉i vel extra-  
cti forma usurpata, v. g. mirabiliter frigus & rigorem compescunt ☉ destillata  
caryoph. junip. ac similia, ingruente paroxysmo regioni stomachali inuncta, ap-  
plicato desuper latere probè calefacto. Vel

℞. ☉ destillat. macis

caryoph. an. ℞.

junip. ℥j.

☉

ol. nuc.



ol. nuc. mosch. expr. ℥j. M.F. balsam. præcordiis dicto modo inungendus. Qualis inunctio etiam interdum regioni lumborum aut plantis pedum applicari potest. Imò solus later calefactus, plantis pedum applicatus, rigores etiam solet imminuere. *Internè hæc ipsa symptomata optimè corrigunt salia fixa, extracta, aromatica amara, olea destillata acria, qualibet opiata.* Hinc *mistura ex theriaca cum specifico Strobelbergeri* egregia est, præsertim in casibus, quando intermittentes omnem calorem deponunt, & solo frigore molestæ sunt, sive algore fiunt, it. ℥. Salis absinth. ℥j.

matr. perlar. vel ꝑis ostrear. præp. gr. xv.

piper. alb. ꝑ. sat. gr. vj. vel vij. M. pro una dosi 2. vel tribus

horis ante paroxysmum assumenda. Sic etiam in *chronicis intermittentibus*, in quibus ordinario magis rigor urgere solet, vulgus *granorum piperis* viij. vel xij. in grossa frustula concisa in haustu cochlearis ∇ ritæ assumit ante paroxysmum, fausto cum successu. Item pro compescendo rigore :

℥. Θ absinth. gr. xv.

lap. ℥. ℥ss.

ol. destillat. caryoph. gut. ij.

laud. opiat. gr. j. M.F. ꝑ. capiatur ante paroxysmum, inungendo simul dicto oleo præcordia. Item

℥. Extr. absinth. ℥j.

Θ absinth. ℥ss. c. l. q.

℥. destillat. caryoph. F. Pilulæ, capiantur ante paroxysmum, egregie calefaciunt.

XV. *Ad intermittentes ardenes*, præmissis præmittendis, nil melius est quam *sal armon. vel solitarium*, dosi ℥j. ad ℥ss. ante paroxysmum usurpatum. Vel :

℥. Sal armoniaci ℥j.

antihectic. Poter. ℥ss. M.F. ꝑ. ante paroxysmum. Certè nil magis *astum intermittentium mitigat*, quam ✱, aut ejus *us urinosus*, & hinc etiam *arcan. duplicatum*. Aliàs aliquot febres ordinario modo affligentes profligavi.

℥. Sal armoniaci ℥j. ad ℥ss.

corall. rub. præp. gr. xv.

ol. destillat. junip.

macis an. gut. j. M.F. ꝑ.

ante paroxysmum propinandus.

XVI. Post rigorem subinde, superveniente jam æstu, ægri conqueruntur de *in signi viriam prostratione*, cum *respiratione anhela*, *celeri*, *frequenti & parva*, & *gravissimo æstu interno*, utur quoad contactum externum minus æstuarere solent. Talibus in æstu paroxysmi vel ✱, quocunq; modo propinatus, vel *mistura* cum aceto & lapidibus ℥. supra insinuata, bono cum successu propinaur.

XVII.



XVII. In Paroxysmis intermittentium subinde graves *Cardialgia & stomachi rosiones*, item *precordiorum angustia*, similiaque symptomata *inquietudinem & anxietatem* inferentia, idque imprimis in hypochondriacis & scorbuticis molestias pariunt. Curantur, præmisso pro circumstantiarum ratione vomitorio, vel applicato in principio paroxysmi clystere, per Empl. ex Tacamahaca vel sola vel cum cerato de ladano *Cratonis* mista, cum oleis destillatis malaxata, & regioni stomachi applicata.

XVIII. *Cephalalgia* variæ post paroxysmum, aut die intermissionis, nisi suppressus sudor easdem inducat. Fir tamen in febribus nonnullis imprimis scorbuticis, ut in primis paroxysmis nullus omnino promanet sudor, sed declinante jam febre hic vel sponte prorumpit, ita ut noctu diuque interdum cum euphoria tales sudoribus tantum non disfluant. Ergo pro cephalalgia tali vel sudor patienter expectandus: vel blando epithemate camphorato calido dictus dolor mitigandus.

XIX. *Vesicatoria*, vel nuchis, vel carpis manuum applicata, febres diurnas optime exhaustunt, speciatim rigor ex eorum usu cessare solet: interdum penitus cessat febris, applicantur die intermissionis, ut ita eorum operatio præveniat paroxysmum. Nam & *Strobelbergeri Empl. febrifugum* vim nonnihil causticam, certe intensè rubificantem obtinet. Sic quoque *Potterius lib. 2. de febb. c. 23. p. 109.* refert, quod in *quartana diurna* vesicatoria carpo admodum interdum sint proficua. Quod etiam facit suo modo *salivatio* *gialis*, *quartanarios* subinde radicibus curans, ut hoc reverà videatur remedium ipso morbo gravius. *Conf. Ballon. in Bonetti Pharo. Med. p. 626. 653. It. Piens de febb. part. 2. p. 273.* Notabile est aliàs eos, qui aliquandiu intermittentibus laborarunt, promissimè salivare, etiam ex aliquot granis *g* duleis propinatis. Hinc *ad præcavendam* talem *salivationem* purgatio promovenda; vel fortis sudor repetitus imperandus.

XX. *Intermittentes diurnæ*, præsertim tertianæ duplicatæ, item continuæ paulo diuturniores, ita videntur alterare sanguinem & inde derivatam lympham, ut crassior, viscidior, glutinosior eorum evadat textura, unde convalescentes tales adhuc *febriculas lentas* subinde experiuntur, aut saltem *appetitus* aliquandiu infaulto omine *non debite* redit. Febriculæ tali optimè (præmisso interdum vomitorio, mucum primarum viarum eliminante) per *\*cum* occurrere possumus. *Anorexia* vero vel *absinthii*, vel *centaurii min.* continuatum qualemque aliquandiu usum.

XXI. *Diurna* febres, it. quæ per copiosa absorbentia, aut calcinata terrea diutius usurpata, curatæ fuerunt, vix sine insigni viscerum labe, aut multiplicibus hinc resistentibus symptomatis solent evanescere, unde & colicæ & hydropes, aut pedum saltem tumores, aut cachexiæ subinde hos insequuntur.



Talibus malis & præcavendis & curandis optimè intersit *absinthium* in decocto, essentia, succo, extracto, frequentius usurpatum, aliaque congrua amara. Sanè *crurum tumor oedematosus* ordinariò chronicis intermittentibus supervenit, præfertim si copiosius biberint ægri, & parum sudaverint, vel si copiosius post curam febris citò se ingurgitent; sed parum in recessu habet hic tumor; interno etiam multiplici *absinthii* usu, externo vero *chelidonii* maj. recentis plantis pedum admonitione facile abigitur.

XXII. Dum jam remittit febris universaliter, aut etiam alio tempore die intermissionis, commodè essentia *absinthii*, centaur. min. spirit. cochlear. Elix. propr. sine acido, Elixir febrile *Mynsichtii*, similiaque alterantia, quæ acidum infringunt, & biliosiores, actiores & subtiliores reddunt, propinantur bis in die ad 30. vel 40. guttas.

XXIII. Febres intermittentes hic loci ut plurimum cum scorbutis conjunctæ sunt, unde sæpius subinde recidunt febres. Retuli D. Michaelis quendam quinquies recidivam passum fuisse, ob scorbutum febris junctum, quo curato, febris planè cessavit. Talibus in febribus necesse est, Medicus aliis remediis semper addat anti-scorbutica, v. g. conducunt in tali casu arcanum duplicatum *Myns. magist. corall. c. succo citri & spir. cochlear.* ac similia aliis sociata, v. g.

℞. Elixir. febril. Myns.

spirit. cochlear. an. ʒij. M.

capiantur gutt. 40. bis in die intermissionis.

Vel: ℞. aq. antiscorbut. Dornier. ʒi.

sal armoniaci ʒß.

cochl. ʒj.

laud. op. gr. j.

syr. sceler. Forest. ʒij. M.

Vel: ℞. arcan. dupl. Myns.

magist. corall. c. succo citr. an. ʒj.

⊖ CC. vel viperar. volat. gr. iij. M. F. ʒ.

Vel: ℞. aq. antiscorbut. Dornierell.

febrifug. usit. an. ʒjß.

cochl.

sal armoniaci an. ʒj.

laud. op. gr. j.

syr. sceler. Forest. ʒß. M. S.

Wässerstein zum Pulver.

In hoc ipso tanquam vehiculo capiatur iste ʒ, atque durante paroxysmo, durante æstu, aut saltem post rigorem subinde de eadem capiatur. Agitat subinde febrici-



febricitantes tales *sitis*, qua pro fallenda, optimum est *serum lactis caprillum acidulatum cum succo citri*, item *decoctum tamarindorum* egregium est in talibus febribus. v.g. *R. Tamarind. ℥i℥. coq. in sero lactis vel aqua hordei. Colatura Tinctura fl. bellidis ℥ij. tingatur, addendo Syrup. violarum q.s. pro gratia saporis. M.D.* pro Julapio durante æstu. [Morellus de mat. med. p.m. 330. Decoctum ita fit, ait: *R. Tamarind. ℥j. coq. in feri lact. vel juris alterati lupulo vel fumaria ℥x. ad consumptionem ℥ij. Colentur per linteum densum. cappe de Colatura ℥j. ℥v. ℥vj. cum Saccharo fiat potus.*]

XXIV. *Julapia refrigerantia* locum non habent, ubi calor proportionatus est constitutioni ægri, vel qualitati materiæ coquendæ, &c. multò minus, ubi minor est. Ergo in tali casu satius est, si *sitis* adsit, concedere potum ordinarium consuetum. Sic quis vino adsuetus, nec in totum interdicens, quia consuetudini aliqui dandum, & ingens delictum foret, ab uno extremo ad aliud prolabi: *Nobilissimum remedium ad temperandum calorem febrilem est & depuratum*, supra hoc nil melius desiderare poteris, si propinetur in decocto hordei. Sumatur & depuratum, cujus præsertim in febribus ardentibus continuis continuè ad ℥℥. licet dare, nempe successive. Si accadat, ut dato & urina cum tanto ardore non mittatur, vel liberalius accadat mingere, bono animo esto. In febribus ardentibus monendi sunt ægri, ne nimium potum ingurgitent, quoties lubet. Præstat liberiorem potum concedere, modo dein expectent, dum sentiant omnem ex ventriculo abiisse. Si vero hoc ab ægris impetrari non possit, ut calidum bibant, optimè esset. Si enim calidum biberent, cum & dissoluto, magis calorem refrænari & temperari videres; à potu enim frigido magis incalescimus, quod videmus, cum ex ambulatione æstuiamus & frigidum bibimus, verba sunt *Lindani super Hartmann.*

XXV. *Externa specifica* subinde multum valent, non tamen applicanda sunt, nisi præmissis universalibus. Sic *Emplastra, Cataplasmata, amuleta* subinde proficua sunt. Illa parantur vel ex *allio, sabina, ruta, ranunculo ardente, plantagine vulgari & aquatica, terebinthina, calce viva, pulvere pyrio, croco, araneis, harum oleo, &c.* Sic *allium contusum mistum cum croco carpis manuum* applicatur. Quibus quidam *piper longum* addunt; In *fuligine furni* non contemnendum remedium est, si *hæc & salvia ana misceantur cum albumine ovi, & applicentur palmæ manuum*, egregiè æstum compescunt. Alii recipiunt *fuliginem, eandem cum allis, cepis & albumine ovi miscent, aceti nonnihil affundunt, & ita carpis manuum applicant, &c.* Facit huc *Empl. febrisugum D. Michael.* quo mediante senem ferè octuagenarium *quartana* laborantem curavit.



℞. Fuliginis fumi splendent ꝑjß.

terebinthim. ʒvj.

telarum araneorum ʒj.

camphor. ʒij.

ⷑ aran. q. l. F. Empl. carpis manuum utrinque applicandum. Rectè additur *camphora*. Nam hæc à ʒj. ad ʒij. sacculò lineo inclusa, & in scrobiculo cordis suspensa, donec exhalaverit tota, feliciter *tertianarios* restituit. In *quartanis* præ cæteris externè *aranea carum*, & *conducunt*. Unde & *Emplastrum febrile Strobelbergeri* araneas pro bali cognoscit.

XXVI. Notatu dignus est *Ballonii locus in Bonetti Phar. Med. p. 213*. Puellæ febre tertiana jam mensē laboranti, ante paroxylmos dextri hypochondrii & cruris dolores calore extenso quiescebant, &c. &c.

XXVII. Sic in cura quartanarum & hinc etiam quarumvis chronicarum Medicus *tangat hypochondria*, an adsit tumor aut durities, scirrhus lienis, hepatis aut melenterii, *querat itidem*, an multi adsint flatus, item an viscera interna salva sint. Facto hoc, demum prognosin & curam instituat. Certè cum quartanæ aliæque intermittentes vix possint esse diuturnæ, quin superveniat vitium lienis, aut alius cujusdam visceris abdominis, in talibus casibus non negligenda *Martialia*, die inprimis intermissionis *cum febrifugis mista*, v. g. *Tinctura Oli ʒis Zuvelf. solut. ʒis cum succo pomorum mista c. m. coctlear.* & *Martis compos. &c.* & *diaph. Martial.* & hoc præsertim, ubi icterus supervenire velit. Externè in talibus casibus *emplastrum de cicuta mistum cum gummi ammon. in acet. solut.* misceantur & Emplastri figura applicentur. Item *emplastrum carminativum Sylvii* hic optimo cum successu applicatur. *Helmontius* mentionem facit Emplastri, quo, ad splenis regionem applicato, plurimos quartanarios se curasse asserit. Compositio & præparatio ejusdem quibusdā dicitur hæc: *℞. Tabaci, q. v. affunde vini q. s. coq. ad ebullitionem ad mediam horam, postea coletur & fortiter exprimatur. Colatura expresse adde succi Nicotian. inspiss. mollis communis cera, olei commun. q. s. ad consistentiam Emplastri, applicetur tepidè regioni lienis.*

XXVIII. In chronicis ac diuturnis intermittētibz, ac in specie in quartanis, discussō licet morbō, diu paroxylmi tempus ægri observent, & præsertim ordinaria diætā & abstinētia recidivā declinent. *Conf. Aët. Medic. Hæsn. vol. I. pag. 191.*

XXIX. Inter Parhemata, quæ malè curatas febres, præsertim intempestivè suppressas insequuntur, est inprimis *Colica convulsiva*, quales nempe etiam *Parresin* inducere valent, v. g. mulieri post curatam tertianam, per ol. destillat. juniperi supervenit tandem gravis dolor abdominis, præsertim hypogastrium lanci-

nans



nans & insigniter gravativus, cum retractione umbilici interiora versus, pertinacissima alvi adstrictione.

℞. Aq. menth. ℥jss.

sal armon. ℥ss.

laud. op. gr. ij. vel iij.

syr. cort. aurant. ℥iij. M.

capiatur subinde cochlearim.

Sedato nonnihil paroxysmo, propino potionem laxativam passulatam, propriè dictis purgantibus frustra, & cum dolorum exasperatione usurpatis. His præmissis, cum superesset adhuc dolor in abdominis regione hypogastrica, & tumor durus instar parvi farciminis ibid. tactui se offerret, applicandum jussi.

℞. Gummi ammon. in ✕ soluti

Empl. de Galbano uir. an. q. s.

malaxentur c. s. q. Ungt. de alth. compos. F. l. a. Emplastr. irrorandum cum ☉ philosoph. applicetur dictæ regioni, optimè contulit & ita curata est. Alvus in talibus pertinaciter clausa esse solet, ita quidem ut nec purgantia, nec clysmata aliquid operentur, tunc contra decoctum passulatam optime est proficuum. Quod si omnia fuerint sedata, in usu absinthiacorum aliquandiu persistendum.

XXX. Quoad febrifuga catholica, revera legitima sub medendi methodo plura dantur talia, ut ☉ ia fixa, vel ✕ cum non immeritò huc revocari queant, sicuti sub perverso ausu, & inconcinna methodo etiã optima specifica fallant. Kergerius de ferment. sect. 3. p. 250. commendat suum febrifugum præcipitans ad quasvis intermittentes. Relatum est ab amico, esse nihil aliud, quam cremor ☿i part. jv. & corall. rub. præp. part. iij. subtilissime pulverisata. M. exactè & doi. ℥ss. usq; ad ☿ j. tam die intermissionis, quam ante paroxysmum usurpentur. Helmontius commendat suum ☿ium diaphoreticum siccum, sed quem in arcanis sibi reservavit. Pertinet huc febrifugum antiquarium Riverii, etiã quasvis alias febres curans, cujus plures hinc inde circumferuntur descriptiones. Plures parari istud volunt ex ☉o, ☉o, ☿io & ☿ vivo, una via sicca præcipitatis. Sed dubito fere de hac descriptione. Nam ☿iale remedium esse existimo, & si rectè operandi ratio in ejusdem operationibus observetur, facile quasi suspicari potest, ex basi Mercurii dulcis procedere.

His ita observatis, & medicandi ratio & remedia febrium intermittentium patent. Aliàs inter febrifuga vegetabilia locum habent quævis amara, in specie absinthium, carduus bened. centaurium minus, gentiana, tertianaria, taraxacum, nasturtium, sedum minus, præsertim in quartana & in scorbuticis. item zedoaria, chelidon. majus, imperatoria, china china, &c. & hæc in specie ad quartana usum est proficua, si dosi ℥j, ad ℥ij. vel in forma sicca, vel quod præstat, in ha-



in hâuſtu vini calidi ante paroxyſmum uſurpetur. Ordinariè *quartanam* fugat, *Invenit tamen eſt remedium*, quia poſt unam alteramve ſepumânâ recidivat malum, niſi poſt chinæ uſum ac proſtigatam febrim purgatio blanda iuſturatur. Genuinum uſurpandi modum vid. in *Bartholin. cent. 5. liſt. 50.* item *Sydenham, obſervationibus de morbis acutis & epidemicis, p. 98. ſ. 1. c. 5.* Sed loco hujus revera aſbittor, *Gentianam*, aut ejusdem ſuccum inſpiſſatum commode poſſe ſubſtitui, cum hac ipla *Gentiana* in morbis chronicis, etiam *quartana* ſit egregia, ſicut *Barbette in ſua Praxi ſalia fixa* huic chinæ chinæ ſolet anteponere. Ex hiſce *Veteres* eorundem ſuccos recenter expreſſos, aut etiam decocta amariffima ante paroxyſmum adhibuerunt. Conf. *Rulandum in ſuis curat. empiricis*, per hujusmodi decocta mediante copioſo ſudore quosvis intermittentes curans. Addatur hiſ *myrrha*, ante paroxyſmum contra *quartanam* laudata. Ac credo, præſertim in *ſcorbuticis*, quod non contemnendum ſimplex ſint. Sunt qui  $\mathcal{L}$ . *Myrrh. caſtor. opoponac. gentian. abſinth. an.*  $\mathfrak{zj}$ . c. ſ. q. *Mithridat. & ſucci gentian. F. pilula. N. 25.* de quibus horis 2. ante paroxyſmum æger, 7. vel 10. deglutiat, & hinc ſudorem expectet. Hiſ addatur etiam  $\mathfrak{q}$  inter febrifuga non ineptè relatum à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . ante paroxyſmum. Sanè  $\mathfrak{z}$  *pyrus* non ineptum eſt militum febrifugum, quo utuntur in caſtris ad intermittentes fugandas, Doſ. à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . qui ratione  $\mathfrak{q}$ is &  $\phi$  utique convenit. Facit huc  $\mathfrak{z}$  *roſceus febrifugus D. Saltzmanni*, cujus baſis eſt in ſulphure :

$\mathcal{L}$ .  $\phi$  fixi  $\mathfrak{z}\beta$ .

ſor. ſulphur.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ .

ſal armoniaci  $\mathfrak{zj}$ .

ſantal. rubr.  $\mathfrak{z}$  lat.  $\mathfrak{zvj}$ .

ſacch. albiſſimi  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ . M. F. Pulv. propinetur à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{zj}\beta$ .

ante paroxyſmum. Santalum & ſaccharum poſſunt ſine noxa omitti, & tunc doſis diminuatur.

Februm intermittentium curam tradit *Hermann. Grube de medicam ſimplic. cognoscendis ſect. 1. art. 2 p. 13.* quam, quia compendioſa eſt, tranſcribere & ſuperioribus addere placet. Multos ait febre intermittente laborantes compendioſe (abſit faſcinum) reſtitui, præmiſſis tamen præmittendis, (vel Venæ ſectione, ſi e re videbatur, vel clyſtere) ſequenti, & bilis ferociam refrænante & eliciente ſudorem pulvere.

$\mathcal{L}$ . CC. phil præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ .

ſalis prunell.  $\mathfrak{zj}$ .

$\mathfrak{z}$  diaphoret. gr. viij.

M. D. in 2. part. æq. S.

Ein Fieber-Pulverlein auff 2. mahl.

Hunc pulverem ægro, ſe paululum ad ſudorem componente, in aqua carduib. aut

aut alia ſpec  
miſſionis pr  
mili frequ

Post  
reſtituti  
multis e  
omnibu  
verem,  
ita imm

Hic  
obſtruch  
ret, ſud  
ſolvat. D  
formata  
habetur.

Vel i

U  
dimidiu  
citr. mi  
terit ad  
quor gu



aut alia specifica aliquot ante paroxysmum horis curavi propinandum. Die intermissionis præbui per vices unum, item & alterum cochlear sequentis, quæ in usu mihi frequentiore est, mixturæ

℞. Aq. petroselin. ℥ij.  
card. ben. ℥j.  
cichor. ℥ss.  
theriacal. simpl. ℥vj.  
syr. de s. radic. aper. ℥j.  
℞ per campan. ℥ss. M. S.

**Et alteriende Mixtur.**

Postera luce alteram partem pulveris ante dicti (si opus fuerit, nonnulli enim restituri sunt sumto tantum priore) jussi propinari. Et sic fomes ille febrilis in multis est discussus. Si vero multum negotii dederit pituita (quæ quidem in omnibus peccat intermittens, in aliis etiam magis, in aliis vero minus) pulverem, quem una item & altera ante paroxysmum hora præbendum curavi, ita immutavi.

℞ CC. phil. præp. ℥ij.  
salis card. bened.  
cent. min. an. gr. vij.  
M. divid. in 2. partes æqual. S.

**Ein Schwef. Pulverlein auff 2. mahl.**

Hic & is tali videtur casui maximè accommodatus, cum & pituitam incidat, obstructions pancreatis, ceu genuinam febrium intermittentium matrem referet, sudores moveat & urinam, & salium ratione alvum in nonnullis blandè solvat. Diebus autem intermissionis, vel sequenti, vel aliis ad similem modum formata usus sum mixtura, quæ & ipsa in multis mihi morbis instar polychrestæ habetur.

℞. mistur. simpl. ℥ij.  
essent. absinth. ℥ss.

℞ cochl. ℥i.  
tartari ℥ss. M. S.

**Ein schône Mixtur.**

Vel illa: ℞. Elix. propr. Parac. ℥iiij.  
essent. absinth. ℥j. M. S.

**Ein Sieber. Mixtur.**

Unde pro diversitate vel ætatis vel constitutionis ægrorum, vel scrupulum dimidium, vel integrum, aut in ∇. appropriata, ut fumar, cum syr. acetosir. citr. mixta, aut in vino exhibui. In quo quidem casu non citra fructum poterit adhiberi sal illud volatile oleosum Sylvii, si ejus detur copia, ex quo aliquot guttæ in vino possunt exhiberi. Sed si æger bile abundet, aut parciore



ejus sit usus, aut plane etiam ab eo abstineas, &c. Dispar autem in febribus intermittentibus procedendi ratio est, si aut malignæ sunt; aut cum aliis symptomatibus conjunctæ sunt gravioribus; vel in corpore cacochymico, vel in senibus, aut in infantibus, Hactenus Grube.)

De

## FEBRIBUS CONTINUIS.

Quoad supra factam divisionem considerabo prius febres continuas acutas, postmodum lentas. *Acuta primariae* sunt vel *simplices*, alias continentes, sive synochi putridæ, vel *compositæ*, alias continuæ periodicæ sive synochi.

*Synochus putrida* sive *continens* ita dicitur ad differentiam *Ephemeræ* & *Synochi non putridæ*. Hæ enim in fermentatione sanguinis naturali intensius aucta, & plus minus turbata, adeoque non naturali facta ex abusu rerum non naturalium consistunt (facile tamen in corpore impuro, sed cujus sanguis à debita crasi plus minus declinat, & heterogeneatum particularum ad fermentationem præternaturalem dispositus est, in putridam vulgo sic dictam, seu fermentativam præternaturalem degenerare possunt,) & secundum durationis suæ rationem in *Ephemeram* sive *unius diei naturalis* febrem, *Latinis diariam*; & hinc in *Ephemeram plurium dierum* sive synochum simplicem absque putredine, quæ ultra quintum vel septimum non durat, & aliquo critico naturæ motu finitur. De quibus jam amplius nil attinet dicere, cum vel raro sub Medici curam cadant, ut prior; vel sponte natura sua, modo à Medico non impediatur, desinat ut posterior. Videri tamen possunt *Sylvius l. 1. c. 28. Piens de febrib. part. 2. c. 2. p. 15. Willis de febb.*

*Synocha febris* igitur sive *continens* ingruit primitus cum rigore & horrore plus minus intenso, præcedente membrorum omnium lassitudine & aliquali capitis perturbatione, quam insequitur incalescentia, ac æstus totius corporis intensus, isque continuus, eodem tenore vel persistens, vel similiter accrescens, vel similiter decrescens, usque ad finem status. Isque æstus vaporosus boni ominis sæpius acris & mordax cum *pulsu* celeri frequenti, plus minus magno & vehementi, interdum inæquali, nempe similis ferè est pulsui, quem possumus in nobis observare, quando ex intensiori corporis motu concurrente irascibili animi pathemate, v.g. ex fuga, ex imminente malo incalescimus. *Urina* intensè tinctæ, crassæ, post aliquot dies successivè turbatæ, & sedimentum copiosum deponentes excernuntur.

Obser-



Observandum tamen, quod eorum urinæ, qui constitutionis sunt biliosæ, aut qui laborant scorbuto, aut qui declinant ad phthisin, levi etiam febricula intensè rutilecant, ob acriora & acidiora plus minus  $\Theta$ ia Massam sanguineam talium ingredientia: è contra quorum Massa sanguinea est magis temperata naturaliter, h.e. dulci nutritio chyloso succo æqualis permista, eorum urinæ minus intensè cæteris paribus tingi solent, & crassiores, illorum vero tenuiores observantur, hinc & pariter in illis naturaliter celeriores & frequentiores, in his rariores & tardiores pulsus observari solent. Semper igitur idiosyncrasia subiecti simul consideranda. *Sitis* affligit intensæ, *saliva* pauca, eaque glutinosa observatur, *cephalgia*, *agrypnia* ut plurimum junctæ esse solent. Pergit tali cursu hæc febris, donec *solvatur*, id quod fit vel subitanea crisi, vel successiva λύσις. Illa nonnisi in his febris accidere solet, idque frequentius in calidioribus climatibus, & generosiori victu potuque utentibus, rarius apud nos, idque vel septimo, vel decimoquarto, vel vigesimo primo, &c. λύσις vero pedetentim solvitur, dum cocta materia, v.g. per successivam urinæ excretionem, vel per sudores nocturnos crebrius repentes, successivè excluditur. Quod etiam facit, quando eadem, præsertim plus minus acuta, solvuntur per copiosam expectorationem, excretionem, & excreationem cum mediocri tussi: sicut præsertim petechialibus, i.e. *Stech. Fieber* / copiosa ex faucibus excretio & quasi pryalismus morbum solvit; interdum successivè abscessus quodam in loco supervenit, &c. nempe & λύσις hæc, his in febris successivam coctionem materiæ morbificæ insequens, crileos cum sit vicaria, tamen excretionem vel translationem materiæ coctæ fiat necesse est: nisi in lentam aut hæcticam similem acuta hæc febris degeneret, aut ex materiæ coctæ, sed non debite, h.e. non sufficienter in salum mutata, nec fixata, renovato fermentationis impetu recidiva sequatur.

In fermentatione igitur hac sanguinis præternaturali ita continuo pergente, & novum influorum præternaturali fervore & impetu hinc concitato, id, quod eandem occasionaliter inducit, adeoque fermenti præternaturales vices occupat, est secundum fundamenta, supra in genere posita, & quantum hæcenus ex juvantibus & nocentibus judicare potui, *Vitium chyli sub digestionem plus minus corrupti, & ob id in duodeno à bile affusa minus perfecti, sed vitiose alterati*, quod sub liquoris fermentativi occulto acido dulcis, aut acido amaricantis volatilis nidorosi forma successivè Massa sanguinis instillatum, eoque vices fermentationis & circulationis leges subit, donec ulterius aut copiosius congestum, vel quacunque occasione externa excitatum, tandem ordinariam sanguinis fermentationem & nascentiam naturalem turbat, indeque quasi effervescentiæ febrilis præternaturalis occasio existat, mediante qua heterogenea ista materia sanguini suffusa, ipsique inimica secernatur, & hinc excernatur,



ut in morbo nempe salubri: vel Massa sanguinea corrupta & inquinata deficiat in effectu secretorio, ut tandem penitus immutata ejus textura, & fermentatio vitalis & nascentia, & ipsa vita ceu illorum effectus deficiat. Adeoque depuratur Massa sanguinea in febre continente salubri; penitus vero pervertitur eadem in lethali, quasi sc. generosum mustum fermentando se depurat, & facum secretionem, tanquam quadam coctione in vinum generosum abit: quod undecunque laesa fermentatione ista in vappam, aut situm, aut potum ingratum, aliisve modis vitiatum transit. Quod simile intelligibilis saltem reddenda, non autem explicanda harum febrium naturae inserviat. Nempe hoc ipsum chyli vitium est quasi (mutatis nempe mutandis,) stercus liquidum, siue scoria ex intestinis praternaturaliter transmissum in Massam sanguineam, ibidem irritando archæum febrem inferens, ut vult *Helmont. Tract. de febr. c. 11.*

Confirmat hæc haec *analogia ista, quæ inter febrem intermittentem, & continuam talem intercedit*, dum non saltem de facili complicantur, aut invicem permutantur, ut infra patebit: sed quod unus est in intermittente paroxysmus, hoc in continua est integri morbi cursus. Nempe acidum primarum viarum fermentativum, sed sub digestionem aberrans, chyli non rite transmutati, & consequenter nec debite perfecti medio, in ægri Massam sanguineam delatum, praternaturalis fermentationis est occasio, quod aliàs naturali modo chylum perficiens, hunc sanguini permiscibilem, & continuatæ fermentationis adjumento perfecte assimilabilem reddit. Adeo nempe secundum *Verulamium in histor. vit. & mortis. pag. 136.* Stomachi robur fundamentum est ad reliquas coctiones, & omnes succorum in corpore fermentationes sunt saltem continuationes fermentationis, in stomacho inchoatæ, ut loquitur *Symson in zymologia. p. 50. &c.*

Ex dictis hæc vis & operandi ratio causarum remotarum promptè elicitur, cum febres hæc soleant frequentius occupare corpora juvenilia, magis grassari vernali & æstivo tempore, corpora it. εὐσπαρκα & εὐχρημα, quorum Massæ sanguineæ ob particularum fermentescibilium copiam & volatilem acrimoniam intensius fermentari solent. Ut taceam prohibitam transpirationem insensilem, iracundiæ fervorem, acrium & volatilem abufum, &c. Sic *Hildanus* immersionem subitanæ in aquam frigidam post æstum, corpora disposita in febres ardentes conjicere observat: *Cent. 1. observ. 95.* item *Valeriola l. 2. obs. 6.* (nisi synochus plurium dierum siue non putrida hinc oriatur) ex nimio usu aquæ theriacalis febrem ardentem observat *Cent. 1. hist. 31.* it. ex theriaca nimia quantitate adhibita, &c.

Hæc continentibus plus minus acutis & simplicibus complicari solent  
inter-



*intermittentes*, adeoque *continuae compositae*, sed quae certo temporis recurſu exacerbationes plus minus intensas patiuntur, ob id periodicæ dictæ generari ſolent.

Hæ ipſæ *continuae periodicæ ſunt plurimum tertianæ*, exque frequentiores, in quibus nempe ſine intermiſſione quidem febris pergit, utut ſubinde exacerbetur, & ab iſta exacerbatione denuò remittat: hæc ſunt *continuae quotidiana*, ſed hæc rariùs eſt acuta, & ferè ſub centum continuarum ſed lentarum venit. *Omnium rariffima eſt continua quartana*, adeò ut ſolet. in *Praxi*, cui Veterano Præctico jam ſeptuagenario, & tamen in Pomerania, ubi ex acido fixo viſcido, ſive Veterum melancholia, nati morbi, indeque hypochondriacum malum ac ſcorbutus frequentiores ſunt, & ex quo humore quartanam derivant, viventi nunquam apparuit, eam aut nullam aut rariffimam eſſe judicet. Quin & ſi aliquando occurrant, ad lentarum naturam eas proximè accedere aſſertit *Piens de febris part. 2. pag. 98.* aut cum continua lenta complicatæ erunt. *Notabile* talis complicationis exemplum ſuggerit *Lindanus ſuper Hartmann*, dum dicit: Vidi ego in hac urbe (nempe Amſteldami) tres quartanas cum hectica, ex animi mœrore contractas: primus paroxyſmus erat vehemens, ſecundus lenior, tertius leniſſimus, quartus qui reſpondebat primo iterum vehemens, &c. His quartanis remittentibus remanebat febris continua ſive hectica ex mœrore orta. Principio non putavi dari quartanam continuam, ſed poſtmodum deprehendi; effeci, ut omnes quartanæ ceſſarent, ſed remanebat hectica.

Continua in his periodicis eſt febrilis fermentatio, ejusque effectus pulſus mutatus & caloris intensio, ſed certa ſua periodo ſaltem exacerbationem, cujus indicium ſymptomata præbent, patitur; ita tamen ut nunquam aut rariffime horroſis ſenſus percipiatur, ob intensiorem caloris ſenſum & motum, totum corpus occupantem, quin æſtuationis ſaltim augmento, ſitis, cephalalgia, anxietatum, &c. intensione, exacerbatio funeſta eſſe ſolet. Conf. *Sylv. lib. 1. c. 31.* Ex intermittente igitur & continente componuntur *continuae periodicæ*, ſpeciatim *tertianæ acutæ*. Complicatio tribus contingere ſolet modis. I. Dum intermittens in continuam degenerat, & ita poſtmodum perdurat. II. Dum continens in intermittentem abit, correctæ plus minus Maſſa ſanguinea, & concurrente ſucceſſivè fomite præternaturali in primis viis. III. Simul inchoant & pergunt, ſive ſimplices fuerint intermittentes, ſive compositæ & multiplicatæ. Notabilis eſt complicatio, quàm refert *Panarolus Pent. 2. obſerv. 33. p. 99.* nempe Tertianam continuam duplicem cum quartana lethalem.



Jam vero notabilia quædam his acutis in febribus occurrunt symptomata, pro quorum varietate & diversimodè denominari solet hæc febris. Nempe quædam harum febrium dicitur *Causos*, si-ve *febris ardens*, cujus duo quasi pathognomica sunt symptomata; *astus nempe intensus, & situs clamosus*, ferè inextinguibilis, si-ve sint continentes, si-ve sint continuæ tertianæ. vid. *Sylv. l. I. c. 29. §. 24. & c. 31. §. 5.* quibus primariis symptomatis subinde accedit & linguæ ariditas, labiorum fissuræ, capitis dolor, &c. *Horstius v. in Problem. dec. 1. q. 4. p. 5.* Causum veterum, hodiernam Hungaricam esse asserit. *Easdem* penitus *Causas*, sed intentiores, & concitatio-rem fermentationem excitantes, ac febres acutæ aliæ habet: unde *ex volatili acriori acido, intensiorem effervescentiam concitante, intensissimus iste astus*, ex hoc ipso vero, dum alcalisatur quasi causa febrilis, ut loquitur *Helmont. Tr. Pylorum. rector. §. 26.* *intensa adeo situs*, h. e. depravatum in febre fermentum stomachale, dum non aptum est ad consuetam digestionem, in excrementum nidorosum facessere sinit, quicquid in stomacho fuerit, quod à calore partis, & speciatim ab nimio æstu febrili magis alteratum, & quasi colligatum in texturam alcalisatam, ut quasi empyrevma contrahat, tunicis ventriculi tenacius impactum, febrilem sitim infert, irritando & vellicando certo modo membranam stomachi & œsophagi, & per consensum ipsius quoque linguæ. Unde intolerabilis ferè sitis & qui amaricantibus, v. g. cerevisia lupulata ex dictis causis intenditur, nec nisi acidis, præsertim mineralibus corrigibilis est.

Alia differentia est in *Febri, Lipyria* dicta, in qua interiora uruntur, exteriora verò frigent. *De qua disceptantes* admodum quoad ortum & fiendi modum *autorum sunt sententia. Quamplurimi ad secundarias adeoque vel comitatas, vel symptomaticas febres referunt.* Instar omnium sit *Lindannus*, qui *super Hartm. inquit. Febris Lipyria* est febris ardens, orta ex inflammatione visceris interioris valde sensibilis, de qua loquitur *aph. 46. sect. 4. Hippocr. & 72. sect. 7.* de quibus notandum: 1. Febres non intermittentes, 2. in talibus aliorum extremorum & ardor internorum. Ubi per partes externas non vulgo dictæ manus, pedes, nasus, lobi aurium intelligendæ, sed universi corporis habitus. Algor aut non ex tactu Medici aut adstantium judicandus, sed egri judicio, qui se algere dicit, & regi jubet. Tepent enim membra, nec est ea vis, quæ in aliis febribus ardentibus adesse solet.

Hæc febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum, quadri-  
duum & vix unus evadet, nisi statim ab initio hujus mali præveniamus. In liene, hepate, visceribus, &c. quæ accenduntur, non sunt tam periculosa, quam quæ partibus membranosis accidunt, ut ventriculo, ileo, utero, vesicæ, &c. Solent conqueri de summo æstu partis affectæ, linguæ crusta nigra,  
magna

magna corp  
Lindannu

Notan  
riam. Pa  
quidem etia  
tum l. 2. de  
est hæc sen  
Lipyriam c  
Primerofu  
guorum  
tervatam  
ma sit, ad  
ta, saltem  
ratum, æstu  
nem concit  
finè à lui g

Ulterius

De quibus  
rationem,  
ginis instar  
brili calcin  
lecta & hol  
quasi dispo  
proventus,

Febres

dicta, vid.  
men malig  
bus an  
videtur, q  
h. e. contin  
partes æstu  
ter convul

Bem

æque adm  
mis diebus  
teat. Imo  
su maligni



magna corporis agitatio, sitis inextinguibilis, delirium, pervigilia, &c.

*Hæc Lindanus.*

Notanter dicit *Lindanus*, partis sensilis valde inflammationem sequi *Lipyrriam*. Pars enim non valde sensilis, v.g. Mesenterium inflammatum, febrem quidem etiam continuam, sed lentam ferè plus minus inferre solet. *Conf. Sennertum l. 2. de febb. c. 16. p. 206.* Sanè practicæ experientiæ comprimis consentiēns est hæc sententia. Sunt & nonnulli, qui etiam *primariam febrem subinde esse Lipyrriam* contendunt, quos inter non tantum est *Sylv. l. 1. pr. c. 29. §. 31 & 32. Primerosius l. 3. de febb. c. 8. p. 264.* sed etiam ex nimio liberali usu fructuum taginorum (*der Buchäcker*) eandem enatam, adeoque appareatè primariam observatam à *Borruchio in Act. Med. Hafn. vol. 2. p. 160.* Primaria talis cum rarissima sit, adeoque adhuc nonnihil dubia, & quoad fiendi rationem adhuc intricata, saltim frigoris ratione, ad genus nervosum membranosum undecunque irritatum, æstuationis vero respectu, ad sanguinem in præternaturalem fermentationem concitatum, hincque alteratos insigniter, idq; ex supradictis probabilissimè à sui generis acido, respiciendum erit.

Uterius sunt febres cum *Prunella*, Germ. *die Bräune* dicta, conjunctæ. De quibus *Sylvius cit. loc. §. 26. 33.* Arbitror salivæ hic maxime habendam esse rationem, quæ alterata, & inprimis mox glutinosa reddita in febribus mucilaginis instar nonnihil obducit istas partes, quæ mucilago pedetentim ab æstu febrili calcinata quasi aut exsiccata, indeque istis partibus teneris perquam molesta & hostilis existit, quæ exinde irritatæ, mox phlogosin sive inflammatoriam quasi dispositionem acquirunt, unde rubedo, ardor, dolor, mucii plus minus spissi proventus, &c.

Febres acutæ quædam sunt *Deliræ*, vulgò *die Haupt-Kranckheiten* dictæ, *vid. Sylv. l. 1. c. 29. §. 27. & 35.* In his fermentum febrile (ut plurimum tamen malignum, unde & interdum epidemice grassantur tales febres) speciatim in animalibus, & hinc generi nervoso circa interiores capitis partes inimicum videtur, quod istorum texturam vitando, adeoque motum debitum pervertendo, h. e. continuo vellicando (unde intensior circa frontem, quam alias corporis partes æstus percipitur) vigiliarum pertinacium, hinc deliriorum ac consequenter convulsionum causa existit.

*Benignæ* quoque existunt hæ ipsæ acutæ, sed sæpius quoque *malignæ*, æque admodum periculosæ: imò sæpius accidit, ut febris révera maligna in primis diebus formam Causi, aut febris benignæ præ se ferat, ac sua malignitate lateat. Imo dubitant nonnulli, an detur Causus alius, cui non ut plurimum juncta sit malignitas.

*Colli-*



*Colliquativa dictæ* febres etiam huc pertinent, in quibus subito corpus emaciatur, dum res nutritivus chylosus, tam in Massa sanguinea, quam solidis partibus dissolvitur, & ipsa pinguedo quasi funditur & liquefcit. Accidit hoc *nunc* mediante sensili substantiæ colliquatæ excretionē, idque crebrius, & hinc dicitur v.g. *diarrhæa colliquativa*, in qua copiosa, ut plurimum admodum fœtida (qui *fætor*  $\phi$  substantiæ, adeoque & pinguedinis pessimam colliquationem notat, cum nilæque fætere soleat, ac  $\phi$  sive pinguis corrupta, & ad putredinem vergentia) excernuntur. Item *urine fluxus colliquativus*, in quo urina copiosa cum supernatante propriè dicta pinguedine effunditur. *Sudor colliquativus*, qui copiosus, minus calidus, interdum plus minus glutinosus excernitur: *Nunc* sine tali sensili excretionē, id tardius, dum nempe absimitur res nutritivus corporis pedetentim, nec alius suggeritur, necessariò corpus emaciatur.

*Causa* colliquationis talis *partim* in subjecto patiente, sive succo nutritio chyloso rorido, & indenata pinguedine; *partim* in efficiente consistit: in *patiente*, si succus iste texturæ rarioris subtilioris, minusque ab acido concentratæ existit, hinc facilius resolvable & attenuabilis esse solet: v. gr. carni aprugnæ sub assatione nil omninò, aut planè minimum est, quod defluit, suis vero domesticæ carni, plurimum, eò magis, quo plus adipe vel carne abundat, ut loquitur *Gorram in definit. Med. p. 319.* Texturam autem istam, plus minus resolvablem, à certo contextente acido dependere illustrat experimentum istud, quo  $\phi$  per  $\phi$  i acidum in pinguedinis consistentiam coagulare possumus, dum alcalia e contra & saccharum butyri coactionem debitam penitus immittunt.

*Causa efficiens* attenuans, & menstrui instar dissolvens, & hinc seroso vehiculo unibile reddens, non est tantummodo caloris motus, ut hic multum simul valeat, sed *acrimonia septica sive quasi caustica fermenti febrilis* peccantis, penetrans, dissolvens, & nutritivum succum ac pinguedinem liquefaciens, simili ferè ratione atque acres quasi causticæ particule purgantium, aut sudoriferum resinorum acrium, &c. dissolvere & liquefacere assolent chylosas & roridas nutritivas particulas: *quæ acrimonia, ad quam acrium classem, an acidorum volatilissimorum an alcalium, an  $\phi$  forum adscribenda sit*, in medio hoc loco relinquo.

*Distinguenda autem sunt hic, das gelinde Abnehmen* in febribus, ab eo, quod nos dicimus *das Verfallen oder Einsinken.* Illud à colliquatione & hinc emaciatione oritur, hoc vero à spirituum influorum defectu, aut saltem deficiente vi elastica, fibras & stamina partium in debito tono, & hinc inter-

sticia



stitia porosa in debita dilatazione pro fluidorum quorumvis faciliiori transmissione detinente, oritur. Hac igitur vi cessante vel ob ~~u~~uum absolutam paucitatem, vel eorundem vitia tam constitutionem, vel denegatum plus minus eorum influxum, partes molles, praesertim faciei collabi, nasus acuminari, tempora excavari, oculorum orbitæ profundiores apparere incipiunt: ut in subitanea syncope correptis, aut facie Hippocratica deformibus, manifestum redditur. Ut itaque colliquatio subitanea nunquam bonum signum esse solet, pessimum tamen semper indicium est ista subsiditiae partium subitanea, quæ nunc mox in principio morborum, nunc in eorum progressu, interdum horali spatio contingere observatur, spirituum influorum affectum gravem omnino innuens.

Apud veteres scriptores Practicos & horum interpretes plures adhuc febrium acutarum differentia annotantur, v.g. febris *Pemphygodes* dicta, Latine *Ampullosam* diceret, in qua tam facies & os, quam caput & aliæ partes corporis bullis & bullulis hinc inde prætuberantibus interstincta observantur, cuius notabile exemplum vide in *M. A. N. C. Ann. 8. pag. 93.* qualis tamen bullarum elevatio & intumescencia potius fermenti maligni cuiusdam, critico quasi naturæ motu cum suo vehiculo ad instar variolarum, exclusi effectus esse videtur.

*Febres Typhodes, it. Elodes, it. Hydrodes*, Latinis *Sudorifica* dicta, est, in quibus primo statim die ægri copiosè sudant, sudore ipso parum aut nihil alleviante (quæ an eadem fuerint cum *sudore Anglico*, ut asserit *Langius, epist. 19. lib. I.* dubitare licet,) sive colliquativus, sive non fuerit talis sudor: illius nempe colliquativi theoria ex supradictis, hujus vero aliquo modo mutatis mutandis ex *Sylvio lib. I. prax. c. 30. §. 40. & II. 4. item c. 58.* intelligi potest.

*Febris Affodes* dicta, sive *anxiosa*, in qua ob anxietates ægri decubitus eundem non ferentes, figuram jacendi variant, adeoque in lecto se jactitant. Inter omnes anxietatis causas frequentissima est *oris ventriculi affectus*, quando nempe vel ob malignum quoddam fermentum, vel à pravis, utut paucis, humoribus, ejus tunicis immersis, mordetur sive irritatur. Præter hanc tamen *vel* *κῶμα* intensius, *vel* *orgasmus* materiæ ejusdem, *vel* malignitas insignior, *vel* imbecillitas in causa esse solet. De quibus in specie vid. *Steph. Rodericus Castrensis, l. I. c. 21.* quæ ex quibus

*Febris lyncodes, πυρετὸς λυγρῶδης*, sive *singultuosa* talis est febris, in qua singultus cum febre permanet, vel cum febre per totum morbum simul



exacerbatur. Exemplum vid. in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 43.* ut plurimum equidem ex ventriculo siue per essentiam, siue per consensum affecto.

*Febris phricodes*, *πυρετός φρικτός*, siue *horrifica*, cui in toto morbi cursu crebri horrores & rigores superveniunt, quales non solum in suppurationibus partium internarum; sed etiam febribus compositis interdum supervenire solent. De quibus omnibus, ne actum agam vid. *Castrum cit. loc. nempe quæ ex quibus l. c. 18. 19. 20. &c.* Conf. etiam *Zacut. Lusit.* qui & earum historiam ac observationes pertractat in *Medicorum principum histor. & Prax. adm.* Inter febres compositas plus minus acutas primariam sui considerationem inereatur febris dicta *Semitertiana* siue *Hemitritæus*, de qua tamen variantes sunt Auctorum sententiæ, cujus discrepantiæ, præter generalem febrium theoriam admodum intricatam, hæc ferè est origo, vel nimia veterum veneratio, & in iisdem defendendi studium: vel non ritè observata multiplex tam compositionis febrium mutua, quam complicationis earum cum aliis affectibus varietas. *Vulgatissima de semitertiana fert sententia*, esse eam compositam ex duabus febribus tertiana & quotidiana, quarum una sit continua periodica, altera vero intermittens, in qua ipsa, quoniam sub quovis paroxysmi insultu horror plus minus perceptibilis sit, ob id & *horrificam* siue *phricodem* hanc febrem vocasse veteres asserunt. Talis semitertianæ typum, ex intermittente quotidiana cum tertianâ, exhibet *Regius in suis dissertationibus*. Vir quidam robustus incidit matutino tempore in horrorem totius corporis, quem iusecutus est calor multus, pulsus celer & creber perpetuò durans. Sub vesperam ipsum eadem die invasit refrigeratio totius corporis, post quam sequebatur pulsus iusto frequentior & celerior. Sequenti die calore illo perpetuo & pulsu celeri ac crebro durante, leviter perfrigeratus est, calorque deinde increvit, & pulsus increbuit. Tertio die rursus mane exhorruit, & dein incaluit, & vespere, postquam refrigeratus esset, rursus increvit calor: quarto vero die leviter sub vesperam rursus refrigeratus incaluit, & pulsus increbuit.

Semitertianam vero compositam ex tertiana intermittente & quotidiana continua, vid. in *Tymæo lib. 8. cas. 21. 22. pag. 367. & seq.* Conf. etiam *Rivarium in observat. de morb. infrequentibus observ. 23.* Item Hemitritæum ex continua quotidiana & quadruplici tertiana vid. in *Rever. cent. 4. observat. 23.* Sic Hemitritæum ex continua minus acuta & duplici tertianâ cum singultu vehementi & tumore in sinistro hypochondriaco observavit *Platerus libr. 2. observat. pag. 312.* *Sennertus* hisce duobus modis & alium semitertianæ typum addit, nempe illam, quæ ex intermittente, præsertim tertiana, vel simplici, vel multiplici, conjuncta cum febre symptomatrica continua, inflam-

matio-

mationem  
speciatim pe  
lms se in Ju  
& mortuo,  
ileum vero si  
hoc pluribu

Observ  
semitertian  
complicatu  
rianæ talis  
tertianas h  
refragatur  
asserit, un  
bit. Quo  
obs. 56. Pie

Com  
asserit, qu  
ribus ingru  
subintrante  
bitox.

Obse  
rentes in o  
complicata  
rentem ex  
& 16. & fe  
serv. 14. l. 5.

Sane o  
ut faciliè fi  
plus minus

tritæi fer  
denibus ri  
tensore æ  
lescentia, q  
superiorib  
genus velle  
occasionem  
tionis acu



mationem partis cujusdam internæ insequente, oritur, persuasus ad hoc ipsum speciatim per observationes *Spigelii in Tr. de semitertiana*, v. g. Refert *Spigelius* se in Juvene quodam Belga, ex Dysenteria in febrem semitertianam lapsa & mortuo, per anatomiam ejus inspectione factâ, intestina tenuia inflammata, ileum vero sphacelo corruptum, ubi adhæret colo & cæco, invenisse. Conf. de hoc pluribus *Sennert. l. 2. de febb. c. 21. p. 323.*

Observandum ulterius hic occurrit, non raro febrem malignam esse, quæ semitertiana typum referat, vel quia intermittenti tertianæ, quocumq; modo complicatur; vel quia ipsa maligna vago nonnihil exacerbationis morfu semitertianæ talis typum repræsentat. Ob id *Forestus lib. 5. observ. 14. & 16.* Semitertianas has laboriri asserit grassantibus febribus malignis & pestilentibus. Nec refragatur *Spigelius cit. loc.* qui tempore pestis hanc febrem frequentissimam esse asserit, unde & *Schenckius l. 5. obs.* Hemitritæum, pestilentem pluribus describit. Quo facit & Hemitritæus malignus bezoardicis curatus. *Reverius cent. 4. obs. 56. Piens de febb. l. 2. p. 283.*

Complicationem istam minus admittit, sed semitertianam nil aliud esse asserit, quam febrem continuam horrificam sive phricôden, cum multis rigoribus ingruentem, vel plures intermittentes sibi invicem succedentes, & quasi subintrantes; id quod probabiliter subinde evenire omnino probabiliter arbitror.

Observandum & hoc, ut malè curatæ, quæcumque ex causa, intermittentes in continuas lentas facile degenerant, ita & tali lentæ ipsa intermittens complicata, Hemitritæi faciem referre potuit. Sic enim tertianam intermittentem exquisitam mutatam in semitertianam refert *Forestus lib. 5. observ. 13. & 16.* & febrem lentam tandem mutatam in Hemitritæum, iterum *Forestus observ. 14. l. 5. refert.*

Sane omnes modò enumeratæ & observatæ complicationes ac aliæ plures, ut facile fieri possunt, ita & Hemitritæi, in genere sic dicti, typum omnino plus minus variare necesse est. Nempe *signum pathognomicum Hemitritæi ferè esse solet*, quando febris continuè quidè affligit; sed cum succedentibus rigoribus crebrioribus aut horroribus, ubi rigores cum insequente intensiore æstu tertiana, horror vero aut saltem perfrigeratio cum mitiori incallescencia, quotidiana febris intermittens typum constituere dicitur. Jam ex superioribus patet, fermentum acidum, aliudve quodvis acre, membranofum genus vellicans, horrois & rigoris: it. Massam Sang. inquinans, exæstuationis occasionem suggerere, quibus perpenfis, de facili multiplicis typi, & complicationis acutarum lentarum intermittentium primariarum, secundariarum,



malignarum, &c. in subjecto patiente ratione criseos partium contentarum, & constitutionis partium solidarum plus minus variantium, & modi & hinc differentiarum patefcunt, adeo ut uni cuidam certæ complicationis generi minus nos præcisè applicari debeamus, verbi gratia, Semi-tertianam cum variolis observavit *Spigelius de semitert.* l. 2. c. 16. Nullus dubito, recurrentes apparenter cum horroribus aut rigoribus paroxysmos ab acri variolarum fermento, partes membranaceas vellicante, & in sanguine æstuante, accidisse, & ita in subjecto patiente, ratione specialis contentorum idiosyncrasiarum, quasi typum quandam repræsentasse. Pariter *Forestus l. 5. obs. 22.* febris horrida mentionem facit, cui accessit Erysipelas. Horrores hi non à speciali febris typo, sed ab acido Erysipelatis, vellicante subinde membranaceas partes ortum habuerunt.

Pro meliori *diagnosis* compositionis talis febrium inprimis notabilis est locus *Sennerti, de febrib.* l. 2. c. 21. pag. 320. dum dicit inprimis compositas arguit reditus rigoris, horroris ac frigoris post ejus quietem. Quod si planè continua & simplices videantur febres, attendendum est, *an post rigorem sudor subsequatur*: Nam si in febre, quæ continua videtur, rigor fiat, & sudor non sublequatur, aut forte plures rigores unus sudor, signum est febrem illam non esse simplicem, sed compositam. Nam in synocha rigor non apparet, nisi crisi tempore, quem sudor sequitur. Deinde etiam *pulsus febris composita indicium exhibet*: Nam quamvis febres quædam continuæ videantur, si tamen sæpius fiat pulsus contractio, illa novi paroxysmi motusque materiæ novæ indicium est.

Quoad *Prognosin*. Terminantur febres acutæ continuæ vel perfectè ad sanitatem, aut ad mortem, vel imperfectè. *Perfectè*, quando aut crisi subitanea, aut successivâ *λύσις* convalescunt ægri, de quo supra: sin minus, invalescente quotidie febre, agrypnia, deliria, convulsiones superveniunt, hinc mors ultimam ducit lineam. *Imperfectè*, dum abusu nimio præcipitantium sive absorbentium fixiorum supprimitur imperus fermentativus humorum & spirituum febrilis, & fixato in tantum acido morbofo, aut recidiva, ut plurimum periculosior denuò insurgit, aut febris acuta in lentam, hæctica similem, mutatur.

Aliàs febris tam continens, quàm continua tertiana ceu acutæ sunt ambigui exitus: per se quidem minus periculosa, de facili tamen periculum supervenit. *Ea sunt periculosa*, quæ mox extremos habent labores, h. e. quæ nimis sunt acutæ, & ubi symptomata, actiora præsertim, ac mox in principio, ingruunt. Tales ferè malignæ esse solent, unde quævis malignæ acutæ periculosa censendæ sunt. *Urina alba*, aut admodum cruda, in febribus ardentibus admodum periculosa est, & plerumq; mortem portendit. Urina alba tenuis & clara in delirantibus cum febre continua vel ardente lethale est signum. Quando *□a rubicundior*



cundior est initio, tanto citius terminatur cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum. Quæ lethales futuræ sunt, vires indies magis prosternunt, citra ullam criticam evacuationem, aut si quidem excernitur die minimè decretorio, naturæ fatiscantis signum exhibet. Cum sunt morbi acuti, septimo aut decimo quarto die finiuntur apud nos, quin & ad vigesimum extendi solent, quæ in aliis regionibus ordinario septimo terminantur, rarius ad 14<sup>um</sup> extenduntur. Unde in effatis Hippocratis & Practicorum observatis, regionis ac aliàs circumstantiarum probè habenda est ratio. Satis secundum coctionis signa citius vel tardius se exhibentia, brevior aut longior expectandus est morbus. Dum per crisin finitur, usitatissimè quidem apud nos vel sudore, vel alvi fluxu solvitur; in calidioribus regionibus imprimis hæmorrhagiarum critica judicatur. Sic *Hildanus cent. 6. observ. 77.* observat virum robustum febris ardentissima & continua laborantem, qui septimo die in sudorem adeò flavum, ac si croco tinctus esset erupit, tam copiosè ut contorta subula aqua ubertim extillaret, & lintheamina omnia croceo colore inficeret. Sic *Zacut. Lusit. l. 3. prax. admir. observ. 110.* observat hæmorrhagiam criticam per porum juxta radicem pollicis pedis dextri, in interna parte, sponte apertum: non secus atque *lib. 1. Prax. admir. obs. 86.* observat, per hæmorrhagiam criticam, sive per sanguinis effluxum copiosum ex venula gingivæ inferioris febrim ardentem ingentem criticè curatam, & solutam refert. Curiosum est, quod refert *Platerus l. 1. c. 86.* Delirans in febre ardente uxorem per vim comprimit, moxque extinguitur. Uxor vero mox quoque eodem modo correpta, à febre quidem sanata est; mens tamen nunquam ferè constitit.

Quoad curam harum febrium acutarum, in hac, si unquam aliàs, Medicus sit in febribus acutis naturæ minister. Cum enim depuretur M.S. in iisdem, adeoque fiat sanguinis febrilis effervescencia, ob materiæ ejusque heterogeneæ, ipsiusque naturæ aversantis secretionem, ut ejus coctio, & hinc crises testantur, manifestum evadit, indicationes veras & genuinas in eo versari, ut sanguinis præternaturalis fermentatio intra modum naturæ propositum ingruentem conservetur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat sive intendatur, unde periculosa symptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat sive deficiat, qua ratione materiæ coctio & excretio impediretur, ac faciliè lenta chronica febris dubii eventus superveniret, ut rectè loquitur *Sydenham. Tr. method. cur. febrib. f. 1. c. 4. p. 18.*

Medicatio igitur febrium talium cum à sola fiat natura, hoc saltem Medicus est officium, ut illius conatum debite moderetur & adjuvet. 1. impedimenta removendo. 2. alterantibus & blandè diaphoreticis (h. e. fermentum febrile, ejusque actionem plus minus absorbentibus & temperantibus, vulgò bilem corrigentibus) causæ occasionalis peccantis vim moderatè infringendo. 3. sym-



ptomata nimis urgentia mitigando. *Primum* præstat V.S. evacuatio. *Secundum* vero  $\phi$  tata,  $\xi$  ialia fixa, animalium partes duræ, &c. *Tertium* in genere anodyna, in specie moderatè acida, aliæve appropriata. Hac nempe methodo nec negligit cr. sin Medicus, nec otiosè eam expectat.

*Crisin negligere jubet Helmont*, quia anticipare, idque rectissime, licet, remediis nempe universalioribus & sublimioribus, mox in principio vim causæ occasionalis sive fermenti morbofi evacuando, & naturæ turbatæ impetum sistendo. Sed quam paucis licet adire Corinthum. Crisin vero otiosè expectant non solum veteres, qui præmissa Venæ sectione aquæ frigidæ largiore haustu saltem curare solebant ægros, morum naturæ criticum observando: sed etiam moderni plures Itali & Galli præsertim, qui post Venæ Sect. & clysmata, sola tenuissima diætæ, & largiori pitisanæ exhibitione sanare suos in acutis satagunt, sub spe criseos.

Pro his scopis obtinendis observandum I. Cautissimus debet esse Medicus, ne pro Causa, aliq; continua acuta curet præsentem malignam. Febris enim maligna non rarò in primis diebus formam tam causi præ se fert, & sua malignitate latitat. Ideò melius est, statim adhibere appropriata alexipharmaca; & tutiori ratione procedent illi in cura, qui primis diebus usum bezoardicorum & alexipharmacorum (ita tamen ut ad sudorem patiens nequaquam cogatur,) recommendare recordabuntur. Si itaque certo jam constet, malignitatis metum adesse nullum, tunc, quæ agenda sunt reliqua, peragi poterunt.

II. Si febris est, in qua Venæ sectio locum habet, talis est sanè febris acuta continua, idque saltem, ubi nimis urget, aut metuendus est æstus, nimiaque turgescencia contentorum corporis, ut in plethoricis, generosiori victu utentibus, item in adætu, aut quibus suppressa est solennis quædam evacuatio, in talibus commodè vena incidi potest. *Conf. Sydenham sect. 1. c. 4. pag. 19.* Et quidem aperienda vena mox in principio, quocunque diei tempore, nempe rectè hic loquitur *Lindannus*: Venæ Sectio eam ob causam instituitur, ne calor immodicè exardescat. Ut igitur franes illos æstus, & circuitus sanguinis liberior fiat, opus est Venæ Sectione, manè sive vespere; Multis enim religio est, alio tempore sanguinem mittere, quam mane, & hoc qui observant, quandoque graviter peccant, & accidit sæpe, ut sanguis mittatur, cum in furore maximo est febris, cum tamen Venæ sect. fieri non debeat, nisi meliore tempore morbi, & remissiore calore febrilis. Nam ut rectè *Celsus* monet, lib. 2. c. 10. in ipso furore sanguis non est mittendus, & qui tunc mittit, idem facit, ac si jugularet hominem. Qui itaque maturum præcisè observant tempus, sæpe in hunc errorem incidunt. Ergo dies non oportet numerare, sed in principio primo, aut tempore huic proximo sanguis mittendus, modò hoc observetur, ut in remissiori fiat febris tempore. Quantitas sanguinis mittendi

mittendi secum  
venit.

III. Vor

tentibus: n  
urget; aut in  
adlunt; vel  
urgent, san  
mata in cursu  
rio, ab horu  
cinis delitesc  
& fortasse i  
periculo gr  
mentum m  
vires à mor  
pinari pote  
Quod si du  
indicata ad  
mitus provo  
cursu erunt  
non sint nim  
lent evacua  
in quibus,  
vomitoria.

IV. P

vocant, ut p  
tione morbi  
petua & i  
Quod si n  
saltem mor  
est frustrat  
movens no  
nociva, au  
in princip  
Oblen  
tertiana re  
coctionem  
acris ad ve  
sepemorte



mittendi secundum conditionem subjecti ac impetum febris determinanda venit.

III. *Vomitoria*, utut non æque videantur necessaria, atque in intermittentibus: nihilominus tamen, ubi in principio aut incremento morbi nausea urget; aut inanis vomendi conatus adest, saporve amaricans aut similes ructus adhuc; vel cardialgia aut præcordiorum anxietates in principio & incremento urgeant, sanè vomitoria sunt optima, nisi vel diarrhæam, vel gravia symptomata in cursu morbi experiri velis. E.g. in febris initio, propinato vomitorio, ab horrendis illis symptomatibus, ex humorum in ventriculo locisque vicinis delitescendum illuvie ortum ducentibus, ægros præmunimus, imò verò & fortasse in ipsis quasi incunabulis opprimimus morbum, qui aliàs cum ægri periculo grandesceret & longævus evaderet. Quod si serò accersitus, jam incrementum morbi adsit, nihilominus, cætera ubi responderint, ac speciatim, si vires à morbo nondum attritæ fuerint, etiam in incremento vomitorium propinari potest. Conf. hic accuratus & elegans *Sydenham*, cit. loc. p. 21. & seqq. Quod si dubium sit, annon sit febris maligna, tunc sanè si ista indicantia supra indicata adfuerint, item si febris maligna ex contagio ortum traxerit, tutò vomitus provocandus. Hoc enim factò, sanè omnia symptomata toto morbi cursu erunt mitiora. Observandæ tamen simul erunt *Vires*. Item vomitoria non sint nimis valida, quoniam in talibus ægtis multùm & vehementer solent evacuare, fluidioribus corporis contentis, secus ac in intermittentibus, in quibus, præsertim contumacioribus, validiora subinde usurpanda veniunt vomitoria.

IV. *Purgatio*, nempe propriè dicta, sive quam abusivè eradicativam vocant, ut plurimum nociva est in continuis & ardentibus, nec nisi in declinatione morbi videtur convenire, coctâ scil. jam materia. Sed tunc ferè est superflua & inanis, cum materia cocta per urinas & sudores eliminari soleat. Quod si non fiat, aliqualis & repetita blandior purgatio, & quæ stimulando saltem motum naturæ provocat, locum habet. In principio harum febrium est frustranea, movens quidem sive turbans corporis contenta, sed non ritè promovens nociva, crudis adhuc omnibus existentibus. In progressu morbi est ferè nociva, aut saltem inutilis dictis ex causis. Si quid tamen movendum videatur, in principio secundum *Hippocratem* move.

Observanda tamen hic est animadversio *Septalii*, l. 5. §. 4. p. 98. ut in continua tertiana respectu sui, aut materiæ illam facientis, nunquam ab initio ante coctionem medicamento purgante evacuandum est; ita cum quandoque bilis acris ad ventriculum transfundatur & mordens, gravissima inferens pericula, & sepe mortem, potissimum, si eger ad vomendum naturâ ineptus fuerit: illa ut præ-

veniamus



veniamus licebit purgatione uti respectu symptomatis: ut syr. rosac. solutivo, ex sero lactis vel solo sero, vel cui incocti sint Tamarindi, &c. Ut ut autem purgatione uti vix liceat, toto tamen morbi decursu eò respiciendum subinde, ut alvus blande seruetur aperta, idque inprimis, ubi æstus urget, qui sub alvo clausa semper magis intendi solet: idque eò tutius fieri potest, quo minus malignitatis adest suspicio. Nam malignis in febribus in quibus natura verè intendit motum ad partes intercutaneas, cautissimi sumus in alvo aperienda. Pro hoc igitur scopo alvum apertam servandi convenit inprimis serum lactis aut simplex, aut cui de Tamarindis ℥j. vel ℥ss. intusa fuerit. it. decoctum Tamarindorum cum passulis, &c. v. g.

℞. Pulp. Tamarind. ℥j.  
dissolv. in l. q. feri lactis.

℞. Colatur ℥viij. ad ℥bj. S.

Barter. Franc. / capiatur pro lubitu.

Vel: ℞. Decocti Tamarind. c. passul. ℥bj.  
syr. rub. idæi ℥j. M. S.

Eröffnender Alterir-Zulep.

Quod si vero in principio harum febrium blande purgare, aut primas vias abstergere animus sit, tunc

℞. Pulv. rhab.  
crem. ꝑ an. ℥j.

scamm. præp. gr. j. M. capiatur in vehiculo calido manè

Vel: ℞. Pulp. Tamarind. ℥ij.  
rhabarb. ℥j.

scamm. præp. gr. ij. M. F. Bolus, D. S.

Vel: ℞. ꝑi O-lati gr. vij. ad xv.

scamm. ꝑat. gr. ij. vel iij. M. D. S.

Item infusum blandum ex foliis senæ cum rhabarb. in principio harum febrium, ubi non nimis celeriter moventur, tuto concedi potest.

V. In principio saltem vel venam secare, aut etiam laxativo primas vias stimulare concessum esse dixi, minus vero in progressu morbi, id quod erudito discursu pluribus deducit *Ralloni in Bonetti Phar. Med. p. 172.* ubi ostendit, ob vehementiam morbi, & symptomatum in ejus progressu ad remedia, nempe V. S. & purgationem, non statim properandum esse. Rectè. Alterantia enim & blanda diaphoretica saltem conducunt, & quæ symptomata urgentia mitigant.

VI. *Chysmata*, perquam sunt proficua in his febribus, ut alvum continuò fluidam tervent, idque præsertim duobus in casibus, 1. si urgent symptomata præcordiorum & abdominis: item si orgasmus humorum ad caput ferri quod-

quodammodo  
commodum  
Quibus &  
elucenda ven

VII.

vanda liber  
mata minu  
præsertim  
sunt crud  
inprimis  
resinosa,

VII

ma. Do  
gasmus si  
lissimus e  
laud, opia  
sedatur la  
as anim  
medicam  
tempore  
promatib  
vendo op  
nonnihil  
& spiritus  
carent, v  
rantes cu

Vel imit  
noctem,

IX.



quodammodo videtur. 2. Si nimia æstuatio & ebullitio sit sanguinis, tunc commodissime applicantur enemata. Cont. Sydenham. loc. cit. p. 27. & 29. Quibus & adde principium morbi præcept, in quo ante V.S. clymate alvus eluenda venit.

VII. *Diaphoresis*, ut in omni febre, ita in specie in continuis conservanda libera: Sic enim calor & æstus mitior, & cephalalgia aliaque symptomata minus gravia esse solent. Minus tamen ad sudorem cogendi sunt ægri, præsertim in principio aut incremento, quia tunc temporis, dum adhuc omnia sunt cruda, sine successu & absque *evphoria* debilitatur æger. Conveniunt aut inprimis diaphoretica salina, terrea; minus volatilia  $\Delta$ urea & aromatica, vel resinosa, quia hæc *æther* nimis incendere solent.

VIII. *Opium* & *Opiata* legitimo usu in febribus ardentibus sunt optima. Docet hoc ipsum *Lindanius*, dum dicit: Si materia peccans turgeat, & orgasmus sit humorum, tunc syrupus papaverinus ad  $\mathfrak{z}$ . optimè convenit. Nobilissimus enim & blandus est, & convenit in febris ardente; cum nitro, vel etiam laud. opiat. usurpari potest. In febribus sane ardentibus motus furibundus optime sedatur laud. opiato, cum tantillo  $\phi$ , sed debet recto tempore exhiberi, nempe si *Ætus* animalis tenuis & furibundus sit. Consultum est in exhibitione ejusmodi medicamentorum non expectare, donec *Ætus* jam planè consumti sunt; sed in tempore usurpanda, dum adhuc vires constant, adeoque urgente nimis æstu, symptomatibus mitigandis, quietem ægro conciliando, & hinc diaphoresin promovendo optima sunt moderatè usurpata papaverina, nam orgasmum humorum nonnihil sufflaminant, & hinc, ut coctio melius procedat, per accidens juvant, & spiritus blande figendo, absorptionem & dissipationem eorum nonnihil præcavent, v.g. imitari possumus *Platerum*, cent. 2. c. 49. dum aliquot caulo laborantes cum dolore ventriculi curavit hac potione.

$\mathfrak{z}$ . Aquæ scabios.  $\mathfrak{z}$ vi.

syr. de papav. nigr.  $\mathfrak{z}$ j.

succi limon.  $\mathfrak{z}$ ß.

spec. diamarg. frig.  $\mathfrak{z}$ j. M.

Vel imitemur *Sydenham*, ad tumultum, ab emetico concitatum, sopiendum, sub noctem, vel hora somni blandum anodynum propinantem e.g.

$\mathfrak{z}$ . aq. papav. rhæad.  $\mathfrak{z}$ ij.

mirabil.

syr. de meconio an.  $\mathfrak{z}$ ij.

papav. errat.  $\mathfrak{z}$ ß.

M.F. haustus, ut habet cit. loc. p. 25.

IX. *Vicius* in febribus ardentibus sit tenuis, & cum appetitus ferè semper



sit prostratus, minus ad victum cogendi sunt ægri, nam alimenta assumpta calore febrili putrescunt potius, quam digeruntur, inprimis alimenta multum nutritiva aggravant stomachum. Melius igitur est, ut per aliquot dies jejulent ægri, quia facile ferunt. Nempe, ut rectè hoc urget *Helmont. Tract. victus ratio*, melius est ægros sanos, quam obesos reddere. Hinc etiam optime notat *Willis*, sæpius circa victum post febrim instituendam, recidivæ scopulo allidi, sc. à præproprio carni-um & cibi fortioris comestitu ægri in febrim relabuntur: Cum enim viscera sint debilia, & alimenta, nisi tenuia, non facile coquantur, cumque sanguinis crasis sit imbecillior, ut succum nutritivum non assimilet, si alterutri quid inpropor-tionatum offeratur, iterum naturæ æconomia pervertitur, & omnia pessum eunt. Quare à carnibus reconvallescentes diu temperent, iisque utantur demum, non nisi ☐ fuerit sanorum simillima.

X. In febre ardente sive continua *Potus* concedendus est liberalior, inpri-mis quo major est sitis, & intensior ardor, eò liberius indulgendum genio. Re-cte enim *Paracelsus*, *Lindanus* & *Langius* in *Epistolis* carpunt eos, qui ægris fe-brientibus omnem fere potum interdiciunt, pessimo consilio. Hoc saltem obser-vetur, melius esse, ut frequentius & parcius bibant, quam ut una vice multum in-gurgitent. Prius enim successivè alterat, posterius vero tonum stomachi labefa-ctat. In selectu potionis, habenda est ratio effervescentiæ febrilis plus minus tem-perandæ & sedandæ, & hinc symptomatum, speciatim circa primas vias urgen-tium, præsertim alvi plus minus clausæ vel apertæ. Tandem & consuetudinis ratio simul habenda est. Hinc serum lactis bene depuratum, & succo citri ad aliqua-lem gratiam acidulatum, potus revera medicamentosus existit, modo diarrhæa absit, sed potius intensior æstus urgeat. Confer *Piens de febb. part. 2. p. 116. it. Septarius in animadversion. p. 98. §. 11.* Aliàs aqua fontana vel cerevisia secunda-ria bene pura cum 5. vel 6. parte vini tenuioris mista, addendo succi cydoniorum, vel succi ribium q. l. ad gratiam saporis, suavissimum, & acutè febrientibus gra-tissimum potum suggerit. Acida enim inprimis his in febribus in potu conve-niunt, tam mineralia, in æstu nempe nimio ac causo, quam vegetabilia, in æstu nempe moderatiori. Decocto hordei sub nomine pitana plures utuntur, quod minus approbo, cum cruditates stomachi flatulentas ejusque atoniam inferat.

XI. Velicatoria, quando & quomodo in febribus his acutis applicanda, dum caput & genus nervosum nimis affliguntur, infra, ubi de malignis, expo-netur.

Remedia, alterantia in his febribus usitata, vel ipsum affectum ejusque cau-sam materialem occasionalem respiciunt, vel symptomata primaria. Illa sunt ☉. & ☉ ata, inprimis ☉ statum & ☉ flatum, sive arcanum duplic. *Myns.* hinc ꝑa mineralium fixa, præsertim Sialia, v.g. S diaph. tam simplex quam compo-

compositum  
bezoardicum

Hinc ablo  
latina, cujus

Corallia pi  
figill. &c.

fructuosè ul  
dicta, itid, a

acetosa, port  
bus parata d

Sylv. Prax.  
tinent sem.

mâ quibus  
Sylvius

ducat Apoz

Ad eme  
Apozema

Ad bil  
Apozema

Ad bil  
ram, & ad

ficula redun



compositum, aut *Stiale Ludovici*, aut *Uale Poterii*, sive hujus *antibeticum*,  
*bezoardicum minerale simplex*, aut *℥. ℥ij. &c.*

Hinc *absorbentia animalia*, hisq; cognata *terrea*, v.g. *C. C. sine Δ. huiusq; ge-  
 latina*, cujusvis acris *temperativa*, *ebur sine Δ. maxilla lucis piscis*.

*Corallia præpar.* aut horum cum *succo citri Magisterium*, *unicorn. fossil. terr.*  
*figill.* &c. *Quin & salia volatilia C. C. it. liquor C. C. succin.* subindè cum aliis  
 fructuosè usurpentur. Hiscè ex *vegetabilibus refrigerantia*, & *hepatica* vulgò  
 dicta, itid. accensenda v.g. *cichorium, taraxacon & omnia intybaica, plantago,*  
*acetosa, portulata, fumaria, fragaria, flores rosarum, &c.* ex quibus & simili-  
 bus parata *decocta* repertiuntur promiscuè in *Practicorum veterum scriptis*, e.g.  
*Sylv. Prax. l. i. c. 29. item Piens de febb. part. 2. c. 2. & 3, &c.* Quò etiam per-  
 tinent *sem. frigida majora* dicta, *Osâ* suâ vi blandè *temperativa*, *emulsonis* for-  
 mâ quibusdam usitata.

*Sylvius l. c. §. 40. Corrigenda acrimonia bilis salina* inter composita con-  
 ducet *Apozema* sequens in die usurpandum quantitate mediocri & tepidum:

℥. Rad. acetos. cum fol. Mij.

fol. fragar.

violar. an. Mj.

coq. ex aq. hordei ad Colat. ℥xx.

adde syrup. acetos. citr. ℥iij.

℞. ②. dulcis ③ss. M.

*Ad emendandam bilis oleositatem inflammabilem* præscribi poterit sequens  
*Apozema* similiter usurpandum

℥. Rad. plantag. ℥j.

fol. semperv. maj.

portulac. an. Mij.

coq. ex aq. pura ad Colat. ℥xx.

addendo syr. portulac. ℥iij.

ol. ④. per camp. parat. q. s. ad acidit. temperat. M.

*Ad bilem sanguini penitus immistam* denuò ab ipso *seernendam* conferet  
*Apozema* sequens modo eodem, quo priora usurpatum.

℥. Rad. Tarax. cum fol. Mij.

herb. fumar. Mj.

coq. ex aq. pura ad Colat. ℥xx.

addendo syr. cichor. simpl. ℥iij.

℞. ②. ③. ④. ⑤. M.

*Ad bilem apozemate præcedente* aut simili medicamento à sanguine solu-  
 tam, & ad excretionem dispositam, *sensim & blandè* una cum reliqua in sua ve-  
 sicula redundante turgenteque, *minuendam evacuandamq;* inserviet præter alia



tum simplicia tum composita sequens apozema bis tervè in die ad ℥ij. vel iv. tepidè assumendum:

℞. Rad. cichor. ℥ij.

fol. endiv. Mj.

flor. ros. pallid. Mj.

crem. tart. vel tartari crudi ℥ij.

coq. in vase fictili vitrato ex

aq. pura ad Colat. ℥xx.

add. syrup. de cich. cum rhab. ℥ij. M. ]

Remedia quæ symptomata magis respiciunt, sunt imprimis *acida*, *astum*, *sitim*, *oris squalorem*, *virium diminutionem* mitigantia. Talia vel ex *vegetabili regno* sumuntur, adeoque *mitiora*: vel ex *minerali*, adeoque *acriora* existunt; *Illa* in æstu minus urgente, *hec*, ubi intensior æstus, nec subjecto patientis, aliisque circumstantiis proportionatus adest, magis locum habent. *Illa* enim facilius in falsum, temperatum, diureticum in nobis alterantur, *hec* è contra fixioris naturæ, & quasi firmioris texturæ minus alterabilia sunt, adeoque humores nimis effervescentes, ceu *acida* potentiora figunt, & indè natas æstuationes aliaque pathemata mitigant.

*Vegetabilia* usitatiora sunt *succu citri*, *cydoniorum*, *ribium*, *rubri idæi*, *ace-rosa*, *tamarindi*, &c. Præ cæteris commendabiles sunt hi ipsi per spontaneam residentiam post fermentationem depurati. *Mineralia* suggerunt *minerales* tam simplices, primariò *phos.*, hinc *phos.*, *nitri*, quam compositos, nempe *elysseos*, *æleos*; item illos tam *acres*, quam mediante *V. dulcificatos*, qui meritò aliis præferuntur. Hæc enim suprema sit lex praxeos, quam sæpius etiam urget *Sylvius*, ut, quantum fieri potest, *temperatis* insistamus, quia etiam naturaliter omnia corporis nostri contenta fluida sunt temperata. Secundò quia remedia intemperata subitanè nimis inferunt mutationem, quæ nunquam bona. Ex omnibus illis *phos.*, hinc *phos.* *dulcem* eligerem. Ex quibus plures formulæ in incremento & statu proficue concinnari possunt. v.g.

℞. arcan. duplic. gr. xvi.

℥ diaphoret. ℥ss. M. pro dosi.

*Pulvis* hic ita compositus interdum nonnihil laxare observatur.

℞. *phos.* *o* trat. sive *phos.* *o* tal. ℥ss. ad ℥ij.

℥ diaph. ℥j. M. pro 2. dosi.

Vel ℞. Ebor. sine igne

antihect. Poter. an. ℥ss. ad gr. xv. M. pro dosi.

Vel ℞. C. C. sine igne gr. xv.

bezoard. min. vel ℞al. ℥ss.

camphor. gr. j. vel ij. M.

Vel



Vel ℥. C.C. sine igne gr. xv.

⚭ diaph. ℥ss.

⊖ volat. C.C. gr. vj. M. pro dosi.

Item ℥. Ebor. sine igne

unicorn. fossil.

Cinnabar. ⚭ ij an. gr. viij. M. pro dosi.

Vel ℥. Aq. taraxac.

card. bened.

flor. acac. an. ℥j.

Gelatinæ C.C. ℥j. ad ℥ss.

C.C. sine igne ℥j.

⚭ diaph.

antihect. Poter. an. gr. xij.

syr. portulac. ℥vj. M.

Vel ℥. ▽. rubi idæi ℥jss.

— taraxac. ℥j.

succi ribium vel rubi idæi ℥vj. ad ℥j.

⚭ diaph. ℥ss. ad ℥j.

⊖. o. dulce. q. l. ad grat. sap. vel ℥j. ad ℥ss. M.

Item ℥. ▽. taraxac. ℥iij.

Tinctura flor. bellid. ℥jss. ad ℥iij.

CC. sine igne ℥ss.

antihect. Poter. ℥j.

syr. papav. rhæad. vel papav. alb. ℥j. M.

Vel, ubi magis acrimonia Salina peccat:

℥. Sem. 4. frig. maj. an. ℥jss.

papav. alb. ℥ij. c. l. q.

▽. flor. papav. rhæad. F. Emulsio, adde

Ebor. sine igne ℥ij.

⚭ diaph. ℥j.

sacch. parum, M. capiantur subindè cochleatim.

Aliàs acida ista ferè sub *Juleporum* forma sive titulo imprimis præscribuntur. v.g.

℥. Flor. bellid. rub.

rosar.

tunicarum an. Mss. infunde in aq.

comm. Mens. jss. aciduletur parum *sulphuris* per campanam,

stent in loco tepido ad extractionem Tincturæ,

℥. Colaturam, adde

Rr 3

syrup.

Vel



syrup. rubi idæi, vel rosarum. rub. vel violarum.  
q. s. pro grato sapore.

Confer. *Sylvius*, l. 1. prax. c. 1. §. 13. & 29. §. 47. [Ibi hæc habet in cap. de siti lesa.]

℞. Aq. hordei ℥xxx.

flor. ros. rub. ℥ss.

℞. q. s. ad grat. acidit.

Stent in aquæ dulcis vel arenæ balneo per horas 3. aut donec rubello colore tincta sit aqua, *Rosarum Tinctura* dicta, cui colatæ affunde

Syr. jujubini ℥ij.

M. & F. Julapium gratissimum.

Si quis ab acidis abhorreat, vel lædatur, sequenti utatur :

℞. Aquæ decoctionis hordei ℥xx.

cinam. ℥j.

syr. violar. simpl. ℥ijss.

lap. prunellæ aut nitri sola solutione & coagulatione depurati  
℥j. M. Dosis haustus mediocri.]

*Decoctum herba & radicis acetosa* elegantis & coloris & grati saporis, cui vel succi acetosa expressi & asservati, vel succi ribium per se asservati & syr. violarum pro lubitu addatur ad gratiam saporis, usurpetur pro *Julapio*. It.

℞. Decoct. hordei ℥vj.

alterant. usit. ℥iiij.

syr. de succo ceras.

ribium an. ℥jss.

℞. q. s. pro grat. sapore.

Vel quod melius :

℞. Decoct. rad. scorzoner. cum CC. ℥vj.

syr. acetosell. de nymph. an. ℥j. ad ℥jss.

Tinct. ros. violar. an. ℥j ss.

℞. q. parùm. M.

Item ℞. ∇. fontan. ℥vj.

syr. rubi idæi ℥jss.

papav. alb. ℥vj. ad ℥j.

℞. q. s. ad grat. vel q. s. M.

Pertinet huc decoctum, quod alterans in *Causo* :

℞. Rad. scorzoner. ℥j.

glyzyrrh. ℥ss.

fol. acetos. M. j.

flor. violar. ros. rubr.

borrag.



borrag. an. p. ij.  
 hordei select. Mj.  
 rasur. C.C. ℥j. ad ℥j℥.  
 passul. mundat. ℥j.  
 coq. in f. q. aq. simpl. ℞. Colat. ℥iij. adde  
 ☉ parum, q. f. ad aequal. sapor. gratiam, M. de quo  
 æger subindè capiat.

Par, quoad *medendi methodum*, ratio est *continuarum tertianarum*, cum & eadem omnia locum habeant remedia, saltem, quòd in his ad *exacerbationum vicissitudinem* magis respiciendum sit, adeoque ubi *præmittenda præmissa* fuerint, *absorbentia* illa & *alterantia* supra laudata, in specie ☉. ☉-latum, *coralliatum*, *lapid. cancr.* & *antibect. Poterii*, imminente quasi paroxysmo in specie usurpanda sint, conservando corpus in diaphoresi blanda, alvumque liberam retinendo, aliq; pro symptomatum tam præternaturalium quam nonnaturalium varietate debitè præstando.

Eadem ferè de *Semitertianis* aliisque similibus *compositis & complicatis* variè *febris* dicenda veniunt. Sunt autem omnes periculose *semitertiana* & nunc magis, nunc minus *acuta*, pro varietate nempe complicationis & compositionis variæ, unde & cura specialis pro harum varietate varianda, attendendo, an *benigna* magis, an *maligna* fuerit eadem: An *simpliciter febris composita* sit. An vero *cum inflammatione partis cujusdam* vel nobilioris, vel ignobilioris, sensilioris, vel minus sensilis juncta: quò nobilior aut sensilior pars inflammata fuerit, eò auctus magis & periculosus erit affectus, & cui altiori ope succurrendum. *Lenta* itidem si *intermittenti* juncta fuerit, pro ratione originis *lenta* & *prognosis* & *cura* nonnihil modificanda. Adeoque ea quæ de *intermittentibus & continuis* monita fuerunt, & de *lentis & malignis* infra monebuntur, aut de *inflammationibus* suo loco dicentur, ea & *semitertianis*, prout ad unam vel alteram talium prius accedunt, accommodanda erunt. *In genere* rigorem & horrorem tollent *absorbentia*, *alkalia*, &c. *astum* vero eadem diaphoresi & alvi libertate juncta. Sittatà periodo recurrant paroxysmi, ante *exacerbationem* possunt remedia propinari.

*Vomitoria* in plerisque sunt optima, sicut si *cum inflammatione* juncta, *diaphoretica & sudorifera*, cum *lentis* vero, *salia abstergentia & incidentia*, ut *sal armon. arcan. duplicat.*

Quoad *differentias continuarum* supra recensitas *Causus* nil singulare obinet in cura, saltem quod ☉ *ata*, tam *stis* quàm *astus* ratione imprimis conveniant, sive in forma sicca in potu dissoluta usurpentur, sive ☉ *simplex*, aut potius *dulcificatus* in potionibus assumatur, v.g.



℞. ʒ. iat. ʒij. D.

Dissolvatur in Mensura vel cerevisiæ, vel potus ordinarii, ita ut ʒß. liceat dare die naturali, nisi liberior alvus obstitit. Quod si accidat, ut dato nitro cum tanto ardore non mittatur urina, & liberalius accidat mejere, bono animo esto, dicit *Lindanius*. ℞. ʒ. i in *ʒulepis*, it. in *potionibus*, quarum formulas supra dedimus. In hoc passu bonum etiam est remedium *laud. opiat.* si tempestivè & prudenter exhibeatur, omnem caloris vim refrænabit.

*Lipyrria febris* ut plurimum periculosa, admodum inflammationum *Erysipelacearum* partes internas occupantium, curanda per *diaphoretica* tam *absorbentia*, quam *volatilia alcalia penetrantia & discutientia*, quam medendi rationem infra, ubi de *inflammationibus*, in specie ubi de *Pleuritide*, habebimus.

*Prunellam* cum febribus junctam præter apertionem maturam *venarum raninarum*, in hoc symptomate speciatim convenientem, promovent *oris lotiones* tam cum, quam sine gargarisatione; cujus formulæ v.g. fit præscriptio à *Sylvio lib. 1. prax. c. 29. § 86.*

[℞. Fol. prunell.

salicis

fragar. an. Mj.

hordei integri p. j.

F. decoctio in aq. pura

in Colatur. ʒxij. dissolv.

diamor. ʒj.

lapid. prunell. ʒß. M. F. *Gargarismus*, quo tepido sæpius os colluat & gargarizet ægrotus.]

Item ℞. Sem. ptyll.

cydon.

malv. an. ʒij.

c. f. q. aq. spermat. ranar. extrahatur mucilago.

Mixtur. ʒ. ʒß.

de qua, quantum sufficit, in ore subindè detineatur.

Confer, quoad has formulas, *Miscell. A. N. C. Ann. 3. pag. 123.*

Item ℞. Mucilag. sem. cydon. cum aq. rubi idæi extract. ʒß.

syr. portulac. ʒvj.

ʒ. parùm, M. detineatur in ore.

Item succum ʒ. *fluviatil. contus. express.* perquam egregius in hujusmodi *faucium affectibus* est, vel ex ʒ. *flu. v.* in mortar. cum paucis *aceto* contusis, post lenem factam expressionem, addatur huic *succi sedi Maj. ʒiij. M.* & hoc ipso liquore fricanda lingua.

Ant



Aut ℥. aq. semperviv. maj. ℥ij. vel iij.  
mucilag. sem. cydon. cum sperm. ran. extract. ℥j.  
nitri depurati ℥j. M.

Aliis palmam præripere dicitur, si

℥. sempervivi maj. q. v. & contusi, tunc

℥. succi semperviv. maj. ℥j. cui adde

sal, armoniaci ℥℥. dissolvantur & ita invicem destillentur, quâ  
ipsa aquâ fauces eluantur aut humectentur, cujus defectu

℥. aq. semperviv. vulg. cum succo præparat. rec. imprægnati & in  
ejus ℥. j. dissolv. salis armoniaci ℥j. & dicto modo adhibeatur. Alioquin ob-  
servavi in morbis malignis, dum fauces sunt siccæ & aridæ, sine crustæ pituitosæ  
præsentia, optimum fuisse remedium *aqua commun. ℥. i℥. mell. commun. cochl.  
j. vel ij. spir. vini Rhenani rect. ℥j. vel ℥℥. mista* ulurpentur pro oris collutio-  
ne. Si post tales oris collutiones in graviore malo mox lingua denuò arefcit, tum  
nil melius est, wann die Zunge von der Hitze gang verbrand wäre / daß es keiner  
collutioni weichen wolte. ℥. Frustulum lardi non saluti, vel si salitum fuerit, in  
aqua prius macerati, hujus frustulum unum imponatur linguæ, & ita aliquandiu  
detineatur, emollitur exinde lingua, & interdum crusta quasi coriacea separatur.  
Loco frustuli lardi contra talem linguæ scabritiem alia pinguis, v. g. butyrum  
non salitum itidem commodè ulurpari potest.

Malignarum febrium curam suo loco infra tractabimus.

Delirium in febribus & ejusmodi ambulones, agrypniam & cephalalgiam  
curant præservativa, inprimis blanda anodyna aut opiata, cum aliis appropriatis  
cautè & circumspèctè usurpata. Quòd si caput affligi in specie innotescat ulte-  
rius ex eo, quod circa frontem intensior æstus quàm circa reliquas corporis par-  
tes sentiatur, venarum raninarum apertio (inbinde proficua existit: Ac sanè in  
morbo dicto Hungarico seu febris castrensi, In der Soldaten, oder Ungarischen  
Krankheit) earum sectio & ratione junctæ prunella & ratione capitis pathema-  
rum summè proficua existit. Quarum loco, & tali in symptomate imminente,  
aut gravius urgente, cætera si respondeant, vena frontis sectio à quibusdam insti-  
tui solet.

Forſan ubi sub agrypniis aut Cephalagiis, item frontis æstuationibus pericu-  
lum delirii imminet, hirudinum ponè aures applicatio non inutilis foret, cum  
aliàs in febribus ardentibus etiam periculosis obauditio superveniens bonum  
signum esse soleat, propterea quia ex decubitu aliquali fermenti febrilis, seu ut  
aliàs loquuntur, materiæ peccantis ad glandulas parotides cæteræ partes allevian-  
tur. Præter dicta istis in capitis pathematis epithemata non rarè fructuosè, sed  
calidè, aut saltem tepidè applicantur. Observandum autem, quod ejusmodi  
epithemata etiam tempora simul regere debeant, ita ultra arterias ibidem pulsantes  
pergant. v. g.



℞. aq. flor. sambuci ℥ij.  
apoplect. usit. ℥ss.

Philon. Rom. ℥j. M.

item ℞. aq. flor. sambuci.

chamæm. an. ℥j.

apoplect. usit. ℥iij.

spir. vini camphorat. ℥j. M.

item Epithemata ex succo cancr. fluviat. commodè applicantur: vel huius loco:

℞. sem. papav. albi ℥ij.

Nucl. Persicor. ℥ij. vel iij.

aq. sperm. ran. ℥iij.

semperviv. maj.

solan. an. ℥ss.

F. Emulsio, adde

Camphor. gr. viij. vel x. usurpetur pro Epithemate.

Huic dimidium vel ana succ. & fluvi. recent. express. permisceatur, & ita crebrius fronti applicandum.

Tandem & ea, quæ pedum plantis applicantur, tam ad æstum temperandum, quàm illa capitis symptomata mitiganda, in casibus, in quibus nulla ad cursum excretio futura speratur, aut expectatur, conferunt, v. g.

℞. rut. recent. M. iij.

radic. raphan. inciss. N. iij.

sal. comm. M. j.

fermenti acerrimi M. ij.

c. s. q. aceti rutac. F. Cataplasma pedibus ita applicandum.

Alii stomacho radicem raphani in taleolos incisam, pedibus sale & aceto probe prius mundatis, apponunt. Quidam etiam occipiti applicant. Raphanus enim irritando successivè quasi attrahendo derivare videtur.

Pauperiores saltem recipiunt limum recentem. Hunc aceto probè permixtum, nudis pedum plantis applicant. Quin & fermentum pistorum acre, aceto & sale nonnihil subactum, ita nudis pedibus applicari potest. Quin & si impetuosior raptus quasi ad caput metuatur, in specie ubi excretio quæcunque inprimis cutanea suppressa, ista capitis symptomata inferunt, Vesicatoria, femoribus vel brachiis applicata, conducere arbitror.

Quoad colligati vas febres, in his ad acre colliquesaciens inprimis respiciendum, ut hoc corrigatur. Si enim hoc neglecto, excretiones saltem, quæ tantum producta sunt morbosa, respicere velis, hasque suppressere, tentis iisdem, mille malis multabis ægrum. Ad acre aut illud temperandum



vix aliquid convenientius esse videtur, quam *absorbentia*: v.g. *Antimon. diaphoretic.* *Diat. terra sigill. unicornu fossile* &c. Quæ eò videbuntur efficaciora, si sociatione blanda *acidorum* aliqualem quasi austeritatem contraxerint. Hinc enim *Sylvius spir. salis dulcem c. 29. §. 92.* laudat. Fortan & quodvis *acre temperans* hîc locum habebit. Inter *composita* *Diascordium Fracastorii*, juncto *succo citri* propinatum, præ aliis conducibile videtur. Sufficiant hæc de *Continuis acutis*, sequuntur

## CONTINUÆ LENTÆ.

*Continuas acutas* hætenus consideravimus, easque *benignas*: pergendum ad *continuas lentas*, ita dictas, quod tardiori motu sua absolvant tempora, minusque urgentibus febrilibus stipatæ sint symptomatis, calore in specie minus vehemente sive intenso, ut ut plus minus acri, mordaci molestæ: idque nunc magis nunc minus tales: illa magis propriè ita dictæ, German. *cine schmoche* *Hike* / ita à comite frequentiori, nempe contabescencia corporis, *cine schwindstichig Darr, Stieber* vocantur: hæ enim *minus lenta*, & nonnihil ad *acutarum* naturam accedentes, graviora ferè symptomata juncta habent, adeoque brevius tempora sua, absque tamen critico motu, successiva saltim solutione percurrunt, quales *continua quotidiana* in specie dictæ. Sunt enim *lenta omnes benigna*; *maligna* aut *acuta* esse solent, ut ut petechiales præ cæteris lentæ esse videantur.

Porro hæ *lenta* nunc sunt *primaria*, nunc *secundarie*: illæ per se incipiunt, & nullum alium morbum sequuntur: hæ verò ex alio fiunt morbo sive ab alio, tanquam à sua causa immediate dependent; v. g. quæ vulgo corruptionem partis cujusdam internæ sequuntur, item *Febres catarrhales* dictæ, &c. sive ab alio morbo malè tractato per illius degenerationem fiunt, adeoque tunc tanquam *primaria* per se subsistant, quales sunt, quæ *continuas acutas*, item *intermittentes* malè curatas insequuntur, suntque *omnes febres lenta* ferè *periodica*, hoc est, quæ suis plus minus periodis certis exacerbari solent, idq; *vel* (frequentius quidem) vespertino tempore, sicque *quotidiana* typum repræsentant, *vel* ab omni pastu; tuncque ad *hæstias* ferè revocantur. De his singularem.

Quoad *Lentas primarias*, horrore levi sed diurno ferè egros apprehendunt, insequente quidem calore continuo, sed non adeò intenso sive vehementi, prout in acutis, ut ut subinde mordaci, plus minus acri, interdum tolerabili sive mediocri, sed qui vespere intenditur, & usq; post mediū noctis graviter urit, & absque sensibili quadā excretionem solvitur, *pulsus* continuo celer, frequens, magnitudinis & vehementia moderatus, ad parvitatem tamen declinans, *appetitus* nullus, *sitis*



intensa, os glutinosum, *urina* crassæ intensius tinctæ, quæ facillè turbantur, & subindè multum crassamenti seponunt, adest simul *lassitudo* totius quasi contundens, cum *lancinationibus* *aruum* subindè juncta, interdum etiam *cephalgia* tensiva & gravativa molesta esse solet. Pluribus ad *acutarum* naturam accedere hujusmodi *lentas*, non solum ex hætenus facta relatione pater, sed in specie, quod *acuta continua* & etiam *intermittentes* in *lentas* tam has, quàm alias facillè degenerent, quin & in *hecticas* transeant.

Nempe, *acuta illa* ex concitatori fermentationis febrilis impetu, occasione acrioris & volatilioris acidi in sanguine acriori, (cæteris hinc derivatis humoribus & ipsis acrioribus existentibus) originem ducunt: *Lenta* contra ex remissione illo impetu, ab acido minus acri, aut in subiecto seu vehiculo viscidiori ac glutinosiori hærente, ipsis corporis humoribus cæteris temperatioribus, plus minus ac glutinosioribus, vel naturaliter vel præternaturaliter existentibus.

Observandum enim est probè axioma: Chronicos, contumaces, diuturnos ac *lentos morbos*, ex *viscida*, *glutinosa* ac *tenaci materia*, vel tanquam proxima occasionali causa, vel tanquam fomite dependere; *acutos* verò & cum corporis perturbatione junctos ab *acriori causa* occasionali materiali originem ducere.

Ortus ergo *lentarum harum febrium primariarum* erit *vitium & defectus digestionis primæ* dum ex inertiori aut alterato fermento digestivo (undecunque id vitii ortum fuerit) & bile quoque mitiori minusque acri, chylus minus volatilis, vitioso tamen acido sapore inquinatus massæ sanguineæ instillatur, quo ipso successivè fomes febrilis supervenit, (unde à sanguine pituitoso, sive pituitâ acidâ oriri continuas quotidianas asseruere Veteres) salubriter cessans, dum illo fermentationis motu depurat massa sanguinea, & quidquid heterogenei permixtum fuerit, coxerit & præcipitaverit, ut cum *urina*, vel successivis sudoribus eliminari queat. Cum verò chylus talis juxta sanguinem etiam lympham totius corporis insigniter alterare soleat, utpote in qua lymphæ naturaliter gelatina lactea seu chylota deprehendi solet: &c. Sanè talis plus minus alteratio, ac debitis usibus exsequendis hinc necessaria ineptitudo lymphæ fovere saltim febrim, & nonnullorum in eadem symptomatum originem esse, probabile admodum videtur, adeoque revocanda huc veniunt ea, quæ de *febris lymphaticis* eruditè disserit *Sylvius l. 1. c. 29.* Sanè *exacerbatio vespertina*, & calor circa idem tempus ibidem gravior, ex *lymphæ alteratione* illa primariò oriri videtur, cum quilibet à lymphæ orti affectus circa vespèram & appetente nocte ferè magis intendi soleant, ut in *febris catarrhalibus*, simpliciter ex lymphæ vitio natis, manifestum est. Ratio hujus intricata est; forsan, conniventibus circa id tempus nonnihil corporis poris, uberior transpiratio impeditur, unde lymphæ aut copia aut acrimonia augetur, aut textura seu constitutio ejus plus minus vitatur &c. *Lassitudo* itidem ista *contundens*, & plus minus *lancinans*, ex lymphæ derivanda venit,



venit, cum lacerationes hæ in artubus ferè semper sequantur lymphæ vel in motu, vel in constitutione vitia. Observantur nonnunquam in *intermittentibus*, item *continuis* eadem; sed tunc ferè semper *scorbutus* subesse solet, & inde lymphæ præternaturalis alteratio.

Ad has *lentas febres* pertinet & ista, quam veteres *Galen* sectatores *Epialam* appellârunt, in qua agri simul calent & frigent, vel ut alii, in qua interiora algent & exteriora fervent. Hanc cum quotidianis coincidere, & ex cruditate pituitosa primarum viarum oriri putat *Ballonius* in *Bonett Phar. Med.* p. 203. Sed meritò fictitiam his modis definitam Galenicorum asserit *Lindanus*, qui hoc nomen nil aliud, quàm *febrim mollem*, sive *continuum*, homotonon, cum calore leni, humido ac molli intelligit: id quod & appellationis ratio insinuat, de qua vide *Piens de febb. part. 2. p. 91.* Quod si unquam talis observetur febris in qua calor & frigus coincident, placet præ aliis *Plateri* asseritio, *Epialam* non continere febris peculiarem speciem, sed esse symptoma vel intermittentium copulatarum, cum horror alterius febris supervenit calori alterius, antequam dissolvatur, quod *per subintrantiam* vocant, vel intermittentium cum continuis junctarum, cum calori continuo misceatur horror intermittentium. Vid. *Plater. ar. 2. pr. p. 56. & 29.* & ex eodem *Piens*, citato loco. Simile quid interdum apud puerperas aliosve ægros *purpurâ* affectos videre est: apud nos, in quibus ante purpuræ eruptionem, urgente licet æstu, tamen si tantillam partem quandam extra lectum proferant, mox horroris sensum in corporis peripheria, interdum sub ipsis quoque lecti integumentis, percipiunt, dum scilicet acriores particulae salinæ, sub corporis communibus involucris delitescentes, & jam jam excernendæ, vellicatione sua talem horroris sensum, circa panniculum carnosum inferunt.

Referuntur huc à quibusdam etiam *febres syncopales*, in quibus agri animi deliquio frequenter corripuntur. Symptoma tamen hoc non *continuis*, plus minus *lentis*, adeò proprium est, quin & *malignis* non rarò superveniat, quin & in intermittentium paroxysmis subinde observetur. Unde etiam ad *intermittentium differentiam* hanc referre visum fuit *Sylvio lib. 1. prax. c. 30. §. 104.* De cætero quibuscunque etiam febribus syncopætales supervenientes videntur esse *stomachicæ*, atque vel occasione muci vitiosi, superius ventriculi orificium obfidentis, & vitioso sapore illud crebrius irritantis; vel ex aliquali humore plus minus æruginoso in ventriculo contento originem ducere: de quibus supra, ubi de *Lipothymis*.

Quoad *Prognosin*, *continua quotidiana*, quò magis vel minus diuturna esse solet, difficilis tamen ferè curatur, nec semper omni periculo vacans est. Quò pejora etiam habet symptomata, eò periculosior esse solet. Hinc *Syncopalis*



quā talis non est absque periculo: considerandæ tamen & cæteræ circumstantiæ. *Paroxysmi vespertini* si sint *longi*, cum interdum ad 16. horas extendantur, *vir- tus debilis* & *appetitus prostratus*, ingens periculum subest. Salubris hæc *febris*, nisi cautè curetur, nunc in *cachexiam*, si nempe *acuta* magis nonnihil fuerit, nunc verò in *hecticam*, si *lenta* magis extiterit, terminari solet. *Epiala lenis* est absque periculo, sed *diuturna*, & quæ faciliè in *hecticam* terminari potest.

In Cura 1. *Fermentum acidum* corrigendum. 2. *Vehiculum* ejus aut *fomes* ferè *pituitosa*, *cruditas acida*, removenda. 3. *Symptomata* mitiganda.

*Pro his scopis consequendis* observetur I. tam in principio, quàm incremen- to hujus *febris mitius vomitorium* optimè locum invenit, præsertim si vires si- mul consent. II. *Diuretica*, quia simul sunt *alterantia*, optimo successu applicari possunt, nempe ut loquuntur *Practici*, præmissis præmittendis, fun- dunt atque attenuant sanguinem, & ita restaurant plus minus naturalem ejus fermentationem, simulque crassa ci udaeque excrementa. Si quæ circa primas vias aut aliis in locis restiterint, dissolvendo abstergunt, & remotioni aptiora reddunt.

II. *Remedia* itaque, hac in febre proficua, sunt *sal armoniac. nitrum anti- moniatum, Tartarus viriolatus Tacken. Anti-hectic. Poter. terra fol. Tartari*, ejusque liquor, *spir. salis dulc. &c.* Hinc

℞. \* depur. ℥j.

antihect. Pot. ℥ss. ad gr. xv. M. D. unâ vel duabus vicibus, præsertim ante exacerbationem.

Vel: ℥. aq. hyssop.

Card. bened. an. ℥jss.

theriac. simpl. ℥ij.

sal. dulc. ℥ss. ad ℥j.

fyr. de hyssop. ℥ss. M.

*Epialæ* specialis cura ex ejusdem origine aut generatione faciliè haberi potest.

In *Syncopali* habenda ratio causæ. Hinc *unicornu verum* maxime *Foreste* l. 3. obs. 19. *Schol.* prodesse dicitur, cum vino in paroxysmi principio, tempore *Syncopes* propinatum. Nempe ubi acres aut æruginosi succi ventriculum lanci- nârint; Sic *Zacut. Lusit. l. 3. prax. obs. 22.* febrem refert *syncopalem minutam sive mollem*, obstinatam, cum nulla proficerent, per ∇ cum *tamarindis decoctam* ali- quandiu continuatam, refert curatam. Nempe ubi nidorosi acres succi, similia- ve contenta in ventriculo hæserint.

Aliàs nota sunt *mosa volatilia* vel *alcalia*, vel *æca* seu *inflammabilia* ad *syn- copes* curam, ubi nempe *viscidum* plus minus *flatulentum*, in causâ fuerit. Non in- concinnum tamen est hîc monitum *Ballonii in Phar. Med. p. 211. §. 85.* *Lipothy- mia* interdum præcedit febrem; Medici territi isto symptomate ad *cardiaca* pro- perant, cum potius ad *purgans medicamentum* statim sit veniendum.

Ut



Ut res clarior fiat, exemplum quotidianæ *continuae* minus lentæ, sed ad *acutæ* nonnihil accedentis narrabo. Virgo annorum octodecim, & cui difficulter fluere solebant menses, negotiis domesticis adfucta, nec adeo ordinatâ utens diætâ, conqueritur de *lassitudine artuum spontanea quasi contundente*, cum *cephalalgia intensa* & sibi pedetentim aucta. His aliquot diebus persistentibus corripitur aliquando à meridie *horrore mediocri* per aliquot horas, quem insequitur nox gravis cum æstu satis *intenso*, *cephalalgia gravissima*, *angustis præcordiorum gravativis sine somno*. Manè melius habet, cephalalgia tolerabilis, calor moderatus, ut reliqua symptomata: sed à meridie, appetente vespërâ, omnia sensim exacerbantur. Nox insequitur iisdem symptomatibus ac antecedens gravis. Sequenti manè omnia denuò remissa & mediocria. Medicus à meridie vocatus, offendit ægram viribus adhuc constantem, de *cephalalgia & lassitudine artuum* præsertim conquerentem: *calor mediocris*, naturali tamen intensior, isque *continuus*, *pulsus celer, frequens*, magnitudine & vehementiâ *moderatus*, ad *parvitatē* declinans; *appetitus nullus, sitis intensa*, potum cerevisiæ consuetæ horret, aquam appetit: *Urina turbida, crassa, intensius nonnihil tincta, fauces & lingua* salivâ viscidâ molestata. Præmissa *vena sectione* partim, ut adstantium postulatis satisfaceret, partim quia menses non benè fluxerant, per aliquot dies varia tentabam, frustra omnia. Tandem *cruditarum pituitosarum*, in primis viis delitescentium, suspitione commotus præscripti:

℞. Aq. menthæ ℥℞.

Syr. emetic. Sal. ℥iij. cepit, sed sine vomitu, aliquot secessus admodum torminosos habuit, sed cum tanto levamine, ut cephalalgia & æstus penitus evanuerint, nec redierint, hinc:

℞. \* ℥ij. D. pro 2. dos. manè.

item ℞. \* ci ℥j.

arcan. duplic. ℥℞. M. pro una dosi ante consuetum exacerbationis tempus assumenda.

item ℞. ~ \* c. ℥℞. Dos. 30. gutt. bis in die, quæ curam absolvit.

Supra dictum fuit, extra *lentas primarias* etiam *secundarias* dari, ex aliis morbis, quocunque errato non ritè tractatis, enatas; & tunc tanquam primarias solitatie existentes. Non raro tales in praxi occurrunt, & frequentius *febres vel continuas acutæ*, vel *intermittentes* insequuntur, quando *præcipitantium*, ut vocant, sive *absorbentium* abusu nimio (*oder wann sie bald vertrieben werden*) acidum morbosum fermentum præmaturè figitur, ac quasi retunditur, & hinc, cessante sanguinis ebullitione febrili, heterogeneæ copiosæ particulæ, aliàs præcipitandæ sive concoquendæ, retinentur in ejus massa, quibus ipsis & obviuntur ejus particulæ salinæ activæ, fermentativæ, & inertes quodammodo evadunt,



evadunt, & lymphæ simul, speciatim glandularum conglomeratarum, v. g. salivarium & pancreatis vitatur & glutinatur, subindeque salior evadit. Quibus occasionebus *febres lente continue* oriuntur cum *calore mediocri*, ægro interdum *vix adeò sensili*, nisi, ubi suas *exacerbationes* habent: easque ut plurimum *vespertinas*, in quibus subindè *intensior & mordax satis* percipitur, *pulsus continuo celer, frequens, mollis*, magnitudine ac vehementia *moderatus*, ad parvitatē declinans, *vires prostrata*, appetitus nullus, os *glutinosum*, ex quo copiosa viscida subindè rejiciuntur, *molestia præcordiorum gravativa*, *fluxus alvi*, subindè *materia liquida* quasi *pituitosa*, nunc cum, nunc sine *lancinationibus intestinorum molestis*. *Urina crassa, copiosa, crassum albidum seponentes sedimentum*, excernuntur, &c. & sanè plura in his febribus observantur symptomata, quæ eruditè Sylvius sub *febre lymphatica salivali & pancreaticâ* explicat l. 1. præ c. 29. §. 13. & 14. Superveniunt quoque tales *febres lente* supradictis febribus, si post has curatas ægri avidius alimenta ingerant, quo medio, ut non rarò recidivam sibi conciliant, ita, ubi depauperata magis fuerit massa sanguinea, ex copiosiore & crudiore chylo, non ritè assimilabili, *lenta* saltem *febris* gignitur. Nec solis febribus, sed etiam aliis affectibus, ex acido viscido plus minus natis, in quibus vel intempestivè movetur camarina, & hinc in massam sanguineam & lympham derivatur; vel non debite evacuatur, de facili *lente* tales, quasi *hectica*, plus minus superveniunt *febres*, pro quarum tamen omnium cura *acido-salsi peccantis correctio temperando; viscerum attenuando, incidendo; & ejusdem excretio, vomitum, alvum, urinam vel sudorem ciendo* indicatur, prout hoc ipsum ex exemplis allegandis clarius patebit.

Juvenis 15. vel 18. annorum laboravit *febre tertiana intermittente ordinaria*, quæ ferè sublatâ, *concidit appetitus*, omnia *assumpta* etiam potulenta alieno sapore videntur imprægnata, & ipse *gravamen* quoddam, *angustias & pressiones circa præcordia* sentit. Assumpto ergo vomitorio rejecta copiosissima viscidissima materiæ saburra: omnia hæc symptomata cum ipsa febre omninò evanescent: sed brevi post, cum strenuè ederet, denuò eadem patitur in præcordiis symptomata, reperto vomitu eadem excrementa, eaque in magna copia rejecit, sed subsequitur *calor insignis* vesperti & noctu, usque post meridiem alterius diei graviter affligens, cum *virium imbecillitate, capitis dolore gravativo, procumbentia in somnū, appetitu dejecto, saliva crassa & viscida* os & fauces subindè *agglutinante & infarciēte*. Calor à meridie remittebat, sed post cœnam recuriebat, per noctem affligebat, donec à meridie remitteret. His enè pensitatis *febrim quotidianam lentam & quasi lymphaticam à Sylvio* appellatam esse, suspicatus sum, & quidem non tam ex lymphâ pancreaticâ, cum nulla essent abdominis symptomata, & æger quotidie alvum exoneraret, quàm ex lymphâ reliquarum glandularum, quæ crassa, viscida & acida præternaturaliter reddita,

unde

unde &amp; Hinc

Sed æger, ciliaginosa corrigeretur

Similis lentis fixos sive prolixos moderatos moderatus bat, viscidum de admodum Uturpabat his irritis: Caudum; hinc superfluit, mulerunt.

Similis te, quæ affligit unde post a rum torpore vesperam no modè satis quiete, os fe oppler, spon dom anxius put dolet &amp; sua tentatis,



unde & saliva simili vitio affecta, oris & stomachi symptomata ista inducat,  
Hinc

℞. Antihectic. Poter. ℥ss.

℥ fiat. gr. viij. M. D. in duplo.

manè & vespri dosim unam. Aliquantulum profuit

℞. aq. menth.

fornic. an. ℥jss.

spir. theriac. simpl. ℥jss.

oxymell. squillit. ℥vj.

spir. sal. dulc. gr. xv.

syr. de hyssop. ℥iij. M. D. capiatur cochleatim.

Sed æger, dulcedinem potionis nauseans, de novo copiosa, crassa, viscida, mucilaginosa rejecit. Hinc, ut cruditates viscidæ melius attenuarentur, & stomachus corrigetur:

℞. \*ci depurat. gr. xv. D. in duplo, quod optimè profuit.

℞. \*ci depurat. ℥j.

Antihect. Poter. gr. xvj. M. d. in duplo.

Similis lenta erat febris, quæ sequebatur post tertianam legitimam, per pulveres fixos sive præcipitantes obrutam vel quasi curatam: Sed supervenit successivè calor mediocris, sed lentus, continuus, pulsus celer, frequens, mollis, magnitudine moderatus, appetitus ferè nullus, cerevisiam vix tolerabat, leviter saltem sorbebat, viscida copiosa ore rejiciebat, urina copioso sedimento imprægnata, subinde admodum debilis erat: uno nomine, omnia erant disposita ad Hecticam. Usurpabatur \* cum an. sap. ℥. vel antihect. Poter. it. arcan. duplicat. sed etiam his irritis: Ob viscida per oscopiosè rejecta vomitorium in dimidiata saltem dosi datum; hinc copiosa, & viscido-ferosa rejecta malum ferè totum levârunt: quod superfuit, matutinus usus Elixiris Proprii. & vespertinus spir. sal. armoniaci sustulerunt.

Similis erat febris lenta, ex acido viscido sanguinem & lympham inquinante, quæ affligebat Nobilem. Hic post curatos morbillos purgationem negligit, unde post aliquot septimanas corripitur, insigni lassitudine & omnium membrorum torpore, accedit semper mox à meridie calor præternaturalis; ita ut circa vesperam non mediocriter æstuarer, usque post noctem mediam: manè commodè satis habebat, febre tamen lenta continua superstite, dormit nonnihil inquietè, os ferè siccum semper & glutinosum est, copiosus mucus à meridie fauces opplet, sponte subinde vespri ad vomitum inclinât, quo tempore etiam admodum anxius est, alvus obstructus, pulsus celer, frequens, parvus, vehemens, caput dolet & perturbatum est; Urina turbida cum copiosis sedimentis. Aliis frustra tentatis, ordino vomitorium, quod cum eûpogia operatur; postmodum spir.

Tt

sal. armo-



*salis armoniaci*, & tandem post hujus continuatum usum *Elixir. Propr.* finem curæ imposuit. Nempe *acidum morbillorum* sub cura temperatum, & vehiculo seroso absorptum, non excretum, sanguinem, chylum, lympham, inquinavit, à quorum *acido-salsa visciditate talis febris* supervenerat. Par ferè ratio esse videbatur cum alio, *contagio Venereo* inquinato, ac *bubone & exulcerationibus parvis circa glandem* correpto. Hic, præmissis *purgationibus mercurialibus*, potare cepit *decocta lignorum cum antimonio & mercurio præcipitato*, sed cum aliquot dies hæc continuasset, incidit in *febrim cum totius corporis lassitudine, astu præternaturali*, sed *vesperi* saltem *exacerbante* gravissimè, & post mediam noctem usque grassante, ante meridiem redibat, & à meridie finiebatur, vespere recurrens &c. *Pulsus* continuè erat *frequens, celer, ferè parvus, os glutinosum*, rejiciebat *copiosa viscida*, *anxius* nonnihil erat, & *febris hæc lenta ex contagio Venereo*, *acido specifico in materia viscida sanguinem & lympham inquinante*, per ista decocta commoto, non sufficienter prius evacuato corpore, originem ducere videbatur; paucis præmissis propino *vomitivum* cum insigni

*copiâ.* Hinc

*℞. \*ci ℥ij. pro 2. dos. semper 1. ante paroxysm.*

*Item. ℞. \* 3℔.*

*arcan. duplicat. ℥j. M. pro 2. dos.*

*Item. ℞. \* 3℔.*

*℥i. ℥j. M. pro 2. dos. hisce astus & symptomata cetera remiserunt.*

Tandem *℞. \*ci 3ij. Dos. gr. 40. bis in die, copiosam urinam cum euphoria movit.* Sed cum *appetitus* adhuc esset admodum prostratus, præscripsi decoctum.

*℞. rad. chin. in caleol. incis. 3℔.*

*rad. lign. cassia. 3vj.*

*rad. liquirit. 3vj.*

*santal. rub 3ij.*

infunde in *aq. comm. ℔. vi.* stent in Mariæ balneo per noctem, manè adde *passul. min. 3ij.* coquantur lento igne ad remanent. *℔. iv.* de qua Colatura datur. De quo decocto manè & à meridie bonum haustum cepit, semper gr. 40. *Tinctura Antimonii* addendo, & ita quoad affectum hunc convaleuit, redeunte appetitu & viribus integris.

Similis febris lenta est ista, quæ affligit quosdam post scabiem malè curatam, ut observavi in quodam Studiofo. Symptomata erant prostratio virium, fauces & os siccum, saliva glutinosa, liquida alvi dejectiones, calor continuus præternaturalis vel moderatus, pulsus celer, frequens, vehemens, parvus: Urina cum copioso lateritio sedimento, appetitus prostratus, sitis intensa affectus quasi hecticus.

Varia



Varia & multa frustra tentabam, tandem optimè contulerunt *pilule ex exir. hellebori nigricum & dulci*, & hinc crebrior usus *essentia viperarum*, & tandem *c arminatiuus de tribus*.

Pertinet ad huiusmodi *lentas* etiam *Febris virginea*, *chlorosi* sive *cachexia virginea* juncta, *hectica* interdum quodammodò similis, ex *cruditatibus* ut plurimum *primariè viarum viscidis*, hinc *bilis inertia cum mensium suppressione* enata.

Fuerunt hæc *Febres continua primariæ*; sequuntur *secundariæ*, h. e. quæ non propriam substantiam habent, sed à graviore alicujus partis affectu originem trahunt: Dicuntur aliàs etiam *symptomaticæ*, per quandam similitudinem, quia vel ut symptoma morbum sequitur, ita & febres tales alium morbum: Vel sicut remoto morbo, remouetur ejus symptoma; ita & hæc febris. Sunt equidem, qui febres has in *comitatas & symptomaticas* strictius dictas dividunt, ut *Sennerius de febb.* illo nomine eas indigitans, quæ *inflammationibus partium* junguntur: hoc cæteras.

Sed non opus est scrupulum in talibus quærere. Sunt autem hæc ipsæ *secundariæ* nunc *acute*, idque crebrius, nunc *lente*, pro affectuum, quos sequuntur, & *partium affectuum conditionibus*, dum illi vel grauiores vel leuiores sunt; hæc verò nempe *partes affectæ vel sensiliores vel minus sensiles*. Item vel nobiliores sive quæ majus cum sanguine & spiritibus commercium habent; vel ignobiliores.

Has ergo inter *symptomaticas* se offerunt I. illæ, quæ *vulnera* quædam insigniora sequuntur. *die Wundfeber* / *ab acido in vulnere oborto*, *doloris inflammationis*, & hinc etiam *febris* autore. Præter ea, quæ extrinsecus vulnere conducibilia sunt, internè egregia *mistura est*, in casibus *chirurgicis polychresta*. v. g.

℞. *hyssop.* ℥ij.

*fœnic.* ℥j.

℞. *theriac.* ℥iij.

*acer. vini vel simpl. vel destillat.* ℥iij. ad ℥ß.

*lap. & fluuiat. præpar.* ℥j.

*syr. card. ben.* ℥iij. M.

*Vel in forma sicca:*

℞. *lap. & præpar.* ℥j.

*Extract. theriac. gr. ij. M.*

Quibus etiam pro partium affectuum ratione; vel symptomatum variorum *syndromè* simul alia *appropriata* addi possunt.

II. *Febres*, quæ adsunt *inflammationibus* grauioribus, occasione *acidi inflammationum* ut plurimum causantur. *Febres* hæc nunc sunt *acute*, v. g. in *Pleuritide*, *Angina*, *Erysipelate*; nunc *lente*, ut in *inflammatione* propè *fundum mesenteris* &c. Curantur hæc febres simul & eadem ratione, quâ *inflammationes* ipsæ, per *attenuantia*, *acidum absorbentia*, *volatilia*, *alkalia*, *diaphoretica* &c. de quibus suo loco, nempe ubi de *inflammationibus*, vide inferius.



III. Quæ sanguinem intra corporis cavitatem aut in ipsis solidis partibus effusum coagulatum insequi solent, & ex *acore*, putredinalem corruptelam antecedente, oriuntur. Conducunt sanguinem congruatum resolventia, & putredini resistentia, qualia præter *misturam supra laudatam*, sunt *bellis minor*, *papaver rhaas*, & *diaph.* non negligendo simul *potiones vulnerarias*.

IV. Dum *pus* fit, major calor, & labor, & dolor, quam factò pure adest, ut dicit *Hippocrates*. Aeoque in quovis *apostemate*, dum suppuratur, *febris juncta* esse solet, magis tamen *lenta* quam *acuta*, v. g. ex *lacte coagulato* dum *apostema* fit, vel dum *apostema* fit in *auribus* &c. *febris juncta* esse solet, tam diu durans, donec facta sit perfecta suppuratio. Unde hujus promovenda *maturatio*, & *remediis supra indicatis acidum absorbentibus*, & *diaphoresi* & *diuresi sanguinem depurantibus* insistendum.

V. *Ulcera* insigniora externarum, aut qualibet internarum partium insequi solent *febres symptomatica*, *lenta*, ferè *hectica*, adeoque *diuturna*, & ad *tabem ac mortem* tandem deducentes, à *sanguinis infectione*, à *pure falso acri, viscido*, ut notissimum est in *ulcere pulmonum phibisco*: Nec curari hæc possunt, nisi removeatur partis corruptela, & mundificetur & consolidetur *ulcus*, id quod *absorbentia supra laudata*, *potiones vulneraria*, *alcali divites*, ex *lap. ed. heder. terrestr.*, *charesfol.*, *bugula*, *pulmonaria*, *scabiosa*, ut & *lignorum decocta*; item *sulphurea balsamica*, *flores sulphur.*, *myrrha*, *bals. sulphuris* præstabunt, de quibus infra, ubi de *phibisci*. Ac sanè quàm plures *lenta*, *diuturna* & *tabifica* *febres occultæ*, nec à priori benè cognoscibili, *corruptione* aut *putredine ac latente ulcere sive abscessu* partis cujusdam internæ, *mesenterii*, *pancreatis*, *renis*, *epatis*, *vesicæ*, *uteri* &c. originem habere solent, & difficilè curabiles, ac sæpius *lethales* ægris existunt. Vid. *Schenck. l. 3. obs. Barthol. cent. 2. hist. 19. & cent. 4. hist. 18.* Hinc in *M. A. N. C. an. 4. appendic. p. 50.* *febres lenta perpetua abscessuum latentium comites esse* dicuntur.

Quò etiam facit *fœtus mortuus*; aut *secundina*, vel *integra*, vel *parte sui retenta*, hinc *putrescente*, & in *saniem plus minus purulentam* abeunte, tam sanguinè inficiente, quàm per contactum simul uterum inquinante: haud curabiles, nisi illis *remotis*, ac *putredine*, ne latius serpat, *supradictis remediis maturè prohibita*, ac *parte læsa consolidata*. Pertinent & huc *fistula diuturna*, quæ etiam *hectica similem febrem* inducunt.

VI. Præ cæteris considerabiles sunt *febres Catarrhales*, dicit *Bluss. Steber*, quæ in principio & incremento catarrhorum, v. g. *coryza*, *tussis*, *rancedinis* &c. subinde molestæ sunt, & ex *vicio lymphæ*, *glandularum*, primariò quidem conglomeratarum, secundariò etiam conglobatarum, circa caput & pectus confistarum oriuntur, dum nempe illa, quacunque ex causa (de quo ubi de *Catarrhis*) *acidior* aut *salsior*, ac quasi *muratica* facta, copiosius circa dicta loca effunditur, occasionem



occasionem crebrius suggerente *ambientis aeris inclementia*, aut alio *objecto externo* dictas partes irritante.

Talem *catarrhalem lympham* motum comitatur *febris ex alteratione sanguinis, à lymphæ & irritatione spirituum influorum*, in qua febris cum capitis perturbatione & dolore gravativo seu *gravedine*, levis horror, facillè quidem transiens, sed crebrius repetens, molestus est, quam appetente vespera insequitur calor sive ardor rodens sive *acris, & mordax* magis, quam magnus; increfcens ferè usque ad medium noctis, à quo successivè denuò remittit, durat tamen *continuò lentus*, sed *obscurus calor*, qui omni vespera intendi, & insigniter subinde exacerbari solet: Pulsus est *continuò frequens & celer*, vehementiâ & magnitudine *moderatus*, sub *exacerbatione* in dictis conditionibus *acutus*. Urinæ excernuntur *intensius tinctæ*, sed uno alterove die elapso *crassescere*, hinc *turbari & copiosum sedimentum* deponere solent. Durant ista symptomata sub *coryza & tussi* gravioribus usque ad statum morbi, dum nempe *lymphæ temperari & crassescere* incipit, seu ut vocant, *materia catarrhalis cocta* fuerit, & spissior mucus emungi, & glutinosior pituita expectorari incipit: Acrimonia enim lymphæ si correctæ est, cessat etiam febris.

*Catarrhales* hujusmodi febres, ac ipsi catarrhi interdum *epidémica* esse solent, ab *aeris communi impressione* natæ, nunc, idque frequentius, *benignæ*, rarius *malignæ*, & tunc subinde *acutæ*, quæ malignæ contagio suo lympham in specie inquinare videntur. Scil. pertinere huc videtur *morbis iste Epidémicus*: cujus mentionem facit Riverius *de morbis infrequentibus*, §. 9. Ac sanè *lymphæ constructio ac motus plus minus naturalis*, præsertim glandularum conglobatarum probè observandum venit pluribus in *febris tam intermittentibus, quam continuis*, cum diversa symptomata, *lancinationes in specie artuum*, sub paroxysmis subinde urgentes, haud aliunde quam à *lymphæ vitio* oriri videantur.

*Catarrhales* hæc febres, ut ut ex se omni graviore periculo careant, ob insignem tamen molestiam interdum & vehementiam curam postulant, in qua 1. *irritatio partium solidarum affectarum*, indeque natus *spirituum impetus*, ac copiosior *lymphæ effusio opiatâ* sistenda, 2. *Lymphæ acrimonia corrigenda* aut per *salia volatilialcalia*, aut *marina absorbentia*, & *temperata*, vulgò *incrassantia* dicta. 3. *Correcta evacuanda*, aut universaliter per *Diaphoretica & Diuretica*: aut particulariter per *nares & os*, atque hoc saltem *in statu*, cessante febre & coctâ materiâ.

℞. aq. serpill.

scabiol. an. ℥j.

spir. sal. armoniaci anisat. ℥j.

Syr. papav. albi ℥j. vel locohujus

Tt 3

laud.



laud. opiat. gr. ij. M. capiat. cochleatim ante exacerbationem vespertinam, & in hac ipsa, & exciterur blandus sudor.

Item ℞. liquor. C. C. succin. ℥ij.

essent. opii ℥ss. M. dos. gutt. 40. vel 50. aliquot horis ante exacerbationem, & iterum ingruente nocte.

Ubi diuresis magis intenditur:

℞. liquor. terr. fol. ꝑ. ℥ss. Dos. 40. vel 50. gutt. bis in die.

Sufflaminatâ sic febri, & impetu spirituum aclymphæ sedato, si opus fuerit, blanda laxatio institui potest, v. g. ex massa pil. de ammoniac. Quæ aut mass. pil. de succino Craton. acuat. cum mercurio dulci &c. Quibus factis reliqua jam incrassata expectorantibus ac similibus sunt evacuanda.

Anno 1669. mediâ ætate Catarrh epidemicus grass. batur cum tussi gravi, coryza, cephalalgia, doloribus dorsi & artuum, hæmorrhagia narium, & diarrhæa: curabatur optimè per sudoriferum hocce:

℞. aquæ sambuci

Carduib. an. ʒvj.

℞. C. C. essentificat. i. e. cum sale volatil. proprio.

acuat. ʒss.

sal. volatil. succin. ʒss.

syr. papav. rhæad. ʒss. M. capiat. una vice.

Vel hujus loco:

℞. aq. flor. acaciæ ʒj.

liquor. C. C. succin. ʒss. ad ʒj.

Diacod. Mont. ʒvj. ad ʒj. M. capiat. pro dosi sudorifera.

Pro tussi humida, in qua copia viscida rejiciebantur, conducebat potio expectorans, ex aqua asthmat. oxymelle squillit. &c. vide superius, ubi de tussi peccorali. Pro coryza & capitis affectibus inunctio verticis cum ol. succini, item Emplastrum ex Cerati probregmate usitati & Empl. de beton. ana, malaxatis cum ol. succini vertici imponendum.

Pro artuum affectibus eorumque debilitate curandis, imprimis ubi dolores sive laniationes artuum Reissen in Oledern aderant:

℞. ∇ fœnic.

flor. papav. rhæad.

menth. an. ʒj.

asthmat. Rudolph. ʒij. ad ʒvj.

lumbric. terr. per putref. ʒss.

specif. cephal. ʒss.

syr. flor. tunic. ʒss. vel ʒ. vj. M.

pro aliquot dosibus, aliquoties in die capiendis.



VII. Rari sunt insigniores aut diuturniores dolores quarumvis partium, quin febrim symptomaticam comitem tandem adipiscant, continuo pulsu, celeri, frequenti, in principio vehementi, in progressu debili ac parvo, interdum, dum membranosa partes magis afficiuntur, duro, calore lento sive miti, non adeo magno: sive acidum vel acre dolorificum massam sanguineam simul alteret, & præter naturalem fermentativum motum inducat, sive simpliciter ex *humum animalium* concitatore impetu, hinc vigiliis, inedia &c. commoto sanguine intensius, febris quasi synocha simplex plurium dierum concitetur. Sic v. g. colicas contumaciores, aurium dolorem, odontalgiam graviolem, tandem febricula talis sequitur &c. Quæ tamen consopito saltem dolore, etiam evanescit, & ferè blanda sudatiuncula terminatur. Pertinent huc febres istæ, quæ in principio paroxysmorum Arthriticorum usque ad statum ferè observantur, de quibus videatur Sylvius l. i. Prax. c. 30. §. 36. 110. 161. Sed de febribus symptomaticis vide in specie pluribus agentem Sennert. l. 2. de febb. c. 16. p. 202. & seqq.

Agmen harum febrium claudit

## HECTICA

quæ frequentissime esse solet symptomatica, aut saltem, aliarum febrium respectu, quæ in illam terminantur, secundaria, adeo ut negent quidam dari hecticam primariam ac per se incipientem. Vid. Pienis, part. 2. de febb. p. 49. Quod tamen ita universaliter vix concedendum videtur, quin ex perverso usu rerum non naturalium, v. g. tristitia, aut mœrore diutius protractis, excernendis præternaturaliter retentis, vitiosis assumptis, aut saltem malè digestis, hecticam oboriri possit, Practici observarunt.

Est aliàs hectica lenta admodum febris, ægro interdum vix sensibilis, nam calor ejus admodum lenis est & quasi occultus, qui ipse primo tactu vix est perceptibilis, utut, si diutius contineatur manus ægri, nonnihil se manifestet, duabus vel tribus horis verò post assumpta alimenta prodit se calor, isque nonnihil acrior vel vehementior. Deinde corpus insensibiliter & successive emaciatur, & tunc hectica consumptio, marasmus dicitur. Denique pulsus equidem est vehementior solito ac frequentior, parvus tamen & debilis, cum successiva & clandestina virium prostratione. Et hæc sunt tria signa pathognomonica quasi, & primaria symptomata, quibus præsentibus hectica conjicitur. 1. Calor occultus, post pastum auctus. 2. Absumptio corporis. 3. Pulsus celer, frequens, parvus, debilis, durus.

Symptoma, quod maxime infestum est hecticis est, Marasmus sive marcor, cujus ratione Hectica in tres gradus solet dividi. Primus gradus est, dum saltem torrida partium solidarum substantia, & quæ in nutrimentum partium proximè abit, successive absorbitur. Secundus gradus est, dum hæc ipsa substantia torrida

mutata



mutata in pinguedinem, vel jam in succum nutritivum partium solidarum mutata, & plus minus assimilata, successivè denuò liquefacta consumitur. *Tertius gradus* est, cum omnino absumto ipso rore roscido, ipsa stamina partium fibrosa arescunt & exsiccantur, & hinc ariditatem sensibus manifestam contrahunt. *Urina hæcticorum* in principio sanorum sunt similes: sin verò concurrat vitium stomachi, *urina alba*, pallida & tenuis subinde excernitur. *Hæctica* ad marasmodum progrediente *urina* est oleaginosa: qualis *urinæ* facies tamen etiam in duobus aliis casibus observari solet, nempe in *febre ardente*, item in *intermittente*, nimio *astu* conjunctis, interdum talis *urina oleaginosa* conspicitur, quoniam aucto calore, liquefacta corporis pinguedine, nonnihil ejus cum *urina* excernitur. Deinde in *Scorbuticis* & *malo hypochondriaco affectu* similis pinguedo supernatans observari solet, sed non est pinguedo, sed potius salia vitiosa coagulata, pellicula instar *urinæ* supernatantia.

Ut distinguantur hæc, observetur, quod ubi vera est pinguedo supernatans *urinæ*, semper sit *uniformis*, & ad latus adspecta nullum colorem aut splendorem repræsentet: In *scorbuticis* verò & *hypochondriacis* hujusmodi quasi pinguedo innatans ad lat<sup>us</sup> adspecta instar caudæ pavonis vel iridis elegantissimè colorata apparet. *Excrementa alvi* in hæcticis sunt diversa, feces quandoque sunt duræ, imò sæpiùs, dum in principio & incremento hæcticæ difficulter egeruntur, fiunt postmodum admodum liquidæ & copiosæ ventriculo nempe labefactato, nec ritè continente, nec debite digerente assumpta. In ultimo hæcticæ gradu fluor alvi ferè est *continuus*, ægrique sudoribus nocturnis ferè diffluunt, capilli tandem defluunt.

Modus generationis hujus febris est duplex: nunc *per se* incipit, adeoque *primaria* est, nunc *instar symptomatis* alios affectus sequitur, estque *secundaria symptomatice*. Ista hæctica, quæ *per se* incipit, est, quæ oritur vitio rerum non naturalium: quæ verò aliis supervenit morbis *instar symptomatis* est, quando observatur supervenire febribus *continuis*, aut *intermittentibus* contumacioribus ac vehementioribus, in specie perverso modo curatis. Sic *Horstius* l. 1. obs. 34. observat hæcticam lethalem abortam ex *intermittente*, per specifica ineptè & empiricè curata. Supervenit etiam hæctica sæpiùs viscerum plerorumque, specialissime *pulmonum inflammationi*, uti etiam hinc natis *apostematibus* & *ulceribus*, cum quibus ordinariò solet jungi Hæctica. Sic *Lindanus* super *Hartmannū* vidit Hæcticam contumacissimam ex abscessu mesenterii: item ex *ulcere renum*; item ex *utero*, qui in carcinoma inciderat. Vidit in fœmina ortam ex *multitudine fonticulorum*, qui omnem humiditatem & rorem consumserant, qui postquam clausi & sanati essent, curata fuit. Quin & *lui* Quæ subinde febris lenta hæctica plus minus similis sociari solet, aut sub febre, quæ hæcticam simulat, latet morbus Gallicus. Vid. *Zac. Lusit.* l. 2. *prax. admir. obs.* 119. item *Fonseca* t. 1. consult. 40. p. 264.

Ipsa



. Ipsa *Hectica* verò quæ per se incipit, ordinariò ex vitio ventriculi ac alimen-  
torum originem habere solet. Unde in tali *hectica primaria* semper respiciendum  
ad stomachum; ut corrigatur ejus *cruditas*, imò reliquæ causæ non naturales vix  
sufficiunt inferre *hecticam*, nisi simul stomachus ita afficiatur, ut hujus vitio ali-  
mentorum succedat corruptela. Vulgò dicitur *Hecticam* consistere in habitu  
corporis, ita ut sit quidam calor in partibus solidis accensus & residens, quod ta-  
men non est, quin potius instar aliarum febrium radicitur in massa sanguinea  
una cum *lympha vitiosa*. Prout enim se habent hi duo liquores, in specie san-  
guis, ita se habet universum corpus. Id quod confirmat *ulcus* in parte quadam  
nonnisi sanguinis inquinamento *hecticam* inferens. Vid. *Piens de febb. part.*  
2. p. 46. & 51.

Causa proxima hujus febris est *dyscrasia sanguinis* nimis *acido-salsa & acris*,  
cum *nimia ejus viscositate sive glutinositate* juncta, unde simul *lympha facilis vi-*  
*scositas*, idque sensibilibiter in glandulis conglomeratis adesse solet. Hinc enim *saliva*  
non tantum *pauca*, sed etiam *viscida* nonnihil & *glutinosa* percipitur. In ista  
igitur *dyscrasia sanguinis*, non blanda & æquabilis sit fermentatio in præcordiis,  
sed potius insigniter depravata. Unde & *spirituum* in corpore defectus & succes-  
siva *virium debilitas* superveniunt, cum *particula saline acide & urinosa* non de-  
bitè invicem intestino motu consolidantur, sed potius inertes factæ in tertium  
ferè salsum coaluerint partim, partim adhuc liberæ ab istis salinis particulis im-  
pediantur, quo minus debite fermentent, quin potius ex vitiosa fermentatione  
calor nonnihil auctus quidem non tamen intentus, sed tantum *acris* nonnihil in-  
ducatur.

Hæc ipsa omnia augentur insigniter à visciditate *salsa lymphæ*, unde magis vi-  
tiata est, & quasi plus minus oppressa *sanguinis fermentatio* pulsum parvum ac  
celerem generat. Sanguis talis *salsus* & simul *viscidus* ineptus est, ut nutriat  
partes, quia potius asperitate sua rorem nutritium viuiat, eumque acri ac lento  
calore successivè colliquat, unde corpus necessariò tandem absumitur. Post pa-  
stum ergo dum fluidior, facileque digestibilis alimentorum pars per vias consue-  
tas sanguini infunditur, hic ipse nonnihil dilutus fluxior redditur, & ob resoluta  
magis salia fermentationem nonnihil intensiorem inducit, unde aliquot horis  
post pastum calor auctus, cum pulsu frequentiore & nonnihil majore, percipitur,  
efflorescente simul nonnunquam calore faciei plus minus roseo.

Sed cum hoc ipsum *chylosum excrementituum supplementum* minus com-  
modè assimilatur tam sanguini, quàm partibus solidis, tempore nocturno sub spe-  
cie sudoris denuò per cutis poros emanat, unde sudores nocturni in *hectica* con-  
firmata sunt satis frequentes. Ulterius propter dictam *salivalem lymphæ visci-*  
*ditatem* imminuitur simul appetitus, superveniente omnium alimentorum fasti-



*dio.* Nempe in *vitiis stomachi* semper ratio habenda est *saliva* : nam ex hujus ratione non raro impeditur & labefactatur plus minus assumentorum fermentatio, ac idem ipsa sanguificatio. Hæc quæ dicta sunt de *causa proxima* confirmant ea, quæ tanquam *cause remotæ* febrem hæcticam inducunt, dum nempe huc collimant, ut ad *acrimoniam acido salivam* cum juncta *visciditate* sanguinem & lympham disponant, quæ ipsa, ne actumagam, vid. apud *Sylv. l. 1. pr. c. 32. §. 8. seqq.*

Quoad *Prognosin*, in principio *Hæctica* faciliè curatur, quò verò magis confirmata est, & quò propius accedit *tubi*, eò difficilius curatur : *tertius gradus* planè incurabilis est. *Hæctica*, quæ *putrida*, ut vocant, sive *intermittenti*, vel *continua alii* jungitur, curatu difficilis est, & plerumque lethalis, ægris contabescentibus. In *junioribus* facilius, in *adultis* difficilius, in *senibus*, quocunque se habeant modo, nullo modo curatur. Si *facies* adsit *Hippocratica*, res ferè esse desperata. Ad hæc, si accedit *Lienteria*, vel *alvi profluvium*; aus si *intumescant crura*, mors brevi aderit. Quoad *tempus eventus*, notum est, quod sit *morbis admodum chronicus ac contumax*, ejusque longitudo ac difficultas ætate ac corporis constitutione est metienda.

In *Cura* primùm advertendum est, num *hæctica* dependeat à *partis aliqujus morbo*, adeoque sit *symptomatica*, tum enim cura ad istum morbum est dirigenda. Deinde considerandum, an sit *simplex primaria*, an verò *complicata cum febre quadam putrida*, & in hoc casu tollenda prius *putrida*, & hinc removenda *Hæctica*.

Pro hujus ergò cura I. *acrimonia sanguinis & lymphæ acido-salivæ* temperetur. II. *Eorundem visciditas* corrigatur. III. *Ventriculi digestio* restauretur.

Hinc observandum (α) in *Hæctica simplici* & quæ est *absque putrida*, sive *fermentativa*, nec *evacuationes* nec *vena sectiones* instituendas (β) Si *prima regio corporis* excrementis sit referta, propter *cruditates* à debili stomacho productas, tutò *blanda purgatio absteriva* institui potest. (γ) imò si *vitiis stomachi* oritur *Hæctica*, tunc attendatur consilium *Lindani*, dùm inquit : In curatione *Hæcticæ* statim ad *partis affectæ cognitionem* incumbere oportet, quâ cognitâ, facilius *Hæctica* quàm quartana curatur : Oriuntur plerumque ex *stomachi vitio*. Convenit ergò *vomitum* tali in casu instituere. (δ) Inter *symptomata*, quæ superveniunt *hæcticæ*, præcipuum & magis funestum est *alvi fluxus*, ægros faciliè ad *interitum*



retitum perducens; *colliquativus* enim est: Refranandus ergo erit remediis ex *cydoniis*, *rosis rubris siccis lacte chalybeato* &c. (e) Dulcia, ut *saccharata* & *mellita* &c. vitanda sunt, quod visciditati contentorum & hinc inæquali fermentatione eorundem fomitem suggerunt.

*Præmarium morbum* curandam esse dixi, ab eo si dependeat *hectica*. Si ergo superveniat *febri intermittenti* vel *continua* malè curatis, ibi præmissio aut omisso vomitu, utilissimum est *sal armoniacum cum antihectico Poterii*, secundum formulas superius traditas: Sin ab *ulcere*, *abscessu*, aut simili vitio dependeat, hujus cura intendatur, ut supra de *febris symptomatice* insinuatum fuit.

Quod si *Hectica* fuerit *primarius morbus*, eadem tractanda venit per *remedia pharmaceutica*, sed & præcipuè *diætica*. *Chirurgica* nihil hîc valent. Ex *Pharmacia* conveniunt remedia, quæ *temperant salsum*, & *attenuant viscidum*, quæ inter eminent *terr. fol. Tartari ejusque liquor* rite paratus, item *sal armoniacum* tam solitariò, quamque additis *sulphur. fixis* solciatum, qualia sunt primò *antihectico Poterii*. Item *bezoard. Zale, antimon. diaph.* &c. Sanè *antihectico Poterii* ab autore cum *Conserva rosar. ad hectica curam* feliciter usurpatum fuit. *Mixture* ex *aceto destillat. cum lap. S. vel cum perlis* utiles observantur *hecticis*, siquidem verum videtur quod affirmat *Hellmont*, quod in *perlis & oculis S.* si resolvantur in primum suum concretum lacteum, sit *cura absoluta tabis*, sed talem liquorem primogenitum obtinere non omnibus æquè concessum est. Hisce etiam *cichoreum, endivia, lactuca, nymphaea* &c. exque his parata remedia accenseri solent. In specie conducunt *passula* perquam egregiè, nempe, ut aliàs dicunt, non datur melius *hepaticum* ac melius *nutriens*, quàm *rob. sive pulpa passularum*. Unde etiam à *Riverio* tam in *praxi* quàm *observationibus*, item in *Joelii praxi* non secus atque aliis multum extolluntur ad curam *hectica*.

Sanè in *discretia sanguinis acri* temperanda, & sanguine quasi renovando, perquam egregiè sunt *passula*; item *decoctum passularum cum radice cichor. vel cum radice chinae* egregium est. Hisce sunt, qui addunt rorem *majalem*, & ex eodem paratum cum *S. & S. essentielle*, quibus accedit ros *S. li. volatilis*.



qui nempe in destillatione Oli primus erumpit, ac *omne volatile phlegma*, quod ante stigma acidum prius prodit, nempe insipidum licet ferè, sulphure tamen volatili singularium virium est imprægnatum. Hoc *phlegma Oli roridum* à Marco Marci subinde rectificatum, & reiteratis digestionibus à Olo abstractum, fit *remedium egregium ad hecticam*, ab exacerbationibus partium interinarum natam. Vid. Marc. Marci in Philos. restit. Tr. de Magnetismo Oli.

Hæc quoad remedia pharmaceutica. Cæterum maximam in hectica cura partem constituit Lac, & quævis lacticia, sed præmissis necessariò præmittendis, primas vias scilicet abstergentibus & mundificantibus. Ad hæc circa usum lactis observandum, ne hectica adjuncta sit febris alia putrida, febris putrida dicta. Item ne adsit capitis dolor: item ne ventriculus scateat excrementis ac sordibus acerbis ex digestionis vitio natis: item absit hypochondriorum tensio. Lac ipsum inter convenientissimum est muliebri, inprimis si ex uberibus sugatur, cuius rei exemplum vide in Forest. l. 4. obs. 20. Extra hoc usurpatur Lac bubulum ex bestia sana & sanis pascuis gaudente, seu ipsum Lac usurpetur, quæ communis est sententia, siue in specie sumatur lac ebulliatum, à Piens de febb. part. 2. pag. 61. laudatum. Quibusdam etiam lac caprillum non sine fructu ordinatur. Optimum est lac asinum, præ cæteris in hectica cura expertum. Modò usurpentur huiusmodi lacticia maturè, nec nimis tardè, adeoq; viribus adhuc ut-cunque constantibus: Deinde ut coagulatio lactis impediatur, aliquantulum sacchari addendum; calidum etiam assumtum, siue ex mammis sugatur, siue recens emulctum adhuc calidum ebibatur. Primarium etiam lac alimentum sub tali lactea cura constituat, cæteris non nisi levioribus ac faciliè digestibilibus, iisque paucis assumtis. Ante omnia verò exploret Medicus, an æger lactis usum tolerare queat? Modum docet Joet in praxi, ubi de Hectica: nempe ventriculo prius leni purgatione evacuato, exhibeat ægro initio ℥iij. vel iv. lactis, videlicet si probè concoquat, & nil molestiarum ex eo sentiat, nec post assumtum lac gravitas in ventriculo sentiat, aut singultus excitetur, aut vomitus nauseæque succedat, nec calor in corpore nec pulsus intendatur, tum potest integra libra manè & vespèri propinari, post sumtum autem lac nec violentius se commovebit, nec dormiet æger.

Alia inter alimenta temperata sunt optima, hinc pultes. v. g. ex oryza, item inscula avenacea & hordeacea conducunt, de quibus Borell. cent. 4. obs. 89. item amygdalata, nucleis pinearum, pistacearum, sem. 4. frig. maj. &c. hinc & S. fluv. rana, ostrea à quibusdam laudantur. Centè S. fluv. rore alcalino nutritivo turgidi, modò à stomacho digerantur, alimentum erunt medicamento-rum egregium, vel succus ex S. expressus, ac butyro non saluto mistus suggerit butyrum antihecticum egregium. Conf. Sachs. in Gammarol. Rana, item ostrea, si eas feret stomachus, simili ex ratione benè conducunt. Notabilis est obser-

vatio

vatio Linda  
annorum  
annos incid  
ratarum 12.  
cùm exinde  
comederat,  
libus habeat  
gestionem e  
si fluxus ab  
rinac. lac  
Amat. L  
rum testu  
sub lactis  
fio, quin h

Mal

qui sub spe  
mali. In  
ter differun  
occasional  
sua natura  
Hac rition  
& benigna  
sunt benigni  
ligna, cholera  
Ex istis  
pe illa febris  
nora, quàm  
alias in tali  
con, pericu  
mortem ter  
mento febr  
verò in eade  
egros anxio  
gnificant, f  
que subesse  
Sympt  
comitari sol



vatio *Lindani* super *Hartmann*. qui dicit: Amstelodami fuisse virginem viginti annorum, quæ ex ulcere *pulmonum in Hæticam* jam desperatam per aliquot annos inciderat: Huic virgini voluptas *ostreas* edendi obveniebat, unde præparatarum 12. offeruntur, quibus absuntis & tantundem iterum conceduntur, & cum exinde benè haberet, illa intra breve tempus magnam earum quantitatem comederat, unde brevi convaluit, nupsit & octo liberos peperit. Nempe in talibus habeatur ratio *stomachi*, ejusque quoad *appetitum* dictamen, & quoad *digestionem* operatio: idem de *ranis*, alii de *testudinibus* id ipsum affirmant. Quod si *fluxus alvi* adsit, imprimis crassa alimenta conducunt, ut de *oryza*, *pultes farinac.* *lac chalybeatum* propinetur. Quod de *testudinibus* retuli, confirmat *Amat. Lusitan. cent. 2. cur. 53.* qui curavit quendam per *pullorum gallinaceorum testudinibus nemoralibus* saginato um, & potum *lactis asinini*. Sed præstat sub lactis usu carniū esum intermittere, ne lacti ad corruptionem detur occasio, quin *lact. cinia sola* pro cura usurpentur.

## FEBRIS MALIGNA.

*Maligna febris* ita dicitur propter similitudinem ab hominibus malignis, qui sub specie recti decipiunt, nam tales morbi apparent boni, revera autem sunt mali. In Febris *malignum* tale, item *pestilens* (hæc enim non nisi gradualiter differunt) est materialiter nil aliud, quam nudum nomen designans causæ occasionalis sive materialis statum & conditionem, quia nempe hæc degenerat à sua natura & mutata fuit, respectu nempe corporis universi patientis, in pejus. Hac ratione non tantum *febres* tam *intermittentes* quam *continua* sunt *malignæ* & *benignæ*; sed etiam communis affectio *quorumvis morborum* est, ut interdum sint *benigni*, interdum *maligni*. Sic dantur *pleuritides maligna*, *dysenteria maligna*, *cholera maligna*, & sic consequenter in aliis.

Ex istis sequitur fundamentum *diagnosticon februm malignarum*, dum nempe illa *febris* est *maligna*, quæ habet *symptomata majora* sive *graviora* aut *solentiora*, quam possunt ex causa ordinario modo constituta oriri, adeoque qualia aliàs in tali morbo adesse non solent. Hinc sequitur *fundamentum prognosticon*, *periculosos* esse tales morbos, & speciatim febres, & quod sæpius acutæ ad *mortem* terminentur, v. g. *Febris* hæc ex vitio *digestionis primæ* sub nato fermento febrili est *tertiana*, si more aliàs solito omnia procedant, est *benigna*. Si verò in eadem tanquam in *ardente* vel *animi* subinde superveniunt *deliquia*, vel *agros anxios admodum* cum *pulsu parvo* in vigore *paroxysmi* existere videmus, significant, *fermentum febrile* ejusque *fomitē depravatū & corruptū*, adeoque subesse *malignitatem*.

*Symptomata* illa vel *majora*, vel *insolentiora*, quæ febres *malignas* ordinariè comitari solent, sunt multiplicia, adeo ut nulla ferè sint *symptomata*, quæ non



subinde in febre illa maligna observata fuerint. v. g. *hydrophobias* in febribus *malignis* observavit, *Salmuth. C. 2. hist. 52.* item *Sanchez. in observ. med.* Interdum malignitas est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo ac gangrena* corruptas observare liceat. *Conf. Hild. cent. 3. observ. 93. & 95.* item *Salmuth. cent. 1. hist. 7.*

Sed quæ frequentius ac ordinariò magis in febribus malignis observavi Symptomata sunt: *Virium subitanea*, sine causa manifesta, eaque ferè omnimoda prostratio, adeò, ut longè major in his febribus esse soleat, quàm in aliis. Sentitur etiam tribus, nonnunquam quatuor diebus ante febrem, ac imprimis in brachiis & cruribus solet percipi. *Pulsus* inter initia sæpe *naturali pulsi* est *simillimus*, aut non multum adeò ab eo discrepare videtur. Subitò tamen *debilis ac parvus* reddi solet. Interdum mox in initio pulsus est *frequens, debilis, parvus*, ac invalescente morbo multis modis *inequalis*. In genere, ubi in febre, quæ plus minus simulat *ardentem*, pulsus est parvus, ibi certò colligendum, subesse *malignitatem*, adeò ut quamdiu nonnihil *magnus* existit, vel quantocyus *ex parvo* nonnihil *major* evadit, semper *bonum* esse solet. *Sitis* in febre maligna aliquando tanta est, ut communem febrium conditionem longè superet, & cum calor in malignis non soleat esse tantus, quantus in ardentibus, imò interdum adeò mitis, ut ægri de eo non conquerantur, nihilominus tamen gravissimè urgeat *sitis*, signum est, subesse *malignitatem*. Quod si *potius*, retinguendæ sitis gratia porrectus, non solum nil profit, verum etiam simul *fluctuationem* aut *anxietatem* pariat, *linguamque scabram* aut *aridam* reddat, *malignam perniciem* subesse, indicium est.

*Urina* ut plurimum sanorum similes sunt, adeò ut in *malignissimis febribus* *urina optimè constituta* subinde excernatur. Unde *tales urinae*, præsentibus aliis pravis signis, certum *malignitatis indicium* præbent. Interdum in *statu turbida* fiunt, sed *tenuis* sunt, indeque vel parum vel nullum *sedimentum* deponunt, simul etiam *color talium dilutiore* est, quod tamen nil boni denotat. Unde malignis in febribus coctionis & cruditatis ratio non habetur tanta, quanta in benignis. Interim tamen, etiam si pessimè habuerint ægri, modo tamen etiam in summa virium prostratione, *urinae* excernantur *crassæ*, ac fiant *turbidae*, & *sedimentum* plus minus copiosum, vel candidum, vel *lateritium* simileve, sed *aquale* deposuerint, tamen semper *bonum signum* est, & neminem cum tali *urina* intereuntem observavi. Quin & *sudores* antea impossibiles, aut similes huic *excretionibus cutaneæ* spontè prodire solent. E contra in febre maligna, etiam melioribus signis præsentibus, *urina* tamen *cruda & perspicua*, licet *crassâ & intense tinctâ* existente, & ita perdurante, tamen nihilominus intereunt ægri, ut etiam in tali *clara urina* aliquid quasi *sedimenti flavescens* teorsim natere videatur. Hoc enim chyli portiuncula est, ex assumtis cum *urina* secreta,

Calor

Calor eam  
purida, si ne  
tamen sunt g  
intus tamen c  
strant region  
intensissimo  
gnitatis sign  
Subitò or  
dit, & quam  
adstantium  
porem per  
etiam vale  
lam aveste  
manifesta  
voso gener  
ribus origi  
Præte  
gatio, ex qu  
non semper  
pedem agit  
nescii quan  
bus, nunc,  
in stomach  
monstrant  
existente,  
porrectum  
anxietatib  
quibuscun  
cursum, si  
tione viri  
hoc in casu  
xietates ist  
pe hoc in c  
quæ stoma  
doris medi  
eadem inte  
ex suppress  
vus inter d  
expectand  
olentia exc



Calor eam non habet acrimoniam, quàm aliæ febres benignè fermentativæ sive putridæ, si nempe ejusdem generis benignas & malignas conferas. Symptomata tamen sunt graviora. Interdum foris non admodum vehemens sentitur calor, qui intus tamen exurere solet. Interdum ægri dicunt: *Es brennet im Leibe* & monstrant regionem stomachi, sive præcordialem. Certe dum conqueruntur ægri de intensissimo calore interno, partibus externis moderate calentibus, prævum malignitatis signum est.

Subito omnis perit appetitus, cui interdum nausea & fastidium ciborum succedit, & quamdiu ægri aliquid jusculi vel tantillum alimenti sine nausea, aut insigni adstantium persuasione assumunt, semper bonum est signum, imprimis si adhuc saporem percipiunt genuinum, & non dicant: *Es schmeckt wie faul Holz*; quod etiam valet, si potum ordinarium, v. g. cereviziæ lupulatæ terre valeant, nec illam averferunt. Agrypnia ut plurimum ægros vexant, mox in principio, sine causa manifesta, exque nunc sunt anxiosa, nunc absque anxietate. Hæ ex affecto nervoso genere & ritibus animalibus, illæ ex stomacho & præcordiis malè habentibus originem ducunt.

Præterea anxietas cordis, indeque inquietudo ægri insignis, & interdum sectigatio, exque majores, quàm pro ratione febris adesse solet; Inquietudo illa anxiosa non semper toto fit corpore, sed nunc brachium unum vel alterum movent, nunc pedem agitant, aut extra lectum exserunt, nunc integumenta hinc inde tradunt, nescii quare hoc faciant. Anxietates hæ quàm frequentissimè ad sunt in his febribus, nunc, utut rarius, in principio, frequentius, in incremento & statu: sedem habent in stomacho, & ibidem angunt ægros. Interroganti: *wo ihm dann so angst sey?* monstrant regionem præcordiorum, respiratione tamen libera, & non impedita existente. Unde etiam vomiturunt ægri, interdum quicquid medicamentorum porrectum fuit, denno evomunt & nil amplius. Subinde conqueruntur in istis anxietatibus: *wann ich mich nur übergeben könnte* dicunt. Hinc sæpius observavi, quibuscunque vomitorium in primo malignarum insultu dedi, hi omnes morbi cursum, sive salutaris sive lethalis fuerit, quieti & tranquilli, summa etiam prostratione virium existente transegerunt: in specie, si à contagio fuerit malum, adeo ut hoc in casu unum ex primariis videatur auxiliis vomitus maturè provocatus. Anxietates istæ, etsi per sudores leventur, tamen sudoribus cessantibus redeunt. Nempe hoc in casu non semper copiosa materia peccans aut sordium saburra adest, quæ stomachum afficiat, sed effluvia illa fermenti febrilis maligna, quæ cum sudoris medio diffillantur, primæ viæ ac præcordia liberiora sunt, sed illo suppresso, eadem interiora versus ruunt, & anxietates inferunt: non secus scilicet diarrhæa ex suppressa diaphoresi interdum oritur, & contra hanc aucta illa cessare solet. Alvus interdum clauditur, id quod melius est, præsertim quando excretio cutanea expectanda, frequentius nimis fluida est, & excreta liquida, feculenta, pessime olentia excernuntur, uno nomine, fluxus colligatus est.

Hæc



Hæc & similia symptomata varia malignis in febribus observantur, sed sæpe latent febres tales, ut non nisi tardè subinde Medicus eas valeat internoscere. Sed suspicio earum oritur 1. quod agri plus solito sint imbecilles citra manifestam causam. 2. quod, licet omnes functiones sint naturales, tamen appetitus penitus sit prostratus. 3. simul agrypnia etiam sine causa quacunque agrum vexet. 4. quod urina tales sanorum similes sint. 5. Pulsus minor plus minus debilis. 6. Quod citra calorem magna adsit sitis cum aridura lingue & faucium. Quia etiam critica symptomata nonnunquam malignitatis signa mentiuntur, eadem distinguere docet Poterius lib. 1. de febb. c. 18. nempe omnia symptomata gravia, quæ apparent ante signa coctionis, morbi maligni ratione fiunt, at post coctionem pendent à consuetu natura & morbi, nilque maligni habent, præter speciem & apparentiam.

Quæritur jam in specie: in quonam consistat malignitatis ratio formalis tam morborum malignorum in genere, quàm in specie malignarum febrium? De hac controversia quatuor primariæ sunt hypotheses. I. Afferit, consistere malignitatem in singulari corruptione humorum, qua iidem putredine quasi afficiantur, & ita singulari modo corrumpantur. Verùm dum non explicatur, in quo consistat putredo talis, neminem sententia hæc sapientiores reddit.

II. Moderni, quorum antesignanus est Willisius Tr. de febribus, volunt, in febre maligna sanguinem disponi ad coagulationem ita, ut hinc inde semigrumosus hæreat, & sic circulum naturalem turbet, undè tam tetra oriuntur symptomata. Verùm hanc sententiam non ineptè refutavit Carolus de la Font. Med. Doct. in Acad. Avenionensi in Gallia, Tr. de veneni pestilentis natura & cura, II. dissert. 1. c. xv. qui potius venenum corrosivum de natura arsenici causam pestis, hinc & mutatis mutandis, malignarum febrium statuit. III. Est Sylvii, qui malignitatem quamcunque in acrimonia nimia; nunc lixiva sive urinosa, nunc acida consistere asserit. vid. Tr. de lue Quæst. 130. in specie autem in febribus malignis peccare acrimoniam salis volat. alcali nimis acris, enervantis acidum lymphæ & sanguinis. Vid. Prax. l. 1. c. 33. & de peste Tr. IV. Est eorum, qui malignitatem consistere volunt in verminatione sive putredine animata. Hujus sententiæ patronus est Kircherus in Scrutinio Pestis. Consentit eidem Langius in præfat. super Tract. prædoct. de peste, item Hauptmann. de viva mortis imagine. Sanè Kircherus non solum in Scrutinio pestis, sed etiam in Arte magna lucis & umbra l. 10. part. 2. pragmat. 2. innumeros vermiculos minutissimos in quovis subjecto putrescente, in plantis putridis, aceto, lacte, cadaveribus, lignis, fructibus, sed & in sanguine febrientium, in cerebro hominis, aliisque ejus partibus ex putredine ortos per microscopium observavit. Vid. etiam Mundum subterraneum Kircheri lib. de veneno p. 107. August. Hauptmann. ejusdem est sententiæ,



tentia, qui omnes morbo ex putredine maligna exortos suam ex verminosa substantia originem trahere assent. Idem Auctor per microscopium observavit in Gangræna, lue & ea, vermes plurimos, limacum instar, qui carnem non secus ac caseum fodicassent, & unicus ejusmodi vermiculus chartæ impositus brevi spatio 50. alios extra corpus rejecit. In peste sævissima, quæ totam Lusitaniam depopulatam reddidit, principio morbi omnibus vermium rotundorum nigtorum copiam per nares manasse observavit Zacut. Lusit. l. 4. med. Princip. histor. 46. quest. 42. Zappf. in dissert. de morb. Ungarico inquit: Ipse in nupera dysenteria laborantibus per microscopium aliquoties observavi innumeros vermiculos, albos & rubros, acarum magnitudine æquantes cum rostrulis hamatis. Item in puerpera hujus loci, sinistra mamma, quæ laborabat ulcere, multa remedia, sed in cassum fuerunt adhibita: Tandem in suspicionem vermiculorum ex lacte putrescente incidi, cremorem crassiusculum effluentem per microscopium examinans, tunc aderant innumeri vermiculi minimi, quales in caseo apparent: postea adhibito bufonum pulvere cum pauxillo oleo arsenici, vermiculis enecatis, ulcus brevi fuit consolidatum. Sic habitum corporis verminosum cum variolis & pustulis vidit Rhodius cent. 3. obs. 64. Conf. etiam M. A. N. Can. 1. p. 147. probabile ergo admodum videtur, sanguinem præsertim malignè febrientium admodum vermiculosum existere. Sed hanc sententiam, & hinc malignitatem derivatam optimè ventilat Marcus Marci in Phil. vet. restit. part. 4. sect. 8. dum dicit: Vermes non nisi præcedente putredine sive corruptione sanguinis & humorum posse generari, adeoque potius effectus esse corruptionis malignæ, quàm ejusdem formalem rationem.

Ex modò allegatis hypothesis eam probabilissimam arbitror, quæ in acrimonia intensissima & simul summè volatili consistere malignitatem statuit; sive acerrimum fermentum & spirituosum, adeoque intimè penetrans, & tam fluidorum corporis texturam insigniter immutans; quàm solidorum sensibilitatem singulariter irritans, esse causam fermentalem malignitatis: vel ut Sydenham loquitur, observat. de morb. acut. l. v. c. v. malignitatē in Epidemicis morbis, in particulis calidissimis & spirituosissimis consistere, ita ut malignitas ad venenorum naturam, quorum vis in acrimonia summa sub minima mole insigniter activa consistit, accedere videatur. Sylvius equidem in febribus malignis acrimoniam lixiviosam, sive alealinam intelligit: sed cum alcalia potius passivè se habeant quàm activè, & ubique acidorum ductum sequi soleant; nervosarum etiam partium symptomata, v. g. deliria, vigilia &c. in plurimis perquam frequentia, potius ab acido acri, quàm urinoso videntur oriri, & constitutio partium vitalis, quarumvis, tam solidarum quàm fluidarum, sive veterum calidum nativum, quæ in malignis in specie oppugnatur, in acido volatili (quatenus



Tackeni haftenus probabilissimis, dum meliora monstrata nondum sunt, hypothesebus insistere placet) potissimum fundata sit, quæ nonnisi à symbolizante, sed vitioso, & illud quasi subjugante vitiari potest acido; remedia quoque usitatoria, ut salia volatilia, camphora, animalium partes duræ, ut CC. ebur, unicornu. Item terra pingues & plus minus temperando absorbentes, terra sigillata, bolus armen. Item antimonium diaph. bezoard. miner. remedia solaria, diaphoretica, &c. Speciatim vi acidi volatilis temperativa & correctiva, ac plus minus fixativa polleant, probabilius videtur

4. acidum acerrimum volatile si ve spirituosum potius malignum istud in febribus constituere, quàm urinosum, live laxiosum. Unde etiam causus alixque fixiores continue febres, tam vicinæ sunt malignis, ut hæc subinde sub illarum regimine lateant, & illæ quoque promptissimè in has degenerent, quatenus faciliè fermentum febrium illarum benignum, si ve mitius, acrius & volatilius reddi, indeque malignitatem veram contrahere potest: ut taceam variolas, pleuritides ac similes, manifesto ex acido natas febres, sæpe malignas simul existere. Sed si ritè hæc consideremus, malignitas haftenus explicata nonnisi illas febres attingit, quæ ex contentis humoribus maligno tali fermento inquinatis, oriuntur, quæ mitiores saltem esse videntur, cum graviore, ex infectis, & maligno afflatu quasi vitiatis spiritibus primariò oriri videantur, qui infecti exinde notabiliter immutati, & plus minus syderati, si ve ex parte mortificati, contenta corporis, in specie sanguinem pessimè vitiantes, maligniorum febrium & speciatim pestilentialium ipsiusque pestis fundamentum existunt.

Nempe afficiuntur in febribus malignis primariò quidem contenta corporis, utut secundariò etiam acres, maligna particula generis nervosi partes quasdam, v. g. ventriculum plus minus affligere soleant. Prout autem particularum fermentativarum non est differentia in proprietatibus & activitate, ita etiam malignitas quibusdam in febribus humores, præsertim sanguinem inquinat, in aliis verò spiritibus magis infecta est, quorum prævio inquinamento & massam sanguineam plus minus afficit. Ut hoc pateat, observandum, quod symptomata illa inter graviora & insolentiora primatum ducat, nimia virium prostratio, tam ex ægri narratione, quàm ex ægri pulsu cognoscenda: Cum verò omnis vis corporis viriumque debitum robur in spiritibus situm sit, non poterit in malignioribus febribus tantus virium collapsus tam repentinus esse, nisi malignitas si ve venenum primò spiritus occupet, hisque in specie inimicum sit, & his mediantibus contenta cetera fluida, speciatim sanguinem inquinet, id quod ulterius cetera concurrentia symptomata confirmant, pulsus nempe parvitas & debilitas, urina in malignioribus aut pessimo ægri statu naturalibus similes



similes subinde; item *agrypnia* ac *delirium*, in talibus febribus citò ac frequenter affligens *contagium*, efficacissimè & latissimè, in distans non rarò, se diffundens, quod saltem *spirituosus* ac *subtilissimis effluviis* competere potest. Conf. hic in specie *Velthuisius de usu lienis* p. 134. & *seqq.* ac sanè plures *contagiosiores* & speciatim *pestilentes*, ipsaque *pestus spiritibus* in specie inimica sunt.

Sunt autem *spiritus*, virium fundamentum, *duplices*, vel *vitales*, vel *animales*, qui tamen mutuo nexu & functionum circulo mutuas opes sibi conferunt, & ad conservationem sui ac totius corporis intimè conspirant. Probè itaque attendendum, utrum in maligniori febre magis *spiritus vitalis* cum massa sanguinea vitiatur, an verò *animalis* & *genus nervosum*.

*Spiritus vitales* & hinc *massam sanguineam* primariò affectam esse persuadent. 1. *Astus* intensus, cum *pulsu* celeri, frequenti, parvo. 2. *Sitis* clamosa, *fauces* aridae, *lingua* scabra, nigra & fissa. 3. *Astus* moderatus cum *pulsu* celeri, frequenti & inæquali, mox sub *ingressu morbi* apparentes.

*Spiritus* verò *animales* ac *genus nervosum* primariò magis affectum ostendunt (1) *ardor capitis* circa frontem continuus, & longè intensior, quàm in reliquo corpore (2.) *Pulsus durus*, citra partis cujusdam membranosa in quadam corporis regione notabilem affectum, simul *celer*, *frequens* &c. Tales *pulsus cum duritie* semper *suspecti* esse solent. (3.) Si cum *pulsu laudabili*, hoc est, magno, vehementi, æquali, frequenti, *astu* plus minus *intenso*, tamen *summa virium prostratio*, aut *stupor*, aut *facultatum animalium defectus* se exerat. (4.) Si *urina* parum à naturali statu recesserit, aut *tenuior*, quàm morbi ægrive conditio requirat, fuerit, adeoque pertinaciter *cruda* extiterit. (5.) *Agrypnia pertinaces* sine manifesta causa. Forlan & (6.) huc pertinet, si *arida, scabra*, plus minus *squalida cutis* ægri fuerit, absque *vaporofo calore*, vel *blandi madoris* vestigio.

Talium adeoque malignarum febrium *malignitatis*, qua *spiritus* afflando quasi adedè pessundent, *ratio* à priori hætenus *imperfectibilis* extitit, ipsâ *spirituum naturâ* & existendi ratione nondum adedè exactè exploratâ. Sanè *contagia* magis *activa*, sive *spirituosiora* & *potentiora* in *vis* imprimis agere, præter modò dictas rationes, persuadet *imaginatio*, quæ non nisi *spirituum ministerio* peragitur, & tamen efficacissimè *contagiorum receptionem* promover.

Ex hætenus dictis lucem fœneratur, unde *astus* & *febrilis sanguinis ebullitio* ut plurimum *remissior* observari soleat in *febre maligna*, & vix unquam ad gradum *ardentium* assurgere, pessimo licet ægri statu. Unde notatu dignissimum est assertum *Sydenhami de meth. mod.* p. 43. quamvis *malignitatem*, quæ sanguinem adoritur *sine insigniori febrili ebullitione*, *periculosiorem* longè esse. Aut enim *spirituum* magis affectorum & quasi *syderatorum*, quàm *turbatorum humorum* est indicium: aut saltem in *humoribus* præsertim *sanguine* afe-



mentativis malignis miasmatis *confusionem*, & in *textura* & *motu intestino* eorum in *ordinationem* indicat. Unde natura quasi oppressa non potis est symptomata illa magis regularia exerere, quæ morbo competunt. Conf. etiam ejus (Sydenhami) *obs. de morb. acutis*, s. 5. c. 5. p. 362. sanè in istis malignis, quæ cum *excretionem cutanea* contingunt, v. g. *petechialibus*, *variolis*, *purpura* &c. Tantum abest, ut *astus* & *sanguinis ebullitio* gravioris morbi sit indicium, ut potius, modò non nimius fuerit, promoveat insigniter & separationem & excretionem producti illius morbofi, sub cute defixi: cum hi è contra periculosius habere soleant, in quibus deficit magis calor & æstuatio corporis febrilis; unde & parcius & tardiùs excretio talis cutanea procedere solet. Equidem *malignis febribus*, quæ ex *interna contentorum degeneratione* oriuntur, item in *Variolis*, *Morbillis* &c. & hinc etiam *febri acuta* languis effervescentia agitari solet; sed in *acutioribus*, *pestilentialibus*, *peste ipsa*, *spiritus influi* in primis affici, & quasi mortificari aut necròsi affici videntur.

*Fermentum* istud *malignum* quamcunque afficiat partem, nunc in *corpore humano* generatur, nunc aliunde ipsi communicatur. Multis equidem videtur dubium, an intra nos generetur malignum, & quasi ita venenum in nobis producat; quod tamen non nisi ex natura veneni non ritè intellecta originem duxit. Sed qui considerat varias, & subinde imperceptibiles, in corpore nostro *humorum alterationes*, secundum *res non naturales*, præsertim varia assumenda, & *præternaturales*, speciatim, in primis viis, & *multiplices miscelas* & per *medicamenta* quoque factas eorum *mutationes* & exinde *mirabiles texturas*, ac hinc *proprietas novas*, ac planè *singulares sapes*, is non dubitabit etiam *malignas febres* in specie & primis viis, suscitari posse. Nam & irati hominis morsus venenosus non absque ratione quibusdam putatur. Sic. v. g. *succus pancreaticus* & *felleus* naturaliter constituti tertium *temperatum succum* constituunt, quorum *alteratio*, præsertim pancreatico acriori aut acidiori existente, *bilis*, *aruginosa dicta*, plus minus *hostilis*, prout *acrior* sive *mitior* eadem fuerit, & ob pessima symptomata, quæ interdum inferre solet, plus minus *maligna* oritur. Sed tales ut plurimum *privata* sunt. Nam quæ ab *extra* communicatur *malignitas* aut *contagio*, aut *epidemicà quadam aeris* & *alimento*rum *alteratione* nobis insinuat, adeoque in plures simul observatur grassari.

Hinc observanda venit *Februm malignarum differentia*, à Lindano super Hartmann. insinuata. I. *Maligna simpliciter*, v. g. quando *nausea*, aut *tertiana continua*, vel *intermittens* suà naturà benignà, ex degeneratione causæ occasionalis sive fermenti febrilis, ex parte acrioris & subtilioris, pessima inferentis symptomata, facta est *maligna*. Sic *variola* nunc *benigna* nunc *maligne* observantur. II. *Maligna contagiosa*, v. g. *petechialis*, *febris castrensis* vel morbus

Hunga-



*Hungaricus*, quò ut plurimum etiam pertinent *Epidemica maligna*, III. *Pestilentes*, harum summus gradus. IV. *Pestis ipsa*, Rex morborum.

Quoad *malignas contagiosas*; fundamentum harum consistit in tali fermento maligno morbofo ( h. e. quod ob *acrimoniam malignam* summè activum, adeoque sui mediante intestino, quasi fermentativo motu, apta in materia, multiplicabile existit, ob *volatilem* verò & *spirituosam naturam spiritibus nostris* imprimis *communicabile*, & hinc absque activitatis impedimento, in distans quoque *diffusibile* & *summè penetrabile* est ) quod *aure* sive *odoris* instar, adeoque in minima mole *contentis nostris*, præsertim *spiritibus nostris* sociatum, assimilationis modo *se multiplicans*, *effluviis spirituosorum* medio longius in *distans*, vel per *aerem*, vel per alium quendam *fomitum*, aut etiam per ipsum cum corpore *ægri contactum* disseminatum, *spiritibus* sibi *symbolizantibus* se sociat, sicque etiam *sanum* inficit.

Nempe *contagium* istud videtur se imprimis associare *mumia nostra spiritali vitali*, hinc enim v. g. in *peste humana* homines, non verò bruta, & contra inficiuntur: magis itidem ab *ægris consanguinei* quàm alii affici solent. *Contagium* tale, quod *Aere* mediante se nobis insinuat, præterea sensibilibus afficere solet *stomachum* & *massam sanguineam*, *spiritusque* per *pulmones* circulos.

Quod afficiatur *stomachus*, ex eo patet, quod tales infecti, ubi aliàs nullam alterationem sentiunt, conqueruntur tamen de quadam *molestia in orificio ventriculi superiori*, quam molestiam sæpius sequitur *nausea*, quæ si superveniat, *bonum* est *signum*; Innuit enim *ventriculum* insurgentem contra malignitatem: Et sanè rectè dicit *Lindanus*, in constitutione *Epidemica* hoc esse observatum, neminem *nauseare*, nisi qui *placuisse* contagiosum suscepit. Hinc in quibusdam *febre maligna* mortuis *ventriculus aliteratus* & *Eschara*, tanquam à *vesicatorio* aut *caustico affectu* deprehensus fuit. Vid. *Barthol. cent. 3. hist. 68.* item *cent. 3. Epist. 42.* item *Helmont. de Peste*. *Contagium* autem afficit *stomachum*, quatenus *Aer* haustus *contagio* plus minus inquinatus & imprægnatus *salivam* inquinat, quæ per *gulam* descendens *ventriculum* inficit. Non enim possum consentire *Helmontio*, qui dicit *cribari aërem* per *pulmones* & *diaphragma*, & hinc ad *stomachi ambitum* pertingere. Sanè *Bartholinus in febb. malignis* locum *primario affectum* semper esse *stomachum* exinde concludere nititur.

Quoad *Febres epidemicas* malignis privatis, & quæ ex particulari contento- rum corporis, præsertim in primis viis, *dyscrasia*, & hinc *maligna volatili acrimonia* oriundis oppositas, hæ vel *vicio atmosphaera*, vel *vicio vitæ* generari, & his mediantibus in plures grassari solent. Quod si *contagii* simul accedat *violencia*, eò latius diffundere se solent. *Atmosphaeram* quidem multiplicia *effluvia* inquinant, vel ipsa nobis in se *hostilia*, & *maligna*, vel *mutuo halitu* & *associatione* nobis contraria facta, vel (quo inclinat *Hodges Tr. de peste Londinens.*



p. 39.) *spiritus nitro-aerei* alterativa & quasi corruptiva, quo minus ului vitali nobis amplius intervire queat. Sic *febrim malignam ex attractione aurae*, ex *ventilato frumento*, per aliquot annos quieto, obortam, notat *Rulandus de febr. Hungar. c. 8, p. 231.* Sic ex *fœtore paludum & rerum injectarum putrescentium febrim malignam pestilentialem* paucos ante annos Lugduni Batavorum natam notat *Helvetius in Diribitorio p. 65.* & sanè frequentissimam *febrim pestilentium* originem rerum talium corruptarum fracedines esse, jam diu observatum est, confer *Hamel. de affect. corporis p. 438.* ubi, quo modo tales fracedines febres pestilentes inducant. Unde & post magnas hominum strages, & corporum minus debite sepulcorum *putredinales exhalationes*, & in diuturnis obsidionibus, aut castris non mutatis, ex varia colluvie putrescente exhalantes *fracidi odores* epidemicas malignas suscitant febres. Ut nihil hîc dicam de *antris subterraneis*, antea diu clausis, apertis, de *terra motibus* &c. crebrius febres malignas comites trahentibus. Quoad *Vicius errata*, nihil notius est, quàm *famem sequi pestem*. Item esus alimentorum, præsertim carniū absque *sals condimento*: Item esus *carnium agrotantium*. Vid. *Borell. cent. 2. observat. 32.* Item potus *aquarum putridarum*, aut usus *fructuum horarum corruptorum*, à *maligna aura* afflatorum, facundæ matres *morborum*, speciatim *febrim malignarum epidemicarum* esse solent.

Cavenda autem in genere sedulò *fermenti maligni*, seu *causa*, febris malignæ, confusio cum *alterationibus sanguinis, aliorumve humorum, notabilioribus* in malignis febribus obviis, seu productis morbois, ut plurimum *spirituum insuorum*, prævia alteratione & affectione à fermento maligno indutis: hinc enim nec *sanguinis coagulatio* à *Willisio* asserta, nec ejusdem *nimia dissolutio*, quam *Sylvius* urget, ad *rationem* malignitatis formalem explicandam intervniunt; dum hæ alterationes *producta morbois mediata*, non secus ac *bubones* ac *carbunculi*, putandæ sunt, v. g. in ægto *variolis* aut *morbillis* correpto, & per totum corpus iisdem incrustato, non putandum est, extitisse in corpore tales sordes, quæ febrim induxerint, & postmodum sub cute depositæ *variolarum* pustulas saniem constituent, siquidem sanissimus subinde ex improvise iisdem copiosissimis obducitur: sed à *fermento maligno*, interdum sub forma *odoris contagiosi* hausto, & inquinante, & horum medio *humores afficiente* generantur ista in corpore, donec unâ cum multiplicato *fermento cōtagioso*, sed istorum humorū, licet alteratorum, mediò temperato & correcto secernantur, & circa glandulas intercutaneas defigantur. Par ratio *Petecharum*, *purpure*, *bubonum* & *anthracum* esse videtur. Sunt horum *colores rubri, lividi, nigri*, non à maligno fermento, plus minus caustico siye urinoso præcisè; sed à majori vel minori *mortificatione*

ficatione &  
oriantur, cu

Quoad  
pessimi læpe  
runt sympte  
est effatum  
tis: unde  
bere tempo  
rini enim  
feruntur.

Quod  
ed melius  
ferim in  
deterior.  
permanen  
recrudesc  
enorema  
certam per  
ria peccan  
Ad. Mec  
metuendu  
tem perse

Sura  
loissima,  
servavi: qu  
cubitus q  
materia pe  
ratis leiha  
appareant

Nar  
pnia, sine  
gis, quàm  
spina pecu  
bransis pa  
brachio au  
res applica  
Sin in  
ea carpum



fi catione & necrōsi humorum vel partium solidarum, ob suum extinctionem oriantur, cujuscunque etiam naturæ fermentum malignum fuerit.

Quoad *Prognosis*, omnes equidem febres malignæ periculosa sunt, & pessimi sæpe omnis; quò periculosiora tamen cum viribus debilitatis concurrunt symptomata, eò majus periculum portendunt. Interim verissimum est effatum Hippocratis, in acutis incertas esse prædictiones vitæ & mortis: unde & Galenus, malignas febres statuta ad judicandum non habere tempora assentit. Ideò prudens Medicus cautus sit in prognosi. Plurimi enim cum periculosissimis evadunt signis; alii cum salutaribus è medio auferuntur.

Quò magis equalis est pulsus, & consuetum eundemque tenorem servat, eò melius: inordinatus verò inaequalis, & quasi contractus, periculosus, præsertim in principio. Inprimis, quò major pulsus, eò melius; quò minor, eò deterior. Urina sanorum sunt simillima, vel etiam perturbata & crassa, tales permanentes malæ. Multi, coctionis signis in urina apparentibus, sed denuò recrudescentibus, sublati sunt è medio. Urina tamen cocta, laudabile habens enaorema, per aliquot dies continuans, & in sedimentum sensim abiens, salutem certam perpetuò pollicetur. Rarum est, quod cruda urina metastasin materię peccantis sive producti morboſi in morbis malignis felici eventu insinuet. Vid. Aët. Med. Haff. vol. 4. p. 156. Delirium si à somno compescatur, non est metuendum, inprimis si simul copioso conjunctum sit sudori: post somnum autem perseverans delirium admodum est periculosum.

Surditas, si vè potius obauditio in morborum acutorum principio periculosissima, circa statum verò apparens salutem portendit, id quod aliquoties observavi: quare, nondum determinatum est; forsan ad parotides glandulas decubitus quendam quasi criticum innuit, & successivam hinc discussionem materia peccantis; Siquidem & parotides tumores in febribus malignis & purpuratis lethales in augmento & statu morbi; si verò tantillum declinante morbo appareant, salutare.

Narium stillicidium semper malum signum est, præsertim si cum agrypnia, sine manifesta causa, ardore capitis, aut continuo magis, aut intenso magis, quàm reliqui corporis, facies simul rubore adfit: raro tales evadunt: nempe spina peculiaris, (fermentum malignum) capiti quodam in loco, aut ejus membranis partibus infixæ est, cujus occasione hæc symptomata. Hinc vesicatoria brachio aut cruribus admota, item raninarum sectio, aut hirudinum ponè aures applicatio subindè necessaria est.

Sin in vola manus æger sentiat tensiones, aut titillationes; item si circa carpum, dum pulsus tentat Medicus, tendines, etiam quietis digitis, mo-

verè



veri aut subsaltare videntur, *convulsionum* certò imminentium indicium est.

*Muscarum* venatio, aut *flocorum* collectio in malignis ferè semper *lethalis*: Rarissimè tales evadunt; cujus exemplum vide M. A. N. C. Ann. 3. p. 484.

*Tempus e-ventus acuti morbi* sive *februm malignarum*, quod attinet, in nostro climate à septimo usque ad 14. ferè suos terminos habent. Quoad *modum e-ventus*, ferè modò quasi *critico* judicantur, nempe *per sudores*: Quò pertinent *excretiones cutanea* pustularum, petechialium &c. nunc *per metastasi* producti nempe *morbosi*, à fermento quidem maligno geniti, ipsum tamen fermentum cicuratum & correctum in se continentis, ad loca glandulosa, unde *bubones*, *anthraces* &c. originem habent.

In CURA 1. *Fermentum malignum* appropriatis *alexipharmacis* dictis corrigendum, & per convenientes vias, speciatim *sudores*, evacuandum. 2. *Spiritus & humores* roborandi, ne tam facilè à fermento maligno alterari, sed hoc potius subigere queant. 3. *Symptomata*, tam ratione violentiæ *maligna*, quam ratione febris continuæ plus minus ardentis, *urgencia* mitiganda.

Nam quoad primum, modò vel *acre acidum volatile malignum* in humorib<sup>9</sup> correctū, vel odor, aut *fracedo venenosa* in spiritibus suscepta, alterata & extincta fuerit, quod superest, facilè ab hoste liberata *natura supplet*, dum spontaneo ductu per excretionem cutaneas, *bubonum*, *anthracum*, *pustularum*, *macularum*, *venenum*, correctum prius, & vehiculo serosi humoris involutum, excludit. Quoad secundum, modò *spiritus & humores* in sua naturali *crasi & constitutione* conserventur, sive præterea per *remedia* ipsis *sociabilia*, fermento autem maligno *hostilia*, tanquam quodam *balsamo* condiantur, quò *symbolizatio* aut *convenientia* eorum cum aliorum hominum *sanguine & spiritibus* hoc modo plus minus immutetur, & ita tam facilis *fermenti maligni*, præsertim *epidemi-ci* aut *contagiosi* susceptio impediatur, aut suscepti licet, *confermentatio* cum iisdem mutuaque earum *alteratio* ita præcavetur, in quo optima consistit præservatio, quin potius ita dispositi *spiritus & humores* vincere illud queant, h. e. *corrigere & temperare*, & hinc *excludere*, in quo curationis versatur cardo, res omnis de facili impediatur. Nempe, ut rectè *Paracelsus* tom. 3. operum fragmenti de peste hoc verum regimen præservativum asserit, *die virtutem attractivam stillens/ daß nichts ein läßt gehen* / h. est, ut interpretor, ita alterare corpus, ejusque contenta, ut inepta fiant ad *veneni* aut *contagii* susceptionem. Conf. idem *Paracels. de Peste lib. 2. cap. 3.*

Hisce modis nempe *fermentum malignum* corrigendo, vel *balsamicâ viminiæ naturam spiritualem* condiendo, operari videntur *Alexipharmaca*, ea-que pro sui varietate nunc saltim *alterutro*, nunc simul utroque modo. Rem-  
exem-

exemplis qui  
minerali reg  
Gracia abeg  
perquam lau  
fius sive odo  
montio teste  
& fracedine  
Concreta &  
ignis & O  
sorbent simi  
gnæ autore  
acre, & illu  
odor efficac  
& acre  
hui miscela  
lium acidi  
scendo se  
do textura  
magis, si  
siverint; q  
liorum o  
malium p  
non saltem  
mum salia  
phoresin ac  
ducunt.  
bedera, jun  
cinnaras cor  
net, præter  
diant con  
vim & a  
que intensi  
vinita defe  
in genere a  
Ut au  
sua, sunt e  
lia, ut &  
ner. unico  
partes dur  
Unicorn.



exemplis quibusdam illustrabo: Præ cæteris decantata sunt *sulphurea*, v. g. ex minerali regno *sulphur commune*: ejus usu *Hippocrates* pestem istam famolam Græciæ abegit, & *suffitus ejus* pro aeris emendatione, & pro potus medicatione, perquam laudatum existit, non secus ac *ejusdem in substantia usum*. Sanè *suffitus* sive odor *sulphuris*, ut quasvis *corruptiones & alterationes*, ipsamque, *Hellmontio* teste, *sanguinis putredinalem alterationem* præcavet; ita & simul odores & *fracedines malignas, contagiosas, pestilentes*, ignis instar tollit & extinguit. Concreta *gialia hæc*, debito & appropriato venenoso sive maligno habitu per ignis & *Qi* vim exhausta, in febribus malignis saturantur quasi denud, dum *absorbent* similem *malignum & venenosum halitum*, sive *fermentum*, febris malignæ autorem. *Terræ pingues*, temperando & absorbendo *fermentum malignum acre*, & illud ita corrigendo se exerunt. *Camphora* penetrantissima substantia & odor efficacissimus, & *balsami* instar condit corpus nostrum, etiam mortuum, & *acre* *sum* quodvis temperat, ita simul odorem *malignum & pestilentem* sui miscela alterat & enervat. *Aceta* qualibet, aut horum loco *succi vegetabilium acidi*, præsertim *curi*, item *clyssi mineral. sulphurei*, penetrando & permiscendo se undique certo modo alterant contenta corporis, & *firmiter* suo modo *texturam* eis conciliant, quo modo tum *præservatori* inserviunt, idque eò magis, si *alexipharmacis aromaticis* infusis *balsamicam vim* majorem acquisiverint; quam pro *vehiculo* plurium remediorum, præsertim *aromaticorum calidorum* optimè conducunt, quò etiam *vina generosa acidula* pertinent. *Animalium* partes duræ, C. C. *ustum*, *ungula alcis*, *lap. bezoar.* &c. absorbent non solum partibus animalium *hostile malignum & acre*, sed simul & potissimum *salia* eorundem *volatilia & crassi sanguinis* conservandæ, & per *diaphoresin* ac *diuresin* depurandæ, & ita suscepto maligno evacuando simul conducunt. *Alexipharmaca* cætera, *aromatica, amara* &c. v. g. *Zedoar, baccæ hedera, juniperi, lauri, angelica, myrrha, crocus* &c. exque his & similibus concinnatas *compositiones theriacales*, per *opium* imprimis animatas &c. quod attinet, præter *usum sudoriferum* modò laudatum, dum *ustum corporis* sui usu, mediante constitutione *resinosâ* (*Osâ*) intendunt, hoc ipso *sanguinis balsamicam vim & suum vigorem ac robur* conservare, *impetum* verò eorum, undecunque *intensorem factum*, societate *opii* debite refranare, ac contra *malignum virus* ita defendere, ostendunt, *acido* præsertim cum *vehiculo* usurpata. Sed hæc in genere de *alexipharmacis* delibasse sufficiat.

Ut autem in suas quasi classes redigantur remedia, malignis febribus opposita, sunt ea vel *fixa* vel *volatilia*. *Fixa* vel *mineralia* vel *animalia*: *Mineralia*, ut *diaph. bezoard. min.* qualibet. *diaph. Cinnabaris* *gii*, *terra miner. unicorn. fossil. corall. flor. sulphuris*, & *ata* &c. *Animalia* suggerunt partes duras, tam temperatas quàm ustas, ut C. C. vel *ebur*, cum vel sine *Δ*. *Unicorn. verum* *prepar. lap. animalium bezoardici, pulveres viperini* & similia.



*Volatilia* sunt vel *macra* sive *salina* ferè frigida, vel *aromatica* sive *oleosa*, ferè *amara calida*. *Macra* illa sunt *spiritus* & *salia volatilia urinosa*, C. C. *viper. urina*, liq. CC. *succin.* &c. Item *acetum*, *succus citri*: Nam tota *citrus* est *alexipharmaca*; *elysi sulphurei*, qui tamen magis in potu ulitati, *oleosa volatilia* sunt *camphora*, omnium optima, *zedoaria*, cent. min. card. ben. *scordium*, *allium*, *chelidon. maj.*, *helen.*, *vincetox.*, *Calendul.*, *crocus*, *Rob. junip.* & *sambuc.* item *olea destill.* ut *succini*, *citri*, *camphore*, exque his concinnatum *oleum pestilentielle* Henist. ol. destillat. C. C. *Tartari* &c. *Essent* & *spiritus theriacales* *camphorati*, vel *crocati*, *aceta bezoard.* *Tinctura bezoard.* &c. *Mediæ* quali naturæ est *Gelatina* C. C. item *semina expulsiua* dicta, *napi*, *citri*, *aquileg. card. bened.* &c. Ex modo dictis sexcenta alia concinnantur composita, v. g. *pulvis bezoard. Senn.* vel *D. Mich. rubens Pannon.* inprimis conveniens, ubi *fluxus alvi* simul adest, *pulvis Saxon.* quorum largissima seges hinc videatur apud omnes *Scriptores*. Pertinet huc *theriaca* & *Mulkridatium*, *Elect. de ovo*, *Confect. de Hyacinth.* & præ his temperatum magis *Diascord.*, *Fratrass.* & quod magis laudandum, à *Sylvio* correctum, quæ ipsa propter actuationis incrementum, quod inferunt, convenientissimè cum *vehiculo acido*, in specie *aceto*, propinquantur.

Pro remediis supra dictis indicationibus ritè applicandis observandum: I. Ad illud præfertim, quod magis urget, esse respiciendum: nempe *febris* nunc est *simpliciter maligna*, nunc *complicata* plus minus cum *febre ardente*; propterea attendendum simul ad *motum sanguinis fermentativum*, ejusque *ebullitionem febrilem*, & inde dependentem *astum*, *cephalalgiam* & alia symptomata *febris ardentibus* communia. Quò magis enim hîc urget, eò minus *alexipharmacis volatilibus oleosis* utendum est, quò minus verò eò tutius talia, præsertim in principio & augmento usurpari debent, id est, ut vulgo vocant, attendendum, an major *putredo febrilis* sive *effervescentia* in sanguine, an verò major *malignitas*: Nam, si prius, *alexipharmaca minus sulphurea* aut *oleosa*, sed magis *absorbentia*, aut *salia volatilia*, eaque subinde *blandis acidis* temperata usurpanda. Sin verò posterius, tutius generosiora etiam & actuationem corporis nonnihil intendentia *theriacalia* & similia usurpantur *alexipharmaca*.

II. Observandum, quia *februm malignarum* non semper, nec in omnibus una eademque est ratio, sed eadem variis se produnt symptomatibus, & nunc *continua*, nunc *intermittentes* videntur, *malignitatis* gradus etiam differunt; ita eas *curendi ratio* non simpliciter est eadem, sed pro varietate dictarum circumstantiarum subinde varianda sunt remedia. Sic illa *maligna febris*, quæ à *contagio* oritur; magis requirit *alexipharmaca* & *potentiora sudorifera*: quæ verò à *causa interna*, *humorum* nempe intus genita *maligna constitutione*, magis *temperantia*, *absorbendo alterantia*, & *successivâ diaphoresi resolventia*. Sic attendendum

dendum quod  
systema magis  
isora optatis  
fixa, acidis  
februm mali  
gnitati appropin  
Epidemica,  
III. In  
gio extrinse  
hæc nausea  
precordiorum  
cordia mor  
sive priva  
vetur, ut  
viserment

IV. C  
ptum, p  
quàm pur  
in talibus  
perniciosa  
instituta p  
item ubi  
urget effe  
calibus p  
mis vis o  
clysmata,  
cretio cutan  
bo, aut de  
incommod  
in febris  
succo citri  
quantitate  
plebit: Rec  
dum per al  
alum contra

V. Ob  
ad eod, qu  
deterius,  
trahendo



dendum quoque an *massa sanguinea*, an verò *spirituum animalium ac nervorum systema* magis affligantur. Posteriori n. in casu *volatiliora, subtiliora* ac *penetrantiora* optatis mista magis conducunt: priori verò in casu non nisi *volatiliora* aut *fixa, acidis blandis* subinde interpositis, conducunt. Item propter *specialem* febrium malignarum *differentiam* temper observandum, ut in specie huic malignitati appropriata opponantur *remedia*, ut in *Variolis, Petechiis, Dysenteria Epidemica, purpura* & similibus fieri debet.

III. In principio malignarum, si vel à *causa epidemica externa*, vel à *contagio extrinsecus hausto*, ortum fuerit malum, *Vomitoria* sunt optima: innuit hæc *nausea*, post susceptum contagium ordinariò insequens; vel *anxietates præcordiorum* vel præsentis, vel metuendæ ac imminentes; aut si alia circa *præcordia* molesta se offerant *symptomata*. Pariter conveniunt eadem *vomitoria*, si ex *privato contentorum vitio* febris maligna orta fuerit. Sed tempus observetur, ut maturè fiat, nempe in principio *antimonialia vomitoria* sunt optima, vi *fermenti maligni* collectivâ plus minus simul instructa.

IV. Observandum: nil *exitialis* est, & hominem *febre maligna* correptum, præsertim si intensior fuerit malignitas, citius ad interitum trahit, quàm *purgatio* in specie *superflua*. Uti enim nonnisi funesto omine *laxa* in talibus observatur *alvus*, & *Diarrhæa symptomatica* aut *colliquativa* perniciosæ admodum sunt in his febribus: ita quælibet etiam artificialiter instituta *purgatio*, idque in specie, ubi à *contagio* natum est malum, item ubi suspicio est, *cutaneam* affuturam *excretionem*, item ubi minus urget *effervescencia febrilis* ac *æstus*, quàm *malignitas* &c. Omnibus in his talibus *purgatio* quocunque in morbi tempore *vitanda*. Quod si *primis viis obstructis aperiendis* aliquid molendum necessarium sit, *blanda clysmata*, eaque *temperata* adhibeantur. Et hæc ipsa etiam ubi jam *excretio cutanea* se offert, nonnisi cautissimè applicanda. *Declinante* autem *morbo*, aut *devictâ perniciæ*, post quatuordecim dies &c. *blandè laxantia* non incommodè conveniunt. Siquidem externè, pro *primis viis abstergendis*, in febribus malignis necessarium videatur, hoc vel *serum lactis*, præsertim cum *succo citri* nonnihil acidulatum, vel *decoctum Tamarindorum julepis* in debita quantitate additum, vel *nitrum antimoniatum* in potu dissolutum optimè complebit: Rectè hæc dicit *Ballonius Phar. Med. p. 175.* in malignis potius alterandum per *alexipharmata*, quàm per *purgantia* evacuandum. Id quod observandum contra *Gallorum & Italorum* praxin.

V. Observandum. *Vena sectio* in malignis, qua talibus, locum non invenit, adeò ut, quò magis maligna sit febris, eò magis noceat *venæ sectio*, idque sit eò deterius, quò tardius instituitur. Quid enim prodest, sanguinem & trahendo *fores apertiores maligno fermento* pandere? Atque inprimis



<sup>1</sup> <sup>4</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup>  
*excretionē cutanea* aut ~~in~~ sunt ubi sperantur, minimè naturæ motus, venam secando, turbandus est, cum si illa refrigeratio ex sanguinis detractio-  
 ne noceat; cum æstus talium ægrorum, modò non sit excessivè nimia, excre-  
 tionē tales promoveat. Sanè multorum annorum Practicus B. D. Michaelis  
 nemini in febribus malignis venam secuit, plurimis funestorum experimentis  
 cautior factus. Sunt equidem, qui in Plethoricis venæ sectionem exanthematum  
 eruptionem promovere asserunt: sed hoc non nisi rarò evenit. Ubi tamen *mi-*  
*tior est malignitas*, adjuncta autem *febris ardens vehementior*, in *subjecto juvenili*;  
 in tali interdum, sed *mox à principio*, vel sub principio, venæ sectio cautè insti-  
 tuenda. Conf. hîc simul istæ circumstantiæ, quas insinuat Willis. Pharm. rat.  
 p. 2. p. 389.

VI. *Sudorifera* ergo primatum obtinent in cura malignarum, sed debitis  
 tamen determinata regulis. Quò major est *malignitas*, eò frequentius & co-  
 piofius provocandus est *sudor*, adeò, ut in *malignioribus* aut *pestilentialibus* ter  
 in 24 horis sint propinanda *sudorifera alexipharmaca*; Habenda tamen *virium*  
*ratio*, ne hæ ipsæ nimis exsolvantur. Ad hæc, ob nimiam feri exhaustionem, in-  
 que sanguinis ortam incrassationem, *nimia sudoris profusio* subinde *minus tuta*,  
 largiori potu refarcienda. Propter virium ergo istum defectum, post omnem  
 sudorem, ut etiam in ipso actu fluente *blandis acidulis*, sub *juleporum* vel *mistu-*  
*rarum* forma viribus prospiciatur; unde *acida urinosus* mista naribus admoven-  
 da, ut *vinum generosum*, *acetum cum aq. carbunc.* temperatum & c. *aq. apople-*  
*ctica cum succo citri* aut *aceto* diluta, quæ etiam sub ipso sudore cochlearis dosi  
 possunt propinari, vel *aceti theriacalis*, aut similis parum propinetur, v. g.

℞. Decocti citri ℥ j.

Syr. rub. idæi, q. s. pro grat. sapor. M.

Vel: ℞. Decoct. C. C. ℥ j.

succi ribium

granat. acid. an. ℥ j.

Dialcord. Fracast. ℥ ij.

Syr. rub. idæi ℥ ij.

℞ o dule. parum. M.

Et hujusmodi *mistura acidulata* cum *diascordio* præsertim locum invenit, quan-  
 do per *salia volatilia* paulò profusior sudor fuerit prolektus. In *sudoriferorum* usu  
 attendendum est, an corpus sit perspirabile, & an ad sudorem inclinet, vel non.  
 Si illud, tutius & potentiora propinari possunt *sudorifera*; si hoc, cautius & mi-  
 nora, ne turbetur magis & exagitetur massa sanguinea, interpositis ubique *blan-*  
*dis acidis*.

Sed *sudorifera* inter non levis delectus habendus est. Tutissima omnium  
 sunt *salia volatilia*, hinc *volatilia aromatica*; sed hæc ipsa saltem in principio  
 morbi



morbi & incremento conveniunt; in statu fixiora tutius usurpantur, idque præsertim in volatilibus sulphureis ac remediis theriacalibus observandum, ac nonnisi in principio & incremento morbi adhibeantur, ac ubi mitus urget aestus; periculum aliàs est, ne in statu novas turbas in massa sanguinea intensiorem æstum & ebullitionem, indeque varia capitis symptomata inferant. Vid. hîc elegans locus Ludovici in Pharm. p. 237. cum quibus conferantur loca parallelap. 243. 261. 280. 284. 328. &c. Nempe volatilia inter sudorifera, ubi febris paulò intensior fuerit, macra convenientius locum habent; ubi v. hæc febris remissior fuerit, oleosa seu aromatica adhiberi possunt. Et sicuti hæc aromatica propter æstuationes nimias & phlogoses circumspicere usurpanda; ita salia volatilia, propter nimiam sanguinis fusionem, & nimiam faciliè supervenientem hæmorrhagiam moderatè usurpanda. Vid. Aët. Med. Hæst. Vol. 4. p. 166. Nocumtis omnibus medentur interposita subinde analeptica blandè acida, nempe ex succis vegetabilium, in specie citro ac cydonis, item ex clysis mineralibus sulphureis; aut denique mistura cum paucis & dulc. Et in specie compositiones theriacales cum vehiculo acido propinata & melius ac tutius operantur. De Theriacis genuino usu vid. Septalius in animadv. l. 5. §. 53. p. 130. Post sudorifera talia volatilia in principio & augmento aliquoties repetita fixiora animalia aut fixiora usurpanda & continuanda erunt. Camphorata alexipharmaca & sudorifera sunt optima; quæ præter vim veneni correctivam simul aliqualem vim æmulum quasi fixativam obtinent; unde præsertim in inquietudinibus, vigilis ac metu delirii conveniunt, quando & vigilias & deliria ipsa compescunt. Sed propter volatilem penetrantiam non semper excessivè usurpentur, præsertim quorum vel caput debilius est, ut eruditi aut delicatiores fœminæ, aut etiam quibus aliàs horrida aut inimica existit. Alias in propriè dictis malignis, præsertim contagiosis, inter alexipharmaca nunquam intermittenda.

VII. De Opiatis apertum est Horstii judicium in jud. de Chirurg. infusor. p. 83. In febribus malignis quibuscunque opiata utramque faciunt paginam; unde & opium tam insigniter extollit & quibusvis compositionibus alexipharmacis addendum suadet Ludovici in Pharm. p. 276. Sicut etiam Verulamius in hist. vit. & mortis p. 96. §. 21. opiatorum eximium usum in febribus malignis prædicat. Nempe egregium sudoriferum est opium. Spiritus quoque, ne tam citò resolvantur, quasi coërcet, & graviora in malignis symptomata mitigat; unde optimo cum consilio istud in magna dosi Veteres Theriaca & Muhratio addiderunt. Conveniunt autem inprimis in augmento morbi, dum ad statum properat, vel cum sudoriferis propinata; ut sic melius proliciatur sudor, præsertim ubi anxii & inquieti sunt agri; vel etiam post sudores cum julepis & misturis propinentur, ut quasi roboretur nonnihil denuò, ac quietior fiat æger. Notabile est, quod hæmorrhagia in malignis subinde periculosa opii usu fuerint coërcitæ.



Conf. *Timaeus* in *Cas.* p. 378. Item *Horst. obs. lib. 1. p. 18.* Moderni vel laudatum opiatum, vel essentiam opii, aut hujus loco essentiam theriacalem usurpant. Ex Veterum compositionibus excellit *theriaca*, praesertim cum *vehiculo acido* propinatum. g. cum *aceto rosaceo*, ne nimium æstum in sanguine excitet; propter quam causam, nempe æstum, ejus loco *Diascordium Fracastor.* seu temperatum magis adhibetur, in specie in alvi, aliisque excretionibus praternaturalibus.

VIII. Observandum *Vesicatoria ex cantharidibus* &c. sunt egregia in febribus malignis: conveniunt autem in principio status in primis, dum vel graviora praesertim capitis & facultatis animalis imminet aut urgent symptomata, ut *Cephalalgia nimia, deliria, convulsiones*; item ubi *soporosi* imminet affectus, adeoque ubi suspicio est, ne vel fermentum malignum magis spiritus animales & genus nervosum afficiat, vel quacunque ex causa raptus sanguinis aliorumque contentorum ad caput fiat; item ubi interiora uruntur, exteriora verò frigent: item quando naturam aliquam excretionem moliri, erumpentibus hinc inde maculis, à doloris sensu in quadam parte suspicio est; vel quando facta jam excretio, quacunque ex causa denuò retrocesserit. In talibus casibus optimè *cruribus*, supra vel infra genu, vel *brachiis*, prope carpos, aut prope axillas, tandem etiam circa *nucham*, sed hoc vix, nisi in affectibus *soporosis*, aut ubi jam aliis in partibus applicata fuerint, *vesicatoria* applicantur. Sanè talibus in casibus, tam in benignis, quam malignis conducunt, idque eò magis in his, quod ~~parcior~~ *parcior* sudor aut *diaphoresis* in iisdem non rarò observatur. Arbitror, quod in *miasmate maligno evocando*, mediante spirituum ad locum dolentem concitato impetu, singulare quid obtineant: Hinc enim & *bubonibus* aliisque tumoribus, ut melius erumpant, optimo consilio applicantur: Hinc & febres intermittentes sui applicatione subinde tollunt. Remedia inter *vescantia* optima sunt vel *Emplastrum vesicatorium in Pharm. Augustan.* vel *emplastrum* istud *vesicator. Schröderi.*

IX. Observandum: Sollicitus sit Medicus in cura ægri febre maligna correpti, præcipuè circa tria hæc: nempe oculos, linguam & manus: Oculos quidem ut possit judicare de futuro delirio, quando nempe sunt ignei & quasi fulgidi, aut quando adfectus eorum est paulò ferocior, delirium imminet: Linguam verò consideret, ac fauces, ut cognoscat, an immineat *prunella* vel *faucium* excoarctatio & ulceratio, aut alia similia pathemata: Manus verò ut cognoscat, an convulsiones sint metuendæ.

X. Obs. Quoad *Dietam* in febribus malignis observandam, tenuis hæc sit necesse est, & cum sæpius summè fastidiant alimentorum odorem, nullo modo ad eundem cogendi sunt; quin juscula aut similia abundè, licet in parca quoque dosi, sufficiant. Potus sit vel *cerevisia* secundaria, vel etiam aqua simpliciter,



pliciter, cum parte tertia vel dimidio vini temperata, & infuso *pomo citri* in taleo-  
las inciso, vel *succo citri expresso* medicata, quin etiam *Gelatina C. C.* recens pa-  
rata largiter cum potu isto partim scopo *analeptico*, partim scopo *alexipharma-*  
*co* admisceri potest, vel *decoctum citri Myrsicht*, additâ *Gelatin. C. C.* conve-  
nientissimus in malignis est potus. *Vinum generosum acidum* non nocet in mali-  
gnis, quin moderato usu remedii confortantis vices subeat. Nec inconveniens  
est, *fumo sulphuris* medicari potum quemvis ordinarium, cum tale sulphuris  
gas ad extinguendam malignitatem, & condiendos balsamica vi humores mirè  
conducatur; cujus loco etiam *clysti antimonialia*, *sulphurei* moderatâ dosi cuius  
ordinario potui utilissimè instillari possunt. Quem potum sulphurandi & *cly-*  
*fos* hos proficuos præparandi modum vid. in *Cnöffel*. elegantissimo scripto, *Me-*  
*thod. med. febres epidemicas*. Aliàs & *⚪ iatum* à *℥j.* ad *℥ij.* in Mens. j. potus  
ordinarii dissolutum, nisi vel alvi liberior fluxus, vel stomachi nauseabundi imbe-  
cillitas obstiterit, commodè dissolvi potest.

[Poma & pocula febrilia *Cnöffeli* vid. in Append. ad Ann. 6 & 7. N. C. p. 178.]  
His ita præmissis, quoad *remediorum formas* in *febris malignis* magis usita-  
tas sint v. g. tales, nempe in *principio & incremento*, præmissis præmittendis :

*℞.* aq. flor. sambuc.

card. ben. an. *℥℥.*

liq. C. C. succin. *℥j.* vel hujus loco

sal volatil. viper. *℥j.*

syr. card. bened. *℥℥.* M. pro dosi, capiatur expectando

blandum sudorem. Vel more communi *℞.* *Tinctura bezoard.* ritè paratæ  
*℥℥.* ad *℥j.* in quocunque vehiculo, stomacho vacuo, expectando sudorem.

*Vel:* *℞.* aq. scord.

flor. sambuc. an. *℥j℥.*

C. C. f. *Δ.*

*⚪.* diaph. an. *℥j.* ad *℥℥.*

sal. volatil. C. C. gr. xv.

succin. gr. vj.

syr. card. ben. *℥j.* M. F. Potus pro 3. dosib. expectando

blandum sudorem, cui ubi gravius urgent symptomata, commodè & *laud.*  
*opiat. gr. ℥℥.* potest addi. *Vel* cui *mistura theriacalis* placet :

*℞.* aq. scabios.

flor. sambuc. an. *℥j℥.*

acet. rutac. *℥vj.*

theriac. *℥ij.*

*⚪* diaph. *℥j.* vel *℥℥.*

bezoard.



bezoard. min. gr. xv.

syr. rub. idæi ℥vj. M. pro 3. dosib.

Vel: ℥. aq. flor. sambuc. ℥iij.

acer. sambuc. ℥ss. ad ℥vj.

theriac. ℥ij.

⚄ diaph. ℥ss. ad ℥ij.

syr. card. bened. ℥ij. M. pro 2. dos. pro eliciendo sudore.

Item ℥. Unicorn. ver. prepar.

⚄ diaph.

Cinnabar. ⚄ij.

⊖ volat. viper. vel. C. C. ana gr. viij.

M. F. ⚄. pro 1. dosi.

Quod si *Theriaca* minùs conveniat, ℥. ejus loco *Diascord. Fragast.* v. g.

℥. aq. scabios. ℥iijss.

succ. citr. rec. ℥vj.

*Diascord. Fragast.* ℥ij.

⚄ diaph. ℥ss.

camphor. gr. iv.

syr. car. bened. ℥ss. M. pro 2. dosib.

*In progressu morbi, & ubi volatilia, in specie sulphurea, cautiùs usurpanda veniunt:*

℥. Antimon. diaph. ⊖ss.

ebor. s. Δ gr. xv.

sal volat. C. C. gr. v. M. F. pulv. pro 1. dosi, cujus vehiculum sit.

℥. aq. flor. sambuc.

scabios. an. ℥j.

syr. papav. alb. ℥vj.

card. bened. ℥iij M. de quo capiatur pro lubitu.

Item: ℥. C. C. s. Δ. gr. xv.

Cinnabar. antimonii ⊖ss.

bezoard. Qar. gr. vj. M. F. pulv. pro 1. dosi.

Quod si *Diarrhea* forsan sit juncta:

℥. C. C. usti ⊖j.

bol. armen. ⊖ss. M. pro 1. dos.

Vel: ℥. aq. fl. sambuc. ℥iij.

spir. theriac. simpl. vel camph. ℥iij.

C. C. s. igne. ⊖j. vel usti ℥ss.

terr. sigill. ⊖j.

syr. acetos. citr. ℥ss. M.

Porro:



Porro: ℞. aq. scord. ℥ij.

spir. theriac. camph. ℥ij.

C. C. l. Δ ℥β.

bezoard. min. ℥j.

syr. papav. alb. ℥β. ad ℥vj. M. pro 2. Dos.

Commodè hujusmodi misturis etiam *myrrha* potest addi, nisi saporem æger nauseat. Quod si *convulsiones* imminere velint,

℞. pulv. bezoard. D. Michael. ℥j.

Cinnab. antimonii gr. xv.

sal. volat. C. C. ℥β. M. pro 2. dos.

*Rosencruzerus* in specie hunc pulverem, ex tribus salibus ex tribus regnis desumptum laudat:

℞. sal. card. bened. ℥β.

bezoard. min. gr. vj.

sal. volat. C. C. gr. iij. M. pro dos.

In graviore malignitate:

℞. Antimon. diaph. ℥j.

Cinnab. Antimon. ℥β.

camph. gr. v. M. pro dos.

Quod si pro scopo *expellendi semina expulsiua* adhibere sit animus, hoc fiat ad imitationem *Zuvelfferi*, *Pharm. Reg. p. 209.*

℞. cort. citr. flav. recent. ℥ij.

sem. citr. ℥j.

card. bened.

aquileg. an. ℥jβ.

myrrh. elect. ℥β.

amygd. d. ℥j.

contundantur in mortario, & c. l. q. aq. scord. & scorzon. F. Emuls. ad ℥iij. vel v. M. edulcoretur parùm. Detur.

Juxta hæc remedia *diaphoretica* in & post sudorem subindè *mistura blanda acido-confortativa* adhibendæ sunt: v. g. post decoctum citri *Mynsicht*. supra insinuaturn, *julepus* ex decocto citri cum rad. scorzon. quem habet *Febr. de scorzonera p. 61.*

[℞. pomor. citri recent. num. 2.

Incide cum corticibus in taleolastenuēs. adde

saccharialbissimi ℥ij.

rad. Scorzon. mund. ℥ij. vel iij.

aq. font. ℥β. vj.

coq. ad tertias & colentur.]

℞℞

Vel:



Vel: *zulepus* ex decocto citri, cum quo *Tinctura rosar.* elicienda, ad imitar. *Ti-*  
*lemanni de materia Medica* p. 9.

[*℞. pomorum citrinum. ij.* In taleolas secta conspergantur  
saccharo albo, coq. in aq. quartariis 3. ad remanentiam Mensur. 8. Colatura  
frigida datur sola; vel etiam cum ea & *succo citri Tinctura rosarum* extrahitur.]

Vel: *℞. decoct. rad. scorzon. cum CC. ℥. j.*

succi rub. idæi ℥ij.

citr. ℥j.

Gelatin. CC. recent. ℥j. ad ℥jss.

syr. acetos. citr. q. s. pro grat. sapor. M.

Vel: *℞. aq. fontan. ℥. j.*

Gelatin. CC. ℥ij.

syr. rubi idæi ℥jss.

papav. alb. ℥j.

spir. nitr. dulc. ℥j. vel q. s. pro gratia sapor. M.

Quibus placet, etiam *decoctum Tamarindorum* usurpare possunt, quando nem-  
pe alvus non nihil liberanda venit, v. g.

*℞. Decoct. Tamarind. cum passul. ℥. j.*

syr. rub. idæi.

acetos. citr. an. ℥j.

spir. nitr. dulc. parum. M. D. S.

Hæc de *malignis in genere*. Variant autem eadem in specie, pro adjunctorum  
symptomatum inprimis varietate. Sic quando in *febre maligna* hinc inde se ma-  
nifestant *macule* corporis cutim tingentes, propriè

## P E T E C H I Æ

& *Febris Petechialis* dicta, Germanis *das Flecken-Steber*/præ aliis frequens;  
Aliàs etiam *febris pulicaris*, *febris lenticularis*, *peticularis* item *puncticularis* & c.  
dicta: Ubi inprimis observandum est, sæpius quidem in *morbis malignis* erum-  
pere *maculas*, quæ *febrim petechialem* constituunt; non tamen præcisè, sunt si-  
gna pathognomonica febris malignæ, cum in aliis febrib<sup>9</sup>, non præcisè malignis,  
tales subinde appareant. Sic interdum in *tertianis* sub fine paroxysmi subinde *ma-*  
*culis* coloratur corpus ante sudorem, quæ post sudorem evanescent, utut non  
adsit febris maligna. Ita in *Scorbutis* subinde *rubicundis maculis* tingitur cutis,  
utut ægril de malignitate possint conqueri. *Febres* pariter *scorbutica* hoc ha-  
bent singulare, ut *macule* pulicum puncturis similes, subinde citra malignitatem  
efflorescant.

In *febris malignis petechialibus* ægri inprimis conqueruntur de *lassitudine*,  
& dolore contundente totius corporis, vires simul mox insigniter prostrata, fe-  
bri



*bri* nihilominus *miti* adhuc existente: Nam calor non adeo *vehemens* est in toto corpore, minusque mordax, quam in *ardente* etiam *mitiore*: ferè tamen *vespertino* tempore intendi observatur; imò interdum in principio tam *mitis* est, ut æger vix se ægrotare sentiat. Hinc superveniunt *graves & continua cephalalgia*, *agrypnia*, *anxietates* & *jectigationes* ægrotorum; in principio faciliè sudant, in progressu *difficilius*, in statu ferè *nunquam*. Subinde *alvi fluxus* variorum *spumoso*rum, ut plurimum *foetidissimorum excretorum* supervenit, quæ omnia & aliis *malignis* sunt *communis*: Saltem, quod *maculæ* raro *quarto*, sæpius circa *septimum* erumpere soleant, præsertim circa *pectus & scapulas*; hinc & *abdomen*, & *crura*: tandem etiam *brachia* iisdem tinguntur; *facies* ordinariò *libera* esse solet. *Maculæ* hæ non solum *externas partes* affligere solent, teste *Castro*, de *Peste* p. 76. Interdum non *maculæ* solum, sed etiam *vibices* in his febribus apparent. Vid. *Major. Dissert. de Chirurg. Infus.* p. 260. *Deliria* quoque & *convulsiones* frequentissimè in statu superveniunt, quo tempore etiam in morbo *salubri* & multò magis in *declinatione*, quasi *pyralismus* quidam, h. e. copiosa *salivæ*, *mucosæ*, eaque *continua* ex ore & faucibus cum *inopetenti* ægri excreatio. *Continua* ferè esse solet hæc *febris*; hinc rarum est, *intermittentem* eandem fuisse observatam à *Fehr. De Scorzonera* p. 72.

Confundi solent interdum *pulicæ morsus* cum ejusmodi *maculis pulicaribus* febrium. Ut *distinguantur* melius, *notandum*, quod *pulicæ morsus* seu *macula* in centro sui habeant *punctum ruberrimum*, morsus vestigium, quod deficit in *petechiis*: Præterea *pulicæ morsus* appositâ *farinâ lupinorum* cum *aceto* aut *oxymelle* subacta statim evanescent; *pestifera* verò sive *petechiæ* nequaquam, autore *Zacut. Lusit.* l. 3. *prax. admir. obs.* 14. *Maculæ* hæ in morbo *salubri* intense *rubent*, hinc pedetentim *palescunt*, *flavescent*, sicque evanescent; & quod magis *rubicundæ* sunt, eò *melioris* sunt *notæ*: e contra quæ ex *rubore* *livescunt*, seu ut aliàs loquuntur, *plumbei coloris* sunt, vel quæ *nigrescunt*, à *Belgis* *Pyperforis* dictæ, hæ ipsæ *pestimæ* sunt, ac quod *magistales*, eò *deterioris* sunt *conditionis*: Nempe quod *major* est *virulentia malignitatis*, indeque *superficie* cutis *major* vel *minor* *mortificatio*, eò etiam calor *magis* vel *minus lividus* ac *nigricans* esse solet. *Mortificatio* hæc in *extinctione* sive *destructione* us in finem consistit, quo *vegeto* *rubent* *partes cutaneæ affectæ*, *deficiente* eodem ad *nigredinem* vergunt, ut in *Gangrena* ac *Sphacelo* notum est; Unde & *Petechiæ* veluti *inusta escharam* simul inducentes observatæ fuerunt, vid. *M. A. N. C. An.* 6. p. 148.

*Petechiales* hæ *febres* ferè *primitus* ex *corruptela interna contentorum* oriuntur, adeoque *magis massam sanguineam* aliosque *humores*, quam *spiritus* *virulentia* suâ afficiunt: *contagiosæ* tamen admodum sunt, ipso tamen *contagio* minus *spirituoso* minusque *activo* existente, quasi *latere aliquandiu* queat, antequam se *exerant*. Interdum *epidemicè* grassari observantur. Vid. *Fehr. de Scorzonera* p. 72.



Quoad *Prognosin*. *Febris petechialis*, quò magis blanditur, eò magis nocet: sæpe cum omnia pacata apparent, mors imminet; sæpe morti vicini præter expectationem evadunt. Aliàs *periculosus valde est morbus*. *Macula copiose* die septimo, 10. 11. 12. &c. prorumpentes, eaque *lata, rubra* live sanguinea, in primis præcedentibus aliquilibus *coctionis signis*, bona sunt: è contra *lata, livida, cærulea*, plus minus *nigricantes* *pesima*, cum *virium debilitate* magnum periculum portendunt, *malignitatis mortificantis* indices. *Macula pauca*, febre magis ingravescente & *urina cruda* existente ferè *lethales*. *Macula*, quæ subito *disparent* aut *recurrunt* periculosissimæ. Quò magis cum *macularum eruptione coctionis signa* apparent, eò *melius*. *Hæmorrhagia parca* suspecta: *larga* in incremento, die critico aut indicatorio erumpens, *bona*; post *maculas* verò jam *efflorescentes* perquam *suspecta*: *Excrementa alvi nigra, sævida, periculosa*.

Quoad *tempus eventus*, minus quàm aliæ malignæ *acuta* esse solent, *lenè* sua tempora percurrunt, ita ut *in statim* sex, octo & plures dies in eodem tenore persistent ægri, antequam vel in *melius*, vel in *deterius* fiat mutatio.

Quoad *modum eventus*: Qui morbum non negligunt, & statim sub initium utuntur remediis commodis, facillè liberantur, nonnunquam 11. 12. aut 14to die; qui verò curationem differunt, & aërem liberum non devitant, *diutius decumbunt*, sæpius *succumbunt*. Interim tamen, si omnia ritè procedant, nec vires adeò sint prostratæ, ferè *intra 14. dies*, acutorum more, cessant. *Solvitur* equidem interdum per *criticam hæmorrhagiam narium*, vel *sudationem*, vel *urinam*, quod tamen rarò apud nos contingit; quin successivè apud nos per *diaphoresin aut tam* evanescere soleat. Interdum etiam *Metastasi producti morbo* si *live materia cocta* in quendam locum finitur; Sic per *apostema in testibus* febrem petechialem terminari aliquoties observavit *Rolsinckius*.

Quoad *Curam* *adem indicationes* atque supra circa *malignas in genere* insinuatæ fuerunt, etiam hîc variant; saltim observentur:

I. *Vomitiva* in *petechialibus* præ aliis malignis maximè *proficua* esse; cum mox à priori principio *graves anxietates* soleantprehendere ægros, quas curare, earum incrementum præcavere, & ita longè quietiores reddere possumus ægros, propinatio maturè *vomitório*. *Purgatio*, nisi in primo principio, ferè *nocet*, cum aliàs ad *Diarrheam* de facili proclives sint *petechiales*.

II. *Vena sectio* nullius usus est, cum *febris ipsa* minoris sit conditionis, magisque urgeat *malignitas*: Et *lethalem* etiam esse docet *Forest. in Schol. obs.* 36. l. 6. *noctivam* verò ostendunt *Aët. Med. Hæstn. vol. 2. p. 290.*

III. *Sudorifera* ergo primatum ducunt, speciatim in principio & incremento, dum adhuc sudare possunt, ac solent ægri, unde sub isto tempore *volatilia*, in specie

Vid. Fracastor.  
l. 3. d. mm. 9. tag. 36. l. 6.  
c. 6. p. m. 23.  
seq.



specie *theriacalia* tutissimè adhibentur. In *progressu* verò *morbi ac statu fixioribus* saltem indulgendum, devictâ jam prioribus malignitatis atrocità, jamque quod reliquum est, naturâ operante. Quod si gravior sit malignitas, ad minimum ter in 24. horis porrigenda sunt remedia. *Sudor* autem non excitetur nimis; quin vitium semper habeatur ratio, propter quem respectum nec linteis nimis vel stragulis opprimendus est æger, sed tolerabiliter saltem contegendus.

IV. Apparentibus jam *petechiis*, abstinendum non solum est à fortiter laxantibus, sed etiam *clysmata* cautè, nec nisi *blanda*, atque non, nisi *necessitate urgente* injicienda. Quod si *maculis* jam apparentibus superveniat fortè *alvi fluor*, cautè tractandus, & non adeò subito supprimendus, nisi *copia* excelescit, quod *natura* evacuationem sensilem molitur, idque præsertim, si *affectus* non tam ex *contagio*, quàm *interno contentorum spontaneo vitio* ac corruptela originem duxerit; ita tamen regatur, ut *macularum expulsio*, quantum possibile, promoveatur, non verò ab isto *alvi fluore* cohibeatur.

V. Si ulla est *febris*, in qua *vesicatoria* conveniunt, est in primis *Petechialis*, speciatim, quando retrocesserint *maculae*; rarò enim aut nunquam denuò apparere solent, sed vel supervenientibus *nervosi generis symptomatibus*, nempe *deliriis & convulsionibus*, ægri intereunt, vel successivè per *auctam diaphoresin* saltem, morbus solvitur. Ut ergo ancipiti tali in casu ægrum levemus, item si aliàs *graviora nervosi generis symptomata* immineant; ut ordinatio in *statu* harum febrium affolet fieri, *consultissimum* est, maturè applicare *vesicatoria* in pedibus ac brachiis, prout plus minus urgent symptomata. Vid. *Sanctor. in method. vitandor. error. p. 841. M. A. N. C. Anno 2. p. 315.*

VI. Quoad *Diatam*, in æquali calore naturali conservandi sunt ægri, *vinum* in primis moderato usu conducibile est his ægris. Sic enim *Henric. ab Heer. obs. 5.* refert, mulierem in *febre petechiali* pro desperata habitam, *vini usu* restitutam. Conf. etiam *Bartholin. cent. 6. hist. 7. Febr. de Scorzon. p. 173.*

Quoad *remedia ipsa*, nil peculiare, quod non supra *de febribus petechialibus* in genere dictum fuerit, monendum occurrit. Saltem in principio magis *sudoriferis*, præsertim *volatilibus*, in statu verò *fixioribus*, *blandè temperantibus* & *absorbentibus* magis utendum. Hinc in principio

℞. C. C. f. Δ

antimon. diaph. an ʒj.

sal. volatil. C. C. gr. xij. M. F. pulv. pro 2. dos.

Vel: ℞. aq. cord. Herc. Saxon. ʒj.

Tinctur. bezoard. ʒij. ad ʒj.

Spir. C. C. essent. ʒj.

Syr. de scorzon. ʒij M. D.

S. Herz und Schwef. Brand auf 1. mahl.

Zz 3

Item;



*Item aliquoties in principio & incremento proficuam expertus sum hanc potionem:*

℞. aq. flor. sambuci ℥ij. vel iij.  
acet. sambuc. ℥℥.  
Theriac. ℥ij.  
℞ diaph. ℥ij.  
syr. card. ben. ℥ij. M.

Aliquando septem in una domo *pestilentialibus febribus* corripiebantur, in specie duæ ancillæ, his præscripti, præmisso vomitorio:

℞. theriac. ℥ij.  
℞ diaph. ℥℥.  
sal. absinth. ℥j.

cum s. q. syr. acetos. citr. F. Bolus pro 2. dos. quarum una quæque capiatur in cochleati acet vini, unde *copiosus* emanavit *sudor*. Una illarum actu patiebatur menses, quæ sine nocumento hunc *bolum* recepit. Hoc præmisso, postmodum creberrimo usu hujus *Electuarii*, die nocteque illud capiendo, ac sæpius repetendo, ac *sudorem* tubinde expectando convaluerunt:

℞. conserv. pulp. citr. ℥j℥.  
Diascord. *Fracast.* ℥℥.  
℞ diaph. ℥j℥.

c. s. q. succi citr. F. *Electuar.*

postmodum verò *in & prope statum* convenienter usurpari potest, quod

℞. aq. flor. sambuci ℥ij.  
ceras. nigr. ℥j.  
spir. vini camph. ℥iij.  
C.C. s. Δ. ℥ij.  
bezoard. min. ℥j.  
sal. volat. succin. gr. ix.  
syr. flor. tunic. ℥℥. ad ℥vj. M. capiendo vel per 3. dos. vel cochleatim.

*Item:*

℞. aq. scabios.  
menth. an. ℥j℥.  
Gelatin. C.C. recent. ℥j.  
℞ diaph. gr. xv.  
syr. Card. bened. ℥℥. M.  
pro 3. dos.

*Item loco Julepi nocturni:*

℞. Decoct. rad. Scorzonæ. cum CC. ℥j.  
succu citr. recent. ℥j.

Diascord.



Diascord. Fracast. ℥ij.

antimon. diaph. ℥j.

syr. card. bened. ℥jss. M. capiendo pro lubitu.

Item, cum plures simul ægrotent, pro remedio sæpius capiendo :

℥. Decoct. lign. saffra. ℥jss.

succ. citr. ℥iij.

Diascord. Fracast. ℥iij.

antimon. diaph. ℥jss.

bezoard. min. ℥ss.

syr. flor. tunic. ℥jss. M. capiatur sæpius pro lubitu.

In statu, dum summa urserit virum prolatio, sequens potest usurpari potio :

℥. aq. scabios. ℥jss.

cord. Herc. Saxon. ℥vj.

cinam. ℥iij.

confect. alk. ℥j.

bezoard. Oar. ℥j.

syr. rub. idæi. ℥ss. M. capiatur pro lubitu.

Quoad externa, ubi stomachi urgeant symptomata, commodè in malignis scutum stomachale potest præscribi :

℥. Cerat. stomach. de ladan.

Theriac. Androm. an. q. l.

Malaxata inducantur super alutam.

Vel: ℥. Gummi Tacamahac. part. ij.

cerat. stomach. part. j.

liquefacta etiam subigantur largiter cum theriac. Andr. q. l. &amp; applicetur.

Sunt, qui epithemata fronti, præcordiis applicare solent, sed malè. Quia enim de facili refrigerantur, clausuræ pororum occasionem suggerunt, &amp; ita petechiarum eruptionem impediunt, aut eas facilius retrocedere faciunt, v. g.

℥. ol. scorpion. compos. Matth. ℥j.

destillat. meliss.

rutæ

citrian. ℥ss.

M. pro linimento : scrobiculo cordis &amp; pulsui applicando; vel idem cum oleo Nucis Moschata express. M. in forma balsami.

Veteres in usu habuerunt lium externum, quando petechiales aut similes excretaiones cutanea convenienter prodire nolunt; instituerunt frictions sive inunctionem externam cum nitro.

℥. ol.



℞. ol. amygd. amar. ℥ij.

vini Rhenani ℥vj.

aq. chamæm. ℥℞.

nit. ℥ij.

Bulliant ad consumptionem aquæ, & F. transcolatio. Colatura toti corpori afflicta; in specie dorso ad evocandum virus malignum in febribus malignis & petechialibus, præsertim quando non bene procedere vult sudor.

## VARIOLÆ & MORBILLI.

Huc etiam referuntur, quæ tamen sunt saltem symptomata febris continua, sive synochi sui generis, nunc benigna, nunc, & quidem sæpius maligna.

Earum historia ita se habet: Prægresso horrore plus minus insensit, insequitur astus intensus, gravitas totius corporis, cephalalgia insignis, dorsi, præsertim lumborum dolor, cum pulsatione in spina, oculi tumidi & subrubentes & quasi lachrymantes, tussis sicca, rænædo, faucium dolor, pulsus celer, frequens, vehemens, durus, plus minus magnus vel parvus prout mos febris est. Urina sanorum non dissimilis; Natura nempe ad ambitum corporis serum imprimis propellente; interdum tamen turbida est, quod magnum contentorum ebullitionem & agitationem significat: interdum alba cum sedimento fursuraceo apparere solet. Respiratio nonnihil difficilis, vomitus, nunc verò saltem inanis vomendi conatus, hæmorrhagia narium, subinde admodum copiosa, occasione nempe sanguinis nimium ebullientis & ferventis concitata; in principio morbi levioris spæ reddens, in statu verò morbum longiorem vel funesti eventus innuens. Egri sunt inquieti, agrypni, deliria, & imprimis convulsiones Epileptica satis frequentes; diarrhæa subinde ægros corripit, interdum Diabetes, & miclus cruentus ægros fatigant.

Hæc & similia symptomata ægros vexant plus minus, donec tertia & quarta die macula rubra apparere incipiant: quibus ritè & copiosè prodeuntibus ferè mitigari solent quælibet prædicta symptomata: Macula istæ nunc simpliciter tales sunt, ita manent, ac sensim post aliquot dies evanescent, ac Morbilli appellantur; nunc successivè in pustulas rubras elevantur, quæ albescent pedetentim in centro, cum circulo ambiente purpureo, livido, & c. ubiq; in medio tum in pus abeunt, hinc in crustas & squamas; tandem decidunt, atque hæ Variolæ dicuntur.

Macula tales potissimum ac primitus in facie ac manibus apparent, hinc & reliquis in partibus, quæ tumide omnino fiunt, ac quasi tumore ex phlegmone & œdemate misto affliguntur, præsertim caput. Sub suppuratione ista non rarum est, quod ulcera gravia variis in locis relinquunt, ipsaque ossa carie afficiantur; in specie malè, aut non ritè expulsa variola, indeque per metastasin ad internam quandam partem delatæ, successivè mille mala, pro partium affectarum

varietate,

varietate, inf  
post se que  
talogum vid.

Multipl  
nerto de febb  
morillos ter  
nunc sociata

Ann. 3. p. 37

Afficiu

internis eac

aliquæ, ac i

servavit Ba

monibus v

tereunt ag

vel fluxu d

Febre

maligna: c

verà in sang

puratio, &

purat à rec

rupti sui vel

tando sepa

mentationi

flammation

Non d

peccant in pr

acida convu

urina cruen

variolas rel

morbis infa

præcipitatu

tusses sicca

pham impr

Acidu

ranem, san

pus mutat

cutim, pr

illud acidu



varietate, inferunt, aded ut non arbitrer, esse vel reperiri morbum, qui tot mala post se queat trahere atque *Variola & Morbilli* non bene judicata, quorum Catalogum vid. in *Fehr. de scorzoner. it. Schenck. in obs. l. 6.*

*Multiplures* autem solent esse *Variola & Morbilli*, prout videre est in *Senerto de febb.* ubi de *Variolis*. Hinc & *Schenck. l. 6. observ.* præter variolas & morbillos tertium pustularum genus *Crystallinum* refert. Affligunt nunc solitariè, nunc sociata petechiis prodeunt, aut hæ post variolas sequuntur. vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 378.*

Afficiuntur autem in *Variolis & Morbillis* non solum partes externæ, sed & internis eadem copiosè insidere solent. vid. *Parvus l. de variol. c. 2. it. Schenck.* alique, ac in specie *pulmonibus* non leve periculum ab iis imminet, ut rectè observavit *Barthol. cent. 3. epist. 38.* ac *Kerkring. spicileg. obs. 62.* refert puerum, pulmonibus variolis repletis, subito suffocatum. Unde qui *variolis aut morbillis* intereunt ægri, vel suffocati intereunt, vel ex convulsionibus epilepticis moriuntur, vel fluxu dysenterico interimuntur.

*Fehris variolarum ac morbillorum* nunc est benigna, nunc, idque sapius, maligna: omnes homines, in specie infantes, iisdem corripuntur. Radicem reverà in sanguine obtinent fundatam, estque totus morbus tantum sanguinis depuratio, & quasi despumatio, mediante fermentatione febrili, quâ sanguis se depurat à recrementis lactis matris aut nutricis vitiat, & plus minus ab acido corrupti sui vestigia in sanguine relinquentis: Unde talia inquinamenta, fermentando separata, unâ cum sanguine, tunc simul corrupto, præcipitantur per fermentationis modum, & intra cutem defiguntur, ubi acrimoniâ suâ parvulas inflammationes & tandem harum suppuraciones inferunt.

Non differunt *Variola & Morbilli*, quam secundum magis & minus, ac peccant in primis particula fermentativa, lactis acore corrupta, à qua acrimonia acida convulsiones partium nervosarum, dolores lancinantes, dorsi, dysenteria, urina cruenta, ulcera & aded ossium caries & phthisis pulmonalis non raro post variolas relicta. Confer de acido acri primariò in variolis peccante *Sylvium de morbis infant. cap. 9.* Acidum illud, uti effervesceat in primis cum sanguine, donec præcipitetur, ita excitatum simul lympham inquinat singulariter, cujus ratione tusses sicca, rancedines, oculi lachrymantes, &c. Oculos vexant, de quo lympham imprimis affectam esse vid. in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 302.*

Acidum illud ita ex sanguine secretum, ac in pustulas congestum intercutaneas, sanguinem in parvis, quas acrimoniâ suâ excitant, inflammationculis in pus mutat per præcipitationem  $\Delta$ is sanguinis ab acido. Idem illud acre rodit cutem, pruritus infert, & fibris ejus profundius erosus cicatrices efficit. Acre illud acidum nunc volatilis & acrius existens, malignitatem sic dictam comi-



tem secum trahit. Cum adeoque tantum non omnes homines afficiantur *Variolis & Morbillis*, idque ferè semel, (undè rarum est, mulierem septies variolas passam, tandem 118. ætatis anno hoc morbo periisse, teste *Borello*, cent. 3. obs. 10.) Sanè probabilissimum videtur, eas causam occasionalem altius in sanguine radicatas habere, non quidem ex vitio sanguinis menstrui matris, quæ sententia fuit Arabum, sed ut *sulpicor*, & di lactis nutritivi corrupti reliquis. Hinc enim earum cum *achoribus & favis*, & ipsis ex lactis vitio ferè nascentibus convenientia. Propter hanc in sanguine fundatam originem, consanguinei in specie mutuo afficiuntur, ut *D. D. Michaël* plura retulit exempla; quod frater in Italia eodem tempore laboraverit *variolis* aut *morbillis*, quò alter eodem morbo laboraverit in Germaniâ, adeò ut longa etiam intervalla pertingat hæc inter consanguineos conspiratio. Novi tres *Nobiles*, quorum duo adulti *Gissa* studiorum gratia morabantur; tertius cum sororculis domi degebat, sed cum hic tertius cum sororibus laboraret *Variolis*, isti duo *Gissa* simul iisdem correpti moriebantur, ut tunc temporis nil aliàs ibid. de *Variolis* innotuisset: Sic *Studiosus* natione *Lipsiensis Wuteberga* corripitur *variolis*, & eodem tempore soror ipsius gemella iisdem *Lipsia* ex improviso corripitur, imò gravida sanè enititur puerum *variolis* correptum, cum antea filio ex *variolis* ægotante sedulo assedisset, referente hoc *Morison*, de morbis mulierum p. 66. Aliàs non rarum est, mulieres gravidas *variolis* correptas & fœtum similiter iisdem afflictum peperisse, vid. *Bartholin*. Centur. 2. Epist. pag. 681.

*Seminarium* autem illud fermentativum in sanguine delitescens non nisi accedente causâ externâ, speciatim certâ aëris alteratione in actum deducitur; unde sæpè *Epidemica* existunt. Non tamen putandum, præexistisse in corpore sano tot & tantas sordes, quæ postmodum in ambitum corporis copiosissime sæpe detruduntur; sed fermentum acidum, fermentando se multiplicans, ex naturalibus nutritivis corporis contentis eas generat. Unde quò magis quis est *cacochymicus*, sive cuius sanguis alterabilis magis existit, eò copiosioribus iisdem afficitur. Unde nec *Rabiosi* ab iisdem sunt immunes, uti observavit *Febr. de scorzonera* p. 78. it. *Henr. ab Heer*. obs. 6.

Inutiliter dubitatur: An Veteribus Græcis eadem etiam fuerint cognita: Nam sunt, qui per Græcorum *ecthymata* variolas, per *exanthemata* morbillos intelligunt. Vid. *Parvus de Variol.* cap. 1. Sed res præcisè determinari nequit, cum *ἐξανθήματα* & *ἐκθύματα* Græcis vox generalis & universalis sit, quamvis in cute efflorescentiam denotans. Vid. *Castrum*; *Qua ex quibus*, lib. 3. c. 14. 15. 16. pag. 187. 197. 201. Sanè, utut *Essentiâ Variola & Morbilli* convenire videantur, differunt tamen hæ ipsæ, pro ætatum, nationum, aliarumque rerum non naturalium varietate diversimodè: Sic enim morbilli

morbilli in  
Vid. Thierm  
bre, variolas  
febrem acuta  
Indias primit  
Item Riveri  
riodica obse  
tes variolæ e  
dem Variol  
Hafniens, q  
ram vid. in  
nè peculiar  
pag. 30.  
dam, qui a  
quem aatu  
laborare,  
tiam inno  
neque disp  
gè dolere so  
erant. C  
in M. A. N.  
A. N. C. A.  
cent. 5, hist  
Quo  
confertim e  
tura robur  
mata remit  
cientem ex  
bo Gallico  
Macule p  
de morb. a  
magnæ, p  
propinqu  
cidunt.  
Mala  
quæ haben  
similes;  
re, & in



*morbilli* in Italia & Hispania periculosiores, quàm *Variola*, quæ in Germaniâ. Vid. *Thiermeyer consil. lib. 1. pag. 88.* Sic *Morbillos* in Gallia semper cum febre, *variolas* vero sine febre esse observatur, cum contra in Germania semper febrem acutam comitentur, eamque ferè graviolem *variola*. Sic *variolas* in Indias primum Hispanos intulisse vid. *Schenck. de fermento pag. 468. & seqq.* Item *Riverii Prax.* ubi de *Variolis*. In Islandia vigesimo quovis anno periodica observantur *Variola*, teste *Bartholin. cent. 3. Epist. pag. 390.* Frequenter *variola* esse solent in Japonia. Vid. *Ast. Soc. Reg. volum. 1. pag. 825.* Eadem *Variola* in Æthiopibus, distincta à *Variolis* Coropæis. Vid. *Ast. Med. Hafniens. volum. 2. pag. 235.* Unde & mirabilem earum ab Æthiopibus curam vid. in *Miscell. A. N. C. Ann. 8. pag. 116.* Sic *morbilli* Amboinenses planè peculiare observati à *Saar*, in den Ost-Indischen Kriegs-Diensten / pag. 30. Nec minus curiosum est, quòd *D. Michaël* aliquando curavit quendam, qui ab altera parte corporis *morbillis*, ab altera vero *variolis* erat affectus, quem natura ita mirabiliter in duas quasi partes diviserat. Adultos gravius laborare, & difficilius ferre *variolas ac morbillos* quam *pueros*, per experientiam innouit. Densior nempe adutorum cutis, & firmior ejus textura, neque dispositioni materiæ adeò apta est, & sub suppuratione sensibilibus longè dolere solet. Maligniores etiam *variola* frequenter *verminosa* observatæ fuisse dolere solet. Maligniores etiam *variola* frequenter *verminosa* observatæ fuerunt. Conf. *M. A. N. C. Ann. 8. p. 143.* & sudorem *verminosum* in *Variolis* erunt. Conf. *M. A. N. C. Ann. 6. pag. 8.* *Vermiculos* post *variolas* cum ☐a rejectos vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 44.* item *Vermes* in *Variolis*, *Rhod. cent. 3. obs. 64.* *Barthol. cent. 5. hist. 20.*

Quoad *Prognosin*, melius est *Variolas & Morbillos* citò quam tardè, confestim quàm successivè erumpere. Materia enim inobedientiam & naturæ robur ostendit. Post eruptas *variolas & morbillos* febris & symptomata remittere debent: Sin minus, res periculosa est. Aut enim insufficientem expulsiõnem, aut defectum virium ostendit. Quorum parentes morbo Gallico laborarunt, gravius laborant *Variolis*, teste *Horstio, observ. p. 308.* *Macule purpureæ* an in *Variolis* mortis prænuucia, observat *Sydenham observ. de morb. acut. p. 180.* *Variola* meliores sunt citò albescentes cum circulo rubro, magnæ, plures, molles, acuminatæ, rotundæ, disjunctæ & sine continuitate propinquæ; quæ loca externa & ignobiliora occupant, facilè maturantur & decidunt.

Mala sunt *variola*, vel ipsæ discolores ad livorem declinantes, aut saltem, quæ habent circulum lividum, violaceum, aut nigricantem, dura & verrucis similes; depressa admodum periculosa, uti &, si antea acuminatæ subsistere, & in medio sui foveolam acquirere incipiant, item in quorum medio







vehementer sitiunt, intusq; continenter anguntur, prompreque refrigescunt bullæ, detumescantq; morbilli variolæve, glauco livore pallescunt, tunc ægri capulo propinquant: Hoc enim caloris nativi extincti argumentum est. Interdum hæc pustula, licet non statim jugulent ægrum, tamen quia vel malè curatæ, vel quia partem quandam nobiliorem gravius læserint, diuturna vel lethalia inducunt symptomata.

In Cura (1.) Fermentum acre acidum temperandum. (2.) correctum per diaphoresin, naturâ monstrante viam, ejiciendum. (3.) Symptomata urgentia mitiganda. (4.) læso partium vel imminens præcavenda, vel facta restituenda.

Pro his scopis ritè obtinendis observetur:

I. Distinguendum esse tempus ebullitionis & tempus excretionis, sive expulsionis. Illud est, quamdiu effervescentia febrilis Massæ sanguineæ depuratoria viget: Hoc, quando excretio cutanea incipit probeque procedit. Tempus ebullitionis sive Massæ sanguineæ despumationis ut plurimum primis 4. diebus absolvitur; excretionis vero à tertia vel quarta die per 7. subsequentes ad 11. protrahitur, quo tempore etiam ferè maturescunt, ut circa 13. diem curatio absoluta sit. Nempe hæc ut plurimum fiunt ita, interim pro circumstantiarum varietate subindè variolæ non præcisè tertia aut quarta, sed etiam 7. vel 8. etiam 20. erumpentes die observatæ: Sicut variolæ jam desperatæ etiam post 17. diem demum suppuratæ notantur in *M. A. N. C. Ann. 8. p. 141.* Sicut ex variolis retrocedentibus affectus singularis convulsus, qui post 2. menses, redeuntibus demum variolis, demum evanuit. vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 380.* His ipsis temporibus ritè distinctis magna pars curæ innuitur: nam nec ebullitio nimis evehenda, nec nimis suppressenda. Conf. *Sydenham. Meth. med. febres p. 97.* Nec expulsio variolarum nimis provocanda, teste eodem in *observ. de morb. acut. p. 193. 177.* Sed in principio, ubi pustularum elementa nondum comparent, haud protinus ad expellentia dilabendum, sed naturæ conatus ita expectandus, ut interim porrigimus talia, quæ non tantum primordia morbifici fermenti compescere ac mitigare, sed etiam quæ corruptioni sanguinis à malignis miasmatis perficiendæ obstaculum ponere possunt. Dum vero erumpunt, sive jam eruperunt variolæ, symptomatis urgentibus, pro re nata Medicus debet prospicere. Magnâ tamen in hoc cautione opus est, ne, dum exiguis consulimus, magnâ pharmacorum molestrâ naturæ opus turberetur. Etenim toto hoc tempore una & continua est ebullitio febrilis, quare nil temerè movendum erit.

II. Semper post sanatas variolas corpus purgandum est, sanguisq; purificandus, ne hincindè hærentes reliquæ acido & sæ, mille mala inferant: pro quo scopo & dulcis præ cæteris excellit. Sed an in principio purgandum quaeritur? Equidem variolis & morbillis, quâ talibus nil conferunt purgationes,



quatenus tamen subindè corpus cocochymicum est, aut *prima via* sordibus obseſſe, ne supervenientia exindè varia symptomata naturæ motum turbent, *blandissimum* primas vias *abſtergens*, cautè tamen, & laltim *primo in principio* propinetur, ne occasio detur periculo isti, quod ex *alvi fluxibus* in variolis imminet; adeoque vel *blandum laxans passulatum* conducit, ad imitationem *Horſtii*, *observ. anat. 27. vel §. dulcis* parca doſi propinetur, ac appropriatum contra variolas remedium, vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 13. & 97.* Sanè cùm ante hoc triennium variolæ populariter graſſarentur inter infantes, ad hujus loci imitationem omnibus, quibus suspicio forſan imminentium variolarum aderat, mox in primo principio *Mercurium dulc.* dedi, pro ætatis ratione, grano uno vel altero præter propter annorum numerum transcendens, v. g. infanti trium annorum dedi *gr. iij. 4. annorum v. vel vi.* interdum pro ſtimulo granulo *pulveris jalapæ* addito. *Pulvis* hic nunc *ſolarius*, nunc sub regimine *conſerv. roſar.* in principio primo datus, nunc vomitum & aliquot ſecefſus, nunc alterutrum ſolum provocavit, & ferè ſemper felicem eventum appropriatis remediis adhibitis obſervavi. Sed in progreſſu morbi: item ubi puſtulæ plus minus eruperint, à quolibet tantillum alvum ſtimulante, etiam leviffimo clyſmate aut ſuppoſitorio ſtudioſè abſtinendum, nec, niſi ſummâ urgente neceſſitate, alterutrum eorum uſurpandum, vid. *Miſcell. Largii app. de Morbill. §. 97. & ſeq.*

III. In variolis & morbillis *Sanguis mittendus* haud venit. In noſtro climate nil prodeſt, ſed naturæ motum turbando multum nocere valet. Interim tamen in principio, in adultis plethoricis, aut habitioribus vena aperta haud adeò nocere ſolet, præſertim cùm ſubinde inſtituenda veniat in caſu, quo de variolis nondum adhuc eſt ſuſpicio, ſed in primo fiat principio. Dum enim jam apparere incipiunt puſtulæ, periculoſiſſimum, modo non lethale, exiſtimo, venam aperire. Hoc tamen non obſtat, quin in aliis regionibus, aliis in caſibus, ſubinde ante, aut etiam poſt puſtularum eruptionem vena ſalubriter ſecta fuerit, exemplo tamen apud nos non imitando. vid. *Ballon. Pharoſ Medicor. 179. 185. Horſtius in operib. med. in obſervat. pag. 39. lib. 1. obſerv.* item *Filius Horſtii in obſerv. anat. pag. 23. & 24. Septalius in animadv. pag. 111.*

I V. *Opiata* in variolis & morbillis per quam proficua ſunt, debitis cum catitelis adhibita, quas vide in *Miſcell. A. N. C. Ann. 8. p. 115.* cùm pro mitigandis urgentioribus ſymptomatis, & promovenda excretionē cutanea, proſiſtendo alvi fluxu, & præcavendis nervoſi generis ſymptomatis multum conferant, in ſpecie veſperi exhibita. Ad hæc ab eorum uſu in faciei & manuum intumeſcentia, quam inſignem in hoc morbo natura habet, evacuatio rectius procedit, dictuſque tumor eorum ope ad debitum naturæ terminum pertrahitur,



hitur, ut loquitur *Sydenham observ. p. 203.* Hinc puer in variolis per 5. dies ex abusu Syr. papaveris innocuè dormiit. vid. *M. A. N. C. Ann. 8. p. 114.* unde infantibus gr. j. vel alterum theriacæ, adultis laudani opii concisam dosin commode propinare possumus.

V. Sanatione peractâ interroget medicus clientes, an in partibus quibusdam, præsertim in pectore, aut abdomine, aut cavitatum harum visceribus sentiant aliqua symptomata, & tunc partilæ sæ maturè succurratur. *Post variolas enim non sufficienter expulsas sive excretas* facile ægri in phthisin incidunt, aut pleuritidem, aut diuturnum periculosumque alvi fluxum.

VI. In variolis & morbillis *Aër studiosissime cavendus*, quin potius in locò tepido sive moderatè calido ægri afferendi, & debitis stragulis custodiendi sunt. Ne tamen quid nimis in hoc puncto. Passim in hoc erratur, dum ægri in locis nimis calidis custodiuntur, atque copiosis stragulis tantum non suffocantur, id quod subinde admodum est nocivum. Ut hoc regimen fiat ritè tempore ebullitionis, obser vetur æstus in ægro febrilis, qui si excedat, nullò modò per integumenta, aliisve modis est intendendus; è contra si est debiliior, aut saltem videatur minor, quàm qui sufficiat secernendæ & expellendæ materiæ Variolarum, integumentis aliisque modis est augendus. Quod si medius fuerit æstus, ita ut nec excedat, nec deficiat, sed sufficiens videatur pro excretionem variolarum, & morbillorum in mediocri calore sustentandi sunt ægri. Quæ regulæ in quibusvis febribus cum excretionem cutaneâ junctis probè observandæ. *Conf. Horst. obs. anat. p. 25. Sydenham passim in ejusdem method. item in observ.*

*Diætâ* tenuis in primis convenit his ægris, præsertim ebullitionis tempore, ne impediatur naturæ motus. *Lentium decoctum* eorumque esus à quibusdam in his affectibus laudatur, sed sine fundamento. *Vinum* nocet his ægris vid. *Febr. de scorzon. p. 87.* [Vinum, aut, semper noxium est, etiam rubrum]

Quoad *Remedia* duobus scopis prioribus satisfacienda, eadem sunt vel generalia, *absorbentia & volatilia*: vel *specificis magis*, variolis & morbillis imprimis convenientia. *Absorbentia & volatilia* simul & acre acidum temperant, & per diaphoresin auctam illud ejici faciunt. Sed *illa fixiora* magis temperant, *Volatilia* magis sudorem & urinam movent. *Illâ* potius conducunt, ubi circa primas vias urgent symptomata: *hac* ubi acrius & volatilius peccaverit acidum, adeoq; graviora præsertim nervosi generis symptomata inferat, ut inquietudines, convulsiones, &c. *Illâ* magis tempore ebullitionis, *hac* excretionis conducunt, dum difficilem aut tardam eruptionem admodum promonent. *Illâ* magis conveniunt, ubi primarum viarum urgent symptomata, *hac* ubi pectoris aut pulmonum metuantur à variolis mala. Remedia *Fixiora* sunt *unicorn. fossil. & diaphor. Cinnabaris antimoni, corallia.* item *C. C. sine igne, unicorni verum.* Item *semina*



*semina expulſiva iſta ſpeciatiſſime variolis & morbillis dicata. Volatilia autem ſunt quælibet Volatilia Oſa, ſpeciatiſſime ſal volatile C.C. viper. & in infantum variolis nunquam ſatis laudatus liquor ſuccinatus.*

His iſſis pro urgentium Symptomatum ratione & opiata, ut ſupra monitum, quolibet morbi tempore, poſſunt ſociari. *Specialia* magis remedia, *myrrha, caſtoreum*, horumque eſſentiæ cum V<sup>q</sup> lato præparata: it, *Tinctura* q̄ bene acis: it, *ſtercora animalium*; *crocus, ficus, milium*, & inter externa *ſuccinum*, Myrrha optimum eſt præſervativum, & curativum variolarum, balfamica vi alterationem horum à fermento maligno inhibens, adeoque ne copioſè nimis affligant, præſervans, quod pariter & de Caſtoreo verum. *D. Languis* habebat eſſentiam, anodynam ex *Caſtoreo* & *aſâ foetida* cum *Tinct. tartari* pararam, quâ in præſervandis & curandis his affectibus plura præſtitit. De *Croco* refert *Lipſius de Variolis*, eum mirabilem eſſe in expulſione variolarum & morbillorum, dolorem ſedando, & venenoſitati reſiſtendo. Inter *ſtercora animalium* excellit *ſtercus equinum*, in forma noduli potui inſuſum, aut etiam cum cerevitiâ calida *ſuccus expreſſus*, & exhibitus ſcopis omnibus in variolatum & morbillarum cura ſatisfacit, & in ſpecie ab angina ac pleuritide ac cognatis in variolis periculofis malis præſervat: In ſpecie *ſtercus ovillum* tanquam inſallibile ad variolas deprædicatur remedium. *Dyſby Recept. part. I. pag. 69.* Sicut ad morbillos ſingulare experimentum eſt *ſtercus caprinum* in potu datum, mirabiliter ſimul expellens. *Ficum decoctum* ad expellendas has puſtolas, & temperandam eorundem acrimoniam, multum laudatur. *Foreſt. l. 6. obſerv. inquit.* Morbilli adeo paſſim graſſabantur, ut vix puer aliquis in urbe ab illis immunis eſſet, omnibus autem qui decocto ficum in cerevitiâ utebantur, facile foras expellebantur. Hinc etiam decoctum ficum *Myſ.* contra variolas in uſu eſt. *Sed obſervetur*, quod hoc interdum alvum laxare ſoleat, quod merito his in morbis ſuſpectum; præcaveatur hoc, ſi decoctum patetur *mili cum ficibus* ad imitationem *Sala in Append. Mirotech. p. 825.* Cum decoctum milii per ſe egregium admodum his ſit in affectibus.

Quoad *Succini* externum uſum, curioſa eſt obſervatio, quam refert *Reckerus de Cultrivoro Pruſſiaco p. 48.* Cum ante biennium Variolæ hic eſſent epidemiales, virgunculæ cuidam in principio morbi ante earundem eruptionem brachialia ex ſuccino parata carpo circumpoſita fuere. Cumque à ſiniſtra manu deciderent ſape, dextra verò ſemper admotæ manerent, variolarum inimenſæ copię ibid. loci prorupere, ita ut non ſine moleſtia ardorem illarum ferre coacta fuerit. Cum his confer ea, quæ quoad *ſuccinum* habet *Helmont. in Tumulo Peſtis p. 881.*

Ex his variæ fieri poſſunt formulæ, v. g.

℞ ꝑ. diaphor.

C.C.ſ



- C.C. f. Δ. an. gr. xv.  
myrrh. ℥℥. M. pro 2. dof.
- Item præmisso præsertim usu ℥ii dulcis,  
℥. C.C. sine igne ℥j.  
myrrh. gr. vj.  
theriac. gr. ij. M.D. pro 2. dof. infanti;
- Item ℥. C.C. sine igne  
unicorn. fossil. an. ℥j.  
℥ volat. C.C. ℥℥. M. pro 2. dof.
- Vel ℥. Aq. scorzoner.  
scabios. an. ℥j℥.  
℥ diaph. ℥℥.  
C.C. sine igne ℥j.  
℥ volat. viper. gr. xv.  
syr. flor. calend. ℥j. M. pro 3. dof.
- Item ℥. Sem. napi  
aquileg.  
Carduiben. an. ℥j.  
c. f. q. aq. scabios. F. Emulsio; adde  
bezoard. miner.  
C.C. sine igne  
unicorn. fossil. an. gr. xv. M. Edulcoretur parum;
- Vel ℥. Unicorn. ver. præp. ℥℥.  
Cinnabar. ℥ij. gr. xij. vel xv.  
℥ volat. C.C. gr. vj. M. pro 2. dof.
- Vel ℥. ℥ diaph. ℥j.  
Cinnabar. ℥ij. ℥℥.  
myrrh. gr. vj. M. pro 1. vel 2. dof.
- Facit huc ℥, quem admodum laudat Joël in praxi;  
℥. C.C. sine igne gr. xv.  
bezoard. Olar. ℥℥.  
℥ volat. C.C. gr. v.  
laud. op. gr. ℥. M. pro 1. dof. Vel in forma liquida;  
℥. Aq. scabios. ℥j℥.  
Essent. myrrh. ℥j.  
C.C. sine igne ℥j.  
bezoard. min. ℥℥.  
laud. opiat. ferment. gr. ℥. vel 1.  
syr. Card. ben. ℥ij. M.



Convenienter quoque in principio salia fixa, in progressu & tempore ebullitionis *salia volatilia* usurpari possunt. Hinc

℞. Ebur. sine igne ℥ss.

℥ diaph.

myrrh. an. gr. vj.

℞ Card. bened. gr. vij. pro 1. dos.

Circa statum & dum remittunt symptomata, & copiose jam pustulae efflorescunt

℞. Tinctura ℞i acris

essent. myrrh. an. ℥ij. Mf. dentur adulto 50. vel 60.

gutt. ter in die, infanti 20. vel 30.

Vel ℞. Tinctura ℥ij

Essent. myrrh. an. q. v. Mf. D. bis vel ter in die.

pro circumstantia aegri:

Aliquando cum recessissent morbilli, & varia effecissent symptomata:

℞. ℥ diaph. ℥j.

Cinnabar. ℥ii ℥ss.

℞ volat. C.C. gr. xij.

Camph. gr. ij. M. pro 2. dos.

Item in puella decenni variolis afflictâ, quæ sine suppuratione incipiebant evanescere, cum fluxu alvi, & hujus pedes jam ad genua usque cum dolore livescabant. Hinc

℞. ℥ diaphor. ℞r. gr. xv.

Castor.

myrrh. an. gr. iiij.

Camph. gr. j. M. D. in duplo.

Quem semel cum aliquoties summisset, alvo suppressa, variolæ denuo apparuerunt, sicque evasit.

Puero 13, annorum tribus diebus gravi corporis aestu, vomitu continuo, & incipiente diarrhæa afflicto, in suspitione variolarum cum in vicinis locis observarentur: ℞. Extr. theriac. gr. v.

laudat. opiat. ferment. gr. j. ℞.

M. F. Pilul. N. xij. pro 2. dos.

à prima dosi omnis vomitus & angustia cessarunt. Hinc

℞. ℥ bezoard. compos.

specif. cephal. an. ℥j. M. pro 2. dosib.

Hinc copiosissime erupuerunt variolæ. Potui infundebatur *sercus equorum*, ejusque succus permiscebatur.

Puer unius anni cum semisse, cum alii fratres morbillis correpti, decumberent ex improvviso, à meridie cum gravi stertore incalescere admodum & debilitari capit

capit. Er  
tungen Xij  
Cum mal  
decumbente

Hujus  
helandi cess  
tione & iv  
ob id acin  
tem sensu  
Puer  
& simul d

Sym  
vel post e  
quando ve  
catus fuit  
gulariter  
conveniun  
mius fuer  
bus curan  
nempe hu  
invicem ag  
Vigilia, a  
morbi pri



capit. Er hat sehr geröchelt / und sey ihm ein Stuch Fluß gefallen / habe sehr kurzen Athem / und setze sehr.

Cum malum hoc ex imminentibus variolis esse suspicaretur, cum alii fratres una decumbentes graviter tussirent:

℞. ∇. flor. sambuc. ℥j.

liq. C.C. succin. ℥j.

syr. papav. albi ℥ij. M.

Hujus usu copiosissimi proruperunt morbilli, & stertor & difficultas anhelandi cessarunt. Nempe ex imperu lymphæ acrioris & hinc inimica vellicatione & irritatione faucium, laryngis & pulmonum, malum ortum fuerat, ob id acrimonia suspecta maligna erat corrigenda per volatilia; irritationis autem sensus sopiendus per papaverina.

Puero aliquot annorum ex variolis gravi difficultate respirationis laboranti, & simul diarrhæa correpto in statu morbi:

℞. Aq. scabios. ℥ij.

terr. sigill. ℥j.

syr. è succo scabios. ℥vj. M. capiat pro lubitu.

It. Infantibus in Morbillis diarrhæa affectis.

℞. ∇. menth.

flor. sambuc. an. ℥j.

Gelat. CC. ℥vj.

succi cydon. ℥j.

terr. sigill. ℥j.

℞ diaph. ℥j.

syr. de toto citr. ℥j. M.

propter infantes est grati saporis.

**Symptomata** in his morbis mitiganda sunt vel ante eruptionem, vel post eruptionem. 1. *Anxietates precordiorum & jectigationes*, quas,

quando vel vomitus spontaneus præcessit, vel per medicamenta nauseosa provocatus fuit, omnium optime confert liq. C.C. succin. infantibus præsertim singulariter conveniens. Cui etiam extr. theriacale aut laud. opiat. in parva dosi conveniunt. 2. *Vomitus* in principio non statim suppressendus, aut si nimius fuerit, extract. theriacale, syr. papav. laud. opiat. una cum absorbentibus curant.

3. *Diarrhæa* aut alius alvi fluxus per terr. sigillat. curatur. Si nempe hujus pulveris largiter cerevisiæ injiciatur, & sub quolibet haultu probe invicem agitentur, & ita assumantur; it. CC. nstum, theriacalia conveniunt. 4. *Vigilia, deliria*, imprimis convulsiones epileptica, quæ infantes mox primo in morbi principio cum abdominis duritie affligunt; quas optimè curat liq. C.C. succ.



cinnabaris ℥ij, & si necessarium videtur, in morbi principio, *clysmata* levia.  
 5. *Hæmorrhagia narium moderata* aliquandiu sinenda, præstat ut plus fluat  
 sanguis, quàm minus. vid. *Horstius. obs. Anat. p. 95.* Quod si non sufficienter pro-  
 cedat, potius promovenda venit, vellicando nares, aut cum seta porcina, aut  
 crebrius & fortius eosdem emulgendo, aut aliis modis hæmorrhagiam narium  
 provocando, quod cum fecissem, sanguis bene fluxit, & febris desit, & brevi  
 sanata est, dicit *Forest. l. 6. observ. 48.* Quod si excedit, optime narium hæmor-  
 rhagiam curant *bufones* appensi, aut sub axillis agitati, vid. *Willis de febb. pag.*  
 266. Id quod & in aliis malignis obtinet. Virgo adulta febris petechiali graviter  
 correpta, cum jam efflorescerent copiosè petechiæ, gravi & pertinaci corripitur  
 hæmorrhagiâ: pro qua sistenda iussi caperet. 2. *bufones vivos*, eosque contu-  
 tos & conquassatos sub axillis utrinque alliger, cum lintheo, quo factò subito  
 omnis hæmorrhagia sedata fuit, & virgo per continuatum *Electuarii* ex-conserv.  
 citr. cum theriacâ usum convaleuit. Sed brevi post, cum nimis strenuè edisser,  
 gravissimæ anxietates præcordiorum & æstus intensissimus recurrunt, jubeo ut  
 vomeret, usâ Syr. emetico, & dictum electuar. continuaret: quo factò perfectè  
 convaleuit. Alias cum in variolis nimio hæmorrhagiâ ex ebullitionis sanguinis ni-  
 mio impetu oriantur, easdem etiam opiata cum absorbentibus seu præcipitantibus  
 dictis compescunt, vitando tunc volatilia. 6. *Tussis.* Hic in principio temperantia  
 & levigantia, vulgò incrassantia; in statu vero incidentia & expectorantia usur-  
 panda. Ibi Syr. violar. papav. de jujub. Diacod. in aq. scabios. tussilag. Hic vero  
 Syr. Nicotian. de Erysimo, cum ∇. menth. hyssop. &c. In omni tempore remedia  
 ex scabiosa præsertim, speciosè præservant & curant partes respirationi dicatas.  
 7. *Virium prostratio* corrigitur à Tincturâ corall. cum C. C. it. vin. Rhenan.  
 haustulo, speciatim quando prosteruntur vires à nimio sudore.

Post eruptionem symptomata sunt 1. *Retrocessus*, in hoc casu nil melius  
 est quam vesicatoria. vid. *Act. Medic. Hafn. vol. 2. p. 200.* sicut aliàs, ubi in va-  
 riolis graviora urgent symptomata, nec in eadem erumpunt, non absque fru-  
 ctu vesicatoria applicantur. vid. *Febr. de scorzonera p. 88.* item *Act. Med. Hafn.*  
*vol. 3. pag. 72.* 2. *Suppuratio* pro hac promovenda, ac ne lædantur præsertim  
 partes internæ, optime conveniunt *lapid. cancr. cum myrrha* crebrius usur-  
 pata. v. g.

℥. Lap. S. præp. 3ß.

myrrh. gr. xv.

C. C. sine igne ℥j.

℞. card. bened. gr. v. M. pro 3. dof.

Vel vesperi ad promovendam suppurationem & levandum ejus dolorem in  
 adulto.

℥. Aq.

3. Cicatrice  
 randum illud  
 tus; unde 1.  
 lencia. 3. Ci

Pro quo  
 cum penna  
 albicantes a  
 sangen sich  
 und nege  
 achmahl d  
 neu / so w  
 ac sapius re  
 stillans, vid  
 in Armam.  
 nibus levit  
 infant. c. 9.  
 sub eruptio  
 natur. Hic  
 loco etiam  
 clav. p. 249.  
 Borell. obs. 6.

Ne aut  
 nunt vesica  
 decocto he  
 p. 247. An  
 huc, quod  
 pedum, di  
 dâ & mul  
 punt. Se  
 aliave grav  
 Navos  
 per deliq  
 cum pauc



℞. Aq. scabios. ʒvj.

lap. &amp; præp. ʒj.

myrrh. gr. vj.

laud. op. gr. β.

syr. de succo scabios. ʒiij. M.

3. Cicatrices & foveæ earum ab erosione, ab acido acri & so. Ergo temperandum illud, ut plus mitescat: quo facto fovearum & cicatricum nullus metus; unde 1. maturantia & temperantia conveniunt. 2. nævos & maculas tolerantia. 3. Cicatrices & foveas, si quæ sunt, implentia.

Pro quo scopo ut temperetur & mitigetur pus, & amygd. dulc. expr. recens cum penna calidè illinatur, quando jam maturaverint, & in medio oculi quasi albicantes apparuerint, hoc sæpiusculè fiat in die. Vel: Wenn die Pocken anfangen sich zu bezeigen / nimn Nieren. Fett von einem Schwein / schmelze es / und nege Tüchlein damit / und bestreiche mit solchen das Angesicht sechs, sieben, achtemahl des Tages / das thue so lang / biß die Pocken oder Blattern austrocknen / so wird kein Mahl bleiben. Frustulum item lardi, subinde impositum ac sæpius renovatum est egregium. Præstantius est pinguedo lardi incensi destillans, vid. *M. A. N. C. Ann. 6. App. p. 192.* Pulvis ad variolas Myns. & id. in *Arman. p. 134.* Unum ex optimis est spir. vini aromaticus c. salibus volatilibus leviter acuat, & subinde calidè variolis applicatus. vid. *Sylv. de morb. infant. c. 9.* vel observetur elegans illa methodus *M. A. N. C. Ann. 4. p. 150.* ut sub eruptione variolarum V myrrhatum calidè per 2. dies repetitis vicibus illinatur. Hinc sacch. ʒi. ▽. ros. mixtum, calidè penna faciei applicetur: Hujus loco etiam Empl. de sperm. ran. cum sacch. ʒi imponi potest. vid. *Hoffmanni clav. p. 249.* Sed cautè talia fiant, ne repulsis variolis superveniat mors. Vid. *Borell. obs. 64. Forest. l. 6. obs. 45.*

Ne autem facies tot variolis obsideatur, Viennæ dorso sive scapulis imponunt vesicatoria. vid. *Thiermayer. l. 1. Conf. p. 106.* Alii pro hoc vaporem ex decocto herbarum emollientium pedibus suscipiunt. vid. *M. A. N. C. Ann. 6. p. 247.* Aut lacti calido pedes immergunt. Autore *Sylvio loc. supra cit.* Facit huc, quod refert *Forestus lib. 6. observ. 42.* In pruritu manuum & plantarum pedum, dum erumpunt pustulæ, ponantur dicta membra assidue in aquâ calidâ & multum confert. Pluribus & punctiones cessant, meliusq; morbilli erumpunt. Sed habeatur tunc pedum ratio, ne à copîa variolarum dolores diuturni aliæve gravia mala iisdem concilientur. Conf. *Hildan. cent. 3. obs. 99.*

Nævos tollunt inprimis spermaranarum, hinc ▽. flor. fabar. c. paucos & ʒi per deliq. temperata: it. ▽. omnium florum, cui misceatur cosmeticum Clavii cum pauca turia, &c. Facit huc etiam Cataplasma

Bbb 3

℞. Farin.



℞. Farin. fabar.

lupinorum an. ℥ij.

M. cum ☐ bovis ad consistent. Cataplasma. hoc ipso vespere tota inungatur facies. Relinque ita per noctem, mane tunc ∇. florum fabar. ablue & videbis egregium effectum. Cicatrices denique, si nihilominus quedam supersint, pro his mediante nutritione debite implendis inservit axungia alicuius piscis illita, & pinguedo anguillæ.

4. *Ptyalismus*, rarum equidem hoc post variolas apud nos est symptoma; observatum tamen sæpius à *Sydenham*. Hic igitur variolis malè tractatis, interdum auspiciato superveniens, ut tractandus, vid. in cit. *Authore de method. med. febres* p. 108. it. in ejus observ. p. 174. & 201.

Quoad *quartam indicationem*, *lesionis partium* adhuc habenda est ratio, quas inter rarius ac periculosius affligi solent imprimis *Oculi*. In his variolis laborantibus adhibeatur frustulum crudum *carnis recentis vitulina*, & ita repide oculis imponatur, ut hoc ipsum falsam infestantem oculos humiditatem absorbeat. Hinc ubi ferè ad quadrantem horæ adhæserit, auferatur, & recens imponatur, & sic consequenter aliquando continuando. *Succus cerefolii* cum ∇. *fenic.* instillatus variolas oculorum curat. Vid. *Sylv. de morb. infant.* c. 9. §. 83. Item

℞. Aq. plantag.

solan.

rosar. an. ℥j. in quibus ebulliant

sem. sumach. ℥j.

plantag. ℥ss.

Ex Colatura f. Collyrium, sæpe oculis instillandum, idque *in principio*, ut defendantur oculi à pustulis, in quo obtinendo tale me nunquam fefellit, dicit *Renealmus in observ.* Aliquando cum jamjam humor ad partem appulerat, admiscui, detractis aq. solan. & sem. sumach, mucilag. sem. alch. in aq. *fenic.* extract. ℥ss. Quibusdam minori in copia pro ratione morbi. Conf. *Horst. l. 6. obs. append. p. 301.* Loco sem. sumach. malicorium recipi potest. v. g.

℞ Cortic. granatorum ℥ij. infunde in s. q. aq. ros. & plantag. stent in infus. in loco calido, postea filtratur, & adde

margarit. præp. gr. ix.

croci orient. gr. iij. M.

Aut pro collyrio extemperaneo. ℞. Aq. plantag. & sperm. ranarum, in quibus parum sacch. Hi misceatur, & ita oculis instilletur pro præservatione. Loco cuius *℞ sacchari* etiam *tutia* præp. cum paucis o. lo albo adhiberi potest.

Quod



Quod si nihilominus oculi progressu morbi intumescant, ita, ut nequeant aperiri, vel etiam glutinosis sordibus inviscantur, decocto sem. lini, fœnugraci, cydon, malv. vel fotu ex malva & sem. cydon. in aq. communi decoctis aperiantur, idq; tamdiu, donec inviscatio & tumor cessent. Nebula postmodum in oculis apparentes, ꝛe sacch. candi in oculos inflato curantur. Hoc enim saccharum præservat non solum oculos; sed etiam nebulas detergit, si etiam cum aq. rosac. adhibeatur. Sin his omnibus non obstantibus, tamen variolæ oculos occuparint, ita, ut istis curatis, nebulæ aut suffusiones, aut similes visus obscuraciones post variolas supersint, proficua est ∇. ophthalmica Rulandi, vel ∇. ophthalmica ex croco merall. Pertinet huc, quod refert Lipsius de variolis; In einem alten Buch hab ich diß experiment gefunden: Ein Knab'lein sahe nach den Blattern ein gang'es Jahr nîcht / waren zwar ihm die Augen noch gang / aber mit Wust überzogen. Endlich nam einer Englanwurgel / schnitzte diese klein / sod es in halb Wein und halb Wasser / und sprânge ihm das Wasser 3. oder 4. Morgen in die Augen / das bißte wol / doch genasste ihm das Aug. Item, das Del von den Lebern der Aleuppen (mustelarum) ein oder zwey Tropffen in die Augen gethan / beißt die Felle weg / ist eine edle Arzenei. Conf. quoad Pterygion post variolas curatas For. 1.6. obs. 55.

Nares defendendi sunt, in quem finem

℞ Flor. ros. rubr. p. iij.

camph. gr. viij. M. F.

nodulus crebrius naribus admoendus, vel solitarius, vel aceto rosaceo intinctus. Quod si in variolis crusta subinde circa nares concrecant, ita, ut per eas us trahi nequeat, butyrum recens non salitum, vel cum ∇. rosar. sapius lotum, blandè inunguendus est, quousq; crustæ decidant.

**Aures.** Ubi in variolis auditus latus fuerit, imprimis vesicatoria pone aures applicanda: hinc essentia card. ben. aut castoreicum bombace crebrius auribus immittatur. Vel fiat suffus ex castoreo, myrrha, colocynthide, sem. fœnic. & paucis croco in vino coctis, ac per tritorium auribus immittatur.

Funeſtæ imprimis variolæ sunt **Faucibus**, in quibus suffocatoria pathemata, atque adeo agrypniam quasi inducunt. Ad præservandas has fauces.

℞ Aq. prunell. ℥iij.

lyr. de suc. scabios.

granat. an. ℥ß.

Rob. diamor.

dianuc. an. ℥ij. M. S.

Cassiaum Hals.

Vel ℞ Aq. prunell.

scabios.



scabios. an. ℥ij.  
 mucilag. sem. Cydon.  
 fenugr. an. ℥ij.  
 ☉ depur. ℥℔. ad ℥j. M. S.

## Gurgelwasser zum Hals.

In quem finem *stercus equinum* optimo consilio potui additur vel *succo cancer. fluviatilis* c. ▽. *semper vivi mas. misto*, pro collutione oris & faucium usurpato, fauces & lingua præservantur.

Quod si nihilominus fauces & lingua obsideantur, idque cum magno dolore & calore, imitemur *Forest. l. 7. obs. 17.* qui jubet, ut continuo cum *lacte caprino & aq. plantag. simul mistis*, tepide se gargarizent ægri, aut si gargarizatio molesta sit, saltem aliquandiu in ore detineantur, hinc expuantur, quod miraculi instar prodesse ait, & oris & gutturi præstantissimum remedium, cum signa exanthematum se produnt. It. ℞. *Gargarisma ex decocto hordei, passul. min.* ac similibus temperantibus adhibeatur, idque ad faciliorem maturationem, pustulis vero jamjam se aperientibus, huic decocto *mel rosaceum c. panxillo alumine* admisceatur ad meliorem purificationem, ne ulcera sordida remaneant. Quod si nihilominus fauces exulceratae fuerint.

℞. Herb. *salvæ*, vel *veronicæ*,  
 sem. hordei, an. M℔. vel j.  
 passul. min. M℔. coq. in s. q. aq. plantag.  
 Colat. ℞. ℥viii. vel ℔j.  
 adde mellis rosati ℥j℔.  
 alum. ℥℔. ad ℥j. M. pro Gargarismate.

Quod si *lingua* exulcerata fuerit, siquidem hæc non raro tota putrescit, eroditur, & expuitur. (*vid. Schenck. l. 1. obs. Barth. C. 2. hist. 22.*) Contra talem linguæ exulcerationem

℞. Flor. *malvæ arbor.* ℥℔.  
 balauft. ℥ij.  
 myrrh. elect. ℥j.  
 alum. ℥℔.  
 c. s. q. mellis despumati, F. Linim. molle.

Quod si variolæ *labia* obducant, adeoque ingentem dolorem inducant;  
*mucilag. sem. cydon.* eadem inungantur, & curentur.

Quod si *Dysenteria* vel corripiat, vel subsequatur variolas, internè *diaseord. Fracastor. C. C. ust. terr. sigill. tormentill.* &c. conveniunt. Externè si ferat morbi conditio, *clyster* ex lacte cum rad. symphyti usurpari potest. Adhiberi etiam possunt remedia *Riveriana*, quæ in *cent. 1. obs. 71.* & *cent. 2. obs. 2.*



In *miſtu cruento* remedia ex *plantagine* ſunt optima.

*Paralyſes* nunc particulares, nunc univerſales, non raro inſequentur variolas, quam tractandi rationem vid. in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 13.* Item quoad loquelam poſt variolas amiſſam, ex vitio paralytico, vid. *Hild. C. 6. obſ. 14.*

*Ulcera* ſubinde peſſimi moris poſt ſe relinquunt variolæ, adeo ut *Salmuth. cent. 2. obſ. 50.* ulcera mammarum admodum maligna orta notet ex paucis latentibus variolis corruptis. Ulcera talia cautè, & non adeo vulgari modo tractanda ſunt. Conf. *Fehr. de Scorzonæ. pag. 88.*

*Gangræna* non raro variolas uno alterove loco inſequitur, quæ pars quomodo tractanda, & ægra à corpore ſeparanda ſit, exemplo gangrænæ genarum à variolis docetur in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 50.* Facit huc curioſa obſervatio *Thiermaiers conſ. l. 1. p. 106.* Scortum in Variolis ſphacelatum per *precipitatum rubrum* cum unguento roſato digeſtivo mixtum, ſeparatum & reſcitum.]

Denique *articulorum tumores & Ulcera* poſt variolas ut curanda, vid. in *M. A. N. C. Ann. 6. p. 139.*

Ad malignas hujusmodi febres pertinet etiam

## FEBRIS noſtra PURPURATA,

der *Griefel* dicta. Aliàs *febris militaris* dicitur. Vid. *M. A. N. C. Ann. 6. p. 76.* quo loco p. 205. *Purpuræ epidemicæ malignæ* infantum ſit mentio. Aliàs febris militaris dicitur, vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 397.* item *Morbilli ignei* quibusdam vocantur, vid. *M. A. N. C. l. c. Ann. 6.* Febris hæc quosvis adoritur, mares & fœminas, infantes & adultos, præſertim puerperas, quibus & malignior & funeſtior exiſtit, forſan menſium retentorum occaſione. *Acidum* ſui generis *malignum eſt ejus fomes.* Hoc enim ubi ſecrerum & deviſtum fuerit, atque ad loca intercutanea propuſſum, horum ardor, pruritus, deſquamatio, excitatur. *Remedia volatilia & myrrha* conveniunt. Subinde acutus, non raro præceps eſt affectus, qui dum maximè videtur blandiri, etiam ex leviffimo horrore, ſubito jugulat.

In *Cura* eadem quæ ſupra de malignis dicta fuerunt, obſervanda. In ſpecie *rob. ſambuc. cum CC. item:*

℞. aq. ſcabioſ.

fumar. an. ʒiſſ.

Eſſent. caſtor. ʒj.

unicorn. ver.

Gcc

Anti-



## De Peste.

antimon. diaph. an. ʒ ss.

sal. volatil. C.C. gr. xv.

syr. artemis. ʒvj. M. pro aliquot dosib.

Item præsertim, si diarrhæa talibus funesta se sociaverit.

℞. aq. flor. sambuc.

card. ben. an. ʒi ss.

spir. theriacal. simpl. ʒiij.

C.C. ust.

antimon. diaph. an. ʒj.

bol. armen. gr. xij.

syr. flor. tunic. ʒiij. M.

Liquor C.C. succinatus egregius pariter est in hoc affectu. Agmen claudat

## MORBUS HUNGARICUS

sive *Febris castrensis*, maligna admodum & gloriosa præ cæteris malignis febribus, trigâ symptomatum acerbius affligentium insignita. Nempe 1. *gravi cardialgia & anxietate*. hinc 2. *Intolerabili Cephalalgia*, indeque *gravissimis deliriis*, ac denique 3. *graviore Prunella*, quibus & *dolor sive lassitudo artuum osteocopus*, & subinde *alvi fluor* se solent sociare. German. *Hauptfranchheit/die Ungarische Franchheit/die hirtobende Sucht*/appellari solet, in specie & secundum experientiam dicta. De hoc morbo tractavit *Mart. Rubandus*.

*Cura* eadem est atque supra insinuatam. Valent in specie *Vomitoria*, quæ in morbi principio admodum sunt necessaria. Hinc etiam *venarum raninarum sectio*, respectu nempe *Prunella*, loco quarum *venam frontis* quidam secare amant, respectu habito ad *Cephalalgiam & deliria*. *Remedia* inter pro *fulero* commodè inservit *decoctum C.C. cum succo citri*. Pro diaphoreticis *spiritus therical. camphor. Diacord. Fracast. pulvis rubeus Panonicus*. Quibus & *nitrum antimoniatum*, præsertim in potu subinde addi potest. Faucibus optimè convenit. aq. semperviv. maj. v. g. ℥j. cum succi proprii ʒij. acuata, addita, salis armoniaci ʒj. quæ misceantur pro gargarismate.

## PESTIS

Adhuc superest, cujus consideratio & Theologica & Medica esse potest. Theologi eam flagellam DEI dicunt, Medici ejus naturam, quantum possibile, & indagant, & per medicamenta malignitati ejus succurrere fatagunt. Multi multis de peste agunt. Sufficiat nobis quoad theotiam *Kircherus in Scrutin. Pests, Helmont. in Tumulo pestis*. Quoad praxin verò feliciter imitandam *Barbetti. in descriptione Pests. & Diemerbroeck de peste*, quibus & societur *Sylvius de peste*, utpote qui præsentis pesti interfuerunt.

Est

Est autem  
quoniam fere  
pore, vix pe  
mori pessim  
unde diverso  
lica pestilens.  
descripta est a  
fuerunt oble  
cujusdam pest  
plerumque  
riori seculo

Urut au  
leat, prop

Bubones au

in genere

cus, qui ort  
contagium  
periculum  
res secum tr

Mias  
quaquaver

pestilential

GAStanq

co illi odor

vatio 74, ce

runt. Summ

tantum per

vestes, num

aërè inquit

tale pestilen

plus minus

tu aut pav

Natu

cata fuit. Il

runt, in

& (sue patr

artificios,



Est autem pestis, quando in morbis adest supremus gradus malignitatis, qui, quoniam ferè cum omnibus morbis conjungi, adeoque varia symptomata inferre potest, vix peculiarem quandam morbum constituit, sed tantum conditionem morbi pessimam designat. Conjungitur etiam pestis cum omnibus aliis morbis, unde diverso tempore diversæ pestes observatæ. Sic ab *Aegineta* prodita est *Colica pestilens*. *Peripneumonia pestilentialis* meminit *Fracassinus*. *Pestis pleuritica* descripta est ab *Joh. Wiero*. Ab aliis *phrenitides*, *dysenteria*, *hepatides*, *pestilenticiales* fuerunt observatæ; itè *Angina pestilenticiales* non sunt raræ. *Mercurialis* meminit ejusdam pestis, quæ *pedes, tibias, & ossa* ita infestabat, ut correpti intra triduum plerumque interirent. Nec ignota pestis illa, quæ *sudoris Anglici* nomine superiori seculo innotuit.

Utut autem malignitas pestilentialis pluribus diversis affectibus se associare valeat, *proprie* tamen sic dicta, & peculiaris morbi species est *pestis ista, quam Bubones aut Carbunculi, subinde & Petechia insequuntur*. Adeo ut per *pestem in genere* nil aliud intelligatur, quàm *morbus maximè contagiosus & Epidemicus, qui ortum ducit ex miasmate venenato, ab aere primum suscepto, & hinc per contagium propagato, qui occultè & latenter homines aggressus in summum vite periculum conjicit, & ferè bubones, carbunculos, nonnunquam & petechias comites secum trahit.*

*Miasma* istud summè subtile est, adeoque admodum activum, adeo ut quaquaversus diffusum, virulentiam suam exerat, unde à quibusdam *spiritus pestilentialis*, ab aliis *aura venenata*, ab *Helmontio Gas fracidum* in aère dicitur; *Gas* tanquam spiritus incorporalis, nullo sensu propriè cognoscibile, simile cæco isti odori, quo mediante canes heros suos agnoscere solent. Quò facit *observatio 74, cent. 1. Borelli*, de quodam, qui locum infectum odore cognoscere potuit. Summè contagiosum est miasma, quod miris modis inficere potest, cum non tantum per immediatum contactum corporalem, sed per intermedia quæcunq;, vestes, nummos, literas hinc inde transmissas, propagatum fuerit. In specie tamen aère inquinando in distans quasi, multipliciter se propagat, cujus medio fermentū tale pestilens inspiratum, mox spiritus vitalis partem quandam afficit, & cruorem plus minus inquinat: unde tam promptè vite periculum, hinc & terrore & metu aut pavore percussī tam faciliè contagium suscipiunt.

*Natura miasmatis pestilentialis* à nemine hactenus cognita, aut debite explicata fuit. Illustrarunt negotium hoc, qui *natura arsenicalis illud esse asserunt*, in specie *Kircherus in scrutin. pest.* qui plurib<sup>9</sup> ventilat hanc controversiā, & suæ putredini animali applicat. Hinc in primis legend<sup>9</sup> *Helmont*, in eo præsertim artificios<sup>9</sup>, quod eleganter demonstrat modū, quo ex animi affectib<sup>9</sup> subinde pestes propa-



propagantur. Nam inter causas, quæ corpus disponunt ad pestis fomitem promptius suscipiendum, vix potentior est imaginatione, & hinc natis affectibus, horrore, metu, pavore &c. Exemplum miranda vid. in *Denfing. dissert. de Peste*, Ipeiatim in *Höchstettero decad. 7. conf. 7.*

Quoad *causas remotas* sunt hæ ipsæ variæ, præ cæteris *terra motus* considerandi, cum passim exempla prostant. Non immerito tunc causa rejicitur in *effluvia mineralia volatilia, mercurialia*, simili dem *Schwaden* / cujus halitu toties jugulantur metalli fossiores. Pertinet huc *fames*, quam sequitur sapius pestis, item *hominum strages in bellis*, quorum cadavera, putredine resoluta, ad pestem disponunt, in quo ipso munitalis consociatio ad cadavera cum hominibus imprimis observanda. Plures aliæ *aeris alterationes*, undecunque natæ, ad pestes quoque plus minus disponunt. Hinc enim morbi maligni populariter grassantes nunc acerbius affligunt, nunc denuo remittunt, pro aeris scilicet alteratione variæ: unde & tales Epidemici morbi interdum prodromi sunt insequentis pestis. De *veneficiis* & aliis modis pestem inducentibus non est opus multa dicere, cum exempla passim prostant apud Autores.

Quoad *affligendi modum* pestis nunc cum febre complicata, nunc sine febrilibus indicis affligit. Sunt equidem multi, qui existimant, pestem esse non posse sine febre, verum contrariatur experientia, de quo videatur imprimis *Barbette Tr. de Peste*. qui, cum duas pestes sustulisset Amstelodami, refert se observasse multos, quibus citra febrem bubones sub axillis, aut prope inguina, eruperint, manifesta indicia correptionis à peste, quos ipsos tumores absque febre longè difficiliores curatu esse, quam reliquos observavit. Imò in genere *pestis absque febre periculosior est ista, quæ fit cum febre*. Febris nempe est motus naturæ irritatæ. Dum ergo mox prosternitur spirituum exercitus, ut siderati quasi intereant, & hinc primarium naturæ robur deficiat, absque febre, periculosissime tamen decumbent ægri.

*Symptomata* peste infectorum pluribus non attinet enarrare, cum in quolibet peste ferè variant. Sufficiant interea, quæ tam *Barbette, quam Sylvius & Diemerbroeck* enarrant.

Multi pariter curiosi sunt in expiscandis *indiciis pestem futuram præsignificantibus*, quæ omnia tamen sunt vana, interim pauca conjecturæ non omnino sunt inanes. Uti sunt multa aut varia infecta, bubonum copia, quæ & alia plura vid. in *Kirch. de Peste*.

*Præsentis pestis indicia* pariter sunt nulla. Ubi tamen morbi acutiores ac periculosiores cum bubonibus ac carbunculis, aut petechiis grassari incipiunt, de peste amplius dubitare nemo potest. *Ipsam vero ægrum peste corre-*



*ptum ostendit nausea sine manifesta causa*, id quod contagii suscepti indicium est. *Item* certum signum, quod nunquam vos faller, dicit *Lindanius*, est, si *agri sentiant in locis bubonum*, i. e. in inguinibus, sub axillis, vel paroditib<sup>9</sup> *puncticulam, plures vel pauciores*, vel etiam *unam quasi candente acu factam*, certi estote Peste. Quādo igitur tale quid in bubonib<sup>9</sup> sit, statim oportet evocare, quia punctio illa est conatus naturæ, volentis huc deponere venenum. Quæ ipsa confirmantur ulterius, si præcesserit metus vel terror, & jungatur capitis dolor insignior, vel similis præternaturalis subitanea corporis alteratio. *Chronologiam Pestium* insignium à diluvio ad nostra usque tempora, vid. in *Piens de Febris* part. 2. p. 189.

In *prognosi* cautus sit Medicus, ut minus possit in peste errare, quàm in febribus malignis, quia sæpius infecti moriuntur. De *scabie* saltem observandum, quod tempore pestis sit salutaris: teste *Forest. l. I. obs. 24.* qui etiam lue gallicæ infectos, sed ulcerosos raro peste infici asserit. Aliàs enim pestem libenter lue Venereæ se sociare asserit *Hodges de peste Londinensi*.

*Salutarem promittit eventum*, si Bubones atque tumores citò erumpant, & symptomata tunc remittant. *Bubonaria* pestis est omnium mitissima & securissima, *petechialis* pessima, media est pestis cum *anthracibus*. Bubones plures ac boni coloris sunt salutare, contra carbunculi quo plures, eo periculosior. Si per *sudores* largiores materia discutitur, bonum signum: si verò frigidus sit sudor, vel etiam extrema frigida, in speciem ares, malum est. *Narium stillicidium* lethale. *Tumores delitescentes* periculum portendunt. Eminentibus exanthematibus vel bubonibus superveniens *singultus*, lethale signum. *Delirium* cum oculis igneis & lingua sicca, prævum signum. Si super *bubonem* erumpat *anthrax* sive *carbunculus*, est lethale. *Anthraces* in digitis erumpentes periculosi, propter multos concurrentes tendines. Si ante febrim erumpant *tumores*, minus est periculosum, quàm si post febrim demum appareant. Si *tumores* aliquantisper sunt *inflammati*, non est adeò periculosum, verùm ubi eos circumdat *circulus lividus*, periculosum. *Cantharides* applicatæ, ubi non excitant vesicas, audacter prænunciandum, ægrum vix evasurum. Si post vesicatorium applicatum & apertum, vel cauterium actuale intra 12. vel 24. horas anthracis progressus ad vicina non potest inhiberi, æger interibit. Idque etiam fit, quando post *cauterium* sive potentiale sive actuale applicatum, *locus aridus* permanet: sin verò applicato cauterio erumpat vesicula, quò major, eò melior, & postmodum materia laudabilis in illa generatur, æger erit extra periculum. *Anthrax cum vibice* communiter flavo, aut rubeo est admodum periculosus. Quod si vibex albescat citra febris decrementum, pauca salutis spes superest. Si bubones in collo, aut prope aures, inducant



dolores guttaris, & deglutitio citra insignem internam inflammationem impediatur, patiens vix ultra 12. vel 15. horas supervivet. Febris insignis citra anxietates cordis minus periculosa est, quàm anxietates cordis citra insignem febrem. Interdum fit, ut anthraces oriantur in oculis, in manibus, in stomacho &c. citra spem convalescentiæ: item si oriantur anthraces in vesica urinaria, ægri cum summis torminib⁹ Intereunt. Quidam tanquā certum habent prognosticon, projiciunt lac mulieris, masculum lactantis, in urinam peste infectæ, unde si cadat in fundum, ante 6. vel septem dies ægros interire; sin minus, dicunt eundem supervivere: sit fides penes experientiam.

Quoad *Curam*, duo consideranda. 1. ut præservetur æger ab insultu. 2. ut infectus curetur.

*Præservativum* ordinarium est fuga, cum conditionibus. Citò fuge, longè recede, tardè redi. Aliàs cùm pestis afflictio in duobus consistat. In causa agente, & subiecto patiente, genuina præservatio consistet. 1. In causæ averuncatione. 2. In subiecti ad resistendum roborationem, ne contagium malignū suscipiat, i. e. ut loquitur *Helmont.* dicens xenexon tollere appropriationem & adoptionem mumialem, extra quam nullum fit contagium. Nempe spiritus corroborandus, ne perterrefiat: In contagio verò mumialis dispositio delenda, & hinc sanguis certo quasi balsamo condiendus, ut symbolizatio mumialis hoc ipso minuatur. Scilicet non adeò promiscuè in quosvis grassatur pestis, quin certas familias, certum sexum, certam ætatem, certos homines saltem affligat gravius. Conf. *Boyle suspic. de aeris qualitat. p. 34.* item *Felibusius de liene. p. 171.* Deinde jejunos facillè affligit pestis, quod de febribus quoque observandum. Item in mentali fossoribus, item qui in *§io* vel *§io* occupati sunt, ideoque *jejunus non esto*, sed semper antequam domum exeas, aliquot *bucellas panis & haustum vini absinth. bonum, vel alius medicati sumas*, ita quidem, ut prius accendas *camphoram* magnitudine pisi, quàm leviter accensam immitte haustui vini, ut supernatando comburatur. Sin exinguatur, denuò accende, & perge, donec consumpta sit. Est vinum egregium in peste præservativum, acidum generosum, ex eo saltem quod animolos reddat homines. vid. *Willis. de febb. ut & de peste.* Potest etiam fieri vinum medicatum ex infusione vegetabilium alexipharmacorum, *nunquam omitiendo myrrham & camphoram*, & tale vinum potest crebrius hauriri.

*Purgantia* ad præservationem sint rara, parca, & cauta. Rara, ne sæpius instituantur, parca, quæ non in magna dosi, cauta, ne sint vehementia. Ubi opus est laxatione, *haustulus Barbetti*; qui videatur de peste p. 603.

[℞. rheielect. ʒiʒ.

fol. lenn. mund. ʒij.

crem. Tartar. ʒj.

rad.

Potus spiritus  
compositio  
phlogos d  
his gravia d

Fonicul

confirmati

obs. p. 359

præservati

co, ubi fue

dico, ut ion

num, qui n

gium esse

etiones in

rum est, qu

Præ

tionem co

4ea, 8. olo

est ed meli

huic & alia

junt. &c.

nes conveni

superaffusi

sum domo

quantulan

præferunt

usurparip

chisci effu

formetur

eum 4re, &



rad. scorzoner.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .sem. anis.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .coq. ex aq. card. bened. Colatur.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ . addestyr. de cich. cum thabarb.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ .

spir. salis parum.

confect. alker.  $\mathfrak{vj}$ . M. F. haustulus.]

*Potus spirituosus*, in specie aqua & spiritus theriacales, apoplectica &c. item ipsae compositiones theriacales praeservatione non sunt adeo convenientes, quia ad phlogoses disponunt. Unde superveniente peste vel graves inducunt febres, & in his gravia deliria; aut igitur parum usurpanda; aut intermistis acidis temperanda.

*Fonticuli* corpori inusti sunt unum ex optimis praeservativis per experientiam confirmati. vid. *Hildan. cent. 4. obs. 23. River. in observ. communicatis. Horst. in obs. p. 359. 360. Aët. medic. Haffn. vol. 4. p. 152.* Hinc *Lindannus* optimo consilio ad praeservationem fonticulos ordinari asserit. *Avunculus me<sup>9</sup>*, dicit, vixit in Marocco, ubi suo tempore intra 5. septimanas 85000. perierunt. Ille suavitudo Judaeo Medico, ut inureret fonticulos, unde illi omnes fuerunt liberi ac immunes, praeter unum, qui noluit sibi inuri. Ipse expertus sum, pergit *Lindannus*, remedium egregium esse in fonticulis, & qui ignari accedunt ad infectos, statim sentiunt punctiones in fonticulis, idque etiam confirmat *Hodges de peste. pag. 241.* Unde rarum est, quod interdum fallant, teste *Hochstetter. decad. 7. cas. 1. & cas. 31.*

*Praeservatio* ipsa instituitur vel per medicationem aëris, vel per medicationem corporis. *Aerem medicari solemus* per suffitus, ubi imprimis excellunt aëra, olea & acida. & accensum insigniter aërem corrigit, si adjungas nitrum, est eo melius. Hinc pulvis pyrius accensus est unum ex optimis corrigentibus, huic & alia sulphurea addi possunt, succinum, thus, myrrha, camphora, baccae, jantp. &c. unde & tormentorum bellicorum crebriores in civitatibus explosiones conveniunt. Praeterea Gl.  $\odot$  ut & horum spiritus lateribus calefactis superaffusi conveniunt. Hinc v. g. acetum nitratum Sala lateri candenti affusum domos & vestimenta optimè purificat. Vel  $\mathcal{L}$ . acetum rutaceum, cui aliquantulum  $\odot$  addatur, & hoc ipso dicto modo suffitus instituatur. Sunt qui praefereunt acetum, in quo solutum sit  $\odot$ , quod dicto modo pro suffimento usurpari potest, in quibus omnibus tamen camphora subinde addenda venit. Trochisci efficaces sed paulò suaviores pro fumo possunt parari ita:

 $\mathcal{L}$ .  $\odot$   $\mathfrak{ss}$ .aëris  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ .

Benzoes, styrac. simul liquati an, q. s. ut:

formentur trochisci, sub usu carbonibus ardentibus injiciendi. De Hippocratica cum aëre, & pice aëris correctione vid. *Kircher. in scrutin. de pest. p. 362. & Helm. in*

18094.



*in mul. pestis.* Non inepti videntur, qui lac calefactum præcipiunt, ut reponatur in conclavi suspecto. Sic etiam fieri, ut infectio lacti se insinuet, adeo, ut crusta viridiuscula supernatare appareat.

*Medicamenta, corporis medicationi inservientia,* sunt vel externa, vel interna. *Interna sunt acida, & hinc sulphurea.* *Acida volatilia* ab omnibus commendantur, in specie *acetum*, per aromata alexipharmaca, præsertim diaphoretica infusa, *medicatu*, sub nomine *aceti theriacalis*, quod sive cum, sive sine theriaca paratum fuerit, egregium est præservativum. De talibus manet cochlear unum vel alterum jejuno stomacho, vel post jusculum assumatur, præservationis gratia. Talia sunt *acetum bezoard.* Kircheri de pest. p. 176. Romanâ peste, ait, dum hæc scribo, dominante, istiusmodi remedium confectum fuit, & quotquot illi usi fuerunt, (siquidem pluribus externis tenuioris substantiæ id communicatum fuit) ii nullum, etsi cum peste correptis intra eadem ædium gurgustia unâ commorarentur, eorumque curam haberent, peste infectatum fuisse, falsi sunt. *Componitur* autem ex speciebus domesticis obviis, uti sunt *acetum* exquisitissimum, *ruta*, *pimpinella*, *betonica*, *noces juglandes*, *allium*, *bacca juniperi*. Quibus addatur si suppetat, paululum *camphora*, si non suppetat, paululum *spodii cervini*: quæ per infusionem in aceto 40 horarum spacio digerantur ad solem, vel intra hypocaustum. Deinde percolatum reponitur ad usum, cujus matutino tempore stomacho jejuno assumatur tantum, quantum cochlear tenere potest, & habebis antidotum certissimum pro eo die & securissimum. Nec te terreat saporis ingrati acrimonia, sciasque tanto esse hujusmodi antidota pesti magis contraria, quanto ingratoris fuerint saporis, cum omnia dicta ingredientia, nescio quâ antipathia occulta pesti, cæterisque venenosis aeris infectionibus contrarientur, neque solum ad intra susceptione conferunt, sed & odore, naribus, temporibus, pulsum locis illita, mirum in modum conferunt. *Hæc Kircherus.* Item *acetum theriacale Tymæ*, cujus succellum ipse vidit in peste, in *cas. 32. l. 8. p. 393.* (A. M. DC. XXXVIII, inquit, Stetini Pomeranorum, ut & Stralsundi, maximè verò in castris exercitus Suecici ad Tribbsæam, pestis contagiū vehementissimè grassabatur, tentata multa & varia remediōrū genera, Nihil tamen æquè prodessè visum est, ac acetum meum theriacale, mox inter initia cum tantillo Diascordii vel Theriacæ ad eliciendos sudores exhibitum, plurimi namque solo hujusaceti usu, Deo juvante, restituti sunt. Sic Anno M. DC. XLIII. grassante inter præsidarios Suecicos Colbergæ febri maligna & pestilente, hoc unico remedio tanta cohors servata est gregariōrū, convalescentibus ferè omnibus, quotquot eodem aceto tempestivè utebantur, exceptis paucissimis, quibus serius oblatum fuerat. Descriptio aceti theriacalis hæc est.

℞. confect. orvietan. ℥ij.

diascord. Fracastor. ℥i℥.

Theriac.

Mista flent  
colatur, ad

Imò ac

allarum suff

hinc filtrata,

℥. q. V cam

theriac, q. v.

vatione. Vi

13. (Sylv

rem agros

quàm vulg

antequā inv

nec unquam

verò sublato

dum ac ferè

diebat domi

cos meo ex

peculiarem

potuerint

adeoque s

esse, qui

ipsum mul

lius pestis,

cerevisia au



Theriac. Androm. ℥j.  
 Rad. angelic. contraierv.  
 enul. pimpinell.  
 tormentil. scorzoner.  
 dictamn. alb. petasit. an. ℥vj.  
 fol. scordii - rutæ - millefol. an. Mj.  
 flor. calendul. - tunicar. an. Mß.  
 cort. fraxia. - citr. an. ℥ß.  
 bacc. junip. ℥ijß.  
 macer. zedoar. an. ℥iij.  
 camphor. ℥ij.  
 croci orient. ℥j.  
 myrrh. puræ & elect. ℥ß.  
 acer. ex succo rubi idæi q. l.

Mista stent in infusione loco calido bene tecta, donec extrahatur Tinctura, cuius colatur. ad ulum fervetur.

Imò acetum bacc. junip. myrrha, zedoar. card. bened. infusum instar milliarum sufficiat compositionum, aut simpliciter Theriaca, c. f. q. aceti dissoluta, hinc filtrata, dat acetum præservativum sufficiens, quibus semper tempore usus f. q. **V** camphorati addenda est, cum camphora aceto solubilis haud sit: Vel theriac. q. v. assumatur in vehiculo aceti, addita myrrha & camphora pro præservatione. Vires aceti alexipharmaci præter *Sylv. Tr. de peste, vid. Berthol. cent. 4. hist. 13.* (*Sylvius ait l. c. p. 275.* Ego sanè ante novennium, cum quotidie plures visitarem ægros peste infectos, præcautionis loco aliud non sumpsi medicamentum, quàm *vulgaris aceti vini cochlear unum*, micâ panis exceptum, & quidem manè antequàm inviserem ægros. Id remedii genus usurpavi per octo menses continuos, nec unquam minimam toto illo tempore ab infectione noxam sensi. Postquam verò sublato hoc malo desissem ab hoc aceto diutius assumendo, sensi postmodum ac ferè semper capitis mei dolorem mihi contingere, quoties infectam ingrediebar domum, licèt id ignorarem, nec tamè mihi metuerem. Novi equidem paucos meo exemplo potuisse acetum per aliquot hebdomadas ferre, dum aliqui ob peculiarem sui constitutionem, melancholicam dictam, ne quidem per plures dies potuerint perseverare in ejus usu. Solent alii *vini Rhenani*, aut *cerevisie veteris*, adeoque *subacescentis* haustum manè sumitum commendare. Novi non deesse, qui *vini spiritum* aut simplicem, aut theriacalem laudant, sed novi id ipsum multis fuisse noxium: quod de acidis dici non potest, saltè ratione ipsius pestis. Laudatur quoque *Elixir. propriet. P. ut & q. is, o is, Oli.* ex paucâ cerevisia aut yno assumendus. Laudantur etiam *fructus acidis, mala citria, aurea,*

D d d

granata



*granata seu punica, Ribesia &c.* confortat quoque *aceti spongia excepti odor*, si fuerit acetum simplex, aut aliquo aromate plantave aromatica impraegnatum: Adeo ut si quis omnia in pestis praecautione efficacissima contulerit, comperiet pleraque acida esse, aut cum acidis parata. Unde patere puto, acidum non tantum desiderari, contra pestis venenum, sed ipsum imprimis ab eodem impetu ac impugnat: Quibus vero acida meraca esse solent molesta & gravia, iisdem temperari possunt vini spiritu. Sic salis spiritus ejus ope ita temperatur, ut omnis pene ipsius aciditas obliteretur, si saepius cum eodem cohobetur, nec antimonium desinit conducere in peste. Haecenus *Sylvius*, qui loco citato plura notatu digna designat. (*Bartholinus l. c.* novi, ait, quos solum acetum vesaceum ore sumptum, carpoque illitum, a peste praeservavit. In eadem lue acetum bezoarticum omne tulit punctum. Alii nostrates grassante contagio aceto calendula solo se munierunt, & incolumes evaserunt.)

Post acida sunt *sulphurea*, tam mineralia, quam vegetabilia, balsamica vi corpus defendentia. Hinc sulphur ipsum, aut ejus flores cum *myrrha*, mistum & usurpatum convenit: hinc etiam omnis potus sulphurandus. Juxta sulphur est *myrrha, succinum, camphora &c.* *Camphora* tamen ceteris palmam praeripit. Hinc & *Elix. propriet.* cum spiritu sulphuris plus minus acidulatum, egregie convenit. Vel:

℞. flor. sulphuris ℥ij.

myrrh. ℥ij.

aloes ℥j.

croci

camph. ℥ss. M. F. Pulvis.

Ex quo varia fieri possunt remedia, cum addito saccharo q. s. F. Bolus praeservativus: c. s. q. conservae pulpae citri potest fieri *Electuar. praeservativum*. Cum addito aceto usus tempore semper agitando potest fieri *aacetum praeservativum &c.* Hisce etiam opium addendum venit, qui spiritus figendo, & animi pathemata non nihil coercendo, inter praeservantia non ultimum meretur locum. Hinc & *Thebriaca, Mithridatum, Diascord. Fracast.* opio divites compositiones cum aceto praeservationis gratia usurpari possunt.

Inter *Externa* convenit *spongia aceto impraegnata*, natibus subinde admoveenda, omnibus pomambris praefenda. Vel adimitat. *Zuvelseri. Pharm. Reg. p. 137.* fiat pyxis tornatilis perforata, spongia aceto etiam replenda natibus admoveenda, quibus *camphora, myrrha* addi possunt pro libitu. In ore masticetur *radix zedoaria* vel *zinzib.* in aceto non nihil macerata. Quod facit, quod *Schenckius* ex *Fallopio* refert, nebulones, qui inserviebant peste correptis, non praeservabant corpora sua, nisi *zinzib. & zedoar.* elu, ea ore masticando. Masticabant ante *zinzib.* postea ebibebant haustum vini generosi, & tota die habebant *zedoaria* manducando. *Myrrha* ite frequenter masticanda, aut fiant trochisci ex *myrrha*

& cam-

& camphora  
quod si quis  
illinit veli,

Sunt qui an  
qualia sunt  
Sala. egeg  
Trochiscu  
Vel ℥. q.  
Höferus H  
leant & pra  
appensus,  
nibus, eor  
ex ossibus  
lum gestan

Curat

fusceptum  
geritatur  
tiam, vener  
ita pestem c  
ca, quibus c  
vetur,

I. Ale  
ager ter su  
beant, dum  
& similibu  
mine, & u  
recidiva,  
firmarum

II. A  
tem vener  
de spongia  
natibus ad

III. L



*Camphora*, cum *mucilag. gumm. iragacanth.* qui in ore continuo volvantur : quod si quis præterea tempora, carpos, & præter alia præcordia & aut *balsamo* illinire velit, is

*℞. ol. destill. junip. ʒij.*

*citr.*

*succin. a. ʒj.*

*camph. gutt. xxiv.*

*M. & dicto modo usurpetur.*

Sunt qui *amuletis* multum tribuunt, & rectè, modò non recipiantur nociua, qualia sunt arsenicum & similia, & hujus loco *℞. magnes arsenicalis. Ang. Sala.* egregium amuletum, *℞. ejus q. s. e. g. ʒij. vel iij. & c. c. f. q. Benzoes f.* Trochiscus, syndone rubro obducendus, & circa regionem cordis appendendus. *Vel ℞. ʒ per fumum Hi coagulati, & ita amuleti instar appendatur. Confer. Hoferus Hercul. Med. p. 104.* Nota etiam vim Bufonum, & quantum hi valeant & præservativè ceu amulera, Nempe *℞. bufo* per caput perforatus, & ita appensus, vel adimitat. *Helmont. de Tumul. pestis f.* Trochisci ex ipsis bufonibus, eorumque vermiculis rejectis in patella cerea, & ita appendantur. Alii ex ossibus bufonum, vel etiam bufonibus integris, ichthyocollâ exceptis, ad colulum gestandum amuletum parant, veneni attractivum & præservativum.

*Curationis totius cardio* in eo vertitur, ut *μιασμα* venenosum ab extra susceptum intra corpus, potenti sudorifero foràs educatur. Fundamentum suggeritur natura, quæ curatura pestem, deponit venenum, & ab hoc vitiatam materiam, veneni tamen atrociam simul corruptentem in bubones & carbunculos, & ita pestem curat, adeoque peste afflicti confugiant ad *sudorifera alexipharmaca*, quibus ob penetrantiam summam semper addenda *camphora*. Sed observetur.

I. *Alexipharmacum repetendum sapius*, singulis 8. horis, ita, ut in 24. horis æger ter sudet : nec metuenda nimia virium prostratio, cum ferè melius habeant, dum sudent ægri, interea, remittente sudore, analeptici acidis spirituosis & similibus refocillentur, etiam si quoque bubo & anthrax sit magnus cum levamine, & utut petechiæ sint copiosæ, sudorifera tamen sunt continuanda, ne fiat recidiva. Interim in sudore eliciendo, texturæ ægri, raræ vel densæ, virium infirmarum vel validarum, malignitatis majoris vel minoris sedulo habenda ratio.

II. *Æger sudans à somno* debet arceri. Somnus enim impedit convenientem veneni per sudorem expulsionem. Quod si somno nimis infestetur, subinde spongia aut linteum aceto vini vel rosaceo nonnihil camphorato, imbutum natibus admovendum, ut ejus odore somnus arceatur.

III. *Dum sudad æger, ℞. panis parvus & furno calens*, detrahatur crusta in-



terior, excaveretur circa medietatem aliquantulum. Cavitas theriaces ʒij. repleatur, ac ita umbilico imponatur. Venenum enim à pane, ut vocant, attrahitur, quod alii faciunt, si æger abhorreat à remediis, peste correptus. *℞.* Panis secalinus adhuc recens calidus, in crusta fiat inferiori foramen quantitate imperialis, infundatur spiritus vini camphoratus, & ita dictus panis imponatur abdomini, ut foramen respondeat umbilico. Sic æger incipiet sudare, venenum verò pani se insinuabit, qui propterea defodiendus est.

IV. Ubi adest *agrypnia*, aut ex hac *delirium* imminet, aut adsit nimia inquietudo, tunc subinde necessarium videtur, sudoriferis de laud. opiat. addere aliquid, præsertim in principio, ut symptomata coerceantur, & post sudorem abstersum blandus sopor sequatur. Scil. leviter nonnihil abstergendus est æger, ne frigidior æt. liberum offendat. Abstergatur verò linteis probe calefactis, sulphure, succino, thure & myrrha probe suffumigatis.

V. Pestis interdum conjuncta est cum *febre ardente*. Hæc si adsit, & insignis effervescencia totam agitaverit massam sanguineam, mitius commodè Mithridatum, aut therica conceditur, eaque nonnisi acidis temperata propinetur. *Diascordium Fracastorii* tutius tunc usurpatur, quando *fixa antimontalia*, & *salia lixivialia* usurpantur: aliàs periculum est, ne dum veneno resistimus, febrem nimis intendamus. Si verò cum peste *febris mitis aut nulla* adsit, convenientius illa theriacalia aromatica usurpantur, ut debita sanguini & corpori æstuatione restituantur, & hujus medio expulsio promoveatur.

VI. *Acida* nunquam omittenda, quin eadem temperata nunc sudoriferis addenda, nunc in sudoris declinatione, & post sudorem propinanda, cum ægrum reficiant, & simul malignitati quodammodo resistent. His ipsis tamen acidis semper aliquid sudoriferi addendum, ut corpus si non in perpetuo sudore, saltem in perpetua diaphoresi aucta plus minus conservetur.

VII. *Vesicatoria* in peste affectis fausto cum successu applicantur, paribus scil. in casibus ac circumstantiis, atque in malignis febribus eadem explicari hætenus diximus. Nempe *fonticulus* in præsertione, *vesicatoria* autem in curatione melius conducunt. Admoveri potest partibus variis, vertebis colli, versus humerum aut carpum, cruribus & suris internis, quin simò & bubonibus subinde applicantur cum fructu. Talia enim vasa cujuscunque generis calefacientia, & unà cum serosa colluvie & noxiis humoribus, per ulcerum portas miasmata pestifera educuntia sunt, ut taceam à partibus nobilioribus revulsionem, atque à vicinis derivationem. Sed ut celeriter operentur, acerrima sint hæc ipsa. Sequens massa in ultima peste Londinensi fuit experta.

*℞. pic.*

Quibus finit  
3 viij. vel ʒi  
tquillit. q.  
massam. Pa  
exerat. Exc  
cantharid  
bus dolor  
tis. Exist  
de magne  
hæcipla, n  
urinæ ard  
ubi mictu  
applicand

VIII  
vires labef  
observat.  
bent, idq  
bunculi,  
de febb. p  
tius in an  
& anthra  
nis necelli

IX, I  
tur nausea  
habent al  
cit Linda  
thraces,  
ne conat  
est, bubo  
mitiorum  
Si vor  
queant,  
tunc sol  
ad collu  
ut dicit  
porrigan



℥. pic. naval. ℥v.  
galban. ℥j.  
cera ℥iſſ.

Quibus simul liquatis, & ab igne semotis, addatur pulvis cantharidum prepar. ℥viii. [vel ℥j. fermenti veteris, sem. ammeos an. ℥iij. Euphorb. ℥j. cum aceto squillitic. q. s. incorporentur, assidue agitando, quousque cogatur in Emplastri massam. *Pars autem ad ruborem prius fovenda*, quo vis emplastri eo potentius se exerat. *Excitata ulcera diu aperta relinquuntur*, Emplastro de meliloto, pulvere cantharidum insperſo, locum iterum atque iterum sauciando. Inflammationibus doloriferis opportunè succurrendum, foliis brassicæ ulceribus superimpositis. Existimo tamen in peste morbisque malignis huiusmodi epispasticis semper de magnere arsenicali aliquantulum addendum esse. Utur autem multum profinc hæc ipla, *non tamen indiscriminatim omnibus admoveantur*. Nempe ubi urget urinæ ardor, ejusque incontinentia, sphincteris vesicæ inflammatio, vel ulceratio, ubi mictus cruentus, si mulier in utero habeat, vel si inter fluxus menstruus, nec applicanda in nimia virium prostratione.

VIII. *Satius est in peste planè abstinere à venæ sectione*, quam eadem vires labefactare, (cujus exemplum funestæ sc. sectionis vide apud *Verzascham observat. Medic.* 58.) Plura incommoda venæ sectionis insecta eam prohibent, *idque eo magis*, ubicum peste alvus fluere cœpit, vel ubi bubones ac carbunculi, aut petechiæ se manifestent. Vid. *Hodges de peste.* p. 157. 168. *Piens de febb.* p. 179. unde cautè legendus, nec faciliè apud nos imitandus *Septarius in animadv.* p. 112. dum quibusdam in casibus, apparentibus jam bubonib⁹ & anthracibus, venæ sectionem instituit, ut ræcam paradoxon, vid. venæ sectionis necessitatem, quam in peste persuadere conatur. *Sydenham. observat.* p. 39.

IX. In principio morbi, ubi venenum est adhuc in primis viis, quod testatur nausea, commodissimè adhibentur *vomitória*, addendo ea, quæ vim habent alexipharmacam. Sane purgatio nulli, vomitio pluribus salutaris, dicit *Lindanus*. Et ubi jam mox in principio incipiunt apparere bubones & anthraces, necessitas verò ulterius suadeat, ut propinetur vomitorium, tunc, ne conatus nature, per tales tumores expellentis, venenum impediatur, consultum est, buboni & anthraci attractivum remedium applicare, ne dum propinetur vomitorium, tumor recedat.

Si vomitus adeò vexet ægros, mox sub primo insultu, ut remedia retinere nequeant, imitandus venit *Hodges de peste* p. 196. & *Sydenham obs.* p. 152. Nempe tunc solo tegumentorum pondere & custodia (nisi quod linteaminis pars subinde ad colligendos halitus vultui superinducatur) sudor provocandus: item, ut dicit *Sydenham*, cum materiæ morbificæ radii versus ambitum corporis se exporrigant, illicò alvi profluvium & vomitiones ab iisdem introsum reflexis,



ac in ventriculum & intestina decumbentibus provenientes, ultro sedantur, adeo ut quantumcunque stomachi subversio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probè retineantur, ac ad sudores ex voto proliciendos conducant.

Quoad *remedia generale alexipharmacum pro peste nondum inventum* est, nisi *camphoram* aut *basones* quis velit substituere, quæ tamen non videntur sufficere, cum deprehentum fuerit, diversis temporibus diversa etiam remedia peculiare obtinuisse vires. Quod si specialia pestis ac appropriata remedia nondum inventa fuerint, generalibus istis in febribus malignis usitatis utendum erit, quibus pro symptomatum varietate & alia subinde admiscenda. Vehicula talium remedium ut plurimum sunt aquæ destillatæ, aceto sambuc. rutæ, aut theriacali imprægnatæ. Remedia inter ipsa excellit sæpe laudata *Camphora*, unde & *Henisii* oleo suo pestilentiali, ex oleo destillato succini, citri & camphoræ composito, ad gtt. x. vel xv. pro circumstantiarum varietate propinato, multa in peste Veronensi præstitit. Hinc *Mindererus* de peste inquit: Meo iudicio camphora plus virium in peste obtinet, quàm vel pretiosa quælibet medicamenta bezoarica (vid. *Anatom. Camphora D. Mæbii cap. 13. p. 50.*) sunt qui

℞. camphor. ℥j.

album ovi ℥vj. destillant per retort. liquorem cum spir. vini cohobant, pro alexipharmaco pestilentiali. Hinc & *spiritus vini camphoratus*, ut *spiritus vini theriacalis camphoratus* tam egregius est in his morbis. Unde à nonnullis hæc duo remedia ab *Unzero* de peste præscripta extollunt.

℞. aq. vitæ vel theriacal. ℥vj. vel ℥j.

croci ad quant. cicer.

camph. ℥ß. M. infecto adulto detur totum, juniore dimidium, ac superbiberè potest parum aq. card. bened. ad proliciendum sudorem.

Vel alterum. ℞. Theriac. And. ℥ij. vel ℥j.

flor. sulphur. ℥j.

camphor. gtt. xv. M. D. totum infecto, expectando sudorem. Juxta camphoram & *spiritus C.C.* ritè paratus, ac *sale volatili* probè acutus, ad ℥j. exhibitus egregius est in curanda peste. Crebra experientia in peste Londinensi confirmatus refert *Hodges* de peste p. 184. Juvenem summa spirandi difficultas tenebat, arteriæ vibrando cessare videbatur, omnia demum ultimum spiritum languentis in labiis supremis enunciabant. Exhibui spir. C.C. ℥j. cum ℥iij. aq. scord. compos. morbo pertinaciter hærente. Post trihorium iteravi potionem, addendo spir. ℥j. & admota erant etiam vesicatoria. Semihora vix elapsa calor viguit, æger ab orco revocatus fuit. Tandem cum exitus in facili erat ulcerum, in furis à vesicantibus excitatorum decoloratione, nec non

ser-



sensus abolitione sphacelationem imminuentem minitante partib<sup>9</sup> affectis profundè incisis & scarificatis &c. hausto etiam bis de die, medio memorato, res iterum in integro &c.

*Bacca hederæ arbor.* ad ℥j. in vino. vel aq. cum card. bened. assumptæ sæpius in peste tanquam proficuum admodum remedium fuerunt observatæ, quibus etiam vix cedere videntur *Bacca juniperi*, adeo ut ejus robore non immeritò Theriaca Germanorum vocari possit. Hinc sunt, qui commendant sequens Electuarium in peste præservativum & curativum remedium.

℞. rob. juniper. ℥iij.

Elect. de ovo.

mithridat. an. ℥jss.

theriacæ ℥iij.

flor. sulph. ℥iij.

myrrh. ℥iij.

camph. ℥ij.

croc. or. ℥ss.

succ. citri ℥ss. l. q. ad consistentiam Electuarij: de quo ad præservationem sumitur quantitas castaneæ, pro cura verò ℥iij. vel ℥ss. in aq. card. bened. & aceros. an. ℥j. M. hauriantur una vice.

De *Allio ejusque caputibus*, contusis cum aceto vel vino assumptis in peste sudoriferis, res alias nota est. Præter remedia ex *cervo*, item *viperis* notissima, egregii sunt *bufones*, dum præter usum externum sal volatile bufonum potens est & diaphoreticum & diureticum. Quidam recipiunt bufones vivos, quos in spiritu vini submergunt, & ita suffocant, & V alexipharmacum acquirunt. Bufones ita maceratos per retortam destillant, spiritus & sal volatil. egregii usus præparant. Quibus rædiosi sunt hi labores, ℞. bufones ab interioribus purgatos, exsiccant, pulverisant, & cum hepate proprio similiter exsiccato in forma pulveris à ℥ss. ad ℥j. propinant, pro remedio antiloimico. *Stercus humanum* non ultimum est inter alexipharmaca. Observatum fuit, quod stercus proprium, cum urina propria haustum, per vomitum, alvum & sudorem curaverit, de quo conf. etiā *Riverium in obs.* unde & in *Zacut. Lusit.* non pauca prostant exempla virtutis hujus stercoris humani contra morsum viperarum, aliorumque animalium venenatorum. Conf. hic *Saar in seinen Ost. Indianischen Kriegsdiensten*. Et certum est, *stercus humanum* buboni pestilentiali applicatum, optime curare *bubones pestilenciales*. Ex regno minerali excellunt sulphurea, tam ex sulphure communi, quàm in specie ex *℥ii* ritè parata. Præterea, quæ *Kircherus & Helmontius* habent, *Petr. de Castr.* testis est, in peste Romana felici admodum successu exhibitæ fuisse *sulphuris tenuissime triti ℥ij. cū uncis aliquot aceti fortissimi*, quibus simul adderem *camphoram*. Unde & potius quilibet in peste sulphurandi sunt.

De



De *potionibus theriacalibus* aliisque similibus pharmaceuticis sufficiant ea, quæ hinc inde circa malignas fuerunt monita: ex his facile est parare formulas, v.g.

℞. Theriac. Andr. ℥j.

bezoard. min. ℥ss.

Camph. gr. vj.

acet. bezoard. q. s. F. Bolus pro una vice, expectando sudorem.

Item

℞. ♂ diaph.

flor. sulphur. an. ℥ss.

sal. volatil. viper. ℥j.

camph. gr. viij. vel x. M. divide in 2. partes æquales pro ♂ sudorifero,

Vel

℞. aq. card. bened. ℥j.

liq. C. C. succin. ℥j. ad. jss.

camph. gr. v.

syr. de scord. ℥ss. M. pro haustu.

Item

℞. aq. card. bened. ℥jss.

acet. theriac. ℥vj.

diascord. Fracast. ℥ij.

camph. ℥ss.

syr. acetos. citr. ℥iij. M. pro 2. dos.

D. Michael. cum successu, usurpavit sequens Electuarium.

℞. specier. nostrar. alexiteriar. ℥jss.

pulv. Saxonie. ℥jss.

theriac. opt.

mithridat.

Elect. de ovo. an. ℥j.

flor. sulphuris ℥vj.

camph. ℥iijss.

ol. pestilent. Croll. ℥jss.

destillat. succin.

citr. an. ℥j.

syr. de scord. q. s. M F. Elect.

S. Sonderliche Diffselwerg. dos. ℥j.

Hoc ipso multi milites ab eo conservati fuerunt.

Vel

℞. Tinctur. bezoard. ℥j.

℞. C. C. ℥j. M. pro 1. dosi.

Loco Tincturæ bezoard. à quibusdam secretus habetur ☞ pestilentialis sive antiloimicus.

℞. ⊕ benè calefact. ℥j.

Irrora

camph. ℥ss.  
uniatur liquo  
antiloimicu


Sympto

In Bu

rativa. 3. n  
bonum op  
sudor pfov  
cus ad motu  
sunt, qui su  
men minus  
expectanda  
vel lividus,  
protinus eti

Ea vero,  
nus tumore  
♂ lato mist  
lectim dolo  
ctione vene  
mollescant  
exicati cum  
huc Empla  
fures epider  
plus in rece  
Sala præte  
scriptis vid  
67. ex ipso  
ducit: Bu  
infignis: c  
alliciunt, f  
vel plures  
in peste ex  
monii eru  
liantur in



Irrora cum .  $\text{℥ij}$ . destill. per Gram vitream.  
in  $\Delta$ . intensiori. Jam

$\mathcal{R}$  tart. rectific. part.  $\text{ij}$ .

Viridi ætis modo præp.  $\text{p. j. ℥}$ . Mistis his, adde singulis uncis  
camph.  $\text{℥ ℥}$ . ponantur vitro bene obturato in digestionem, donec camphora  
uniatur liquori. Si cum aliqua particula opii digeratur & filtretur, dat Elixir  
antiloimicum egregium.

*Symptomata* frequentissima Pestis sunt *Bubo & Anthrax*.

In *Bubone* curando tria externa sunt applicanda: 1. attractiva. 2. matu-  
rativa. 3. mundificativa & consolidativa. Utur enim sint, qui discussioni Bu-  
bonum operam dare volunt, minus tamen consultum hoc arbitror, nisi simul  
sudor provocetur: liquidem & bubones sponte recurrentes vesicatoriis extrinse-  
cus admotis; his vero internè propinatis denuò proliciendi erunt. Equidem  
sunt, qui suadent bubones crudeos mox esse aperiendos & incidendos, quod ta-  
men minus commodè videretur, quin potius aliqualis saltem ejus maturatio  
expectanda, plus minus perfecta, pro circumstantiarum varietate, nisi bubo sit  
vel lividus, vel niger, ita ut gangrænam minetur, nullâ expectatâ maturatione  
protinus etiam crudus aperiendus est.

Ea vero, quæ applicantur pro attrahendo veneno, & maturando simul plus mi-  
nus tumore sunt varia. Quidam & ceptas coctas, easq; contusas cum sinapi albo  
mixto mistas, applicant bubonibus ceu potens attractivum; loco sinapi, ubi præ-  
sertim dolor intentius urget, *theriaca* dicto modo cum cepis applicetur pro edu-  
ctione veneni, & maturatione abscessus. *Bubones* exiccati in vino macerati, dum  
mollescant, buboni impositi, potenter malignitatem attrahunt, vel  $\mathcal{R}$  *busonis*  
*exiccati cum*  $\nabla$  *scorzonæ*. in forma cataplasmatidis imponitur buboni. Pertinet  
huc *Emplastrum attractivum Magnet. Cnophel*: quod vide in *method. med.*  
*fetres epidemicas* pag 60. 61. & c. it. pag. 104. Elegans est *Emplastrum*, & quod  
plus in recessu habet. Reliquis ferè *Emplastrum magneticum O-Ose Angeli*  
*Sala* præfertur, cujus descriptionem ac legitimum usum penes Autorem in suis  
scriptis vid. in spec. in *Barbette. descript. pest. Bern. Verzascha obs. Medic. cent. obs.*  
67. ex ipso *Barbette*, idiomate Germanico, in latinum translato, *descriptionem ad-*  
*ducit*: Buboni statim *vesicatorium* applicato, etiam si tumor non sit magnitudinis  
in signis: *cucurbitulas* intermitto, quoniam illæ bonos æq; quàm malos humores  
alliciunt, sanguinem alterant, & dolorem & febrim excitant. *Vesica* post horas octo  
vel plures dissectæ *Empl. magneticum* imponi jubeo, cujus sanè tanta virtus  
in peste existit, ut nullum nobilius mihi innotuerit. *Formula talis est*  $\mathcal{R}$ . an-  
timonii crudi, sulphuris flav. arsenic. alb. an.  $\text{℥ij}$ . subtilissime pulverisata sepe-  
liantur in phiola in arenâ, subministretur ignis, donec colliquecant, &  
E e e colore



calorem rubeum vel subrubrum induant; vase refrigerato, exime materiam, quæ magnes arsenicalis vocatur, & venenata amplius non est, ut in canibus cuihbet experiri licet. Postea ℞. gumm. serapin. ammoniac. galban. an. ℥℥. ol. succin. ℥ij. terræ vitrioli dulcis. ℥j. gummata dissolvantur in aceto vini forti, & per pannum lineum expressa bulliendo iterum inspissentur ad priorem consistentiam: deinde seorsim colliqua ceram & terebinthinam, & extra ignem agita, donec in spissitudinem redigantur: adde porro supra dicta gummata & magnetem arsenicalem cum terra Oliac ℞. succini, sic habebis Empl. ad extrahenda omnis generis venena efficacissimum. Emplastrum istud hisce viribus præditum observavi: Cuti impositum ne minimam quidem escharam producit, interim malignos humores tam egregiè extrahit, ut bubo juglandi similis intra 4. aut 6. dierum spatium prorsus tollatur: verum hoc non semper tam citò succedit, & hæc est causa, quare necessitas, ad humores subito evacuandos, sæpe numero vesicam prius excitare desideret; imò in corporibus robustioribus escharam non producit, nisi ope vesicatorii non solum cuticula, sed etiam cutis quædam porriuncula corrosa fuerit: in corporibus autem tenerioribus nullo vesicatorio præmisso escharam per se excitat. Crusta hæc veneni extracti vera sedes est, quare mediocriter crassa reperitur, cute superficialiter tantum corrosa, quod consideratione dignum est; nam inde colligitur, cur illa multò citiùs separetur, quàm aliæ crustæ artificialiter excitatæ: horis enim 24. aut 36. effluxis, solius spatulæ auxilio, nulla præcedente scarificatione absque ullo, aut saltem exiguo cum dolore auferri potest, si solum unguentum basilicon usurpetur. *Separationem escharæ sequens unguentum* etiam egregiè promovet. ℞. mellis virgin. axung. anat. an. ℥j. fuligin. camin. ℥vj. terebinth. ℥j. vitell. ovi, nuro ij. theriac. ℥ij. ol. scorpion. q. l. F. unguentum. Quod si tumor crustâ primâ ablata sufficienter non sit imminutus, emplastro prædicto magnetico secundam vel tertiam excitabis. Tandem *ulcus consolidandum emplastro de minio vel albo cocto*, aut *diapomphol.* Sed nimium ad *consolidationem non festinandum*, ne humor venenatus in corpore adhuc latitans novum morbum, vel ipsam pestem inducat. Idem *Verzacha curationem bubonum pestilentialium Chirurgicam in eadem observatione tradit.* Methodus medendi externa, ait, qualem in bubonibus inguinum pestilentialibus ex iussu meo Chirurgi instituerunt, tali modo absoluta fuit. Ante omnia ad tumoris evacuationem & veneni extractionem commune vesicatorium ex ℥j℥. ℥is cantharidum cum ferment. & aceto mixta, in parte bubonis inferiore applicare, atque post 8. vel 10. circiter horas excitatâ & ablatâ vesicâ folium betæ aut brassicæ rubræ aut raparum oleo inundum imponere iussi, ut venenati humores melius effluere possint. Secundo die *emolliens & suppuratorium Cataplasma* toti buboni à Chirurgo admotum fuit. ℞. mic. panis, tritic. alb. ℥ij. farin. alth. lil. alb. an. ℥j. herb. malv. scabios. scord. rutæ. flor.

flor. Chamom.  
num. vj. cepa  
de ol. scorp.  
vitell. ovorum  
smate ad com  
pebantur, ill  
& pure emis  
Apostol. ℥ij  
℥j. vitell. ov  
davit. Mo  
patur, in m  
lius loco se  
gum; an. ℥j  
tulum excava  
contundere  
cum felici su  
nem deduci  
præced. huc  
Loco hu  
usurpavit.

Hæc ipsa em  
unt, & maliq  
bonem har  
latis promit  
factâ eschar  
malignitas

Alii p  
applicata s  
quo cum  
imponunt



flor. Chamomil. melilot. an. ℥j. farin. sem. lini ℥ss. fœnugr. ℥ij. ficuum recent.  
num. vj. cepar. num. iij. pulv. & coq. in aq. font. ad formam pultis, sub finem ad-  
de ol. scorp. ungu. resumt. an. ℥ss. theriac. Andromach. ℥ij. pulv. croci ℥ss.  
vitell. ovorum num. iij. F. s. a. Catapl. Quando autem bubones solo hoc Catapla-  
smate ad completam suppurationē perducti propter cutis densitatem non rum-  
pebantur, illos in parte decliviori Chirurgus Scalpello, lansetta dicto, aperuit,  
& pure emisso *ad ulcus mundandum sequenti linimento* usus fuit. ℥. Unguent.  
Apostol. ℥ij. terebinth. Venet. mell. rosat. an. ℥ij. theriac. Andr. ol. scorpion. an.  
℥j. vitell. ov. num. j. F. linim. Postea Chirurgus more consueto ulcus consoli-  
davit. Monendum hic est, quod prædictum Cataplasma, cum facile corrup-  
patur, in magna copia parari non debeat. Unde si tam citò haberi non possit, il-  
lius loco sequens *emplastrum* substituatur. ℥. Emplastr. melilot. diachyl. c.  
gum. an. ℥j. ol. scorpion. q. s. M. Pauperibus mandavi cæpas magnas aliquan-  
tulum excavatas sub cineribus assare, dein axungiam suillam admiscendo illas  
contundere, & ad formam Cataplasmatibus buboni imponere, quod remedium  
cum felici successu usurparunt. Si istis medicamentis bubones ad suppuratione-  
nem deduci nequeant, Medicis futuris Loimiatri *methodum Barbettianam* pag.  
præced. huc relatam, commendat *Verzascha*.)

Loco hujus *D. Michaël* in Peste pro curandis *bubonibus & carbunculis* hoc  
usurpavit.

℥. Empl. diach. c. gum. ℥jv.

℥is fol. uvæ in vers. sive parid. ℥j.

magnetis arsenical. ℥ss.

cum ☉ scorpion. & araneæ. Minderer.

F. Emplastrum.

Hæc ipsa emplastra magnetica in cute tenuiori & textura ratiore optimè suffici-  
unt, & malignitatem extrahunt, ut eadem sub forma crustæ & escharæ super bu-  
bonem hæreat, *sed* in cute duriori, aut in bubone profundius latente, aut non  
satis prominente, applicandū prius venit *vesicatorium*, quod post 7. vel 8. horas  
factâ eschara aperiendum, & hinc dictum Emplastrum imponendum, donec  
malignitas sufficienter extracta, & crusta remota fuerit.

*Alii* præmisso vel omisso vesicatorio ℥. herb. parid. Mij. (hæc enim sola  
applicata suppurare & maturare bubones dicitur) *alii fermentum* recipiunt, ex  
quo cum *scrophularia*, additis & *baccis herbe parid. cataplasma* faciunt, & ita  
imponunt.

℥. Rad. lilior. albor.

alth. an. ℥ij.

ficuum pingv. N. ij. vel iij.

coq. c. f. q. ☉ lil. alb. ad consist. catapl.

E e e 2

adde



adde fulig. splendent. ℥i.

sapon. Vener. ℥vj.

ol. ranar. ℥ij. M. p. Cataplasmi.

Hisce remediis *mitigatus nonnihil bubo aperiendus venit*, quia periculum est, si perfecta suppuratio expectatur, & sponte tumor rumpat, ne propter dolorem ac ardorem, subinde atroces, virus dissipentur, vires prosterantur, ac sanies pestilens retrorsum regurgitet, unde *vel* scapello aperiendus est, *vel* cauterio potenciali applicata exitus materiae patefaciendus. Talium loco & sequens *emplastrum* ab *Hodges* expertum applicari potest.

℥. Empl. oxycroc. ℥ij.

Galban. colat.

gumm. caran. an. ℥i.

pice naval. ℥ij. liquatis simul cum ℥ chamom. vel lilior. F.

Massa pro empl. quod plusmillies chirurgica manus vicem supplevit. Apertio tamen Bubonum artificialis auspiciat, ipsi habetur. Aperto bubone vel sponte, vel scapello, usurpetur *balsamus* & *anisat.* vel *terebinth.* in istus cum *unguento basilicon.* & *theriaca*, imponendo desuper emplastrum *diapompholyg.* donec mundificetur & consolidetur ulcus, observando, ut istud quam diu possibile apertum servetur. De cetero *probe attendendum*, ne acetum bubonibus applicetur, teste *Hildano* in suis observat. Sic pariter nec *opiata* propter dolorem, nec *china* propter ardorem applicanda veniunt, ne venenum pestilens vel interiora repetere cogatur, vel talium abusu sphacelus partis introducat. Quod si *bubones* *oedematosi* aut *rebelles* fuerint, quomodo tractari debeant vid. in *Horst. obs. p. 350.* & 351. Nec & unguentis aut emplastris contra bubones addendus est, ut recte monet *Barbette*. Exinde enim mortem observavit *Schenckius* in suis obs.

*Parotides* eodem modo tractandæ sunt ac Bubones.

Quoad *Carbunculos* & *Anthraces*. Cognoscuntur facile, si cum colore purpureo & puniceo emergant, & circum circa circulus rubicundus, qui melior, aut lividus, qui deterior se representet. *Carbunculus* talis facile serpit, & gangraenæ instar vicinas partes inficit, donec tandem pars mortificata excidat. Interdum saltem *pustula alba* apparet, materiam quasi coctam continens, quæ aperta aut compressa sicca ac profunda in partibus carnosius radicata apparet. Interdum *pustulae plures*, quasi hydatides (wie *Wasser-Bläschen*) emergunt, sub quibus durities inflammatoria apparet, &c.

*Carbunculus* talis quicumque nil aliud est, quam incipiens partis mortificationis, unde in *Cura* 1. mortificationis vicinas partes inficientis progressus inhibendus. 2. Substantia mortificata separanda. 3. Ulcus relictum mortificandum.

dum. Nota  
fit ab aliis oleis  
quidam expit  
ex molli galba  
cum crusta a  
lem atque leu

Pro primo  
Præcaver enim  
neni tora exte  
ubi de peste

Marcus M  
carbunculi  
ex ol. lini &  
bulstro ℥ij  
Hoc enim  
cidere facit.  
magnet. An  
descriptio vi  
terium a dū  
facto eschar  
bunculos, &  
c. Emplastr  
ulcus prob

Ea qu

interno o  
fati ℥ij. &  
ne dissolvant  
tea, & appli  
per opus el  
cum exerce  
modus ex

In Do

ris febrium  
machi,  
desumitur  
fere præc  
etiam ante  
phalagis



dum. Notandum aut in genere, quod dum ardor summus est, abstinendum sit ab aliis oleis & pinguibus, quia quandoque sphacelismi periculum inducunt: quidam expiscantur, *utrum curabilis vel lethalis sit Carbunculus*, Emplastrum ex molli galbano imponunt, quod si anthraci tenacissime adhæreat, ut non nisi cum crusta avelli queat, salutis spem esse asserunt, si ei non adhæreat, incurabilem atque lethalem.

Pro primo igitur scopo sapphiro in cute ducatur circulus circa Carbunculum. Præcaver enim non tantum, ut ulterius non serpat; sed præterea etiam vis veneni tota extinguatur, ita hoc non tantum affirmat *Hartmann, in prax. chymiatr. ubi de peste*, item *Helmont. Tr. de magnet. vulner. curat.* Sed videatur etiam *Marcus Marci in philosoph. vet. restitut.* ubi de magnetismo sapphir. hinc apex carbunculi illinatur butyro  $\frac{3}{4}$  ii quantitate nummi: hinc applicetur raptorium ex ol. lini & chamom. cum Croco *Hartmann ubi de peste §. 15.* vel locotalium butyro  $\frac{3}{4}$  ii extremitates anthracum attingantur, siue circumducatur circulus. Hoc enim non solum progressum mortificationis inhibet; sed etiam totum excidere facit. Talibus factis, vel mitiori in malo sine his applicandum est. *Empl. magnet. Ang. Sala*, utpote quo non datur melius, vel *empl. de fuligine*, cujus descriptio vid. in *Horstii obs. p. 349. 356.* Alii non ineptè mox applicant cauterium actuale, utpote in parte plus minus mortificata minus dolorosum, hoc facto escharam raptorio successivè separant, &c. His factis, ubi exciderit Carbunculus, & substantia suppurata probèeducta fuerit, idem unguent. *Basilcon. o. Emplastro tetrapharmac. & theriac.* usurpandum; Balsamo vero  $\frac{3}{4}$  is anisato ulcus probè est mundificandum.

Ea quæ actum in genere mitigant, sunt in si ecie *Gata*. v.g. pro usu interno  $\odot$  *Giatum*, in potu ordinario dissolutum,  $\frac{3}{4}$  i. ad Mß. aut etiam  $\frac{1}{2}$   $\odot$  *Giatum*  $\frac{3}{4}$  i.  $\odot$  *diaph. Gij.* M. pro 2. dof. it. *arcan. duplic. it.*  $\odot$  *dulcis &c.* Externe dissolvantur.  $\odot$  *in succo sempervivi maj. & acet. rosac.* quibus intingantur linthea, & applicentur pulsibus. it. fronti & temporibus. Sed observandum non semper opus esse refrænare calorem, nisi ubi modum nimis exceßerit. In febribus cum exeretione cutanea conjunctis, calor haud faciliè sufflaminandus erit, ne modus excretorius impediatur.

In *Dolore capitis, vigiliis & deliriis* notandum, sæpius dolorem capitis febrium continuarum imprimis benignarum esse saltem per consensum stomachi, vel primarum viarum saltem in principio. Cujus ratio exinde desumitur, quod vomitorio in principio morbi dato, ut præcaventur omnia fere præcordiorum symptomata, ita speciatim cephalalgia, quam interea etiam antea fuerint, remittat. Quia & clysmata injecta in  $\frac{1}{2}$  i. cum co-phalalgia subinde eandem notabiliter levant. Sunt tamen & febres cum



fertim *maligna*, quæ genus nervosum, adeoque & caput *primario affligunt*. Hinc æstu corporis utcumque moderato, caput, præsertim circa frontem, intense ardet, agrypnia adfuit plus minus, interdum planè non dolet. *Febres sunt pessima nota*, quibus correpti, rarò evadunt, nempe spina maligna capiti & nervoso generi infixæ est, unde illa symptomata. Quoad *vigilias*, hæc pertinaces in febribus *vel* hypochondria ac præcordia malè affecta sequuntur; & tunc inquieti, & plus minus jactabundi solent esse ægri, *vel* capitis sive cerebri malè habentis sunt pedissequæ, & tunc intensior incalescentia circa frontem, oculi fulgidi, capitis plus minus perturbatio, item subinde dolor per essentiam adesse solent, ægri minus inquieti sunt. Hæc ipsa symptomata diutius si durent, aut gravius affligant, delirium post se trahunt, cujus comes tandem sunt convulsionibus.

*Dolor igitur Capitis*, si in principio est, adeoque non portendat judicationem, vel crisin, curandus venit. Si vero febris sit valde intensa, adfuitque salutis signa, supervenerit vero capitis dolor, cum ipsa prope judicationem venerit, nil oportet tentare, quia interdum talis cephalalgia solet esse signum decretorium, vomitum vel hæmorrhagiam præfagiens. Par ratio est quoad *Vigilias*, in quibus criseos tempore vel præsentis vel instantis anodyna, aut plus minus somnifera minus tuto applicari possunt. Internè verò mala hæc curat in genere *papaver*, & quælibet ex eo parata opiata. Externè verò in febribus in usu est *unguentum alabastrinum*, nunc cum  $\odot$  papav. express. temporibus subinde illitum, item *Emulsio ex nucl. persicor.* v. g. *℞ iij. cum sem. papav. albi. 3j. cum ∇. flor. sambuci aut verbenæ, aut solani parata*, ac fronti tepidè applicata, nunc cum, nunc sine camph. Pariter & supputanea remedia, nempe *cataplasmata ex foliis ruta, rad. raphani & e comm. cum fermento suscepta*, & plantis pedum applicata. Denique  $\odot$  in  $\nabla$ . appropriata quavis dissolutum, cum linteis multiplicatis fronti ac temporibus applicatum convenit. *Observandum tamen* hîc, dolorem in parte capitis anteriore à febre oriri, in parte vero posteriori à proprio capitis affectu. Confer *Primeros; de febribus p. 321.* deinde quoad *Epthemata humida*, hæc minus conveniunt, quando nempe corpus in continuo est madore. Talia enim uti refrigerata fuerint, strictionem pororum capitis, adeoque & per consensum universæ cutis diaphoreseos impedimentum inferunt.

Hæc ipsa ferè & vigiliis medentur: præterea tamen & *medulla crurum vituli recens* temporibus crebrius illita, vespertino tempore somni beneficium adfert. *Emulsiones ex sem. melon. 4. frigid. major. papav. &c.* Ut interno usu, temperando sanguinis æstum & acrimoniam fermenti febrilis, vigilias subinde

inde compescunt. Internè

[Barbet  
valde parum  
conferat,  
nullum somni  
quod sequitur

Capiatur co-  
somnum bene  
tamen Auto-  
nimis debili-  
in his ab eo  
es usum se-  
dolorem sequi  
plantis verò p-



inde compescunt; ita & externè epithematis forma applicata non inutiles sunt. Internè

℞. Aq. flor. papav. rhæad. ℥ij.  
C. C. sine igne  
℥ diaph. an. ℥j.  
laud. opiat. gr. j. vel ij.  
vel essent. opij. gr. xij.  
syr. corall. ℥vj. M. pro 1. vel 2. dof.

[*Barbette de peste* scribit, opio, licet sudoriferum sit, isto pestis tempore se valde parum fuisse usum, quòd somnus primis duobus vel tribus diebus non adeò conferat. Quando vero patientes 6. vel 7. diebus continuo se insequentibus nullum somnum capere possunt, & virium defectus inde sequitur, hac ratione, quod sequitur, præscriptum & egregiè assumtum contulit.

℞. Aq. prophylact. nostr. ℥jß.  
borrag. ℥j.  
cinamom. ℥ij.  
confect. hyacinth. ℥j.  
sacch. perlat. ℥ij.  
laud. op. gr. ij. M.

Capiatur cochlearim singulo horæ quadrante, donec somnus redeat, hinc æger somnum benè naturalem, & in somno ipso dolorem sat tolerabilem capiet. Idem tamen *Autor temerarium opii usum dissuadet*, nec impuro ventriculo, ægrisque nimis debilibus, dandum esse monet, quod plus nocumenti quam emolumenti in his ab eo sit expectandum. E contra neminem meticulosum nimis esse jubet, ne ejus usum se ignorare prodat. Prius verò quàm ad laud. opiat. deveniat, *capitis dolorem* sequenti more sedare studet *Barbette*. Hederam terrestrem contusam, plantis verò pedum, ut & volis manuum hoc vel simile admoveere jubet.

℞. Fol. rutæ Mjß.  
ferment. acris ℥ij.  
fimi columbin. ℥j.  
fal. comm. ℥ß.  
aceti sambuc. q. s. M. F. Cataplasma plantis pedum & volis manuum applicandum.

Vel ℞. Bol. armen.  
terr. sigill.  
cretæ vulgar. alb. an. ℥ß.  
acer. calendul. q. s. M.  
usurpetur eod. mod.)

Inter-



Interdum *profundior ſomnus* rgros febricitantes, quaſi ſtupidos reddit, cui reſiſtunt *acet. rutæ. ſambucin.* ſive etiam *ſuccus ruta acetam iſtus.* item *caſtoreum aceto intinctum.* &c. naſibus applicata. *Veſicatoria* cervici, item carpiſ aut malleoliſ applicata ſunt optima. *Conf. Horſt. in obſ. p. 383. in Problem. p. 26.* Vel *æ. thuris, bacc. lauri, pip. nigr. an. ꝑ. ſ.* ſubigantur probè cum albumine ovorum, imponatur fronti q. s. & ſomnolentiam arcebit. [*Barbette* ed in caſu theriacam, mithridatium & diſcordium, ac ſimilia non convenire ait, quod & hæc ipſa opium in ſe habeant: ſequens autem conferre, qui vapores capitiſ & ſimul calorem ac cordiſ anxietateſ proſtigat.

℞. Sal. rutæ

ſcord.

prunell. an. ꝑ. ſ.

℥. lat. gr. viij.

aq. prophylact. ꝑ. ſ.

meliff. q. ſ.

ſyr. de betonic. ꝑ. ſ. M.

F. Hauſtus expectetur ſudor, ſomnus vero eo & ſeq. die, quantum vires permittunt arceatur.]

*Hæmorrhagia narium* varia eſt pro varietate febrium. Circa hanc notandum eſt, an hæmorrhagia ſit critica, an ſymptomatica. Critica intempeſtivè ſuppreſſa, quæ mala intulerit, & quomodo ipſa correctæ ſit. vid. *Henr. ab Heer. in obſerv. p. 70.* Hæmorrhagia talis febrium ſiſtitur, vel ſanguiniſ fluxum prohibendo, vel locum apertum occludendo, illud priuſ, hoc poſteriuſ, illud imprimiſ vellicantia, aut derivantia, aut interna refrigerantia præſtant. Quod ſi ſedata fuerit hæmorrhagia, placet conſiliuſ *Sydenham in method. med. febres, pag. 61.* Laxationem alvi eſſe inſtituendam, ſi nempe alia non impediunt. Inter interna excellit laud. opiat. & omnia papaverina etiam & præſertim in maligniſ, præmiſſiſ præmittendiſ. vid. *Tymeuſ in Caſ. pag. 378. Horſt. obſervat. lib. 1. obſerv. 27.* hinc & aq. papav. errat. cum ſyr. de portulac. & de papavere, hinc & ſucci aciduli cydoniorum, ribium, ſyr. portulac. aut plantag. ac denique terr. ſigill. lap. hamatit. corall. bezoard. Martiale, aut ꝑ. diaphor. Martiale, &c. Inter externa autem imprimiſ confert, ſi hoc ipſo abluantur manuſ ac pedeſ, vel epithemata ex aceto collo applicentur, vel creta cum aceto in forma Cataplaſmatiſ temporibuſ ac fronti applicata. Buſfo vel vivuſ lub aliſ applicatuſ, vel exſiccatuſ ſimili ratione ſub axilliſ detentus, vel pugno compreſſuſ, ut probè incaleſcat, potenter hæmorrhagiaſ ſiſtit. Denique nitruſ ad ꝑ. ſ. in aqua frigida diſſolutuſ ac propinatuſ hæmor-

hæmorrhagiaſ  
roſi, quo læpe

[Barbette o  
vel 6. labora  
nem in craſſa  
quo læpiuſ

Ex huiuſ uſuſ  
ſit n  
per acidula.  
facit ſeruſ la  
vegetabilia,  
& ſyr. citri.  
Vegetabilib  
niens eſt, ut  
[Barbette o

piuſ exhibe  
tantuſ dem



hæmorrhagias sistit. Conf. *Riverium cent. 1. obs. 48.* Quo facit *Julepus Prime-rosii*, quo sæpe usus fuit ad compescendam hæmorrhagiam aliis irritis.

℞. aq. symphit.

plantag. an. ℥iiij.

syr. de ros. sicc.

plantag.

cýdonior. an. ℥iij.

acet. vini albi ℥iij.

⊕ Gati aut sa. prunell. ℥j.

℥ li gr. x.

[ *Barbette obs. histor. 2.* in quodam peste & cum hac insuper hæmorrhagia die 5. vel 6. laborante non ausus est sudorifera continuare, sed cor confortare, sanguinem incrassare, sicque sanguinem retardare. Hujus gratia ordinavit sequens, de quo sæpius cochlearia duo haurire jussit.

℞. aq. rosac.

plantag. an. ℥iiij.

cinamom. ℥vj.

sanguin Dracon.

corall. rub. præparat. an. ℥j.

confect. Hyacinth. ℥j.

spir. salis grt. viij.

syr. berber. ℥iij.

Ex hujus usu hæmorrhagia fuit sedata, sanitas & mens redierunt.]

*Sitis* molestum perquam symptoma, sedatur convenientissime per *Ota* & per *acidula*. ⊕ *ta* interexcellit ⊕ *Giatum* in potu quovis dissolutum: quo etiam facit serum lactis depuratum, imprimis succo citri, acidulatum. *Acidula* inter tam vegetabilia, quàm mineralia excellit *Julepus* ex *△ commun.* acidulata cum *sal.* & *syr. citri*, sudorem simul movens. vid. *River. cent. 1. obs. 19. cent. 3. obs. 83.* Ex Vegetabilibus acidis vulgò notis *Tamarindorum pulpa*, aut *decoctum* conveniens est, ubi alvus simul aperienda venit.

[ *Barbette de peste pag. 615.*

℞. aq. borrag.

acetos. an. ℥ij.

prophylact. nostr. ℥j.

succ. aurant. acid.

citri recent. an. ℥ij.

julep. rosac. q. s. ad mediocrem. edulcor.

lap. bezoar. or. gr. xv. M. de quo patienti cochlear. j. sæ-

pius exhibeatur bibendum, hoc sitim magis sedabit, quàm cerevisiâ, vel decies tantundem datâ, & tamen ægrum in sudore suavi insuper detinebit. Vel:

FFF

℞. aq.



℞. aq. card. bened. ℥j.  
prophylact. nostr. ℥ij.  
syr. granator. acidor. ℥ij.

Vel: ℞. rad. *Scorzoner.* petasitid. an. ℥j.  
fol. acetos. Mij.  
coq. ex aq. hordei. Colatur. ℥j.  
syr. violar. simpl. ℥ij.  
sal. prunell. ℥ij. vel salis q. s. M.

Potus refrigerantes pro divitibus suaviores & magis confortantes hac ratione parari possunt, ita.

℞. aq. borrag. ℥ij.  
card. bened. ℥ss.  
rosac. ℥j.  
sacch. perlat. ℥ss.  
ambr. gryf. g. ij.  
Moschi gr. j.  
succ. citri recent. q. s. M.

Cerevisiam concedit, si imprægnata sit frusto C. C. usti; vel nux moschata contrita nodulo inclusa in ea detineatur. Nihilominus nec nimia quantitate, nec sapius, nec nimis frigidam bibendam esse monet, aliàs flatus, alvi fluxus, cordis anxietates & symptomata plura alia inde fore metuenda scribit. Schwache Mägen/ait idem, und mit Bangigkeit des Herzens geplagte Personen lasse ich im abnehmenden Fieber ein wenig Moseler, oder Rheinischen Weins mit Zucker und Limoniensafft gebrauchen: aber alhie ist nicht die Masse zu halten Welche den Franzwein zulassen / oder Schweiszerische Mittel darmit vermengen/ in einem grossen Fieber einzugeben / die irren meines Erachtens gar sehr.

Idem obs. hist. 5. cuidam loco cerevisiæ ordinavit seq.

℞. aq. card. bened. ℥j.  
alexipharm. ℥ijss.  
Julep. rosar. ℥ijss.  
spir. salis. gutt. viij. M.]

*Cardialgia & vomitus.* Sal ablinth. ad ʒj. datum valde prodest in vomitu & nausea febrium. Conf. *Riverium cent. 1. obs. 47.* Item *conservamenth. Extra: tormentill.* est egregium. Conf. etiam Remedia *Barbette usitata in descript. pest.* in vomitu febrium pestil. [Si mala hæc, ait idem pag. 622. non ex internis carbunculis pestilentialibus oriantur (nam & hoc ventriculum, ut & intestina occupare, certiores nos reddunt temerarii quidem, at fide digni naturæ scrutatores, qui in sectione cadaverum eos ibiprehenderunt, cui nec experien-

ria,



tia, nec ratio contrariatur: ) citra insignem laborem ista sedavi, patientem quavis semihora coch. j. sequentis misturæ recipere jubens.

℞. aq. menth.  
prophylact. nostr. an, ʒiʒ.  
cinam, ʒʒ.

Confect. hyacinth. ʒj.

sal. corall. ʒj.

syr. myrtin. ʒʒ. M.

Ex hujus usu vomitus plerumque sedatur, si præsertim regio ventriculi ter vel quater quotidie oleo sequenti inungitur:

℞. ol. nucist. expr. ʒiʒ.  
macis destillat. ʒʒ.  
absinth. ʒj. M.

interea parvus potus conceditur, sedato verò vomitu, mox sudoriferum exhibeo.

*Alvi fluxus* uti & *Tormina abdominis* curat in specie Discord. Fra-

castor. a ʒj. ad ʒij. propinatum. v. g.

℞. aq. plantag. ʒj.

acet. Sambuci ʒij.

diascord. Fracast. ʒj.

Extr. tormentill. gr. xij.

syr. plantag. ʒij. M. pro j. dosi.

Vel

℞. aq. plantag. ʒij. vel iij.

cinamom. ʒiij.

diascord. Fracastor. ʒij.

C. C. f. Δ.

antimon. diaph. gr. xv.

syr. portulac. ʒiij.

spir. nitr. dulcis, ʒj. M. capiaturo lubitu.

item *Essentia therical.* ad gut. 30. vel 40. item *extract. therical.* ad gr. iij. vel iv. aliaque similia: *anodyna* autem & *opiata* sunt optima, quibus adduntur & *absorbentia*, nempe *C. C.ustum bolus arm. terra sigill. crystall.* præpar. cum *conserv. rosar. antiqua* propinata. Item *extractum tormentilla* ac similia. *Cydoniata* denique quælibet sunt usitatissima. [Barbette l. c. p. 624. *Alvi fluxus* plerumque mortis est prodromus. Attamen quosdam, in quibus non merus sanguis vel materia cruenta prodibat, sequenti modo sedavi. Patiens ab omnibus salsis, ut & acidis, quæ aliàs in pestis curatione sunt necessaria, sicut & à potu largiore absteineat. Si sitis, quæ tum temporis ægros maximè urget, fuerit impatiens, sequentis mixturæ cochlearia duo vel iij per vices accipere jubeo.

FFF 2

℞. radic.



℞. radic. tormentill. ℥j.  
 flor. ros. rubr. p. j.  
 rasur. C. C. 3℔.  
 sem. acetos.

myrtill. an. 3j.

coq. ex aq. ferrata. Colatur. ℥ix. adde

confect. Hyacinth. 3j.

syr. Myrr. 3j. M.

*Theriaca solius* 3j. singulo quadrihorio assumpta, multis egregie contulit, ut & sequens cochleatim usurparum,

℞. Diascord. Fracastor. 3ij.

carabe 3℔.

corall. rub. præp.

Sang. Dracon. an. ʒj.

Margar. præpar. ʒ℔.

aq. fœnic. 3j.

plantag.

rosar. an. 3℔.

syr. de symph. Fernel. 3j. M.

Die Mutter oder Hesen von weissem/ und insonderheit von rothem Wein/ über den gansen Leib warm gestrichen/ und mit einem vierfachen Tuch bewahret/ hat grosse Wirkung gethan.

℞. ol. mastichin.

nucist. expr. an. 3j.

aneth.

absinth.

myrtill. an. 3ij.

Theriac. veter. 3iij. M.

Vel:

℞. bol. Armen.

Thuris,

mastich.

sanguin. Dracon. an. 3ij.

mumia 3iij.

pulv. gallar. 3℔.

sem. dauci.

levistic.

anet.

myrtill. an. ʒj.

ol. nucist.

Sudor

derati sunt ex paulò diuturni minantes, e pauperatum liata, inter rant. Con huc pleno put, ut rec

Quoa

quæ interd so sudore se tu sine crilec In talibus re 3j. M. app

De hoc

cui titulus:

servationis

Primò

frequentat

occurren

spir. acido

iz. manè s

do præterv

In locis

mayur ta



ol. nucist. expr. ʒi.

Terebinth. Vener. q. s. M. F. empl.)

**Sudores**, rarius equidem hi nimis vexant sub febrium motu, quia moderati sunt exoptati; interdum tamen post febres continuas, aut graviores aut paulò diuturniores, crebri sudores nocturni ægros vexare solent, atrophiam minantes, ex deficiente nutrimenti chylosi assimilatione, ob sanguinem depauperatum nati. Hos ipsos & emulsiones temperantes, vel absorbentia corallata, interdum etiam cum aromaticis subjunctis amaris, v. g. absinthio curant. Confer etiam Sydenham. in observat. p. 335. De cætero corpore adhuc pleno in febribus non eliciendi vi, quia facilè translatio fieri potest ad caput, ut rectè monet Ballonius Pharos. Med. p. 215.

Quoad **Vrinarios affectus**, suppressio hujus interdum supervenit, quæ interdum criseos per sudores imminenti indicium est, præsertim si prægresso sudore superveniat. Conf. H. ab Heer. observat. p. 62. Interdum in statu sine criseo indicium supprimitur, vel in delirantibus, vel alio modo affectis. In talibus regio pubis illinenda venit unguento de alib. ʒß. oleum scorpion. simpl. ʒj. M. applicetur crebrius.

De hoc affectu accuratè scribit DD. Mauritius Hoffmannus in tractatulo, cui titulus: *Verſuch von den Pest, Siebern* / edito 1680, cujus remedia tam præservationis quam curationis gratia præscripta sunt sequentia.

Primò Autor iste alimenta ex aceto vel malis citricis aut acetosella parata & frequentata commendat; Hebdomadarim tamen, præsertim mutatione lunæ occurrente, acido citri, aut potiuncula ex aqua card. bened. vel sambuci, vel spir. acido AA. aut mistura simplici usque ad ʒj. vel spir. Oli ad gutt. 6. 8. 10. 12. manè sudorem ad horæ quadrantem vel dimidiam procurare jubet, quo modo præservationis scopus observandus.

℞. mistur. simpl. ʒiiij.

per camp. ʒij. M.

S. Sauertlicher spiritus zur Vorſorge AA. biß auf 15. oder mehr Tropfen einzunehmen.

In locis suspectis, vel de tempestate nebulosa de pulvere camphorato. BB. sumatur tantum, quantum cultri culpis capit.

℞. pulv. macis alexipharm. camph. ʒiß.

rad. zedoar.

sulphur. chym. an. ʒij.

M. ad scatul. S. Campffer Pulver zur Vorſorge

g. BB.



Aut cortex citri condit. aut radix scorzonæ, condit. frequen-  
ter usurpetur;

Aut in ore detineantur *Rotula de zedoar.* vel *Angelica* seqq. C. C.

℞. pulv. rad. zedoar. ℥ij.  
angelic.

flor. sulphur. chym. an. ℥j.

M. c. s. q. sach. fin. in aq. scord. dissolut. F. *Rotulæ.*

S. *Zitwer Schausselein zur Vorsorg.* C. C.

Vel *bacca juniperi.* *Nares spongiosis aceto juniperino vel theriacali* DD. in præ-  
gnatis & in pyxide ex juniperi ligno tornata asservatis *premuniantur.*

℞. aceti theriac. August. ℥ij.

spir. theriac. camphor. ℥ij. M.

S. *Theriac. Essig zum Schämlein.* DD.

*De collo sacculus* ex floribus cordialibus & camphora paratus & interpassatus  
E. E. suspensus continuo gestetur.

℞. spec. pro Epithem. cordis rec. par. ℥β.

camphor. pulv. ℥iiij.

M. ad facul. seric. rub. cord. maj. interpassat.

Num. 1. S. *Campffer. Säcklein* E. E. am Hals hangend zu  
tragen.

vel *nodulus de zedoaria & camph.* vel *allium* portetur &c. Conclavia evapora-  
tione ex lapide ignito cum baccis juniperi acidis, vel pulvere pyrio, sulphure,  
thure, myrrha suffiantur.

In *Cura.* Quamprimùm quis præter spem ob lunc mutationem, ob  
*animi affectum*, iræ nempe, vel terroris, qui pro reliquis flammæ vitali, turbando  
sanguinis motum circularem, nocent, vel ob excessum in potu commissum,  
vel motum corporis, vel susceptum aërem venenatum, aut patientis alterius su-  
dorem, quis inflammatur & corripitur, id quod ex insolita anxiosa debilitate, ri-  
gore, somnolentia, cephalalgia, nausea ventriculi &c. eò facilius cognoscitur,  
cum revera ceteri similibus symptomatibus stipati morbi, pestilentialibus grassan-  
tibus, fideant, nil certius melius est, quam ut talis æger (ad multiplicem probam  
prisci per Germaniam & Italiam benè noti, potatoris veneni Tarquinii Romæ  
Neapolitani, qui sicut Altorph, Ann. 1662, Domin. Palmar. ita & alibi sæpius ar-  
senici gr. xij. ex vino albo sumsit, & mox Orvietano suo per vomitum reddidit,  
& veneni vim elusit:) susceptum venenum è ventriculo ut alia venena ore sum-  
ta, revocet & tractet, & statim prima, secunda vel tertia horâ sine mora, quando  
natura talem excretionis modum sponte non tentat, beneficio aquæ calidæ oleo  
imprægnatæ, vel *potiuncula acido-vomitivæ* A.

℞. oxy-



℞. oxymel. simpl. ℥j.

pulv. sal. vitrioli vomit. ℥ss. vel ℥j.

M. c. aq. hordei q. s. F. potio brevis.

S. ad vitr. **Saures Brech-Träncklein A. auf einmahl.** vel **pul-**  
**veris emetici. B.**

℞. pulv. si emetic. Myns. gr. iij. vel iiij.

S. ad Chart. dupl.

**Brechpülverlein B. in saurer Brüh einzunehmen auff 1. mahl.**  
aut **syrupi emetici. C.**

℞. Syr. emet. Angel. Sal. pro ratione ætatis ℥ij.

vel ℥ss. vel ℥vj. S. ad vit.

**Brechsaft C. mit Holler- oder Geißrauten-Wasser auff 1. mahl.**  
aut **agua benedict. D. Ruland. se disponat.**

℞. aq. bened. Ruland. ℥ss. ℥vj. ℥i. pro ratione ætatis.

S. **Brechwasser D. auff einmahl mit ein wenig Essig zu nehmen.**

(His omnibus, ut medica mentis aliis, pro ratione ætatis à minori dosi ad majorem cum judicio progrediendum, cum in compendium omnia secundum suas circumstantias contrahere possibile non sit;) & ita hærentem maximam partem in ventriculo massam febrilem malignam minuat, atque sic febrem, obstructo fonte, ut natura ipsa provida idem sæpe cum emolumento conatur, optimè & maximè trunget: Hoc autem facto, acidulo confortante ex vino tunicato, vel citriis, aut acerosella, aut scorzonera parato per duas vel tres horas se recreet, & tum statim ad *Electuarium alexipharmacum E.* properet.

℞. El. Dialcord. Fracast. ℥ss.

C. C. absque igne præpar. pulv.

sal. card. bened. pulv. ana ℥j.

gran. cherm. elect. pulv. ℥ss.

M. cum syr. papav. errat. q. s.

F. Boli. inaur. num. vj. D. ad scatul.

S. **Bißflutwerglein E. ein übergültes Rüchlein auff ein-**  
**mahl in saurem Träncklein warm einzunehmen zu schwitzen.**

Vel **acido-camphoratum pulverem. F.** in 6. partes æq. divisum, ut primo, ita & quarto, 7. 9. 11. & 14. die (utpote in quibus diebus aliàs natura libera vim suam & cooperandi virtutem, teste experientiâ, exierit. ex 4. aph. Hipp. 36. & quo tempore similes morbi acuti ut plurimum judicantur. 2. aph. 23. quando nempe rectè tractantur, atque natura robusta est, qualis in calidis regionibus & corporibus, etiam 4. 7. vel 9. diebus liberatur.)

℞. Terræ sigill. Strigens ℥ss.

C. C. Camph. pulv.



sal. card. ben. pulv. an. ʒj.

M. ad vj. chart. æqual. S. ad major.

**Campffer-Pülverlein F. ein Briefflein auf 1. mahl.**

Vel

℞. pulv. rad. zedoar. ʒiij.

C. C. absque Δ præparat. ʒij.

camphor. el. ʒj.

M. ad Cart. vj. aqual. S.

**Campffer-Puſſer F. ein Briefflein auf 1. mahl.**

Vel

℞. terr. sigill. ʒlat. vel

C. C. ʒlati ʒiij.

sal. card. bend. ʒj.

camphor. ʒß.

M. F. pulvis. D. ad vj. part. æq.

**Campffer-Pulver F. ein Briefflein auf einmahl.**

manè in potiuncula aquæ acetosella, vel galega, vel acetosa, cum 4. vel 6. cochlearibus succi expressi vel citriorum, vel acetosella, vel cum aceto rubi idæi, vel sambucino acidulatâ, bene calida capiat, & postea per dimidiam vel totam horulam, pro ratione virium, sudet. Interea conclave ex acidis juniperi baccis aut ligno juniperino recente super lapidem ignitum suffiatur, sudor calidis benè detergetur, & recensitis rebus acidis patiens refocilletur. Quando jam æger ex virium restauratione & symptomatum gravium remissione, urinaque fracta, se in meliorem statum esse translatus percipit, repetitionem *Electuarii E. vel pulveris. F.* usque ad initium quarti diei negligat, & interea, si plethorica adsit dispositio, in partibus extremis tutius ferè cucurbitulas, quàm vena sectionis usum administrabit, quotidie etiam conditi confortantis acidi G. usum, capiendo cochlear bonum, manè & vespèri, continuabit, reliquum in loco frigido asservabit, erectiq; semper animi erit.

℞. conserv. acetosell.

acetos. citri. an. ʒiß.

rad. scorzon. cond. & incis.

cort. citr. exterior. condit. & incis. an. ʒvj.

spec. liberant. ʒij.

gran. cherm. elect. pulv. vel confect. alkerm. vel cordial.

sal. prunell. pulv. an ʒj.

M. ad fistil. c. f. q. syr. A. tunic. F. cond.

**S. Krafft Condit. G. einen Löffel voll auf einmahl zu nehmen / und den Rest im Keller auf zu behalten.**

Quod si verò Cephalalgia, anxietates, & cum calore imbecillitas non remittant, sed magis crescunt, *Electuarium alexipharmacum E.* vel ʒ F. aliquot granis Bezor. aut C. C. aurati, vel solut. margaritarum prædictionibus augeri, iisque manè per duas dies proximè insequentes assumtis, ægri ad sudorem di-

midia

midia hora m  
G. sumere, &  
dulis conforta  
potu aqua ex

aut acidulo

Vel recens e  
possunt. A  
in excessu pe  
libera exerce  
nibus igneis.  
sanguis in v  
ventilation  
ma vitalis  
vitalis om  
paucos die  
reconvale  
conciplen  
cipio, ut se  
licet conse  
Quem in f  
sed & diet  
vinum & c



mediæ horæ mediocrem se disponere, vespere verò quotidie *conditum confortans* G. sumere, & interea *pro cibo* acidulis iusculis, vel hordeatis, & *pulpis* cum acidulis confortantibus ex Granatis, Ribibus, Citriis, Aurantiis, Acetosella, &c. pro potu aqua ex C. C. raspar. H.

℞. C. C. raspar.

rad. scorzoner. mund. an. ℥ 8.

cort. citr. extern. ℥ iij.

sem. acetos.

anil.

bacc. alkekeng. an. ℥ j.

Incis. & contus. M. ad chart. S.

Stück zum Hirschhorn-Wasser H. verdeckt von einem Viertel biß auff 3. Seidel abzusieden/und abgesehet zu trincken wie ein Julep oder Krafft-Milch. (cui addi possunt nonnunquam Rad. graminis & salæ parillæ contra *convulsionis* pericula.)

aut acidulo Julepo. I.

℞. Syr. acetosell. ℥ iij.

acetos. citr.

papav. errat. an. ℥ j.

aceti rubi idæi. ℥ vj.

sal. nitr. perl. ℥ ij. M. ad vitr.

S. Sauerlichte Säfte I. zum Julep mit dem gesottenen Hirschhorn-Wasser.

Vel recens expresso *succo cydoniorum*, aut *granatorum*, & similium, *sine vino* uti possunt. A quarto autem die usque ad septimum nonnihil remissior sit sudor, ne in excessu peccetur. Quamprimum enim vitalis flamma ventilatur, & respiratio libera exercetur, exclusis, quæ suffocationem minabantur cum anxietate, fuliginibus igneis, ita ut flamma ista suffocationis periculum effugerit, vires redeunt, & sanguis in virtute coquendi laudabili perstat, vitæque vitura continuat. Quod si ventilatione tali primis 12. vel 24. horis, aut ad longissimum primo triduo flamma vitalis non erigitur, sed penitus suffocatur, tota que massa sanguinea, seu succi vitales omnes omnibus in vasibus corumpuntur, homo quidem aliquot horas vel paucos dies anxiam cum fermentescente seu gliscente calore vitam agit, spes verò reconvalescendi, ut flamma vitalis, candelæ instar extinctæ, resuscitari queat, concipienda est nulla. Quapropter nullo modo feriandum, sed *statim in principio*, ut scaturigo mali obtureretur, vitæque vitalis & sanitatis custos, sanguis scilicet conservetur, *sedula in vomitus & sudoris provocatione navanda est opera*. Quem in finem non modo *symptomatibus* metuendis maturè obviam eundum, sed & *diata* certa, tenuis, acidula, quæ cibos euchymos & coctum faciles offerat, vinum & carnem excludat, nonnihil tamen alyum laxet, & aërem corrigit: Daß

Ggg

man



man sich nemlt. h. mte sauren Gerstlein/ Aepffel/ Müsslein/ Weinbeer/ Brstlein / Zwersch/ n/ Prunellen/ Pinacellen/ Haber/ Süpplein/ Herstlee oder Vorragen/ oder Sauerampffer/ Müsslein und dergleichen vergnüge/ und Leibes/ Deffnung behalte/ und stets getrostes Gemüths bleibe. &c.

*Symptomata* quod concernit, quæ primis diebus, 4to. 7o. 11. & 14. à fermentatione febrili totius massa sanguinea omnium spirituum animalium, ut umbra corpus, sequi solent, quatenus ceu noxia periculum quoddam minatur (aliàs enim non sunt adeò formidanda, eaque adaucta flammâ vitali & correcto sanguine ac spiritu animali, remittenteque morbo redeunt.) sequenti modo iis occurrì potest. & quidem

I. Ad *nauseam, fastidium ciborum*, & quandoque *vomitum frequentem* à *singulium*, à fermento ventriculi depravato ortum, tam *acidi conforians conditi*, G. cochlear j. quàm *spiritus acidi A. A.* sæpius gutta 15. ad 20. in brodio carnis tenui sunt exhibendæ. *Externè Empl. de crusta panis Montagnana*, vel *sacculus stomachalis* interpassatus ex *mentha crispa*, *absinthio*, *romarino*, & *rosis rubris*, vel ex fermento cum *baccis juniperi*, *cariophyllis*, *nuce moschata*, *macere* & aceto rosaceo facta placenta calidè applicanda.

II. Ad *Cephalalgiam, inquietudinem, & agrypniam* ab adscendentibus igneis fuliginibus excitatam, non solum *internè emulsio refrigerans K.*

*L.* sem. 4. frigid. major. enuch. an. 3℔.

papav. alb. rec. ʒij.

contunde c. s. q. aq. decoct. cum C. C.

vel lact. f. l. a. Emuls. ad ℔j.

adde man. Christi perlat. pulv. ʒj.

ocul. G. preparat. ʒj.

M. ad vitrum. S. Kühlende Milch K. auf eine Nacht zu betreiben.

nocte una duobus haustibus sumi. sed & *externè calida*, *falsa*, vel *cineraria pediluvia* ex *malv.* *chamom.* *violaria*, *hedera terrest.* in coctis, mane & vespere, ad quadrantis horæ spatium usurpari possunt. *Unguentum alabastrinum L.*

*L.* unguent. de alabast. ʒj.

popul.

ol. papav. alb. expr. an. ℥iij.

pulv. rad. Rhod. ʒij.

M. ad fictil. S. Alabaster Stirn. Eißlein L.



corio inductum, fronti usque ad tempora, vel ex *nucleis Persicis*, sem. *papav. albi* & *aq. rosar.* applicari; soleis verò pedum singulo trihorio, quadrihorio, vel post 6. horas raphanus niger ralus & salsus, vel rapa flava, vel inferius sequentes placentulæ fermentaceæ adhiberi, vel insimul verò dorsum, brachia & crura sacculo tale repleto benè calido manè & vesperi fricari possunt.

III. Ad *Sitim* magnam, ex fermento in ventriculo gliscente igneo natam, & *ardore me jusdem*, conducit *aq. C. C. decocta cum Berberibus H.* vel *aqua*, in qua *citrium malum totum cum sacchari quadam portione decocta*, præsertim si cum *syropis acetosis I.* *Julapia* ex ea fiant, item *Emulsio K.* vel *cremor ptisanæ cum pulvere sacchari candi* & *salis prunellæ*, convenientissima sunt. Alternationis gratia *cerafa acida* in aqua decocta, vel *passula*, vel *berberes*, vel *citria*, vel *aurantia*, *granata*, vel *nodulus ex seminibus melonum & papaveris albi ex aq. rosarum saccharata*, concedi possunt.

IV. Ad *Syncopen*, *palpitationem cordis* & *anxietatem* à sanguine ebulliente & vappescente oriundam, præter *externam* suaveolentem *humestationem ex aqua rosarum* factam, aliquid *confectionis alhermes*, vel *cordialis cujusdam cum succo rubi idæi*, aut *pulverum cordialium probatissimorum* quidam. M.

℞. spec. cordial. temperat. ℥j.

conf. liberant. ℥ij.

sal. margar. sicc. ℥j.

M. ad iij. chart. æqual. S. major.

Hergstärkend Pülverlein M. ein Bricefflein auf 1. mahl in  
Zulep oder Krafft. Milch.

alternis diebus dari, externè verò tres *sacculi cordiales N.*

℞. saccul. cordial. major. usit. ex speciebus pro Epithemate  
cord. rec. parat. ac interpassat. num. iij.

S. Herg. Säcklein. N.

aceto rosaco vel tunicarum, vel rubi idæi cum exiguo vini, vel aquæ melissæ madefacti, calidi axillis & ad jugulum colli usque impositi, vel circumligati continuo gestari, *pulsus quoque balsamo citri*, vel *hujus cornice*, vel *oleo scorpionum* magno Matthioli juxta cum Empl. febrifugo O præservari possunt.

℞. Empl. antifebril. Strob. pro puls. super alut. ten. extens.  
magni. eines halben Thalers num. ij.

S. ad chartam. Sieber. Pflaster O. übergeb. inden 9. Tag zu  
tragen.



V. Ad *prunellam* sive *Anginam* & incipientem *oris putredinem*, ab inspirato & ex ventriculo rursus expirato vapore maligno productam, *Gargarismus* adstringens ex speciebus, cum rosis rubris, mistis, & cum aqua hordei decoctis paratus, additis *rotulis salis prunelle*, *terrâ sigillata*, una cum *syrup. papav. rhead. & diamor.* confert. P.

℞. fol. plantag.

fragar. an. Mj.

summ. veron.

flor. scabios.

prunell.

ros. rubr. an. Mß.

Incis. Misc. ad chartam. S. Vermischte rothe Rosen Species zum Gurgelwasser. P.

Speciatim quando externè collo *sacculus integro croco*, *floribus sambuci* & *sale Petre* repletus & interpassatus ita siccus calidè applicatur.

VI. Ad *alvi fluxum* ʒj. *terra sigillata*. vel ʒß. *pulveris adstringentis rubri* Q.

℞. C. C. vel cran. cervi usti. ʒj.

Gran. chermes. el. ʒj.

Pulveris. M. ad chartam duplicem.

S. Stropffend Pulverlein Q. auf 2. mahl zu nehmen.

cum aq. flor. sambuci, vel succo cydoniorum, convenientissimè datur, calidè quidem, ut sudor eò facilius prodeat. Umbilico etiam *Emplastrum adstringens theriacale* R. imponi potest.

℞. Theriac. Venet. ʒij.

croci ʒiis stipt. ʒj.

M. cum therebinth. q. s. & extend. super alut. ten. magnit. Imperial. S. Stropffpflaster R.

*Sialvus* contra nimis adstricta, *pruna* & *pruneola*, vel *passula* quoque & *pulmenta pomacea*, ut & parum de *rotulis salis prunelle*, auxilio esse possunt, si necessitas flagitat, quod tamen raro contingit.

VII. Ad *Soporem* & *Affectum comatosum* sæpius, suscitandi agri gratia, naribus *nodulus ex camphora* aut *ruta*, aceto madidus objici, vel succus nasturtii aquat. iisdem injici, *vesicatoria* quoque S. manibus & coxendici applicari, *vesicæ* maturè aperiri, & cum *unguento de cerussa* vel *camphorato* sanari possunt.

℞. Empl. vesicat. super alut. ten. extens. magn. cinchaba-  
ben Thalers/ num. iij.

S. ad

III. Sa-  
diolius contin-  
paretur, & cu-

IX. Co-

quæ non foli-  
umbilico im-  
ras renovan-  
& vesica dep-

X. Ad

S. pulvisbus

dis anxiet

de ortæ ma-  
rursus curat

XI. Ac

de, præsertim  
vibices longi  
distribution

quæ aqua g-  
M. cavena-  
sale Petre-  
tape dibe-

sed etiam  
& sæpius



S. ad chart. Zugpflasterlein S. an gehörige Ort zu appliciren.

III. *Sudoris foetidi & contagiosi* ergo vapor aceti juniperini eò studiosius continuandus &c. aq. rosar. etiam acidulata ebulliens cum cinnamomo paretur, & cum confectiōe alhermes, in aceto camphorato, soluta fiat illitio.

IX. Contra *deliria* peculiares habentur *placenta ex fermento T.*

℞. pulv. sem. sinap.  
nasturt.

Sabin.

sal. nitri an. ʒj.

M. c. s. q. fermenti panis acerrimi,

F. Placent. magnit. & crassit. manus extens. num. iij.

S. Sauerteig. Kuchen über die Sohlen T.

quæ non solum post *pediluvium calidum ex aqua salsa* pedum plantis, seu etiam umbilico imponuntur, vel *nucha vesicatorium* S. applicatur. Istæ post 12. horas renovandæ: hoc statim usurpandum, & modo removendum, prout rubedo & vesica deprehenditur.

X. Ad *tremorem & membrorum tensionem* dicta jam *vesicatoria* S. pulsibus manuum & supra genua in parte interiore, imò contra *nimias cordis anxietates* etiam sub axillis, & supra umbilicum cautè applicari, vesicæ inde ortæ maturè aperiri, & medicamento refrigerante camphorato, vel siccante rursus curari queunt.

XI. Ad *maculas* non rarò diebus citricis, 4. 7. vel 9. in corpore hinc inde, præsertim dorso, brachiis & cruribus, seu morsus pulicum; quandoque ut vibices longiores provenientes, & à guttarum sanguinis syderati dispersione & distributione ortis, non modò *sudorifera* continuanda supra nominata, inter quæ *aqua galega* excellit, hinc *Electuarium alexipharmacum E.* & *pulveris F. ac M.* cavendo sedulo frigus, & fricando quotidie corpus sacculo, sale calido vel sale *Petra repleto*, & præterea de *aqua Corn. Gerv. H.* cui *nodulus U.* inhæreat, sæpe bibendum.

℞. sem. aquileg. vel Galeg. rec. ʒiij.

sal. prunell. ʒj.

gran. cherm. ʒss. Contus. M. ad nodul. setic.

S. Bündeln ins Trinkwasser zu hangen. U.

sed etiam *cucurbita sicca* passim in dorso, brachiis & cruribus calidè affigendæ & sæpius detrahendæ, vel dictis sacculis, sale vel nitro refectis, & lixivio calido,

Ggg 2

vel



vel aq. sambuci humectatis, corpus calidè benè fricandum, ut eò citius maculæ discutiantur, & resolvantur, nec ad interiora redeant.

XII. Sed si sanguinis syderati venenatæ guttulæ, seu particulæ non amplius vitales à natura non disperguntur, sed post aures, sub axillis, in inguinibus, inglandulis coacervantur, ita ut post tertium vel quartum diem *bubones*, *carbunculi* & *anthraces* passim, tanquam certa pestis signa exoriantur, eò laborandum, ut promoveantur, emolliantur, & ad suppurationem sine sphaceli periculo deducantur. Quem in finem *Emplastrum sambucinum* probatissimum W. vel *Emplastrum pulmentare* X. cum *theriaca* mistum, quotidie crassè illinendum, bis calidè applicandum, & cum *Emplast. de Fuligine Aug.* aut mixtura ex fermento, butyro & cantharidibus, vel pulte lactea cum croco & sale petræ alternandum.

℞. vitell. ov. ad durit. coct. num. iij.  
crudor. num. ij.

sal. comm. præparat.

nitr. præp. an. ʒvj.

M. cum rob. sambuc. q. s. pro Emplastr. ad ficit.

S. Holler. Pflaster. W.

℞. farin. orobi,  
fœnu græc. ana ʒij.

fol. scord.

succis.

flor. chamom.

sambuc.

hyperic.

summ. aneth.

absinth. ana Miß.

sal. nitr. ʒi.

caric. ping. num. viij.

Incis. tenuiss. incid. M. ad chart.

S. Pulver mit Holler. Wasser oder Kadelreibel. Wasser oder Scabiosen. Wasser zum Brennpflaster X. zu vermischen.

Quam primùm pus apparet, tumores tales corrosivo, vel quod melius, lancetta aperiendi, & postea salubri digestivo Y. & unguento Z. ac Emplastro ex melle, vitello ovi, terebinthina & theriaca composito & induto circumligandum, & tardè ex toto sanandum, hac tamen cum cautela, ne corrodingo serpent, id quod periti Chirurghi scitè præcavere norunt.

℞. Vitel. ovi. rec. num. j.  
ol. violac.

mell.

Hactenus L

Pestem

coagulatione

tuum animal

mescontinui

natura renov

dere, quando

eandem cont

superant, u

ipso prodan

post flamma

esse, propter

pocautum o

ventilatione,

Sam post D

temen fructu

ris coagular

simque me

loquitur)

tibus subli

homines e

lio, quia n

mori cog

Quar

nitatem (I



mell. rosac.

tereb. Vener. an. ℥ij.

theriac. Vener. ℥j.

S. Digestiv- Sälblein Y. mit geschöpfften Tassen an appli-  
ciren.

X. unguent. Agypt. magistr.

ol. hyperic. an. ℥iij.

pulv. scord.

rad. arist. rot. ver. an. ℥ij.

mell. rosac. ℥iij.

M. ad fictil.

S. Sälblein mit geschöpfften Tassen einzulegen. Z.

Hactenus D. Hofmannus de febribus pestilentialibus earumque cura.

*Pestem ipsam* verò ait esse morbum contagiosum, non ab ebullitione, sed coagulatione & refrigeratione, tam fermenti stomachi, quàm sanguinis & spirituum animalium natum: *Febres malignas pestilenciales*, nil nisi ebullitiones continuas & vehementes totius massæ sanguineæ esse proclamat, quatum vii natura renovationem totius massæ sanguineæ querat, eamque victricem evadere, quando naturales succi præternaturales & ferè malignos citò superant: & eandem contra vinci, quando præter naturales humores coprà paucos naturales superant, utut plerumque horrore vehementi vel frigore incipiant, eoque ipso prodant, flammam vitalem in sanguine vim, vel suffocationem pati, & post flammæ hujus extinctionem in massa sanguinea ignem prunæ instar superesse, proptereaque maturè, quantum possibile, mediante sudore, velut hypocaustum calidum fenestrarum relevatione, non autem ignis extinctione, ventilatione, & quasi per afflatum suscitatione opus esse. *Pestis* autem *causam* post Dei dispositionem, cœlique tempestatem, à venenatarum nebularum, semen fructusque perdecientium, pluviarum frigidarum multitudine, inde orta aëris coagulandi virtute derivat, à qua vis fermenti stomachalis ignea sensim sensimque mediante faucium saliva adulteretur & extinguatur, sanguis albus (ita loquitur) & ruber in vasis fixus & refrigeratus, atque na flamma vitalis in spiritibus subsistens, & in animo terrore percusso, quasi timida subito suffocetur, ut homines etiam subito per imaginationem euntes & stantes cadant, & sine auxilio, quia nulla medicina in ventriculo actuari & ad operationem deduci potest, mori cogantur.

Quare hoc tempore, propter ætatis hactenus elapsæ calorem & aëris serenitatem (Deo gratia) nondum ad id pertimescendum.

Quod



*Quod si verò talis necessitatis casus hic illic post famem superatam, & usum alimentorum insalubrium per singularem venenatam, vel vitali facultati adversam stomachici fermenti refrigerationem, ignisque ibi aliàs efficaciter operantis extinctionem, præter spem post diurnam, humidam, nebulosam & asperam tempestatis mutationem oriatur, optimum consilium est, præservationis ergo variis suffimentis, è ligno vel baccis juniperi, sulphure, pulvere pyrio, suffitu communi & talibus aromaticis Aug. ædes & conclavia quotidie suffire, & moderato usu variarum, subtilium, spirituosarum aquarum vel hebdomadario Theriacæ, Mithridatis vel spiritus theriacalis camphorati, centaur. min. cochlear. Trisol. aquat. Elix. P.P. aut zedoar. sulphurei, aut camphorati pulveris, vel pilularum pestilential: Avicenna, Plateri, Ruffi &c. vel vini medicati optimi ex petalide, helenio, carduo ben. centauro min. absinthio & baccis junip. se præservare, ulcera non sanare, imò fonticulos excitare, parum verò, præsertim diebus mutationum Dnæ, in novi- vel plenilunio, oborta nebulosa & humidam tempestate, in publicum prodire, sed nonnunquam mane fistulam Tabac. Bezoardici vel juniperi haurire.*

In *Curatione* verò summè necessarium est, ex tempore aut propter, posthabita omni venæ sectione & purgatione, attamen post moderatam vomitionem, ad mutationem fermenti stomachici efficacissimam, spirituosiss, subtilissimis, volatilibus, ignis vitalis multum foventibus, & in actum statim exeuntibus calidis remediis naturæ suppetias ferre, eamque excitare, ut fermentum stomachicum, præsertim vacillans vitæ flamma se multiplicare citissimè, & ubique coagulatus & refrigeratus sanguis vitalis calefieri, & ad priorem activitatem deduci queat. Facultatis enim animalis & vitalis quia fundamentum est facultas naturalis: Quem in finem post spirituosam ventriculi fomentationem ista hic magis, quam in febribus pestilentialib⁹ convenientia remedia, Theriaca Andromachi, Theriaca Dialesaron, Ther. Augustan. &c. Mithridatum Damocratis, item Antidotus Matthioli, Elect. Papa & de ovo. Confectio Archigenis & similia alia fortia & penetrantia Electuaria quam primum, ut dictum, post vomitum, in spirituosiss aquis ex aqua benè calida possunt exhiberi. Eoque in casu etiam cochlear raphani rusticani rasi acrioris, ut in castris sæpius fuit observatum, cum cochleari Vi conducere potest. Similiter quoque radix petasidis, imperatoria seu magistrantia, levistici, vincetoxici, velex nucibus, sicibus, ruta & allio composita, vitalem flammam suscitans Theriaca rusticorum cum rob juniperino singulari usui esse potest, ut mox calefaciendum & calefactum stomachi fermentum ad sanguinem venæ portæ & venæ cavæ, spiritusque nervorum & valorum lymphaticorum animales denuò se diffundat, & in Oceano sanguinis ad cor quasi gliscentem, & serpendo vires acquirentem coagulationem & concretionem sanguinis lethalem efficaciter impediat. Cujus gratia etiam necessarium, ut omnia spirituosissima remedia probata quovis quadrihorio vel post 6, vel 8, horas, prout visum, offerantur,

offerantur, in  
granis cherm  
rad. scorzon  
decocta, qua  
legia, galega  
& loco salu  
fectiones vici  
latilia C.C.s  
drib, cent. n  
sunt, cum p  
sulphuris e  
sanguis hirc  
enim ista ca  
dentia videat  
gorant, quæ  
culi & sangu  
nando, ut po  
portiones sap  
& circa ingui  
quatenus se  
coagulant ac  
nem in præ  
possibile, p  
quidem imp  
rob (ambuci  
bitulis vocat  
vetur. Hac

[In Sen  
bentur. A

Singula se  
vel quando  
ihure, mas  
Kammerd  
nis gratia le  
Sij, usurper  
pilulas Fran



offerantur, inter quæ ea, quæ ex rad. scorzon. corticibus citri, conferv. acetosell. & granis cherm. cum syr. de cinnamom. & melissa præparat. condita, & ex C. C. & rad. scorzon. pimpinella, caryophyllata & zedoaria, ac cinnamom. præparata decocta, quando præsertim in iisdem vitali virtute multa pollentia semina aqui-legia, galega, nasturtii, sinapi infunduntur, insigniter conferre possunt. Sicut & loco salum theriacalum vel viperinorum Veterum celebratissimorum, Confectiones viperine, aromatica & juniperina Quercetani, item salia chymica, volatilia C. C. sal. armoniac. & alia tenuium partium, vel salia fixa absinthii, carduib. cent. min. melissa &c. aciditatem coagulantem corrigentia valde proficua sunt, cum pulveribus cordialibus, spec. cordial. temperat. item zedoaria cum flor. sulphuris & camphora. Item pulv. Pannon. pulv. Elect. de gemmis cal. item sanguis hirci cum mistura simpl. atque nostro balsamo vita exhibit. Quamvis enim ista calida tenuium partium febrili sæpe accedenti calori incrementum addentia videantur, conferunt tamen, cum fermentum resuscitant, sanguinem vigillant, quæque coagulant sanguinem, tollunt, spiritalcentiam fermenti ventriculi & sanguinis promovendo, & fulgines acidas, coagulationi faventes, eliminando, utpote per quas subsistentes coagulata, crassiores & chylosæ sanguinis portiones sæpius etiam gelidi & ignei bubones pestilenciales post aures, sub axillis, & circa inguina in glandulis, ut & inter scapilio & aliis in locis vibices & maculæ, quatenus sequentem sanguinem in circulari suo cursu impediunt, & retentum coagulant ac colligunt, causantur, quorum naturam, præservationem & curationem in præcedentibus exposuimus, quod nempe non detinendæ, sed quantum possibile, per diaphoretica tenuissimarum partium ad exteriora expellendæ, & quidem imprimis post quartum diem cum vitello ovi, vel allio, vel cepa assa, vel rob sambuci, & nitro, vel Empl. de fuligine, aut vesicatorio theriacali, aut cucurbitulis evocandæ, ut sanguis reliquus in suo motu promoveatur, vitaque conservetur. Hæc Mauritius Hofmannus.]

[In Senatus Lipsiensis, ve, mehrter und verbesserter Ordnung sequentia habentur. Ad corrigendum aërem in ædibus & conclavibus.

℞. bacc. junip. ℥j.

sulphuris opt. ℥ss.

salis petrae ℥½.

Singula seorsim contundantur, postea misceantur, quo manè, meridiè & vesperi, vel quando placet, suffusus fiat. Qui meliora desiderat, parare potest *suffum ex thure, mastiche, styrace &c.* Ein Stüflein brennender Londen kan auch in der Kammer des Nachts/ jedoch mit guter Vorsicht gehalten werden. Præservatio- nis gratia semel vel bis pillule pestilenciales Russi hebdomatim manè à 3ß. ad 5ij. usurpentur, vel Elix. prop. cum Rhab. 40. gutt. ad 60. in vino absinth. aut pilulas Francof. qui his assueti semel vel bis capiant. Reliquis diebus alterna-

H h h

tim



in Elix. prepar. per se, vel cum tertia parte Tinctura bezoard. mist. 25. gr. ad 40.  
in vino absinth. sumantur manè, vel in brodio carnis.

℞. Elix. prop. P.

Tinctura bezoard. D. Mich. an. 3iij.

M. S. Præservativ. Elixir.

Purgantia calidiora caveantur; *Jejunus* in publicum nemo exeat, sed vel juscu-  
lum capiat, aut panem butyro cum ruta vel absinthio illitum, & deinceps hau-  
stum vini absinth. vel ex carduobened. parati sumat. Mundato corpore alexi-  
pharmacatutius usurpantur, ut *Theriaca, Elect. de ovo, Elect. camphoratum* Ke-  
gleri, ut & *Diascordium* quotidie semel vel bis magnitudine castaneæ per se, vel  
in vino, vel in aqua card. ben. aut scordii alternatim. In publicum exituri gin-  
givam quodam ex Electuariis jam notatis, vel cum vino absinth. vel aceto præser-  
vativo leniter prius fricent. Confert etiam singulis septimanis bis, sumtâ *The-  
riacâ* vel *Electuario camphorato* per se, vel in vino, aut in aceto rutaceo, scordia-  
ceo, vel theriacali dissoluto, sudorem lenem provocare, & indusio bene prius  
perfumato se munire.

℞. conserv. acetos. 3iij.

flor. citr.

tunicar.

Diascord Fracastor. an. 3vj.

Elect. camphorat. Kegler.

Rad. scorzoner. condit. an. 3ß.

zinzib. in Ind. condit. 3iij.

syr. è tot. citr. q. s.

M. F. l. a Electuar. med. consist.

S. Præservativ - *Latweg vor Herrn/ Frau und Kinder* / quo-  
tidie bis, manè & vesperi cubitum iturus, quantum cultri cuspis bis vel ter capiat,  
pro ratione tamen ætatis & aliarum circumstantiarum capiat.

℞. spec. pro trochisc. sublingual. August.

liberant. an. 3ij.

Extr. Angelic. 3ß.

zedoar. 3j.

Sacch. in ∇. scorzoner. dissol. q. s. F. l. a. confect. in Rot.

S. Præservativ - *Küchlein vor Herrn und Frau*. Una vel duæ sa-  
pius, nullâ habitâ ratione temporis, sub lingua detineantur, donec dissolvantur.

℞. Tinct. corall. cum spir. cord. cervi. 3ß.

S. *Hergstärkende Corallen* Tinctur. bis in septimana gr. 25.  
usque ad 30. in haustu vini vesperi iturus cubitum sumat.

*Pulvis Montagnana*, de quo ipse scribit, quod nunquam viderit aliquem mori,  
qui illo usus fuerit.

[℞. sem.

brodio carnis  
prout consulti

Aceta, u  
riale officinar  
Externè tempo  
quam cochlear  
prægnata glob  
sunt.



[℞. sem. citri.

acetos. an. ℥ij.

rad. dictam. albi.

gentiam.

tormentill. an. ℥ij℥.

boli Armen.

cinamom. elect. an. ℥j.

margar. præparat.

sapph. præpar.

off. de C.C. an. ℥j.

santal. omnium.

sem. ocyмян. ℥i℥. M. F. P.] Dosis ℥j. ad ij. manè in

brodio carnis vel gallin. vesp. in cochl. vin. &amp; quidem hebdomadatim bis, vel prout consultum videtur.

*Aceta, ut rutaceum, è toto citr. fl. sambuci, fl. tunic. rubi idæi, antipestilen-  
tiale officinar. domi servari, & alternatim internè & externè usurpari possunt.  
Externè tempora, frons, nasus & pulsus iisdem illiniri possunt: internè nonnun-  
quam cochlear. j. vel ℥. pro ratione circumstantiarum spongiolæ & iisdem im-  
prægnatæ globulis vel sphæculis tornatis inclusæ ad odorandum adhiberi pos-  
sunt.*

℞. conserv. acetos. ℥ij.

rosar. ℥℥.

Theriach. diatellur. ℥j.

Andromach. ℥℥.

rad. angelic.

tormentill. ℥℥. an. ℥ij.

cum syr. acetos. F. Electuar. mediocr. consist.

Præservativ. Latweg vors Gefinde. Dos. i. vel 2. Messerspitzen/  
manè, vespèri, & quoties opus,Si quis *Balsamum*, quem secum portet, desideret,

℞. ol. scorpion. magn. Matthiol. ℥j.

angelic.

rutæ. an. gutt. xv.

citr. ℥℥.

camphor. gutt. vij.

corp. pro Bals. q. s. F. l. a. Balsam. S. Præservativ.

Balsam.

Vinnus



*Vinum absinthides pro Familia.*

℞. fol. & summit. absinth. ℥j.

herb. carduib.

fol. & summit. rut.

(cordian. ℥ss.

rad. angelic.

pimpinell. an. ℥iij.

flaved. citr. recent. ℥vj.

concisa. g.m.s.

Species pro vino Absinth. Præservativ.]



CAPUT



PA

Sanguis  
tes, ut c

Sabum  
culofa

latim, secun  
ne observata  
de magnis lie

II. Q

III. Q

Quoad nutriti  
raro hac ipia

Quæ est  
plus m

mulculosa &

matum, men

utur subinde

& pinguioris

quidem qua

quando ve

Schwind

Atr

tior est, q

quando u

Atr

sunt Spir

efficiunt, t

sunt alime

reddit, A

Par



## PARTIS SECUNDÆ

## CAPUT I

## DE

## NUTRITIONE LÆSA.

**S**anguis ex sinistro cordis Ventriculo ebulliens distribuitur ad omnes partes, ut corpus nutriatur. Hæc nutritio tribus læditur modis. I. Quando *abundat* idque vel *universè*, in toto corpore, secundum carnem musculosam & huic annexam pinguedinem, *in corpulentia nimia*: Vel *particularim*, secundum partium nonnullarum & viscerum parenchymata; Quæ ratione observatæ fuerunt stupendæ magnitudines hepatis, item renum &c. Sicut de magnis lienibus jam suo tempore locutus est *Helmont.*

II. Quando *deficit* in *Atrophia* & *Tabes*.

III. Quando *depravatur* in *Cachexia*, *Anasarca*, *Ictero* &c.

Quoad nutritionem auctam, ad *Corpulentiam nimiam* nil attinet dicere, cum rarò hæc ipsa in praxi offerat. Vid. *Sylvius*. Potius igitur consideremus

## ATROPHIAM

**Q**uæ est deficiens Nutritio, quando corpus non nutritur amplius, sed plus minus hæc ipsa deficit. Deficere solet nutritio ratione carnis musculosæ & pinguedinis, non item ratione cartilaginum, ossium, parenchymatum, membranarum ac fibrosarum partium. Hæc enim non absumuntur, utur subinde simul plus minus exsiccentur & arescant; adeoque habitus carnosus & pinguioris absumtio in genere *Atrophiam* constituit, das *Abnehmen*. Et quidem quando pinguedo solum deficit, vocari solet *Macies*, die *Magerkeit*: quando vero caro simul absumitur, nec restituitur, vocatur *Tabes*, die *Schwindsucht*.

*Atrophia* hæc nunc est *particularis*, nunc *universalis*, quæ ultima frequentior est, quando totum corpus non nutritur: Illa verò *particularis* est rarior, quando unum vel alterum tabescit membrum & vocatur *Aridura*.

*Atrophia universalis causa* est vel in *efficiente*, vel in *objecto*. *Efficiens* sunt Spiritus animales influi, qui cum Spiritu insito confermentati nutritionem efficiunt, unde deficientes atrophiam inferunt. *Objectum* seu id, quod nutrit sunt alimenta, quorum vel defectus vel vitium nutritionem deficientem reddit. Quoad Spiritus animalis defectus, sunt, quando vel non generantur in

Pars II.

abun-



abundantia, vel geniti absumentur, in motionibus corporis aut animi. *Non generantur* ex variis sanguinis vitiis, quæ ex vitiis cerebri, aut intextura, seu ut aliàs vocant, temperatura aut conformatione læsa scaturiunt. *Absumentur* in iis, qui fortius aut crebrius laborant; hinc raro grassii aut obesi rustici; item qui crebrius Veneri indulgent, unde ex parte tabes dorsalis; item qui indulgent interioribus meditationibus, hinc literati frequentius macilenti, non secus ac qui mœrore aut tristitia diuturna sunt affecti, ut quando Virgo ob amassii discelsum tabeperit, ex *Obs. Panaroli Pentecost. 6. Obs. 18.*

*Quoad nutrimenti vitium* deficit Nutritio

I. *Quando non generatur alimentum* in stomacho. v. g. in inedia voluntaria, aut etiam quando alimenta parum nutrientia aut vitiosa assumentur.

II. *Quando chylus genitus non distribuitur* usque ad vasa sanguiflua, idque vel *vitio lactearum* in intestina hiantium obstructarum. v. g. in passione cœliaca: vel *vitio glandularum* mesenterij obstructarum, hinc tumefactarum adeoque plus minus frumofarum, cuius exempla non sunt pauca. Vid. *Hildan. Cent. 1. obs. 7. Horst. l. 2. obs. 5.* Facit huc, quod refert *Bontius de Medicina Indor. cap. 12.* quòd nempe Atrophia Indis quoque Epidemica sit, idque ex Mesenterij vitio nempe abscessibus. Infantibus præsertim atrophiam ex hac causa est frequens, nempe vitio mesenterij, de quo vide *Barbette in Anat. Pract. part. 1. c. 14. it. in praxi part. 3. cap. 2.*

III. Deficit nutrimentum, *quando chylus sanguini permistus & plus minus assimilatus nimis cum eo evacuatur*; quo pertinent nimia sanguinis effusiones. Facit huc motus, qui etiam nutritivum rorem exhaurit, per glandulas intercutaneas, sudoris specie; item æstus nimius, quòd liquefaciendo succum nutritivum hunc successive depravat: Item fluxus alvi nimis copiosi, quale exemplum refert *Borellus Cent. 2. obs. 64.* ac quilibet fluxus colliquativi. Fluor albus uterinus mulierum diuturnior item Atrophiam ac Tabem comitem secum trahit. Ulcera carnosæ & fistulosa in artubus, v. g. in genu, atrophiam inferunt, abscissione partis curandam. Vid. *Horst. l. 9. obs. 20.* Denique nimia Venus, quæ c. Spiritibus mediante genitura & nutritivum rorem exhaurit. Pertinet huc affectus novorum maritorum TABES DORSALIS dictus seu *Hæctica maritorum*, quando nempe hi nimis attenti ad rem talem dorso Atrophiam incurrun. Duplex Hippocrati ejus species est, vel à *destillatione* in spinam, vel à *genitura* aut huic analogi liquaminis copiosiore excretionem; unde & Gonorrhæam quamvis fere insequi solet. Utrisque in casibus ægri in dorso successive extenuantur, spina prominere, sensus vermiculationis c. titillatione subito per medium dorsum decurrente percipiunt. Exempla vid. ap. *Solenand. Conf. 5. ap. Tulp. lib. 3. obs. 34. Zacut. Lusit. lib. 1. prax. admir. observ. 122.* Sed in specie de hac

de hac *Lumb. Willis. Phar.*

II. *Al.*

hoc nimis ac  
hinc ineptum  
in stomacho  
plus minus  
culum quer  
potus frig  
turbant, &  
pissimè ha  
supervenit  
salsum, a  
mutat, qu  
etiam vitio  
& ipsius fe  
tunc vix an  
tutionem fl  
in crassi su  
Vid. *Solen*  
imprimis c  
necessariò  
quocunq  
febres tan  
Hæctica t  
ditate con  
ex acrimor  
in malo hy  
atrophiam  
rholdes r  
etiam Ba  
simodè  
crasiam  
constitu  
affecta.  
sufficien  
reddit.  
ceration



de hac *Lumbagine* ac tabe dorsali. *vid. Sennert. Prax. lib. 2. part. 2. cap. 15. & hinc Willis. Phar. rat. part. 2. p. 82.*

II. *Alterâ ex nutrimento* oritur, quando hoc vitiosum est, quando v. g. hoc nimis acre, aut asperum & salsum, alioque vitiô peregrinô inquinatum hinc ineptum est, ut nutriat corpus, idque fit vel propter vitiosam nutrimenti *in stomacho digestionem*, vel propter vitiosam nutrimenti geniti in *MS. antea plus minus vitiatâ corruptionem*. Conspirant hæ duæ causæ sed rarò, ita ut per circulum quendam se mutuo intendant, v. g. animi affectus, iracundia, tristitia, potus frigidus post nimiam incalcescentiam, esus post iram &c. nam sanguinem turbant, & digestionem primam vitiant; *Ventriculum* quod attinet, in hoc sæpissimè hæret causa atrophie ac tabis, præsertim successivè interno ex fomite supervenientis, quando scil. alimentum corrumpit, istudque in chylum vitiosè salsum, acido salsum aut asperum, aut plus minus viscidum, aut serosum immutat, quæ vitia successivè, aut ipsa vitiosa assumpta, v. g. in picâ, sequuntur, aut etiam vitio lymphæ salivæ ventriculi digestionem turbantis oboritur tabes, ut & ipsius fermenti, vel etiam succorum in primis viis tabe successivè contracta, & tunc vix amplius emendabili supervenit, quatenus ea quæ materialiter ad constitutionem fluidorum horum concurrunt, imprimis Spiritus, sanguis & lymphæ, in crasi sua vitiata existunt. Non rara sunt Exempla talis tabis ex stomacho natæ. *Vid. Solenand. Conf. 8. sect. 1. it. Conf. 15. sect. 2. Poterius hinc inde in suis centuriis; & imprimis quotidiana experientia hoc confirmat.* Secundo *Vitio Sanguinis*, ubi necessariô etiam vitiatur distributus chylus, oritur Atrophia, quando sanguis quocunque modo in sua crasi vitiatur, adeoque nutritioni ineptus, & hinc post febres tam continuas quàm intermittentes malè curatas superveniunt lentæ & Hecticæ tabem inferentes, partim ex acrimonia acido salâ, partim junctâ visciditate contentorum corporis. Unde Scorbutici sæpe laborant tabe & atrophia ex acrimonia salis scorbutici, nutrimentum corporis inquinantis, id quod etiam in malo hypochondriaco familiare est, ut hi ipsi si malum progressum fuerit, in atrophiam incidunt. Pariter & menses retenti, ut & lochia suppressa, vel hæmorrhoides retentæ, aut imprudenter sanatæ atrophiam subinde inducunt. Conf. etiam *Bartholin. Cent. 2. hist. 35.* & quæ sunt aliæ causæ plures, sanguinem diversimodè inquinantes. Pertinet huc imprimis quando massa sanguinea ad discrasiam degenerat, vitio partis cujusdam solidæ nobilioris, propter sui malam constitutionem, in functione solitâ deficientis, aut etiam abcessu aut ulcere affectæ. Tali in casu non solum ipsum pus sed & viscus ulceratum non amplius sufficiens debitæ functioni circa sanguinis conservationem, malum eo deterius reddit. Et talis ex visceris cujusdam vitio quovis insigniori, ac speciatim exulceratione nata tabes singulari nomine vocari solet.



## P H T H I S I S.

**E**ste quidem *Phthisis* vocabulum per se generale & propriè significat quamvis corporum consumptionem à quacunq; causa natam. Caterum strictius & ferè usitatus *Phthisis* dicitur omnis ista contabescencia, quæ sequitur corruptelam ac speciatim ulcerationem alicujus visceris nobilioris. Ita si quis contabescat ob purulentum hepar, purulentos renes, corruptos pulmones &c. *Phthisi* laborare dicitur. Hinc & ex abscessu mesenterij *phthisin* observavit *Horstius libr. 2. obs. 5.*

Jam quoniam pulmo præ omnibus partibus internis maximè expositus est injuriis externis, à quibus insigniter lædi potest & solet, ipse etiam talem sortitus sit texturam, ut facillimè ex sanguine suscipere queat varia recrementa, à quibus facillimè alterabilis existit, ob id etiam omnibus ex partibus pulmo frequentissimè vitatur & exulceratur, propterea *καὶ ἐξ ὅλης* subinde *phthifici* ij dicuntur, qui ulcere pulmonum laborant, cum *phthisi* tali ex cujusvis partis abscessu vel ulcere nata. In omni hac *phthisi* semper simul conjungitur febris *hectica*, in quac. parte sit ulcus, qualis sæpe conjungitur etiam ulceribus partium externarum insignioribus. Quodsi viscus quoddam nobile suppuratum est, sequitur sordidum ulcus, quod magis magisque inquinando sanguinem, tabem admodum exasperat.

*Phthisis pulmonalis* à *vomicâ pulmonum*, cum qua sæpius confunditur, in eo differt, quantum à se invicem differunt abscessus & ulcus sordidum. Nam in *vomicâ* pulmonum seu eorum abscessu est pus purum, album, leve & æquale, quod ipsum interdum suis membranis inclusum citra excretionem in pulmonibus hæret: Verum ubi pus tale non expurgatur, degenerat variè à propria natura in varias sordes ac sanies, & tunc supervenit ulcus sordidum, quod *confirmatam* dat *Phthisin*.

Probè autem hinc observandum, quod inter *Phthises*, uti frequentior est *pulmonalis*, ita inter causas *phthiseos pulmonalis*, frequentior esse solet ejusdem *exulceratio*. Ast præter hanc & aliæ causæ viscus pulmonum vitiantes *phthisin* inducere valent; adeoq; non solum exulcerationem pulmonum, sed etiam quamvis eorum labem insigniorem, ob usum eorum, sanguinis everasiam & constitutionem vitalem summè necessariam, ad *phthisin* disponere certum est. Ut adeò rectè *phthisis pulmonalis* desiniatur in genere: *Contabescencia corporis ex vitio pulmonum nata*, non ex sola exulceratione, ut communiter fieri solet. Sic & pulmonum corrugatio (de qua supra) tabem potest inferre, non secus ac si aliquid peregrini in asperam arteriam assumtum, hanc irritando ad tussim continuam, successivè constitutionem & hinc functionem pulmonum ita lædere potest, ut tabes superveniat. Sic ex nucleo avellanæ in pulmonem illapso tussis conti-

continua cum  
2. p. 27. Par  
lethalis vid. m  
Ann. 2. pag. 5  
Sicut è contra  
Spicileg. anat.

Frequen

Causæ ren

quentissima  
omnis phthi  
vel defluxio  
ria, præserti  
triculi vitia  
nem inducun  
nerans, casu  
guinis sputu  
ritides & Peri  
quunt. Var  
mineralium i  
vant, non rar  
rulentus ab  
nale infera  
riuntur, ob

Pertin

monis. Pot

Medic. p. 112.

vinis, Fumu

poras frigida

N. C. Ann.

Parentibus

quoque est

mentum ul

etoratum,

mutuo infi

fert adeo q

de olfaciens

corum velt

hoc videri p



continua cum emaciatione totius & imminente phthisi vid. ap. *Bartholin. Centur.* 2. p. 27. Pariter ex nucleò pomi in asperam arteriam illapso phthisis perfecta lethalis vid. in *Miscell. N. C. ann. 4. pag. 26.* Plura huc facientia vid. *M. N. C. Ann. 2. pag. 58. Ann. 3. p. 181. It. Marcus Aurelius Severinus de abscess. p. 269.* Sicur è contra pulmones exulcerati sine phthisi observati fuerunt vid. *Kerkring. Spicileg. anat. obs. 72. It. M. A. N. C. Ann. 1. p. 223. Bart. Cent. 2. hist. 14.*

Frequentioris autem phthiseos pulmonalis, nempe *exulcerationis*

*Causa remota* sunt varia, nempe vel interna, vel externa. Internas inter frequentissima est nimia sanguinis & lymphæ acrimonia & fædè muriatica; Nam omnis phthisis pulmonalis, quæ à Catarrho vulgò oriri dicitur, seu destillatione vel defluxione ex capite, à nullo alio est, nisi à sanguinis & lymphæ acrimoniâ varia, præsertim acido fædè, cujus fundamentum ac origo prima in digestionè ventriculi vitiatâ posita est. Inter causas remotas externas fortuita plura ulcerationem inducunt pulmonum, v. g. vulnus penetrans thoracem, hinc in ulcus degenerans, casus ab alto indeque sanguis in quodam thoracis locò grumofus, sanguinis sputum ut plurimum, si non semper, phthisin pedissequam habet. Pleuritides & Peripneumoniæ non ritè judicatæ, ordinariò phthisin post se relinquant. Variolæ frequentes phthiseos autores. Halitus acidi & corrosivi mineralium in iis, qui v. g. operationibus Chymicis, vel metallicis operam navant, non rarè tabem ac phthisin inferunt. Unde & aquæ fortis odor adeò virulentus ab *Helmontio* dicitur, ut crebriori inspiratu susceptus phthisin pulmonalem inferat. Unde gypsum & calcem præparantes plerumque phthisi moriuntur, observante *Zacuto*.

Pertinent huc Acidulæ & omnia Vitriolata in iis, qui debiliore sunt pulmonis. Potus vini acidi ad phthisin disponit. Hinc enim *Hæser, in Hercul. Medic. p. 112. edit. in 12.* teste, in Austria fere phthisis endemica, propter abusum vini. Fumus Nicotianæ copiosius haustus, ad phthisin pulmonalem disponit; potus frigidus post incalescentiam corporis pariter eandem infert vid. *Miscell. N. C. Ann. 6. p. 309.* Hereditarium malum est phthisis pulmonalis, quod à Parentibus per traducem seminalem in Fætum transplantatur. Contagiosum quoque est malum exulceratio pulmonum phthisica confirmata, dum per fermentum ulceris corruptivum aut per halitum expiratum, aut per saniem expectoratum, pulmonem sanum in alio similiter inficit; unde & sæpius conjuges se mutuo inficiunt vid. *River. Cent. 4. obs. 92. It. Schenck. in observat.* qui refert adeò contagiosa esse phthisicorum confirmatorum sputa, ut Medicus subinde olfaciens eadem factus sit inde phthisicus. Idem ex *Fracastror*: refert, phthisicorum vestes post biennium etiam contagium propagasse. Ac sane non mirabile hoc videri potest, si verum est quod refert *Panarolus Pentecost. 2. obs. 49.* expectoratum



etoratum sputum ex confirmato ulcere pulmonum excretum adeo virulentum & malignum esse, ut muscas illud gustantes instar arsenici interimat.

Atrophia & Tabis jam factæ *Cognitio* est per se clara. Hujus historiam graphicè describit *Sylvius. l. 1. prax. c. 37.* Quoad causarum varietatem ea Atrophia, quæ Spirituum animalium vitio contingit: Item quæ ex defectu alimenti est, ex causarum antecedentium examine, & adjunctorum symptomatum syndrome facillè pater. v. g. ista tabes, quæ vitio glandularum Mesenterij contingit, abdomen inflatum, cum dolore in ejus profundo obtuso, imprimis tensivo habere solet, excreta liquida & chylosa excreantur, ac sensum corpus emaciatur. Sed ea tabes, quæ ex vitio interno oritur, imprimis præcognoscenda venit, circa quam ad 3. causarum fontes imprimis respiciendum erit. 1. An tabes sit ex vitio stomachi? 2. An ex vitio sanguinis? 3. An ex corruptelâ ulcerosâ cujusdam partis, in specie pulmonum?

Cognoscuntur hæc ipsa ex antecedentibus imprimis, atq; etiam concomitantibus symptomatibus. Sic appetitus aut coctionis præcedentis læsiones circa stomachum negotium suspectum reddunt. Alia quæ immediatè sanguinem afficiunt, hujus læsionis suspicionem præbent. v. g. quando ulcus in quodam loco sanatum comitatur phthisis pulmonalis: Sic ex ulcere pedis sanato phthisin lethalem observat *Thyermeyer Conf. l. 2. p. 85.* Nempe à fermento ulceris unâ cum sanie acri per istud evacuari solita retentis, cum sanguine hinc inde circum raptis & in pulmonem depositis, malum ortum traxit. Facit huc ipse habitus agrorum plus minus ad phthisin & atrophiam dispositorum; nempe quotidiana constat experienciâ seu observatione succulentos aut obesos minus evadere phthificos, benè autem macilentos, aut naturâ plus minus attenuatos. Horum nempe sanguis minus temperatus, minus dulcis, minus oleosus existit, adeoque minus nutrit: E contra acrior, asperior, salior esse solet, facileque incallescens, unde tales minus bene nutriri observantur. Frequentissima phthisis est pulmonalis, circa quam inquirendum, an à causâ externa v. g. inspiratis, an ab internâ oriatur: Et si ab hac, an affectus secundarius sit an verò primarius? Si enim affectus secundarius, i. e. si pleuritidem aut sputum sanguinis sequatur, affectus antecedentis ratio imprimis habenda est. Si verò est affectus primarius, tunc ista est phthisis pulmonalis, quæ ab ulceratione ejus ex defluxu catarrhali, ut vocant, oritur. Hujus malè sic dictæ phthiseos catarrhalis radix seu ortus est in ventriculo malè digerente, progressus in sanguine aut lymphâ exinde acidò salis factis in pulmonibus, uno alterove ejus lobo, ejusque vesiculis & cellulis plus minus erosis. Unde in loco eroso ulcus supervenit sive suboritur, cujus fermentum nutrimenti proximi corruptivum existit, unde fordiū, saniei & puris generatio, ac mediante tussi successiva excretio, donec

vel

vel ab istis sord  
pulmonibus s  
tiva, nunc med

Hinc ut  
defluenti falsò  
cum, nunc sin  
cum appetitu  
cescentiam su  
tussim stimulu  
sertim nutriti  
pore putrido

De sap  
conquerunt  
aut saltem po  
lis, saltem a  
quendam cal  
pulsus, semper  
in specie vesp  
puer alba non  
tantum calor  
fluere, tussis  
cessive flavesc  
lenta fere eva  
manè, vesper  
res nocturni,  
tenduntur, un  
ni intenduntur  
defluunt, sed  
materiæ, aggr  
maximè prom  
tereunt. N  
expectoratio  
Tulp. obs. l.

Obser  
sit pulmona  
occasione p  
nalis superv  
tione tussis  
monum ero



vel ab istis fordibus suffocentur ægri, vel erosio & absumentis maximam partem pulmonibus sanguis debitâ in crasi deficiens, nunc mediante diarrhæa colliquativa, nunc mediantibus tumoribus pedum œdematosi mortem inferat. ” ”

Hinc ut maturè præcognoscatur huiusmodi Phthisis catarrho à capite defluenti falsò adscripta, ejusdem historia bene notanda. Nempe ægri nunc cum, nunc sine manifesta causa de virium labefactione conqueri incipiunt, cum appetitu plus minus dejecto, aut saltem carnes abhorrente, sentiunt flaccescentiam substantiæ carnosæ in artubus, percipiunt subinde aliqualem ad tussim stimulum, tussunt sed inaniter, saporem in ore percipiunt falsum, præsertim matutino tempore, dum è lecto se levant; malò magis progresso, de sapore putrido cinereò, *wie faul Holz oder Asche*, conqueri solent

De sapore item piscium & carnum putridarum matutino tempore in ore conqueruntur, tussis successivè intenditur, idque præsertim vespertino tempore, aut saltem post lecti introitum; supervenit febricula lenta ipsis ægris ferè insensibilis, saltem ab omni pastu præter gravationis sensum circa præcordia levem quendam calorem percipiunt; interim tamen quocunque tempore tentetur pulsus, semper celer, frequens, plus minus parvus observari solet: Interea tussis, in specie vespertina exasperatur, respiratio nonnihil fit difficilis, incipiunt expueri alba nonnihil viscida. Procedente malo exasperatur hectica, dum non tantum calor post pastum augmentatur, sed etiam sudores nocturni incipiunt fluere, tussis augetur indies, evacuatur copiosa materia albida, viscida, quæ successive flavescere, interdum livescere, tandem nonnihil foetere, denique purulenta fere evadere solet; quatit continuo pectus hæc tussis, præsertim vesperti & manè, vesperti minus, manè plus materiæ corruptæ ejicitur: Hinc hectica, sudores nocturni, difficilis respiratio, corporisq; contabescencia magis magisque intenduntur, unà cum virium omnium successiva labefactione, sudores nocturni intenduntur, ita ut simul atque oculos claudant ægri, sudore diffuant, capilli defluunt, sed viribus exhaustis, cessante tussi, aut deficiente ejus expectoratione materiæ, ægri suffocantur, aut superveniente diarrhæa colliquativa, ad quam maximè proni sunt phthisici, aut etiam tumoribus pedum œdematosi ægri intereunt. Non rarum est furculos aut ramulos venarum & arteriarum erolarum expectoratione fuisse rejeetos, qualia exempla præter *Bartholin. in Hist. vid. in Tulp. obs. l. 2. c. 12.* ” ”

Observandum autem hic ulterius, quod tussis phthisicorum non statim sit pulmonalis, sed fere in principiò sit stomachalis, cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ, aut pulmonum excretæ tussis pulmonalis supervenerit. Deinde non in qualibet phthisi, aut pulmonum exulceratione tussis adesse solet, quando interdum citra insigniorem tussim insignis pulmonum erosio, aut exulceratio observata fuit. *Vid. Kerkring. in spicileg. obs. 72.*

Sic



Sic quoque puris sputum seu expectoratio, etiam si cum tussis fiat, non semper ex pulmonibus fit. Ita *Schneiderus l. 4. de Catarrhis p. 103.* Phthysicum habuit, qui copiosum pus & sanguinem rejiciebat, aperto corpore pulmo sanus, hepatis exulceratum inventum. Sic puris sputum menstruum sine phthysi *vid. in M. A. N. C. Ann. 1. p. 233. it. Barthol. Cent. 4. hist. 17.* Plura qui de Tabis & Phthysicos natura desiderat, adeat in specie *Willisium Pharm. Rat. part. 2. sect. 1 c. 5. § 6. ii. Sylv. l. 4. Prax. & Tr. de Phthysi; deniq; Benedictum in Theatro Tabidorum.*

Quoad *Prognosin*, tres isti gradus Phthysicos, nempe *imminentis, incipientis & confirmata*, quos Willis insinuat *citato loco. p. 106.* probè observandi sunt. Primus enim facilè, secundus difficilior, tertius planè non curatur. Et quidem in gradu secundo vulneratis ac laudabili diætâ, ut interdum curari, ita ulterior progressus interdum per plures annos retardari potest. Sed necesse est cautissimè & rigorosè agri observent omnia, aliàs impossibile est, ipsis succurrere. Quò melior & sanior stomachi est constitutio, eò uberior sanitatis spes superest. Qui ex pulmonum ulcere vult evadere, sex *Hippocratis* signa habere debet, quæ recenset *Sennertus libr. 2. prax. ubi de phthysi. p. 207. §. 5.* eaq; prolixius explicat *Sylvius* unâ cum aliis *Tr. de Phthysi. §. 87. & seqq.*

*Cura* Atrophiciæ & Tabis eò est dirigenda, ut *primò causâ removeatur.* Hæc causâ remotio variat equidem pro earum varietate supra recensitâ; sed in tabe, quæ frequentius curæ subicitur, aut stomachus curandus, aut acrimonia sanguinis ac lymphæ acido salsa temperanda, aut deniq; exulceratio visceris plus minus perfecta sananda, aliavè contra corruptela corrigenda.

2. *Symptomata graviora* interdum, præsertim in Phthysi, mitiganda, qualia sunt tussis ferina, præsertim nocturna, exscretio difficilis, inde respirationis difficultas, item Sudor nocturnus vel Diarrhæa.

3. *Alimenta copiosi succi*, quæ stomachus appetit, & chylum dulcem alcali probè divitem suggerunt, succosque corporis temperatos reddunt, usurpanda.

*Ratione stomachi* convenit vomitus, hinc acida blanda conducunt, ut Spiritus Salis dulcis, liquor terræ fol. Tart. Elix. Prop. sine acido. lap. 69. cum acet. &c.

*Ratione acrimoniae sanguinis & lymphæ* Sulphur, succinum, myrrha, & diaph. antihectic. Poter. papaverina & opiata, tragacanth. amygd. passulæ &c. Ex his & similibus parati pulv. pectorales, species &c. His sociantur ligna, in specie assafras & rad. chinæ: Hinc Quajac. & ex his lignis parata decocta, quæ resinofam Sulphuream substantiam elicita obtinent, unde temperant acre, resolvunt hinc inde hærentes sordes, & in progressu Phthysicos in specie, ubi jam discrasia sanguinis processerit longius, aut pulmones jam affecti sunt, conferunt, quibus optimè sociantur passulæ. Præscribendi modus & usus *vid. in*

*Lotichii*

*Lotichii* Obf. gerendam, at facile excogit. bezoardico al. iari cum succo. haud inceleb. alcribere, qu. fluxionesque.

R. Lign.

infund.

neres

quam

Sem.

lis &

colati

affunc.

cinam

Quo d

R. Lign.

xx. aq.

addent

frixerit

tur. li

liqui

noct

tis, C

*Ratione*

hedera terr.

substantiam

Terebinth

Quo

toria in At

vitio stom

mannus in

to, ubi ur

constent

ne merus

buse vacu

purgation

Par



De Phthisi atq; Tabe.

*Lotichii Obs.* qui pag. 23. ita ait: Ad materiam Pulmonibus jam impactam digerendam, attenuandam & per sudores successivè evacuandam, nihil utilius facile excogitari poterit Decocto ligni Guajac. quo tanquam hujusce affectus bezoardico alii insignes Medici tam olim quam hodieque, imò ipse ego, singularem cum successu, uti sumus. Non pigebit autem modum a descriptione haud incelebris Medici *D. Balib. Brunneri* & Consilii ipsius *Medicinalibus* huc ascribere, quia ille, tanquam raro, sicut dixi bezoardico, contra catarrhos de- fluxionesque ad pulmones & ventriculum, uti solet:

℞. Lign. Guajacin. el. ℥viij. cort. lign. ℥ij. passul. ℥j. lign. aloes pulv. ℥ij. infund in lib. xv. aq. ferventis. in ollam vitreatam & ponantur intra cineres calidos per xxiiij. horas. Postea benè clausa coquantur. Ante quam verò ad medietatem coctio facta est, injiciantur lign. Sassafr. ℥ij. Sem. anis. ℥ij. cinam. el. ℥iiij. Santal. citr. ℥j. coq. probè recta sine favillis & fumo, donec ad medietatem pervenerint, postea per se refrigerata colatura cautè defundatur. Hujus exhibeantur ℥vj. Fecibus decocti affunde aq. comm. ℔. xx. coq. ad tertias, sub finem coctionis addendo cinamomi ℥ij. Refrigerata per se colentur & F. Potus communis. Quo deficiente

℞. Lign. Guajac. probè limat. ℥iiij. lign. aloes ℥ij. passul. ℥vj. coq. in libr. xx. aq. ad tertias, sub finem, ut per quadrantem horæ unà coquantur addendo lign. sassafr. ℥vj. sem. anis. ℥iiij. cinam. el. ℥j. ubi sua sponte refrixerint, colentur. Porro pag. 55. hanc habet formulam. ℞. Limatur. lign. Guajac. el. ℥iiij. sarf. parill. ℥ij. rad. chin. opt. ℥β. rad. farfar. liquirit. pulmonar. an. ℥iiij. passul. enucl. ℥j. sem. anis. ℥iiij. infund per noct. in aq. fontanæ (vel cœlestis) mens iiij. coq. manè ad casum medietatis. Colaturæ adde Sacch. & cinam. q. s. ad gratiam gustus pro decocto. Ratione visceris læsi imprimis vulneraria simplicia, in specie veronica, scabiosa, hederæ terr. chære fol. &c. conferunt. it. Sulphura quæcunque, in specie g. ialia, substantiam puris ejusque proventum corrigentia. it. Bals. sulph. Peruvianus. Terebinth. &c. Quæ in synopsi concentrata paulo uberius explicanda veniunt:

Quoad g. primam intentionem seu indicationem observandum, quod vomitoria in Atrophia, item in Phthisi incipiente sint optima, ubi scil. malum est ex vitio stomachi & acrimonia M. S. Hoc inculcat *Lindanius*, cui consentit *Hartmannus in Prax. Chymiat. p. 99. & 185.* Quin & in ulcere pulmonum confirmato, ubi urget difficilis respiratio, aut est difficilis materiæ excretio, si vires adhuc constent, vomitorium similiter tum optimè convenit, hac observatâ cautelâ, ne metus adsit sputi sanguinis, nam potenter & copiosè saniosos ex pulmonibus evacuat vomitus. Post vomitum cavetè à purgantibus. Nam licet à leni purgatione, liberaliter evacuantur, præsertim ad Phthisin dispositi; experientia



tamen testatur, quod tales agri post purgationem vesperti crebrius & pejus tussiant, imò vel lene purgans tabidos maximè & copiosissimè evacuare solet cum insigni virium noxa. In totum ergò non sunt purgandi, uti etiam *nec vena aperienda*, nisi quædam sang. evacuatio suppressa in causa sit, ubi V. S. conceditur *Vid. Miscell. A. N. C. Dec. 2. An. 2.* ubi ex recensione D. Valentini Mulier phthisi incipiente laborans V. S. restituta. Sed post vomitum reliqua cura consistit in mitigatione acrimoniæ salinæ; Quam enim noxia sit purgatio uti etiam V. S. in Phthisi *vid. in Borello Cent. 4. obs. 15.* Vulgò etiam solent inurere *fonticulos* Phthificis, seducti à Catarrho, quem ex capite in asperam arteriam depluere existimant, sed nil prosunt, modò non noceant. Temperata acida ceu experta commendat *Barbette in sua praxi p. 107.* & credo intelligere illum tabem ex stomacho, quæ tamen sub moderata dosi blandiora etiam sub cursu morbi haud adeò inconcinna sunt. Talia blanda acida sunt ~ sal. dulcis, liquor terr. fol. Tart. Elix. Prop. Mistura *Barbetti*ana ex †to & lap. 69.

Rx. Aq. Scabiosæ.

Card. bened. aa. ʒij.

prophyl. ʒß.

Syr. pap. errat.

laud. opiat. gr. i. M. F. Mistura cochleatim singulis horis capienda.

Item videtur huc facere *Conerdingii pulv. contra phthisin*

Rx. Sal. \* puri

nitr. depurat. an. ʒß.

liquirit.

ireos florent. an. ʒj. M. Dos. manè & vesperti, quantum cuspis cultelli capit.

Verùm in quac. tabe, in specie illâ, quæ jam in ulcus pulmonum transit, fugiuntur Vitriolata, quæ nocent pulmonibus, cum Vitriolum sit virulentum phthificis. Unde novi quosdam ad phthisin dispositos, propter Scorbutum vel malum hypochondriacum, visitantes acidulas, qui vel sub earum potu, vel paulò post Phthifici facti fuerunt. Hanc ob rationem dulcia saccharata & mellita admodum nocent quibusvis tabidis, fermentativa enim sunt & putrefactiva, adeoque visceri cuidam eroso, speciatim pulmonibus perquam inimica; præterea quoque insigniter stomacho hostilia sunt, ac imprimis quosvis corporis succos viscidiores ac activitate inertiores reddere solent: Unde etiam syruporum non nisi moderatus usus in Phthisi tolerandus, nisi in quantum ad lubricandas fauces interdum, sed cautè, ad scopum promovendæ expectorationis usurpantur. De nocumentis mellis & Sacchari *vid. Garenzer de Tab. Anglic. D. Phil. Jacob. Schenfelder* pro phthificis sequentes duas formulas celebres esse scribit l. i. curat.

Es hift.

Es hift. p. 21.  
modico fe  
biscocti coq  
17. exsiccent  
exsiccatore  
nen guten &  
Samel-od  
R. Radic.  
china incisâ  
bæ veron.  
rosar. ex o  
simi an. ʒ  
succ. ʒij. l  
nuo simul  
diar. simpl  
davon unte  
Qua  
tussilag. am  
rant quam  
etum hor  
veniunt.  
exemplar  
dicti, ex la

Pulv. Cnöp  
cura Cnöp  
morbo no  
Cnöp heli  
anilato se  
mnum. I  
has torul



*Chist. p. 219.* R. Farin. hordeac. ℥xv. Sacchari fini ℥v. lact. caprill. q. f. cum modico fermento fiat panis coctus: Scindatur in taleolas & rursum ad formam biscotti coquatur atq; pulverifetur. R. 69. fluviatil. benè mundatorum No. 17. exsiccentur in furno, ut in pulverem redigi possint. R. Pulv. panis ℥vij. 69. exsiccatorem ℥ij. M. Ein köstliches und bewehrtes Lungenpulver / davon einen guten Löffel voll alle Morgen in dünnen Gersten-Schleim / oder kräftigen Hamel-oder Fleischsuppen / mit ein wenig consummato vermischt / zu nehmen. R. Radic. chin. elect. ℥iij. radic. centaur. major. alth. tussilag. an. ℥ß. Prius china incisa coquatur benè in lb. v. aq. Tandem addantur reliquæ radices & herbaræ veron. scabios. pulmon. hederæ ter. capill. ♀ ana p. ij. Flor. viol. purp. rosar. ex obscurò rubrarum, tussilaginis, saly. an. p. j. sem. bombac. fœnic. erysimi an. ℥j. post debitam cocturam colentur. R. Colatur ℥xv. add. syr. viol. è succ. ℥ij. scabios. veronic. farfar. an. ℥j. sacch. cand. penid. mellis an. ℥ij. denovo simul coquantur & l a. clarificentur, imponendo nodulum cum spec. diaph. simpl. ℥iij. flor. benz. ℥j. M S. Kräftiger Lungen-und Brust-Zulep / davon unter Tages / wie auch zu Nacht ein guter Löffel voll zu nehmen.

*Quoad secundam indicationem* conveniunt hel-nium, liquiritia, betonic. tussilag. amygd. Sed passulæ imprimis laudabiles, quæ omnium optimè temperant quamvis omnium humorum acrimoniam & benè nutriunt. Unde decoctum hordei cum passulis. it. decoctum passular. c. rad. helen. aut cichor. conveniunt. *Joel* in praxi dicit, quod passulæ pinguefaciant & *River. Cent. 4. obs.* exempla habet pinguefactorum per usum passularum. In specie pulv. pectorales dicti, ex lap. 69. Sulphure. & diaph. antihectic. *Poteri* sunt egregii, v. g.

R. rad. ireos flor. ℥iij.

lap. 69. præp. ℥j.

antihectic. Pot. ℥ß.

croc. ℥j. M. F. pulv. pro aliquot dos. vel F. Rotulæ. It.

Pulv. *Cnopheli* ex Sulphure & aliis parati, quorum compositiones & usum vid. in cura *Cnophelianâ* in *M. A. N. C. Ann. 6. append. p. 81.* Ubi hæc: Primò in morbo nondum confirmato & absque excretionem sanguinolenta adhibuit Cl. *Cnophelius* pilulas suas Balsamicas ex aloe, myrrha & croco, cum bals. sulph. anisato seu Elixir. propr. helleborino efformatas. Dosis erat ℥ß. ante somnum. Post per octiduum, & quidem ter in die, scil. manè à meridie & vespere has rotulas sulphuratas, quæ

R. Specier. diareos, diatrag. frig. an. ℥ij. & ij fixi diaph. ℥vj.

A. sulph. ℥ß. Sacch. albi, in aq. tussilag. q. f. dissolut. ℥vj.

ol. anis. gt. xij. F. Tabulæ ad scatulam mundam.

Dos. 6. 7. & 8.



Vel R. ꝯijfix diaphor. ꝯiꝯ. flor. sulph. ꝯiꝯ.  
 ꝯpecier. diatrag. fr. diaireos, succin. alb. præp. an. ꝯj.  
 extr. helen ꝯiꝯ. bals. sulph. anil. ꝯiꝯ.  
 sacch. in aq. fœnic. s. an. q. s. dissol. ꝯiiij. F. l. a. Rotulæ.  
 Sequenti septimana loco rotularum præscripsit aliud, quod vid. ibi & plura.  
 Pulveres tales vel sumuntur in decocto hederæ terrestris, vel in decocto lign.  
 chin. vel sassafras &c. Sane sulphur ac alia sulphurea flores, Tinct. sulphuris,  
 & diaph. antihectic. Poter. mirè conveniunt, tam in Phthisi pulmonali inci-  
 piente, quàm in quacunque tabe ex acrimonia sanguinis enata; præsertim  
 puris acrimoniam non tantum corrigunt, sed & nimium ejus proventum coer-  
 cent optimè. Unde & balsamus sulphuris tam terebinthinatus, quàm anisatus  
 egregii sunt in Phthisi ex corruptione visceris cujusdam interni, aut exulcera-  
 tione nata. Dos gr. x. ad xii. in liquore appropriata, decocto nempe vulnera-  
 riô, vel lignorum, aut ex his misto decocto pectorali propinantur. Verum  
 cum ignea vis sit in hoc balsamô, ob id in iis, qui hecticâ manifestiori affliguntur,  
 cautè aut plane non usurpetur, cum observatum fuerit, quosdam ex nimio  
 bals. sulph. usu hecticam lethalem contraxisse. Hunc in finem cum tali bals. opti-  
 mō consilio junguntur alia, in specie sacch. ꝯ, quod singularem vim attempe-  
 randi & refrigerandi obtinet. Unde sacch. ꝯ i cum bals. sulph. à quibusdam bo-  
 no cum consilio usurpantur; in specie a. species dia ꝯ i *Mysichti* conveniunt.  
 Hinc & Tinct. antiphthifica dicta, ex sacch. ꝯ i & Vitriol. ꝯ is c. Spir. Vin. parata  
 hoc in passu usitata est. & diaph. & in specie antihect. *Poterii* per quam egre-  
 gium est, cum hic ipse hoc antihectico conservæ rosac. misto, aliquo-  
 ties Phthisin curaverit. Vid. Conf. 3. cur. 20. His omnibus pro scopo tempe-  
 randi tussim, præsertim nocturnam sistendi, & hinc copiosum nimis puris pro-  
 ventum coercendi merito accensetur opium, cujus largas doses præ aliis  
 ægris dū sine nocumentis ferre possunt Phthifici. vid. M. A. N. C. annô 4. p. 29.  
 ac opii usu imprimis diu conservari possunt phthifici. Sic aliquando Phthifi-  
 co dedi seq.

ꝯ. Conserv. rosac.

heder. terrestris an. ꝯj.

flor. sulph.

antihect. Poter. an. ꝯj.

lap. 69. præp. ꝯj.

laud. opiat gr. xvj. c. s. q. Diacod. Mont. F. Elect.

Quod intra octiduum semper assumat, capiendo bihoriô ante coenam bonam  
 dosin. cujus usu semper habent melius ægri, tussis remittit, melius dormiunt,  
 mane facilius magisq; cocta exspuunt. Sanè hæc opiata quotidie it. essentia opii  
 liquida successive ultra tres menses continuata sunt, citra sensilem noxam. Con-

veniunt

venit aut  
 quando diffi  
 da sunt, tali  
 termittantur  
 in parte læsa  
 sum sic inhib  
 usu sudores  
 seu confirman

duabus hor  
 reddebatur,

Vel pro

In specie co  
 siccaurget.

Conf. hic e  
 monita fue

Ad ha

incipiente p

lia aliâsin

catarrhalib

fermentur

Nam semp

bus capitis

phæ & san

rum decoct

reus l. 2. de

riô sanitat



veniunt autem præſertim in principio & incremento phthiſeos: In ſtatu verò quando difficilius eſt anhelitus, aut etiam quando multa viſcida expectoranda ſunt, tali in caſu, ne ſiſtatur excretio, cautè uſurpentur, aut penitus intermittantur. Certè irritationis ſenſum ſiſtendo, tuſſim, item humorum acrium in parte læſa decubitus & hinc ulteriorem corruptelam & ulcerofum progreſſum ſic inhiſcent. Hoc etiam commodi habent opiata in Phthiſicis, ut veſperſinò uſu ſudores nocturnos potenter cohibeant. Hinc aliquando Phthiſico perfectò ſeu confirmato præſcripti:

℞. Antihect. Pot. ꝯj.

Sacch. Fi. ꝯß.

extr. croci. gr. iij. l. v.

laud. opiat. g. ij. l. iij.

c. f. q. balſ. Peruv. F. Pilul. pro 2. dof. quarum unaquæque

duabus horis ante cœnam ſumatur. Sub uſu earum ſemper æger hilarior reddebatur, ſudore nocturno iſta nocte ceſſante.

Vel pro uſu veſperſino ℞. ∇. ſerpill. ꝯij.

Syr. de Veronic. ꝯj.

laud. op. gr. iij. M. F. Potiunc.

S. Abendträncklein auff 1. mal.

In ſpecie conveniunt talia, quando Tuſſis veſperſina aut nocturna plus minus ſicca urget. It.

℞. ∇. Scabioſ. ꝯij

Syr. Scabioſ. l. betonic. ꝯj

Diacod. Mont. ꝯiij. M. D.

S. Abendträncklein auff 1. mal.

Conf. hic ea, quæ ſupra circa tuſſim, de tuſſi ſicca nocturnâ catarrhali & c. monita fuere.

Ad hæc ipſa remedia alterantia, craſin ſanguinis & lymphæ corrigentia, in incipiente præſertim phthiſi pulmonali, pertinent etiam decocta lignorum, qualia aliàs in morbis chronicis lymphæ vitio & inde natis malis, ſeu affectibus catarrhalibus in uſu ſunt, quibus eo magis felici ſucceſſu utimur, ſi vulneraria, fermentum ulcerationis inchoatæ corruptivum corrigentia, ſimul addantur. Nam ſemper, quando præctici dicunt, eſſe labem pulmonalem à deſtillationibus capitis catarrhalibus, ſubintelligitur vitium pulmonum, ex acrimonia lymphæ & ſanguinis primariò dependens. Modus adhibendi huiusmodi lignorum decocta optimè docet *Arcenſtr. de vuln. capit.* Unde etiam *Alphonſus Ferrerens l. 2. de lign. Sanct.* decocto ejusmodi phthiſicos tantum non deſperatos demò ſanitati fuiſſe reſtitutos, refert. Non ſecus ac *Eraſtus in Conf. Scholzi*



„ 88. dicit: Curavi phthificos nonnullos planè desperatos & incipientes plu-  
 „ rimos. Summa curationis hæc est: Exhibeo illis decoct. lign. Sancti per  
 „ 2. vel 3. menses, prius purgato corpore, si ægroti sint cacochymici. In decocto  
 „ aliquando macerari jubeo faniculam, pedem leonis, sæpe pyrolam, quinque-  
 „ folium & veronicam &c. quæ simul subinde usurpantur; Expectorantia  
 „ sunt aut humida, aut sicca, ex speciebus diaireos simpl. flor. sulphuris sacchar.  
 „ candi &c. *Vid. Riv. in prax. it. Cent. 1. obs. 99.* Ex his radix chinæ & lignum  
 „ sassafras præ cæteris conveniunt, sed si ritè sibi volunt consulere tales ægri phthi-  
 „ fici, alio potu non debent uti, quam ejusmodi decocto. Decoctum sassafras  
 „ elegans *vid. in Poter. Cent. 2. c. 99.* Hisce accensentur etiam ligna fantal. simili  
 „ modò usurpata, præscribendi modus est seq. v. g.

℞. Rad. chin. in taleol. incis. ℥ij.

fl. papav. rhæad.

betonic.

Scabios. an. Mß.

passul. maj. enucl.

min. an. ℥j.

c. f. q. ▽. comm. coq. Colatur. edulcoratæ adde.

syr. papav. rh. parum.

S. Brusttranc auff etlich mal.

Vel. ℞. lign. sassafr. ras. ℥ij.

flor. papav. rh.

beton. an. p. ij.

macerentur per bihorium in ▽ font. hinc bulliant. Colatura  
 edulcorerur Syr. papav. rhæad. D.

S. Sonderlicher Glusttrunc.

Aliquando in tussi pulmonali phthisin minitante cum successu præscripsi:

℞. rasur. lign. sassafr. ℥j.

maceretur in aq. comm. Mens. ij. adde

Herb. heder. terrestr.

Scabios.

pulmonar. an. Mij.

fem. anis.

fœnic. an. ℥ß.

rad. liquirit. ℥ij.

passul. min. conquass. ℥j.

coq. ad tertias Colatura D.

S. Hust- und Brust-Tranc auff etlich mal.

Item

Item alii per

incisa macer  
 coctionis

stum in lecto  
 Terebinth. u  
 pabantur, sed  
 corrigendis, a  
 dam & hinc  
 inepta sunt h  
 phthisi non t  
 nempe speci  
 ceu ubi vis  
 phthisicum  
 hæc habet:  
 debet, adju  
 sudor colliqu  
 spem & opin  
 tussil. enul.  
 raceum.  
 bus & extra  
 heder. terr.  
 relicto.  
 letur. Ad  
 pistar. an  
 cemento pa  
 tas, vomica  
 quantitate e  
 Deo sic ann



Item alii perfectio Phthisico

℞. Lign. Quajac. ℥iij.

cort. ejusd. ℥j.

rad. chin. incis. ℥j.

bardan.

helen. an. ℥ij.

bacc. junip. ℥iij.

herb. veron. Mj.

heder. terr. Mj.

incisa macerentur in ℥b xij. ∇ simpl. per 24. hor. coq. ad dimid. addendo in fine  
coctionis

fem. anis.

foenic. an. ℥ss.

rad. liquirit. ℥j.

Colatura D. capiebat omni mane bonum hau-  
stum in lectō, expectando aliqualem sudorem, addendo simul gr. xij. bals. sulph.  
Terebinth. unicuiq; haustui. Vespertino vero tempore remedia cum opio usur-  
pabantur, sed minus, cum hectica ager affligebatur. Scilicet pro lymphæ vitiis  
corrigendis, ad ejusdem nimiam effusionē, pulmones nimis irritantem inhiben-  
dam & hinc puris seu sordium quantitatem & qualitatem corrigendam, non  
inepta sunt hæc ligna, præsertim cum vulnerariis usurpata, idque præsertim in  
phthisi non tam confirmata, quàm adhuc crescente. Cætera huc facientia,  
nempe species diaireos, diatragac. Pulv. Hali contra phthisin sperma ceti &c.  
ceu ubivis nota, in medio relinquo. Pertinet huc Electuarium illud Anti-  
phthisicum, quod *M. A. N. C. Dec. 1. Ann. 4. p. 134.* habent, ubi *D. Winclerus*  
hæc habet: Uxor quædam post hæmoptysin sæpius molestam in phthisin inci-  
debat, adjuncta hectica. Expuebat tussiendo purulenta cruore tincta, aderat  
sudor colliquativus respiratioque valde difficilis. Tamen unicō hōc præter  
spem & opinionem omnium Deo benedicente evasit. ℞. rad. symph. maj. "  
tussil. enul. mundat. an. ℥iij. coq. in aq. f. q. admollit. Tunde & trajice per se "  
taceum. ℞. passul. maj. & min. ana ℥b. ss. coque in brodio reliquo à radici- "  
bus & extrahatur pulpa eodem modo. ℞. Salviæ acut. beton. hyssop. veron. "  
heder. terr. pulmonar. macul. an. Mj. coq. ad mollitiem in brodio à passulis "  
relictō. ℞. decoct. colat. add. Sacch. canar. ℥b. j. coq. ad consistend. co- "  
letur. Adde it. pulv. radicem & passul. amygd. d. excort. pinear. rec. probè "  
pistar. an. ℥iij. cinam. ℥ij. croci ℥j. M. f. l. a. Elect. Eodem quoque medi- "  
camento paucis mutatis filium meum 3. annorum, cui post petechias supera- "  
tas, vomicæ in pulmonibus 4. vicibus collectæ & ruptæ, ita ut pus in magna "  
quantitate expectoraret, macie valde confectum & calore hectico consumtum, "  
Deo sic annuente feliciter restitui. Pertinet & huc denique conserva, seu ut "

alii



alii vocant, saccharum rosatum, à pluribus adeo decantatum. Ac sane alcali non nihil stypticum in flor. ros. rubr. egregium est, pluribus scopis ad acrimoniam præsertim succorum corrigendam & viscerum tonum conservandum interveniens, sed saccharum junctum non æquè omnibus proficuum & hujus ratione nociva quibusdam observata fuit. Conserva *Vid. Sylvium ubi de phthisi* §. 187. Aliàs à pluribus expertum idque sæpius feliciter est remedium. Ususest, ut vel crebrius pro lubitu usurpetur, vel vespertino præsertim tempore crebrius assumatur. Ex quo c. flor. sulphur. terr. sigil. ꝯ. diaph. rad. ireos. flor. aliisq; similibus pectoralibus Electuaria parari possunt. In specie pulv. fungorum salicis, in plenilunio Mens. Maij collector. ꝯß. cum hac conserva crebrius usurpatus quibusdam singulariter laudatur. Nempe spongiæ istæ viridiusculæ in salice superius adnascens exsiccantur in sole, pulverisantur & ita cum aliis contra phthisin usurpantur.

*Pro tertia deniq; indicatione*, quæ læsionem partis respicit, præsertim ulceratæ, conveniunt ea, quæ fermentum acidum, partis plus minus ulceratæ corruptivum, corrigere & ita puris ulteriorem proventum inhibere valent, adeoq; detergentia & mundificantia applicantur; hinc usurpentur ea, quæ naturæ opus in consolidando loco læso adjuvent, quantum possibile. Hæc inter excellent vulnèria dicta, quorum alcali pluribus usibus in phthisi curanda interviit, si præmissis præmittendis usurpentur, in specie si ventriculi ac primarum viarum & his in locis, principalioris assumtorum alterationis, habeatur ratio. Hinc decoctum bugulæ seu consolidæ mediæ admodum commendat *Poterius in Pharmac. Spagy.* Decoctum vero symphyt. & prunell. cum china & Quajac. laudat *Lindanius*, assumendo in quolibet haustu dosin ꝯij diaph. Hinc & fanicula, veronic. plantago, vinca per vin. equiset. flor. ros. &c. tam in decoctis, quam inde paratis pulveribus, aut cum saccharo & melle electuariis, in usu sunt. v.g. Sequenti decocto *Chirurgus* quidam *Stetincensis* phthisi laborans per multos annos se sustentavit,

℞. Herb. alchymill.

pulmon.

fanicul.

cent. min.

veron.

auric. mur.

vinc. pervinc.

flor. hepatic. an. Mj.

coq. in cerevisia bene defecata;

de Colatura bibat æger manè jujune ante prandium, ante cœnam & cubitum iturus.

Vel

Vel in ph

vel decoct

Apur

ribus cellit

et phthisi

gredientium

visceribus,

℞. 2

Faciunt h

Pertiner

ex pulv.

dactis.

balsamic

Pa



Vel in phthisi pulmonali nondum inveterata

℞. Herb. heder. terrestr.  
chærefol.  
veronicæ aa. Mj.

rad. helen. ℥i℥.  
ireos flor. ℥j.

sem. anis. ℥iij.  
fœnic. aa. ℥ij.

ficuum pingv. N. iv.

passul. min. ℥i℥.

rad. liquirit. ℥vj. M. coq. in aq. & ita F. *infus.*

vel *decoctum*, vel cum sacchar. *syrupus*, aut cum melle *hydromel* &c.

Apud nos pluribus in frequenti usu est sequens farrago, quæ feliciter pluribus cessit, magis tamen ad phthisin pulmonalem inclinantibus, quam perfectè phthisicis, liquidem ob alcali herbarum vulnerariarum aliorumque ingredientium vis alterativa, in corrigendis corporis contentis & confirmandis visceribus, non contemnendi usus est:

℞. Anis. Samen / Fenchel Samen / aa. Mij. Engelsüß / Inngen-  
kraut / Leberkraut Blumen / Ehrenpreis / Tormentill-wurzel /  
Sennet-blätter / Süß-holz / jedes Mj. grüne Salbey / grün  
Tfop / grün Leberkraut aa. Miß. diese Kräuter sambt ein paar Löf-  
fel voll Honig zusammen in einen neuen Topff von 4. biß 5. Kan-  
nen mit Röhrwasser gethan / wol vermacht / mählich gesotten /  
und ohngefehr halb einkochen lassen / welches in zwey biß dritte-  
halb Stund geschicht / so dann Morgends und Abends ein  
Löpflein davon getruncken.

Faciunt huc *pulv. antiphthisici*, præsertim *pulv. antiphthisicus D. Erbenii*:

℞. Visci pyror.

salviæ an. ℥j.

pulmonar.

veronic.

flor. farfar. an. ℥i℥.

rad. enul. ℥ij.

sacc. cand. alb. ℥ij. M. F. Pulv., Dos. ℥j.

Pertinent huc *Electuaria* quorundam, imprimis tamen excreationi inservientia, ex pulv. scordii, salviæ, rad. helen. &c. cum melle ad Electuarii consistentiam redactis. Sed cum his vulnerariis modo recensitis, in specie simul usurpanda sunt balsamica, in tantum, quantum hectica plus minus juncta usum eorum ferre potest,

Pars II.

Vel



potest, adeoque minus confirmatis, seu in cura magis incipientibus, i. e. in præ-  
servatione phthysicos conducunt, qualia ex aloë, myrrha, bals. sulph. tereb.  
Peruvianô & similibus usurpantur. Nempe *bals. Peruvian.* gt. j. aut plures cum  
sacch. in pilulas redactæ, aut etiam guttatim in vehiculo calido, aut vitello ovi  
sorbilis dissolutum balsamum & quotidie usurpatum, multum laudatur ad qual-  
vis partium internarum læsiones & exulcerationes. Huc pertinet bals. Pneumo-  
nicus *D. D. Dolæi in Encyclop. de Phthysi* descriptus; hinc & *Riverius* multum  
commendat has pilulas:

℞. M. P. Ruffi ℥j.

℥ diaphor.

Gumm. Quajac. an ℥ss.

c. q. i. bals. Peruv. F. Massa. Dos. ℥j. Capiatur per mensem in ægrum.

De *Terebinthina* res nota est, quantum vi balsamica in quibusvis partium ex-  
ulcerationibus valeat. Optimè datur in ovo sorbili, vel sola, vel addito modi-  
co flor. sulphuris; it. permisceri solet eadem cum melle violato, & cipiando  
Terebinth. ℥ss. mellis violac. ℥ij. M. cum pauco vitello ovi, de quo capiat æger  
omni manè quantitatem castaneæ, in jusculo calido. Alij Terebinth. ℥ss. c. mell.  
ros. & syr. heder. terrestri vel Nicotian. miscent & in forma boli subinde  
assumendum suadent. Sed nimis ingratus hic ejus usus; omnium optimè vi-  
tello ovi dissoluta capi potest.

Quoad *Symptomata*, præsertim in phthisi mitiganda, *Tussim* quod  
attinet, præsertim ferinam, hanc mitigant optimè supra laudata opiata, quæ ipsa  
etiam *sudores nocturnos* cohibere solent.

Quoad Symptoma in *Screatu*, equidem Nicotiana & quævis ex ea parata  
sunt optima. *Heurnius in Praxi* solo syrupo, ex succo ritè parato, quosdam ta-  
bidos phthysicos restitutos fuisse memoriæ prodidit. Certè ad ulcus pulmo-  
num abstergendum & sordes acres plus minus viscidas pectori inhaerentes eli-  
minandas optima sunt ex Tabacô remedia. Pariter si *sputum multum ac feti-  
dum* fuerit, mel & myrrha screatum promoventibus semper addenda erunt.

*Diarrhæa colligativa* si quæ supervenerit, utut ferè mali sit ominis, ab-  
sorbentibus, terrâ sigill. CC. ust. & simil. inhibetur, vitando tunc, quantum  
possibile est, mellita, facilè aliàs alvum moventia. De *suffitibus*, odoramentis  
& similibus nil attinet dicere. Conferatur supra laudatus *Bennettus*.

Quoad tertiam indicationem, ut *Dieta* ritè formetur, imprimis ven-  
triculi ejusque virtutis digestivæ & hinc dictaminis appetitus habenda  
est ratio. Hinc alimenta probè nutrientia, copiosum alcali, quodvis acre tem-  
perans, suggerentia & quæ succum minus alterabilem sed potius glutinosum,  
roridum, nec facile exhalabilem suggerunt: Hinc *o.* ostrea &c. subinde  
utiles

utiles phthi-  
pulmonum.  
nia, ubi ex  
tem correctæ  
atrophia à  
impedimen-  
ventriculo  
est à nimia  
ne & at em-  
cile coagu-  
alium cibi

manas, c  
tio corpori  
ex ulcerati-  
abstergit p  
Omnibus  
testatur *Pl*  
gens, quia  
præsertim  
butica ph  
aut & x. a  
vid. *Borel*  
*Riverius*

Præ-  
sorbilia su-  
Atrophia  
guento ar-  
materiali

Qu-  
servatur  
occasione  
quando  
tem nut-  
eam ten-  
ro & si-  
laves, m  
quodvis  
D



De Phthisi atq; Tabe.

utiles phthificis observata fuerunt. *Lindanus* sanè refert, hæcticam ex ulcere pulmonum, copiosò *ostrearum* elu curatam. Præ cæteris *lac* & quælibet *lacticia*, ubi cætera ritè præmissa fuerint & dyscrasia contentorum maximam partem correctæ, convenientissima sunt. Aliàs vix aut parum proderunt, quoties atrophia à colluvie cujusdam visceris aut vitio stomachi enata fuerit, nisi hæc impedimenta prius removeantur, quia aliàs vix fieri poterit, quin *lac* in ventriculo etiam corrumpatur. Convenit igitur imprimis in Atrophia, quæ est à nimia acrimonia humorum, cum eorum caliditate, ubi opus & humectatione & atemperatione. De Saccharo semper aliquantulum addatur, ne tam facile coaguletur. Porro qui *lacte* ritè volunt uti, debent ter in die sumere & vix alium cibum gustare, saltem passulas quasdam sumere, idque per aliquot septimanas, donec denuò corpus iterum proficiat. Sumto lacte moderato exercitio corpus movendum est, ut facilius idem distribuatur. In istâ etiam tabe, quæ ex ulceratione pulmonali oritur, *lac* itidem præmissis præmittendis confert, Nam abstergit parte serosa, conglutinat caseosa, nutrit corpus & temperat butyrosa. Omnibus verò præferendum est *lac muliebre*, quo multos restitutos se vidisse testatur *Platerus*. Ab hoc proximum est *lac asinum*, optimè ulcus detergens, quia serosum, cui succedit *caprillum*, scorbuticis imprimis conveniens, præsertim si capra prius appropriatis vegetabilibus nutrita fuerit. Sanè in *Scorbutica phthisi* optima sunt lacticia, quibus instillari possunt Spir. Cochlear. aut  $\theta^*$ . aliave similia. Quantum butyrum è lacte muliebri in phthisi valeat, vid. *Borell. Cent. 3. Obs. 82.* Item de lactis muliebris usu, præter *Forestum in obs. Riverius in obs. communicatis.*

Præterea ad *Dietam* passularum earumque Rob crebrior usus, & ova forbilia sunt optima. Sunt qui etiam *Transplantationis* medio curare satagunt Atrophias. Modus vid. in *Hartman. Prax. Chym.* ubi de Atrophia. It. c. unguento armario. Vid. *Schmuck. in cur. magnet. pag. 59. ut. Paracels. de rebus materialibus.* Sed talia transeant. Hæc de Atrophia universali.

Quoad *Atrophiam particularem*, quæ aliàs *Aridura* dicta, rarius observatur in quadam parte à causa interna, ut plurimum præcedentem quandam occasionem externam eadem sequitur ob nutrimenti vitium & ejus defectus; quando nempe tam sanguis propriè dictus quam chylus non rectè affluit in partem nutriendam, propter quoddam impedimentum, propter arteriæ nempe ad eam tendentis læsionem & compressionem, ex luxatione, fractura, tumore duro & similibus. Rarissimè tamen ex hoc principiò oriuntur *Aridura particulares*, motus enim sanguineæ massæ est vehemens, ejusque insignis per porulos quosvis & angustias penetratio, ut in valis capillaribus manifestum est.

Deinde fit *Aridura* vitio partis debilitatæ, ita ut nequeat alimentum, licet



conveniens aut recipere aut retinere, aut commodè istud agglutinare. Debilitas hæc dependet à Spirituum vitio, animali nempe influo, & hinc insito, qui ceu agens se habent in nutritione & alimenti partis appositione. Debilitatur autem Spiritus insitus in manifesta membri, cum vulnere ac ulcere, læsione, quando nempe in vulneribus nutrimentum partis copiosius effluit, aut per ulcera idem copiosè in pus mutatur & ita cum succo nutritio influo simul Spiritus influus absumitur, à quò Spirit. insiti conservatio & vigor dependet; pars arefcit, ac difficilè postmopum restitui potest. Usu hoc venit præsertim in articolorum vulneribus & hinc aliarum partium nervosarum similibus læsionibus, quibus copiosior lymphæ fluxus sæpius supervenire solet. Nam *Synovia* hæc est liquor chylosus nutritius, in parte nutrienda, occasione vulneris plus minus ad ulcus tendentis, degenerans in liquorem saniosum & aquosum, sub qua degeneratione acorem occultum contrahit, ut exinde vulnera ista non solum periculosa fiant, sed simul partes læsæ, dum destituuntur convenienti nutrimento, necessariò arefiunt, unde fibræ exiccatae & contractæ poros partis magis connivere faciunt, ipso vero insito Spiritu simul plus minus labefacto, nutrimenti convenienti affirmationi impar redditur. Unde sanato licet vulnere seu ulcere, nihilominus tamen pars difficillimè denuò nutrirî potest, quin potius pertinax *Aridura* sequitur. Quin & cum debilitata dicto modo pars minus robusta sit atque alia ipsi respondens (id quod *robur inaguale* vocat *Helmont*,) propterea facilius ac sensibilius ferè externorum objectorum impressiones recipit, unde tales ægri restituti licet, tamen qualvis aeris mutationes in loco antea læso mox præsentiant Spiritus deinde influus & debilitatur in aliis partium nervosarum læsionibus, sine aperta licet continui solutione, modò debitum motum Spiritus influi plus minus inhibere queant; hinc paralyfes, convulsiones articulorum & hinc compressiones & distorsiones nervorum ac tendinum, it. horum ipsorum dislocationes &c. à quibus ipsis, externis licet & apparenter parvi momenti læsionibus, propter Spiritus animalis influi impeditum plus minus radiosum influxum, pars in motu successivè debilior, cum sensu quodam stuporis aut formicationis, successivè flaccidior & plus minus tabida quasi redditur. Pertinet huic denique defluxus Catarrhalis, quando vid. sine ulla causâ manifestâ, saltim ob lymphæ catarrhalis decubitus in quandam partem ejusve articulationem & inde fibrarum ac tendinum paralyticam plus minus resolutionem, cum sensu doloris obtuso, præsertim vespertino ac nocturno tempore ingravescente, pars successivè ad Atrophiam particulariter disponitur. Quâ ratione non rarum est, in arthridide vaga scorbutica aut etiam in aliis arthritidis speciebus, partem, quæ sæpius aut gravius affligitur, debilitari successivè, flaccescere plus minus ac tabescere. Omnes hæc ariduræ difficiles sunt curari, idque eo magis, quò magis confirmatae ac inveteratae. Præ cæteris tamen optimè scripsit de hoc



de hoc negotio *Felix Würz* in der Wund-Ärgney Tit. Von den Zufällen der Wunden *cap. 29. 23. p. 580.* Post hunc *vid. Agricola in Chirurg. parv. p. 31.*

Quoad *Curam*, hæc eò sit directâ, ut promoveat Spirituum animalium & hinc simul M. S. ad partem influxum, quo reparetur sufficiens nutritio. In specie habenda est ratio, an cum solutione continui & effluxu spirituosî nutrimenti inducta fuerit aridura, an vero solâ læsione, sine continui solutione, sive hæc à vi externa facta fuerit, sive ab interno lymphæ acidæ decubitu. Nam *si prius* obtinet, remedia magis temperata, adeoq; ut vocant, moderatè calefacientia, sed probè humectantia & humore roscido oleoso partem perfundentia adhibenda hic sunt. Hinc, ut vocant communiter, calefacientia & facultatem attractricem stimulantia conducunt, ut ita sensibilius afficiendo sensum tactûs, Spirituum uberior radius humorumque copiosior affluxus ita in parte conservetur; *Ultimum si fuerit*, cum internis seu sudoriferis, externa discutientia & resolyentia usurpentur. Catholicum ad particulares ariduras remedium est arcanum *aluminis* quod commendat *Felix Würz* in *Chirurg. cit. loc.* cum linimentis & pinguedinibus appropriatis applicatum. In specie autem *si cum effluxu nutrimenti* aut Synovia, post vulnera insigniora sit aridura, conveniunt foci partis c. decoctis emollientibus, ex animalium partibus paratis, v. g. ex capite, pedibus, pulmone & hepate ovis & agni &c. Postmodum fiat litus ex pinguedine hominis, vulpis, ursi, canis, lupi & taxi &c. vel in specie f. Unguentum, ex pinguedine ardeæ, ranarum, an.  $\text{ʒij}$  porcellorum  $\text{ʒiij}$ . & facto litu applicetur Empl. ex pinguedine porcina. Quod *si vero ex paralyssi contusione &c.* sequatur aridura, post frictiones partium deorsum versus institutas, linimentum ex alumine plumoso, pulvere sabinae, oleo laurino, juniperino & similibus, prout à Wittigio describitur, usurpetur; vel fiat  $\nabla$ . cum vino destillata ex sem. cortic. radic. armorac. & similibus, prout describitur ab *Agricola cit. loc. it. à Schmuckio Thesaur. Med. secret. 50.* & cum pannis calidis probè affricetur & applicetur, præsertim in casu ubi ariduræ membri sensus fornicationis aut stuporis unâ adsit. Præter quæ remedia etiam ex Lumbricis paratus Spiritus ac. litus in aridura ex dictâ causâ convenit. Quæ ipsa etiam locum habent, si ex defluxu catarrhali dolorosa aridura superveniat. In quò casu præter sudores internis concitatos, optimi sunt spiritus formicatum & lumbric. terr. c. pauc. Spir. Vin. addito alcali fixo per retortam destill. & rectificati, vel aquæ articulares ad extra c. panco spirit.  $\text{ʒx}$ . c. calc. viv. ita applicentur aut usurpetur; imprimis liquor lumbricorum terrestrium, per deliquium in clibano paratus, prout describitur à *Mollenbroeck de Varis p. 270.* cum usu applicari potest &c.

*Qualitate peccans corporis nutritio* in genere vocari solet



## CACHEXIA

in qua natus cutis color, imprimis faciei nitor languescit mutaturque in varium, pallidum, lividum, luteum, virentem & est revera cachexia fructus cacochymiae, hæc verò pedissequa cacochylia. Dependet sic ab effusione vitiosi nutrimenti, i.e. humoris vitiosi, loco nutrimenti hinc inde distributi in habitum corporis; & humor iste, qui ita habitui corporis affunditur, si est albus, dicitur *cachexia* in specie; si flavus *icterus*; si viridiusculus seu luridus aut lividus, aut alio tetro colore tinctus, *icterus niger* audit.

In genere igitur quamcunque corporis & partium subcutaneorum mutationem à statu naturali in deteriore innuit, ex vitiatâ quasi nutritione dependentem, unde variae *cachexiarum* sunt species. Nam præter dictas datur cachexia scorbutica, it. hypochondriaca &c. In specie tamen usus obtinuit, ut vitium istud tantum cachexia appelletur, quando corpus à nativo colore in pallidum & humidum, subtumidum & flaccidum degenerat & à sanguificationis defectu in specie dependet. *Pars* igitur *affecta* seu *subjectum* inhaesionis sunt partes solidæ, in specie molliores; *subjectum* vero radiationis est massa sanguinea cacochymica facta.

*Cachexia* talis præter cutis mutatum colorem junctam simul solet habere dispoenam, præsertim quoties corpus, adscensu in altum, tantillum movetur, quando tunc sæpe cordis palpitatio, arteriarumque circa jugulum temporaque pulsatio observatur. Accedit quoque universi corporis, præ cæteris crurum lassitudo, urget non rarò compressivus & anxiosus præcordiorum dolor, qui post alimenta assumpta intendi solet. Adest sæpe etiam febris lenta, fere quotidiana periodica, pulsus sunt inæquales, parvi, frequentes & debiles, Urinæ sæpius etiam sunt crudæ & turbidæ, copioso sedimento albo. Tandem corpus turgit & tumet, sequitur *Leucophlegmatia*, ac tandem *anasarca*, tam universalis, quam subinde particularis crurum, cum *ascite abdominis*, seu hydrope in specie sic dicto. Nulli ætati parcit cachexia, licet scæminas ob vitam sedentariam frequentius & ob supervenientia menstruationis vitia contumacius afficiat. Quin & sæpius comitem habet affectum Scorbuticum aut Hypochondriacum. Plura huc facientia vid. in spec. in Sylv. l. 4. Pr. & Tr. de Cachexia.

*Causa proxima* Cachexiæ est nimia cruditas M. S. indeque dependens deficiens aut imminuta ejus fermentatio. Unde chylus & ipse plus minus vitiosus non ritè assimilatur, sed tota massa eodem repleta cruda & vitiosè fermentans manet, unde tali crudo sanguine per partes circulato, hæ chylo & sanguine, non ritè alteratis nec volatilifatis, infarciuntur potius, quam debita assimi-

assimilatione  
rum esse, quæ  
hæret.

*Cam*

nunc esse affe  
inlequitur m  
confluetas sup  
rum fluxus c  
albos, it. feb  
tentus etiam  
§. obs. 21.  
obstruction  
inferunt.

*Cachex*

alimenta nec  
volatitem ab  
sum in prim  
chexiæ ponit  
acrimonia fa  
fæces f. parat  
debitam ch  
Quin hic ex  
unde de fa  
moveretur ad  
debita ferme  
strua sanguin  
ut habitus ce  
rum & nerv  
mus Cachex  
Etici enim r  
simul fuerit  
major, sit  
etiam vala  
lymphatica  
chedticum  
plus minus  
magis ad ir  
ordinarius



assimilatione nutriuntur, ita ut rectè dicat *Forestus*, corpus non aliter inflatum esse, quam pasta non ritè fermentata, in qua digiti impressi vestigium hæret.

*Causa remota* est multiplex. Observandum enim cachexiam nunc esse *affectum primum* & qui per se incipit, nunc *secundarium*, aliosque insequitur morbos, v. g. qui quasvis sanguinis nimias effusiones, aut ejusdem consuetas suppressas, insequitur; in specie mensium suppressio, uti & nimius eorum fluxus cachecticas reddunt mulieres. Sic gonorrhæas diuturnas aut fluores albos, it. febres chronicas ordinariò insequitur. Mola aut fœtus mortuus retentus etiam cachexiam inferunt. *vid. Forest. libr. 19. obs. 26. in schol. Horst. l. 5. obs. 21.* Urinæ suppressio, viscerum hepatis aut lienis vitia, uti sunt atonia, obstructions & tumores faciliè scirrhescentes, renum ulcera &c. Cachexias inferunt.

*Cachexia primaria causa remota* est deficiens chylosis, dum nempe alimenta nec ritè fermentando volatilantur, nec in subdulcem aut subsalsum volatilem abeunt liquorem, sed in pituitam acidam degenerant, adeoque vitiosum in primis viis acidum quasi fixum nec volatile, primum fundamentum cachexiæ ponit, quod fovet ulterius semper conjuncta bilis inertia, seu deficiens acrimonia salino volatilis, quæ nec corrigit, nec perficit debitè chylum, nec ritè fæces separat. Unde M. S. particula fermentativæ succo isto crudo obrutæ, debitam chyli alterationem & sanguini assimilationem perficere nequeunt: Quin hic exinde crudus, plus minus viscidus & quasi occultè acidus remanet, unde de facili stagnans in præcordiis, dum levi corporis motu celerius movetur ad pulmones & cor, *disponeam & anxietates* infert. Quin & M. S. debita fermentatione vitiata & imminuta, imminuitur quoque in fœminis *menstrua sanguinis fermentatio*. Quod si ulterius incrementum capiat malum, ita ut habitus corporis tumidus insigniter inflatus & exinde fibrarum musculosarum & nervosarum laxatus tonus flaccidus fiat, dicitur *Leucophlegmatia*, summus Cachexiæ gradus. Quod si ex retento qualicunq; occasione sero (cachectici enim non, aut difficillimè sudant, & parum quoque mingunt,) serosior simul fuerit sanguis, oritur vitium, quod dicitur *Anasarca*, quæ eò erit major, si tali succo crudo obstruantur glandulæ partium musculosarum, aut etiam vasa lymphatica, ita ut lymphæ, aut saltim serositates non commodè per lymphatica reduci queant. Unde *Borellus Cent. 3. obs. 66.* observat corpus cachecticum crysalli instar translucens. Quod si humorum istorum serosorum plus minus chylosorum seu pituitosorum, ex proprio impetu, decubitus fiat magis ad inferiora, unde crura, scrotum ac tandem abdomen intumescant, erit ordinarius sic dictus *Hydrops*.

Con-



Confunduntur equidem subinde Leucophlegmatia & Anasarca, sed non, nisi subjecto, nempe habitu corporis conveniunt. Nam in Leucophlegmatia est habitus pituitosus, (i.e. crudus chylosus) Anasarca verò est ab ichoroso & crudo sero, in habitum corporis deposito, concurrente forsitan plus minus vasorum lymphaticorum ruptione: Hinc in Leucophlegmatia minus est splendoris ac nitoris, quam debet esse: In Anasarca plus iusto splendet ac nitet corpus; deinde vestigia digito impressa diu durant in Leucophlegmatia, quæ in Anasarca brevi disparent & fere Anasarca Leucophlegmatiam insequi solet.

Vulgo statuitur cachexiam & similes affectus oriri ex intemperie frigida, quæ sententia cum superstructa sit hypothesi, quod hepar sanguificet mediante suo calore, sponte ruit; quin potius Willis in Pharm. rat. part. 2. p. 384. & seqq. materiam esse humorem serosum, efficiens vero esse sanguinem cachexiæ & Leucophlegmatiæ asserit. Occasionales causæ chyloseos vitiatæ, à rebus non naturalibus dependent.

Quoad Cachexiam secundariam, nascitur hæc talibus occasionibus, quæ sanguinem immediatè afficere, vel, idque frequentius, mediante læsionis digestionis primæ eundem alterare possunt. Sic ea quæ Spiritus nimis exhauriendo, aut dissipando & hinc fermentationem stomachi lædendo, ut hæmorrhagiæ nimix, gonorrhææ: Vel fermentum digestivum alterando, ut menses suppressi & febres chronicæ, mediatè sanguinem alterant. Immediatè afficiunt sanguinem lues Venerea semper cachexiam comitem adsciscens. Urina suppressa, viscera, abdominis præsertim, affecta, sanguificationis aliàs perfectioni inservientia, fœtus mortuus, aut secundinæ retentæ, sanguinem inquinando debitam quoque ejus spiritalcentiam impediunt.

Quoad Prognosin malum est chronicum cachexia & tardæ curationis: Quò magis inveteratum, eò difficilius curatu, sed læpissimè in Hydropem degenerat. Sin occurrat scirrhus hepatis aut lienis confirmatus, vix cachexia curabitur. Si sequatur febrim acutam, aut intermittentem chronicam, malè à Medico, vel crebriori potu ab ægrò, tractatam, difficilis curatu. Si cachexia superveniat mulieribus, quibus ordine naturæ menses deficiunt, difficulter curabitur.

In Cura attendatur I. ut emendetur prima digestio. 2. Corrigatur massæ sanguinæ discrasia.

Unde in Cachexia primaria I. acidum vitiosum primarum viarum removendum per absorbentia, in specie & alia, partes animalium duras, terrea, alcalia tum fixa tum volatilia. II. Viscidum incidendum & attenuandum per gummata, salia tam salia quam alcalia, stomachica aromatica. III. Bilis inertia acuenda, aromaticis seu resinosis volatilibus oleosis, præsertim amaris, quæ alias hepatica



hepatica dicuntur. IV. Cruditates primarum viarum & sanguinis plus minus correctæ, evacuandæ vomitu, secessu, diuresi &c.

In *secundariâ* vero *Cachexia*, morbus primarius curandus, aut læsiones ab illò inductæ seu relictæ eliminandæ, semper digestionis primæ negotium, quantum possibile, observando. Hoc ut ritè insequamur, rectè monet *Lindanus*, quod observandum; quòd cachectici, quò lenius tractentur, tantò citius curentur. Et cum cachexia sit initium hydropicæ, commode methodus & medicamenta quæ in hydropice conveniunt, etiam in cachexia adhiberi possunt, & contra ea quæ in cachexia usurpantur, validiora tamen, in Leucophlegmatia & Anasarca quoq; profunt. In specie conveniens regimen *diætæ* observandum & præsertim motus persuadendus, id quod confirmat *Panarolus Pentec. obs. 30.* de muliere admodum cachectica exercitiò plus quàm alio auxilio sanata. Hinc

R.  $\theta$ . digest. hypochondr.  $\mathfrak{z}$ j. ad.  $\mathfrak{z}$ iiij.  
div. in 4. part. æq. D. S. digestiv Pulver.

Vel hujus loco R. Crem. Tart.  $\mathfrak{z}$ j.

lap.  $\mathfrak{D}$ .  $\mathfrak{z}$ j. M. pro 2. dof. duobus diebus, manè, in vehiculo calido, assumendis.

Vel R. Tart. Vitriolat.  $\mathfrak{z}$ ij.

$\theta$ . absinth.  $\mathfrak{z}$ j. M. div. in 2. part. æq. S. digestiv Pulver.

R.  $\theta$   $\times$ .  $\mathfrak{z}$ ij. p. 2. dof. S. digestiv Pulver.

Quibus præmissis una alterave vice propinetur *vomitivum*, aut si hoc minus conveniat, instituitur *purgatio* per alvum.

R. Extr. Panch. Croll. g. xv.

$\mathfrak{O}$ is cum succ. pomor. g. vj. l. vij.

troch. alh. gr. j $\beta$ .

c. f. q. essent.  $\mathfrak{O}$ . F. Pil.

Aut etiam potio *laxativa* cum gumm. ammoniac. usurpetur.

In *Anasarca succus ireos* recens per residentiam depuratus, cum paucâ *mannâ* mistus, convenit, ad ferositates abundantes evacuandas.

His præmissis R. Solut.  $\mathfrak{O}$ . c. succ. pomor.  $\mathfrak{z}$ ss D.

S. *Grösnende Essenz* dof. 20. ad 30. gutt. cum leni motu.

Vel in subjecto paulo robustioris stomachi

R. Liquor.  $\mathfrak{O}$ is solar. dof. ad 40. v. 50. gr. simili modo.

Vel R. Salis  $\mathfrak{O}$  compos.  $\mathfrak{z}$ iiij. D. S. &c. Dosis omni manè quantum cuspis cultelli capit. Parili ratione *Tinct. Viriol. Ois Ludovici, pulv. cachect. Hartman. vina Dialia* commodè usurpari possunt, observando conditionem vinctriculi plus minus robusti & qui facilius aut difficilius talia ferre possit. Quo facit *Claretum Dial. Mynsicht. Vinum Malvaticum Dial. Hart.*

Pars II.

d

$\mathfrak{O}$ is



*Et in specie, de pulveribus anticachecticis vid. Hartman. in prax. Chymiatr. p. 204. 206.* Sub usu *martialium* alvus semper aperta servanda est; quare consultum, omni septimana semel, vespertino tempore, dosin *pilularum usual. v. g. Clavianar. aut Francos. aut* quales describit *Sylvius in Prax. c. 7. §. 52. p. 69. &c.* usurpare & ita interpolatis vicibus cum istis *Chalibus* adhibere. His aliquandiu continuatis, fiat progressus ad *alterantia volatilia* plus minus *aromatica*, qualia sunt omnia aromata, omnia simplicia amara, *hepatica* aliàs dicta, omnia *salia* & *Spiritus urinosi volatiles* tam *simplices* quam *compos. Rob Juniperi, pulpa passular. & omnia passulata, elix. P. &c.* Quibus pro circumstantiarum ratione nunc febrifuga, nunc antiscorbutica, nunc emmenagoga permiscenda. *Elix. P. s. acido, Tinct. Tart. compos. &c.* Horum usus multiplex est, frequentius in forma nodulorum usurpantur, nunc specialiter alterantium, nunc simul laxantium, nunc ante, nunc post *Chalia* v. g.

℞. Herb. absinth.

menth. an. Mj.

rad. helen. ℥j.

gentian. ℥ss.

rhabarb. elect. ℥vj.

fol. sen. s. st. ℥j.

rad. helleb. nigr. non præp. ℥vj.

cortic. esul. præp. ℥iij.

♂ Tart. ℥ss. Indantur Nodulo.

Vel ℞. Herb. rosmarin.

salvia. an. Mss.

absinth. Mj.

flor. Cent. min. p. jv.

genist. p. iij.

rhabarb. elect. ℥iij.

cinam.

galang.

Zingib. an. ℥ij.

limatur. & recent. ℥iij. includantur nodulo, vino infundendo, pro scopo alterativo. Nam *rhabarbarum* non tam propter usum laxandi, quam alterandi, acidum corrigendi, bilem in naturali statu conservandi, urinam movendi & atoniam hepatis corrigendi adhibetur, unde & etiamnum anima hepatis quibusdam dicitur. Sane præmissis præmittendis in virginibus, in specie cachecticis egregium usum observavi tam *Rob Juniperi solius*, subinde usurpati, quam ex *Rob Juniperi cum rhab. pulverisato facti Electuarii*

℞. Rob.



℞. Rob. Juniperi ℥iij.  
pulp. rhab. elect. ℥iij.  
cinamom. mors. elect. ℥j.

M. F. Elect. de quo omni mane capiat bonam dosin.

Aut hujus loco *passula* usurpari possunt, quæ mirè conveniunt in cachexiis quibusvis, sanguinem laudabilem ac temperatum reddunt, bilem optimè in statu naturali conservant & sanguinis motum fermentativum nonnihil restitunt. Hinc Elect. *Solenandri*, aut etiam *Electuar. ex passul. Horst. in obs. p. 201.* conveniunt. Aut

℞. Pulp. passul. ℥vj.  
extr. Ois cum succo pomor. ℥vj.  
rhabarb. el. ℥ij.

cinam. ℥j. M. F. Electuar. variando subinde dosin pro circumstantiarum ratione. Sanè quando in Cachexiis bilis acuenda & sanguinis motus fermentativus nonnihil restaurandus est, aromatica talia amara resinosa & Rob hi aromatici optimè conveniunt; nempe hæc omnia effectum calefactionis post se relinquunt. Jam vero intemperies frigida in cachecticis solet adesse.

Item ℞. Tinct. Tart. compos. f. hujus loco

Elix. propr. f. acido ℥j.

Ess. absinth.

cent. min. an ℥ij. D S.

Großnende Essenz. Dos. 40. l. 50. gutt. bis l. ter in die manè in vehiculo calido hor. s. pomerid. in cerevis. & sub intr. lecti.

Vel ℞. talia matutino tempore & à meridie.

℞. Spirit. ☿. ℥j. vel hujus loco.

carminativ. de tribus, l. hujus loco

Tinct. nephritic. l.

Liq. CC. succin. de quibus à meridie & sub introitu lecti capiuntur 40. gt. It. cum aromaticis istis interdum usurpatis capiatur sub introitu lecti Elix. menth. cochl. parva dosis; aut hujus loco spiritus baccar. juniper. &c. & horum medio promoveatur digestio prima, acuat bilis, & restaureretur de novo sanguis. In

## ANASARCA & LEUCOPHLEG- GMATIA

eadem quoque conveniunt, in quibus tamen præterea sudorifera & diuretica laudantur pro habitu corporis simul emendandò. Sudorifera inter eminet decoctum lign. Sassafras & Guajac. de quo conf. Willis Pharm. rat. p. 2. p. 366. & 375.



Sic *Lindanus* refert, se curasse *Anasarcam* in muliere. *decocto Guajac. & elect.* unde curata & simul fecunda facta fuit. *Decoctum gran. junip.* vi diuretica & diaphoretica est egregium. *Decoctum rad. vincetox.* in vino parat. mira præstare aasserunt, non secus ac *decoctum Helenii*. Novi exemplum insignis *Anasarcae* mediante *decocto fruct. Cynosbat. c. arillis* curatæ. Pro scopo diuretico *lixiv. ex ciner. absinth. & Genista c.* vino albo paratum, est egregium. Nam certe *vinum absinth. aut enulatum* optimè conveniunt pro potu, in *Cachexiis* & *Anasarca*. Adeo nempe *amara* post *stercoralia* utramq; in his affectibus faciunt paginam. Alia, ut essent. *lign. malvatic. juniperin. Elixir febrile Myns.* ceu alias nota, mitto. *Forest. lib. 19. obs. 34.* *Anasarcam* ab obstructione mensium, præmissis universalibus per ea, quæ uinas ducunt & simul menses cient, curavit, ut est *decoctum asari*, quod mirè prodest, præsertim si *cinamomi* aliquid adjungamus, fortiter coquamus & una *herb. sabin. bacc. junip. & radic. rubia* addamus. Aliquando in *Anasarca* una cum aliis proficuum observavi sequens decoctum;

℞. Rad. bryon. rec. ʒj.

asari. ʒß.

℥. Tart. ʒiij. infund. in f. q.

▽. simpl. stent in loco tepid per noct. manè adde

rad. vincetox. ʒvj.

comar. absinth. Mj.

flor. bellid. Mß.

bacc. Juniper. ʒiij.

Incis. & contul. infundantur & confundantur simul in ▽ simpl.

Colatur. ℞. ʒxv. ad f. b. i. s. adde

Spirit. ʒx.

Tinct. nephritic. an. ʒij.

Syr. de hyssop. ʒiij. M. de quo capiat ter in die bonum haustum.

Externa ut vesicatoria, est barotica, acuum puncturas &c. pro *Anasarca* cura, vid. in *Willis Pharm. rat. P. 2. p. 269. seq.*

*Cachexiam* modo explicatam frequenter sequitur

## HYDROPS,

non secus, ac reliquas ejus species, ut *Cachexiam ictericam, hypochondriacam, scorbuticam & febrilem*, tandem insci qui solet.

*Hydropis* nomine intelligitur aquarum seu humorum serosorum præternaturalis collectio, quam necessarîo tumor & distensio partis c. ejus mollitiæ & non rarò fluctuatione comitantur. *Hydropis* vox convenienter Latinis *aqua intercus* redditur. Jam vero aqua hæc vel totum corpus tumefacit

cit, vel detet  
particularem  
tium varietat  
colligitur in  
lis: Si in per  
in abdomine  
tum & tume  
cele: In par  
rali nomine  
torem a  
duplicatur  
rens obs. C  
Ex hi  
Tympanite  
rum collecti  
Hydropes re

Saltem

præter quas  
tum & abdo  
sarca est, cur  
ris, minus  
quia præter  
mensum tu  
ca partium  
se conveniat

Cap

tum, quæ  
sanguificatio  
tentia omni  
insens in hy  
mont, Tr.  
tempore a  
nus, Medici  
semper a Je  
lien's scirr  
habent cur  
vata in hyd  
solida prin



cit, vel determinatam ejus partem. Illud dat hydropem *universalem*, hoc *particularem*. Illa universalis, dicitur *Anasarca*; hæc vero particularis, pro partium varietate, quas affligit, varia & specialia fortitur nomina. Sic quando  $\nabla$  colligitur in capite, dicitur *Hydrocephalus*: Quando in pectore *Hydrops pectoralis*: Si in pericardio præternaturalis abundet lymphæ, est *Hydrops pericardii*: Si in abdomine, dicitur *Hydrops Ascites*, ab utre, quia abdomen instar utris repletum & tumefactum apparet. In utero est *Hydrops uteri*: In testibus est *Hydrocele*: In partibus externis, uno alterove membro, *tumores serosi aut aquosi* generali nomine appellantur. Imò in omenti bursa copiosæ aquæ inclusæ, in insignem tumorem abdomen attollunt quale Exempl. *vid. in Horst. obs.* It. in peritonæi duplicatura conclusæ aquæ, hydropis abdominis speciem præbent, *vid. Meckers obs. Chirurg.*

Ex his patet Hydropem non esse propriè alium, quam ubi est  $\nabla$ . Hinc *Tympanites* impropiè est hydrops, cum flatuum tantummodo, non vero aquarum collectio sit. Unde saltim propter similitudinem tumoris cum ascite, ad *Hydopes* refertur.

Saltem Divisio in *Universalem & Particularem* notanda venit, præter quas tamen frequentissima Hydropis species est ista, quando pedes, scrotum & abdomen insigniter turgescunt & intumescunt, quæ nec propriè *Anasarca* est, cum saltim partes inferiores occupet, utut *Willisio Anasarca particularis*, minus tamen appositè dicatur; neque tamen est *ascites* propriè dictus, quia præter particularem abdominis tumorem & universa crura subinde immentum tument. Revera igitur frequentissimus hic hydrops est, quasi *Anasarca* partium inferiorum, cum origine, fiendi modo, ac medicationis ratione inter se convenient, accidentaliter vero differant, de quo infra.

*Causa Hydropis* non est hepar frigidum ob hæmatoseos defectum, quæ veterum fuit sententia, cum à modernis dejectum sit ab imperio sanguificationis, ipsique publicæ dictæ exequiæ. Deinde adversantur huic sententiæ omnes, qui per experientiam Anatomicam observarunt, sæpissimè hepar insons in hydropicis, in specie asciticis fuisse repertum, de quo vid. præter *Hæmont. Tr. ignotus hydrops* §. 10. *Sennert. l. 3. prax. ubi de ascite*, qui jam suo tempore assertum hoc rejecit. Unde in principio hujus seculi *Sylvius Duncannus, Medicus Romanus*, peculiarem edidit libellum, cujus titulus: *Hydropem non semper à fecore fieri, excusum Roma An. 1601.* Non nego equidem hepatis & lienis scirrhus fuisse subinde inventos in hydropē demortuis, sed hoc commune habent cum aliis visceribus. Viscerum enim quorumvis varia & multiplex observata in hydropicis constitutio præternaturalis, ita ut hætenus nil certi de parte solida primariò in hydropē affecta, colligi queat. Imò fieri potest, ut sine vitio



alicujus visceris hydrops nascatur, quando ab errore externo, à potu frigido confertim ingesto, ▽ in abdomine colligitur; atque adeo non solius hepatis, sed & aliorum viscerum culpa, imò interdum visceribus penitus illæsis, hydropem generari constat. Ut taceam obscuram esse generationem & fiendi rationem Hydropis, si ex hepate oriri supponatur.

Propius ergo ad *causas* accedamus: Est g. hydrops non secus ac supra memorata cachexia, nunc *morbus primarius*, qui per se ex vitio rerum naturalium aut nonnaturalium successivè nascitur; nunc *secundarius*, qui ex vitio quodam morbozo præternaturali præcedente originem ducit. Nempe oritur hydrops frequentissimè

I. *Ex febb. intermittentibus* chronicis quibusvis malè tractatis, speciatim quartana diuturna, præsertim quando ægri in paroxysmo nimis bibunt, frequenter hydrops oritur, adeo ut frequentissimus diuturnarum & malè tractatarum quartanarum pedissequa sit hydrops, pro qua præservanda diebus intermissionis *amara* ex vegetabilibus febrifugis, præsertim *absinthio* sedulò usurpanda sunt, pro conservanda bilis & sanguinis crasi debitoque viscerum tono.

II. *Ex asthma* (præsertim orthopnoea,) non solum humoroso, sed etiam convulsivo, cui, si diutius duret, ordinario hic hydrops supervenit; item ex aliis pectoris pathematibus hydrops observatur, siquidem aliquando ad empyema, ad phthisin & sanguinis sputum hydropem hunc infecutum observatum fuit.

III. *Ex Renum vitio* frequentissimus est hydrops, adeo ut renem ceu adæquatum artificem hydropis omnis asserat *Helmont. Tr. ignotus hydrops* §. 16. & 20. velex eo imprimis, quod totus hydrops per urinæ fluxum solvatur *cit. loc.* §. 3. Sane ex renibus obstructis & debilitatis, aut ab iisdem ulceratis, crebrior hydrops observatus; sicuti pariter nephritica pathemata & renes exulcerati frequenter hunc affectum inferunt: Mictus quoque sanguinis diuturnus hydropem infert, teste *Schenck, in observat.*

IV. *Ex vitio visceris* cujusdam nobilioris, aut usus necessarii in abdomine, hepate, liene, mesenterii glandulis affectis, utero &c. frequens hydrops observatus. *Rondeletius in Prax. cap. 35. de scirrho hepatis* inquit se ex frequenti corporum dissectione observasse, omnes hydropicos, vel scirrhos, vel glandulas mesenterii induratas habere, aut pancreas similiter constitutum. Sic lienem malè affectum, in specie scirrhosum factum, hydrops necessario insequitur. Par ratio est de hepate scirrhoso hydropem inferente & ex vulnere hepatis, sclopeto inflictio, suppuratio hydropem natum *vid. in M. A. N. C. Ann. 6. p. 145.*

V. *Ex ictero* & aliis quibusvis cachexiæ speciebus confirmatis tandem nascitur

nascitur hydr  
vid. optimè d

VI. 25

admodum or  
ciunt. Si p  
è contra pol  
semper hydr  
modicum sa  
*Riverius in o*

VII.

tas hydrop  
enim leucc  
*Poter. Cent.*  
alvi proflu  
pem gravem  
*in obs. idem*

VIII.

gurgitatio hy  
hydrops poss  
nocturnus in  
§ 202. In p  
mè hydrop  
& hydrops  
gidam quor  
*Pentec. 3. obs*  
maticorum a

Juxta H  
tionis, & infe  
in hydropic

tur in hydr  
vialis, pauc  
cruda & pa  
assumtorum  
nem sugges  
rium non e  
tissima cura  
us fluente,  
na emittent



nasceitur hydrops; in specie scorbutum hydrops sui generis insequi solet, de quo vid. optimè differentem *Eugalenum Tr. de Scorbuto*.

VI. *Ascites à sanguine, vel præternaturaliter excretò, vel retento*, frequenter admodum oritur. Sic suppressæ Hæmorrhoides, & intercutis metum injiciunt. Sic propter menstrua consuetà suppressa hydrops non rarò supervenit; è contra post quamvis hæmorrhagiam aut nimiam, aut crebrius repetentem, semper hydrops metus imminet. Sic post vomitum sanguinis, post immodicum sanguinis sputum, hydropem insecutum, observatum fuit. Videatur *Riverius in obs. communis*.

VII. Imo ex alijs nimis excretionibus, præsertim per alvum, crebrò genitus hydrops notatus, speciatim ex nimis alvi fluoribus, tam artificialibus (sic enim leucophlegmatiam & ascitem à varijs catarcticis malè adhibitjs, notat *Poter. Cent. 2. cap. 92.*) & nonnaturalibus, quam præternaturalibus; sic ex alvi profluvio diuturno, observat *Ferdinandus* hydropem *hist. 98.* item hydropem gravem, succedentem pyalismo diuturno & pertinaci, observavit *Thonerus in obs.* idem de dysenter. ac similibus excretionibus observatum.

VIII. *Crebrior & copiosior aut intempestiva potus*, præsertim frigidi, ingurgitatio hydropem infert. Sic ex haustu copioso frigida, post nimium æstum hydrops post tertianam genitus in *M. A. N. C. Dec. 1. Ann. 6. p. 85.* Potus nocturnus in specie ad hydropem disponit. *Vid. Act. Med. Hassn. vol. 2. p. 260. & 202.* In paroxysmo febrium, qui copiosius potant, præsertim frigida, facillimè hydropem incurrunt. It. ex copioso frigida potu in æstate hepatis scirrhus & hydrops *vid. in Fonsc. l. 2. conf. 39. it. Riveriò Cent. 2. obs. 65.* Alius frigidam quotidie ante prandium bibens hydropicus factus, Autore *Panarolo Pentec. 3. obs. 42.* Quo facit *Spir. Vin.* nimis abusus & similium potuum aromaticorum aut generosiorum ingurgitatio nimia.

Juxta has causas, magis particulares, observandum, *sensibilis urina excretionis, & insensibilis transpirationis defectum*, ut plurimum, si non semper, adesse in hydropicis. *Urinam* quod attinet sanè hæc non uniusmodi excernitur in hydropicis, quando ut plurimum crassa, intensè tincta & perquam lixivialis, pauca tamen excernitur, quæ in alijs è contra, utut rarius, pallida, tenuis, cruda & pauca prodire solet. Sanè in omnibus parciòr & longè minor, quàm assumptorum potulentorum fert ratio, prodire solet. Et ferè primam occasionem suggerunt hydropi renes, imò frequenter ex solis renibus affectis, atque lotium non emittentibus hydrops supervenit. Hinc etiam est, quod optima & tutissima cura hydropiseos in urina provocatione consistat, qua denuò copiosius fluente, subito evadunt. Hinc est, quod id serum, quod aliàs sub formæ urinae emittendum erat, in abdomine verò coacervatum & exhaustum arte, nullas

tamen



tamen proprietates urinæ, nec sapore, nec odore, nec colore exhibeat, cessante nempe renum functione. *Schenckius* in cive Altenburgensi decollato & publicè dissecto renalem adipem maxima ex parte aqueam, defluere vidit indeque hydropis initia visceribus & testibus induta observavit & *Bartholinus* omentum in hydropicis computruisse vidit.

*Quoad insensibilem transpirationem*, hujus penuria colligitur ex eo, quod licet multum feri colligant hydropici, nihilominus tamen difficulter sudant, ideoque & citra madorem illorum corpus est, nec in balneis facillè sudore madescunt; quod ipsum cum aliis cachecticis comune habent, qui omnes difficulter ad sudores cogi possunt. Hinc si sudor hydropicis supervenerit, adeo ut æger alleviari se senserit bonum. Forsan observationem hic meretur, quod *Smectus Miscellan. l. 8.* asserit, illos præcipuè difficulter sudare, quibus jecur & lien ætate morbove vel obstructione magna aut scirrho obduruerit.

Premiis hisce *Symptomata* necesse erit considerare, quæ præsentia sui *hydropem* vel *presentem*, vel plus minus *imminentem* designant. Incipiunt ferè pedes in inferioribus locis circa talos intumescere, tumore quidem œdematoso, plus minus seroso, impressa digiti vestigia aliquandiu retinente, qui noctu quidem imminuitur, ita ut matutino tempore multò exilior videatur; interdiu augetur, adeoque vespertino tempore major longè apparet. Idem tumor paulatim ascendens transit ad ventrem, quem successively occupat; ut plurimum in scrotum sibi parat viam & tunc simul quandoque intumescunt testes, præputium & colis; quandoque penitus occultatur, quandoque quadruplo major & translucidus fit. Dum æger de latere in latus convertitur, murmur & fluctuationem  $\nabla$ æ quasi sentit, quinimo moto corpore,  $\nabla$ . ita movetur, ut impetus ejus conspici possit, ut habet *Celsus*.

*Intumescit* autem abdomen plerumque sensim & vix animadvertentibus ægris & interdum quasi subito & brevi temporis intervallo. Præterea nunc unum tantum latus tumor occupat, nunc utrumque, ita ut venter quandoque in duas partes divisus videatur, nunc vero æqualiter distenditur venter ab hypochondriis ad pubem usque, erecto autem corpore, sensus ponderis procumbentis in regione inguinum percipitur. Plerumque quidem venter etiam post mortem tumidus manet, rarò vero detumescit, quod tamen observavit *Wallonius libr. 2. Epid. Eph. p. 270.* in duabus mulieribus, quarum utraq; cum hydropica foret, postquam extinctæ essent, ita resedit venter, ac si nunquam intumuisse. Dum sic inferiores corporis partes accrescunt, superiores decrescunt & emaciantur, præcipuè jugulum, cervice & pectus, quibusdam tamen & facies, præsertim matutino tempore à somno intumescunt, interdum & ad extremum manus inflantur, colore in facie ut plurimum pallido plus minus ac livido. Multi pruritu admo-

admodum  
& macula  
que febris  
nifestior. P  
imprimis  
suntur aq  
num tamen  
omnino sig  
tunt & spi  
estque unu  
te tumore  
adeo, ut  
cogantur  
Platerus in  
irritatio, e  
busdam, id  
epilepsia A  
eadem in ap  
p. 27. pilca  
convulsu  
pe & epilep  
Observ  
quo vid.  
confundat  
1. E  
vidis tumo  
hydropicis  
tumor uno  
3. Certum  
drope.  
est, perit  
constitut  
in gestati  
quod no  
nique su  
Pos  
observan  
das gelbe  
Pari



admodum molesto vexantur, quidam etiam scabie laborant. Abscessus quoque & maculae in cruribus quibusdam erumpunt, saepius tamen lethales. Plerumque febris comitari solet hydropicos, estque continua lenta, circa vespere manifestior. Pullus est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione. Sitis imprimis agros misere vexat, quae indulgendo crescit & quo plus sunt pota, plus sentiuntur aqua. Simul etiam cibi fastidium adest insigne; quodsi, quod rarissimum tamen est, sciant parum, è contra commodè plus minus appetant, melius omnino signum putandum est. Hinc magnam angustiam circa praecordia sentiunt & spirandi difficultatem, maxime cum loca alta scandunt, vel decumbunt, estque unum ex praecipuis de quo conqueruntur, quae etiam nondum apparente tumore incipit hydropemque praefagit, eoq; emergente incrementum sumit, adeo, ut saepius à medià nocte orthopnoicorum more erecti spiritum ducere cogantur; hinc dispnoeam nocturnam praenunciam hydropis ascitis esse asserit *Platerus in Observ.* & tum plerumque etiam tussis sicca, seu inanis ad tussendum irritatio, eaque mali omnis accedere solet. Alvus nunc clausa est, nunc quibusdam, idque non absque eversione, subito liberior esse solet. Quandoque & epilepsia Asciti supervenit & grave periculum plerumque minatur; interdum eadem in apoplexiam lethalem convertitur: Refert enim *Wallon. lib. 1. Epid. Eph. p. 27.* piscatorem quendam hydrope laborantem epilepticum factum, saepius convulsam, abscessu in testiculos & femora facto, liberatum fuisse ab hydrope & epilepsia.

Observandum autem ne obesi nimis, habeantur interdum pro hydropicis, de quo vid. *Hochstetteri decad. 10. p. 418.* Probè quoque observandum est, ne confundantur hydropicae & gravidæ. Discernuntur autem invicem

1. Ex calore faciei virido & bene habito. 2. Ex tumoris specie: In gravidis tumor abdominis ad praecordia sursum vergit, estque inaequalis: In hydropicis autem inferior pars abdominis intumescit, mammae detumescunt & tumor undique aequalis & quasi oedematosus, ut nil dicam de motu foetus. 3. Certum signum est fluctuatio, nempe ad tactum senties fluctuationem in hydrope. 4. Vivacitas & vigor oculorum significat gestationem; sed ubi hydrops est, perit oculorum nitor, fiunt lividi &c. 5. Urina in gravidis non sunt ita constitutæ, ut supra de hydrope dictum. 6. Hydrops valde membrum gravat, in gestatione autem non item. 7. Quo se vertunt hydropici, eo labitur  $\nabla$ , id quod non fit in gestatione. Sitis in hydrope juncta est, in gestatione non. 8. Denique sub hydrope menses saepe fluunt, in gestatione non &c.

Porro *Aque* istæ serosæ, seu contenta fluida non semper unius generis observantur. Plerumque est pallida & citrina & urinam ferè refert, vocant das gelbe Wasser/ interdum lutea, interdum viridis, interdum flava in nigrum



vergens, interdum loturæ carniū similes observatæ fuerunt aquæ. Exemplā allegata vid. in *Senn. l. 3. Prax. ubi de Ascite* p. 717. Easdem exemptas & leni igne tractatas, in gelatinam albam abire observavit *Boyle in Philos. experim. p. 83.* ut & *Willis Pharm. rat. P. 2. p. 150.* In gelatinam viridem abiisse observavit *Simson in Hydrolog. p. 370.*

*Acre quoque est fluidum illud, salsum ferè aut acido-salsum, quod alij ∇æ permistum, spumam instar saponis excitat.* Ita refert *Gabelkhoverus* civem quendam Augustanum hydropicum, alterius consilio dolio (in ein Saß mit Wasser) insidentem, ∇æ salsæ se immeruisse quotidie, & post 15. lotionis diem ruptum esse umbilicum & aquam omnem, quæ in ventre continebatur, effusam in aquam balnei, hanc verò inde spumofam totam redditam fuisse, ut speciem aquæ, multo sapone agitatæ referret. Unde etiam acrimoniæ illius ratione, subinde interanea erodit & exulcerat. Sicuti & subinde *ulcera in externis partibus* præsertim cruribus excitat, difficulter curabilia; unde & quod per alvum excernitur, non sine morfu intestinorum ac præsertim recti, evenit. *Speciatim* aciescentiæ cuiusdam participem illam aquam esse collectam, non immeritò suspicatur *Willis Pharm. rat. P. 2. p. 164.* Et confirmatur ulterius ex eo, quod sudor hydropici acidus lac coagulans observatus fuerit. Vid. *Aët. Med. Haffn. vol. 4. p. 174.* & quod internè pariter, quàm in specie externè discutiendo tumori dicata, ad *alcalium* naturam accedant v. g. *∇a calc. vivæ, limaces ac cochleæ, lixivium stercorum animalium &c.* Sane ex acrimonia hac præsertim occultè acida, duo explicanda veniunt *phenomena* ab autoribus minus animadversa. I. *Quod intumescentia illa crurum, scroti & abdominis sit quidem à contento liquore, sed tamen fortis ista tensio & juncta quasi inflatio, non ab eo, qua tali, simpliciter proficisci videatur, sed arbitror potius vim fermentativam habere hunc ipsum liquorem, seu ipse in se fermentet, seu cum contentis cæteris liquoris, speciatim nutritio succo ad partes istas distributo, motum turgescentiæ, proximum fermentationi, concipiat.*

II. *Dum acre istud contentum acido salsum undique à partibus membranosis, v. g. cute, peritonæo, &c. concluditur, vix fieri poterit, quin ab eodem vellicentur. & irritentur plus minus fibræ illarum partium, qua occasione illæ tendi, & quasi spasmo affectæ obrigescere plus minus incipiunt, quo ipso occludi poros & angustari quosvis cæteros meatus contingit, adeò ut non tantum insensibilis transpiratio & sensibilis transudatio eò magis impediatur, sed & tensio hoc modo fibris & membranis renalibus, etiam uberius urinæ excretio eò magis sistatur.* Aliàs sane non video, quare tam parum transpirent aut sudent hydropici, aut saltem guttarum forma non copiosius aliquid transmittant per cutim, nisi hæc prius in pustulas erosa fuerit, aut aliomodo fibris laxis transitus aquis patefiat. Adhæc angustia ista præcordiorum in hydropicis & impedimenta illa respiratoria,

spiratoria, quæ  
chondria se  
repletionem ab  
maximè tumi  
& tactui ced  
ista loca & co  
adigi.

His it  
extravasatio  
Anasarcam  
pedes, scro  
Ascite prop  
differentia  
Præsuppono  
mune recre  
ratione nun  
fectum depi  
deficientem  
Generatur  
& notabili  
jus assumt  
xinam pa  
huius circ  
in locis d  
talem infe  
Remota

tum hæc f  
cum ascite  
tum læsæ  
quitur, p  
rationem  
rioribus c  
diversitas  
tas hum  
Ex  
rum & ly  
suo loco  
niosis ori



spiratoria, quæ non solum circa pectus, sed ferè maximam partem circa hypochondria sentiunt, *quasi cingulo ibid. constringerentur*, non à solâ videntur esse repletionē abdominis, ex eo, quod gravida femellæ gestantes, utut ventre maximè tumido, de simili non conquerantur pathemate, quin mollia omnia & tactui cedentia in iisdem ibidem deprehenduntur, cum *hydropici* tendi circa ista loca & constringi ita soleant, ut ne digitus quidem infra costas nothas possit adigi.

His ita præmissis *ad causam proximam* collectionis nempe & extravasationis illorum humorum est delabendum, in Ascite nempe, quæ ad Anasarcam proximè accedit, seu in *Anasarca* sic dicta *particulari Willisii*, in qua pedes, scrotum & abdomen ad pectus usque & diaphragma intumescunt & ab *Ascite* propriè sic dicto, seu *particulari* abdominis hydropē, multum differt (quæ differentia in historiarum & observationum monumentis pròbè attendatur.) *Præsuppono* autem hic humorem istum esse maximam partem serum, seu commune recrementi & alimenti vehiculum, utut pro contentorum seu mistorum ratione nunc chylosum, nunc pituitosum, nunc cruentum, nunc alio modo affectum deprehendatur. *Coacervatur hæc in corpore* ad hydropem dispositio ob deficientem insensibilem transpirationem & imminutam urinæ excretionem. *Generatur autem primitus* (adeoq; hujus hydropis causa proxima erit) ex insigni & notabili vitio in hæmatosi contingente, ac plus minus deficientē, ratione cuius assumpta in chylum mutata cum juncto vehiculo seroso assimilari debite maximam partem nequeunt, quin hic ipse successivè in sanguine, continuato hujus circulo, alteratus magis magisque attenuatus & resolutus tandem certis in locis decumbit & extra vasa cum vehiculo seroso subsistens tumorem talem infert, quod pluribus explicatum *vid. in Willis Pharm. rat. p. 2.*

*Remota causa* omnes erunt eadem, quæ cachexiæ, cum ut supra monitum hæc frequentissimè in Anasarcam, nunc universalem, nunc particularem cum ascite junctam degeneret. Unde dum per se incipit hic hydrops, ferè vitium læsæ in primis viis digestionis subesse solet. Dum autem alios morbos infequitur, pro horum læsione, corporis ejusq; partium solidarum & sanguinis alteratione multiplici, etiam multipliciter ad hydropem disponent, de quibus *remotioribus causis* superius pluribus actum. Unde pro causarum harum remotarum diversitate humorumq; in corpore alteratione multiplici, subinde tanta diversitas humorum in corpore hydropicorum nata fuit.

*Extravasatur vero idem serum* multi forme, non ex vitio vasorum lacteorum & lymphaticorum, nisi in partialibus hydropis speciebus (de quibus infra suo loco) aut nisi saltim per accidens & secundariò; sed reverà ex vasis arteriosis oriri omnino probabilissimum est. Nempe pro hujus notitia tria hic *supponenda*



*neudaerunt.* I. *Sanguinis texturam & missionem* in hydropicis ita esse alteratam, ut minus exactè cum coacervata uberius colluvie serosa, plus minus chylola miscibilis sit, adeoque serositates istas facilius separari & hinc inde extra se quasi diffluere permittere, cum aliàs serum à sanguine facilius separabile existat, ut in sanguine venâ sectâ emissio manifestum evadit. II. *Contentos corporis humores, in specie sanguinem & serum naturaliter non moveri proprio impetu,* quia aliàs omnis motus fieret ad inferiora, nullus vero ad superiora; sed more mechanico à cordis impetu per vasa pelli, adeoque se purè passivè habere, ac superius & inferius nescire: Simul verò ac vis ista vitalis seu animalis movens in corde plus minus debilitatur, proprio impetu gravitatis ac ponderis eodem ferri, adeoque deorsum ruere. III. *Firmo stare talo experimenta ista Lovveri de Corde c. 2. p. 123. & seqq.* quòd ligata vena cava canis infra cor, brevi post tanquam ascite laborare, ut animalis abdomen aqua repleatur & ligatis jugularibus, tumor aquosus, hydrocephali instar, superveniat, utrumque saltem ex impedito sanguinis per venas circulo; sicut & eadem allegat *Willis in Pharm. rat. vol. 2. p. 199.* Adeoque ex impedito plus minus sanguinis arteriosi in venas transitu separationem & extravasationem feri facillimè contingere. Quà ratione etiam videntur oriri *hydropes subitanei* à causa externa, sine prægrosso interno vitio, v. g. dum hydropem ascitem subitaneum ex gestatione oneris gravioris notat *Bartholinus Cent. 2. hist. 74.* vel dum ex compressione circa os stomachi hydropem notat *Borellus Cent. 2. obs. 24.*

*His ita pramissis dicendum videtur in iis ægis, quibus quocunque ex vitio hydrops supervenit, v. g. in cachecticis confirmatis, ex virium aliquali defectu & massæ sanguineæ ferolisioris laboriosiori & difficiliiori circulo, hanc ipsam proprio impetu ac mole magis deorsum ferri, ac hinc difficilius ascendere, indeque impulsum in arterias factum, in venis haud leviter imminui, ut difficilior ex illis in has, ob id pleniores, respectivè fiat transitus, sub quò transitu juxta osculorum extremitates sanguis spissior, & qui impetum moventem à corde impressum & per arterias continuatum facilius, quam fluidius serum suscipit ac retinet, in venulas tandem ex arterioliis intruditur; ipsum vero fluidius serum, quæ data porta suo pte impetu fertur, à sanguine secedit ad inferiora, præsertimque circa loca, ubi notabilius languescit à corde impressus impetus, congeritur, donec pedetentim magis magisque coacervatus, superiora versus tandem vergat. Hinc enim magis vesperi quàm manè, magis stantibus aut sedentibus, quàm jacentibus tumor increfcere solet; ad quod ipsum & supra insinuata fibrarum strictura haud parum facere poterit. Vivit hic aurifaber, qui ex quartana contumaci per annum male tractata, anasarca partium inferiorum, cum incipiente ascite laborat, ex qua ipsa suo quoque tempore morietur. Hic quoties quavis ex causâ, in specie iracundia, vel eryspelate, vel pleuride notha, quod sapius evenit,*

evenit, corn  
fimo aliqu  
ries mox pri  
flaccidis &  
dies remitti  
redit. Ne  
ejus circulu  
consideran  
Idem  
differentia  
adhuc val  
constituta  
complicat  
ciens, hæc  
ruunt, cum  
fatione ista  
stiam, per q  
sanguinis m  
vicinarum  
ver Salem  
dam venul  
poterunt,  
feri secessu

Atque  
tur prætere  
non tam co  
generati fer  
hecticis, n  
aquâ abdo  
guedo colli  
fieri solet.  
arte per pa  
Helmont  
ria ratio h  
ita intum  
Pi

quem locu  
que nullo



evenit, corripitur, idque semper cum morbo febrili, gravissimo rigore, intensissimo aliquot dierum aestu & hinc sudore uberrimo superveniente accidit, toties mox primo hujus affectus die omnis tumor *hydropicus* evanescit, pedibus flaccidis & extenuatis apparentibus. Dum vero febrilis imperus post aliquot dies remittit, pedetentim, etiam decumbenti adhuc, *cruurum & scroti tumor* redit. Nempe febrili sub impetu cum alteratione sanguinis in specie rapidior ejus circulus & validior impulsus, quo retruduntur in vasa evacuata serositates, considerandus venit.

Idem extravasandi modus obtinet in *Anasarca universali*, hac saltem cum differentia, quod in Anasarca, virium, contenta corporis moventium, robur adhuc validum sit, quod æqualiter sursum deorsum eadem qualitercumque constituta movet; In *Anasarca* autem *particulari* partium inferiorum cum ascite complicata, debilius, adeoque regendis iisdem corporis contentis minus sufficiens, hæc ex parte sui motu spontaneo ferri permittit, quæ ob id deorsum magis ruunt, cum aliàs undique æqualiter distribuenda forent. Sed dum sub transvasatione ista ex capillaribus arteriis in venosa, ob pororum & meatuum angustiam, per quos trajectio fieri solet, difficilius suo modo, adeoque tardior fiat sanguinis motus, hinc serum facile à reliquâ sanguinis massa recedere, partium vicinarum porulos subire & ita undique plus minus stagnando, *Anasarcam universalem* inferre potest. Foras & à chylo, seu pituitoso isto feri contento, quædam venulæ capillares ut & vasa lymphatica obstrui, aut angustari plus minus poterunt, qua occasione & difficilius sanguinis circulus & facilior copiosiorque feri secessus fieri potest.

Atque hæc quoad *theoriam* hydropis ordinarii sufficiant. Nam observatur præterea quoque *hydrops* magis *extraordinarius*, à colliquatione natus, dum non tam coacervari, quam ex contentis aliàs humoribus per colliquesactionem generari serum hydropicum observatum. Docet experientia in febb. acutis & hæcticis, ut aliàs excretiones colliquativæ sunt familiares, ita etiam his subito aquâ abdomen intumescere, ita ut præter chylum ac sanguinem ipsa etiam pinguedo colliquefacta in serum abire videatur, uti hoc ipsum in diabeticis quoque fieri solet. Hinc in hydropicis subinde observatur, aquam heri evacuatam arte per paracentesin, hodie æqualiter demum abdomen replevisse, de quo *vid. Helmont. Fr. Ignorans hydrops* §. 14. Sed in hoc hydropē colliquationis primaria ratio habenda est, utpote cujus affectus ceteri productum saltim est hydropica ista intumescencia.

*Prognosis* nostri hydropis egregiè tradit *Hippocrates l. 2. prædiction.* quem locum *Celsus l. 2. c. 7.* ita vertit: Aqua inter cutem minimè terribilis est, quæ nullo antecedente morbo cœpit; dein quæ morbo longo supervenit.



„Utrique si firma viscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore corpus est aequaliterque in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem arefcit, si cibi cupiditas est, si venter medicamentis movetur, si per se excernit mollia & figurata, si non extenuatur, si urina ex vini potatione & non potis aliquibus medicamentis mutatur, corpus sine lassitudine est & morbum facile sustinet, siquidem in quo hæc omnia sunt, is ex toto tutus est: In quo plura ex his sunt, is in bona spe est.

In specie tota prognoscos ratio consistit saltim in accuratâ consideratione cause remota & constitutionis viscerum abdominis horumque collatione. Hinc si cum hydrope conjunctus est *scirrhus* visceris cujusdam insignioris, v. g. hepatis, lienis &c. difficulter admodum ac fere nunquam curatur, aut curatus licet, facile renascitur, qui recidivans ordinariò lethalis est. Hydrops, qui post febrem oritur, non adeò est periculosus, nec curari difficilis, quam qui à seipso incipit. Et in hydrope, cachexia aliisq; morbis diuturnis similibus, dejectio nigra, quæ non est à medicamentis, lethalis. Hydrops ex perverso purgantium abusu admodum periculosus. Quò lotium minus redditur, eò deterior est hydrops. Tussis in hydropicis malum, autore *Hippoc. sect. 6. §. 47.* Abscessus vel maculæ in cruribus erumpentes, lethales.

Quoad *curam*, in hac 1. *humorum colluvies removenda.* 2. *eorum scaturigo sistenda.* Hoc principale, illud minus principale. Quoniam verò collecta colluvies impedit potiorè intentionem, propterea quantum possibile, removenda. Posterius obtinet *in genere*, sanguinis crasin & inde vitiatam hæmatorfin emendando, digestionem primam corrigendo, bilem acuendo & urinæ fluxum promovendo. *In specie* pro antecedentium causarum varietate & relicta noxa aliqualis varietas subinde observanda: Adeoque omnia ea, quæ *supra de Cachexia* monita fuerunt, hic repetenda.

Pro his scopis ritè obtinendis *observand.* *segg.*

I. *Purgantia* in hoc hydrope bene conveniunt, cum iisdem sæpe copiosa ∇ ex abdominis cavò evacuari soleat; verum purgatio crebra est nociva. Nam dum purgantia evacuant serositates, simul utiles succos plus minus colliquant & ita vires ac viscera debilitant. Hinc rectè dicit *Lindanus*, „qui vult rectè curare hydropem, raro debet purgare, dare tamen tunc debet „ea, quæ vehementer purgant: Inter medio verò tempore *appropriatis* ac masculinæ sanguineam ac reliquos humores corrigentibus & in naturalem crasin reducentibus debent insistere. Confer hic ea, quæ habet *Bruno in Notis ad Jessenij iudicium de sanguine à vena sedâ emissio. p. 147.* Observandum etiam ut purgans exhibitum operationem suam ritè assequatur quod si fiat, bonum, si minus,



minus, malum, cum colliquando solum contenta corporis, ast non evacuando, malum augeat. In Principio vel *lenia* saltem, primas vias *abstergentia* & per *epicrasin* blande *evacuantia* conveniunt, ut ita disponantur primæ viæ ad subsecuturas fortes purgationes. Commodius instituuntur *purgationes* *de-*  
*crescente*, crescente enim malum accrescit, decresciente verò decrescit, unde quo tempore habemus adjuvantem naturam, purgatio instituenda.

II. *Vomitoria* rarius in usum vocantur, utut interdum fructuosus observatus fuerit eorundem usus. Meminit *Celsus*, in  *suis scriptis*, *Metrodori Philo-*  
*sophi*, qui fuit discipulus *Epicuri*, qui hydropicus, cum plurimum biberet, sed mox omnia revomeret, sic convaluit; cujus exemplo, inquit *Celsus* Medici vomitum probant & laudant in iis, qui facile vomunt. Facit huc quod refert *Forestus obs.* 32. l. 19. in *Scholio*, ubi quidam hydropicus prò desperatò habitus, ad-  
scendit naviculam & petiit mare, hinc provocato vomitu & post vomitum exercitio curatus. Interdum ergo ubi adest vomendi inclinatio, aut etiam, ubi gravior dispnæa urget ægrum, commodè institui potest vomitus. Sed necesse est, ut larga dosi propinentur *vomitoria*, cum in hydropicis, præsertim confirmatis rarius vomitum procreare soleant exhibita emetica. Sic enim *Quins vita gr.* ij. l. iij. quæ aliàs abunde sufficiunt pro vomitorio, hydropicum non movebunt, idque aut ob ventriculi atoniam, aut ob remediorum à contentis serositatibus acido salis alterationem & quasi fixationem.

III. *Diuretica* sunt optima. Hæc nempe vera sunt hydragoga, cum naturæ sit mos, per vias urinarias superfluum serum naturaliter expurgare, unde præmissis necessariis universalibus his imprimis insistendum, aliàs intempestivo eorundem abusu, impeditur urinæ fluxus potius, quam ut promoveatur. Aliàs multis satisfaciunt scopis, præsertim quæ sunt ex numero *volatilium*, v. g. quæ ex *urina*, *lumbricis*, *busonibus*, &c. petuntur, quia salina virtute *incidunt*, *penetrant*, *abstergunt*, *aperiunt*, *resolvunt* &c.

IV. *Opiata* ac similia *narcotica* qua talia ac per se, hydropicis ut plurimum sunt lethalia, ut per experientiam confirmat *Mollenbroeck de Arthrit.* *vag.* p. 159. Quod verum arbitror, cum *opiata* in morbis chronicis ac prope-  
modum ad extrema deductis, ut sit in hydropē, quando vigiliæ accedunt, minus profint quam in acutis, quin vires ulterius dejiunt & viscerum tonum ulterius labefactant. Imò post chronicos aut acutos morbos, dum languent adhuc ægri & quædam adhuc symptomata supersunt, si iisdem *opio* succurrere velimus, periculum est, ne hydropici exinde fiant, quod fieri observatum. Sal-  
tim per accidens spirituum impetum nonnihil refrænando & fibrarum irritata-  
rum spasmus demulcendo, sicque sudorum & urinarum fluxum promovendo  
prodesse



prodesse observata fuerunt. *Conf. Bartholin. Cent. 3. Ep. 46. § 149. p. 192. 201.* Quod pertinet mirabilis observatio *Willisii Pharm. rat. p. 1. p. 302.* Sed cum effectus hic sit accidentarius, propterea nonnisi sedula circumspeditione administranda veniunt. *Vid. Bierling. C. 1. advers. 5. p. 16.*

*Auxilia* igitur quæ priori scopo conveniunt, sunt *evacuantes*, tam interna, quam externa. Interna sunt *purgantia*, *diuretica*, & interdum quoque *diaphoretica*. Externa sunt *paracentesis*, *vesicatoria*, *escharotica* &c.

Quoad *purgantia* plura hic passim in usu esse observantur. Selectiora saltem proponere est animus, quæ inter est *sambucus* eiq; cognatus *Ebulus*; in specie horum *cortex medianus*, ex quo expressus *succus* cum *oxymel*. *Squilla* propinatus insigniter  $\nabla$ as evacuare solet. Sed *Autore Foresto l. 19. obs. 37. in scholiis*, si *cortex* iste sursum à ligno abradatur, vomitus concitat, sin verò deorsum versus, per inferiora purgat, de quo experientia consulenda. Præ cæteris appropriatum purgans est *radix ireos nostratus* flore caruleo. Purgat sanè validdè, sed in sapore ejusdem acerrimo simul vim hydropicam alterativam specificam latere existimo. Usurpari potest *radix recens* incisa & ad  $\text{ʒij}$ . infusa in vino vel sero lactis; vel exprimatur *succus* & per residentiam spontaneam depuratur, qui abjecto sedimento à  $\text{ʒvj}$ . ad  $\text{ʒj}$ . propinatus copiosè evacuat  $\nabla$ as. Nam si decoquatur, vim laxandi amittit. Ne vero acrimonia sua noceat, cum *syr. viol.* mistus propinetur, ac ne ventriculum nimis labefactet, cum  $\nabla$  *cinam.* addita exhibetur; vel *radix recens* incisa blandè ebulliat in jussculo pulli, de quo ægro, præsertim debiliore existenti, tantum propinetur successive, donec sufficiens subsequatur evacuatio. *Gialappa* à  $\text{ʒj}$ . ad  $\text{ʒʒ}$ . propinata, aut etiam ejus *resina* ad gr. xv. cum vitello ovorum dissoluta & in form. *emulsionis* propinata, aut *essentia* ejusdem *citrata* ad  $\text{ʒʒ}$ . l.  $\text{ʒvj}$ . exhibeatur.

Vel  $\mathcal{R}$ . Tart. Vitriolar. gr. xij.  
resin. jalap.  $\text{ʒʒ}$ . ad gr. xij.  
Extr. troch. alh. gr. vj.  
ol. distillat. macis gr. ij. M.

*Gummi gutta* & his accensetur, sed cautus sit ejus usus, tum quod incognita sit ejus progenies, tum quod autore *Lindano* ab eodem facillè exulcerentur pulmones; quin potius his palmam præcipit *elaterium*, quò vix datur præstantius remedium, cujus *essent.* it. *extr.* feliciter exhibuit *B. D. Michael. v. g.*

$\mathcal{R}$ . Extr. Elater. g. xv. l.  $\text{ʒj}$ .  
resin. jalap. gr. ij. aut ubi evacuandum.  
serum pituitosius.  
Extr. troch. alhand gr. j.  
c. f. q. ess. absinth. F. Pilul. S. Purgier. Pillen.

Sanè

Sanè *Lind.*  
meum pare  
aliquando rui  
statim deglut  
hensq; caliga  
in hydropo,  
alterans ling  
gulare quid c

Ex reg  
ma cum spir  
Præparandi  
Philos. exper  
aquam copi  
pileos unde  
Mistura prop  
4. Si quidem  
evadat reme

Diureti  
cativum exi  
giè prodest.

Sanè deco  
præsertim  
bacc. junip.  
& urinam  
dropicis pi  
alcitem pro  
ret, volatili  
stipit. fabar  
forma lixiv

Pari



Sanè *Lindanus* dicit: *Elaterium* per se est nobilissimum remedium. Credo meum parentem hoc loco centum hydropicos servasse. Nempe præscripsit aliquando rustico gr. viij *Elaterii* in pilulis, qui eas Pharmacopœo persolvens, statim deglutiit. Sed domum tendens, motu illo pilulæ cæperunt operari, detrahensq; caligas in via, ventrem suum amisit. *Radix bryonia* purgans est *Helmontii* in hydropē, sed correctæ nonnihil; ac sane *bryonia* hæc tanquam evacuans & alterans singulariter convenit; in specie in *hydropē uteri bryonia* hæc *radix* singulare quid obtinere videtur.

Ex regno minerali excellunt pilulæ *Diureses*, nempe *crystalli ex Na* purissima cum *spir. vitrioli* parati, sapore amarissimi, sed mirabiliter  $\nabla$ m evacuantes. Præparandi rationem, cum omnibus enchirisiis, optimè descripsit *Boyle in usu Philos. experim.* *Crystallor.* talium gr. ij. l. iij. cum mica panis in pilulas redacti, aquam copiosam evacuare solent. Alias &  $\phi$  alia decantata sunt in cura hydropicis; unde  $\phi$  *dulcis* mistus cum  $\phi$  *io vitæ*, perquam conveniens laxativum est. Misturæ proportionem docet *Hartman. in prax. chym. p. 25. edit. à Cardiluc. in 4.* Si quidem sub benè factâ istâ miscelâ, acidum  $\phi$  *ii dulcis* figit  $\phi$  *ium vitæ*, ut evadat remedium maximam partem per inferiora purgans.

R. Conserv. flor. persic.  $\zeta$ j.  
 $\phi$  vitæ cum  $\phi$ . dulc. mist. gr. xv.  
 Extr. Elat. gr. j. ad ij.  
 c. l. q. syr. flor. persicor. l.  
 syr. de spina cervin. F. Bolus. pro dos. j.

*Diuretica* inter excellunt in specie *juniperina*, cujus *rob* simul egregium alterativum existit; hinc *malvaticum juniperinum* mistum c. *tinctura nephritic.* egregiè prodest. v. g.

R. Malvat juniperin.  $\zeta$ iv.  
 tinct. nephritic. a. hujus loco.  
 spir. carminat.  $\zeta$ j. M. pro dos. cochl. j. l. ij. pro lubitu.

Sanè *decoctum lign. juniper.* longè magis appropriatum sudoriferum existimo præsertim in Anasarea, quàm *decoctum lign. Guajac.* & *sassafr.* Unde & *decoctum bacc. junip.* in vino generoso experimentum est *Rulandi*, quo ipso per sudorem & urinam hydropem curavit. In specie *alcalia* sunt, quæ pro usu diuretico hydropicis propinantur & quidem in hydropē anasarca magis fixa, in ea v. quæ ad ascitem propius accedit, aut, in qua urina crassa, intense tincta & lixivialis apparet, *volatilia*. Fixa ista sunt *liva lixivialis, sarmentorum vitium, juniper, genista, stipit. fabar. absinth. fimi columbini, &c.* Hæc ipsa diluuntur in vino & ita sub forma *lixivii* propinantur. v. g.

R. S. Sarmentorum vitium,  
 fimi columbin.



juniperi, an. ℥j. infunde in  
vini Rhenani ℥vj. M. de quo hauriatur. Sed adduntur interd. *aro-*  
*maria*, ut firmetur melius totus stomachi.

Vel. ℞. Ciner. genist. ad albedin. calcinat. ℥iiij. ponantur in vase vi-  
treo ad digestionem c. ℥bij. vini alb. per aliquot hor. Co-  
lentur. Dos. ℥vj. ad ℥viij. bis in die.

Pertinet huc *lix. i. vinum benedictum Myns.* ab. ℥ij. ad ℥iiij. pro cura hydropis  
usitatum; vel quod fuit experimentum D. Ellenbergeri

℞. Ciner. tamaris.

juniper.

vitis,

falidis

genist. an. Mj.

Rad. Vincetox.

valerian. an. ℥ij

urtic. ℥β.

angelic.

helen. an. ℥ij.

ireos nostr. ℥ij.

liquirit. ℥j.

bacc. junip. ℥β

rhabarb. elect. ℥ij. M. hisce infundatur vinum, l. ana

∇æ & aceti & de colatura post infusionem crebrius bibatur. Modo laudatus  
Practicus *lixivio ex cineribus stipitum fabarum* &c. vetulam curavit hydropi-  
cam, quæ postea 4. adhuc liberos peperit; in specie *℥ junip. it. ℥ betul. arboris* in  
vino malvatico per urinam hydropem pellunt. *Volatilia diuretica* in specie sunt  
hia volatia ut *spir. ℥\*, tamaris, carminativus, tinctura nephritica*. In specie remedia  
ex *lumbricis* & *busonibus* parata &c. Quo & *spir. urina* per putrefactionem,  
ejusque *℥ volat. bene rectificata* pertinent, isque multum laudatur à Poppio. *spir.*  
hunc *volatilem urina* conjungit cum ana S. V. *rectif.* additò paucò *ambra* & *mo-*  
*schi* digerit, circulat & ita unit. Dos. ℥j. ad ℥β.

Imprimis *lumbricalia* sunt optima; nempe l. *decoctum lumbricorum* in vino  
propinatur. *℥ spir. lumbric.* per putrefactionem paratus in haustu vini malvatici,  
aut *malvatico juniperino*

Vel ℞. *spir. lumbric. terrest.* ℥ij.

*urina* volat. ℥j. M. Dos. ℥β. bis vel ter in die in

Haustu vini decoctionis rad. *fenic.* & *bacc. juniperini.* it. *liquor. lumbric. terrest.* in  
clibano paratus ad imitationem *Crollii in Basilica chym.* egregius est ad hydropis  
curam. Ead. de *Asellis* valent. In specie *Busones* singulare quid obtinent in hy-  
dropis

dropis cura, t  
exime intestin  
solo, vel cum  
potes dare ℥j.  
ne debilitetur  
mandri scripti  
per copiosum  
inter alcalia  
Pharm. p. 15  
cula cochlea  
dosis in liq  
spir. bis solv  
procedunt  
diuretica int  
premissis ne  
hydropes ad  
diaphoretica  
lignorum, &  
Refert nem  
borante, cli  
ita curato.

For  
rit, de qua  
„ Aliqui, in  
„ ℞. Magis  
„ tall. ℥ij. M  
„ gr. v. con  
„ dum Sal

Ex

in umbilic  
nunc fora  
evacuand  
paracete  
pertunden  
melius, rec  
nientissim  
torum tra  
drope val



dropis cura, nempe. *℞. bufones* q. v. exicca in umbra, post excinde capita & exime intestina, quod reliquum, redige in *pulverem subtilissimum* & de hoc vel solo, vel cum *pulvere hepatis* proprii misto, dentur gr. x. ad xv. usque ad *℥j.* quæ potes dare 3. l. 4. vicibus, ita tamen, ut 3. l. 4. dies, post assumptiones, interponantur, ne debilitetur æger. Casu inventum hoc remedii genus, uti in *Hildani* ac *Solenandri* scriptis potest videri. Aliàs & *bufones* vivi lumborum regioni applicati per copiosum urinæ profluvium hydropem solvere dicuntur. Differentia hæc inter *alcalia* hæc *diuretica fixa* & *volatilia* probè observanda. *Conf. Wedel. in Pharm. p. 150. & Willis in pharm. rat. p. 1. p. 316. & 36.* Pertinent quoq; huc *opercula cochlearum*, quorū bene depuratorū & pulverisatorū mane & vespere larga dosis in liquore convenienti propinetur, pellunt n. potenter per urinas. Alii c. *spir. bis* solvunt hæc opercula & hinc eod. modo atque c. *unct. l. liquore nephritico* procedunt & ita liquorem diureticum antihydopicum acquirunt. Juxta hæc *diuretica* interdū etiam procedendū est ad *diaphoretica & sudorifera*, præmissis nempe præmittendis, in specie diureticis, & quidē conveniunt magis in hydrope ad *anasarcā* accedente, quā in ascite. Pro quo usu quælibet etiam aliàs diaphoretica conveniunt: In specie dicta *juniperina* supra laudata, *decoctum lignorum*, *decoctum milii* &c. Occasionem primam, ut aliàs, casus suggestit. Refert nempe *Langius supra cit. ut & Lipsius de hydrope*, de rustico hydrope laborante, clibanum pictorium, adhuc calidum, ingrediente & mediante sudore ita curato.

Forſan & *Salivatio orialis* interdum ceu fructu institui poterit, de quā conf. *Grembsius Tr. Arbor integra & ruinosæ hominis l. 2. c. 1. §. 6.*  
 „ Aliqui, inquit, in curatione hydropicis utuntur *orialis* præmisso digestivo.  
 „ *℞.* Magist. Tartar. Vitr. *℥iſſ.* facul. bryon. *℥i.* *℥.* card b. genist. an. *℥ſſ.* mag. co-  
 „ rall. *℥ij.* M. pro 8. partibus, postea porrigunt *℥ii* dul. gr. xv. gumm. gamandr.  
 „ gr. v. conserv. ros. *℥ſſ.* cum syr. ros. q. s. Dos in postea tribus granis augent, usq;  
 „ dum Salivatio oris superveniat. Hæc sunt interna satisfaciencia indicationibus.

*Externorum* usum ipsa docuit natura, quæ nunc per spontaneam in umbilico abdominis tumidi apertionē, nunc per vesicas in cruribus excitatas, nunc foramine in pollice pedis sponte aperto, successivè collectam colluviem evacuando, hydropicos curavit. Ad hujus imitationem instituta fuit primitus *paracentesis*, h. e. abdominis artificialis apertio, idque nunc veterum methodo, pertundendo abdomen per lancertam, imponendo hinc cannulam; nunc, idque melius, recentiorum methodo, per acum argenteam perforatam. Locus convenientissimus est umbilici dilatati prominentia, hinc à latere umbilici aliquot digitorum transversorum latitudine, notando simul membranam peritonæi in hydrope valde crassescere. *Vid. Barbett. Anat. pr. it. Observationes cultro anatomico*



*Lyseri annexas* p. 283. Emittenda a. venit ∇ successivè. Nam ex subitanea ejusdem extractione mors subinde sequitur. *Vid. Timæus* p. 31. 3vj. vij. *vel* 3x. pro vitium agri ratione, evacuentur. *Conf. Tulpius* l. 3. obs. 38. *Item* l. 4. obs. 42. *Hild. Cent.* .obs. 47. *Cent. 2. obs.* 53. *Panarolus Pentec. 2. obs.* 17. & in genere quovis Chirurgos. Operatio hæc in se est tutissima & quæ aliis remediis internis præsertim alterantibus ritè adhibendis optimè inserviet, modo in tempore adhibeatur. Nam in duobus imprimis fallit casibus. 1. *Quando nimis tardè adhibetur.* Sic enim fit, ut nimis profundè radicato malo & corruptis plus minus visceribus internis, ob præterlapsam occasionem malum non cedat. Et sanè magis in Ascite ceu hydrope abdominis particulari, quàm Anasarca locū habet. 2. *Quando cum hydrope nostro conjunctus est scirrhus,* l. aliud quid singulare, aut incurabile visceris cujusdam nobilioris vitium, tum evacuata ∇, restitante tamen scaturigine, palliativum saltem est levamen.

Juxta abdomen & scroti nimis tumidi, ad naturæ imitationem, fit *apertio* vel ferro, l. cauterio, atque sic optimè spongia admoda, successivè evacuatür aqua. Sed probè hic observandum, ne, quod facile evenit, in loco apertura gangranam concipiat. Labefactatur nempe partium membranarum continentium tonus & spir, infiti vigor à contenta colluvie, quæ magis per loca apertura jugiter destillans facilè mortificationem inferre potest. Hæc ipsa igitur sedulo præcavenda, defendendo partem, circa locum apertum, non communibus Huiusmodi ac similibus remediis, defensivis dictis, ad inflammationem aliàs, usitatis, sed additis in specie *balsamicis*, resinosis, amaris, ad gangranæ curam aliàs usitatis. Hinc *Emplastro de minio Paracelsi* adaptatur *Empl. diasulphuris Rulandi* ceu præservativum gangranam inhibens. Interim tamen si gangrana scroti invalescat, fit subinde, ut penitus decidat, sed succrescente carne, testes involvente, defectus ejus spontè naturæ refarcitur. *Vid. Timæus in Cas.* p. 269. Id quod pariter & in lue & ea, post scroti sphacelum, evenire observavi.

Post scrotum & crura subinde scarificari solent; nempe circa loca carnosæ & circa furas instituendo scarificationem lenem, ita ut incisiones à se invicem aliquantisper distent, *defensiva* supra & infra admovendo. Promptè enim levi facta cutis læsione, copiosum serum transudat, linteolo molli citra frictionem abstergendum, vel apposita spongia excipiendum, ac præterea loca vicina propter facilem gangranæ metum, defendenda, nempe fovendo subinde cum *S. V. simplici, aut theriacali, aut crocato* & imponenda desuper *empl. balsamica defensiva*. Quin & ne vulnuscule gangranam concipiant, *S. V. camphorato* subinde eluenda sunt.

Præterea vesicæ spontaneæ subinde in cruribus se aperiunt, quibus disruptis multa ∇ evacuatür, unde iisdem *folium brassicæ* est applicandum, utpote quod multum seri extrahit. Ad hujus imitationem quidam *vesicatoria* locis crurum



carneosis applicant, nempe vel prope furas, vel in parte carnosa femorum. His enim apertis copiosa colluvies evacuatür & loca ista carnosa minus faciliè gangrænâ concipiunt, quam nervosa.

Caterum quoniam confertim nimis per vesicatoria fit evacuatio & majus de gangrænâ periculum, potius *escharotica* seu *cauteria* vel *actualia*, vel *potentialia* circa loca carnosa applicant. His ipsis enim successivè per parvum foramen, c. minori gangrænâ metu fit evacuatio. *Modum applicandi cauteria* unâ cum defensione crurum à gangrænâ, optimè refert *Willis Pharm. rat. P. 2.* Nempe fots aromaticus partem confortat debilem, cujus robur per balsamicam vim *picis Burgundiacæ* conservatur, sicque gangrænâ metus optimè præcavetur. Quin & *punctura cum acubus*, ob evacundas aquas, optimè institui possunt. *Vid. Willis cit. loc.* Hisce denique accedit profundior paululum unguium abscissio. Hâc enim occasione successive  $\nabla$  destillans, hydropicos deserit. *Vid. Schenck. in observ.*

His modis *prima indicationi* satisfieri solet.

*Quoad secundam indicationem*, in usu sunt *alterantia* in genere sic dicta, varianda quidem subinde pro causarum remotarum differentiis: Quæ tamen ordinariò ferè locum habent, sunt imprimis *Æthia* & *amara*, aliàs *epatica* & *aperientia*, calefacientia dicta, quæ inter excellit *absinthium*, aded ut existimem, potissimam hydropis curandi vim sitam esse in *Æthia* & *absinthio*. Juxta hæc sunt & *vincetoxicum*, *chelidonium majus*, *rhab.* *marrub.* *rubiatinctorum*, *allium*, *hederæ terrestr.* *Bellis minor*, *rob junip.* & *sambuc.* *Tartarea* quævis, *lap.* *ceraun.* seu *fulminaris*; quæ omnia eò nobilioris sunt effectus, quo ipsorum usu, sed additorum aliorum ratione, copiosior urinae fluxus supervenit. Hinc qualibet *Æthia aperitiva*, *pulveres* & *extracta anticachectica*, præsertim cum *Tart.* præparata aut sociata, sunt convenientissima, iisdem temporibus cum aliis alterantibus usurpanda, quibus à purgantibus vacamus. Sic vinum *Æthiale hydropicum Cnopheli* videt in *M. A. N. C. Ann. 6. app. pag. 107.* Ubi simul integrâ hydropis cura tam per interna, quam per externa reperitur. Quò referenda quoque cura hydropis, quæ recensetur in *Act. Hassn. vol. 5. obs. 119.* his verbis: Salvis aliquomodo visceribus & vasis lymphaticis incorruptis, medela dabitur, non purgantibus, non sudoriferis, non diureticis, quod fiet rarò (loquor enim de hydrope confirmato) non paracentesi, quæ ultimam plerumque absolvit lineam, vix centesimo salutaris; sed medicamentis exsiccantibus & diætâ. Inter *exsiccantia* medicamenta laudem præ cæteris habet *chalybis*, ut sapius Deo benedicente expertus sum, qui & aperiendi & viscera roborandi vi pollet insigni: *Limatura* in vino Canariensi seu Rhenano seu Gallico cum *Zedoaria rad.* infusa, ubi *Tinctura* sensim extrahitur, & ab essentia *chalybis* vinum fere insipidum redditur. Formula hujus medicamenti talis mihi in usu est:



„*℞. Limaturæ chalybis recentis* ℥j. rad. zedoar. elect. incis. & contrus. ℥vj. M.  
 „ & insuantur sacco ex sindone albâ. S. Säcklein zu einer Pote Wein. Hu-  
 „ jus vini chalybeati manè & vesperi recipiuntur tria aut 4. cochlearia, &  
 „ fiat continuatio ad 4. aut plures septimanas, sensim affundendo vini aliquid  
 „ (prout tinctura ex chalybe efficacior appareat) usq; dum mitigetur malum &  
 „ sanitatis spes affulgeat, observata diæta conveniente. *Absinthium* nobilissimum  
 simplex, cujus solius usu plures hydropici curati fuerunt. Vid. *Februs de Absinth.*  
*pag. 116. Vinetoxicum* à pluribus decantatum specificum est, cujus decoctum  
 per sudorem & urinam specificè hydropicis confert. Huc pertinet *destillatum*  
*Paracelsi*, quod ad ejus imitationem multi autores usurparunt & commendant :

℞. Tart. rubr. ℔. j.

hirundinar. ℔. β.

colcothar. ℥viij.

vini ard. q. s. pro incorporatione, destillentur & dentur in vehi-  
 culo quodam appropriato, aut in vino malvatico. Pellit urinam & alterat specifi-  
 ce, continuato tamen usu opus est, cum post aliquot dies saltem operari soleat.

*Rhabarbarum* alterans quoq; specificum ad hydropem, ita ut existimem  
 Electuariò facto ex *Rob juniperi* cum *rhabarb.* multum præstari posse in hydro-  
 pe. Confirmat *Riverius in Obs. Comm.* dum refert, post vomitum sanguinis  
 ortum ascitem, per *infusionem rhabarb.* propotui ordinario curatum. *Chelido-*  
*nium maj.* it. *Marrubium* specifica sunt ad hydropem, præsertim si icterum in-  
 sequatur. *Allium* quoque vi alterativa & diuretica hydropicis multum confert.  
 Præter n. exemplum *Bariholini Cent. 1. hist. 74.* hydropici per decoctum *allii* in la-  
 cte curati; facit huc quod refert *Forest. l. 19. obs. 27.* Hydropicum aliis irritis  
 continuatâ *allii* commestione multum aquositatis per urinam reddendo, inspe-  
 ratò evasisse; Sicut & mulier hydropica deplorata, potu *succi allii viridis* expressi  
 cum jure vervecis curata, ut & alij.

De *hedera terrestri* aliquot novi Exempla: Est vir maximè ad Anasarcam  
 proclivis & cujus crura jam aliquoties insigniter tumefacta, copiosum serum  
 per aperta ulcuscula emisere; hic per decoctum *hedera terrestr.* & *absinth.* ana  
 in cerevisia secundaria quotidie aliquoties calide bibitum, hæc tenns pancreaticè  
 vixit, siquidem semper copiosum urinæ fluxum provocavit, sicut simul quoque  
*absinthii* familiaris erat usus. Quoad *hed. vero terrestr.* notabile est seq. Mulier  
 quædam desperatè hydrope laborans & à Medicis relicta usu *succi rad. ireos* in  
*vino malvatico* hausti & interno & externo usu *herb. hedera terr.* convaleuit;  
 nempe aniculâ suâ extra *hederam terr.* locis tumentibus imposuit, unde no-  
 tabiliter tumorem remittere observavit. Quo ipso animata & ipsam herbam in  
 ∇. vel cerevisia decoctam calidè & copiosè hausit, & tali hæjus usu c. *succo ireos*  
 interdum repetito, convaleuit.



*Rob Juniperi & Sambuci* vi alterativa bilis & sanguinis, diuretica ac diaphoretica multum valent in hydropicis, adeoque pro corpore electuaria, aut aliarum formularum commode inservire possunt. Ex *Tartaro, Tinct. Tart. acris, terr. fol. Tartari, Tinct. Tartarisata Ludovic. Tinct. Vitriol. Tart. Zuvelfferi, Spiritus Tart. probè rectif.* ac similia, *th. Tart. &c.* polychresta sunt & tanquam digestiva purgantibus præmittenda, optime conveniunt. Quoad *Ceranium* præparatum, hunc ipsum cum aqua quadam appropriata in alcohol redact. part. iij. c. *exuvius serpentum* part. i. invicem mistis dant *specificum ad Hydropem & icterum, D. Hartm. & B. D. Michaelis*, qui his ipsis crebro usi fuerunt.

Ex quibus variæ possunt fieri formulæ. v.g. In hydropem à vulnere epatis, quo totum corpus valde intumuit, hic nodulus profuit:

℞. Rad. ireos N. ℥ij.

cich.

fœnic. aa. ℥j.

Herb. cham.

fum.

agrim.

cap. ♀.

hep. aa. m℥.

Flor. acat.

perfic. aa. Di℥.

Spec. aperit.

Fol. sen. SS. aa. ℥vj.

rhab. ℥i℥.

Turp. alb.

galang. aa. Di℥.

cort. aur. ℥℥.

th. Tart. Di. Incis. & contus. F. nod. inf. Vino; bibens quotidie

restitutus est. *M. A. N. C. Ann. 6. p. 143.*

℞. Rad. vincetox. ℥i℥.

Herb. chelidon. maj.

marrub.

absinth. aa. Mj.

Cort. citri.

aurant. aa. ℥vj.



Sem. fraxini.

fœniculi an. ℥iij.

Galang.

caryophyll.

Zingib. aa. ℥j.

℥. Tart. ℥vj. Incis. & contus. infund. vino, pro repetitis pro lu-  
bitu haustibus.Idem facile potest fieri purgans, addendo rad. rhabarb. hellebori nigri. Esulæ  
non præp. &c.Vir quidam hydropicus sequenti nodulo fuit curatus, quem mirè per uri-  
nam evacuare dicebat:

℞. Rad. cichor. ℥iij.

gramin. ℥ij.

gentian.

helen.

Cort. capp. an. ℥j.

lign. sassaf. ℥ij.

Comar. absinth. vulg.

pontic.

Flor. card. bened.

summit. cent. min. an. p. j.

flaved. cortic. citr. ℥ij.

Ex incis. fiat nodulus, cui affundatur dimidia mensura Vini malvat. leu alius  
Hispanic. stent in loco tepid. p. diem & noctem. Hinc bibatur manè haustu-  
lus unus, hor. j. ante usum iusculi; continuenter a. tales portiones necesse est ali-  
quandiu. Omni septimana simul bis *clysmā emolliens & carminans* applicatum  
fuit & simul *sacculus ex aromaticis & carminantibus* in ∇ vel vino coctis, abdo-  
mini & scroto impositus fuit. It.

℞. Rob Junip. ℥iij.

Extr. Oris c. succo pom. ℥ij. l. ℥vj.

pulv. rhabarb. elect. ℥ij. l. iij.

c. s. q. aq. cinamom. F. Elect.

It. ℞. Spirit. carminat. de tribus ℥ij.

℥\*. simpl. ℥ij. M. Dos. ℥ij.

aliquoties in die in vehic. conven.

It. ℞. Bis fimi colum. ℥j.

pulv. bufon. ℥ij. M. divid. in 2. part. æq.

It.

It. Fiat vinum

Rabiarinet

Alias q

quidē plura p

Est enim unu

fallendam gy

Rulandum,

pro potu. Na

hydropicis,

cier &amp; optin

temperand

aut Julepus

commenda

diureticus.

Præter

præsertim cu

Sane clysmā

ubi flatus si

quorum ac

Non imme

binth. adm

Part



It. Fiat *vinum chalybeatum*, ad imit. *Hartm.* ubi de Cachexiis, in quo coq. *absinth.* *Rubiatinē. card. b. &c.* quod commodè pro potu ordinario usurpari potest.

Aliàs quo magis abstemii sunt à potu hydropici, eò facilius curantur: Siquidē plura prōstant exempla hydropicorum solā potus abstinentia curatorum. Est enim unum ex gravissimis *symptomatibus* hydropicis *sitis clamosa*, ad quam fallendam *grana mastiches* in ore tenenda & sedulo masticanda. Vel imitemur Rulandum, qui ℞. bacc. junip: contus. Mij. decoq. in fero lactis ℔b. vj. propinat pro potu. *Nitrum* optimè purificatū continuo in ore detentum, proficuum est hydropicis, aut etiam potui eorundem cuique additum, sitim temperat, urinam ciet & optimè iisdem confert: It. *Decoctum ex rad. liquirit. c. passulis* & similibus temperando acre ℔sum, sitim excitans, hanc mitigat. *Vinum seu succus granatorū* aut Julepus cum succo granatorum temperatus, non immeritò ab *Hartmanno* commendatur, *℥ spir. his* parva in dosi subinde propinatus, ad sitim egregius, simul diureticus.

Præter hæc interna etiam *clysmata* multis usibus hydropicis inserviunt, præsertim cum pectoris ac capitis urgent symptomata, v. g.

℞. Cortic. inter. frangul.

sambuc. an. Mi.

rad. bryon. ℥j.

ireos nostr. ℥vj.

bacc. juniper. ℥β.

fem. cumin.

fanicul. an. ℥ij.

coq. in f. q. urinæ puerorum l. feri lactis.

Colatura ℞. ℔b. j. in qua dissolve.

Elect. hier. picr. c. agar. ℥β.

vitell. ovorum. N. ij.

M. F. Clysma pro 2. dosibus.

Sanè *clysmata ex urin. pueri* in hydropicis per quàm sunt egregia, idque in specie, ubi flatus simul adfuerint. *Vid. Valeriol. l. 1. obs. 2. M. A. N. C. anno 2. p. 320.* quorum ad imitationem

℞. Sem. Apii.

fenic. an. ℥ij.

fermenti. com. ℥β.

coq. in f. q. urin. pueri. Colatura adde

mellis despumat ℥β.

ol. destill. terebinth. ℔β. M. pro clysm.

Non immeritò terebinthina hic allegatur, cum clysteres ex urinâ pueri c. terebinth. admodum laudentur à *Willisio Pharm. rat. part. 2 p. 318, 321.*

Part II.

g

Abdo-



Abdomini verò, ut & scroto tumefacto, vel labiis vulvæ nimis tumentibus varia externa applicanda. In leviori malo *herba chelidon. maj.* aut etiam *Geran Robertian.* contusa & plantis pedū alligata, singulari enim experimento multas serositates elicere dicuntur. *Petroselinum recens* contusum & scroto applicatum, etiam conducere observatum. In genere vel *aromatica attenuantia* & *discutientia*, vel *bina solventia* proficua sunt. Parantur ferè ex *foliis sambuc. ebul. chamom. fol. lauri, rad. cucum. asinin. bryon. absinth. bacc. laur. & junip. sem. carminat. & similibus.* Omnium optima sunt animalium *stercora*, in specie *caprillum*, hinc *columbinum*. Nam *stercus humanum* quidem aliàs præferunt, sed applicatum nimis ferit nares. Sanè *stercus caprillum c. urin. propria* subactum & catapl. instar abdomini instratum conducit. Hiscæ succedit  $\nabla$  *Calc. viv.* singularis in tumoribus serosis, si spongia hac ipsa ebria abdomini applicetur; cum aqua præterea in Cataplasmatibus formam coqui & ita imponi possunt seqq.

℞. Fol. sambuci.

flor. chamom. an. Mij.

stercor. caprill. ℥. jβ. l. ℥. ij.

rad. bryon. ℥ij. coq. in f. q.  $\nabla$  vel urin. puer. ad consist. Catapl. applicetur abdomini.

Singulare quid obtinent *cochlea c. suis testis* contusæ & ventri hydropicorum ad modum Cataplasmatibus applicatæ: Quæ si siccæ fuerint, aliæ rursus imponendæ. Singulariter conveniunt, tam in abdominis, quam testium tumore. Hinc plures *Catapl. ex cochleis c. testis contusis* adperso *pulvere stercoris caprilli* & sem. carui cetū efficacissimum commendant Autores.

℞. Flor. chamom. Mij.

farin. fabar. ℥vj.

cochlear. cum testis contus. ℥iiij.

stercor. caprill. ℥ij.

pulv. sem. cumini. l. carui ℥j. coq. in  $\nabla$  simpl. & aceto ana, aut etiam in aq. com. & applicentur pedibus, l. scroto tument.

Item. ℞. Bacc. junip. part. iiij.

laur. part. ij. pulverisata & melle excepta insternantur abdomini; cujus loco Cataplasma ex *fol. rutæ & absinth. an. c. melle* subactis abdomini applicari potest.

Aliàs etiam locum invenit inunctio partium tumentium *c. spir. junip.* addendo parum *oleo carui.* Alii *olea bufon. scorpion. junip. laurin.* ana, similiter abdomini alliniunt.

Vel. ℞. Ung. de arthanit. ℥j.

agripp.

dialth. an. ℥β.



ol. scorpion. simpl. ℥ij.

chamæm.

anethin. an. ℥β. M. F. Ung. crebro

tepide abdomini illinendum.

Quod si gangræna aut ulcera pedum vel scroti in hydropicis adsint, topica pro his selecta, vid. in *M. A. N. C. Ann. 6. App. p. 110.*

De curis magneticis ad hydropem usitatis, nempe dum vesica suilla urinæ ægri impletur, in fumo suspendenda; vel dum sanguis ægri putamini ovi includitur &c. nil atinet dicere. Item, dum rasura unguum, manuum ac pedum cum lindone rubrâ & vivo in dorso alligantur & ita in ∇m fluentē projiciuntur.

## CACHEXIA ICTERICA

ad affectus cachecticos etiam pertinet, eaque multiplex, in qua ægri colore flavo, in corporis peripheria efflorescente, tincti observantur, ac vocatur *Icterus flavus*, & speciatim oculorum album, seu rete illud mirabile variis minutissimis arteriis intertextum, afficitur, id quod patet in inflammatione oculi, ubi hæ magis fiunt conspicuæ; per quæ vasâ distributum contentum flavum, istud sensibilius magis tingit: Nec solum partes externæ flavent, sed etiam interna viscera, imprimis hepar & intestina, colore flavo totaliter infecta observata fuerunt à *Zacut. Lusit. l. 3. P. admir. p. 156. & 136.* Quod si flavedo ista nunc ad viriditatem, nunc ad cæruleitatem, nunc obscurum livorem inclinet,

*icterus niger* vocari solet. Omnes autem *ictერი*, præsertim *primarii*, de dolore compressivo præcordiorum & stomachi; interdum vix tolerabili, miserè conqueruntur. Vid. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 107. et Ann. 6. p. 302.* quas præcordiorum inenarrabiles angustias *icterus* ferè comitari solet.

Adest præterea lassitudo totius corporis & omnium membrorum, sæpius dolores gravativi in regione lumbari, subinde difficiles respirationes anxietatibus istis præcordiorum junguntur, ita ut spiritus defectu vix verbum proferre queant. Urina imprimis *icterus* manifestat, non quod lutea appareat, sed potius ut vocat *Zacut. Lusit. passæa*, i.e. crasse tincta rutilante colore, cui si linteum immersum, flavissimo colore, tanquam si croco tinctum esset, imprægnatum extrahitur, quod aliæ urinæ quæcunque, colore quamvis intensissimo, non faciunt; quod si subsederint, sedimentum qs. argillaceum seponunt; interdum ex viridi nigricantes, interdum ex flavo & rubro ferè nigricantes observantur *urina*.

Sapor ut plurimum, idque in confirmatis, non in omnibus, amaricans, aut etiam varius in ore percipitur, cui ferè semper sitis clamosa jungitur, unde & cerevisiam horrent ægri, alium appetentes potum. *Alvus* nunc est fluida, nunc

diar-



diarrhæa quasi biliosa est juncta, nunc è contra pertinaciter clausa, excrementis prodeuntibus albicantibus. Idq; contingere solet, quando ductus fellei in intestinum hiantes, undecunq; sunt obstructi. *Febris interdum juncta est*, interdum penitus abest; interdum adest ante icterum, qui hic icterus supervenit, nunc criticè, nunc symptomaticè. In quibusdam, non in omnibus, dolor in hypochondrio dextro obtusus in profundo percipitur: Subinde facillè curatur, subinde autem est contumax, aut semel curatus facillimè recidivans; quo in casu sæpius calculi in vesica fellea observati fuerunt.

Quoad *sciendi modum*. Icterus nunc est morbus *primarius*, nunc est morbus *secundarius*. Hoc quando vel febribus supervenit, idque tam continuus, quam intermittentibus chronicis, sive sit *criticus*, post prægessa coctionis in urina signa, die judicatorio superveniens, sive sit *symptomaticus*. Vel quando à venenis & imprimis à morfu animalium venenatorum oritur. Exempla curiosa refert *Marcellus Donatus in hist. med. mir. l. 1. c. 7.* Post morsum araneorum icterum flavum observavit *Joel in praxi ubi de venenis p. 126.* Ex viperæ morfu suboriri ordinario ferè icterum jam veteres annotarunt. A morfu canis rabidi icterum contumacissimum observavit *Bartholin. Cent. 2. hist. p. 322.* Icterus lethalem à manducatione staphisagriæ notat *Loffius in obs. p. 259.* Vel denique quum affectus convulsivos intestinorum, præsertim tentium sequitur. Sic à partu laborioso subinde observatur superveniens icterus, passioni hysterica quoq; sæpius in muliere quadam supervenire vidi; colicis torminibus subinde icterus supervenit. Quo pertinet, quod refert *Bartholinus Cent. 4. hist. 62.* Icterus provocatum per medicamentum sudoriferum in colica assumptum. Sic icterus vulnerato capiti supervenientem die 4to notat *Hochstetterus Decad. 8. p. 198.* Nempe sicuti vulneribus capitis gravioribus 3ia die aut etiam 4ta vomitus biliosus supervenire solet, ita & consensus istius ratione etiam icterus, nempe secundarius.

Quoad *icterum primarium*. *Causæ remotæ* sunt variae: Non ultimum locum obtinet tristitia, quæ nunc inchoat, nunc fovet icterum, teste *Helmont. Tr. Sextuplex digest. §. 56.* Sic icterum curatum, à tristi nuntio recidivantem referunt *Acta Medic. Hassn. vol. 3. p. 82.* Iracundia etiam non rarò icterum provocat; nempe *River. Cent. 2. obs. 9.* Icterus mirandum in gravida ex irâ refert, in qua fæces alvi erant biliosæ & in lecto exigua, extra illam intensam patiebatur flavedinem. Obstructiones ductus communis subinde in ictericis observata fuerunt. Ante aliquot annos hic vixit quidam, qui pertinacissima alvi obstructione cum colicâ intensissima afflictabatur, cui icterus & febris continua superveniebant, hique lethales: Ab obitu dissectione facta, advertentur felleæ vesiculæ grandem & confertissimam, infimumque porum viscida pituita



pituita penitus obstruatum, adeo ut post abscissionem hujus ductus bilarij ne gutta quidem bilis profueret, quia bilis contenta crassissima atque tenacissima erat. Ac sane in pluribus ictericis vel bilis viscida, amurcae similis, vel calculi plures, vel pauciores, majores vel minores in cysti inventi fuerunt *vid. Act. Med. Hassa. Vol. 3, p. 59. Panarolus pentec. §. obs. 22. Deodatus in Valetud. p. 250.* refert icticum lethalem cum pruriginosa lassitudine & vagis hic inde erumpentibus tuberculis: In cadavere 3. lapilli in vesicâ felleâ reperti fuerunt; pariter ac *Timaeus in Cas.* Ictericam post arthritidem diuturnam, superveniente hydropse lethalem, ex calculo magno in vesicâ felleâ, notat. Ac sanè ad icticum proni sunt calculosi, ut observationes Practicorum testantur. *Vid. Misc. A. N. C. Dec. 1. An. 2.* Non tamen hoc universale est, quin sapissimè in ictericis folliculum felleum aut ductus biliarios apertos esse, non saltem docet debita tinctorum excrementorum excretio, sed etiam sapius in icticis lethalibus dissectis, ductus fellei aperti fuerunt, teste *Helmont. cit. loc.* Sicuti in febricitantium ictico nulla hepatis aut ductuum biliorum obstructorum suspicio adesse potest.

Porro ex ulceribus quibusdam crurum oclusis, icticum natum observavit *Amatus Lusitanus Cent. 2. cur. 83.* it. ex mensibus instantibus, sed non prodeuntibus idem pathema notat *Bartholinus Cent. 5. hist. 62.* Sicuti *Henr. ab Heer obs. 6.* monialem ictericam ac cachecticam ex mensium suppressione observavit. Vulnus sclopeti, ventriculum perforans, icticum produxit *vide Barthol. Cent. 6. hist. 58.* Denique & hepar induratum, aut inflammatum, aut scirrhus obductum crebro icticus solet insequi.

Hisce præmissis, ictici sanè tot sunt *species*, quot colorum varietates: Interea omnes unus sunt morbus, unam agnoscunt causam, unam eandemque etiam obtinent medendi methodum, ut recte inquit *Faber in Patholog. p. 344. §. 6.* Quod confirmat *Schenckius lib. 3. obs.* qui notat icticum ex obstructione mensium, in quo successivè 4. colores observati; adeoque *icticus flavus & niger* non differunt specie, sicut nec *icticus viridis*, quem cum gravissimis symptomatib<sup>9</sup> notavit *Petr. Joh. Faber in Curat. cur. 71.* sicuti nec ictici colores plumbei, alique plures varii, cum ex uno fonte omnes oriantur. Nempe immediate sequuntur vitiatam M. S. eamque impuram redditam, propter confusa heterogenea, nec ritè permiscibilia, donec imbibita ista recrementa ad superficiem deponantur. Vehiculum eorum est serum. Hoc autem non solum in ictericis post venam sectam flavissimum conspicitur, sed præterea quoq; ex excitatis vesicis intense croceus liquor elicitur. Quod si ita M. S. ad debitum puritatis statum redeat, sanitas efflorescit: Sin verò in suâ crasi depravetur, mors sequitur. In statu quasi neutrò sunt ictici, nunc ad convalescentiam, nunc ad decidentiam proni. Vulgò omnis icticus dividitur in *flavum & nigrum*, hoc tamen ex



præconceptâ opinione & hypothefi de humorum quaternione, ut ficut sanguis corpori habitum floridum, pituita vero cachecticum, ita neceſſariò bilis *icterum flavum*, melancholia *nigrum* inducat. Hinc ut ſuppoſitum falſum & alia falſa produxit. Nam quia bilis in folliculo felleo colligitur, è folliculò obſtrictò aut ductibus felleis infarctis, ſaltem ictericos flavos fieri voluerunt. Et quia lien fuit ſtatutus buſſa humoris melancholici, ob id in liene ſaltem icteri nigri fontem quaſiverunt. Verùm ex ſuprà annotatis manifeſtum eſt, icterum flavum ſæpius oriri citra impeditum bilis motum ad inteſtina, quod non tantummodò *Riv. Cent. 2. obſ. 9.* obſervavit, ſed etiam poſt ferarum morſum natus icterus flavus, ſine obſtructione tali, obſervatur.

*Nigrum icterum* quod attinet, hunc non oriri ex obſtrictò aut affecto liene, patet inter alia ex eo, quod icterus flavus diuturnior ſemper in icterum nigrum degeneret, unde & nigrum eſſentialiter non differre à flavo aſſerit *Willis de urinis p. 355.* Unde etiam obſervatus fuit icterus niger, in quo excrementa alvi omninò alba apparuerunt, in quò tamen hepatis potius, ac vaſorum cholidochorum, quam lienis vitium ſubefſe videbatur, ut notat *Platerus l. 3. obſ. p. 575.* Hinc rectè notat *Lindannus*, ſe in Friſia multos curafſe, ſcirrhos ac tumores duros lienis habentes, in quibus tamen nunquam vel minimum icteri nigri obſervafſet veſtigium, adeoque lien in eò eſt inſons. Interim tamen quoad bilem & vaſa fellea & inde oriundum icterum, non ad eò omnia ſunt plana. *Supra notatum* fuit, icterum ſæpius obſervari, dum lapides folliculum felleum replent. Sed memini ante plures annos diſſectam hic fuiſſe mulierem capite mulctam, quæ in folliculo fellei copioſos lapides majores & minores collegerat, ſine icteri veſtigio. Et eodem fere tempore diſſecimus corpus maſculinum, in quo principium erat Anaſarcæ, erat ſubtumidum & apertâ ejus cuticulâ copioſum ſerum effluebat, in cujus folliculo felleo ne gutta bilis inveniebatur, in quo tamen nullum fuit icteri veſtigium: Sic canibus folliculum felleum poſſe excindi, ſine vitæ aut ſanitatis incommodo, notum eſt.

His ita præmiſſis *ad cauſam proximam* propius accedamus. Jam verò in omnibus ictericis, pauciſſimis caſibus exceptis, obſervatur urgere primariò ſymptoma ventriculi circa digeſtionem & ægri circa iſtud negotium ordinariò vitium quoddam ſentiunt, imò ſi *juvantia* conſideramus, poſt vomitoria præmiſſa, *ſialia* & hinc amara totam abſolvunt paginam; adeoq; in omni ictero *acidum aſterum in primis viis* activè peccare obſervatur. Saltim dubium eſt, an hujus occasione, ſecundum *Helmontij* hypothefin & vitio digeſtionis primæ indeque naſtis ſcoriis nidorofis plus minus flavefcentibus, plus minus amaricantibus, in M. S. diſtributis & in peripheriam corporis diſfuſis, icterus oriaſtur? an vero præſatum vitioſum fermentum, acidum aſterum, bilem in-

quinando

quinando & h  
inferat? Sa  
rentur, loco c  
tus flavefcente  
minus bilioſis  
in ſtomacho  
quo minus oc  
rum inferenti  
diſtributi, ic  
bibus, non  
ſione ſuperv  
obſervatur.

Juxta h  
icterus ex vi  
prænatural  
ſecernenda &  
vel in debitâ  
viorem dat ic  
tinet, vitiatu  
quod inprim  
valet, cum, v  
rior bilis ſub  
pate eſt gene  
inſiciet, in  
ſecerni in hep  
le ex mutata  
intercludere

Denic  
miſſione bill  
unde, quavi  
ſmorum inte  
conſtringi &  
ſterica &c. ſ  
menta hodie  
cuati, non q  
caſione ſpafm  
que diverſim  
Ex di  
dore prætern



quinando & hinc ejusdem secretionem debitam in hepate impediendo, ictus inferat? Sanè quòd *ex digestionis primæ vitio* & inde cruditate nidorosa, generentur, loco chyli, amararecrementa, aut dulcia flava & sic porro, docent vomitus flavescentes matutini post crapulam. Lac facillimè, præsertim in infantibus minus biliosis, in nidorem croceum abit. Fructus horæi, pinguis, pisces &c. in stomacho nidore corrupti, similes sordes suggerunt: Quid igitur obstat, quo minus occasione talis fermenti austeri, dolores stomachi aut præcordiorum inferentis, vitietur *digestio prima* & inde geniti sordes nidorosi, in corpus distributi, ictus inferant? Existimo sanè omnem ictus, qui supervenit febribus, non bilis aut folliculi vitio, sed diætæ & digestionis primæ vitiatæ occasione supervenire; non secus ac istum, qui post V.S. abusum crebrius nasci observatur.

Juxta hunc tamen ictus, eumq; *frequentissimum*, etiam *secundò* oritur ictus *ex vitio bilis naturalis* (eum modò dictus ictus ex vitio *bilis* vitellinæ præternaturalis, in stomacho genitæ, oriri dici possit) istius nempe, quæ in hepate secernenda & per vasa cholidocha excernenda venit. Hæc enim vel *vitiatæ*, vel in debitâ *distributione impeditæ*, ictus infert. Illa causa frequentior, graviolem dat ictus; hæc rarior, leviolem inducit. Bilem vitiatam quod attinet, vitiatæ hæc ipsa à modo dicto vitioso acido austeri primarum viarum, quod in primis bilem vitare, texturam ejus immutare, ac plus minus inspissare valet, cum, ut supra monitum, in graviore ac pertinaciori ictu, spissior ac tenacior bilis subinde inventa fuerit. *Acidum* hoc vitiatæ bilem, aut dum in hepate est generanda aut secernenda, aut eandem in folliculo felleo jam secretam inficiet, incrassabit & in calculos coagulabit. Quibus occasionibus nec debite fecerni in hepate bilis, aut secreta licet, non debite excerni poterit: Quin facile ex mutata consistentia ductus cholidochos obstruere & ita transitum sibi ipsi intercludere poterit.

Denique ex sola *distributione læsa* indeque genita cum sanguine commistione bilis, oritur ictus, quando calculi meatus obstruunt, aut quando aliunde, quavis ex causa, ductus hepatici obstruuntur; vel quando occasione spasmodicorum intestinorum tenuium, ac speciatim duodeni, orificium ductus fellei constringi & condensari solet, cujus exempla in partu laborioso, passione hysterica &c. *supra* annotata fuerunt. Nempe non rarum est in ictu alvi excrementa hodie pallida, cras denuò flavedine tincta conspici & ita subinde evacuari, non quod nunc obstruatur, nunc denuò referatur ductus, sed quod occasione spasmi intestinalis nunc constringatur idem, nunc denuò aperiatur, idque diversimodè, pro occasionum varietate.

Ex dictò igitur *acido fermento vitioso* primarum viarum & bile, vel ex nidore præternaturali genita, vel bile hepatis naturali, eaq; aut vitiatæ, aut saltem male



malè distributa, omnis ictericorum varietas in colore, ac differentia in symptomatibus deducenda; nempe prout ab acido præfato in texturâ diversimodè mutabitur bilis, qualiscunque etiam ista colorum varietas emerget, cum prævalente potentia bilis vel quantitativè, vel qualitativè, sequatur *icterus flavus*: Prævalente verò acido austero primarum viarum (sive ex stomacho, secundum *Helmont*, seu ex Pancreate, secundum *Sylvium* derivare velis) icterus nunc viridis, nunc plumbeus nunc niger oriatur, cum aliàs notum sit, ab instillatis acidis bilem naturalem ad obscuriorem colorem, in specie viridem, disponi. Sane observavi aliquando in urinâ ictERICI, cui *spiritum bis* instillaveram, sedimentum viride exinde præcipitatum fuisse. Certè dum consideramus cardialgias insignes istas ictericorum, bilis in felliculo notabilem alterationem, per acidum austerum explicabilem, ut & *juvantia*, *Gialia*, acidum corrigentia, *amara*, aut *volatilia* bilis dyscrasiam emandantia, (nempe omnia amara hepatis amica sunt, sicut acida stomacho) facilè ad acidum tanquam primarium agens deflectere possumus. Curavi his diebus mulierem, quæ subinde tantum non intolerabili cardialgia affligebatur, quam ordinariò sequenti die, totius corporis icterus insequabatur, breviter denuo uno alterove die evanescens, sed redeunte quavis occasione ista cardialgia semper superveniebat icterus in paroxysmo cardialgiæ; alvus liberè aliquoties fluebat, utut postmodum clausa esset, pulsus rarus, tardus, mollis, magnitudine moderatus, debilis, prostratio virium summa, sitis clamosa. Diligenter à me interrogata, an amarorem perciperet in ore, semper negabat, sed sedula attentione observavit semper, quoties paroxysmus cardialgiæ instaret, sentire se saporem acrem acidulum ex ventriculo eructatum; Eben als wenn man so einen Spiritum einnimbt/oder als wenn man saure Pulver nimbt. Hoc sane quoties sentiebat, toties die aut nocte sequente paroxysmus cardialgiæ & hinc icterus superveniebat. Curavi eam *pulv. cachect. Hartmanni* & hinc *absorbentibus*, *alcalinis* & animalium partibus duris. Existimo acidum istud austerum irritasse ventriculum ac vicinas partes nerveas, quorum spasmo tam miserabiles cardialgiæ, cum respiratione difficili & totius dorsi dolore, excitatæ fuerunt, sub quo spasmo & vasa cholidocha cum folliculo felleo diversimodè nunc constricta, nunc relaxata fuerunt, unde huius occasione alvi libertas in paroxysmo, cum aliàs sat siccioris esset alvi natura, illius vero occasione bilis impedita distributio, c. sanguine permistio, in habitu corporis secretio, hinc vagus ille icterus. Hactenus dicta confirmat tristitia & mœror, it. iracundia, ad icterus, ut supra dictum, disponentia. Nempe tristitia & mœrore omnes humores incrassari, acidum fixum augeri & ita effectus naturæ bilis contrarii, induci solent. Iracundia omnes humores tenuiores ac mobiliore, ac acido volatili actiores reddere solet.

Proгно-

Progn

Hinc icterus  
ferè lethalis el  
agrum jugula  
cognati alij.  
macior, sicut  
rum nigrum  
febre est criti  
& securior,  
ctione oritur  
felleo & ind  
vant & mo

In Cl

Bilis vitata ex  
nequit, per u  
venda,

Prim præ  
minus resino  
barbarina, se  
præstant m  
cta, simul b

In spe  
nihil varian

Prohi

asperat malu  
nocivæ, nisi  
modo lenis  
unica purg  
præmissis,

nifera sur

Præm

paginam.  
aperientia d  
etiam Ham  
Pars



*Prognosis* omnis nititur causarum antecedentium consideratione.

Hinc icterus qui sequitur vitium quoddam hepatis confirmatum, scirrhum &c. ferè lethalis esse solet & nunc immediatè, nunc mediatè hydropis superventu ægrum jugulat. *Flavus icterus* facilior est curatu, quàm icterus niger, aut his cognati alij. In specie niger icterus quartanis superveniens solet esse contumacior, sicut *Forestus l. 19. obs. 22.* observat quartanæ per 12. annos duranti, icterum nigrum diuturnum supervenisse. Ex flavo autem securissimus est, qui in febre est *criticus*, minus qui *symptomaticus*; post hunc facilioris est curationis & securior, qui ex impedito bilis, per meatum felleum, motu hujusque obstructione oritur, modo non nimis pertinax fuerit obstructio. Calculi in folliculo felleo & inde natus icterus difficillimè curantur, aut curati licet, crebrius recidunt & mortem inferunt.

In *cura* in genere (1.) *fermentum acidum austerum corrigendum.* (2.)

*Bilis viciata emendanda* & in naturalem crasim restituenda; quæ vero emendari nequit, per urinas & sudores evacuanda. (3.) *Distributio ejus debita promovenda.*

*Præ* præstant *absorbentia*, præsertim *stibialia*; *secundum* præstant *amara*, plus minus resinosa & *volatilia*, præsertim *appropriata*, quibus pro laxanda alvò *rhabbarina*, *sennata* &c. pro diuresi *lumbicalia* &c. simul inserviunt. *Tertium* præstant *incidentia*, *aperientia* & tonum hepatis conservantia, *hepatica* vulgò dicta, simul blandè adstringentia, ut firmentur fibræ earumque tonus.

In specie vero pro *antecedentium causarum* varietate specialis cura non nihil varianda, de quibus hinc inde.

Pro his scopis obtinendis *vena sectio* nil juvat, utpote quæ potius exasperat malum, quam idem tollat. *Purgationes* in principio morbi sunt nocivæ, nisi fiant per lenia, primarum viarum saltim absterfiva, aut adsit tantummodo lenis obstructio meatus fellei in intestinis, tunc enim talis obstructio vel unica purgatione potest tolli. In progressu vero morbi, appropriatis imprimis præmissis, purgationes conveniunt, sicuti in declinatione *diuretica* & *sudorifera* sunt optima.

Præmissis itaque absorbentibus *specificæ* utramque in cura icteri faciunt paginam. *Absorbentia* ista imprimis suggerunt *σ* & cætera ex eò parata, vulgò *aperientia* dicta, eaque imprimis in ictero nigro & plumbeo optima sunt. Hinc etiam *Hemaites præparatus seu pulveratus*, seu experimentum in ictero à quibusdam

Pars II.

h

busdam

Prognosis



busdam laudatur, quatenus & hic *ſialis* eſt proſapia. Hinc *Pulv. ſpecificus ad icterum* eſt nil aliud quàm *limatura ſialis* exactiſſimè pulveriſata & ſub tritura *oleo deſtillato aromatico ligni ſaſſafras* irrorata, ne ſcil. rubiginem contrahat, qui à *ſj.* ad *ʒʒ.* commodè & cum ſucceſſu, nunc ſolitarius, nunc cum *crystall. præp.* dimidiò propinatur, ſc. ad imitationem *pulveris cachectici*, imprimis *Hartmanni in prax. chym. c. 171. §. 5. it. 8. diaph. ſial. Ludovic.* expertum, quod vid. in hujus *Pharmacop. p. 330.* & alia *ſialia* &c. item *vina ſialia*, vel vinum in quo ſape ☉ extinctum, à *Poterio* & *Burrho* commendatum. Facit huc & experimentum *Gesneri* in ictero quocunque, quod eſt *infuſum chalybis, cum carbonibus de quercu*, in vino. In ſpecie ex menſium vitio ſi fuerit icterus, *ſialia* laudantur, unde *pulverem compoſitum ad pallidos virginum colores*, ad icterum à ſuppreſſione menſium commendat *Heer in obſ. 6.* *Acidula* huc pertinent, quæ deſperatos icteros interdum curant *Conf. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 284.* cum hæ ipſæ poſt icterum relictam humorum dyſcrasiam & viſcerum atoniam, præfertim ſi diuturnior fuerit, optimè reſtituant.

Quoad *ſpecifica antiictERICA*, hæc inter primatum obtinet *chelidon.*

*maius*, optimum icteri remedium, præſertim quando ex vitio bilis mora indeque *ſacibus* alvinis gryſeis aut candicantibus exiſtentibus, icterus oritur; in tali caſu vel *succus* ex planta recenti expreſſus in quocunque vehiculo hauſtus pro lubitu confert, qua ratione ancillam ictericam paucos intra dies curavi; vel *radix chelidon. maj.* maceretur in vino, quod exinde ſaveſcit, egregium in ictero experimentum. It. *decoctum hujus chelidon.* in vino eſt optimum remedium. Hinc *Joel decoctum chelidonij maj. c. granis juniperi* merito commendat. *Vid. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 280. Foreſt. l. 19. obſ. 21. & 40.* Pertinet huc decoctum *Lindani*, quo quemvis icterum curat, præſertim, quod probè notandum, præmiſſo vomitorio. Ut plurimum enim in principio curationis *vomitivum* propinandum venit; *decoctum* eſt tale

℞. Rad. Cichor aut Taraxac. ʒij.

Chelidon. maj. ʒvj. ad ʒj.

Herb. endiv. a. cichor. Mj. l. ij.

fragar. Miß.

marrub. Mß.

Tart. alb. ʒʒ. ad ʒvj.

Fol. ſen. ʒvj.

coq. ſ. q. ▽. ant ▽æ & vini aa. q. ſ. in vaſe clauſo. Decocti ℞. ſij. D. pro uſu, addendo, ſi præſtantius volueris, ſingulo hauſtui ſpir. Tart. rectif. ʒj. ad ʒʒ. ſumat 3. diebus, omni manè duos hauſtus, interpoſita horâ, donec malum ſit curatum. Attendite ſub uſu, ne ſint ſeceſſus plures quam 2. vel 3. in die; ſi contingat liberalius

beralius purg  
ſtelodami Me  
mazebant cra  
rat ſplendor &  
igitur medica  
rubium, it. C  
remedia, qu  
decoctum, a  
rum, nunc ſ  
ctum infant  
Conf. 34. S

Icteric enim  
pter amarore  
ſed in mucur  
potus erit, ve  
decoctum pa  
ſum non lau  
ratum ex p  
priatum eſt  
nis ejusden  
peric. ſlor. g  
huc obſerv  
conſervam  
negligendu  
deſcribit Fe

Alias ſem  
Timæ ad i

tur ex vin



beralius purgari prima die, aliis sumatur tanto minus. Tali decocto curavi Amstelodami Mercatorem ex ictero nigro. Tribus septimanis nil profeci: Urinæ manebant crassæ & splendide, post paucos dies, apparente coctionis signô aberat splendor & turbidæ erant urinæ; prædixi ergo solutionem morbi; continuari igitur medicamentum, non mutari oportet. Juxta *chelidonium maj.* etiam *mar-rubium*, it. *Centaurium minus*, *Taraxac.* flores *Chamom.* appropriata sunt icteri remedia, quocunque modo, inprimis in decocto, usurpata. *Fragaria* quoque decoctum, aliquamdiu continuatum, appropriatum experimentum est ad icterum, nunc solitarium, nunc cum *passulis* usurpatum; præsertim vero tale decoctum infantibus ictericis proficuum est, teste *Ru'ando in Thesaur.* it. *Fonscal.* 2. *Cons.* 34. Sanè pro potu optimè valet decoctum hoc

R. Fragar. Mij.

passul. min. ʒiij.

decoq. in aq. font. pro potu.

Icterici enim, utut impensè sitientes, malè ferunt cerevisiæ potum, partim propter amarorem, partim quod oneret ventriculum, cum non benè digeratur, sed in mucum degeneret. Hinc sitientibus maximè ictericis, convenientissimus potus erit, vel modo dictum decoctum, vel, si *fragaria* amaror sit molestus, solum decoctum *passularum*. *Passula* sanè multam in recessu habent, unde non possum non laudare *Electuarium Dyobai part. 1. Experim.* ad quemvis icterum paratum ex *passulis min.* & *Rhabarb.* *Hirundinaria* seu vincetoxicum appropriatum est antiictericum, præsertim in declinatione morbi, si vinum decoctionis ejusdem hauriatur, per sudorem & urinam tincturam removens. *Flor. hyperic. flor. genist.* in specie *crocii flores*, experimenta sunt ad icterum. Pertinet huc observatio *Borelli Cent. 4. obs. 31.* ubi icterus à fumo tabaci, curatus per *conservam florum genistæ* & *calendula*. Nec *absinthium*, optimum hepaticum, hic negligendum est. Pertinet huc decoctum euporiston *Camorarii* ad icterum, quod describit *Fehr de absinth. p. 29.*

R. Comar. absinth.

Flor. rosar.

prunor. sylvestr. an par. viij.

crocii part. ʒ. decoq. in vino diuretico & exprime pro usu.

Aliàs sem. *Aquilegia* bonum specificum ad icterum, unde est basis pulveris *Timæi* ad icterum experti

R. Sem. aquileg. ʒvj.

crocii orient. ʒj.

Tart. Vitriolat. ʒʒ. M. F. pulv. divid. in 7. part. æqual, sumantur ex vino Rhenano calido 7. diebus continuis. Testari possum, quod ali-



quando fartorem ictero flavo laborantem contumaciter, aliis irritis, præmissio vomitorio hoc pulvere restituerim, juxta cujus usum imprimis *spir. carminativus* de tribus præ aliis proficius erat. Convenienter potest fieri *emulsio ex hoc semine*

℞. Sem. aquileg. ʒvj. l. ʒß,

c. f. q. ▽. chelidon maj. F. Emulsio adde

Ebor. f. Δ. ʒj. ad ʒß. edulcoretur parum D. & usurpetur pro lubitu. Benè confert hæc Emulsio & Tincturam ictericam optimè delet: Inter alia puerperæ, mox à partu fœtus mortui, ictericæ, cum successu dedi, Ebur certè ceu appropriatum absorbens à multis ad icterum commendatur; juxta hanc emulsionem pariter quoque experta est *emulsio ex sem. frigid. maj.* quæ vid. in *Miscell. A. N. C. Ann. 4. p. 43. & 44.* Hisce accensenda venit *radix curcumæ*, antiictericum bonum, seu solitaria, seu cum ʒ. diaph. ʒial. propinetur. v. g.

℞. ʒ. diaphor. ʒial. Ludov.

rad. curcum. aa. ʒj. ad ʒß.

sal. vol. CC. ʒß. M. p. 2. dof.

In specie, si à calculis in folliculo felleo fuerit icterus, radicem hanc ceu experimentum commendat *Hoffman. in clav. Schröd. p. 365.* de quibus calculis exturbandis etiam videantur remedia ordinaria in *Misc. A. N. C. Ann. 4. p. 103.* Nec omittendi sunt *lumbrici terrestres*, seu eorundem blandè exsiccatus pulvis ad ʒj. sapius propinetur seu per putrefactionem *spir. urinosus* ad ʒß. subinde exhibeatur, propter sal. volatile nitrosum abstergens, incidens & saporem icteri specificum corrigens urinamque ciens, ab omnibus Practicis laudatur: Quibus vix cedit *spir. tartari* probè rectif. urinosus, *spir. carminativus de tribus*, *spir. urina humana* aut hujus loco *spir. b. x.* Hinc pauperculi *urina potu* ab ictero securare solent, vel quod in multis probatum evporiston. ℞. Succ. absinth. & Marrub. q. v. M. cum urinâ ægri, de quo bibat bonum haustum, contineat se in lecto & fudet, sudorque sapius abstergetur.

Certè præmissis præmittendis (id est vomitu & ʒial.) post specifica, *salia volatilia* sunt optima icteri remedia. Unde propter hujusmodi volatilem salinam nitroso ammoniacalem texturam *stercora* quorundam animalium tantoperè ad icteri curam, tam Paracelsus, quam alii practici commendant; in specie *stercus anserculorum* juniorum, chelidonio & anserina nutritorum. Item *stercus canis* ossa rodentis. Item *stercus album pullorum* exsiccatum & pulverisatum; quò facit *tragaa stercoraria Quercetani* &c. quæ omnia à ʒß. ad ʒj. propinantur. Unde & quidam commendant *succum stercoris capræ* expressum cum lacte ceu egregium in ictero remedium. Hisce annumerandi veniunt *lapides in felle animalium*

reperiti,

reperiti, præ  
icteri curam  
N. C. Ann. 3.  
Specificum ad  
hoc morbo al

Quoad evacu  
ctenus enarra  
moderata &  
& appropriat  
dulcè, qui cre  
macer etur po  
fusum fol. Sen  
alterans qua  
Nempe rha  
manè jejuna  
xam habebi

lanè pul vis  
gro, infusum  
concinnae  
quod optim  
purgandis

Quoad  
Radix chelid  
da penitus ti  
nei corporis  
indictis, fri  
bei anetho &



reperi, præsertim *lapis in felle bovis* reperi, cuius pulv. a ʒʒ. ad ʒj. mirè ad icteri curam laudatur; extra quem & *lapis ex felle porci* egregius est: *Conf. M.A. N. C. Ann. 3. p. 499. it. lap. bez. occident. Item lap. Ceraun* præpar. à ʒj. ad ʒʒ. Specificum ad icterum *D. Michaelis*, quo ipso aliquoties curavit, qui quotannis hoc morbo affici ebantur. Ex quibus variæ fieri possunt formulæ, v.g.

℞. Extr. chelidon. maj. gummos. ʒj.

lap. bezoard occid.

ʒ diaph. ʒ tial. Ludov. an. gr. xv. M. F. bolus, diluatur in haustu vini, capiatur.

Item ℞. ▽ taraxac. ʒj.

extr. chelidon. maj. ʒʒ.

ʒ volatil. CC. gr. viiiij.

syr. card. B. ʒj. M.

Quoad evacuationem primarum viarum, remedia huic scopo inservientia, hætenus enarratis aut subiungenda, aut interdum etiam permiscenda, semper sint moderata & blanda. Præ cateris commendantur *flores prun. sylv.* qui blandissimè & appropriatè laxant per alvum, si infundantur in potum ordinarium cum nodulò, qui crebrius bibatur, vel manipulus horum florum infundatur in vinum, maceretur per diem & noctem, quod vinum ita hauriatur. Convenit hic etiam *infusum sol. Sennæ c. ʒe tartari*; in specie *rhahabarum* appropriatum est, potius alterans quam purgans ictericorum, non sine causa à *Paracelso* commendatum. Nempe *rhaharb. elect. pulverisat. ʒʒ. ad ʒj.* propinetur in iure, vel vino calido manè jejuno stomacho, æger non nihil contectus sudabit & à meridie alvum laxam habebit. Vel

℞. Rhaharb. ʒʒ.

Tart. Vitriol. gr. xij. M. F. pulv. usurpetur dicto modo. Et sanè pulvis hic *rhahabari* in his casibus præferendus est extractis. In ictero nigro, *infusum bellebori nigri* in sero lactis confert, aut *pilula ex extracto belleb. nigr.* concinnatæ: Quibus quantum possibile fuerit, *gumm. ammoniac.* sociandum, quod optimum aperitivum mucis visci incisivum. *Præcipitata ʒialia* pro purgandis ictericis à quibusdam commendata transeant, cum tutiora prostant.

Quoad remedia externa in icteri cura usitata, sunt *Centaur. minus. it.*

*Radix chelidon. major.* It. *Hypericon* plantis pedum suppositum. Sic pro delenda penitus tinctura, sani licet sint ægri, interdum pertinaci, conveniunt *frictiones* corporis cum *sacculis*, repletis *farina hordei ʒ fabarum*, quibus aquæ calidæ intinctis, fricetur corpus. Vel fiat *balneum ex saponaria, chamomill. parietar, betanetho* & similibus, quibus corpus abluatur. De *tinca pisce*, umbilico impo-



nenda, aut plantis pedum supponenda, quæ exinde flavescere dicitur & æger sanari, rem in dubio (ceu incertam) relinquo.

Pertinet huc *cura magnetica*, uti in aliis morbis chronicis, ita & in ictero proficua, v. g. ex *urina ægri* & *farina* formentur *placentula* & cani vel feli devorandæ projiciantur, sic icterus evanescet, quod ceu à se expertum refert *Boyle in Philos. Experim.* Vel infundatur ægri urina super acervum formicarum, vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 146.* Vel permisceatur urina cum cineribus fraxini, *Confer Willis. cu. loc.* Vel, quod fuit expertum à *Castro. R.* Ovum gallinæ suo luteo & albumine per mediocriter foramen orbatum, ita ut sola testa remaneat integra, quæ impleatur urinâ patientis & facta scrobicula in hypocausto sinatur ibi, donec lentò calore exsicceatur urina; pari gradu & exsicceatur urina & tollitur icteritia. Potest fieri etiam citius in digestionem cinerum: Si vero per incuriam contingat aduri testam, icteritia abit in nigram icteritiam immedicabilem. Vel sanguine ex medianâ ægrotantis extracto & ovi gallinæ testâ artificiosè incluso & ita ovo 14. dies gallinæ imposito, postmodum sui famelicæ exposito, ut comestatur, icterum & morbos ex vitioso sanguine oriundos, transplantando averruncare satagunt, vid. *Burggravus in Boylichn.* it. ex urina ægri & lacte & addito pane similagineo F. jusculum, propinetur cani, qui si non moritur, ne homo morietur, sed convalescet.

Pro *gravidis ictericis* quibus non æque conducunt interna, aut *imbecillioribus*, in quovis ictero applicari potest Catapl. *foelis ex foliis marrub. virid. rad. Chelidon. mai. & visci quercin. an.* Mij. cum aceto vel vino subactis & plantis pedum applicatis.

## CAPUT II

DE

SANGUINIS ex PARTIBUS REFLUXU  
vitiato & inde orta inflammatione, tam in genere, quam in specie.

**S**anguis ex corde distributus in totum corpus & omnes partes, in his partim nutritioni inservit, partim in quibusdam certam fluidi separationem patitur, ad œconomiam animalis integritatem necessari: Per quas partes cribratus refluit per venas ad cor, circulari motu. *Motus hic circularis sanguinis laeditur & plus minus vitiatur, quoties 1. in parte quadam stagnat. 2. Quando extra partem effunditur in singularem corporis quandam cavitatem. 3. Quando sanguis extra corpus effluit.* Sanguis in vasis capillaribus & partium spatiolis hæ-

rens



rens & stagnans, coagulat<sup>ur</sup> & in minori quanto successivè insensibiliter evanescit & discutitur, in *contusionibus* v.g. Casu ab alto. <sup>6</sup>Uterius vero collectus mox excandescit, ac molestum caloris sensum producit, donec sensim corruptus, in pus vel fariem abeat, quarū prima mutatio, vocatur *inflammatio*, seu *φλεγμονή*, posterior vero abscessus vel *ἀπόστημα*.

(2) Quando sanguis in cavitate quandam effusus v.g. in pectus vel cavum abdominis, ac ibidem collectus in pus mutatur, vocatur *Empyema*. Qui si extra corpus effundatur est *hemorrhagia*. Refluxus igitur sanguinis quicunque impeditus, successivè

## INFLAMMATIONEM

constituit, ita ut causa materialis proxima consistat in sanguinis collectione & stagnatione ob impedimentum ejus refluxum. Nempe si qualibet pulsatione 3B sanguinis per arteriam ad partem fluat, sed 3j. per venas saltim refluat, remanet 3B. & dum continuatis pulsibus semper major majorque sanguinis erit copia, necessariò oritur sanguinis inflammatio. Quod si verò in parte inflammata nil omninò refluat, adeoque nec reciprocus spiritus insui fiat motus, à quo sustentetur insitus, supervenit *Gangrena*, dum suppresso spiritu insito, pars emoritur. Sanguis dum ita stagnat, necessariò pars inde tumet, & propter sanguinem contentum rubet, necessariò hinc etiam dolet, & tandem à sanguine calido simulque plus minus effervescente intense calet, adeoque 4. *pathognomica signa* constituunt modo dicta pathemata, nempe *Tumor, rubor, dolor, & calor*.

*Dolor* triplex in inflammatione successivè observatur 1. *Tensivus*.

2. *Pulsatorius*. 3. *Punctorius*. *Tensivus* à fibris partis inflammatae convulsis, earumque adeò tensione & renitentia: *Pulsativus* à fibrarum, membranas articularum constituentium, convulsiva tensione, hinc ad diastolen resistantia. *Punctorius* vix nisi in suppuratione, superveniens ab acerbis & linis acido salis particulis, acicularum instar pungentibus. Hæc omnibus manifesta sunt in parte externa visibili; dolor pulsatorius verò in parte interna, adeoque invisibili, item interdum gravativus ardor & denique partis ordinaria functio læsa inflammationem comitantur. Hinc observetur, quod, quia non omnis inflammatio est in parte quadam determinata, tanquam subjecto, semper præter modò allegatum quaternionem symptomatum, simul alia accedunt, non morbi, sed partis affectæ ratione supervenientia. Sic v.g. inflammationi in *angina*, deglutitio læsa, in *Pleuritide* respiratio difficilis, ratione partis affectæ superveniunt. Quibus in visceribus inflammatis semper ponderis gravantis sensus, sive *gravativus* obtusus dolor præter dicta simul accedit.

*Causa*



*Causa efficiens* inflammationum est vel *interna* seu proxima; vel *externa* seu remota.

*Interna* vel est sanguis ad æquabilem circularem, per quævis vasa capillaria, motum ineptus; vel est fermentum quoddam vitiosum, aliudve quodvis heterogeneum, irritans spiritum partis insitum & dolorem inferens. Adeoque omnis causa efficiens inflammationis querenda, vel *in objecto* seu sanguine fluente, vel *in subiecto* seu parte, per quam fit motus. Prior causa est rarior, posterior vero est omnino frequentior.

*Sanguis ad motum circularem ineptus est*, vel 1. quando nimis est viscidus ac crassus ob seri defectum ejusque nimiam absorptionem, aut propter chyli crudioris ac glutinosioris, sive pituitæ viscidæ congestionem. 2. Quando idem sanguis ab acido quodam vitioso plus minus grumulosus factus, hinc inde subsistere aptus redditur. Hinc v. g. in subitaneo frigore, aut haustu frigido, post nimium corporis motum & incalcescentiam & inde sanguinis ad facilem sui coagulationem dispositionem, promptè pleuritis, aut peripneumonia oriuntur, non secus ac immersio corporis calefacti in aquam frigidam, ad eadem mala disponere solet. Sed dixi rariorem ex hac causa esse inflammationem. Nam vel universalis in toto corpore aut una quadam parte, aut pluribus partibus simul, fieret sanguinis ex causis istis stagnatio, aut danda foret ratio, quare præcipuè in hac, non vero in alia parte fieret talis stagnatio, adeoque sic ad partem inflammata simul semper respiciendum erit.

*Altera causa, in parte recipiente* scilicet est vitium quodcunque, cujus occasione angustantur partes, quo minus sanguinem debitè transmittant. Hoc ipsum est acidum vitiosum fermentum, spiritui partis insito inimicum, cujus occasione pars tanquam à spina infixæ dolet; cujus doloris occasione, ex fibrarum irritatione, spirituum influorum concitator influxus seu impetus provocatur. Hinc stringuntur fibræ, clauduntur pori, angustantur meatus, sanguinis vitiat circulus & adest *inflammatio*. Sed præter tale fermentum acidum, etiam quodvis heterogeneum, in parte quadam præternaturaliter retentum, eamque lædens, aut molestiæ sensum inferens seu irritans, talis spinæ locum obtinet, ac inflammationem excitat. Hinc enim est, quod quibuscunque ferè doloribus frequentes superveniant inflammationes, v. g. dolori dentium, ab acido radicem dentis mortificante, supervenit inflammatio malæ, quoniam fibræ nervosæ & musculosæ vicinæ ex dolore per consensum affectæ, se crispant & levi quasi spasmō se contrahunt, unde coarctantur venæ capillares, hinc inflammatio. Unde in arthritide ex simili causa tumor inflammatorius, ut plurimum Erysipelaceus, supervenit, it, puncturæ vespæ, intrusioni spinæ & coagulationi lactis in mamma,

ma, mox infla-  
fectus seu pro-  
curam dirig-  
præcaveretur

*Causa*

ximarum ne-  
ex equitatio-  
pressionibus  
tracturis nō  
cta aut post

Obi-

Erysipelatum  
febre ardente  
diem durat,  
fermentando  
dicunt, et vi-  
sarius, volatili  
fui tendit, cuj  
vitiosa acidit  
tus, ita postm  
gis que emen  
unde intensi  
pugna, ut li-  
effervescen-  
sum dico pu-  
fallecat, alb  
alcali soluto

*Ar-*

motu concu-  
minus acci-  
rosto, puncti-  
sanguinem  
ex alia causa  
tali causa est  
ne partis inte-  
perveniente  
externa sub  
in quavis in-

*Parti*



ma, mox inflammationes superveniunt. Non est talis tumor causa, sed potius effectus seu productum. Unde qui tales tumores simpliciter curant, ad posterius curam dirigunt: E contra si modò causa dolorifica sistatur, omnis tumor & præcavetur & incipiens mox curatur.

*Causæ externa seu remota* sunt variæ, ad alteram dictarum *proximarum* necessariò reducendæ. Hinc gravioribus contusionibus v. g. testium, ex equitatione violentâ, supervenit inflammatio: Item arctis partium compressionibus, vasorum angustationibus, nimis fortibus ligaturis, luxationibus & fracturis nò raro inflammationes pedisse quæ se associant. Sic spinæ post ossa fracta aut post craniû contusum, altius eminentes semper inflammationes inferunt.

Observandum autem hic omnes *partium internarum inflammationes de Erysipelatum* esse genere, adeoque esse omnes *acutas*, subinde peracutas, cum febre ardente continua junctas; nam v. g. pylori inflammatio vix ad quartum diem durat. Sanguis itaque extravasatus plus minus ac in parte stagnans, mox fermentando impensè calescit, efferverescit ac in pus corrumpitur, quod suppurare dicunt, *es wird unterföhig*. Ratio est, quod sanguis præternaturaliter extravasatus, volatilibus balsamicis spiritibus mox depauperatur, unde ad corruptionem sui tendit, cujus individuus comes semper est acor præternaturalis vitiosus. Quæ vitiosa aciditas in sanguine extravasato, uti spissat & coagulat sanguinem primitus, ita postmodum sale volatili in sanguine abundante & successivè magis magisque emergente, fermentationis motum ciet, imò interdum acriter efferverescit, unde intensus calor & major tumoris inturgescencia. Quæ acris effervescencia pugna, uti successivè sanguinem corrumpit, ita tam diu durat, donec salia ista effervescencia mutuò concursu in tertium salsum coeant, quod *pus* vocatur. Salsum dico pus, si est laudabile & naturale, cum ex acido urinosoq; necessariò subfalsescat; albedo vero puris est ex sulph. sanguinis sub effervescencia motu ab alcali soluto perque acidum præcipitatò. *Conf. hic Sylvius l. 1. prax. ubi de inflam.*

*Ardor*, qui in inflammatione perquam sensibilis, est ex acidi volatilis motu concitatori, adeoque pro hujus plus minus acrioris, cum alcali etiam plus minus acriori, plus minus facta effervescencia majori, cætera symptomata *ardor, resio, punctio &c.* plus minus intendi quoque solent. Idem *acidum vitiosum*, sive sanguinem purum inquinando ad inflammationem disponat, sive inflammationi ex alia causa oborta superveniat, efferverescendo in ejus massa cum sale ejus volatili, causa est *febris inflammationibus* semper *conjuncta*, aut *acuta*, in inflammatione partis internæ, à causa interna natâ, v. g. in pleuritide, hepatitide: Aut *lenta*, supervenientes nempe inflammationibus partium quarundam externarum, à causa externa subortis, v. g. in inflammatione mammæ ex lactis grumis. Acidum hoc in quavis inflammatione simul subesse & quorumvis cæterorum symptomatum



aut supervenientium affectuum causam probatur. 1. Exemplo pleuritidis, seu inflammationis, spontaneâ de causa enatâ, frequentissimâ; In hac enim sanguis per sectam venam effluens semigrumatus apparet, quo de *vid. infra*. 2. Quia inflammationes quælibet, remotis causis externis, eas plus minus foventibus, curantur optimè internè per talia, quæ acidum vitiosum corrigere, aut per sudorem & urinam ejicere valent, v. g. ocul. d. dent. apri, flor. bellid. papav. rh. sperma ceti & in genere per omnia remedia, quæ sanguinem ab acido grumofum dissolvere, & in casu ab alto usurpari solent. 3. Externæ inflammationes quævis, in specie Erysipelaceæ per talia tolluntur, quæ acidum absorbere valent, v. g. per applicatam cretam, pulv. flor. sambuc. chamom. camphoram, aq. calc. vivæ, lac virginis & similia applicata. Ultra hæcenus dicta ulterius, ratione causæ efficientis formalis, in subiecto patienti consideranda venit crebrior inflammationum *recidiva*. Ratione vero causæ materialis & objecti, considerandus venit sanguis, prout in quanto & quali se habens, *inflammationum differentias constituit*. Quoad *recidivam* inflammationum, facilem observamus aptitudinem quandam in partibus quibusdam, ut vel ex levi quacunque occasione inflammentur, vel quod inflammatio semel in parte facta à causa interna, subinde in eadem parte recurrat. Prius quod attinet, dispositio ista seu aptitudo prompta ad inflammationem in parte, consistit imprimis in nimia partis sensibilitate id. oque irritabilitate, dolore &c. Hinc enim partes nervæ facilius, quam sanguineæ inflammantur, oculi facilius quàm genæ & sic porro. *Quoad posterius*, notus est quidam pleuriticus qui subinde quotannis eodem malo laborat; alius Erysipellate suræ affectus, vel levissima data occasione idem malum denuò patitur. Inflammationes tonsillarum semel factæ, si non benè curenur, facillimè vel data externa saltim occasione, recurrunt.

Dicitur vulgò, remanere in parte inflammata dispositionem certam, unde ad tam facilem inflammationem disponatur. Sed revera triplex hic subest ratio. 1. Debilitas spiritus insiti, 2. Atonia partis semel inflammata. 3. Relicta spina seu aciditas fermentalis occulta, facile vel *internis* occasionibus, v. g. iræ excandescencia, vel *externis* diætæ erroribus, commovenda. Nam pars semel inflammata sive discussa fuerit inflammatio, sive, idq; imprimis, suppurata, necessariò debilitatur, ac plus minus enervatur spiritus insitus, ob denegatum liberius cum influo commercium; fibræ quoque laxatæ & pori partis transformati restitant, unde facile sanguis in suo legitimo motu impediri potest; imprimis si abscessus suppuratus seu inflammatio suppurata non probè & exactè mundificetur, etiam post consolidatum ulcus recurrit; tum enim odor fermentalis acidus residuus manet, qui partim partes sensiles irritando, si excitatus fuerit, fibrarum crispationem excitat, partim suo contagio sanguinem a luentem simul disponit ad faciliorem sui coagulationem, hinc subsistentiam & inflammationem.

*Quoad objecti materialis seu sanguinis in quanto & quali vitia*, attendendum,



dum, an sub inflammationibus concurrat simul aliqualis plethora, seu revera talis, seu ex consuetudine. Nam tali sub occasione copiosius sanguis stagnare & inflammationem intendere solet. Hinc qui adfueri sunt annuis phlebotomiis, aut statis scarificationibus, simul atque hæc intermittunt, sæpius in inflammationes crebrius recurrentes incidunt, quas ferè præcavent ordinariis istis sanguinis de- tractionibus. Novi mulierem, quæ nisi binis singulis mensibus utatur cucurbi- tulus scarificatis, ordinario tonsillarum & faucium inflammationi est subjecta; concurrat nempe hic plethora secundum quid, seu à consuetudine contracta. *Quoad quale sanguinis, dividunt vulgò inflammationes in legitimas & illegitimas. Illas quando sanguis benè constitutus inflammationes excitat; has verò seu ille- gitimas in biliosas, pituitosas, melancholicas dispescunt, non propter tales humo- res sanguini permistos, sed propter variam sanguinis crasin, ac inde natam tem- periem, de quo in Physiol. de Temperam.*

*Quoad prognosin.* Inflammatio vel sua sponte recurrit, vel non re- currit. *Istud*, quando sanguis nondum perfectè extravasatus aut, congruatus fuit, quin relaxatis fibris aut apertis poris idem stagnare incipiens, denuò per venas regurgitat, sive purus fuerit, sive sordibus heterogeneis, in quandam par- tem depositis & ita inflammationem occasionaliter inferentibus, permistus; Id quod probè notandum est in tumoribus partium *criticis*, semper cum inflamma- tione junctis. *Dum non recurrit* inflamatio vel discutitur, vel suppuratur, vel scir- rhescit, vel gangrænescit. Quando inflamatio discutitur (id quod fit imprimis o- perante & prædominante alcali, dissolvendo sanguinem) est optimus finiendi modus; hinc est iste, quando suppuratur & abit in abscessum, ex æquali vigore acidi & alcali; quod si vero acido abundante & prædominante coaguletur in scir- rhum, malum est, propter tumorem contumacem & curatu difficilem. Nisi enim scirrhicautè tractentur, facillè effervescent in cancerum degenerant, cum can- cer adultus & scirrhus dolens in paucis differant. Quod si inflammatio ex omni- modo spirituum & sanguinis in partè motu impedito, in gangranam abit, o- mnium est pessima, dum acido vitali spirituosò destructo sanguis & pars in pu- tredinem dilabuntur.

Positis his fundamentis facilis est accessus ad *CURAM*, in qua *sanguinis stagnatio tollenda & naturalis ipsius circulus restituendus*; idque fit vel *removendo* quasvis *causas externas*, vel *corrigeno internas*; adeoque quoad has 1. Sanguinis tenuitas & fluxilitas conservanda & circulus ejus concitator reddendus per *sudorifera*, præsertim alcalinæ naturæ, tam *fixa*, quàm *volatilia*; *Ille* acidū, san- guinem plus minus coagulans, absorbentia; *hæc* eundem positivè dissolventia &



attenuantia expectato sudore optimè conducunt. 2. Fermentum vitiosum in parte affecta corrigendum, aut quodvis aliud heterogeneum removendum, id quod tam interna quàm externa præstant. Illa sunt *absorbentia fixa*, aut *penetrantia volatilia* cum sudore administrata, adeoque sudorifera, ac sudorem procurandò inflammationibus quibuscumque conducunt.

*Externa* sunt ea quæ (1.) Acidum absorbent, ut *Hina* & *alkalia*.

(2.) Sanguinem vi *aromatica* alcalina dissolvunt & ita inflammationem discutunt. (3.) Quæ temperandò mutuum salium effervescentium concursum, suppurationem adjuvant. Quo facto abscessus aperiendus, ulcus mundandum, hinc consolidandum. Mundificatio sit exacta, ne tantillum fermenti in ulcere corruptivi residuum, recidivas inferre possit.

*Pro his scopis observandum* solenne ferè esse in omni inflammatione ingruente aut præsentè V. S. instituere, eamque subinde aliquoties repetere, idque *secundum revulsionis, aversionis & diversionis* leges & fundamenta alibi explicata. Nempe ubi cætera respondent circumstantiæ, aut etiam plus minus urgent, *V. S. ventilatoria* pro impediendo nimio inflammationis incremento debitis ac selectis in locis instituta, omnino subinde concedenda venit, absque tamen nimio ejus, secundum alias nationes, abusu, ut non semper eadem necessaria sit, cum repetiti sudores per remedia appropriata subinde quibuscumque sanguinis detractionibus præferendi sint. *Repellentia* quod attinet, sic dicta repulsiō est impossibilis, sæpe nociva. *Intercipientia* verò, seu, sic vulgo dicta, defensiva subinde tolerabilia; sunt autem talia, quæ fermenti acidi vim aut progressum, absorbendo istud, aut corrigendo, emendare possunt; sed de his alibi.

*Purgantia* ad inflammationes, qua tales, omnino sunt frustraneæ, utut primarum viarum absterfio & alvi blanda *laxantia*, propter junctam sæpe febrem, perq; proficua esse soleant. *Remedia* igitur *interna* plus minus *diaphoretica* superioribus indicationibus satisfaciunt, sunt omnia ea, quæ infra circa pleuritidem declarabuntur, quæ ipsa etiam in inflammationibus locum obtinent. Conveniunt g. omnia *volatilia salina urinosæ*, ut *spir. tartari*, & *urina*. CC. & c. it. *animalium partes duræ*, salibus hujusmodi turgidæ v. g. *Mandibul. lucij piscis*, *lap. S.*, *dens apri*, *ebur*, *unicorn.* & c. it. *sperma ceti*; quibus adde & *sulphura mineralia* & *metallica fixa*, præsertim *gialia*, ut *g. diaph. bezoardi. miner.* ac denique ratione febris acutæ junctæ, *nitr.* ac omnia *nitrata*; in specie *nitrum antimoniatum*. ac *spir. nitr. dulcis*, simul egregiè diaphoreticus: Ex modò dictis preparata plura, *Mistura simplex*. *Pulv. bezoardici*, *liq. CC. succin.* & c. conveniunt e. g. in principio inflammationum, habita ratione V. S.



Rx. Aq. Scabios.  
 Flor. samb. aa. ℥i℥.  
 spir. therical, simpl. l. camphor. ℥iij.  
 dent. apri præp. ℥j.  
 sal. vol. CC. gr. xv. ad ℥j.  
 Syr. scabios. ℥vj. M. p. 2. l. 3. dos.

Quibus etiam pro circumstantiarum ratione *opiat* addi possunt. Aut hujus loco

Rx. Unicorn. ver. præp.  
 maxill. luc. pisc.  
 CC. f. Δ. aa. ℥j.  
 sal. vol. CC. gr. xv.  
 laud. op. gr. ij. l. iij. M. p. 2. l. 3. dos. in haustulo vini capiendis, expectando sudorem.

In incremento inflammationum.

Rx. Aq. fl. sambuc.  
 chærefol.  
 papav. rhæad. aa. ℥j.  
 aceti sambucin. ℥iij. ad ℥℥.  
 lap. 69 præp. ℥j.  
 mandib. lucii pisc. ℥j.  
 syr. papav. rhæad. ℥j. M. p. 2. l. 3. dos.

Non nisi ratione acidi utimur istis absorbentibus, quæ imbibunt acidum, sed non penitus saturantur, quo ipso lixivii naturam assumunt, ut dicit *Helmont*, ac potentius vitiosa acida absorbere sanguinemq; mediante sudore dissolvere valent.

Vel Rx. Lap. 69. præp. ℥ij.  
 ebor. f. igne ℥j.

laud. opiat. g. ij. M. F. pulv. p. 2. dos. in haustu vini Rhenani assumendis, vel in parvo cochleari aceti, expectando desuper sudorem. Quin & sub morbi statu *Emulsiones ex sem. C. M. C. B. c. aq. papav. rhæad.* paratæ, addendo ℥. *diaphoret.* aut alia supra dicta, sunt utiles.

Dum febris urget, convenientissimum est *nitr. pulverisatum* in potu ordinario dissolvere, idque plus minus copiosè, prout necessarium fuerit. Vel si in progressu morbi febris urgeat

Rx. Aq. flor. sambuc.  
 C. B. aa. ℥ij.  
 ℥. diaph. ℥j.

Syr.



Syr. C B. aut

papav. rhæad. ℥j.

spir. nitr. dulcis q. s. pro grato sapore,

Capiatur subinde cochleatim, observando, ut, quantum possibile, corpus in madore conservetur. Sub hujus defectu opiata non negligenda sunt, quæ figendo spirituum impetum & hinc fibrarum nervearum solvendo stricturam, multum promovent sudorem. Loco potionis istius secundo locò positæ commodè etiam *mistura theriacalis, ex theriaca & aceto*, supra, ubi *de febribus malignis*, insinuata, usurpari potest. Quod si

## ERYSIPELACEÆ

sint *inflammationes*, imprimis adhibendum simul *Rob sambuci*, quibusvis formulis additum, aut pro vehiculo *pulv.* usurpandum, ceu appropriatissimum Erysipelatis remedium, præsertim quando motus naturæ excretorius deficit, nec debite Erysipelas efflorescere potest, tunc loco stimuli usurpatum *Rob* optimum est.

Quoad externa vel discutientia, vel suppurantia, hæc ad *Chirurgiam* pertinent. Sufficiat interim, quod omnium optimè de his agat *Sylvius l. i. pr. c. 40. & Barbette Chirurg. p. 2. c. 3.* Ubi *Empl. diapalma in aceto* solutum in usu esse ait: it. *folia brassicæ, tabaci, hyosciami & similia* imposita, calorem extrahere: Alios a. recipere *stercus ovillum* in vino vel aceto coctum; nonnullos flores *sambuci, meliloti, chamomille & similia in lacte dulci*: *Cretam contusam cum charta cerulea* impositam citò & benè sanare, refert. Fomentum sequens commendat idem

℞. Myrrh. rubr. pulv. ℥ij.

sacch. Bi. ℥ss.

camphor. ℥j.

opii gr. xxv.

vini albi Gallic. ℥vj. Mixta calefiant, quo linteola madefacta

imponantur parti affectæ, eaq; toties renovanda, quoties friges fieri aut exsiccari incipiunt. Aliud ibidem subjungit maxime proficuum

℞. Troch. alb. Rhasis ℥j.

camphor. ℥j.

Sp. V. ℥j.

aq sambuci ℥vj. M.

Pars etiam affecta quinquies vel sexies de die suffumigetur mastiche & thure, præsertim si facies erysipellate laborat, *vid. cit. loc.*

Quoad



Quoad inflammationes particulares, occupant hæc vel partes internas vel externas. Inter has se offert 1. Pharynx cum summitate gulæ: Larynx cum aspera arteria, ac denique tonsillæ: Uno nomine partes in faucium isthmo inflammantur; quæ inflammationes (excepta Tonsillarum inflammatione quæ ferè Notha existit, ac aliàs speciali nomine caret) in genere *Angina*, Barbaris *sqninantia*, Germ. *die Braune* dicitur, utut hæc linguæ saltem symptoma sit & simul quodammodo faucium, in febb. ardentibus familiaris. De his tamen omnibus ac partium huc pertinentium inflammationibus, cum habeant communem medendi rationem, conjunctim agere placet. Quoad

## ANGINAM

ergo, fauces in hac ipsa afficiuntur, adeoque imprimis ea pars, quæ pharyngem & laryngem constituit, ac præsertim partium harum muscoli, hinc & subinde glandulæ, siquidem ut plurimum simul tam Pharynx quam Larynx harumque partium muscoli tam interni, quam externi affici solent, utut nunc una pars magis, altera minus. Unde saltim speculativa, non autem practica est ista differentia, dum *Galenus* & *Trallianus* Anginam distinguunt in 4. differentias, nempe *Synanchen*, quando interni faucium seu Pharyngis muscoli inflammantur. 2. In *Parasynanchen*, quando externi faucium seu Pharyngis muscoli affecti sunt. 3. In *Cynanchen*, in qua internæ Laryngis partes sunt inflammatae. 4. In *Paracynanchen*, quando exteriores Laryngis & gutturis muscoli sunt inflammati. Equidem in Cynanche sæpius simul affecti sunt plus minus pulmones, non solummodò Larynx, unde etiam tunc temporis tam insignes respirandi difficultates, quales in peripnevmonia solent esse familiares, adsunt.

Præter verò *generalia Symptomata* aliis inflammationibus communia, partium nempe in faucibus calorem, dolorem, tumorem & interdum visibilem ruborem, adest in specie in *Angina incipiente* difficilis colli motus non absque dolore; it. difficultas respirandi, difficilis deglutitio & dolor admodum ardens in faucibus. In *factâ* vero jam angina signa sunt respiratio ferè abolita, & nonnisi cum summa difficultate reiteranda, ita ut in quibus gravius afficitur larynx, subinde quasi suffocatio immineat: Deglutitio impedita, ita ut liquor in ore detentus non possit subire gulam & si eousque penetrare possit, propter angustiam summam tamen & laryngis irritationem, denuò per nares sursum regurgitat: Dolor circa guttur & fauces insignis & admodum urgens, tam rodens, quàm pulsans, aut etiam crebrius pungens; lingua rubet, ac insigniter tumet; unde etiam ejusdem motus plus minus impeditur, ac faucibus angina præclusis simul & lingua solum viscidum propendet, seu copioso muco

conti-



continuo obducitur; sunt nempe mucidæ, salæ amaræ aliæve tenaces partium, culæ salivæ aquæ. *Pulsus* ita delineat *Pergamenus*: Anginæ pulsus tensione quadam præpeditus est & convulso similis, magnus & undosus, ut pulsus peripnevmonicorum: Quicunque vehementer ex illis suffocantur, habent parvum & rarum; ubi jam agunt, crebrum & inæqualem. Febris quoque adest, eaque plus minus acuta, prout velexquisita magis, vel notha est angina. In illa acuta in hac subinde lenta conjuncta esse solet. Interim quæ pars magis laboret, an Pharynx, an Larynx, ex læsionibus respirationis, item deglutitionis & situ doloris perscrutandum venit.

## TONSILLARUM

*inflammationibus* occasione lymphæ vitiatæ, spissioris sc. & acidæ acioris concitatis, febris continua sed magis lenta est junctæ, fauces quidem rubent, sed minus inflammatae sunt, tonsillæ verò tumidæ insigniter prominent & cum naturaliter habeant foramen amplum in summitate sui, tunicaq; crassa eas cingens, foramine aperto in fauces perforata sit, adeoque hiet & hinc à dictis glandulis excernatur lymphæ salivæ glutinosior in fauces & gulam; Propterea quando Tonsillæ hæc sunt tumidæ, ac plus minus inflammatae, foramina hæc insigniter hiant & magis conspicua fiunt, ita ut imperitis Chirurgis pro ulceribus tonsillarum habeantur, observante hoc jam *Schenckio in obs. ubi de Tonsill.*

Imprimis in hac *Tonsillarum inflammatione* materia viscida, glutinosa & mucosa linguam & fauces incrustat, ac subinde tenacis pelliculæ instar eis adhæret, ac nil aliud est, quam lymphæ tonsillarum ac glandularum vicinarum vitiata ac impura reddita & glutinosa, à nutrimento dictarum partium chylosô, ob earum læsionem, non ritè assimilato ita alterata.

Inflammatio hæc dictarum partium nunc est *exacta* seu *genuina*, nunc non *exacta* seu *notha*.

*Exacta Angina*, aut quæ rarior est, tonsillarum inflammatio, est ex solo sanguine, adeoque ut vulgò dividitur, vel *sanguinea* vel *biliofa*: Acutum malum est, de quo hæctenus dicta fere intelligenda sunt. *Non exacta* est tantum tumefactio istarum partium plus minus œdematosa & excitatur ferè occasione lymphæ, glandulas dictarum partium malè afficientis, loca vicina rodentis, plus minus ex coriantis & ita junctam phlogosin inducentis; quæ ipsa vitiata lymphæ, prout plus minus circa dicta loca stagnat, etiam plus minus easdem tumidas reddit & circulationem sanguinis plus minus impediendo, aliqualem inflammatoriam dispositionem junctam habet. Et talis *notha angina* frequentius occurrit cum tonsillarum inflammatione, quarum tumor crebrius occasione vitiatæ lymphæ supervenit. Nunc febris expertus est hæc *notha*, nunc lentam

tam saltem ju  
que satis per  
rara Angina  
Porro eveni  
fans, junctæ  
saltem fuit ill  
tabilis ista o  
in puero ita  
commorla

Quo  
nes, in spec  
sunt vel int  
nem mereri  
plus minus  
ciens & ita p  
& transitum  
flammationi  
& vicinarum  
contingit,  
consta, nu  
solet, h. e.  
ordinarie  
anginas dis  
partes, quæ  
tur, facile e  
tali occasio  
non brachi

Per  
pravè cura  
ritidem,  
Monice de  
E  
faucibus h  
pungendo  
sivas inflan  
frustulis vi  
notarunt F  
Paris



tam saltem junctam habet. Et de hujusmodi *Angina notha*, seu *alba* dicta eaque satis periculosa vid. *M. A. N. C. Ann. 6. p. 218.* Pertinere huc videtur rara *Angina* quasi *membranosa* species, quæ vid. in *Misc. A. N. C. Ann. 2. p. 31.* Porro evenit interdum, ut *Epidemicum* malum sit *Angina*, simul in plures grassans, juncta cum febre continua, plus minus ardente eaque malignâ, qualis non saltem fuit ista, quam tractat *Bartholin. de Angin. Epidemica*; sed & facit huc notabilis ista observatio *Panaroli Pentec. 5. obs. 10.* de *Angina maligna epidemica* in puero ita contagiosa, ut parùm mordendo digitos obstetricis, mox in parte commorata carbunculus excitatus fuerit, eaque simul angina correpta.

Quoad *causas*, præter *generales* inflammationibus quibusvis communes, in specie earum, quæ faucium ac partium vicinarum inflammationem inducunt, sunt vel *interna*, vel *externa*. I. *Internas* inter primariam sui considerationem meretur *lympha* vitata, acris, aut speciatim sapore vitioso inquinata, simul plus minus glutinosa, glandulas dictarum regionum plures vel pauciores afficiens & ita partim irritando, partim infarciendo, sanguinis naturalem motum & transitum per & citra glandulas impediens: Ac fanè hæc creberrima inflammationis tonsillarum videtur origo. Sicut aliàs *lympha*, per glandulas oris & vicinarum partium excreta, nimis salia vel acida, ut in affectibus catarrhalibus contingit, acrimoniâ suâ rodendo & plus minus excoiando loca circa fauces confita, nunc graviolem, nunc leviolem inflammatoriam dispositionem inferre solet, h. e. calorem, ruborem, dolorem, cum aliquali subinde tumore. Ulterius ordinariæ sanguinis evacuationes suppressæ, imprimis mensium suppressio, ad anginas disponit, isto nempe in casu, quando jam istæ, quæ fauces affirmant, partes, quâvis occasione prægressæ, debilitatæ sunt & ita robur inæquale patiuntur, facile exinde à sanguine stagnante inflammari possunt. Unde mulieres, ex tali occasione subinde pleuritidi, it. Anginæ sunt obnoxie & V. S. in pedibus, non brachiis, levandæ.

Pertinet huc morbi unius in anginam transitus; quâ ratione, dysenteria pravè curata, aut intempestivè suppressa, præsertim epidemica, uti crebrò pleuritidem, ita in specie anginam infert, qualia exempla non tantum recenset *Monice de fluxu dysenter. c. 5.* sed & *Hildan. Tr. de dysenteria*.

*Externa causa* crebriores, sunt in specie res ineptè deglutiæ, quæ in faucibus hærent, & vel nimia mole eas angustant & ita vasa comprimunt, vel pungendo, aut acrimoniâ irritando, ad fibrarum contracturam & hinc ad successivas inflammationes disponunt. Sic à spina piscis in faucibus hærente, item ex frustulis vitri devoratis & faucibus infixis, inflammationes & tandem abscessus notarunt Practici. Ex potu *aqua fortis* & similium liquorum corrosivorum, in-



inflammatas non raro esse fauces & gulam, res per se nota est. Imprimis inspirata, immediatò contactu hæc loca irritantia, multum conferunt. Hinc subitaneum frigus inspiratum, aut potus nimis frigidus post nimiam ac intensam corporis incalcescentiam, lædendo fauces & sanguinem, per hæc loca circumstantem, alterando, inflammationes inferunt. Ex simili sed singulari inspiratorum vitio, epidemicè oriuntur hæc mala, cum non saltem minima morbosum inspiratum in sui transitu fauces naturaliter læserit, & acrimonia occulta, tanquam tot infixæ spinulæ eas irritaverit, sed forsan etiam sanguinem certò modò alterando, hunc ad facilem sui stagnationem, quin & febrilem malignam fermentationem disposuerit. Ad *externas* has causas pertinet etiam inunctio & rialis pro cura luis & reæ, quæ ineptè instituta, ab acrimonia caustica & rii, fauces vellicante, in liquore lymphatico corrosivo easdem rodente, subinde graves faucium inflammationes, interdum suffocationes infert. Sane luis & reæ virus acre, ut speciatim lympham glandularum conglomeratarum inficit, ita & hujus ratione sæpissimè excoitationes ac inflammationes faucium, subinde perquam contumaces infert, id quòd vulgò vocant, *auffgelauffene Hälse*.

Vulgò referunt multa de luxatione vertebrarum colli, quod nempe hæc ipsa etiam anginam inferat, idque occasione *aphor. 35. sect. 4. Hippocr. Si febre detento repente collum intorqueatur, ut vix deglutiri queat, nullo tamen tumore intus vel foris apparente, lethale est*: Ordinariò, inquiunt, ob luxationem vertebrarum. Sed nota est structura vertebrarum colli & quod talis aphor. hujus explicatio nata sit ex falsâ hypothesi, cum non angina ex luxatione vertebrarum colli nata, sed convulsio emprostotono similis intelligenda sit. Nam quod non possit fieri talis angina ex luxatione vertebrarum colli & cervicis, facile patet, cum non luxentur nisi summa vi, quâ necessariò deprimi debet spinalis medulla, unde abolitio sensus & motus mortisque appropinquatio, unde potius affectus apoplexiæ similis, quam angina sequeretur; sunt enim vertebrarum cervicis processus ita invicem inarticulati, ut citra fracturam luxari nequeant & si luxarentur, præsentaneam potius mortem, quam anginam inferrent.

Quoad *prognosin*, hæ inflammationes tribus modis finiuntur; aut enim evanescunt & retrocedunt subitò, aut discutiuntur aut suppurantur: Et si suppurantur, in specie tonsillarum inflammationes, abeunt interdum in ulcera diuturna & difficulter sanabilia. Quod si ex dictarum partium inflammationibus ægrum mori contingat, suffocatus interit. Rarum est quod critico quasi motu per hæmorrhagiam curentur eadem; refert tamen *Forestus lib. 15. obs. 14*. Cynanchen veram, quarto die, per fluxum mensium criticum curatam. Si angina tumore & rubore foris apparente subitò intro evanuerit, malum, nisi critice discussa fuerit, nam inflammatio ad interiores faucium partes recurrendo, suffocatio-

focationem in  
Amatus Lufi  
observat. N  
tis; vel ad pu  
pe, vel ad alia  
Pertinet

fit conversio,  
Aphorismum  
teria aspera c  
membranam  
tiam & prav  
tra 7. dies.  
monia, aut  
terdum rupt  
vid. *Forest. lib.*  
interdum typ  
producta, seu  
est lethalis.

Quo m  
circa collum,  
partes sunt o  
um gravissim  
parasyneche  
apparens, let  
do cum tali c  
si in hypoche  
augmentum

Cur  
Inflammationi  
sunt gargariz  
rum, uvula  
quibus junct  
Ut ita

I. Int  
matione, spe  
diaphor. *salia*  
3). cum ol. an  
quædam ser



focationem infert, aut alio in loco inflammationes periculosiores concitat. Sic *Amatus Lusitanus Cent. 5. cur. 37.* periculosum anginae in pleuritidem transitum observat. Nam vel ad cerebrum transfertur, unde cephalalgia, deliria, phrenitis; vel ad pulmones, unde peripneumonia, pleuritis; vel ad cor, unde syncope, vel ad alia loca, unde varia mala.

Pertinet huc *Aph. 10. sect. 5. Hippocr.* quibus ex angina in pulmonem mali fit conversio, intra 7. diem moriuntur. Si vero hos effugiant, empyici evadunt. *Aphorismum* hunc optime explicat *Lindannus*, nempe ea Angina, quae est in arteria aspera circa laryngem, si suppuretur, ut magna parte fit, si contingat eam membranam, quae succingit arteriam asperam, per materiae suppuratae turgescentiam & pravitatem rumpi, ut metastasis materiae fiat in pulmones, intereunt intra 7. dies. Inflammatur enim ab hoc materiae decubitu pulmo, hinc peripneumonia, aut suppuratur pulmo, unde empyema. De caetero etiam evenit, ut interdum rupto abscessu pus ad pectus ruat, unde interdum suffocantur agri. vid. *Forest. lib. 15. observ. 25.* Febris cum angina conjuncta saepius est continens, interdum typum tertianae continuae repraesentat; interdum est tertiana continua producta, seu cujus paroxysmi 36. horas durant, & haec angina ut plurimum est lethalis.

Quo minus oculis se sistit tumor, tam intra fauces, quam extra, nempe circa collum, eo majus imminet periculum, quia internae laryngis & pharyngis partes sunt obsessae: Certè interna talis inflammatio paucis est tuta, unde omnium gravissima est *cynanche*, hinc *paracynanche*, levior est *synanche*, levissima *parasyranche*. Sicut strangulatis & suffocatis, ita & anginosis spuma circa os apparens, lethale signum est, teste *Hippocrate sect. 2. aph. 43.* idq; imprimis quando cum tali circa os spuma magna, adsit respirationis angustia insignis. Pariter si in hypochondriis vel cruribus dolor excitetur & angina non solvatur, morbi augmentum innuit.

*Cura* in omnibus est eadem, quoad remedia interna, cum reliquis inflammationibus. Externa vero specialem merentur considerationem, qualia sunt gargarismata, inunctiones, cataplasmata & similia, in faucium, oris, tonsillarum, uvulae & similium partium inflammationibus quae applicari solent, de quibus junctim.

Ut ita recte curentur Anginae ac cognatae inflammationes, observandum

I. *Interne* in angina omnia ea convenire, quae alias in omni inflammatione, speciatim in pleuritide, sunt in usu v. g. *mixtura simplex, dens apri*; & *diaphor. salia volatilia* &c. Sic *Valeriolus obs. 12. l. 2.* refert quod *rasura dentis apri 3j. cum ol. amygd. dulcium* propinata sit optimum remedium anginae: In specie quaedam *stercora animalium*, quae *Paracelsus* & *Hartmannus* insigniter commendant,



dant, interno & externo usu dicata sunt anginis, v. gr. *stercus equinum*, ejusque expressus succus, expectato sudore, in anginis est nobile remedium, id quod etiam de *stercore canis* 3j similiter affirmari debet; sanè hæc & similia remedia, cum debito sudore administrata, in paroxysmo Anginarum, & quamdiu ægri deglutire possunt, multum opis adferunt. Conveniunt ergò omnia acidum internè infringentia, sanguinem dissolventia & mediante sudore partes abstergentia; cum quibus

II. Si ita visum fuerit, mox ad *venæsectionem* accedendum erit, & quidem *saphæna*, pro revulsione universali, postmodum *in brachio* alterutro vel utroque pro revulsione particulari, & denique *sub lingua*, in statu, propter derivationem. Has inter nunc una, nunc plures requiruntur venæsectiones & quidem sub vitio mensium, vel hæmorrhoidum cum angina juncto, necessariò vena in pede secanda venit. Venæsectiones hujusmodi nunc una, nunc plures juvare interdum equidem videntur, cæterum ipsis solis fidendum non est, quoniam sæpius ægri, quando videntur meliores, subito intereunt, quod vid. in *Barbette Praxi*. Venæsectio hæc pro varietate subjectorum ac circumstantiarum interdum repetenda, interdum plures instituendæ, prout corpus vel juvenile, vel senile, prout plethora major vel minor, prout effervescencia febrilis impetuosior vel remissior, prout patiens sanguinis detractionibus magis vel minus adsuetus fuerit. Quidam suadent sectionem venarum jugularium, quam commendatam ac illustratam vide in *Riverii Praxi*, it. *Bartholin. de angina puerorum epidemica*. Verùm subinde est periculosa, nec nisi experto peragenda Chirurgò. Venæsectio sub lingua tantummodo in statu morbi convenit, quando jam inflammatio nullum capit amplius augmentum. Secantur *raninæ* quoniam per has naturaliter solet refluere sanguis, qui in locis vicinis stagnando, inflammationem infert. Interdum sola hæc sectio venarum raninarum præcavet angustiam ita, ut, dum sentitur angina principium, harum incisione maturè malum removeatur, eo scil. in casu, quo corpus non nimis est plethoricum, atq; adeò, quando non est conjuncta cum nimia effervescentiâ febrili, sed quando tantum oritur ex impedimento aliquo, sanguinem in suo fluxu impediante. Alias non nisi in angina statu utile erit illas secare. Prognosis ex modo, quo sanguis sectis venis raninis effluit, vid. in *M. A. N. C. Ann. 3. p. 376*. Nempe si apertæ parùm vel nihil stillent sanguinis, pro malò, imò lethali signò habetur.

III. In tonsillarum ac quibusvis partium oris, anginis, præter quæ in genere circa omnes inflammationes observantur, semper simul lymphæ habenda est ratio, quæ nimis crassa, interdum simul acida aut alio modo vitata, per medicamenta interna *aniciata* *arbutalia*, *succinata*, *myrrhata* it. *volatilia* & *absorbentia*, ac similia corrigenda & emendanda.

VI. In

IV. In  
specifica ma  
turè ejiciatur  
tiffimè institu  
pramisso fe  
autem sibi  
corripiantur

V. I

v. g. ab H  
ulus fuit; C  
Verum &  
Praxeos est  
quibus con  
In principio  
Lindanus, u  
triculo, qua  
& fances, ul  
tur, se lapo  
quali erolio  
subito Ang  
juxta vim e  
hypochond  
ligna & q  
principio p  
idem vom  
propter ang  
aperiti scalp  
spontè, men  
ubi alias p  
est vomitu  
per superio  
atum, qu  
possint sen  
plicanda,  
ad vomitu  
VI. In  
ferim illa,  
recidivat,



IV. In Angina maligna ac ferè epidemica nil attendendum prius, quam ut specifica malignitas ista corrigatur & per *diaphoretica*, junctis *opiat*, maturè ejiciatur. Et tali in casu non habent locum venæsectiones, aut saltem cautissimè instituantur, uti nec purgationes, nisi in summo principio; quin potius præmissio ferè clysmate, solis diaphoreticis appropriatis insistendum. Caveant autem sibi Medici ab halitu ejusmodi ægrotorum, ne & ipsi ab hac malignitate corripiantur, cum ferè admodum contagiosa esse soleat.

V. In Angina cura *Vomitiva* à multis insigniter commendantur, v. g. ab *Hartm. in Praxi Chimiatri*. & *Rulando*, qui sæpius cum fructu iisdem usus fuit: Confer quoque *Riverii centur. 2. obs. 10. & 24. it. Cent. 4. observ. 60.* Verum & laudem & vituperium merentur. Legitima ergò occasio, quæ omnis Praxeos est anima, observetur in vomitoriorum usu. *Uno enim sunt tempora*, in quibus conveniunt vomitoria, nempe aut *principium* aut *periculosissimus status*. In principio morbi admodum conveniunt vomitoria. Fit enim sæpe, ut dicit *Lindanus*, ut angina habeat occasionem ab æruginosa bile in primis viis & ventriculò, quando illa bilis subtilia & morficantia effluvia mittit ad œsophagum & fauces, ubi ipsorum stimulo fit inflammatio & angina. Si igitur æger testetur, se saporem sentire æruginosum, acrem rancidum & titillationem, seu quasi erosionem, ibi protinus in initio oportet dari vomitorium, siquidem tunc subito Anginam tollit, ac convenit tunc in specie *▽ benedicta Rulandi*, quæ juxta vim emeticam etiam interdum sudorem movet: Ita quando gravitas in hypochondriis sentitur, vomitoria itidem conveniunt. Præterea in Angina maligna & quæ per contagium afficit ægrum, optimum est consilium: mox in principio propinare vomitorium. Post primum etiam principium, conveniunt itidem vomitoria *in statu periculoso*, quando jam scilicet facta est suppuratio, sed propter angustiam & ineptitudinem loci, aut profunditatem situs, non potest aperiiri scalpello, quin potius ex tumore immineat suffocatio, aut si aperiatur spontè, metus est, ne in pulmones irruat, ægrumque suffocet. In talibus casibus, ubi alias pauca sunt auxilia, ut aperiatur abscessus vi, ultimum igitur refugium est vomitus, qui concutit abscessum, jam maturatum rumpit, eoque rupto pus per superiora evacuat. Periculosum equidem videtur remedium, satis tamen tutum, quod est unicum, inquit *Celsus*. Et licet medicamenta vomitoria non possint semper deglutiri, nihilominus tamen vel pluma illis imbuta, linguæ applicanda, aut *℞ ins vite melle* exceptus faucibus applicandus. His enim modis ad vomitum provocatur stomachus.

VI. In Tonsillarum inflammationibus, sæpius subinde recurrentibus, præsertim illa, quæ ex lymphæ vitio, v. g. scorbuto aliove simili habituali crebrius recidivat, præsertim ubi ætatis aut aliarum circumstantiarum ratione à priori



malum non bene curabile existit, *fonticulus* brachio inustus convenientissimum est consilium præservativum. Sæpius enim evenit, ut qui semel in quadam parte inflammationem suppuratam fuerunt passi, & forsan fermenti ulcerosi aliquid residuum manserit & facili occasione ex irritatione undecunque factâ, præsertim in corpore cacochymico mox recidivet inflammatio, idque facile in locis glandulosis; quibus in casibus pro palliativâ curâ fonticulus videtur convenientissimus.

VII. Non confundenda sunt inflammationes aliæque faucium partiumque vicinarum tumores, seu à sanguine, seu ab aliis contentis excitentur, cum *Prunella*, isto nempe linguae & faucium symptomate, quod in febribus acutis, ac in specie castrensis seu Hungaricis familiare est. Ut plurimū hoc evenire solet, ut de *Angina* tractantes Practici, remedia contra prunellâ usitata simul consignent, facile cum legentis confusione. Et talia *prunella* dicata, sunt in specie remedia ex *S. semper vivo maj. prunella, mucilag. sale \**, nitro, butyro, lardo &c. quæ ipsa minus anginis, nisi aliis temperata, vel cautè applicata, convenire possunt.

VIII. Remedia ipsis partibus inflammatis, faucibus, tonsillis &c. applicabilia, uti sunt gargarisationes, litus, unguenta cataplasmata & emplastra, eo debent esse directâ, ut (1) resolvant & discutiant sanguinem stagnantem & inde natam inflammationem, & talia sunt blanda incidentia seu penetrantia, volatilia &c. Quod si hoc fieri nequeat, (2) suppurationem adjuvent, uti sunt temperata & emollientia. (3) Maturatum abscessum aperiant, eadem spirit. acriora aut acrioribus mista; Ita auxilia *Chirurgica*, aut deniq; *vomitiva*. (4) Apertum abscessum purificent & consolident, vulneraria & adstringentia. (5) Partem restitutam denovo firment, ac naturalem tonum ejus restituant, nempe adstringentia. Equidem ratione vulgaris medendi methodi, in principio ferè adstringentia usurpantur, nunc sola, nunc cum discutientibus mista, ut nempe internè partibus oris & faucium nonnihil adstrictis, nimium tumoris partium internarum incrementum præveniatur. Sed quam præposterè hoc fiat, ex doctrina *repellentium* manifestum, ac præterea periculum est, ne hujusmodi adstringentibus superiora saltem loca proximè stringantur, inflammatio autem partium inferiorum & internarum sic intendatur, ut rectè *Sylvius* monet l. 1. prax. c. 44. th. 58. it. *Deckerus* in comment. in *Barbett.* p. 57. Adeoque talia potius in fine mali conveniunt.

Gargarisationes quod attinet, equidem suspectæ esse possunt hæ ipsæ, quoniam partes inflammatas nimis agitant, adeoque inflammationem saltem, doloris ratione, sic intendant: Sic in anginosis nihil molestius est, quam gargarizare, cum propter luctam aëris cum aqua gargarisando in angustis faucium labor, motus, dolor, inflammationem potius augeant & exasperent. Hinc ergo in progressu morbi *Lindanus* tales suos ægros nunquam jubet gargarizare, sed de gargariz.

garisate u  
mere ibi pau  
melius, quai

Ren

sunt primo, g  
veronica, or  
farina, anel  
vel cum sul  
passula, jun  
rum, cui po  
ficuum est.  
mentario C

Huc pertine  
Chym.

Ubi vici  
tul. 3. ad 3. j.  
colatura sac

Modern

ac similia vo  
vini usum m  
affecta, aliâs  
etiam, quod  
emissa, garga  
fert, quod v  
dum, ut cal  
oder Strum  
& vaporibus  
tile quo abun  
resolutione eff



garismate unum alterumve cochlear in ore tenere, ad fauces depellere & retinere ibi paulisper sine agitatione & sic per cavum oris refundere, id quod fit eo melius, quando aeger simul resupinatò jacet corpore.

**Remedia** igitur, ad anginas ac cognatas inflammationes conducentia, sunt primò, quæ resolvunt & discutiunt, qualia s. sambuci, chamom. menth. salvia, veronica, origanum, hyssopus, scabiosa, semen lini, fenugraci, fabarum harumque farina, anethum, cuminum, sem. sinapi, rapa, rad. liquir. croc.  $\theta^*$ . nitrum crudum, vel cum sulph. fixatum, acet. sambuci, oxymel, spiritus vini, urina, salia volatilia &c. passule, juba, cepe; ex quibus variæ possunt fieri formula, v. g. decoctum raparum, cui parum salis armoniaci, aut in gravi ardore, nitri parum additum sit, proficuum est. It. Gargarismus Sculteti, revera polychrestus, quem vid. in Armentario Chirurg. p. 32. it. in River. Cent. 9. obs. 76. v. g.

R. Aq. plantagin. ℞ss.

aceti vini ℥j. ad ℥i℥.

sacch. alb. ℥j. ad ℥i℥.

pulv. sem. sinapi ℥j. M. quo calidè gargarisetur os.

Huc pertinet etiam polychrestus iste gargarismus Hartmanni c. 8. th. 3. Prax. Chym.

R. Florum malvæ hortens. l. arbor. Mj.

ros. rubr.

herb. prunell. veron. salv. an M℞.

rad. polypod. querc. ℥ij. ad ℥℥. coq. in  $\nabla$  communis ℞. iv.

aceti vini ℞ss. ad casum transversî pollicis, cum levî expressione.

Ubi viscidior mucus, præsertim in tonsillis inflammatis adfuerit, sem. sinapi contus. ℥j. ad ℥ij. simil. decoqui poterit, sicuti ubi acrior videatur talis gargarismus, colaturæ sacch. ℥j. vel ℥ij. aut mellis q. s. addi potest.

Moderni, speciatim Deckerus super Barbett. spiritum vini, item  $\theta^*$ . ac similia volatilia gargarismis addere jubent. At sanè existimo, spiritum vini usum maximè conferre, ut & salum volatilium tantum, quantum partes affectæ, aliàs admodum dolentes, perferre possunt, idque confirmat hoc ipsum etiam, quòd in inflammatione & tumore tonsillarum urina, calida propria, modò emissa, gargarisationis loco adhibita, optimè prodesse dicatur. Et Lindannus refert, quod vulgus contra tonsillarum inflammationem familiare habeat remedium, ut caligas glandulis apponere soleat, die innere Sohlen der Schuhe oder Strümpfe &c. Sic resolvunt tumorem: Ratio est, quia scàtent sudoribus & vaporibus pedum, in quibus est vis digerendi & resolvendi, propter sal volatile quo abundant Ex quibus clarum fit, volatilia pro inflammationum harum resolutione esse optima. v. g.

R. Herb.



℞. Herb. hyssopi  
 flor. sambuci  
 chamomillæ  
 herb. melilot. aa Mj.  
 passul. min. ℥ss ad ℥vj. coq in f. q. aquæ simpl.  
 Colat. ℞. ℥j. ad. ℥iij. adde  
 spiritus vini ℥i. ad. ℥iij.

vel hujus loco, spir. salis armoniaci ℥j. M. pro gargarismo.

Vel in decocto quodam diluto dissolvatur q. f. *thiari. & salis armoniaci*, ut ita  
 sui juris fiat volatile, ac ita penetrare queat, addito pro temperanda volatiliū  
 acrimonia, aut *melle rosato*, aut *syrupo viol.* aliove simili temperante.

Sic pariter *externè* pro hoc scopo intervenire poterit *litus*, qui

℞. Ol. amygdal. dulc. ℥j.

spiritus salis armoniaci q. f. pro consistentia linimenti extrinse-  
 cus locis tumentibus calidè crebrius illinendi; Vel *exterebinth.* cum *sale volatili*  
*urine aut ❖ci malax.* & hinc cum *unguento dialib.* aut *emplastro de meliloto*  
 mista. Vel

℞. Ungu. dialth. compos. ℥ij.  
 ol. chamomill. ℥ss.

philosoph. ℥ij. M. fiat litus *externè* applicandus.

Vel ℞. Empl. de melilot. q. f. malax c.

oleo destillato succini, aut ceræ & ita pro scopo  
 dissolvendi imponatur.

*Cataplasma ex absinthio confuso & cum pinguedine porcinâ misto*, est egregium,  
 quo solo *Rulandus* anginam curat.

*Sequuntur* ea, quæ *emolliunt & suppurant*, cum quibus semper asperita-  
 tem faucium & dolorem ardentem ac rodentem mitigantia socianda veniunt.  
 Conveniunt igitur temperata quævis, *althea, malva, melilotus, carica, passul.*  
*viol. lil. alb. mucilag. seminum & radicum. ungu. dialth. Emplastr. de meliloto, de-*  
*coctum hordei, lac, oleum amygdalarum d. butyr. vitell. ovor pingued. capon. hu-*  
*man. porcin. anserina, cepæ, vidus hirundinum cum stercorebus*, optimum pro o-  
 mnibus & quasi universale, tam discussioni quam suppurationi inserviens, ubi  
 & talia quævis *stercora*, in specie *album græcum &c.* conveniunt: Illa ipsa enim  
 quia multum *salis armoniaci* quasi *nitrosi* continent, propterea plurimis scopis  
 satisfaciunt. Hinc

℞. Rad. glycyrrhiz. ℥ij.  
 herb. malv. Mj.  
 chamomil.  
 melilot. an. Mss.

ficuum

adest æstus, ip-  
 rismae.  
 Item fa-

horis repeter  
 in inflammat  
 gis dolorem  
 ex nido hiru  
 v. g.

in lacte & a  
 vel  
 porci q. f. in  
 Vel

Quod si n  
 inflamm  
 neribus co

Vide Cata  
 Par



ficuum pinguium incis. no. ij  
 albi græci ꝑ. coqu. in f. q. ∇ simplicis vel feri lactis, ubi minor  
 adest æstus, ipso lacte cum aqua misto, ubi est nimius dolor; M. pro Garga-  
 rismate.

Item faciunt huc *cataplasmata*, qualia communiter fiunt ita :

℞. Medullæ panis tritic. ℥. 3.

rad alth.

lilior. albor. an. ꝑ. j.

semin. lin ꝑ. j.

fœnu græc. ꝑ. coqu. ex lacte ad consistentiam pultis;  
 trajiciantur per setaceum, adde

ol. amygdalar. dulc.

lil. albor. an. ꝑ. j.

butyr. recent. non salin. ꝑ. j.

croci ꝑ. j.

vitell. ovor. no. ij. M. applic. pro cataplasmate omnibus 24.

horis repetendo. Temperata enim hujusmodi temperant acrimoniam salium  
 in inflammatione suppurante effervescentium & quo magis temperant, eo ma-  
 gis dolorem minuunt & suppurationem promovent. Præ cæteris *cataplasma*  
*ex nido hirundinum* & *albo græco* convenit :

\* v. g. ℞. Nidi hirundin. no. j.

stercoris canin. alb. Mj. coq. in vino vel, quibusdam in casibus,  
 in lacte & applicentur in forma cataplasmatum.

vel ℞. Nid. hirundin. cum stercore, pistetur cum melle & axungia  
 porci q. f. inspergendo *album græcum*, ut fiat instar *emplastri* mollioris.

Vel ℞. Nidi hirundin. no. j. adde

herb. malv. alth. an. Mj.

flor. chamomillæ, sambuci an. Mij.

farin. hordei, fabarum an. ꝑ. j.

croci ꝑ. j.

chamomill. ꝑ. M. calefiant, ut instar cataplasmatum applicentur.

Quod si non sanguis purus, sed magis pituitosus, seu chylo magis temperatus  
 inflammationem excitaverit, pro hoc melius dissolvendo commodè *cepe sub ci-*  
*neribus cocta* addi possunt. v. g.

℞. Nidi hirundin. no. j.

flor. sambuci Mj. capar. sub cineribus coctar. no. ij. coque ex  
 cerevisia tenui coctisque adde albi græci ꝑ. ol. lil. alb.

q. f. M.

Vide *Cataplasma Myns. de nido hirundinum in suo Thesauro, section. ultim. p. 520.*

Pars II.

It.



It. Pauli Lutheri in Sennert. ubi de Angina; it. Barbettum in sua Chirurgia, ubi de inflammatione, in specie de angina.

Quod si maturatus fuerit abscessus, aperiendus venit, quod fiet, si internè illinatur abscessus melle c. albo græco probè permistò & subactò; vel mel cui tantillum salis armoniaci admistum est, commodè, quantum doloris patitur ratio, illiniri potest. Vel mel cum cinere hirundinum subactum, illinatur abscessui; Item decoctum sem. sinapi ℥j. in hydromell. ℥j. à Sennerto de angina, laudatum, ad citò resolvendum, in suffocationis discrimine, admodum præstans habetur, & quidem si spontè his modis aperiatur, res est salva; quam apertionem scæritus, tussis &c. adjuvant. Sin minus, si attingi potest abscessus scalpello aperiendus & incidendus. Alii oleo vitr. abscessum attingunt, sicque citò rumpi ajunt; aliis irritis ad vomitoria accessus faciendus est.

Quod si suffocationis immineat periculum, aut modis hisce nec tumor, nec abscessus removeri aut aperiiri queat, ne suffocetur ager laryngotomia, auxilium ferè tutum, administrari potest, de qua vid. Chirurghi Practici.

Aperto abscessu quarto loco ulcus mundificandum & consolidandum; pro quo scopo decocti hordei ℥j. cum mellis rosati ℥ij. vel iv. sufficit. Vel decoctum veronica cum melle: item decoctum plantagin. & fol. quercus cum melle conducunt, quibus in contumaciore ulcere spiritus vitr. parum, quantum saltem ad blandam aciditatem necessarium est, addi potest; Utut probè observandum sit, quod sordida ac contumacia tonsillarum ulcera, ordinariò ferè pro fundamento habere soleant luem veneream. Vel,

℞. Herb. prunell.

veronic.

salv.

rad. pol. q.

liquirit. an. ℥ij.

aluminis crud. ℥j.

mellis rosat. ℥j. coqu. in f. q. aquæ simplicis: Colaturâ utatur pro gargarismo mundificante.

Quod si propter latentem scorbutum ulcera talia faucium sint contumaciora, optimum est, si mel rosaceum imprægnetur cum spiritu salis bene rectificato q. s. ad suavem acescentiam, quo ipso multa præstari possunt in faucium & oris exulcerationibus.

Quod si sordidiora sint ulcera, ad aruginem recurrendum est; nempe vel ad aquam viridem Plateri, aut Hartmanni, quam vid. in eius Praxi Chym. c. 52. lib. 4. & s. Quibus ipsis attingantur ulcera penicillo & hinc vel gargarismus vel litus cum melle rosaceo instituat, vel horum loco recipiunt Chirurghi ungu. Aegyptiacum, subigunt c. melle rosaceo, ita ut acrimonia ejus sic nonnihil temperetur.

Hoc

Hoc ipso cum  
jam ad gangra  
veronica cum m  
datur. Vel

Denique  
tum ex herb  
nucum q. s. p  
porui temper  
citantium ac

Quoad  
in medic. mili  
prodest abster  
cum decocto flo  
niaci; sin vero  
perovivi recens  
genda lingua  
actum cum

Propt

quas in infan  
lis excoctio  
ac ventriculi  
squamula re

Aph  
quæ successi  
acrioribus  
ventriculi,  
Hanc si Me  
Utut autem  
pe d saliva co  
in imis fauci  
incrustare sc  
cant humor



Hoc ipso cum penicillo attingunt & mundificant ulcera, præsertim sordida, aut jam ad gangrænam declinantia. *Consolidat* postmodum talia ulcera *decoctum veronica cum melle*, quod eo potentius est, si de *alumine* aliquantulum simul addatur. Vel

℞. Rad. ireos fl. ℥iij.

myrrh. e'ect. ℥ss.

alumin. ust. ℥ij.

mellis rosar. ℥ij. M.F. linimentum ulcera mundificata consolidans; *conf. Timani in cas. l. 2. cas. 1. p. 78.*

Denique si necessarium fuerit, ad partes cum vino roborandas, fiat *decoctum* ex herba *prunell. plantag. & florum rosarum in vino decoctis*, quibus adde *dianthum* q. s. pro gargarismate blande adstringente. Interea toto morbi decursu potui semper *nurum depuratum*, aut *antimoniatum* addatur, seu optimum febricitantium ac impense sitientium ægrorum auxilium.

Quoad *Anginam notham*, a *ias albam*, optimè hanc pertractat *Mindererus in medic. militari* p. 109. & seq. Nempe ubi lentor viscidus obsidet linguam, prodest abstergio faucium, mediante linteo cum aceto & fiat postea gargarisatio cum *decocto florum ligustri in aqua, cum paucis aceto*, addita particula *salis armoniaci*; sin vero *aphthæ* adsint, loco *salis armoniaci* addatur *alumen*; *succus sempervivi recens, acuat* cum *sale armoniaci*, etiam loco *aceti* utilis est pro abstergenda lingua. Purificato ore idem inungi potest cum *rob nucum*, vel *diamor*, subtractum cum paucis *melle rosar.*

Propter materiæ affinitatem consideremus

## APHTHAS

quas in infantibus vocant, *die Schwämme*/ quæ nihil aliud sunt, quam aliqualis excoriatio aut levis exulceratio omnium oris partium, subinde & œsophagi ac ventriculi, id quod patet tunc in rejectis excrementis, cum quibus sæpius squamulæ rejiciuntur, seu leves quasi crustulæ.

*Aphthæ* succedunt ferè febribus ingentibus & æstuosis suntque pustulæ, quæ successivè in ulcuscula abeunt, & in febribus ingentibus his excitantur ex acrioribus humoribus, & ferè istis febribus superveniunt, quæ homines crudi ventriculi, seu qui sunt æruginosis seu porraceis recrementis referti, corripiunt. Hanc si Medicus evacuare in tempore neglexerit, *aphthæ* necessario sequuntur. Utur autem ventriculus purus sit, nihilominus interdum *aphthæ* oriuntur, nempe à saliva corrupta, à falso & acri humore. Quæ à ventriculo initium capiunt, in imis faucibus observantur; quæ vero ab ichore salivali corrupto, plerumque incrustare solent linguam, quæ tunc fit arida, pallida, viscosa & varia, prout peccant humores: Pessimæ sunt, quæ ex ventriculo non purgato veniunt. Torum



enim ductum per gulam usque ad fauces obsidere solent. Optimæ sunt albæ, flavæ, candidæ, fungosæ, molles, quando instar flocci videntur tumere. Sed quando sunt glabræ, viscidæ, subsidentes, compactæ, tales significant morbum periculosum & diuturnum; In inflammationibus discere possumus naturam aphtharum benignarum, quæ fiunt ex corruptione lactis; raro namque non corripitur infans aphthis primis 7. diebus; Nihil autem melius, quam lac ipsum præbere, inde enim absterguntur, modicè humectantur & molliuntur; sunt & aphthæ rubræ & molles, prioribus deteriores, lividæ, virides & nigræ, omnium pessimæ. Malum signum est, non facile coqui, emolliiri, humectari & longo tempore siccæ, aridæ, compactæ, planas, æquales manere & quando diutius durant, tanto pejus est. Longum morbum significant aphthæ, quæ intra triduum veniunt & abeunt: Has enim rursus sequuntur novæ, adeo ut sæpius succedere soleant & tanto futurus est longior morbus, quanto Medicus frequentius purgat. Nil enim pejus quam sæpe purgare, eo tempore quo aphthæ sunt. Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex sapore & singultu; qui toto morbi decursu non dormiverint, in soporem incidunt & tunc aphthæ prodeunt. Singultus accidit, si sunt ex ventriculo & tunc plerumque sunt deteriores notæ.

**Curatio** tota consistit in humectatione, quæ emolliat & leniter calefaciat. Cum vero aphthæ coctæ sunt, abstergere illas oportet vel spongiola alligata bacillo, vel linteamini; alterutrum intingi debet in decocto aliquo emolliente &c. Quando igitur lingua incipit exasperari, quod præcedit aphthas: *℞. fol. sedi majoris*, detrahatur pellicula ab utraque folii parte, hinc in *▽ rosarum* imponantur, ut humida ferrentur, postea imponantur linguae ad humectationem; pari ratione adhiberi possunt *folia portulacæ*, aut *mucilago sem. cydoniorum cum aqua portulacæ extracta*. Cum autem iam adsunt aphthæ, optimum est decoctum *raparum*, ex quo expressus succus imponatur linguae, humectat & abstergit. Si parum *salis prunellæ* vel *niri* addatur, ardorem simul restinguit. Vel

*℞. Herb. bellid. c. toto Mj.*

*ficum pinguium no. ij.*

*coqu. in ▽ communi, adde blis prunellæ parum, quo humectentur fauces & lingua sæpius.*

*In maxima siccitate ℞. butyrum recens insulsum*, misce cum saccharo cando rubro, ut fiat instar boli, teneatur in ore, emolliat, abstergit; addi potest pariter parum *salis prunellæ*. Quod si ulterius progrediantur aphthæ, degenerant in *ulcera oris* successivè depascentia, quæ ipsa *oris ulcera* etiam ex aliis causis nata, frequentius ferè curantur *abstergentibus* quæ inter est seq.

*℞. Herb. veronic. Mij. coqu. in l. q. aquæ simpl.*

adde

Decoctum sal.  
quali ignea,  
& plantag. m.  
ron, item dia.  
ori parum / p  
tim si scorbu  
aque virides  
Cent. 6. obs.

undecunqu  
Hartmanni  
ori commun

Sicut de his

seu relaxati  
mis tument  
uvulæ prola  
una cum gar  
sal decrepua  
salis commu  
rium alium

adfit, opti  
prus specifi  
colatum, p  
tormentilla  
modicò m  
va glandula



adde mellis q. s. & adhibeatur; addi etiam potest  
herb. plantagin. effectū eo meliori.

*Decoctum Satureje in vino* à quibusdam laudatur, sed suspecta, quia acris est, quasi ignea, potius prædicta conducunt; item *phlegma vitriol.* cum  $\nabla$  *prunell.* & *plantag.* mistum, egregium in ulceribus oris partiumq; vicinarum. *Rob diamor-*  
*ron,* item *dianucum* detergunt & purificant ulcera, quibus in malo contumaci-  
ori parum *spir. vitriol.* aut *salis rectific.* pro suavitate acidâ addi possunt, præser-  
tim si scorbuticum subsit vitium. In hujusmodi ulceribus gallicis optimæ sunt  
*aqua virides Plateri* aut *Hartmanni*, de quibus supra dictum; confer *& Hildan.*  
*Cent. 6. obs. 18.* Par ratio est

## UVULÆ EXULCERATÆ

Undecunque etiam natæ, in qua etiam hæc ipsa remedia, in specie *gargarismus*  
*Hartmanni P. C. p. 264. polychrestus*, commodè usurpari potest, qui in affectibus  
ori communibus & anginâ est præstans:

℞. Herb. malv. hortens. mj. flor. rosar. rub.

prunell. veronic. salvia aa. mß.

radic. polypod. quercin.

coqu. in aqu. portulacæ ℥iv. aceti vini  $\frac{3}{4}$  vj. usque ad casum  
transversi pollicis, postea colentur & colatura leniter exprimatur.

Sicut de his & cognatis oris ejusque partium malis vid. *cit. loc.*

## UVULÆ vero PROLAPSUM

feu relaxationem optimè curare docet & instrumentum singulare pro uvula ni-  
mis tumente abscindenda describit *Bartholin. Cent. 2. hist. 88.* Alias recentem  
uvulæ prolapsum curat *fermentum cum S. V. humectatum* & vertici impositum,  
una cum gargarismate & *decocto florum ligustri cum nitro* & *sale prunellæ*; item  
*sal decrepitatum cum pauco pipere* applicari potest uvulæ ita prolapsæ. Loco  
*salis communis* optimum est *sal armoniacum*, subinde uvulæ applicatum. *Spi-*  
*rium aluminis* commendant Alii; quod si simul

## UVULÆ INFLAMMATIO

adlit, optimum est *decoctum herbe aut radice taraxaci*; *suffitus succini* ore exce-  
ptus specificum est *Rulandi*. Vel *semen cannabis* in posca parum coctum &  
colatum, pro gargarismate adhibitum, est unum ex optimis remediis; vel *radix*  
*tormentillæ* & *uvularia herb. an.* coquantur in cerevisia secundaria & cum  
modicò mellis edulcorata, adhibeatur pro gargarismate. Nempe Uvula est par-  
va glandula in imis faucibus à palato pendens, laxa quadam membrana tecta, in



qua tanquam in sacco pendet. Non enim hâc tegitur, sed præter hanc, propriam membranam suam obtinet. Destillat ex illa glandula tenuis salivæ humor, sui generis, in membranam perforatam & per hanc in palatum; quoties autem materia est viscida, membrana oppletur & impeditur influxus, sicque fit laxitas & distensio membranæ, modo dictis corrigenda. Quibus si dolor ex irritatione aut dispositio inflammatoria exinde accedat, *diacodii Montani* parum modo dictis addi potest.

## INFLAMMATIO VENTRICULI.

*Inflammatur* porro *ventriculus*, ex causis iisdem in genere, quas reliquæ habent inflammationes: In specie, assumpta acria aut vitiosa interdum inflammationem ejus inducunt. Sic *Hildanus Cent. 1. obs. 34.* notat inflammationem ventriculi cum febre ardente & horrendis symptom. ex deglutita acicula; inflamatur rarissimè ventriculus integer, id quod est malum adeo furiosum, ut penitus sit desperatum; aut saltem unum alterumve ejus orificium ubi junctam febrem ardentem acutam habet, adest simul aliqualis tumor circa ventriculi regionem sub costis nothis admodum dolens, cum æstu ejusdem loci, siti inextinguibili, corporis jactatione & vigiliis. Nonnunquam succedunt deliria, nonnunquam convulsiones, nauseant ægri & assumpta ferè evomunt.

*Non confundenda autem est ventriculi inflammatio, cum inflammatione lobi hepatis*, super ventriculum ex parte protensi. Tumor enim proveniens cum dolore in situ ventriculi hoc indicat. Illud in hepate malum magis dolens tactui magis patens, magis circumscriptum, gravioribusque symptomatibus stipatum. *Malum est per acutum*, ex quo pauci evadunt. Quod si non evanescat, ad suppurationem tendit; Si aperiatur abscessus, melius est ut intra ventriculum aperiatur, sic enim per inferiora excernitur; sin vero extra peritonæum aperitur, malum: Pus enim peritonæum aut intestina inficere aliamve quampiam partem, & mediante gangræna ægrum interficere potest.

Quoad *curationem*, eadem medendi ratio est cum reliquis inflammationibus in genere; saltem in specie quoad *venæsectionem* cautio est adhibenda, ne plus sanguinis evacuetur, quam opus est. Solet enim affectum hunc syncope & virium summa prostratio, propter vehementem dolorem, insequi. *Purgatio* in principio non est adhibenda, irritando n. ventriculū magis malum exasperat; Clysmata tamen convenienter injici possunt, *vid. Forest. l. 19. obs. 31.* *Interne* igitur in principio & incremento conveniunt *medicamenta ex papaveris radice & carduo bened. it. nitrum & niatum*, quo solo nitro tam purificato quam

quam fixato  
matione p  
antibectum  
aut decoctum  
inflammatio  
flammati  
cum aqua ab  
ficuti & om  
que, præfer  
rit additus.

Quod si apen  
byssopi cum m  
dant; decoctum  
terra sigillata  
expertum fuit  
sacro p. 181.  
aut similibus  
principio v  
tum in aqua

Quoad  
tus ex cham  
ctis & crebr  
fiat form vel  
quibus ad p  
38. c. ol. rose  
tam scabiosu  
adhiberi po

Alias rarum  
Cent. 3. cur  
hyst. 63.



quam fixato, in decocto hordei sæpius propinato, Lindannus suam filiam inflammatione pylori laborantem curavit. Porro spiritus nitri dulcis, saccharum Hni, antisepticum Poterij, convenienter usurpari possunt: Potui inserviat infusum, aut decoctum liquiritie rase in  $\nabla$  simplici, cum successu adhibitum in ventriculi inflammatione à Rulando vid. ejus Thesaur. p. 175. Quod si discuti nequeat inflammatione, adeoque in abscessum degenerare incipiat, convenit terebinthina cum aqua absinthii lota, si bisterve detur, resolvit enim vel maturat abscessum, sicuti & omnia ex scabiosa parata & maturant & etiam sanant internè quoscunque, præsertim ventriculi, abscessus, præsertim si spiritus tartari rectificatus fuerit additus.

R.  $\nabla$  scabios.  $\zeta$ ij.

Syr. de succo scabios.  $\zeta$ iss.

spiritus tartari rectif. vel

carminativ. de tribus  $\zeta$ j. M.

Quod si aperto abscessu jam genitum sit ulcus, usurpetur decoctum hordei vel hyssopi cum melle, item serum lactis aut lac chalybeatum, mundificant & consolidant; decoctum radic. china cum herba scabiosa præparatum confert. it. CC. vst. terra sigillata, bolus armenus &c. oleum seu balsamum mastichis cum oleo hyperici expertum fuit in Cultrivoro Prussico, de quo videatur Beskerus de Cultrivoro Prussico p. 181. ubi plura huc facientia reperiuntur; quod si ex acerbis corrosivis aut similibus assumtis arrosus aut exulceratus fuerit ventriculus, præmissò in principio vomitu, lacticia, it. terra sigillata sunt convenientissima, it. tragacantum in aqua florum rorismarini solutum, vid. Bartholin. Cent. 6. hist. 21.

Quoad externa inflammationi ventriculi convenientia, in principio foris ex chamomilla & rosis rubris imprimis convenit in vino aut saltem aqua coctis & crebrius applicatis. Quod si ad suppurationem videatur vergere malum, fiat foris vel cataplasma ex foliis branca ursinae, radic. althæe, ros. rubr. aa, Mß. quibus ad putrilaginem coctis, adde farin. hordei flor. chamomill. sem. fœnugr. aa,  $\zeta$ ß.c. ol. rosar. & chamomelino F. Cataplasma quo tempore præter supra laudatam scabiosam & internè passula c. ficibus, malva & similibus, in sero lactis coctis adhiberi possunt; Tandem ut citius maturetur abscessus

R. Sem. fœnugr.  $\zeta$ ij.

ferment.  $\zeta$ j.

stercor. columbin.  $\zeta$ ij.

ol. chamæm.  $\zeta$ iss.

mellis  $\zeta$ j. M. pro Cataplasmate.

Aliàs rarum malum est inflammatio stomachi. Exempla vid. in Amat. Lusit. Cent. 3. cur. 39. Forest. l. 18. observ. 1. 30. 31. it. Zacut. Lusit. Med. Princ. l. 2. hist. 63.

IN-



## INFLAMMATIO INTESTINORUM.

*Inflammanur quoque Intestina*, quæ præter *causas internas* omnibus reliquis inflammationibus communes, interdum pertinacem & quasi Iliacam alvi obstructionem, interdum herniam, interdum dysenteriam immediatè suppressam, interdum *externam* quandam læsionem, v. g. contusionem &c. insequuntur. Inflammanur intestina tam tenuia, quàm crassa, utut illa frequentius. Gravis affectus est, habet cruciatus insignes, ferè indicibiles, sed sicut sunt vehementissimi, ita brevissimè durant. Dolor, ut dixi, est indicibilis, fixus, distendens, ingens in parta affecta intus percipitur, subinde plus minus pullatorius. In loco inflammato tumor quidam rotundus ac renitens percipitur, cuius ratione Veteres intestinorum inflammationem vocarunt *Chordapsum*, quoniam instar chordæ convoluta intestina apparent. Præterea in loco isto percipitur intensus ardor. Febris quæ adest, fere est lippyria, repent extrema, utuntur interiora. Alvus occluditur & non rarò arctissimè stringitur seu contrahitur, ut ne specillum admittat; dein podex introrsum retrahitur, quod quando fit, signum est certissimum imminentis vomitus stercorei, & tunc vocatur *Ileus*. Hoc si eveniat clystere paulò ante immisso, ipse clyster per os redditur; præterea urina interdum suppressitur, venter ferè inflatur, respiratio est difficilis, vires languent &c. *Si afficiantur intestina tenuia*, omnia hæc sunt graviora, ac situs doloris & caloris, medium ventrem imprimis occupat, dolor & tormina ad superiora magis vergunt, stomachi distensio adest, spiritus angustia nausea & vomitus assidui &c. *Si in crassis inflammatio consistat*, omnia ista sunt remissiora, vomitus non ita continuò durat, dolor ad hypochondria magis pertingit, ac lumborum adest gravitas. Inflammatio intestinorum *periculosum est malum*, brevissimè durat & non rarò intra biduum cursum suum absolvere solet & succedere gangræna, quæ inde patet, quòd subitò cessat omnis dolor. Neque enim inflammationes internæ subitò cessare debent, sed tractu temporis. Omnis g. subita cessatio doloris, infallibile argumentum est extinctionis, siue mortificationis partis: Sæpius etiam sine gangræna in ileum terminatur, frequentius lethalem.

In *cura* tractentur leniter, ne irritentur crabrones, adeoque aut mortificatio, aut ileus citius provocetur. Sanguis g. *secta* in brachio *vena* revellendus, idque interdum etiam repetitis vicibus. Hinc si alvus aperta non sit, *clysteres* injiciantur, iique tales, qui non requirunt longum tempus ad præparationem, quia

quia morbus  
aut sacchara  
violaceo vel  
decocto & flu  
cutiens in la  
no omentum  
tum. Opor  
& leniter in  
positis. Si d  
simul intern  
& somnus  
dolor subit  
mixture Ba  
Vel

Inflammati  
aut concuss  
obseruatur  
vel utriusq  
dibus suppr  
inflammato  
mor adest,  
est & si in e  
so, sed exte  
dex ipse, ci  
culter redd  
scellum &  
crepitur &

Quo  
& hinc an  
quidem cur  
Pars



quia morbus præceps, sed sit *ἐν τῷ πρῶτῳ*. v. g. solum decoctum hordei cum melle aut saccharo rubro, aut *nutr. depur.* ℥j. ad ℥ij. Vel Clysteres ex lacte cum saccharo violaceo vel melle rutaceo, vel ex lacte cum succo plantag. it. clyster ex succo aut decocto *flurvatilium*. Hinc leniendi causâ externè applicetur cataplasma discutiens in lacte ejulve sero coctum; præ cæteris commendatur hic à *Lindano omentum vervecinum*, animali vivo extractum & ventri calidissime impostum. Oportet igitur in eodem conclavi animal discindere, omentum extrahere & leniter involutum immediate abdomini imponere, pulvillis calidis superimpositis. Si dolor non cessat, aliud omentum imponatur, imo tertium. Oportet simul internè dare *anodyna*, v. g. *laudanum*, quibus si dolor successivè remittat & somnus succedat, salva res est; si non & delirium sequatur, mors certa. Sin dolor subito cessaverit, ex gangræna æger brevi moritur. Usurpari etiam potest mistura *Barbette in Praxi, ubi de ileo p. 231.*

Vel *℞. ▽ card. bened. ℥iij.*

† sambuc. ℥ss.

succ. semperviv. ℥j.

Rob sambuc. ℥ij.

Bezoard. min. ℥j.

Syr. Portulac. ℥j. M.

## INFLAMMATIO ANI.

*Inflammatur etiam Anus*, idque ex violentiâ *causæ externæ*, contusionis aut concussionis vehementis vitio, ut ex equitatione nimia, quale exemplum observatur in *Foest. l. 23. obs. 13.* it. ex irritatione externa v. g. chartis *piperatis*, vel *vitriolatis* applicatis &c. Vel ex *interna causâ*, imprimis ex hæmorroidibus suppressis, inflammationem in intestino recto excitantibus; In ano inflammato *necessariò* dolor pulsatorius, propter arterias hæmorroidales & tumor adest, nunc magis, nunc minus sensibilis. Dolor quoque nunc in occulto est & si in externa parte malum hæreat, interdum tangi potest digito non immisso, sed externè applicato, aut ano pressò. Peculiariter quoque foramen, seu *Podex* ipse, circulus nempe ultimus intestini recti, introrsum retrahitur, alvus difficulter redditur, accedit febris &c. Inflammatio hæc ani sæpe degenerat in abscessum & hinc in *fistulam*, quæ fistula interdum penetrat in vesicam, hinc crepitus & stercora subinde per vesicam emittuntur.

Quoad *curationem* mox in principio oportet revellere *secta vena* in brachio & hinc ante omnia operam dare, ut protinus alvus solvatur. Fit hoc quidem cum aliquali dolore & inflammationis aggravatione, omnia tamen

*Pars II.*

m

hæc



hæc graviora fient, si fæces retentæ interea indurentur. Protinus g. injiciendus est *clyster* leniens & emolliens, cui, si indurata sint fæces, necesse est *sal gemma* addere. Quod si excreto enemate non videatur recte egisse, oportet aliud injicere cum oleo *napistri* seu *napi sylvestris*, ut sic præcaveatur abscessus; injiciatur autem clystima leniter & suspensâ quasi manu, ne dolor & ardor augeantur, v. g. fiat clystima ex lacte, vel decocto flor. *verbasci*, *parietar.* fol. *melilot.* addatur *sacchar.* &c. Sin minus his modis aperiri possit alvus, per blanda passulata aperiatur eadem, acriter quacunque stimulantia fugiendo. Externe foveatur anus cum decocto *agrimonia* & *menba sarracenica* c.  $\nabla$  & aceto paratò, vel horum loco cum vino, quod appropriatum est discutivum; vel decoquantur hæc in  $\nabla$  *calcis vivæ*: it. *verbasci* flor. in aq. coct. ad hujusmodi calidos abscessus egregie conferunt, quibus *folia solani* & *portulac.* aut si dolor urgeat, *folia hyoscyami* addi possunt, cautè tamen. *Mucilago sem. psyllii*, aut *cydoniorum* c. aq. semper vivi extracta, addito *saccharo* hi & applicata, est utilis. Lac vel cum albumine ovi, vel solum agitatum & ita pro foru applicatum convenit in podicis ardore & inflammatione ex contactu piperatorum & rerum adurentium, teste *Platero*, in *Observ.* Quod si inflammatio ani abierit in abscessum, hic promptè curandus est, per *bals. sulph.* ad extra. *Rulandi*, ex sulphure cum oleo papaverino, prout describitur ab *Hartmann.* in *Praxi Chym.* it. præparetur unguentum *Nicodemi*, ut vocatur & describitur in *Antidot. Weckeri*, quod *bals. sulph.* permistum, optimum erit remedium, pro curando hujusmodi abscessu. Sin abscessus in fistulam abierit, hæc se facile non patitur curari; optimum tamen remedium esse dicitur *ol. dulce*  $\S$  ii, quod videatur in *Agricola Comment.* in *Poppium*.

## INFLAMMATIO MESENTERII.

*Inflammatur* denique & *Mesenterium*; Ac sane *Mesenterii* tumores variï & inde nati abscessus, sæpius sunt origo & fons *chronicorum* & latentium morborum, ex eò, quoniam difficile cognoscuntur, cum mesenterium in profundo situm, aliis partibus hinc inde septum & propter sensum obtusum minus manifesta sint ejus pathemata, unde sæpe & ægros & medicos fallunt. Ad sunt præterea *glandula varia*, quæ diversimodè affectæ, varia abdominis symptomata inferunt. Accedit *textura nervorum* multiplex per mesenterium sparsorum, unde partes aliæ per consensum simul afficiuntur, ut nequeamus ob id rectè distinguere *Mesenterii* proprios affectus ab aliis. Frequentissimè inflammationes ac alios tumores & occultos abscessus patitur, hinc etiam tumouribus strumosis aut *scirrhis* glandularum afficitur, id quod exempli gratia non rarum in infantibus, c. atrophia & tumore quasi tympanitico abdominis,



ex ista causa affectis. Affectus quos inferunt ista *Mesenterii vitia*, tumores & abscessus, sunt varii & vagi, nunc mitius, nunc gravius affligentes, interdum indolentes, interdum frequentius, idque in paulo obesioribus, plus minus dolorosi, nunc circa dorsum & lumbos dolorem, nunc in abdomine, ac praesertim circa umbilicum tormina inferentes, lenti tamen omnes & diuturni; subinde cum febriculâ erraticâ complicati, aut saltem vagis aestuationibus & intercurrentibus interdum horribus leviter comitati, quæ symptomata fere sunt propria membranosis partibus affectis. Corpus simul successivè ut plurimum emaciatur, respiratio evadit difficilior & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, se in abdomine & circa præcordia sentire affirmant. Venter nunc inflatur, nunc ad interiora dorsum versus quasi retrahitur; dolor aut lumborum aut abdominis subinde per intervalla recurrit & sæpe multis annis affligit; flatulentia plures insimul ægros vexare solent. *Curantur* tamen ferè ut alii affectus chronici cachectici aut hypochondriaci, interne quidem per *salia salsa, tartarea, vitriolata, nitrosa, abstergentia*, ut & per *volatilia*; hinc per *Stialia*, subinde *aromatica, amara, aperientia*, aut *hepatica* vulgò dicta, interpositis blandis *purgantibus*; tractentur tamen cautè & sine violentia, exasperantur aliàs & deteriores evadunt, ob nervos tunc irritatos. *Externè Empl. ex gummatibus, de cicuta, de Nicotiana, Empl. Vigonis de ranis c. Q. 10, vel ex gummatibus & Q. 10*, descriptum à Barbette in *Anat. præf. p. 357*.

*Pluratumorum & abscessuum occultorum in Mesenterio*, hinc inde prostant observata, v. g. *callum* inter venas mesenterii natum lethalem; It. *Calculos* in mesenterio refert Schenck l. 3. obs. Hydropem à *vesiculis* mesenterii refert Tulpius l. 2. obs. 34. Mesenterium *lapidosum*, hinc atrophiam lethalem Panarolus Pent. 5. obs. 19 Abscessum mesenterii, ubi cum pure simul *vermiculi* excreti, Thonernus l. 1. obs. p. 173. Tumor mesenterii durus circa medium pancreas per emollientia curatus à Forest. l. 21. obs. 1. Ex scirrhoso mesenterii tumore hecticum incipientem, menses albos, tormina, Trincavellius l. 3. conf. 22. p. 372. Glandulas mesenterii *induratas* & auctas, ventrem tumidum reddentes Platerus l. 3. obs. p. 464. Sed de his & similibus mesenterii affectibus præ cæteris omnium optimè scripserunt Fernelius in *Patholog. speciali* & post hunc Matth. Martini de morbis mesenterii *abstrusioribus* & hinc Sennertus libr. 3. pr. ubi de Mesenterii morbis. Horum *historia* observatæ, *diagnosis, prognosis* & *praxis* satis commoda, *theoria* saltem, pro temporis illius ratione, manca, ex sanguinis circulatione, lymphæ & glandularum observatis aliisque hodiernis experimentis emendanda.

Speciatim jam consideranda *inflammatio Mesenterii* & hanc subsequens *abscessus*, quæ haud adeo frequens est, propter obscuriorem mesenterii sensum, utut copiosis vasis sanguifluis sit instructum. *Inflammatum* mesenterium



terium nunc solum, idq; rarius, nunc simul conjungitur inflammatio intestinorum. Præter generales inflammationum *causas*, *duæ speciales* sunt in mesenterio, nempe dysenteria & hernia: *Dysenteria* enim malè curata sæpe in inflammationem Mesenterii lethalem degenerat, observante *Martini loco cit. p. 42.* In *hernia* vero, dum in intestinis tenuibus Mesenterium simul in scrotum descendit, non potest non contractum, aut vitiosè compressum, ex impeditiō sanguinis circulō, inflammationem contrahere. Præterea tamen & *febres* subinde *ardentes*, ceu metastasi critica, in mesenterii abscessus terminantur, quando & aliis febribus aut morbis complicatæ *inflammationes* & inde nati *abscessus mesenterii*, eos magis intricatos & molestos reddunt, unde non ineptè *Sennertus* febres semitertianas dictas exinde derivat, *l. 3. prax. p. 445.*

Inflammatio hæc mesenterii non secus atque alii tumores & abscessus ejus difficulter *cognoscuntur*, quia latent in profundo & sæpe sunt indolentes, aut dolentes licet, pro uterinis, colicis aut nephriticis pathematis subinde habentur, cum nausea & vomitus subinde accedant. Nihilominus in *inflammatione mesenterii* percipitur quasi *pondus in abdomine*, dum æger se volvit, *ardor* adest, subinde præcordiorum, aut circa umbilicum, *dolor pulsatorius* in profundo abdominis, cum leni ardoris sensu absconditus, cum quo ardore *sensus* quidam *tensivus* in abdomine citra vehementem duritiem sentitur; adfunt, interdum egestionēs chylosæ citra ventriculi vitium; adfunt *signa inflammationis* reliquorum abdominis partium, quæ aliàs facillè confunduntur; præsertim cautione opus est, ne adsit *umbilici inflammatio*, non exterioris, sed interni circa musculos rectos, in quibus interdum fit inflammatio & abscessus, unde pus per eum evacuat. *Febres* quæ in Mesenterii inflammatione & abscessu observantur sunt, diversæ. Si profundum Mesenterii inflammatum, ut plurimum febres sunt *continuae*, sed *languidæ* & quæ sine gravioribus symptomatibus interdum circa vesperam exacerbantur: Interdum multa febris indicia adfunt, teste *Rhodio Cent. 2. obs. 95.* Si vero circa exteriores partes, ubi reliquis abdominis visceribus conjungitur, inflammatio ejus accidat, febres plus minus acutæ, non rarò semitertianæ, adesse solent. In genere, dum *suppuratio* fit, ut aliàs in quavis inflammatione, febris, dolor & symptomata reliqua fiunt graviora. Dum *apostema* rumpi incipit aut rumpitur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente aestu interdum insigni, quæ puris, præsertim per alvum, excretio successivè comitatur. Conf. *Horst. l. 14. obs. 25. & 26.* Item *Bartholin. Cent. 4. Epist. p. 491. & Cent. 4. hist. 96. it. Cent. 2. Epist. 27.*

Quoad *prognosin* inflammationes mesenterii aut suppurando in  
abscessus

abscessus abet  
glandulis obi  
ta dejectione  
mesenterii ad  
de etiam aggr  
lo adfecti, ta  
rumpente ali  
um excretio  
Sin vero in  
gangranam  
Optimè ab  
verò intesti  
Ut autem d  
ta, vitio exu  
rumque per  
pauca, tara  
testinorum.

Cum

mutandis, ra  
est, necipsō  
bus. Præ  
rhodialis  
ctu in mesen  
subinde felic  
dicta est noci  
tamen lenien  
tione subind  
utilissima.

De ca

Hartm. in l  
entibus exte  
tartar. vitru  
simplex, a  
præsertim  
co pomorun  
aperientes d  
jor. Exter



*abscessus* abeunt, aut in *scirrhus* degenerant, qui tam in mesenterio, quàm ejus glandulis observati sunt. In *obstructionibus Mesenterii* supervenientes cruentæ dejectiones subinde salutares *Bartholin. Cent. 6. Hist. 41.* Suppurationes mesenterii admodum sunt lentæ & non nisi tardè suum absolvunt cursum, unde etiam ægros vix in consuetis functionibus impediunt. Diuturno hoc malo adfecti, tandem aut ad *cachexiam*, aut ad *tabem* & *hecticam* deveniunt. Erumpente aliò, quàm in alvum pure, post ruptionem abscessus, nec locum alium excretioni idoneum reperiente, affectus *colica* similis subinde observatur. Sin vero in abdominis cavum effundatur, tunc membra vicina vel inficit, ut gangrænam concipiant, vel acredine corrodit & plurimum malorum autor est. Optimè abscessus ruptus per alvum vel per urinam expurgatur. Quod si verò intestina corrodit, hæc siderata, seu spacelata reddit. *vid. Tulp. l. 2. obs. 37.* Ut autem discernatur excretio purulenta ex mesenterio, ab excretionem purulenta, vitio exulcerationis intestinorum, observetur, *quod si subito, copiose & plurimumque permixta est sanguine*, non potest non à mesenterio esse. *Si verò pauciora, tardius & cum torminibus sensim ac successivè effluat*, est ab ulcere intestinorum.

*Cura* ferè cum reliquis inflammationibus coincidit, mutatis saltem mutandis, ratione nempe partis adfectæ. *Venasectio* haud ita necessaria est, nec ipsò morbò, nec sanguinis effervescentiâ febrili adeo acutis existentibus. Præ cæteris tamen sanguinis quibusvis evacuationibus, *vasorum hamorrhoidalium apertio*, præsertim per *hirudines*, applicatione facta, summò cum fructu in mesenterii morbis institui solet, naturâ monstrante viam & per dicta loca subinde felici cum successu se ipsam exonerante. *Purgatio* quævis propriè dicta est nociva, irritat crabrones & absque euphoria ægri evenit. *Clysmata* tamen lenientia, abstergentia, emollientia, anodyna, pro circumstantiarum ratione subinde injecta, imprimis quando per alvum purgari incipit abscessus, sunt utilissima.

De cætero *cura* ipsa consistit in *resolventibus & emollientibus*, ut loquitur *Hartm. in Praxi. Chymiatr.* Illis quidem resolventibus internis, his verò emollientibus externis. Interna ferè ex superioribus sunt nota, in specie tartarea, *tartar. vitriolatus*, *liquor terra sol. tart.* rite paratus, *tinctura tartari*, *spir. tart. simplex*, aut *carminativus*, *tinctura* ꝯ *Zuelfferi* &c. Item ꝯ *diaphor.* præsertim *Æale*, hinc etiam alia blanda *Æalia*, *essentia* ꝯ *is cum succo pomorum*, *tinctura tartarizata* *Æalis Ludovic.* Item *Essentia amara* aperientes dictæ, ut *absinthii*, *centaur. min.*, *sumar.*, *card. ben.*, *chelidon.*, *major.* Externè applicetur *Emplastrum de cicuta* usitatum, vel solum, vel



cum *gum. ammoniac.* subactum, hâc simul observatâ cautela, si contra dolorem emolliat & discutiat inflammationem, rem bene se habere: Sin vero dolorem exacerbet, certum est factam jam esse inflammationem & abscessum; Alias quoque Cataplasmata & Emplastra ex *betonica, agrimon. chamomill. verbasco, melilot, absinth.* & similibus, in vino coquendis & cum spongia vel aliis applicandis conducunt. Quod si febricula lenta plus minus conjungatur, istis supra enarratis lapides  $\odot$ , *antibect. Poterii c. paucos* & ci internè focianda erunt. His modis vel resolvitur inflammatio & tumor, vel suppuratur, unde rupto abscessu sequitur puris ut plurimum per intestina excretio, eaque in principio confertim, postmodum successivè ad perfectam usque abscessus expurgationem; Interdum remittit puris excretio, post aliquot dies tamen recurrens, idque crebrius, mutatis sic vicibus, quando nempe tanquam in vomica purulenta successivè colligitur, donec in quanto sufficienti collecta, excernatur; in hujusmodi suppurationibus & abscessibus mesenterii notabile est, quod refert *Marcellus Donatus in hist. Med. mir. l. 4. hist. c. 7.* supervenire saepe iis copiosum urinae profluvium: Ob sedimentum autem quod in matulae fundo reperitur, laudabile, nullam salutis spem concipere debet Medicus, cum liquamentum potius corporis tabescentis existat. Factus ita abscessus est mundificandus & consolidandus, adeoque omnia ea hic conveniunt, quae aliàs in exulcerationibus partium internarum, indeque nata phthisi proficua sunt.

Hac inter primatum obtinent ea, quae sunt ex *Terebinth.* hinc *vegetabilia vulneraria.* Sic *pilula de Terebinth.* item *Terebinthina Cypria in vitello ovi* dissoluta & ita assumta. It. *Bals. sulph. terebinthin. aut succinatus*, ni intensior febris obstiterit. It. *Bals. Peruvianus* in jusculo calido vel ovo forbili ad guttas viij x. xij. &c. assumtus. *Potiones vulnerariae* aliàs notae sunt, speciatim in hoc casu, *persicaria, agrimonia & hypericum* sunt proficua. *Decoctum ligni sancti & Jassafras*, in principio rupti abscessus insigniter conveniunt, quibus & *rad. liquirit. scorzonera, ficus* & similia addenda sunt; Item *decoct. rad. chinae* cum liquirit. & passul. Talia enim & mundificant abscessum, & purulentias acres simul temperant. *Formule vid. in Martin.* *Serum lactis* egregium etiam abstersivum ulcerum internorum, ratione nitrositatis suae, id quod vel solum propinetur; vel decoctum cum *rad. cichor. liquirit.* &c. usurpetur. Hisce subinde & blandiora & alia, praesertim in liquida forma focianda; vel *Tinctura sulphuris vitrioli*, it. *Tinctura antiphthisica* &c. Hinc *acidulis* cum fructu usus fuit *Thonerus in suis obs. p. 173.* *Rhabarbarum* tam scopo abstersivo, quam scopo adstrictorio & quasi vulnerariò non negligendum venit. Sed plura de his vid. in specie in modo laudato *Martino.*

Quae hactenus de Mesenterio dicta fuerunt, etiam de PANCREATE feremonenda sunt, cujus morbi & affectus ut perquam occulti sunt, ita plurimum diffi-

difficilium & i  
ca annotasse  
chondriaca, v  
Abscessum in p  
vissima sympt  
suppuratum le  
thalem contin  
phacelatum &  
nos miserè v  
duratum, vi  
celato vid. A  
M. A. N. C.  
fluxu cruento  
Nec on  
buria, humore  
facta, varia p  
dosomenti tum  
Item in Horst  
tur Schenkij

I N F

P L E

Inflammantur  
tionibus par  
spelaceae, n  
inflammam  
in Anthropog  
celescentia. F  
quod sangui  
bus alteratus  
afficit, quia  
Pleuron  
ones: Inflamm  
si altera pul  
Pleuritis  
mo istius T.



difficilium & intricatorum morborum subinde origo sunt. Ex pluribus pauca annotasse sufficiat. *Tumorem scirrhosum pancreatis* cum affectione hypochondriaca, vel potius scorbuto eleganter curatum, vid. in *River. Cent. 3. obs. 85.* *Abscessum in pancreate* latentem; perpetuas vigilias, lipothymias aliaque gravissima symptomata inducentem, refert *Schenckius l. 3. obs. de Mesent. Pancreas suppuratum* lethale *Barthol. Cent. 2. hist. 39.* *Pancreas lapidosum*, vomitum lethalem continuum comitans *Panarolus Pentec. 1. obs. 44.* Idem corruptum & sphacelatum & vomitum continuum lethalem *Barb. in prax.* Puellam per 8. annos miserè vexatam, hectica febre mortuam, in qua *pancreas scirrhatum* & induratum, vid. ap. *Petr. Pav. obs. 14.* Mortem repentinam ex pancreate sphacelato vid. *M. A. N. C. Anno 3. p. 74.* Ex pancreatis excrecentia marasimum *M. A. N. C. Anno 8. p. 57.* Interdum pancreatis morbi superveniente salutari fluxu cruento curantur, autore *Bartholin. Cent. 6. hist. 41.*

Nec omittendum hic penitus OMENTUM, in quo collecti, tanquam in bursa, humores vel flatus, item glandulae ejus subinde scirrhosae, aut steatomosae factae, varia pathemata inferunt. Conf. *Barbett. in Anat. Pract.* & admirandos omenti tumores, vid. in *Marcell. Donat. hist. Med. l. 7. ab Horstio adjectos.* Item in *Horstio Decad. 6. probl. quæst. 10. Hildan. Cent. 3. obs. 62.* quibus addatur *Schenckius in obs. de Omento.*

## INFLAMMATIO PLEURÆ, PLEURO-PNEUMONIA, PERIPNEUMONIA & PLEURITIS.

Inflammanur etiam partes internae ad Thoracem pertinentes & hæ ex inflammationibus partium internarum sunt frequentissimæ, suntque frequentius Erysipelaceæ, nunc magis humorosæ, seu sanguineæ, qua ratione v. g. pleuram inflammata decuplo crassior, quam naturaliter est, observavit *Riolanus in Anthropograph. l. 3. c. 5. p. 378.* & omnes ferè fiunt ab aliquali sanguinis accrescentia. Frequentia autem harum inflammationum ex eo imprimis dependet, quòd sanguis in pulmonibus, alterationibus aeris vel maximè sit expositus, quibus alteratus sanguis, promptissimè loca thoracis lateralia & alias ejus partes afficit, quia partium harum arteriæ proximæ sunt cordi. Vocantur in genere *Pleuropneumonia*, quæ postmodum in specie varias sortitur appellationes: Inflammatio enim utriusq; pulmonum partis dicitur *Peripneumonia*; si altera pulmonum medietas inflammetur, una cum lateris ipsius pleura, vocatur *Pleuritis*. Semper enim quando pleura est inflammata, simul quoque pulmo istius lateris fuit observatus inflammatus, observante hoc *Platero l. 2.*



l. 2. Prax. p. 409. cuius rationes amplius deducit *Hochstetterus* Decad. 7. cas. 4. p. 92. it. ex *Lalio à Fonte* Conf. 91. ubi refert observatum semper fuisse in pleuritide correptis, quod pulmo similiter in isto latere inflammatus fuerit. Id quod pariter confirmant Modernorum Anatomicorum observationes. Confer *Sennert. l. 2. prax. part. 2. c. 16. de Pleurit. quest. 2.*

Non autem solum lateraliter afficitur *pleura*, sed etiam interdum *membrana humeri*, *juguli*, &c. afficiuntur, observante *Tulpio lib. 2. obs. 1.* cum pleura ita inflammata, impossibile fere videatur, quin & inflammatio *musculis continuis intercostalibus internis* communicetur. Siquidem interdum accidit, ut in vera pleuritide phlegmone versus exteriores musculos ob magnitudinem affectus simul tendat, & dolor etiam primò tactu percipitur.

Loco pleurae interdum cum pulmonibus inflammatur *mediastinum*, vel cum iisdem inflammatur *diaphragma*, cui ordinario supervenire solet *delirium*, quod speciali nomine *paraphrenitidem* appellare solent Veteres, à *phrene*, quod diaphragma significat. Conferatur quoad historiam in specie *Vincent. Baronius Tr. de pleuropneumonia. Schneiderus* ferit ejus vestigia in *differt. de pleuropn.*

Harum partium thoracis inflammatarum *pathemata* quaedam sunt *communia*, quaedam *propria*. *Communia* omnibus sunt (1.) *respiratio difficilis* & frequens. (2.) Deinde adest *febris acuta*, continua, cum insigni ardore ut plurimum conjuncta, interdum tertianæ typum observans. (3.) *Pulsus frequens*, celer, magnitudine plus minus moderatus, saltem in progressu parvus. (4.) *Tussis* adest frequens, molesta, in initio sicca, hinc rejicitur sensim etiam sanies tenuis, nonnihil spumosa, mox varie tineta. Hinc sputum totum fit cruentum, tandem albescit, crassescit, fitque mucilaginosum, tuncque vocatur *sputum coctum*. (5.) *Caput* insigniter dolet, adsunt simul *agrypnia*, *siuq.* intensissima fatigat ægros. In specie in *peripneumonia* insignis admodum spirandi difficultas est, cum periculo suffocationis, ita ut æger interdum erectus cogatur spiritum ducere. In *pleuritide* vero minus spirandi difficultas urget. Item, in *peripneumonia* primis diebus vomere familiare est, secus ac evenit pleuritidis; interdum nec bibere nec loqui commodè possunt, ob *respirationis angustiam*, qualem spirandi difficultatem *Hippocrates* vocat *sublimem*. Pectoris angustia adest, cum dolore ejus gravativo spinam quasi attingente, qui dolor remissior est, nisi membrana succingens pulmones simul inflammata fuerit. *Febris* adest *continua*, ut plurimum *acuta*, utut febrem mollem seu *Epialam* subinde se observasse referat *Lindanius*. Facies rubet insigniter. Quod si vero altera saltem pulmonum medietas seu pleura inflammata fuerit, *rubor in malis* respondet saltem lateraliter parti

parti pulmonum  
legata sympto  
Pleurit  
acutum, pun  
nem ab acido  
explicat Hel  
dolorem huj  
sine puncto  
Princip. qua  
sionem infig  
consentient  
parvitate ist  
Medici, eun  
Barbette in p  
flammata, in

Dia

costarum ad  
dolor tamen  
percipitur  
copiosis ex  
l. 1. obs. p. 1  
specie deliri  
siones, resp  
modò rara.

Quod

servantur, d  
quadam sub  
modum hu  
servantur;

H

eo tamen d  
chondrium  
siva molef  
durus, tuss  
progre diatu  
indicium e  
brancearu  
Pars



parti pulmonum affecta, durat à principio ad finem usque & tunc cætera allegata symptomata magis in uno, quam altero latere observantur.

*Plevritis in specie* conjunctum habet *dolorem lateris*, seu plevræ affecta, acutum, punctorium, imprimis molestum, quando inspiramus; cujus originem ab acido & fiendi modum per contracturam fibrarum plevræ, eleganter explicat *Helmont Tr. furens pleura*. Adeoque rarum est, quod refert *Hildanus*, dolorem hujusmodi punctorium non in omni esse plevritide; utut & plevritis sine punctorio lateris dolore observata fuerit à *Zacut. Lusit. in Histor. Med. Princip.* qualem & ipse *Tulpius* observavit. *Pulsus* adest simul *durus*, ob tensionem insignem arteriæ quasi convulsivam, affectui plevræ quasi spasmodice consentientem, quæ pulsus durities juncta cum ejus frequentia, celeritate & parvitate istum constituit pulsum, quem alias *ferrinum* seu *serratum* appellant Medici, eumque plevritidi fere proprium asserunt. *Notabile* est, quod refert *Barbette in prax.* quod pleura in regione dorsi, ubi adnascitur diaphragma, inflammata, interdum ab incautis pro *nephritide* habeatur.

*Diaphragma inflammatum* se exhibet dolore quodam circa externa costarum adfinia ipsiusque sterni, ubi simul cinguli instar venter tendi videtur; dolor tamen exiguus est & saltem molestia quædam juxta sternum inspirando percipitur. Nec punctorius est dolor, tussis non adeo humida, nec cum tam copiosis excretis, atque in pleuropneumonia adesse solet. *Conf.* imprimis *Plater. l. i. obs. p. 158.* ubi elegans observatio *inflammati* habetur *diaphragmatis*. In specie *delirium* facile supervenit. Solent etiam nonnunquam accedere convulsiones, respiratio est inæqualis, modò parva, modò magna, modò frequens, modò rara, &c.

*Quod si Mediastinum sit inflammatum*, paria ferè modo dicta observantur, dolor quidam antè sterni regionem percipitur, cum molestia quadam sub inspirando, non tamen est punctorius, tussis in principio sicca, postmodum humida, in qua rubra & flava rejiciuntur, non tamen adeo copiosa observantur; pulsus qualis plevriticorum.

*Hepar inflammatum* subinde paria ac plevritis habet symptomata, in eo tamen *distinguntur*, quod dolor sit *in latere dextro* & circa dextrum hypochondrium gravativus; non punctorius, ut dolorosa quædam plus minus tensiva molestia ad jugulum usque adscendere videatur. Pulsus undosus, non durus, tussis sicca, non adeo frequens, nec tanta respirandi difficultas. *Quod si progrediatur malum*, ita ut incipiant *suppurari* hæ inflammationes, adest certum indicium ex rigore, quod necessariò omnes internarum partium, præsertim membranacearum, suppurationes comitatur; Sicuti & febris, dolor, vigilæ ac similia



lia symptomata in suppuratione fiente ingravescent. *Suppurationem jam factam* monstrant dolor, qui imminuitur, febris remissior, respiratio liberior, vires non adeo debiles. Verum licet confecto pure cetera mitescant, tamen instante ruptionis tempore, ægri vehementius cum horrore denuo febricitant, ac difficilius ferè quàm antea respirant.

*Causa proxima* Pleuropneumonarum est acidum in sanguine peccans, unde hic ad facilem sui coagulationem & congrumescentiam disponitur, & hinc vel in pulmone, vel in pulmone & latere aliisve vicinis locis hærendo, acidò simul membranaceas partes vellicando & crebriores contracturas stimulando, hos affectus infert. *Conf. Helmont. Tr. Pleura furens.* Hinc sanguis, qui venâ sectâ emittitur, subinde nunc semigrumofus prodire observatur, teste *Gabelchoverò cent. 4. cur. 7.* nunc promptissimè coagulabilis existit, ita ut ferè exeundo congrumescat, teste *Helm. cit. loc.* ipsi verò extravasato pellicula tenax subalbida viscida supernatare observatur, teste *Willius in Pharm. p. 2. p. 178. & 198.* Relicta acidi huius peccantis vestigia in parte affecta, etiam curato abscessu, *recidivas* crebriores in eodem loco facere solent. Quod si sanguis haud perfectè coagulatus minus firmiter intus fixus inhæreat, minorem quoque dolorem inferat, facile resorberi & hinc per *μὲλᾱς αἰν* pleuropneumoniae ad diversas partes transferri possunt.

*Causæ remotæ* sunt varia: Frequentior solet esse *frigus*, externè haustum, post immoderatos calores & corporis incalcentias, seu aer, sive potus fuerit frigidus. *Vid. Horst. l. 3. obs. 20. Forest. l. 16. obs. 28. sic River. obs. 14. communic.* ex indefessa *saltatione* hancque excipiente potu frigida, Pleuritidem notat. *Conf. Hidan. Cent. 4. obs. 25. Hornung in Cista Medic. p. 276.* observat peripneumoniam in Clerico concitatam ex eo, quod bene potatus sæpe in templo cantasset. Præterea *sanguinis ordinariæ evacuationes suppressæ* non raro dant pleuritides, præsertim mensium, quorum occasione acidum vitiosum interdum colligi solet. Sic *Deodatus in Valetud. p. 219.* observat ex mensium antelegitimum tempus emansione, hæmoptysin cum pleuritide sub mamma sinistra suppuratam. Pertinet huc *casus Timæi* pleuritidis ex subitanea mensium suppressione, propter casum in fluviū. Præterea *dysenteria suppressa*, aut malè curata dat pleuritides, observantibus autoribus omnibus. Hinc *Helmont* dicit, quod dysenteria & pleuritides non differant in radice, sed tantum quoad locum affectum. *Febribus* quoque *continuis* non raro supervenit pleuritis, adeoque tanquam symptoma quodā iisdem subinde se associat, ut rectè *Sydenham* in *observ. p. 355.* pleuritidem nunc essentialem seu primarium affectum, nunc *symptomaticam* febris esse asserat. Nec rarum est pleuritides grassari subinde *Epidemico* more, quo tempore, ut plurimum hi affectus sunt *maligni* & hinc plus minus

con-

contagiosi. *Conf. Fonte Conf. 3. it.* vulgariter gratatur, unusque 3. obs. 10. Scatano Cent. 3. c. 1. nuat *Helmont* annuam, teste vat, de quo v deque nata motum per nunt. Sic ex *Med. Hass.*

Quoad dentem. Functus imped spatii trium c gulo numer id est, intra te & septimam. à truncis sup fra cor. II. acidum ple & venenola bos inlequit Vera est infl cum febr ac

(1.) 14. quo loco in rum costali durus, dolo iperatur, cum vera g

2. E insignis p bili, nisi nulla, aut thali simili



contagiosi. *Conf. Foreſt. l. 16. obſ. 34. Wierus in obſ. ubi de pleurit. malign. Lalius à Fonte Conf. 3. it. 83.* qui obſervavit anginas, pleuritides & peripneumonias ſimul vulgariter graſſantes, unde earum cognitio pateſcit, unde & eodẽ modo curantur, unusque in alterum ſape mutatur, quale exemplum habet *Rhodius Cent. 3. obſ. 10.* Scabies retropulſa infert etiam pleuritidem, obſervante *Amato Luſitano Cent. 3. cur. 62.* Denique *periodica* lubinde eſt *pleuritis*, idque ut rectè inſinuat *Helmont*, ubi non adeo fuit ritè curata, & quidẽ periodum habet interdum annuam, teſte *Zacuto Luſ. l. 3. prax. admir. obſ. 112.* vel aliis modis crebrius recidivat, de quo videatur *Borellus Cent. 4. obſ. 83.* Deniq; *cauſa externa*, caſus, ictus, indeque natæ contuſiones aliaque pathemata ſimilia, quæ ſanguinis ordinarium motum per vaſa intercoſtalia plus minus remorantur, ad pleuritidem diſponunt. Sic ex riſu & ſternutatione ſimultaneis, pleuritidem natam, *vid. in Act. Med. Haſſn. vol. 2. p. 239.*

Quoad *differentias* pleuritidis dividitur I. In *aſcendentem* & *deſcendentem*. Fundamentum conſiſtit in diſtributione venarũ, per quas ſanguinis reſcurſus impeditus inflammationem infert. Hinc *aſcendens* conſiſtit in duobus ſpatiis trium coſtarum ſuperiorum, intra ſecundam & tertiam vertebraſ, à jugulo numerando. *Deſcendens* conſiſtit in 4. ſpatiis coſtarum inferiorum, id eſt, intra tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam ſextam, ſextam & ſeptimam. *Aſcendens* dicitur, quia ſpatia illa intercoſtalia recipiunt vaſa ſua à truncis ſupra cor; *deſcendens* verò, quia ſpatia illa accipiunt vaſa à truncis infra cor. II. *Pleuritis* eſt vel *benigna*, vel *maligna*, de quo ſupra, quando nempe acidum pleuriticum ſingulariter corruptum, acrimoniam per quam hoſtilem & venenofam acquirit. III. Eſt vel *primaria*, vel *ſecundaria*, ſive quæ alios morbos infequitur. IV. Eſt vel *vera*, de qua ſaltem hætenus locuti ſumus, vel *notha*. Vera eſt inflammatio medietatis pulmonum & pleuræ illius lateris, juncta hinc cum febris acuta. *Notha* eſt varia, imprimis triplex.

(1.) *Iſta*, quæ à *Sennerto* ita dicitur *l. 2. prax. ubi de pleuritide p. 225. & 230.* quo loco intelligit *inflammationem muſculorum thoracis* externorum & internorum coſtalium, in quâ febris eſt nulla, aut ſaltim lenta, tuſſis rara, pulſus minus durus, dolor ſaltim pulſans, non pungens, at qui extremo manus contactus exaſperatur, adeoque cum vera pleuritide parum, vel nil habet commercii, niſi cum vera graviore hæc ſimul juncta ſit.

2. Eſt *iſta*, quæ uſitato magis *pleuritide notha* nomine venit, eſtque dolor inſignis *punctorius*, in uno alterove latere, ſine febris ac ſiti, pulſu ferè laudabili, niſi in quantum doloris ratione ſubinde frequentior redditur, tuſſis; aut nulla, aut ſi qua eſt, ſaltem catarrhalis, aut lymphæ vitio, unde & febris catarrhali ſimilis tunc fere jungitur; oritur ex acido vitioſo, vehiculo lymphæ aut feri



inter pleuram delato, sine hujus inflammatione, sine pulmonum alteratione & potius *dolor pleuritidis* quam *pleuritis* appellanda venit. Talis affectus in *scorbuticis* non raro observatur; Item *Gallico morbo* affectis aliquando accidere solet. *Vid. Senn. loc. supra cit. p. 256. quæst. 11. it. Willis. Pharmac. rat. p. 2. p. 199.* & hæc est ista *pleuritis notha*, quam à *statu* oriri vulgo asserunt. Spuria hæc pleuritis præter febris acutæ defectum, aliaque similia pathemata, à vera facile dignoscitur, ex eo quod in *pleuritide notha* super partem affectam difficilior fere sit decubitus, secus ac in pleuritide vera. *Vid. Amat. Lusit. C. 3. cur. 67. annot. Cent. 7. cur. 62.* In hac vero *vera*, nempe cum æger decumbit in latus oppositum, pars inflammata pondere suo divellitur majoremque patitur distensionem, minus in hac.

(3.) *Ad huiusmodi pleuritidem*, malè sic dictam *notham*, seu potius *dolorem pleuriticum* etiam pertinet ista, quæ à *vaporibus* subinde oriri dicitur. Sic *Quercetanus in Pharm.* scribit, observatam à se *notham pleuritidis speciem*, quæ in omnibus veram & legitimam æmuletur, ortam à malignis & acris *vaporibus*, ab inferioribus sursum, in pectoris regionem delatis, ex quorum virulentia & acrimonia pleuræ inflammatio, nec non venarum erosio excitatur, unde sanguinis expulsiō, spirandi difficultas, febris & alia symptomata &c. ubi purgatio cum *▽ benedicta Rulandi* instituta sanguinis detractioni & eccoprotici exhibitioni longè lateque præferenda; imprimis *vermes* & corruptionum incommoda tollere jubet, à quibus sæpe numero hæc *spuria Pleuritis* oritur, id quod præstarent & alia. Sic exemplum refert *Bartholeus de difficili respiratione T. 5. c. 3. p. 548.* dum inquit se curasse pleuritidem in quadam virgine cui omnia pleuritidis signa adfuere in principio, quæ tamen post primos dies malignam, ex pravo vermium halitu, se declaraverat & prorsus absque sanguinis missione fuit curata. De *lumbricis quidem* videatur *Amatus Lusit. 1. cur. 52. & Zacut. Lusit. 1. 8. prax. hist. obs. 7. c. 3.* it. Pleuritis à verme *Hochstett. Decad. 7. p. 89.* & hæc præter communia pleuritidis symptomata, ea quoque, quæ vermibus sunt propria, maxime ventriculi angorem secum habet conjunctum.

Quoad *prognosin*: Ex his *pleuropneumonia* variis quasi speciebus, cæteris paribus, levissima omnium est *pleuritis*, etiam si interdum pulsus intermittentem habere videatur, quod in ea minus periculosum est, *vid. M. A. N. C. Ann. 2. p. 338.* Vehementior autem & periculosior est *peripneumonia*; adhuc periculosior *diaphragmatis inflammatio*, quæ acutissimus morbus est, atq; ægrum citò in summum discrimen deducit & sæpe jugulat; sicuti etiam *Mediastini inflammatio* est periculosior pleuritide.

Quod si absque interitu ægri finiantur hæc *pleuropneumonia*, terminantur vel 1. *discussione* & *resolutione* nunc *crutica* nunc *Medica*. 2. Vel copiosa *sputi excretionē*.

cretionē. Vel  
4. rara ac singi  
bos articulare  
Sitermi  
dis, imprimis  
endus. Nam  
tiones. *Vid. 2.*  
4. it. 1. 7. obs. 6  
ref. 1. 16. obs.  
die critico la  
curatæ Fer  
exinanitione  
critica, per q  
supervenient  
mir. obs. 105. l  
obitat §. 16. se  
pneumonia n  
tidi si peripne  
pneumonia, si  
cat brevem m  
pleuritide lab  
Aph. 3. sect. 5.  
à die quo rup  
Aph. 15. sect.  
20. & quidem  
in septimo ter  
rentibus aliis  
est, si in pleuri  
Paria de  
quam urinari  
tamen sputa  
rò bona, mel  
moriuntur;  
contra quam  
vid. in Willis  
pleuritidis sal  
que perturbat  
plurimum les  
dens diem, sex



cretione. Vel 3. inflammationis suppuratione, ac in empyema transmutatione. Vel 4. rara ac singulari metastasi, v. g. nunc ad phrenitidem, nunc in singulares morbos articulares, nunc in ulcera tiliarum &c.

Si terminantur resolutione, vel per sudores, vel hæmorrhagias, vel aliis modis, imprimis est observandus motus naturæ criticus, quæ, si possit, potius preveniendus. Nam in diebus criticis natura sibi relicta imprimis tales instituit evacuationes. Vid. Amat. Lusit. Cent. 7. cur. 28. Piso de colluvie serosa, Valeriola l. 4. obs. 4. it. l. 7. obs. 6. Per hæmorrhagiam septimo die pleuritidem solutam, vide Forrest. l. 16. obs. 37. & pleuritis in peripneumoniā conversa per fluxum mensium die critico sanata, Id. obs. 36. & 39. &c. Pleuritica mulieres per sanguinis mictum curatæ Ferdinand. consil. 5. & pleuritis magna in gravida, post partum ob uteri exinanitionem curata, Ferdinand. hist. 13. Sic interdum superveniunt diarrhææ critica, per quas pleuropneumonia solvuntur. Sic diarrhæam salutarem pleuritidi supervenientem, vid. in Amat. Lusit. Cent. 1. cur. 7. Zacut. Lusit. lib. 1. prax. admir. obs. 105. Desperata pleuritis per alvi fluxum curata, in Valeriola obs. 5. l. 1. Nec obstat §. 16. sect. 6. Hippoc. Diarrhæam, quando supervenit pleuritidi, vel peripneumoniæ malam esse; de quò imprimis vid. Castro, quæ ex quibus p. 17. Pleuritidi si peripneumonia superveniat malum, idem Castro, p. 14. Porro in pleuropneumonia, si sputum statim appareat in initio, intra diem tertium scilicet, indicat brevem morbum; sin verò serius, longum, dict. Hipp. aph. 12. sect. 1. Qui pleuritide laborant, nisi intra 14 dies repurgentur, iis in Empyema fit mutatio Aph. 8. sect. 5. Qui vero ex pleuritide empyici fiunt, si in 40. diebus repurgentur, à die quo ruptio facta est, liberantur, alioquin in tabem seu phthisin transeunt, Aph. 15. sect. 5. Nempe pleuritis maximè ex parte die 14. terminatur, aut saltem 20. & quidem si æger quarto die exspuat album, leve, æquale, ter vel 4. tussiendo, in septimo terminabitur. Si in septimo tale sputum primario appareat, concurrentibus aliis signis bonis, morbus ultra 14. non extenditur. Periculosum signum est, si in pleuritide pulsus perdurus, frequentissimus sit.

Paria de peripneumonia quoque dicenda sunt. In specie sputorum magis, quam urinarum habenda est ratio. Utur enim urinæ sint optimæ & coctæ, sin tamen sputa sunt mala, periculosum; & contra, etiam si urinæ sint malæ, sputa verò bona, melius. Quibus angina in peripneumoniā fit conversio, intra 7. dies moriuntur; sin hos effugiant, purulenti evadunt, Hipp. Aph. 10. sect. 5. Sicuti contra quàm miræ subinde sint peripneumoniæ metastases plus minus faustæ, vid. in Willis Pharm. rat. p. 2. p. 181. Vomitus copiosus & biliosus in principio pleuritidis salutem prænunciat. Pleuritici dolore levati, facie tristi facta, oculisque perturbatis, signum est metastaseos pleureseos in cerebrum, casusque ut plurimum lethalis. Pleuritis molliter incipiens & usque ad quintum sic procedens diem, sexto verò exacerbata, interdum est lethalis, interdum difficilis. De-



*Irrium*, quod in *pleuritide* observatur, aut fortem sequitur pleuritidem, aut si non sequitur fortem, negligatur tanquam ordinarium symptoma. Si verò delirium sequatur mitiorem pleuritidem, mitiore in dolorem thoracis & per intervalla infestantem, de *metastasi* ejus in caput est metuendum. Aliquando in pleuriticis urinæ sunt malæ, cum sputis bonis & liberantur, naturâ criticè expellente malum. Nam in his morbis ex sputis magis indicium quam ex urinis sumitur. Si quidè sputi conditio signa propria coctionis hujus morbi suggerit, unde pro hujus conditione magna pars *prognoseos* instituenda est. Cætera ad *prognosin* pertinentia vid. in *Senn. dict. loc. l. in ejus Epitomatore Riverio*.

In *CURA* horum affectuum omnium I. *Sanguis stagnans est solvendus* & acidum corrigendum, tam per generalia quam specifica. II. Hoc si fieri nequeat, *excretio est promovenda*, in principio quidè per temperatâ seu incrassantia moderata, in progressu vero per incidentia, miscendo hæc variè, prout sputi conditio & expectorationis ratio requisiverit. III. Sin hæc sint frustra, *suppuratio expectanda* & adjuvanda, per pectoralia temperantia, anodynis mista.

Pro his scopis melius obtinendis *observandum*

I. Sæpe in principio morbi esse instituendam *venæsectionem*, eamque aliquoties interdum esse *repetendam*, prout urgentia affectus requisiverit. Non tamen simpliciter est necessaria, quando appropriata remedia, quæ sanguinis grumos resolvunt & sudorem movent, citra venæsectionem non rarò malum tollunt, vid. *præx. Helmont. Tractat. Pleura furens: Holsterhoff. de err. Med. c. 1. §. 2.* Ac sane per se nullum locum obtinet *V. S.* saltem ubi copiosior adest sanguis & nimis acutus, seu præceptis morbi ad statum motus: In tali urgentia per accidens interdum instituta & repetita *V. S.* aliquale levamen adfert. Sic *Lindanus* necessitate coactus, mulieri gravida intra 24 horas, quinque venam secavit, urgente nempe affectu. Propterea de tempore non multum deliberandum venit, sive vesperi, sive manè, sive medio noctis fuerit, dum necessaria est (quod tamen in nostro climate rarius evenit) instituenda est. Pluribus hanc de *V. S. in pleuritide usu, controversiam*, ventilatam vid. in *Hochstettero decad. 7. p. 107.* Ubi ergo secanda est vena, eadem pro usu *revulsionis* instituat in pede, si est *pleuritis ascendens*, aut in brachio, si est *descendens*. *Aversionis* gratia secetur in pede vena oppositi lateris, si est *descendens*, in brachio verò, si est *ascendens* est. Quibus paucis prolixæ istæ controversiæ de loco *V. S.* quas agitarunt veteres insigni fervore, decidi possunt. Conf. *Willis. Pharm. rat. P. 2. p. 104.* Præstat autem ut *V. S.* fiat multis vicibus, nec longis intervallis, neque magna quantitate, ut loquitur rectè *Hildanus*. In *peripneumonia cura* *V. S.* nec revulsoria, nec averforia, nec derivatoria locum habet, quia pulmo cum nullis vasis communicat, sed sua propria habet; Quod igitur à corde recipit, ei deniq; iterum remittit. Nō igitur ulla hora

hora præstari  
inminuenda  
in benigna,  
specifica. In  
mici. loc. fil  
maligna ven  
funt curati.  
lem in malign  
arbitror, ut  
Obs. cap. 21  
salutarem,

II.

malum per  
ante diem se  
præcedente  
hoc Zacuto  
dicat Ruland  
maximè ex u  
refert à se cur  
Sane per se

excrementa  
tali casu prin  
ptionem, ve  
conducere pe  
monia non a  
trculus onul  
pulmonem, f  
cem, nempe  
nil enim pu  
rhaa accidit  
tur nec opus

III.

marium est  
id quod omni  
mos pleuritic  
multo cistere  
Empl. diaspul



hora præstari potest, sed sanguinis tantum fervor mitigandus & ejus quantitas imminuenda, adeoque fiat in brachio. Interim sapissime & ferè tutissimè *pleuritidis benigna*, absque V.S. curari potest, per diaphoretica, volatilia præsertim & specifica. In *maligna enim pleuritide* V.S. vix locum invenit. Refert *Bartholæus cit. loc.* sibi diuturna praxi esse compertum, omnes ferè, quibus in pleuritide maligna vena tunditur, mori: E contra periculo defungi, qui sine phlebotomia sunt curati. Vid. etiam *Gesnerus l. 1. Ep. p. 19.* qui asserit venæsectionem esse inutilem in *maligna Epitēmica*. Vid. ejus *observationes*. Quod sanè in malignâ verum arbitror, ut in Epidemica non adeo semper locum inveniat. *Dodonæus enim Obs. cap. 21. p. 38.* refert, in pleuritide Epidemica administratam venæsectionem salutarem, neglectam lethalem.

II. *Purgatio* in Pleuritide non convenit, nisi ad *declinationem* malum pervenerit. Et si interdum conveniat purgatio, ut plurimum tamen ante diem septimum perniciosa est. vid. *Riv. Cent. 1. obs. 98.* imprimis verò præcedente sputo abstinendum à purgatione, per experientiam confirmante hoc *Zacuto Lusit. l. 1. Prax. Admir. obs. 107.* Quicquid etiam in contrarium dicat *Rulandus*, præsertim in *Thesauro Practico* p. 129. ubi defendit acriter, quàm maximè ex usu esse, in principio pleuritidis fortem purgationem & exempla refert à se curatorum, plerumque per vomitum & secessum, ex *▽ benedicta*: Sane per se *Vomitoria* nil valent in pleuritide, per accidens verò, ubi vitiosa excrementa, in specie acidum & æruginosum in primis viis stagnaverit. In tali casu primo in principiò prodest vomitus; deinde factò abscessu ad ejusruptionem, vel hoc rupto ad ulteriorem puris evacuationem vomitus aliquid conducere potest. Benè hic differit *Lindanus*, dum dicit se, in cura peripneumoniarum non audere vomitorium dare, nec video, quod possit, nisi statuatur ventriculus onustus æruginosa cruditate, à qua sanguis vitiatum impetum faciat in pulmonem, sed in tali casu non respicerem ad peripneumoniam, sed ejus radicem, nempe ventriculum malum. Ita nec in progressu vomitoria conveniunt, nil enim pulmonibus nocentius. Si enim intempestivè purgentur, diarrhæa accidit, cum alvus per se mollis sit; illa autem accedente, sputum non coquitur, nec opus maturatur, & pereunt ægri.

III. Ex omnibus auxiliis, quæ huic morbo mirificè opitulantur, primarium est *sudor*, qui ex toto corpore, & imprimis ex thorace provocatur, id quod omnes elegantiores Practici fecerunt, vid. *Fabr. cur. 8 60. &c.* qui plurimos pleuriticos curavit per sudorem, cum *℞. diaphoret. ad ℥j.* propinato, præmisso *clystere*, interdum etiam *venæsectione*. applicando *externè bals. sulph. cum Empl. diaph. Rulandi*. Confirmat hoc pariter *Hillerus Cent. 1. cur. 52.* *Renæ-*



*mus obs. 32.* qui pleuriticis aliquor, secta vena, flores & diaphoreticos exhibuit & statim prodeunte sudore omnes dolores punctorii abierunt. Et sanè ipsa natura, vel viam monstrat, toties per sudores spontaneos pectoris curans inflammationes.

IV. Malè quidem mox in principio præscribunt Practici *expectorantia*, seu quæ tussiendo expectorationem promovent. Nam talia cum tussim stimulent vel adjuvent, concussionem thoracis pulmonum ac pleuræ inferunt, quibus in principio exasperantur hæc mala, ut rectè observavit *Gabelkhoverus*. Et hæc inter remedia, quæ *sputi coctionem*, aut *suppurationem* inflammationis faciant, malim, dicit *Lindannus*, decocta pectoralia, quam syrupos & saccharum. Nobilissimum pectorale habemus in *liquiritia* & *passulo*. Saccharum malè pectoralibus additur. Nam constat, omnia dulcia saccharata & mellita facilè acescere in ventriculo, cui nil inimicius, quam illud sylvestre acidum. Præscribuntur ergo radices & herba pectorales, sed omittantur semper ista dulcia, nec credatis, gaudere pectus *dulcibus*; gaudet equidem insipidis & quæ non habent qualitatem excedentem, non dulcibus extremè, ut saccharum &c. *Liquiritia* igitur convenit; quæ tamen in pauca quantitate sumenda, cavendo ne uratur, tunc enim prava & acris fit.

V. *Opiata* non negligenda sunt in cura harum inflammationum, sed usurpentur saltem in principio & incremento, saltem ad suffocandam nimiam morbi vim & sistenda pathemata dolorosa, quæ ipsa quoque ad corrigendam materiæ expuendæ cruditatem, adeoque eandem coquendum seu incrassandam multum præstare solent. *In statu verò* vitanda sunt, ne impediatur expectoratio, atque materia cocta nimis pertinaciter sic inhæreat, id quod sine suffocationis periculo vix fieri potest. Solum *papaver rhæas* ejusque flores ceu optimum *specificum* in toto morbi decursu locum habet.

VI. Benè observandum est, ut omnia, quæcunque ægri *bibunt*, *calide* assumant. Nil nocentius est in his affectibus, & quod magis exasperare eosdem solet, quam *frigidus potus*, qui coctionem impedit, excretionem remoratur, tussim provocat, inflammationem intendit & lædendo pulmones respirationem difficiliorem facit; quæ omnia in *calido potu* contrario modo se habeant. Est autem potus optimus *decoctum hordei* & *liquiritiæ*, idq; in toto morbi decursu, it. *decoctum papav. rhæad. c. syrup. scabios. aut violar. aut capillorum Q. is.* In contagiosa seu maligna *decoctum rasuræ CC. erudi. cum vel sine floribus papaveris*, aut etiam cum *sarsa parilla*, optimum est potulentum.

Præmissa igitur vel omissa venæsectione progrediendum statim ad *specificam antipleuritica*, circa quæ notandum, quod eadem sint, quæ in

dysen-

dysenteria alias  
specificæ, quæ  
tum inflamm  
pelaceæ. A

flor. rubr. C. L.  
pliciam, in sp  
gulatim hæc  
pulv. syr. & c

Item.

Quoad succu

De hac mistu  
ejus mirabin  
grumosi sang  
dem. 1. Exte  
[permaterana  
continuando  
te D. autum  
catæ & pulve  
bardana titè p  
venit. Priapi  
Pars II



*dysenteria* aliàs locum habent, ut rectè loquitur *Helmont*. Deinde quod omnia ea *specificæ*, quæ conveniunt in *pleuritide*, etiam in aliis quibuscvis internarum partium inflammationibus prosint, cum omnes ejusdem sint naturæ, sæpius *Erysipelaceæ*. *Appropriata* talia, ex regno vegetabili, sunt *papaver rhæas*, bellis

*flor. rubr. C. B. Card. Mar. papav. alb. cerefolium*, aquæ destillatæ istorum simplicium, in specie  $\nabla$ . *flor. acac. \nabla. flor. papav. rhæad. & aq. flor. chamom.* Singulatim hæc tria: *papav. rhæas, C. B. & Card. Mar.* sunt optima exque his parati *pulv. syr. & ex sem. C. B. & M. Emulsiones*, v. g. in statu Peripneumoniæ

$\mathcal{R}$ . Sem. card. bened.

Mariæ.

papav. albi an.  $\mathfrak{z}$ ij.

c. l. q.  $\nabla$ . flor. papav. rh. F. Emuls. adde

dent. aprorum præp.

mandib. lucii piscis præp.

$\mathfrak{z}$ . diaph. an.  $\mathfrak{d}$ j. M. edulcoretur parum D.

S. Stärckmilch gegen das Seitenstechen.

Item.  $\mathcal{R}$ .  $\nabla$ . chærefol.  $\mathfrak{z}$ ij.

Syr. papav. rhæad.  $\mathfrak{z}$ iss. ad  $\mathfrak{ij}$ .

bezoard. miner. gr. xvj. M. D.

S. Träncklein gegen das Seitenstechen.

Quoad succum *Taraxaci* vid. *Mistur. Barbette in sua praxi pag. 88.* quæ hæc est:

$\mathcal{R}$ . Succi *Taraxac.* depurat.  $\mathfrak{z}$ j.

aq. plantag.

rosac. an.  $\mathfrak{z}$ ij.

prophylact. nostr.  $\mathfrak{z}$ ss.

ocul. 69. crudor. contusor.  $\mathfrak{z}$ ss.

Syr. papav. errat.  $\mathfrak{z}$ iss.

M. in phiala.

De hac mistura sumat æger quovis quadante horæ duo cochlearia, operationē ejus mirabimini. Quoad radic. verò *Bardana, Castro Veronensis* cum sumā copā grumosi sanguinis, per sputum intra biduum rejecti, absq; V. S. curavit pleuritidem. 1. Externè applicando & singulo bihorio renovando lintea duplicata cum *spermate ranarum* non destillato, sed per se servato, applicando & ita per biduum continuando. 2. Internè radice *bardana* seu *Lappa maj.* vere collecta, crescente  $\mathfrak{D}$ . autumno verò decresciente  $\mathfrak{D}$ : Servantur radices, ac in umbroso loco siccatæ & pulverisatæ dantur, dos. cochl. j. in vitrō vini generosi; vel decoctum *bardana* ritè paratum, ceu appropriatum sudoriferum, pleuropneumonicis convenit. *Priapi Ceti & cervi* commendantur quoque ad pleuritidem, quorum ra-

Pars II.

o

forum



forum pulv. ad ʒj. assumitur, aut ex iis paratum decoctum, ceu corpus Juleporum optimè propinatur. Hinc & Barcholetus in pleuritide maligna, *rasuram priapitauri* commendat, cui tamen revera *cervinus* præferendus.

Conveniunt ulterius partes animalium duræ, & *volatili* turgidæ, præsertim in principiò & multò magis exinde parata *via volatilia* & *spir. urinosi*, mediante sudore faustissima remedia, qualia sunt *dens apri*, aut *dens castoris*, *mandibula lucij piscis*, aut qualibet *ossa capitis lucij piscis*, *lap. carpion*, & *percar*; hincque alia genera *marina* &c. Ex quibus speciatim *dens apri* & *maxilla lucij piscis*, *lapis carpion*, & *percarum*, hincque alia genera *marina* &c. primatum ducunt, ad ʒß. præter propter propinata. In sanguine hirci legitime præparatò, experimentissimum remedium contra pleuropneumonas, ad ʒj. propinatum. Methodum parandi legitimum, beneficiò abscissionis testium ex hirco vid. *Helmont. Tr. sextuplex digestio Tr. 75.* & hinc à *Zwelf.* quod si ab ejus usu non statim sequatur levamen, repetatur aliquoties. Pariles virtutes habet *sanguis leporis* ritè collectus, si nempe à canibus in venatione captus, vivus stranguletur laqueo, ut sanguis in alvum fluat & grumescat, aperitur postmodum & sanguis in fumo ficcatur dos. ʒß. ad ʒj.

Nec animalium *stercora* hic sunt relinquenda; præ cæteris exquisitissimum, præsertim apud Anglos, *stercus equinum* masculi, si scil. pila una stercoris hujus excreta benè exprimatur & succus expressus propinetur, mox in principiò & quò citiùs, eò meliùs. *Conf. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 181. & 209.* Secretum vero Magnatum ad curandum pleuresin est *pulv. stercoris columbin.* ad ʒß. in liquore conveniente. *Conf. Panarol. Pentecost. 4. obs. 14.* aut macerentur hæc *stercora c. papav. rhead.* & hinc facta expressione propinentur. Ab aliis admodum extollitur *stercus ovillum*, nempe hoc vocat remedium nobile *Lindannus.* R. *Stercor. ovill. pilam*, subigit in mortariò c. aq. papav. errat vel. card b. f. scabiosæ, & exhibet statim in principiò. Nam dicit, præstat id ob θ. nitrosum; habent enim *stercora* copiosum θ. cum. Pertinet huc, ratione *salis vol. fuligo furni*, quæ est specificum pleuriticum *Horstii junioris*, dum *fuliginem* benè tritam lavat ∇. *st. sambuc.* exliccat, & dos. ʒß. ad ʒj. in *acetò sambuc.* vel *insuf. papav. rhead.* propinat, expectando sudorem. Sic pleuritidem sævam *pulv. fuliginis camini* ad ʒß. in *aq. card. bened.* die septimo curatam vid. *Riv. Cent. 2. obs. 89.* Denique quoad *regnum minerale*, excellit imprimis *spir. nitr. dulcis* seu potius *spir. antipleuriticus*, dum nempe *spir. nitr.* digeritur & cohobatur aliquoties à speciebus antipleuriticis, & hinc c. *spir. nitr.* postmodum mistus & invicem destillatus, egregium est remedium antipleuriticum, loco cujus paratur à quibusdam non inconeinnè *tinctura bezoard.* R. *Loco spir. vitr. spir. nitr.* & ita ulterius lege artis procedendo, nobile remedium ad ʒj. in ∇. *appropriata*, has inflammationes sudore mediante levans. Sulphur ejusque flores optime pariter conducunt.



cunt. Hinc pulv. pyrius egregium remedium contra pleuritidem, ad ℥j. propinatus, tam nitri, quam sulphuris ratione. Pertinent huc quælibet *sulphura fixa*, & hinc etiam *cinnab.* ℥ij. *℥. diaph. bezoard.* *Stiale, bezoard. solare calcinatum* &c. Hisce denique accensetur *sperma ceti*, tam in principiò, quam incremento ad materiæ coctionem multum conferens, unde *sperma ceti c. castoreo* mistum feliciter adhibuit *Timaeus in Cas.*

Hicce remediis subinde reiteratis, si non succedat per inflammationis diffusionem, adeoque diaphoresin morbi solutio, adjuvanda venit materiæ intra pulmones partesq; vicinas congestæ alteratio sive coctio & hinc expectoratio, cum videamus ad hoc inclinare naturam & copiosam materiam successivè agros rejicere. Hic conveniunt aliàs nota, primò *temperantia* seu *incrassantia* & deinde abstergendo & blandè incidendo *expectorantia*, v. g. *decoctum hordei* cum *glyzorrhiza* & *syr. violar.* est optimum conveniens, nam tum temperata requiruntur: Cum vero copiosius sputum apparere incipit, usurpandum venit *decoctum hyssopi* cum *melle rosæ*, ad promovendam excretionem. Nempe ad coctionem hanc imprimis facit *ol. sem. lini*, & hinc *oleum amygd.* sed recenter expressa, tam à Veteribus, quam à Modernis Practicis experientia duce laudata, nempe *Tachen. Hippocr. Chym. l. 2. p. 101. spiritum vini camph.* & *crocatum c. ol. lini* datum raro fallere asserit. Vel ℞. Olei lini rec. expressi ℥ij. *syr. viol.* ℥ij. *hyssop.* ℥ij. v. l. vj. &c. ℥ij. l. iij. pro dosi, aliquoties in die; vel saltem ol. lini rec. f. *Δe extractum*, c. saccharo mistum & ita exhibitum, egregiè confert. Aut ℞. Olei lini expr. ℥ij. propinentur in quocunque vehiculo. Vel ℞. Ol. lin. ℥ij. pulv. dent. apri ℥j. M. & ita propinetur præsertim in principiò. Hujus loco *ol. amygd.* sed recens ab ℥ij. ad iij. propinatum crebrius, egregium est, emollit, doctorem lenit, expectorat, subducit alvum &c. *Conf. quotquot sunt Practici.* Pertinet huc *experimentum Quercetani*, quod est pomum ex cavatum & ℥j. thuris repletum & ita ad ignem coquendum, hinc deglutiendum & edendum. *Vid. etiam River. Cent. 1. obs. 66. & Cent. 2. obs. 63.* Quidam intromittunt ℥j. thuris & superaddunt simul ℥j. flor. sulphuris & ita coctum assunt: ℥j. thuris & præstantissimum remedium dicit *Fonseca l. 2. Consil. 35.* Aliàs ad sputationem promovendam profunt *decocta pectoralia*, uti sunt *decoctum hordei*, rad. liquirit, scabios, c. *hyssop. viol. tusil.* & *papav. rhæad.* in specie *syrup. de junc.* quæ egregiè temperant acres succos & expectorationem blande promovent. Quod si facta coctione fortius expectorandum sit, radix *helen. mel ros. syr. Nicotian.* aliaque similia modo dictis addenda sunt. In specie *spiritus vitrioli dulcis* moderata dosi modo dictis remediis additus, multum ad expectorationem materiæ coctæ promovendam facit. In specie *mulsa* in difficili anacatharsi per sputum, princeps est remedium, cui simul *specificæ variæ ac pectoralia* incoqui possunt.

Quod si nec per sputi expectorationem definant pleuropneumoniæ, ne-



cessu est, ut successivè suppurentur inflammationes & abeant in perfectum abscessum; circa quem 1. suppuratio promovenda. 2. Abscessus perfecta ruptio adjuvanda. 3. Abscessu aperto, partis ulcerosa mundificatio & consolidatio, ac simul puris excretio instituenda.

*Suppuratio* hæc in Pleuritide frequentius contingit, in quâ nunc saltem apostemata colligitur *intra pleuram*, idque frequentius, nonnunquam simul ex parte *intra pulmones* istius lateris, idque rarius. Nam hoc revera sputo solvitur, dum illud sæpius suppuratur. Semper tamen in suppurationis hoc negotio ad utrumq; respiciendum. *Pleuritis suppurata intra pleuram*, nunc rupto abscessu intra cavum thoracis fluit, nunc intra saccum ex dilatata pleura colligitur. Pro-  
 „ be hoc observavit *Lindanus* qui dicit: Autores semper crediderunt, suppurati-  
 „ one facta pus semper infundi in cavitatem thoracis, atque *Empyema* fieri.  
 „ Verum sæpe tantum est collectio puris, in parte ante affecta, quod vidi in filia  
 „ *D. Pisonis*, quæ in Pleuritidem incidit, quæ in suppurationem transit. Locum  
 „ Chirurgus candela cereâ exploratoria exploravit altè, sed inde nihil potuimus  
 „ colligere. Nam puella mortua cum dissecta fuerit, invenimus membranam  
 „ succingentem pleuram dilatam in immensum saccum, in quo subsidebat  
 „ omnis purulentia. Illud tamen magni Medici hæc de re consulti, omnes esse  
 „ putabant. Verum hæc frustra fuit paracentesis facta & miserè obiit. *Ad ma-*  
 „ *turationem* ergò abscessus, internè optimus est *Syr. de Nicotiana, de hedera terr. &*  
 „ *Symphyto Ferneli*. It *Empl. ex lacte & cremore malvarum*, mire maturat & rum-  
 „ pit abscessum: Vel convenit etiam *empl. Zacharie* externè applicatum; vel appo-  
 „ nuntur *Cataplasmata* ordinaria, ad maturationem abscessuum usitata.

*Ubi facta suppuratio*, opera danda, ut *abscessus rumpatur* & pus evacuetur. *Apertionem* abscessus factam, cognoscimus ex spuitione puris & ichore plus minus cruento. Ut autem rumpatur, seu aperiatur abscessus in tempore, optimum remedium est, si vomitus aut sternutatio exciteretur & patiens altâ voce clamando, de latere in latus se volvat. Optimum esset, ut quoties certi essemus de maturato abscessu, saltem perforentur spatia intercostalia, cum hoc se- cure fieri possit, modo locus, in quo abscessus continetur, certè & exactè cognosci possit. Neque enim in eo loco, quo in empyemate & pure jam in thoracis cavitate collecto, sectio fieri solet, apertio instituenda, sed ex pondere, dolore & calore locus, in quo abscessus hæret investigandus & intra duas costas leniter aperiendus &c. sed cautè omninò procedatur. Quæ apertio quoq; saltem in abscessu intra pleuram locum habet: Si in pulmonum quodam lobo simul suppuratio fiat, necessariò empyema expectandum venit. *Ferdinandus in hist. medic. 32. & 45. Decoctum Tabaci* & illius sumum, mirum esse medicamentum ad rumpendam vomicam suppuratorum, seu empyematicorum esse dicit. Er testor Deum

Deum, me at  
 mentes pleurit  
 p. 3. dies & a  
 diebus ruffi ex  
 bulliant in 7.  
 malo. branc.  
 lum pluries.  
 tis & fumus  
 ulum subind

Facta erup  
 abscessus  
 quibus scopi  
 quæ & alia  
 succus, syrup  
 suppuratos.  
 in empyemati  
 aliarum partiu  
 minitantes,  
 phibit pulmon  
 mate monebat

Inter  
 puncturam, ac  
 eatur sperma  
 egregius; ve

Simplex est Ur  
 pariter observ  
 subinde soleo  
 luto etiam ap  
 pmo medinem

Quibusdam



Deum, me annō elapso à morte revocasse mulierem, quæ jam erat per tres menses pleuritica suppurata, cum febre hectica, quæ ab istius decocti assumptione p. 3. dies & ab hujus fumo accepto, tribus vicibus plus lbvj. puris albi, tribus diebus tussi evomuit & nunc sana est. *Decoctum* est hoc: R. fol. tabaci ʒij. bulliant in ∇. dulcis lbij. ad consumptionem medietatis, addendo in fine fol. malv. branc. violarum an. Mj. colentur & c. sapa misceantur & detur calidiusculum pluries. *Fumus* vero est R. fol. tabaci, reponantur in cineribus adhuc ignitis & fumus per fistulam seu embolum assumatur, cum quibus & terebinthina usum subinde adhibuit.

Facta eruptione puris in thoracem, præter remedia pus expectorantia, simul ad *abscessus mundificationem & consolidationem* respiciendum; quibus scopis remedia ex *Nicotiana, hed. terrestri, charesol.* sunt optima. Præter quæ & alia vulneraria sunt simul associanda, in specie *hed. terrestris* ejusque *succus, syrupus, pulv.* decoctum, aliis merito præferenda remediis ad curandos suppuratos. Egregiè enim *apostema mundificat* & denuò consolidat, ne æger in empyematicum desperatum & hinc phthisicum transeat. Id quod pariter in aliarum partium læsionibus, ab inflammationibus residuis, phthisin plus minus minuantibus, locum habet. Nempe omnia huc referenda sunt ea, quæ *supra, de phthisi pulmonali* ex eorum exulceratione, monuimus & etiam *infra de Empyemate* monebantur.

Inter *symptomata* pleuriticis vexantia præ cæterisurgens est *dolor punctorius*, acutus, mirè excrucians ægros. Pro quo leniendo in principiò applicatur *spermaranarum*, bono c. successu. It. *S. V. camphoratus* aut *crocatus* est egregius; vel illinatur *unguentum pleuriticum Mynsichti* pag. 485.

Vel R. Unguenti dialth. ʒij.

ol. amygd. d. ʒij. M.

Simplex est Unguentum, sed expertum à *Rulando & Zacut. Lus.* cujus effectum pariter observavi, si singulis bihoriis ad summum loco dolentis illinatur; addere subinde soleo aliquid *camphoræ* ejusque *olei*, meliori cum effectu; *Empl. de meliloto* etiam applicari potest; *pinguedo muris montani* (cui posse substitui arbitror *pinguedinem hircin.*) est experimentum *Paracelsi*, qui

R. Pingv. muris montan. ʒij.

olei chamom.

rosar. an. ʒij.

amygd. d. ʒij. M.

Quibusdam *Empl.* secretum est hoc:

R. Picis naval. ʒij.

sulph. trit. ʒij.

cera flav. ʒvj.

tereb.



rereb. clara ꝑß.

ol. chamom. q. s. M.

Primo secetur vena, secundo detur papav. rh. Tertiò empl. hocce applicetur.

Quoad *Pleuritidem notham*, prima ista, quæ est ab inflammatione partium externarum internis diaphreticis ad quaslibet inflammationes supra laudatis, & externis sacculis ac fomentis discutientibus levatur.

Altera ista ab acido acri intra pleuram solitarie collecto, per diaphoretica bia volat. cum opiat. mixta tollitur; in specie spir. θ\* ci anisat. cum dimid. essent. opii mixtus & propinatus, expectando sudorem, bene confert.

Tertia ista *verminosa*, optimè curatur per ∇m ꝑ ialem seu hermeti- cam, paratam ex ∇. C. B. in qua bene agitatus fuerit aut aliquantum bullierit ꝑ vivus. ∇. ista cum ꝑ io præparata & propinata, exturbat vermes & curat ægrum.

Ut omnia hæc fiant illustriora, *exemplo* rem declarabo. *Vetula* 42. annorum pleuritide desperata correpta, septima die opem postulat, tussis gra- vis, excretio viscida, nonnihil sanguinolenta, dolor in latere dextro, qui prius fuerat in sinistro, palpitatio cordis, sudor frigidus in peripheria corporis, pul- sus quinta qualibet vice intermittens, omni momento suffocanda videbatur, si- ris clamosa, vox rauca &c. Præscribo

℞. ∇. papav. rh.

c. b. ana ꝑß.

Mandib. luci piscis præp. ꝑj.

θ. volat. mand. lucii pisc. præp. gr. xij.

laud. opiat. ferment. gr. ij.

syr. scabios. ꝑjß. M. capiatur cochleatim;

exinde mirabile levamen perceperat.

Jam igitur ut expectorationem melius promoverem

℞. ∇. Scabios.

hyssop. an. ꝑß.

spir. θ\* ci anis. ꝑß.

syr. scabios.

violar. a. ꝑß. m. capiatur cochleatim

Cum egregiè quidem & copiose viscida rejiceret, tamen de *anxietatibus* repe- tentibus, ut & *doloribus* intensè recrudescentibus, denuò conqueri cepit, cum *respirationis difficultate*, ob id

℞. ∇. papav. rhæad.

card. b. ana ꝑß.

lap. ∅ præp. ꝑj.

θ. vol. mandib. lucii pisc. gr. xv.

laud.

Ratione dol

Reliquias f

Sed cum tu

phthysicos, c

capiat mane

pererant sua

Unde & hæc

Vir at a

post 3. pullat

Potiuscular

fed altera vic

bus volatilib

ut moribund

recrudescet

& delirum &

liquias expu

hujus conti



*De Pleuritide & Peripneumonia,*

111

laud. opiat. ferment. gr. ij.

syr. papav. rhæad.

scabios. an. ℥vj. M.

*Ratione doloris pectorii*

℞. Ung. dialth. ℥j.

ol. amygd. d. ℥ss.

destil. cumin. ℥j.

camphor gr. ix. M. profuit. His continuatis sanata fuit.

Reliquias succus raphani cum saccharo per copiosam sputi excretionem absolvit. Sed cum tussis & alia superessent, symptomata, adeoque metus imminens phthiseos, ob id

℞. Charesfol. & heder. terrestr. an. q. v. incis. coquantur in cerevis. capiat manè & vesperi haustum, continuetur aliquandiu, bene profuerunt. Supererant sudores nocturni continui, emaciantes & debilitantes insigniter

℞. Antihect. Poter. ℥j.

laud. op. gr. iß. M. capiat sub introitu lecti.

Unde & hæc symptomata evanuerunt.

Vir ætatis consistentis gravi pleuritide correptus, cujus pulsus cum semper post 3. pulsationes intermitteret, præscripti octava demum die vocatus

℞. ▽ papav. rhæad.

scab. an. ℥iß.

⌘ diaphoret. ℥ss.

syr. Nicotian.

scabios. an. ℥vj.

spir. nitr. dulc. q. s.

Potunculam hanc bis usurpavit, prima vice sensibile levamen exinde percepit; sed altera vice mire recruduit morbus (sicut aliàs superiores potiones cum sibus volatilibus magis proficuas observavi, quam has cum spiritu nitri dulci) ut moribundus videretur omnibus & semper quidem circa vespere morbus recrudescerebat, præcedente gravi rigore, insequente vehementissimo, sub quò & delirus & summe imbecillus evadebat, unde 10. die præter propter præscribo

℞. Sem. C. B. ℥iij.

c. aq. papav. rhæad. & scabios. an. q. s.

F. Emulsio, adde

mandib. lucii pisc. ℥ij.

sal volatil. mand. luc. pisc. gr. xij.

edulcorentur saccharo M. capiatur cochleatim; mire profuit. Reliquias expurgandas jussi, succo raphanicum saccharo, pro expectoratione; sed hujus continuò & nimio usu diarrheam & quasi lenteriam incurrit: Hinc

℞. Spir. sal. dulc. ℥ij. dos. 25. gutt. bis in die; bene contulit.

Sed



Sed propter calorem vesperi recurrentem, sudorem nocturnum copiosum & tussim continuam

R. Antihectic. Poter.

flor. sulphuris an. ℥℥. M. pro 2. dos. continuetur aliquoties.

Hisce diebus occurrit juvenis inflammatione sub axillis insigni correptus; facta post aliqualem suppurationem apertione, supervenit altero ab hinc die inflammatio, quæ medium pectus occupabat, cum dolore ad tactum sensili, respiratione difficili, ita ut ferè erectus in lecto subsistere cogeretur. Erat pleuritis notha primi modi ex Sennerto, quæ facillè curata fuit, per potiunculam ex lap. & cum ac. dest. supra de inflammationibus in genere usitatam. Vid. supra, quam bis usurpavit cum blando sudore.

Aliquando gravis pleuritis notha secundi modi occurrebat in aliò, cum dolore gravissimo punctorio.

R. ▽ Scabios.

card. ben. an. ℥℥.

spir. 8\* ci ℥℥.

essent. opii ℥℥

corall. rubr. præp. gr. xxiiij.

syr. scabios. ℥vj. M. capiaturn cochleatim.

## INFLAMMATIO HEPATIS.

Inflammatur etiam Hepar, quod totum exinde interdum degenerat in abscessus, ejus parenchyma devastantes; vel abscessus isti in ulcera maligna aut gangranam lethalem abeunt. Vid. Obs. Schenck. item Forest. l. 19. obser. 10. Rariores equidem sunt tales inflammationes, & in specie quoad causas externas est contusio & casus ab altò in latus dextrum; item ab emplastris & unguentis nimis calidis, hepatis regioni affixis, hujus inflammationem abortam observat Hildan. Cent. 7. obs. 46. 47.

Cautè autem considerentur omnia symptomata, quæ sunt admodum diversa, dum inflammationem hepatis comitantur, prout nempe inflammatio est vel in parte gibba, vel convexa, vel prout eadem est in parte concava sive sinistra. Nam si est in gibba parte, urgent ferè symptomata pleuritidem mentientia: Si in parte concavâ, urgent magis symptomata ventriculi & intestinorum. Non facillè hepar inflammatur, aut si inflammatur, febris tamen & æstus ac cognata symptomata non adeò intensa sunt, quam pro ratione partis esse deberent, quia nempe

nempe hepar  
à sanguine arte  
alias Hepat  
vatum, circa  
ro & tensivo,  
brus adelt, min  
tio. Nam per  
comitatur.  
adelt, decub  
ferè lupini ja  
qua arida, ca  
dolor ad jug  
tim dum veh  
mediante lig  
alligati.

Quod si  
perpetuo sing  
vero pars gibb  
latus est diffi  
partes ad jug  
tes thoracis  
affecta, in o  
pro colica à  
quoniam pl  
dam confun  
Zacut. Lusit.  
specie, si plen  
cum Hepatit

Di

sit longè ac  
hepatis infl  
sit in pleuri  
hepatitè est  
tus, quin  
quali deor  
etiam non  
ritide appar  
Pars



nempe hepar parvam habet arteriolam; jam vero in omnibus inflammationibus à sanguine arterioso magis, quam venoso, intendi solent symptomata. Vocatur alias *Hepatitis*. In genere comitantur inflammationem Hepatis *sensus gravativus*, circa ejus regionem in dextro hypochondrio, cum dolore simul obscuro & tensivo, qui *sub suppuratione punctorius* plus minus evadere solet. Mox *febris* adest, minus tamen fere acuta, sed sæpius *lenta*, prout nempe est inflammatio. Nam perpetuò inflammationis magnitudinem vehementia febris analogicè comitatur. *Tussis sicca* seu inanis per intervalla affligit: *Difficultas respirandi* adest, *decubitus* in latere affecto est *difficilis*, non secus ac in latere opposito, unde ferè supini jacent ægri, *pulsus* celer, frequens, inæqualis, *sitis* intensa, *anorexia*, *lingua arida*, *calor mordax* totius corporis &c. Quod si major adsit inflammatio, dolor ad jugulum adscendens percipitur, quasi ad inferiora traheretur, præsertim dum vehementius æger inspirat, idque propter pondus epatis inflammati, mediante ligamento lato diaphragmati, juxta connexionem hujus cum corde, alligati.

Quod si pars ejus *cava* afficitur, *singultus* frequens oboritur, adeò ut ferè perpetuo singultiant, *vomitus* materiæ bilosæ interdum & *diarrhæa* adest. Si vero pars *gibba* afficitur, acris est dolor circa cordis foveam, decubitus in dextrum latus est *difficilior*, dolor ex pressura exacerbatur, *tumor* manifestius apparet, partes ad jugulum dextrum, deorsum trahi videntur & symptomata cætera, partes thoracis apparenter affectas sequi videntur. Contrarium vero in *parte cava* affecta, in qua ipsa interdum *dolores ventris* concurrunt, ut inflammatio hepatis pro *colica* à quibusdam habita fuerit. Exempla vide in *Hildano Cent. 2. obs. 48*. Et quoniam *pleuritidem* subinde mentiri videtur, ita ut etiam cum hac à quibusdam confundatur, de quo vid. *Panarol. Pentec. 1. obs. 13* it. *Forestus l. 29. obs. 12*. *Zacut. Lussit. 2. Med. Princ. Hist. 101*. propterea probè discernenda sunt, & in specie, si *pleuritis* circa costas nothas dextri hypochondrii afflixerit, facillimè cum *Hepatitis* confundi potest.

*Distinguntur* tamen ex eo, quod dolor punctorius in *pleuritide* sit longè acutior, in *hepatis inflammatione* parvus vel nullus, ita etiam spiratio in hepatis inflammatione est *difficilis*, exspiratio vero facilis, cum utraque *difficilis* sit in *pleuritide*; tussis longè vehementior ac ferè humida est in *pleuritide*, quæ in *hepatite* est mitior, arida &c. Pulsus *pleuriticorum* est durus, ac, ut vocant, *ferratus*, qui in *hepatide* magis ad undosum accedit. Denique pondus gravans & quasi deorsum tundens thoracem, percipitur in latere dextro, in *hepatide*, ubi etiam non raro tumor renis quidam tactu percipitur; quæ minus in *pleuritide* apparent.



Porro *musculorum abdominis inflammatio*, juxta hypochondrii dextri regionem etiam subinde cum *hepatide* confunditur. Meretur ut evolatur *Valeriol. l. 4. obs. 5. it. Bartholin. Cent. 2. Epist. 45. p. 549.* ubi prostant notabilia exempla inflammatorum musculorum, loco hepatidis curatorum. Sed *differentia* patet, quod in musculorum inflammatione ad-  
 est *dolor pulsatorius*, qui nullus aut saltem exiguus est in inflammatione hepatis, propter parvam ejus arteriolam; pectoris quoque symptomata in *musculorum abdominis inflammatione* absunt. Denique tactus percipit *tumorem* circumscri-  
 ptum, nec adeo nimis profunde situm, extuberantia quoque magis sensilis ob-  
 servatur. Interim tamen, quod rectè monet *Sennertus*, cavendum, ne fallamur, si  
 N tumor in medio ventre appareat, cum quibusdam etiam hepar ad medium ven-  
 tris extendatur. Sed quoad hæc confer imprimis *Sennertum l. 3. pr. ubi de hepatis inflammatione*, ejusque Epitomatores *Riverium*.

Pro majore dictorum illustratione placet *exemplum* notabile *aposte-  
 matis in jecore, ex Coitero ejusque Observationibus Anatomicis* subungere, qui  
 „ ita dicit p. 120. Civis quidam Norimbergenfis natus annos 42. totus choleri-  
 „ cus, leni tussi correptus, de molesto quodam hypochondrii dextri dolore,  
 „ edendi appetitus amissione, totius corporis languore, æstu, affatim & plerum-  
 „ que post cibum faciem, manuum palmas pedumque plantas invadente & oris  
 „ ariditate, conqueri cepit. Vi morbi crescente, decrescentibus viribus, corpore ex-  
 „ tenuato, totius anni spatio post, coactus fuit decumbere, tandem & me accer-  
 „ siri jussit. Inveni inter cætera febrem quandam erraticam, atque tumorem du-  
 „ rum, tensivumque in epatis regione, ad medium ventris & umbilicum usque  
 „ protensum. Febris minimè erat intensa & periodica, sed hecticæ similis, quæ  
 „ incerto tempore subinde per totum corpus diffundebat æstum solido mayo-  
 „ rem, qui interdum citius, interdum tardius remisit, magis potius quàm cibi  
 „ desiderio molestabatur, ut ferè semper hominibus, qui similibus affectibus ur-  
 „ gentur, usu venire solet. Tumor erat durus, cum magna tensione & vehe-  
 „ menti punctione doloreque ulceroso conjunctus, quamvis nulli lateri incum-  
 „ bere potuerit, tamen facilius dextro quàm sinistro, ad quod aliquid pondero-  
 „ si, in corporis commotione, prolabi sensit. Alvus erat difficilis, urina subflava,  
 „ tenuis, cum paucis sedimento eoque divulso. Punctio, quæ agro omnium  
 „ molestissima erat, nullis unctionibus, emplastris &c. remitti potuit. Tandem  
 „ barbitonfor quidam doloris mitigationem pollicitus est & apposuit catapla-  
 „ sma anodynum, emolliens & suppurans. Inde tumor crevit, efferebaturque  
 „ magis ad umbilicum & dilatabatur, ita ut quidam suspicati sint, hunc morbum  
 „ in hydropem terminaturum. Aliquot diebus post in illo dextro in conspectum  
 „ ve-

„ venit tuber,  
 „ dominis gen-  
 „ nec alia supp-  
 „ ejus restiti, a-  
 „ sticus tridac-  
 „ est, tumor d-  
 „ reptus æger  
 „ ti, cujus not-  
 „ reliqua fuit

Quoa-  
 rumque leti-  
 seam, vomit-  
 difficultatem  
 lum infert &  
 gultus super-  
 aph. 17. Hep-  
 subsistente, in

Quibus  
 pervenit prin-  
 bris ardens,  
 uruntur. Ve-  
 rupto abice-  
 Cum hepa-  
 lum est, qui-

In Clu-  
 medicatio. U-  
 ad partem aff-  
 vatur, semp-

Unde pra-  
 simplex, str-

utramque  
 exultent, m-

ma. Hinc  
 Nitro & s-  
 hoc potu d-  
 rupa violar



„venit tuber, quod barbitonfor existimavit ab apostemate intra musculos abdominis generato prodiisse, quare a pertione sua sit. Ego cum nec indicationem, nec alia suppurationis signa manifesta istuc deprehendere potuerim, conatui ejus restiti, æger vero permisit sibi lapidem causticum apponi. Hic lapis causticus triduo musculos abdominis ad peritonæum & intestina usque dispersus est, tumor desidit & durities evanuit. Eodem die aliquot deliquiis animi correptus æger moritur. Aperto corpore invenimus vomicam simæ hepatis parvi, cujus non parum putruerat, connatam, eamque satis magnam & apertam; reliqua fuere sana.

Quoad *prognosin*. Hepatis inflammatio periculosum malum & plerumque lethale est. *Quæ est in cava hepatis parte*, magis inappetentiam, nauseam, vomitum biliosum, sitim ingentem affert; *quæ in gibba*, majorem respirandi difficultatem, frequentioremsussim & dolorem usque ad dextræ partis jugulum infert & ea, *quæ in gibba parte*, gravior est quam illa quæ in cava. Singultus superveniens hepatis inflammato malus. Hipp. sect. 5. aph. 58. & sect. 7. aph. 17. Hepatis inflammatio, si dies 21. excedat & febris perduret, tumore non subsistente, in suppurationem fertur.

Quibus hepar aut lien suppuratus est, iis plerumque hæmorrhagia narium supervenit primis 7. diebus, paucis 12mo. Certissima signa inflammationis sunt, febris ardens, sitis in exhausta, lingua scabra, refrigeratio extremorum, dum interiora uruntur. Vomitus item niger & porraceus. Morti proximis ventres intumescit, rupto abscessu & frigidum sudant circa collum & faciem, atque animo linquunt. Cum hepatis inflammationem febris ardens & continua comitatur, malum est, quia vehementer viscus inflammatum significatur.

In *cura*. Eadem est hepatis inflammati cum reliquis inflammationibus medicatio. Unde ea, quæ in pleuritide conveniunt, etiam hic erunt in usu; saltem ad partem affectam, cujus tonus facile lædi potest, & amarum præsertim conservatur, semper respectus habendus est.

Unde præmissa fere *venesectione*, imprimis *diaphoretica* v. g. *mixtura simplex*, spir. nutri dulcis, & diaph. dens apri, flores sulphuris, bezoardicum & ale, utramque faciunt paginam. *Purgantia* quælibet, uti etiam *vomitiva* exulent, nitr. contra & qualibet nitrata, it. *Antihæcticum* Poterii sunt laudatissima. Hinc pro *potu ordinario* detur *Julapium*, ex decocto radic. cichor. cum Nitro & saccharo. Sed oportet dare calidum & minimè confertim. Detur pro hoc potu decoctum hordei & graminis cum rad. cichorii & tantillo liquiritiæ & syrupo violarum, aut capill. & is.



Cum his internis *externe* conveniunt *Epithemata* discutientia & ardorem compescentia, calidè tamen applicanda: Quæ inter est S. V. blande *camphoratus*, cum linteo multiplicato applicatus, à *Keslero* laudatus.

Vel R. ∇. hyoscyam.

nymph.

plantag. an. ℥j.

nitr. depur. ℥℥.

camph. in S. V. solut. gr. xv. M. F. *Epithema* applicandum

crebrius calidè. Vel imitemur *Forestum lib. 19. obs. 19. & 12.* qui mire commendat in inflammatione hepatis, ad abscessum quoque tendente, discutientem hunc *forum*.

R. Flor. chamom. melilot. ros. rubr. an. pug. i.

sem. anis. fœnic. lini an. ℥i℥.

santal. rubr. ℥j. coque in ∇. simplici, colaturæ adde

† opt. ℥j.

∇ endiv. ℥℥. M. F. *Epithema* pro Epate.

*Quod si* his administratis nihilominus ad suppurationem inflammatio tendere videatur, id quod docet dolor, febris, aliaque symptomata ingravescencia, rigores nullo ordine accedentes, quos caloris exacerbatio sequitur; confecto vero pure, omnia illa mitescant, vires tamen debiliores relinquantur, pulsus frequens languidus & interdum animi deliquium; tunc interne temperantibus suppuratio est promovenda. Propterea F. cataplasmata ex emollientibus & blande discutientibus, cum addito croco & summitatibus absinthii, pro epatis tono melius conservando, in moderata licet quantitate. Suppurato abscessu, ejus apertio promovenda. *Quod si vero sit in parte gibba*, ac satis promineat tumor suppuratus, abdomen è jecoris regione scapello aperiendum, vomica perforanda, & ita pus evacuandum, de quo vide *Horst. probl. p. 29. it. Amatum Lusit. Cent. 7. cur. 76. 77. Schenck. l. 3. obs.* Ut plurimum vero sine tali artificiali apertione sponte abscessus aperitur, & diversimodè, nunc per alvum, nunc per urinam, nunc per vomitum expurgatur. Rarum est, quod per *missim* pus ex hepate fuerit excretum, de quo *Scheiderus l. 4. de catarrh. p. 103.* Verum inflammatio hepatis suppurata, vomitu purulento soluta, vid. in *M. A. N. C. Anno 8. p. 121.* Ita hepar inflammatum & suppuratum, usu oxymellis diuretici per vomitum, alvum & urinam pus rejiciens, vid. in *Salmuth Cent. 1. obs. 27. & 28.* *Quod si itaque ad intestina rejicitur pus*, idque imprimis, dum cavum hepatis suppuratum fuerit, mediantibus vasis cholidochis, interne attemperantibus acrimonia puris est mitiganda, simulque hydromel plus minus medicatum exhibendum. Externe vero blandis clyste-

clysteribus inter  
evacuatur pu  
gibba pars in  
minus medica  
acrimonia, ba  
rior fuerit, pro  
materia purul  
guidiulculo, g  
monia puris i  
abdominis ex  
branosa & ip  
su veteres ad  
rent, de quo i  
cavum abdom  
loco intestino  
ptum abscessu  
illa vergit. Si  
quatur, sed & i  
tinent imprimi  
neraria ista, ag  
lia vulneraria  
mum; Quib  
mendis & res  
cere hepatis  
cari alias poss  
loc. supra citat

LI

Inflam  
vor, dolor, ac  
drii sinistri pe  
adeo ut facile  
dolor pulsatori  
piolas sat sens  
tere sensilis pe  
inflammato mi  
diaphragmate



clysteribus intestina abstergenda & excretio promovenda. *Quod si vero per renes evacuetur* purulenta materia, mediante sanguinis circulo, imprimis dum hepatis gibba pars inflammata sit, supra dictum *oxymel diureticum*, it. *serum lactis* plus minus medicatum, *emulsionem sem. violarum*, it. *decoctum rad. apii, petroselin. agrimonie, baccarum junip. c. hydromellite* factum, præsertim si juncta febris mitior fuerit, propinare convenit. Si regurgitando ex intestinis, vomitu rejicitur materia purulenta, promoveatur hic ipse *attemperantibus pinguibus*, jure pinguidiusculo, cerevisia butyrata, ol. amygd. dulci. *Quod si vero fiat*, ut ab acrimonia puris in facto abscessu erodatur hepatis membrana, adeoque pus in cavum abdominis excidat, periculum est, ne contentæ corporis partes, præsertim membranosæ & ipsæ erodantur, atque ad sphacelum plus minus disponantur. In tali casu veteres ad *incisionem abdominis* accesserunt, ne sc. aliquid intentatum relinquerent, de quo intelligendus *Aph. 4. sect. 7. Hipp.* Observatum tamen fuit, pus ita in cavum abdominis effusum per alvum evacuatum fuisse, erosa forsitan in quodam loco intestinorum substantia, & ita excreto pure. Adeo semper in puris, post ruptum abscessum, evacuatione naturæ ductum Medicus sequatur, & ducat, quod illa vergit. Sub tali puris evacuatione non tantum naturæ ductum Medicus sequatur, sed & simul ex abscessu relictum *ulcus mundificet & consolidet*; quo pertinent imprimis *dococta vulneraria*, it. *decoctum china vel sarsaparilla*. Inter vulneraria ista, *agrimonia* & omnia ex hac parata, sunt optima. *Serum lactis*, cui talia vulneraria incocta sint, pro absterfione & per urinas evacuatione est optimum: Quibus simul *terebinthinata, bals. sulphuris terebinth.* pro reliquiis absumentis & restituenda partis substantia, subjungenda. Verum ex abscessu & ulcere hepatis, nisi superficiale aut leve fuerit, rari sunt, qui evadere solent. Applicari aliàs possunt ea, quæ in *Mesenterii abscessibus & ulceribus* adhibet Martini loc. supra citatis.

## LIENIS INFLAMMATIO.

*Inflammatur* etiam *Lien*, cujus tamen rarissima prostant exempla: *Fervor, dolor*, ac terè tumor, cum pondere nonnihil gravante, in profundo hypochondrii sinistri percipitur. Cum vero ren sinister ibidem proximè adjaceat spleni, adeo ut faciliè horum viscerum inflammationes confundi possint, ob id in primis *dolor pulsatorius* attendendus est, qui in *lienis inflammatione* propter arterias copiosas sat sensibilis est, adeo ut dicatur, quod apposita manu regioni lienis, pulsatio ferè sensibilis percipi possit, de quo tamen meritò dubitatur; cum è contra in *rene inflammato* mitior talis pulsatio adesse soleat. *Febris* adest continua, *difficultas*, ex diaphragmate per consensum affecto, in *respiratione* simul adest.



In *Prognosi* observandum, lienis inflammationem facile in scirrhum abire. Hæmorrhagia naris sinistra vel alvi fluxus, si criticè accedunt, cum prægressis coctionis signis, bonum est & solvitur lienis inflammatio, vel quia discutitur, vel quia aliò transfertur. Quo facit sententia *Hippocratis*, inflammationem hepatis in lienem converti melius est, quam si lienis ad hepar deferatur; vel hæmorrhagiâ narium, aut urinæ profluvio, vel alvi solutione sanatur, vel suppuratur, vel scirrhescit.

*Cura* est eadem quæ reliquarum inflammationum. *Salvatella* sectio, quam in *lienis affectibus* & præcipuè ejus *inflammatione* commendant, fundamento caret. Præter alia in specie medicamenta *Hina* primariò convenire dicuntur in liene inflammato, qualia sunt *Hî saccharum*, &c. *Externæ*, *Empl. de cicuta* malaxat. cum paucò *oleo camphoræ*, applicari solet. *Poppius* applicat *theriacam*, aut ejus loco *rob sambuci*, cui *saccharum Hî* permiscuit, & sub forma spissi *linimenti* illinit, id quod pariter in renum quoque inflammatione locum habet,

## INFLAMMATIO RENUM.

*Inflammantur Renes* quoque, in affectu propriè *Nephritis* dicto, quæ easdem agnoscit *causas internas*, quas aliæ inflammationes, subinde acidum vitiosum ex primis viis eò delapsum. Quoad *externas*, in specie occasionaliter subinde excitatur ex nimio corporis succussu, dum corpus succussum dat renum inflammationem. Interdum etiam supervenit *calculo renum*, si nimis magnus: In *Nephritide* g. in renum regione circa lumbos calor & dolor & quidem *gravativus*, si media quasi carnosâ renum substantia magis inflammata sit, aut *pulsatorius*, si in circumferentia, ubi arteriæ terminantur, magis eadem hæreat. Dolor talis secundum ductum ureterum ad vesicam, it. sursum, versus costas nothas extenditur, & agri nec erigere se, nec commode incedere possunt. *Stupor cruris* è regione renis inflammati percipitur. *Febris* adest vehemens, nonnunquam *vomitibus biliosis* supervenit. *Mictio ardens*, urina exeundo fervens & fervendo adurens partes subinde *stranguria* aut mictio frequens, cum acerbo cruciatu facta observatur. *Urina* paucæ sunt & flammeæ, subinde aquosæ & claræ, sed quæ semper sine impedimento in vesica exeunt. Fit interdum ut rene uno inflammato, alter, licet non inflammatus, in officio cesset, & fit *Ischuria*, seu *urinae suppressio*. Ut autem ritè *distinguaturs Calculus à Nephritide* seu renum inflammatione observetur (I.) Quod *Nephritidi* perpetuo



perpetuo sit juncta febris synochus; *Calculo* vero minimè aut admodum raro adlit eadem. (2.) Quod *dolor in inflammatione* sit magis continuus & pulsanti similis, *in calculo* vero magis interpolatus seu periodicus & gravativus. (3.) Quod plerunque *renes inflammati* comitem *urinae stillicidium* seu mictionis difficultatem; Contra vero res se habet, ubi *renes calculo* sunt obsessi, in quo affectu non semper *ischuria* se offert, sed tunc demum, ubi calculus ipsis ureteribus firmiter fuerit impactus.

Quoad *prognosin*. Periculosum malum est *Nephritis*, interdum lethale, præsertim si febris acuta cum delirio adsit. Urina alba, tenuis ac purulenta, absque febris ac symptomatum remissione & crurum ac femorum extenuatione, mortem portendit. In renum inflammatione hæmorrhoidum fluxus salutaris.

Quoad *curam*: Remedia coincidunt fere cum reliquis inflammationibus: Pro *revulsione* fiat *V. S.* in brachio: Pro *aversione* in pede. Forsan optimo cum successu hæmorrhoides, per *hirudines*, possent aperiri. *Purgantia* propriè dicta nocent. *Clysmata* vero lactea, it. *terebinthinata*, it. ex lacte ejusve sero cum *nitr.* & *iato* commode possunt injici. Nocent *diuretica*, quæ stimulo urinae fluxum, inflammationem irritant, nec nisi in declinatione conveniunt pro reliquiarum absterfione. Conveniunt *nitrata*, præsertim *nitr.* & *iaturum*. Item *saccharum Hi*, it. *Emulsio semin.* 4. *frigid. maj.* *papaveris albi* & *semin.* ad pleuritidem laudatorum, cum *aq. nymph. semperviv. portulac.* it. *Syr. Nymph. ac portulac. succ. astac. s. D. fluvi.* cum jusculo, aut decoctò *Nymphae, prunorum* &c. exhibitus egregium est remedium, meritò ab *Hartmanno* laudatum, cujus alcali macrum inflammationes potenter resolvere & vi diuretica simul renibus speciatim convenire videtur. Inter *externa* cum his internis sedandæ & discutiendæ inflammationi conducunt *succus Nymphae, sempervivi, plantag. portulac. c. succo D. fluviat.* applicandi, quibus nunc parum opii addi potest. Item *camphora* in *ol. ros. solut.* aut *ol. papav.* alibi extrinsecus inunctum egregium est. In *camphora* enim maximum est sedatorium inflammationum, dicit *Lindanus*. Item ex *succo sempervivi maj.* vel cum oleis vel cum unguentis formetur *litus*, externè egregius, vel *unguentum ex succo sempervivi* & *D. fluviat.* cum *oleo rosac.* ad humiditatis phlegmaticæ evaporationem ebullitis, hinc in plumbeo mortario, diuturna agitatione, in *linimenti* consistentiam reductis, egregium est. His irritis, & si inflammatio discuti nequeat, *suppuratio* promovenda, *internè* per temperata ex decoctò *hordei, glyzyrrh. malvæ, parietar.* *Ex-ternè*



*terne* verò Cataplasmata ex emollientibus, in lacte coctis, applicanda. Suppuratione facta, fit interdum ut *musculi dorsi circa spinam* simul afficiantur, atq; ad suppurationem & abscessum vergant, in quo casu *externe apertio* institui potest, de quo vide *Horstium in obs.* l. 4. p. 260. Sin verò *internè* vergat *abscessus*, adeoq; rumpatur, ac per urinam prodeat, ea exhibenda, quæ pus abstergere & ulcus consolidare possunt. Nempe non rarum est

## ULCUS RENUM

cujus frequentissima *causa* est abscessus & inflammatio renum, utut etiam calculi asperiores, renes atterentes, successivè eos ad ulcerationem disponant. Sicut etiam quodvis *acre*, vehiculò seriper renes transcolatum, eosdem erodere & hinc exulcerare potest. Quò pertinet etiam *sanies acris*, ex aliis locis ad renes fluens. Eosdem *lues* & ea quoque subinde exulcerat renes, teste *Horst.* l. 4. *obs.* 43. sicuti & *Gonorrhæam* & eam inconsultò suppressam, renum insignis ardor & hinc non rarò exulceratio insequi solet. *Exulceratio renum* præter dolorem in lumbis rodentem, plus minus simul gravantem, urinæ purulenta excretio ostendit. Hinc *sect.* 4. *Aph.* 45. *Hipp.* si quis sanguinem aut pus mejat, renum aut vesicæ exulceratio significatur, sic §. 76: Quibus cum urina crassa exiguae carunculae & veluti pili exeunt, ij à renibus excernuntur.

*Causas antecedentes* antecedenria ferè ostendunt. In specie si *ulcus est ex inflammatione*, multum puris apparet in lotio & cum mingitur, apparet album, sed cum steterit, dponitur pus, quod si bene est coctum & urina sanorum similis, suppurare solet. Si vero erosio est à calculo, mingitur urina alba instar lactis ebutyrati, statim subsidet & plane alius est consistentiæ, instar cinerum, quos etiam colore refert & minore gravitate excernitur. Præterea dolor morficans & rodens in lumbis sentitur, à sero acris & nitroso, quod in transitu irritat & rodit, unà cum caloris sensu.

Quoad *prognosin*: Ulcera Renum sunt difficulter sanabilia & satis periculosa, sapius lethalia. *Quæ est ab inflammatione* suppurata, minus est periculosa, facilius curatu: *Quæ vero est à calculo* in renibus, periculosior est & non rarò in totius renis consumptionem degenerat. Sic *quæ ab erosione sunt* ulcera, etiam sunt periculosiora iis, quæ ab inflammatione. Quò magis inveterata quoque fuerunt, eò difficilius curabilia existunt. Alioquin ulcus renum lumbos perforasse, ibiq; in *fistulam* degenerasse, curioso exemplo notavit *Willis de Urinis* pag. 364.

Quoad *curam*, mundificantia & solidantia utramq; faciunt paginam, ubi

ubi prius unive  
ando, parum  
ulcus; in que  
Praxi p. 146. A  
dulcis, pro mu  
lula in ulcerib  
c. 7. l. 3. p. 336.  
herba & radice  
man in castib.  
bus, pro cons  
optima. Qu  
femin. hyperic.

Pertinet huc de  
est auxilium, c  
cie convenit,  
fluv. plenitun  
paulatim nec  
egregie curant  
quam Troch. a  
in ulcere renum  
non penitus co  
Item Heer obs  
decocta vulne  
C. C. M. & su

IN

Infla

interna, u  
in regione pu  
Pars I



ubi prius universo corpori ejusq; contentis prospectum fuerit, partim *evacuando*, partim *temperando* hæc ipsa, ne occasione horum magis exasperetur ulcus; in quem finem *Vomitivus* à pluribus laudatur, vid. *Riverium in Praxi* p. 146. *Augenius* l. 12. *Epist.* p. 693. *Valeriol.* l. 6. *obs.* 1. pag. 483. Hinc *Sius dulcis*, pro mundificando renum ulcere, admodum laudatur ab *Hartmanno. Pilulas* in ulceribus & vulneribus renum proficuas, vid. in *Barbette Chirurg.* part 2. c. 7. l. 3. p. 336. Hinc *serum lactis* vel *hydromel* copiosè potum, item *decoctum herbae & radic. fragar.* sed imprimis *hypericon* proficuum est ad ulcera renum. *Timaeus in casib.* p. 422. *Decoctum rad. petrosel. charesol.* Præmissis mundificantibus, pro consolidatione *decoctum lignorum cum agrimonia, hyperic. charesol.* sunt optima. Quò etiam pertinet *Electuarium Hartmann.* ex *conserva rosar. cum semin. hyperic.* Vel

℞. Herb. agrimon.  
flor. hyperic. an. Mj.  
rad. symphit. ℥β.  
ligni mastich. ℥iβ.  
sem. hyperic. ℥iij. incisa & contusa. D. pro infuso. decoct. &c.

Pertinet huc *decoctum ad ulcera renum Quercet. Terebinthina cyprina* optimum est auxilium, detergit renes & per inferiora derivat. Dos. à ℥ij ad ℥β. In specie convenit, si ex *abscessu* exulceratio fuerit orta. Item *Pulv. S. fluv.* ℞. S. fluv. plenilunio ponantur in vase terreo non vitreato ad os furni, ut exsiccentur paulatim, ne cremantur, contunde in mortario lapideo, renum & vesicæ ulcera egregiè curant. Nullum efficacius autem remedium ad renes exulceratos dari, quam *Troch. de Alkekengi* vid. in *Augen.* l. 12. *epist.* p. 695. *Syrupus magistralis* in ulcere renum expertus, vid. in *Hildan.* C. 6. *obs.* 44. Denique *acidularum* usus non penitus contemnendus in ulcere renum, de quibus vid. *Hildan. cit. loc.* Item *Heer obs.* 1. nempe mundificando optimè conveniunt, tum consolidando *decocta vulneraria*, item *Electuaria ex absorbentibus cum bol. armen. terra sigill. C.C.ust.* & similibus, imprimis conducunt.

## INFLAMMATIO VESICÆ.

*Inflammatur* ulterius *vesica* urinaria, rarò quidem ex *causa interna*, ut plurimum ex *externa*, v. g. ex *contusione*, aut violento ictu in regione pubis. Denique supervenit imprimis *sectionem calculi*, quando



quacunque ex causa corpus vesicae laceratur, aut alio modo laeditur, ad summum saepe die quarto interdum citius ejus inflammatio, dein gangraena, & intra biduum mors, aut si malum est minus, fistulam perpetuam saltem relinquit. *Cantharides* denique acrimoniâ suâ rodendo vesicam ad inflammationem disponunt, quod observatum ex *vesicatorio*, ex *cantharidibus*, extra appposito. *Vid. M. A. N. C. Ann. 2. p. 186.* Comitatur ordinatio inflammatae vesicae *tensio, durities, ardor & dolor* in regione vesicae & pubis, urinam reddendi impotentia, *tenesmus*, interdum alvi suppressio, *febris*, *vigilia, delirium*, quae omnia majora vel minora, prout inflammatio vel major vel minor item vel partem membranosam, vel simul circa collum carnosam affecerit. Unde rarum est, quod observat *Hildan. Cent. 3. obs. 68:* Abscessum vesicae ex casu ab alto, sine febre & sine dolore. *Periculosa* est admodum inflammatio vesicae ac plerumque lethalis, idque quarta, ad summum septima die. Si circa collum inflammatur, interdum suppuratur & supervenit ulcus vesicae, curatu difficillimum. Factâ suppuratione ulcus nunc rumpitur intra vesicam, sicque pus cum urina effluit, nunc rumpitur & externè, in cavum abdominis, atque tunc subinde abscessus in inguinibus supervenit.

Quoad *curam*, imprimis observetur, ut, quantum possibile urinae aut alvi suppressio, quae saepius malum exasperant, removeantur. Hinc *clyster anodynus* ex lacte, aut simul cum nitro, imprimis convenit. Internè à *purgantibus & diureticis* omnino abstinendum, saltem decoctum *herdei c. nitro* depurato est optimum. Item *Emulsiones ex sem. 4. frig. maj. sem. portulac. papav. albi*, itidem conveniunt. Externè convenit *infectus* in  $\nabla$ m decoctionis *rad. & fol. malva, alth. chamom. & similibus*; aut loco infectuum saltem fovenda cum linteis multiplicatis, sed blandè apposita. Hinc inungatur cum *oleo ros. aut nymph. pecten*, in quo *camphora* soluta. Quod si metus sit *gangraena*, cataplasma ex *farina fabarum & lupinorum in vino decoctis* applicatum convenit, addendo simul *aloe, myrrham*, aut *spiritum vini camphoratum*. Hisce modis, si possibile, detur opera, ut discutatur inflammatio. Sin minus, *suppuratio* & hinc abscessus & ulcus expectanda. Illam promovemus emollientibus & temperantibus, saepius haecenus recensitis. Quoad *ulcus*, eò præter inflammationem suppuratam, etiam calculi asperi vesicam laedentes, item *cantharides* interius propinati, interdum vel externè admoti, item acria acida sub vehiculo urinae ad vesicam delata, ejus nunc scabiem, nunc excoriationem & exulcerationem disponunt. *Vid. M. A. N. C. Ann. 8. p. 148.* Comitatur ulceratam vesicam saniei purulentæ excretio, ita quidem, ut si vesica incipit exulcerari, primò sanguis exit, si sit perfecta, pus, si magis adhuc squamæ, & ramenta. Si *gravis & consummata est exulceratio*, gravis fœtor in urina est. Dolor adest gra-

gravis in pectore  
& tenesmus

Ne autem  
ne, observandum  
tu appareant,  
cum urina per  
inter me jendu  
juxta ejus col  
curabilia, ut  
quæ à magno

In Cui

morum temp  
rantem. 2. u  
ulceris acidu  
4. Anodyna,  
externè adhibe  
viola, violaria  
à quibusdam  
ut ipse ait Tho  
cum urina cr  
quirit. mund  
tertia part  
per syringa  
decocta vulne  
de alkekengi,  
decoct. lignor  
addantur Cor  
ra antiphthisi  
cantharidib



gravis in pectore & pede, quoties ægri mingunt, urinæ difficultas accedit, sæpe & tenefmus, & membri virilis erectio.

*Ne autem confundatur exulceratio vesicæ, cum meatus urinarii exulceratione, observandum: Si pus & sanies precedant urinam, aut statim in primo exitu appareant, aut etiam sine urina effluant, in pene vitium est. Si verò talia cum urina permista sint, in vesicâ malum est. Propterea si in pene vitium est, inter mejendum dolor percipitur, id quod in vesicæ ulceribus non accidit, nisi juxta ejus collum ulcus consistat. Sunt autem omnia vesicæ ulcera difficilimè curabilia, ut plurimum incurabilia; periculosiora quæ ex erosione, gravissima, quæ à magno calculo, quæ sine extracto calculo curati nequeunt.*

In *CURA* præmissis *internis universalibus* conveniunt 1. acrimoniam humorum *temperantia*, propter urinam inprimis, exulcerationem subinde exasperantem. 2. ulcus sine morfu *abstergentia* seu mundificantia, ob fermentum ulceris acidum & hinc pus. 3. *Consolidantia*, ob resolutionem partis exesæ. 4. *Anodyna*, propter dolorem inprimis urgentem. Talia tam *internè* quam *externè* adhiberi solent; & quidem acce temperant *lac, althea, liquiritia, passule, viola, violaria, sem. 4. frig. maj.* hinc decoct. *chamæpyth.* in lacte mirè laudatur à quibusdam crebrius usurpatum; sic experta est *potio Thoneri in obs. p. 176.* quæ ut ipse ait *Thonerus*, quasi miraculosum effectum præstitit & exulcerationem cum urina cruenta sustulit. *R. Herb. agrimon. plantag. equiseti an. Mß. liquirit. munda ʒij, decoq. in aqua plantag. & betonic, ana q. s. ad consumpt. tertiæ part: In colat ʒß. dissolv. mel. rosar. ʒiß. M.* Ipse ager singulis horis per syringam portionem in vesicam injectit. Mundificant *terebinthina, decocta vulneraria, cum melle, bals. sulphuris terebinth. & succin. ʒiij. s. dulc. troch. de alkekengi, de Carab. Trochisci Gordonij.* specificè laudantur. Consolidant decoct. *lignorum cum vulnerariis, uti agrimonia, hypericum, plantago, quibus addantur Corallia, terra sigill. bol. armen. succin. tinctura sulphuris vitriol. tinctura antiphthifica &c.* Dolorem leniunt *opiata, papaverina, lacticia, in specie, si à cantharidibus fuerit malum &c.* Ex quibus variæ fieri possunt formulæ;

*R. Rad. liquirit. ʒij*

*alth. ʒß.*

*saxifrag. ʒiij.*

*herb. agrimon.*

*plantag.*

*portulac.*

*heder. terr. an. Mj.*

*flor. malv. arbor,*

*nymph. ana Mß.*

*viol. pug. ij.*

q 2

sem,



## De Inflammatione Vesicæ.

sem alth.

papav. alb.

portulac. ana ℥iij.

fruct. Alkekengi No. vj.

Cicer. rubr. ℥ij.

hordei mund. non excorticati Mß.

Coq. in aq. simpl. Colatur. ℞. ℥iij. adde

fyr. ex multiplici infus. violar.

ex succo agrimon.

capill. ♀ is

mel. rosar. an. ℥j. M.

de quo bis vel ter quotidie, bonum haultum ager capiat. *Terebinthinata* imprimis conducunt, in specie *Platero* usitata

℞. Terebinth. ℥vj.

mellis ℥j.

vini malvat. ℥iiij.

vitell. ovi numero j.

diluta servanda ad usum Dos. ℥vj.

Vel:

℞. Terebinth. ℥ß.

vitell. ovi numero j.

mellis ℥ij.

agitentur in mortario, donec albescant, adde

vini albi

▽ parietar. flor. fabar. an. ℥iß.

fyr. limon. ℥j. M.

Nec *acidula* ad ulcera vesicæ mundificanda rejiciendæ sunt, *Vid. Tulp. l. 2. obs. 83.* ubi refertur ulcus vesicæ desperatum, per *fontis Spadani* usum curatum.*Sic pro tertia indicatione*

℞. Rasur. ligni sanct. ℥iiij.

rad. sarsaparill.

liquirit.

cortic. rad. Eryng. an. ℥j.

flor. rosar.

viol. ana p. iij

herb. agrim.

veron.

hed. terr. ana ß.

passul. maj. ℥iß.

coq. ad ℥iij. Capiatur crebrius.

Nobi-

Nobilis est o  
rem vesicæ cu  
nem extracti  
℞. Decoctum  
enda varia, v  
etu, mulsam  
bullierint, ▽  
jectiones Pl

F. decoctum  
binth. in mell  
dem fieri pote  
Infectio

Sic ad nlcus in  
convenit inje

F. Decoctio.  
Nec T  
vid. Conf. S  
Herb. observ

Inflam  
forlan, utura



Nobilis est observatio Thoneri pag. 176. ubi refert exulcerationem ingentem vesicae cum urina retenta, & intensissimis doloribus, post calculi per sectionem extractionem, aliis omnibus frustra adhibitis, his curatam: Pro potu, R. Decoctum liquirit. ras. ℥j. &c. vid. p. preced. Deinde inter externa injicienda varia, vel per catheterem, vel per syringam &c. R. Lac recens, serum lactis, mulsam succ. equiset. vel plantag. ∇. ferrat. in qua rad. symphit. modicè bullierint, ∇ calc. viv. cum Sief albo Rhasis secundum Barbette in Chirurg. vel injectiones Platero absterfiva usitatae

R. Radic. liquirit. ℥ij.  
cicer. rubr. p. j.  
cortic. fabar. ℥j.  
fol. plantag. M. j.

F. decoctum in ∇, adde parum lixivii, & in decocti hujus ℥j. dissolve Terebinth. in melle dissolut. ℥ij. M. In graviore malo potest addi Ungu. Egypt. Tandem fieri potest.

*Injectio consolidativa*

R. Herb. equiset.  
plantag.  
sem. hyperici ana Man. j.  
Rad. bistort.  
consol.  
lil. alb. ana ℥j.  
Cort. gran. ℥ij.  
Coq. in ℥bj. ∇. ferrat. & in ea dissolve  
Troch. alb. Rhaf.  
f. opii ℥β.  
boli armeni ℥j. M.

Sic ad ulcus in collo vesicae & inde sanguinis per penem egressum, prater interna convenit injectio

R. Vitriol. Rom. ℥ij. ∇. comm. ℥j.

F. Decoctio. Forest. l. 26. obs. 1. schol. in fine.

Nec Thermarum usus ad exulcerationes vesicae & renum negligendus, vid. Conf. Scholz. pag. 383. Sed de vesicae exulceratione curanda vid. in specie Horst. observ. 478. & hinc Plater. in observat.

## INFLAMMATIO CEREBRI.

Inflammantur quoque partes superioris ventris, membrana nempe cerebri & forsan, ut ut rarius, ipsum cerebrum. Nam cerebrum ipsum si inflammari contingat,



brevi ad corruptionem & hinc mortificationem tendit, adeoque multi dubitant, an inflammatio cerebri vel contingat, vel si contingat, an sub curam Medici cadat? De membranarum cerebri extra dubium est, cum copiosis arteriis sint resperse, simulque perquam sensiles sint, in quibus si contingat sanguinis motum impediri, sequitur inflammatio, quæ membranarum cerebri vel solitaria, vel cum parte quadam cerebri sociata inflammatio, modernis vocatur PHRENITIS, sed perperam & perverso vocabulorum usu. Phrenes enim Hippocrati & Græcis Auctoribus notant diaphragma, unde phrenitis proprio sensu erit diaphragmatis inflammatio, quam ordinariò sequitur delirium. Phrenes dicitur diaphragma, vel quia Antiquis mentis sedes fuit reputatum, vel quod in diaphragmate affecto & inflammato, mens perturbetur. Istam Veterum opinionem renovavit Barthol. in Examine Paradoxorum Medic. qui statuit in centro diaphragmatis nerveo sedem esse fundamentalem animæ. Phrenitis ergo genuino sensu erit diaphragmatis inflammatio, cujus in scriptis Hippocratis frequens fit mentio. Nam omnia vocabula Græcorum medica in tis terminantia semper significant inflammationem ejus partis, cujus acceperunt denominationem, ut apparet in verbis Nephritis, Epatitis, Pleuritis, & per consequens Phrenitis. Antiqui vero inflammationem membranarum cerebri, aut ipsius cerebri, vocarunt sphacelismum seu sphacelum, quod patet ex Aph. 50. sect. 7. Hippoc. Quibus cerebrum sideratum est, intra tres dies intereunt; si vero hos superaverint, sani fiunt. Ubi per siderationem seu sphacelum intelligit inflammationem ejus. Tanta confusio vocabulorum ab Hippocr. tempore orta fuit. Malè igitur hodiè mortificatio partis totalis, sphacelus dicitur, dum Antiqui talem mortificationem vocarunt necrosin, quæ, dum est in fieri, vocabatur gangrena, quod vocabulum adhuc in tali sensu in usu habemus. Sphacelus enim proprio & genuino veterum sensu est inflammatio cerebri, ejusque membranarum, quod hodierno abusu necrosin Veterum denotat. Phrenitis verò propriè est inflammatio diaphragmatis. Sed cum verba valeant ut nummi, recepto usu phrenitis, Modernorum vocabulo, Veterum sphacelum, i.e. inflammationem cerebri, ejusque membranarum intelligamus.

Inflammationem hanc calor, rubor, dolor & pulsus immediate insequuntur. Dolor ex parte affectâ vehementissimus est, quoniam inflammata meninges immensè dolent, cum certum sit nullam capitis partem esse sensiliorem dura matre, hinc exquisitissimi dolores necesse est adfint, cum ob stagnantem sanguinem sequatur membranarum disensio, quam necessario sequitur dolor acerbissimus lacerativus. Hinc videmus veros Phreneticos (ut plurimum hodiè confunditur phrenitis cum delirio in febre ardente) avellere capillos præ nimio dolore & immenso quasi furore caput inaniter concutere. Propter acerbissimum hunc dolorem malum est adeo acutum, ut tertia die sit lethale, cum propter sensibillissimum dolorem spiritus dissipentur, facileque partis inflammata sequatur gangrena & inde

necro-

necrosi. Præter  
sufficienter ex  
malum, eorum  
ter delirantibus  
siones, idque p  
in capite est v  
Quanta sit tal  
adipiscimus  
colligi potest  
flammationi  
maximum, e  
bre ardente  
jori abusu fer  
niens, similite  
rarum esse affe

Causa

quædam suppu  
nem suggerat,  
observavit H  
Sic peripneum  
ram, ut pluri  
Schenkm l. 1.  
nuidem repræ

Quoad

membranarum  
potest, ad sum  
fert, se vidisse  
nibus cerebri  
mæ sunt, ut p  
Inflammatio  
desipientiæ,  
interdum ph  
rius hinc inde  
les phrenetic  
res sunt iis,  
libus.

Quoad

pluribus traet



*necrosis.* Præterea ægri hi mox *delirant*, adeò, ut neque calorem, neque dolorem sufficienter exprimere possint, propter intensam incalescentiam spirituum animalium, eorumque inordinatum & impetuosum motum: Unde talibus insigniter delirantibus superveniunt tandem gravissima symptomata, in specie *convulsiones*, idque præcipue, quando malum in *gangrenam* definit. Præterea *pulsatio in capite* est vehementissima, de qua in primo principio conqueruntur ægri. Quanta sit talis pulsatio & inde *dolor capitis pulsatorius*, potest colligi, si attentè adspiciamus collum, apparebit, quod vehementissimè pulset *carotis*. Ex quo colligi potest, quantum impetum & qualem pulsationem sanguis in loco inflammationis sub cranio inferat. Moderno igitur abusu, *phrenitis erit delirium maximum, ex cerebri & speciatim ejus membranarum inflammatione ortum, c. febre ardente & peracuta junctum*: Et hoc est, ut dixi, Veterum *phacelus*. Utur majori abusu ferè quodcunque *delirium grave febre ardenti* aut malignæ superveniens, similiter *phrenitis* appellari soleat. Apparet ex his Veterum *phrenitidem* rarum esse affectum & quem intra biduum aut triduum insequitur mors.

*Causæ internæ* sunt raræ, nisi forsan præcedens sanguinis excretio quædam suppressa, aut aliàs inflammationis metastasis, *veræ phrenitidi* occasionem suggerat. Qua ratione in puerpera, propter suppressâ lochia, *phrenitidem* observavit *Horst. l. 2. obs. 25.* item ex retentione hæmorrhoidum *cit. loc. obs. 26.* Sic peripneumonias aut pleuritides, per *μεταστασιν* subinde in *phrenitidem veram*, ut plurimum lethalem mutari, supra insinuatum & exempla subministrat *Schenkius l. 1. obs.* Inflammationem cerebri per abscessum solutam, *veram phrenitidem* repræsentantem *vid. in Lossii Obs. p. 18.*

Quoad *prognosin*. *Vera phrenitis* seu inflammatio cerebri ejusque membranarum, est affectus ut plurimū lethalis, qui tertio die hominem jugulare potest, ad summum die 7. Nam & *Prosper Alpinus l. 1. de Med. Egypt. c. 13.* refert, se vidisse in *Ægypto* phreniticos 3. vel 4. diebus mortuos. In *inflammationibus cerebri* dejectiones alvi albicantes & urinæ cruentæ, albæ & pallidæ pessimæ sunt, ut plurimū enim ægri intereunt, quod cōfirmat Hippoc. sect. 4. Aph. 72 *Inflammationibus cerebri*, quibus ut loquitur Hipp. tremulæ aut obscuræ sunt desipientiæ, sunt periculosiores, quam quibus sunt desipientiæ tumultuosæ, i. e. interdum phrenetici apparent quasi dormiant, utut nil minus faciant, quin variis hinc inde insomniis conturbentur, adeò ut quæsti inepte respondeant: Tales phrenetici, cum talibus variis in somniis & obscura dissipentia, periculosiores sunt iis, qui fiunt cum vociferationibus, artuum contorsionibus & similibus.

Quoad *curam*, hanc relegatam volo usque ad caput de deliriis, ubi pluribus tractabitur.



## OCULORUM INFLAMMATIO.

*Inflammantur* etiam *oculi*, in malo, quod vocatur *Ophthalmia*, vitium conjunctum cum *Lippitudine*, quæ est, cum in ophthalmia copiosissima lymphæ lachrymalis, tam ex glandulis angularibus, quam etiâ glandulis palpebrarum erumpit, ratione cujus notabilis in ophthalmia symptomatis *Celsus Ophthalmiam Græcorum*, latinè *Lippitudinem* appellavit.

*Ophthalmia* sive *lippitudinis* *dise* sunt *species*, *sanguinea* & *serosa* seu *lymphatica*. *Illæ* est inflammatio tunica annata, cum rubore, ardore, dolore, tumore & lacrymis profluentibus: *Hæc* verò, quæ propriè *Epi-phora* dicitur, est continua lachrymarum destillatio & copiosa ex oculo, comitata plus minus cum ejus dolore, morfu, ardore, rubore, &c.

*Ophthalmia* est vel *vera*, vel *notha*. *Vera* est propriè dicta inflammatio modo descripta, quæ in *tres gradus dividitur*: Si enim phlegmones saltim initium adsit, cum scilicet oculus humidior reddi cum rubore, calore & nonnihil dolore incipiat, idque ferè à *causa externa*, vocatur *τρεχέλις*, quod si inflammatio supra dicta insignior, præcipuè ex *causis internis* oriatur, est *ophthalmia κατ' ἐξοχὴν* sic dicta. Si verò facta sit inflammatio, ut & palpebræ afficiantur & quasi invertantur, nec claudi possint, albumque supra nigrum oculi intumescat, ita ut nigro quasi subsidente, hiatus veluti in oculo appareat, *χρημοσις* dicitur.

Porro ratione *modi afficiendi* ophthalmia interdum est *epidemica* & interdum *contagiosa*, item *periodica*. Epidemicè grassantem ophthalmiam refert *Amat. Lusitan. Cent. 7. cur. 80.* Contagiosam refert *Forestus lib. 11. obs. 4.* Datur & *contagiosa*, ut si quis ophthalmicos contueretur, simul quoque eodem malo corripereetur. Conf. *Sennert. l. 1. prax. ubi de Ophthalm.* Periodicam denique & modò in hac, modo in alio loco recidivantem à variolis natam vid. *Lips. p. 70.*

*Lachrymarum* in ophthalmia destillantium quoque *notanda varietas*. Nam lachrymæ interdum effluunt acres, tenues, vel quasi *corrosivæ* in inflammatione periculosiore, utpote quæ tunc magis dolet, ardet & instar Erysipelatis cujusdam infestat; hinc tales lachrymæ ex lymphæ similiter acri oriuntur & quibusdam *ophthalmia biliosa* dicitur. Interdum lachrymæ *non corrosivæ*, sed potius subdulces, aut quibus palpebræ glutinantur & inviscantur, dum lymphæ lachrymalis est magis crassa & viscida, concurrente simul aliquali nutrimenti proximi partis læsæ corruptelâ, quæ tamen melior est quam tenuis & bina. Ex qua lachrymarum differentia 4. *ophthalmia tempora distinguenda*, nempe

pe principium  
quan' o dol  
humor, h. e.  
climatio cum si

Denique  
movetur, nun  
temporibus  
fundior & v  
ratio frequen

Pa

textæ sunt co  
circulo, valc  
oculi bulbos  
de tunica, a d  
juncta est, un  
consensum ori  
mul capitis do  
conjuncti  
patet, quare  
ant interdum  
post capitis  
saltem fluxu  
fuerint mor  
membranarum

Ca

perficiè infix  
motu, lymph  
stile aut inim  
præterit, l  
vel internu

lum illapso  
ex corpore  
tum fuerit  
sepe ophtha  
Lipso Tr. d  
aurum pur  
Pars 1



pe principium est, quando humor tenuis ac plurimus defluit: *Augmentum* quan- lo dolor augetur, humorque fit crassior: *Status* cum magis coctus videtur humor, h. e. temperatus, adeoque crassus, ut etiam palpebras conglutinet; *Declinatio* cum signa remittunt.

Denique sanguis inflammationem excitans nunc per *vasa* oculi *exteriora* movetur, nunc per *interiora*. Si per *exteriora* tumor, dolor, pulsus in fronte ac temporibus percipiuntur. Si verò à vasis & membranarum *interioribus*, dolor profundior & vehementior erit, plurimusq; in palato ac naribus sentitur ac sternutatio frequens erit.

*Pars affecta* in ophthalmia est membrana externa annata, cui intertexta sunt copiosissima vascula venosa & arteriosa, unde ex impedito sanguinis circulo, vascula hæc in sanguine distenta, magis fiunt conspicua, adeò ut totus oculi bulbus rubeat. *Membrana hæc annata* intimè connectitur cum sclerotide tunica, à dura matre orta & hac mediante etiam cum vera ac pia matre conjuncta est, unde mutua dictarum partium conspiratio & plura pathemata per *consensum* oriri solent. Nempe ratione *pericranii* fit, quod in gravi ophthalmia simul *capitis dolor*, si non *pulsatorius*, tamen *contractivus* percipitur; item ratione conjunctionis cum internis membranarum oculorum & hinc membranarum cerebri patet, quare *contusionibus cranii* & *lesionibus membranarum* cerebri superveniant interdum ophthalmia. Sic in Nosodochio Patavino aliquoties observavi, quod post capitis contusiones septimo vel nono die supervenientes ophthalmia aut saltem *fluxus lachrymales* oculorum, cum eorundem rubedine, signa imminens fuerint mortis, quod innuant jam factam *inflammationem cerebri* ejusque membranarum & hinc imminens *gangranam* & *necrosin*.

*Causa* ophthalmie in genere est spina oculo alicui in externa ejus superficie infixæ, cujus occasione dolorosa fibrarum strictura sanguinis remora in motu, lymphæ contra uberius per glandulas infusio; Vel est quodcunque hostile aut inimicum, acidum aut acre, præsertim si oculum affecerit, plus minus irritaverit, sicque ad inflammationem occasionem dederit, estque vel *externum* vel *internum*. *Causa* verò *externa* sunt *contusio*, *læsis pulv.* acres in oculum illapsi, ut & fumi metallici se insinuant. *Internæ* sunt acre quodvis ex corpore excernendum, si quacunque occasione ad oculum defluerit & delatum fuerit, sic v.g. in specie *variola* acidum oculis inimicum obtinent, unde sæpe ophthalmia pertinacissima aut sæpius recurrentes relinquuntur, ut supra ex Lipso Tr. de Variolis monitum. Infantes pariter ex *tinea* non ritè curata, aut aurium purulentis *fluxionibus* cessantibus subinde in ophthalmias pertinaces



& contumaces incidunt. Sic *suppressos menses* subinde inflammationes oculorum insequuntur, vid. Gabelchov. Cent. 4. Cur. 33.

Quoad *Ophthalmiam notham* seu ut alias vocatur, *siccām*, hæc est ista, in quā lachrymæ ferè nullæ exstillant, utut plus minus noctu palpebræ coagulari soleant; nihilominus tamen oculi rubent, plus minus tument, atque plus minus pruriunt, unde *tres* ejus sunt *gradus*. 1. Quæ est cum pruritu & exiguam fluxionem salivam & acrem conjunctam habet, & dicitur *ψωροφθαλμία*. 2. Quæ cum pruritu & dolore levi & aliquali gravitate sine fluxione est, adeoque saltim rubri & tumidi sunt oculi & dicitur *ἐμροφθαλμία*. 3. Denique sine pruritu, fluxione & cum duritie ac asperitate palpebrarum est, & dicitur *σκληροφθαλμία* seu dura lippitudo. Oriuntur ex subtili, salsa vel acri lymphā, oculis naturaliter humectante, alterante, & ita oculos malè afficiente.

Quoad *prognosin*, Ophthalmia secundum supra monitos gradus magis vel minus periculosa ac curabilis est. *Ophthalmia vera* pro subjectorum ratione, in iisque humorum, præsertim lymphæ ac sanguinis constitutione, facilius vel difficilius curatur. *Ophthalmia per consensum* à dura & piā matre, & à partibus circa cranium contentis, sæviora habet symptomata & difficilius curatur. *Dolor* diu in ophthalmia perseverans pessimum signum est: Materiam enim aut corrodentem, aut distendentem, aut suppurantem arguit. *Ophthalmiam diurnam*, aut sæpius *recurrentem*, facilè visus hebetudo insequi potest, partim ob membranas incrassatas, partim ob humores impuriore redditos. *Quando res eò devenit*, ut inflammatio non possit derivari, vel digeri, vel suppurari, ferè perit oculus: Si autem eò venerit malum, præstat dimittere oculum, quàm certo perire & mori, quod est incidere in gangrænam cerebri. Ophthalmia laborantem superveniens *alvi profusivum* liberat. Hipp. sect. 6. aph. 17. *Nottha Ophthalmia* non adeo periculosa est, quàm vera, diuturna tamen est, & admodum chronica.

Quoad *curam* 1. causa quælibet remota oculum hostiliter afficientes *removenda*, adeoque nunc *externæ* læsiones curandæ, nunc *internæ*, acre acidum, vel falsum corrigendum. 2. *Sanguis* in oculo *stagnans* partim *resolvendus*, partim in naturalem circulum restituendus. *Quod ut fiat*, in inflammatione parva & ubi non est tantum ægri periculum, ut in rubore, ac moderato dolore, *externa* saltim ex *Pharmaceuticò fonte* sufficiunt remedia. Ubi vero inflammatio est magna, aut grave imminet periculum, simul per *internam* curatur, quibus & alia ex *Chirurgico fonte* pro revulsione, *aversione* & *derivatione* socianda. In graviore g. malò conveniens est V. S. *revulsoria* quidem in pede, *aversionia*



*aversoria* vero in brachio, *derivatoria*, si fieri poterit, in fronte. Sane ad derivationem nil melius est, quam *venam frontis* incidere, sed hocce habet incommodi, ut subinde pro secunda vena frontis, laqueus collo injiciendus sit, quo melius tumeat, constrictis nempe jugularibus vasis, quo ipso tamen simul augebitur *inflammatio*, unde non aperienda est, nisi tundi possit sine hac adstrictione. Non tamen nisi præmissis præmittendis hæc vena frontis incidatur, siquidem post eam intempestivè sectam *ophthalmiam* gravissimam, visus & loquelæ perditionem observavit *Hildanus Cent. 5. obs. 13.*

Aliàs pro *aversione* usitatissima ac sanè sæpe proficua sunt *vesicatoria* in nucha, quæ, mirum est, quantum juvent in inflammatione oculorum, quia arteria ibid. se dividit in partem internam ad oculum progredientem, & externam circa nucham hinc inde distributam. Unde *vesicatoria*, dum in nucha faciunt dolorem, eò auctiorem sanguinis promovent circulationem, ut minori impetu ac copia circa oculum congeratur. Post nucham etiam *pone aures* feliciter applicantur *vesicatoria*, sicut *cucurbitulis* pone aures applicatis inflammationem curatam notat *Rhodius Cent. 1. obs. 79. Ubi non suffecerint vesicatoria*, cum ulcus superficiale post aliquot dies denuo sanetur, *setaceum* applicetur in nuchâ, remedium in oculorum affectibus diuturnis summè proficuum, sed perquam molestum, de cujus egregia præstantia vid. *Gabelchov. Cent. 4. obs. 38. In schol. Hildan. Cent. 1. obs. 42. & Cent. 4. obs. 14.* Locus hujus setacei in nucha est remedium quasi vicarium, *auriculare* quasi *setaceum*, ex rad. *Timelee arbore-scentis* (est ista *Timelea* in specie, quam *Tabernamont. l. 3.* nomine *Timelea gran-gnidii* describit, loco cujus & *chamelea vulgaris*, seu *Mezereon* potest substitui) de qua vid. *Riv. Cent. 4. obs. 100. it. M. A. N. C. Ann. 4. Append. 39.* olim in secretis habitam. Nempe radícula dissecatur in fibrillas, quæ lobo auris perforatæ immittuntur; Nempe exsiccata in orbiculos dividitur; postea maceratur in lixivio ex vitium cineribus facto, vel in  $\nabla$ . in qua nitr. solutum fit, sine præparatione enim aures corrodit & inflamat, quæ acrimonia etiam acidis obtundi poterit. Perforatâ aure, filo butyro pingui trajecto, promota suppuratione, secunda vel tertia die, fibula radicis vel orbiculorum imponitur, quæ humores potenter ex capite elicit. Singulis diebus recens immittitur; prior tamen exsiccata & purgata secunda & tertia vice usum eundem præstat. Confert non solum in *Ophthalmia*, sed & in *suffusione* incipiente, aliisq; malis visum hebetantibus. Hujus loco rad. *bellebori* recipit *Timæus l. 1. Ep. 22.* Loco *setacei* adeo molesti, in *ophthalmiis* vel contumacioribus vel ex causa interna crebris recurrentibus, quales in specie in *infantibus* observantur, *foniculi* optimò consilio in brachio illius lateris excitantur, quæ mirum est, quantum possint in infantibus



bus etiam 5. vel 6. annorum inusti, qui sub pubertatis annis, si ita visum fuerit, denuò consolidari poterunt. Interdum pro averfione *arteriotomia* temporalis proficua esse poterit, siquidem *Nicol. Fontanus in Resp. & curat. p. 50.* refert *ophthalmiam* per intervalla recurrentem, cum periculo visus, *incisione arteria temporalis curatam & fonticulo in brachio omninò præservatam.*

Præter hæc & *internè ex fonte Pharmaceutico* ophthalmiæ contumaciores, aut ex lymphæ discrasia sæpius recidivantes curandæ veniunt, adeoque præter *purgationem* cum *jalappâ* factam, *Decoctum lignorum*, præsertim *Juniperi* & omnia *Juniperina* sunt optima. Sic *Horst. l. 2. obs. 32.* observat ophthalmiam contumacem, aliis irritis *decocto sassafras & lignorum* curatam. *Rulandus* quoque in *Thesauo Practico* p. 61. refert de muliere 40. annorum, oculi rubore, dolore, lachrymis & cæcitate diu affectâ, post alia plurima tentata 10. dierum spatio hisce convaluit: *Purgata* fuit prius *pilulis*, hinc *decocto ligni sancti* per 10. dies usa, post *sudorem* imposuit  $\nabla$ . *ophthalmicam* ex  $\text{§} 10$ , & sic convaluit.

Ac sanè *causarum ophthalmiam antecedentium* magna habenda est ratio. Nam *Ophthalmia* ex fumis metallicis, frustraneis externis, per interna mineralia curata fuit ab *Horstio l. 7. obs. 27.* Sic *Bartholinus* ophthalmiam in prægnante, quoties uterum gerit, pertinaciter recurrentem *sternutatoriis* & *V. S.* curavit *Cent. 6. hist. 31.* Ophthalmiam Gallicam  $\text{§} 11$  ope curatam vid. in *Zacut. Lusit. l. 1. pr. obs. 45.* Denique *cinamomum* jeuno stomacho comestum fluxiones in oculum promovet, teste *Panarolo Pentec. 2. obs. 28.*

*Remedia externa seu topica* sunt varia: Practici plures applicare solent *lac*, imprimis *muliebre*, nunc solitarium, nunc aliis mixtum: Sed pessimo consilio; Item propter dolorem quidam applicant *opium*, sed periculoso cum eventu, cum talia ad *cæcitatem* disponant. Utur enim demulceat dolorem *opium*, tamen ophthalmiam ad *gangrenam* simul disponit. *Lac* vero quodcunque *siccens* instilletur, unctuositate sua incrustat oculos & fordidos efficit, unde impedita transpiratione insensili, tunc maximè necessariâ, *inflammationem* potius auget. Si verò *lac non recens* applicetur, nocet subtili suo acore, quoniam acorem contrahit. Unde rectè *Lindannus* se sæpissimè vidisse *lac & opium* applicatum, nunquam tamen felicem usum observasse. Aliàs, quæ *externè* conveniunt, sunt imprimis *sperma ranarum*, vel per se asservatum, vel secundum *Tachen.* destillat. it.  $\nabla$ .  $\text{§}$ . *fluor.* ex iisdem contus. & cum putrescere incipiunt, maturè destillatis elicita. It.  $\nabla$ .  $\text{§}$ . *fluor.* cum *chelidon. maj.* à *Mysf.* descripta in *Armam. Chym. p. m. 296.* liquor *florum cicbor. & flor. cyani*, qui tam ab *Hartmanno*, quam *Sennerto* præscribuntur, sunt nobilissimi, sed observandæ *enchirifes.*

enchirifes:  
melius est:  
una vice sequi  
bile remediari  
sunt. Alum  
c. frusto alum  
prum sit, nur  
lineum, &  
psyllii aut cyd  
phora & ap  
rum Hi cu  
phthalmicu  
est: Teratu  
cum novo co  
& quo magis  
tis optimum  
re, vel cum al

in die gutta u

Solutionem  
riolum, præ  
dum. Hi

Ac sanè in sta



enchirises. Vitra sint crassa, & quo crassiore crusta farinacea obducuntur, eò melius est: Massa sinenda est aliquamdiu in aere siccare, ne disrumpatur. Rarò una vice sequitur liquor, relinquatur donec bis coquatur panis & diutius, nobile remedium.  $\nabla$  *ophthalmica ex infusione vitri*  $\mathfrak{z}$ . aut *C. M. but.*  $\mathfrak{z}$ . optimæ sunt. *Alumen* quoque præstantissimum est; nempe *album ovi unius* agitatur c. *frusto aluminis* in patina stannea tamdiu, donec *unguenti* consistentiam adeptum sit, nunc solitario, nunc pauca  $\nabla$ . *fœniculi* addita. Hoc extenditur supra linteum, & tepidè oculis applicatur. Vid. *Borell. Cent. 1. obs. 31. Mucilag. sem. psyllii* aut *cydon.* cum *aqu. appropriata* extract. addito *sacch.*  $\mathfrak{h}$  & tantillo *camphora* & applicata cum linteis multiplicatis, sunt optimæ. Nam ipsum *saccharum*  $\mathfrak{h}$  cum  $\nabla$ . *app. opriata* dilutum & oculis impositum est egregium antiophthalmicum. *Saccharum*  $\mathfrak{z}$  *ale*, ut vocat *Eindanus*, est præstantissimum, hoc est: Teratur *saccharum candi* in cyatho vel scutella  $\mathfrak{z}$  *nea nova*, nec usurpata, cum novo cochleari *stanneo*, idque tamdiu, donec fiat instar plumbi lividum, & quo magis livet, eò est melius. Nam potestis nimis diu terere, & sic habetis optimum ophthalmicum, quod vel in forma pulveris seorsim potestis inflare, vel cum aliis miscere. v. g.

$\mathfrak{R}$ .  $\nabla$ . Plantag.

ros.

fœnic. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ .

sacch. cand.  $\mathfrak{z}$  *lis*  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$  l.  $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ .

Tut. præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ .

croc. orient. gr. ij. l. iij. M. F. Collyrium, de quo ter vel quater

in die gutta una vel altera in locum instilletur.

Vel  $\mathfrak{R}$ .  $\nabla$ . Fœnic.

euphras.

ros. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ .

vitriol. alb. gr. iv. l. viij.

Solutionem filtra per chartam, adde  $\mathfrak{z}$  *alis sacchi*.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . M. F. Collyrium. Sane *vitriolum*, præsertim *album*, *Galigelsstein*/nobilissimum est, in Ophthalmia, remedium. Hinc aliquoties feliciter imitatus fui *Collyr. Thoneri in obs. p. 116.*

$\mathfrak{R}$ . Aq. ros.

plantag. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

solan.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

vitrioli albi  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . M. Filtrationi adde

Tut. præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . cum linteo imbutò & expressò applicatur.

Est egregium.

Ac sanè *in statu* mirabiliter conveniunt hæc *collyria vitriolacea*, quorum aliquor



egregia Exempla vide in *Barbette Prax. ubi de Catarrhis*. In principio vero morbi, dum dolor, rubor, fervor & lachrymarum acrium fluxus urget, *absorbentia appropriata* imprimis conveniunt, qualia sunt in specie *tutia preparata* & hinc *flores cyani*, quæ correctiva sunt acris plus minus acidi, oculos inflammantis, quibus adde *maurem perlarum, lap. S. lap. calaminar.* exactissimè prepar. v. g.

℞. ∇. Cyani.  
euphr.  
verben. aa. ℥ss.  
Tut. præp. ℥j.  
mat. perl. præp. ℥ss. M.

de qua mistura instilla aliquantulum oculis & simul madentes petias impone.

Facit huc *Collyrium Lipsii contra ophthalmiam ex Variolis* sepius re-currentem. Casus notabilis & curiosus. *Descriptio* rudis hæc est:

℞. Tut. præp. ℥j.  
vitriol. albi.  
sarcocoll.  
nihil albi.  
aloes lotæ  
camphor. aa. ℥j.  
∇. fenic.  
ros.  
chelidon.  
pimpinell. aa. ℥iij.  
album. ovi. No. i.  
ofs. sepiæ. ℥j. M. F. Collyrium.

Quod si ophthalmia sit incipiens ex rebus externis, v. g. pulveribus in oculos incidentibus, elegans, *vitulina vel bovine crude carnis frustum* magnitudine & crassitie imperialis, tempore decubitus admotum, remedium est. Quod si malum sit occasione aeris inclementioris, *mucilagines* supra citatæ sunt optimæ.

Sæpius urget in Ophthalmia intensissimus dolor oculi, pro quò compescendo nil melius est *cataplasmate ex pomis dulcibus* & bene odoratis sub cineribus coctis, donec probè mollescant: *Pulpæ per setaceum tractæ adde sacchar. Zialis ℥j. croc. gr. v. camph. gr. ij. M.* Applicentur tepidè cum linteis multiplicatis. Experimentum est *Timæi in Casib. p. 48. it. Scultet. in Armam. Chirurg. obs. 25.* Quod si ophthalmia sit ex ictu apis, curatur optime collyrio ex *alum. & alb. ovi* supradict. Quoad Ophthalmias *Nothus* seu *siccas*, eadem fere conveniunt; præcipuè tamen ∇ & S. *mucilagines, alum.* cum *album. ovi* supra laudatum.

Item

Item x. Lich.  
dulce, filtratur.

Quoad

rosam, consistit  
adeoque rubor  
humor seu catarrhus  
syndromie affligit  
modo Catarrhus  
imprimis respicitur  
vid. Stenonius

Epiphora

oculum; quod  
illachrymationem

I. celsissime  
licans oculos,  
promovens.

cunque, præse  
piolam lymphæ  
lachrymalis de  
glandula illa  
sive sub cute e

ventus, quæ o  
glandula major  
e. 26. p. 160.

Quoad

& ætatis cursu  
dens, contum  
uri est pessima  
ab illius erosio

In Cu

ejus scilicet acrimonia  
adstringentibus

℞.



Item *gi. Liebarg. Orei pulv. q. v. coq. in ac. dest. q. s. evadet decoctum dulce, filtretur per chartam, & applicetur cum linteo, egregium est.*

Quoad *Epiphoram* seu à quibusdam sic dictam *inflammationem serosam*, consistit hæc in continuo *lachrymarum* stillicidio, quæ nunc acres sunt, adeoque ruborem, ardorem, morsum &c. junctum habent, & vulgò dicitur *humor seu catarrhus calidus*. Nunc mitiores sunt, & sine symptomatum talium syndrome affligunt, diciturque *humor seu catarrhus frigidus*. Est affectus suo modo Catarrhalis, adeoque ad glandulas, ex quibus tale stillicidium oritur, imprimis respiciendum, siue sint in oculorum angulis, siue palpebris, de quibus vid. *Steno in observat. de glandulis oculorum & narium.*

Epiphoræ *Causa* nunc est *externa*, eaque saltim irritans continuò oculum; quò suo modo pertinet observatio *Rhody Cent. 1. obs. 8.* frequentioris illachrymationis, ex persicorum esu; nunc *interna*, eaque triplex: Nempe I. *vel lymphæ vitium* quasi habituale, acrioris ac acido salioris, rodens & vellicans oculos, & talio occasione magis magisque sanguinis ac lymphæ affluxum promovens. II. *Vel vitium glandularum* oculorum, relaxatarum, & undecunque, præsertim sub nutritione propria vitatarum, aut aliàs irritatarum, copiosam lympham continuo plorantium. Quo III. denique facit *caruncula lachrymalis defectus* in affectu Græcis *πύαξ* dicto, qui nil aliud est, quam glandula illa in majori oculi cantho sita, seu à causis externis *exesa* fuerit, siue sub cura externa *abscissa* aut resoluta fuerit, unde sordium, puris &c. proventus, quæ oculus & vicinæ glandulæ irritatæ continuo plorant, de qua oculi glandula majore, vulgò caruncula lachrymali, dicta vid. *Warthoni Adenograph. 2. 26. p. 160.*

Quoad *Prognosin* in infantibus, ut frequens est hic affectus, ita diæta & ætatis cursu vel sponte curatur. *Inveteratus* autem aut *natus majoribus* accidens, contumacior, facile fistulam lachrymalem potest inferre. *Epiphora* uri est pessima, quæ à caruncula deficiente oritur, ita facilior est curatu, quæ est ab illius erosione quam excisione.

In *Cura* 1. *Causa externa removenda.* 2. *Lympha* interdum vitium, ejus scilicet: *acrimonia* est corrigenda *internis & externis.* 3. *Glandularum tonus adstringentibus est firmandus.* Convenit igitur *▽ Timæi in Epiphora experta*

*Rx.* Tormentill. grossò mod. pulverifat. ʒj

O. gr. v.

▽. rosac.

plantag. ana ʒj. Stent in loco calido per diem & noctem  
filtren



siltrentur & servantur usui. It. liquor. flor. cicchor. & cyani sunt egregii. It. valde prodest decoctum cort. granat. Hartman. in Prax. Chym. c. 36. It. R. foliorum cydon. primò vere collectorum integrorum, illaforum & à corruptione præservatorum Mj. coq. in  $\nabla$  purissima, & eâ oculi humectentur ac irrorentur. Humorem arcent, ruborem discutunt &c. Vel album. ovi conquassat. cum succo semperviv. & flor. fabar. impositum confert. Alia ut lap. hamatit. calamin.  $\nabla$ . sigill. Salom.  $\nabla$ . ros. infusio sumach, ex Practicis sponte innotescunt.

## AURIUM INFLAMMATIO.

*Inflammantur* etiam *aures*, nempe auris interna, ejusque membrana meatum auditorium succingens eidem subjecta esse solent. Præter *externa* occasionaliter hæc inferentia subinde etiam sponte sua ex *causa interna* eadem concitatur. Adest insignis ardor in aure, dolor continuus pulsantis vehementissimus; observatur interdum rubor quidam auris externæ, quò magis nempe ad exteriora vergit *inflammatio*, quæ si gravior est, ad malas & tempora se extendit, sicuti, ubi magis interiora inflammantur, *pulsatorius dolor* gravior esse solet, in quo casu & *febris* & subinde delirium, imò & interdum *motus convulsivi* superveniunt. *Inflammatio* autem hæc aut *discutitur*, aut in *abscessum* abit, qui ulcus aurium post se relinquit. Dum *suppuratur*, res non caret periculo propter febrem & conjunctum dolorem, quo interdum cerebrum ejusq; membranæ periculosissime afficiuntur, sicque delirium inducitur. Sic Ferdinand. hist. 14 l. 1. refert *inflammationem aurium* & dolorem intensum cum febre acuta, delirio &c. per excretionem copiosam puris die morbi nono, inflammationis septimò, criticè curatam. Curiosum est, quod Bartholinus Cent. 3. ep. 67. refert in abscessu aurium erumpens pus & vehens simul dentem, sine defectu dentis ullius in maxillis. Si interiora magis occupaverit pus ab aurium abscessibus natum, tympanum interdum putredine absumitur, citra tamen auditus læsionem. Vid. Horst. l. 9. obs. 8. qui iridem refert abscessum auris hemicraniam inferentem.

In *Cura, universalis* aliaq; probè præmittenda sunt, & *externa* quoque nonnisi cautè & consideratis probe omnibus circumstantiis applicanda. Nam talia plus interdum nocent, quam profunt. Vid. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 117. id quod in specie de actu frigidis aut repellentibus intelligendum venit. Convenit autem imprimis ol. vitel. ovor. anodynum & apertionem abscessus adjuvans, it. ol. decoctionis lumbricor. terrestr. vel asellorum tepide auribus instillatum, aut cum bombace iisdem intincta immissum. Quò etiam facit ol. scor-

pion.

pion. vel & ardore auribus applicetur chamamelin.

Quod si cocta, ut decoquatur in ol. rosac. 3ij. c. puta alliorum Amat. Lusit. Posti-

Ulcus vel ex abscessu tum interius demultiformi dolore, qui perveniunt subinde dos à pluribus Vera nerare solent (nisi) Bleichz aquale, subit fuerit.

In CM effluxus eor Otis, vel huius & capitis in noxa inde optimè mittendis Sc. Ulcus urina infusa Pari-



*pion. vel S. fluviat.* incoquantur oleo, quod subinde efficacissimum fit ad dolores & ardores aurium curandos. *Decoctum absinth. Cent. min. Abrotan. & alia aromatica* auribus immissa, vel spir. vini vel spir.  $\theta$  ci cum mica panis calida auribus applicetur. Vid. *Sylv. de morb. infant. c. 9. §. 87. it. bals. sulph. ad extra. cum oleo chamamelin.* mistus conducit.

*Quod si suppuratio promovenda sit, cataplasma ex medulla panis albi in lacte cocta*, ut describitur à *Riverio*, applicanda venit: *R. medul. panis albi lbj.* coquatur in lacte caprino ad pultis consistentiam, deinde adde vitellos ovor. no. ij. *ol. rosac. ʒij. croci. ʒi.* F. cataplasma. Quibus pro *rumpendo abscessu cepa* aut *capita alliorum* sub cineribus cocta simul adjungenda sunt. Conf. *Riverium. it. Amat. Lusit. Cent. 7. cur. 92. it. Höferum in Hercul. Medic. p. 62.*

Post inflammationem aurium, sequitur subinde abscessus, adeoque

## ULCUS AURIUM.

*Ulcer a aurium* aliàs sunt vel *vera* vel *apparentia*. *Vera* vel *ex abscessu* post inflammationem nato, vel *ex aciori lymph a* eò delata, meatum interius exulcerante. *Apparentia* ulcera sunt, quando sanies, subinde multiformis ex auribus effluit, nunc cum, nunc sine præcedente earundem dolore, qui effluxus subinde diu durat, & quo cessante varia capitis & cerebri superveniunt symptomata, quæ levantur sub fluxus continuatione, uti in *infantibus* subinde observatum est, qui per hujusmodi aurium fluxus plus minus fordidos à pluribus malis tam *externis* quàm *internis* levare solent.

*Vera aurium ulcera*, si diuturna aut *inveterata* sunt, facile in *fistulam* degenerare solent, vel erodendo occasionem membranarum suggerunt, ut *hyper sarcoma* (*wild Fleisch*) succrescat, quod auditum obturet. Pus quod effluit, si sit album, æquale, substantiæ mediocris, melius est, quam si inæquale, foetens, saniosum &c. fuerit.

In *cura* observandum est, ne *apparentia* hujusmodi *ulcera aurium*, seu effluxus eorundem plus minus saniosi citò nimis sanentur, præsertim in subjectis, vel humidioribus, vel excretionibus capitis cutaneis, vel affectibus cerebri & capitis internis obnoxiiis, idque in infantibus imprimis observandum, ne major noxa inde oriatur, sufficit, si modo mundus servetur meatus auditorius, id quod optimè mediante *urina humana* assequimur. *Quoad ulcera vera* præmissis præmittendis *internis*, v.g. *purgantibus*, aut *sudoriferis*, aut *essentia lignorum* &c. *Ulcus* mundificandum, & hinc consolidandum venit. *Mundificat* optimè *urina infusa*, aut *urina* in qua *rasura ligni Guajaci* maduerit. It.  $\rightarrow$  spir. urinæ, vel

R. Vini alb, subtilis dulcis

Par. II.

urinæ



urinæ puerorum an ℥j. ebulliant leviter cum ℥ss. mellis. M. Quibus tepidè meatui auditorio instillatis, aut cum turundula iisdem ebria immis-  
 ac manè ac vesperi repetitis, ulcus mundificabitur. *it. succus, vel syrup. vel essentia  
 absinth. aut marrub.* cum paucò melle rosat. *it. syrup. Nicotian.* egregiè conveni-  
 unt. Nonnemo refert ulcus periodicum auris curatum per instillationem *succi  
 marrubii* misti cum melle. Si *O. ustum* cum vino mistum, in aurem infun-  
 datur, potentissimè ulcus exsiccat. Puer 10. annorum surdus ex variolis perma-  
 nens, & cui per tot annos sanies ex aure fluebat, liberatus fuit *succo cepæ & rhodo-  
 melite* instillato, teste *Foresto. l. 12. obs 7*. Denique si antiquum & sordidum ulcus  
 fuerit, applicanda venit *urina pueri* cum paucò unguento *Ægyptiaco* impragna-  
 ta. Hisce si mundificatum & absterfum fuerit ulcus, id quod ex eò patet, si mi-  
 nor sordium ac puris quantitas effluerit, pro consolidatione istis modo dictis, *ru-  
 tia & pompholix* addenda sunt, pro ejusmodi perfecta consolidatione.

Præter sanguinis impedum refluxum impeditur ejus circulus, quando is  
 penitus extra sua vasa effunditur, idque vel intra corpus & insigniores ejus cavitates;  
 Vel extra corpus, ut fit in Hemorrhagiis.

*Sanguis effusus intra corpus* mox coagulatur, hinc efferve-  
 scendo suppuratur, unde dum puris fit collectio in quadam corporis cavitate,

## EMPYEMA

dicitur, à *vomicâ* distinctum, quæ est collectio puris in quodam viscere. Ita  
 dum pus colligitur in pulmone aut renibus, est *vomicâ pulmonum* aut *renum*. Si  
 vero colligitur in cavò thoracis, vel abdominis, dicitur *Empyema*, idque secun-  
 dum hodiernum accipiendi modum, ita ut omne *Empyema* fiat ex collecto  
 pure, vel ob sanguinis extravasati corruptionem, vel ob abscessus visceris cujus-  
 dam inflammati interiora versus apertionem. Veteribus alia horum vocabulo-  
 rum fuit acceptio, dum propriè loquendo *vomicâ* Latinis est id, quod Græcis  
*Empyema*, sive collectio puris, in aliqua parte præsertim interiore & *Empyici*  
 proprie sunt, quibus pus in aliquo viscere oboritur. Sic purulentum hepar *Hip-  
 pocr. sect. 7. aph. 47.* idem quod *Empyema*. Tale malum Latinis dicebatur *vo-  
 mica*. Ita enim Celsus. Moderni ex ignoratione substituunt *abscessum* & in spe-  
 cie *pulmones purulentos* καὶ ἐξοχὴν *vomicam* appellant. Quoniam autem fre-  
 quentissimè puris collectio in cavitate thoracis contingit, propterea *Empyema*  
 καὶ ἐξοχὴν de collectione in dictâ parte dicitur.

*Causæ*, quare sanguis in cavitates effunditur, grumescit & suppuratur,  
 sicut imprimis *externæ*, nempe i. *contusio* vel *vulnus* punctum factum. *Ex*

contusione si fa-  
 cyso seu ecchy-  
 mus est confu-

Ad contu-

vel partium v-  
 laceratis plus  
 cavo collectum  
 nem immed-  
 acescit & gr-  
 piofiores, c-  
 eunt. San-  
 quod acidu-  
 tuo fermenta-  
 ex alcali & ac-  
 cali, facta per-  
 cem siendi mo-  
 nettans cum  
 rioris exempl-  
 fundens.

Sangu-

præter activ-

Sic sanguine  
 netrans inpr-  
 plumbea nig-  
 ubi locus est  
 me extensio-

virium profl-  
 verò collecti-  
 nis lésiones,  
 ca costas no-  
 comproban-  
 stam, prop-  
 effusio. Iter-  
 ria, tunc est

Denic-  
 grumosum



*contusione* si sanguis in partibus subcutaneis externis hareat, oritur sanguinis *susfuso* seu *ecchymoma*, ad Chirurgiam pertinens; *sin* verò interiora loca occupet, hujus est considerationis.

Ad *contusionem* pertinet in specie *casus ab alto*, in quo vel *ruptione*, vel partium violenta *contusione*, vel nimis validâ *contusione*, vel alia ratione ex laceratis plus minus vasis, in cavitates corporis sanguis effunditur. *Sanguis in cavo collectus* & ex vitali consortio proscriptus corrumpitur, quam corruptionem immediatè insequitur *acor* cum spissans, non secus, ac lac levi corruptione acescit & grumescit, multò magis sanguis lacte genitus, ubi particulae salinae, copiosiores, oleosae enim nutritivae & temperatiores in partium nutrimentum abeunt. *Sanguis* occulto tali acore *grumescit* successivè incipit *fermentare*, quod acidum coagulans convenit cum alcali volatili satis copioso, donec mutuo fermentando in tertium *usum*, quod vocamus *Pus*, abeat. Aluminosum est ex alcali & acido, album & lacteum verò à præcipitatione sulphuris, soluti ab alcali, facta per acidum. Et tunc mutato nomine *Empyema* dicitur, cujus *duplicem* *siendi modum* supra insinuavimus. *Prioris exemplum* dat ulcus thoracis penetrans cum copioso sanguinis in ipsum influxu, hinc in pus corruptione. *Posterioris exemplum* dat pleuritis suppurata, à rupto abscessu pus in thoracem fundens.

Sanguinem *lesionis externa occasione* esse effusum in cavitates corporis, præter activitatem causae, consequentia *symptomata* in specie declarant. Sic *sanguinem collectum* & congruatum *in abdomine*, præter vulnus penetrans in primis insinuat abdominis *tumor*, hinc inde spersus *livor* & quasi plumbea nigredo, post grumescentiam *durities* & *renisus* abdominis ad tactum, ubi locus est sanguinis congruati, non simpli. iter ex repletione, sed vel maxime ex tensione, horrentibus partibus viventibus cadaver sanguinis. Accedunt *virium prostrationes* insignes, *lipothymia*, *impedita respirationes*. *In pectore* verò *collectum sanguinem* ibique congruatum comitantur insignes *respirationis lesiones*, *tussis* admodum molesta, *dolores pectoris* varii, *gravitas* ac pondus circa costas nothas, extremorum *frigus*, *febris* plus minus acuta, quae omnino comprobantur per modum lesionis. Si enim *quis cadit ab alto* & perfringit costam, propter rupta vasa costis subiecta, sequitur necessario sanguinis in pectus effusio. Item *se quis fuerit punctim latus*, mox infra costas, ubi sunt venae & arteriae, tunc est signum effusi sanguinis in thoracem &c.

Denique *in capite* & sub ejusdem calvaria collectum esse sanguinem grumosum, monstrat dolor ejusdem *gravativus*, *sensus* insignis *pulsati*



nonnihil *lachrymantes*, *rubor faciei*; superveniunt symptomata stomachi, *nausea*, *vomitus biliosus*, *sanguis* nunc per os, nunc per nares, nunc per aures *exitum molitur*; interdum aëri obstupefcunt, aut brevi post lationem stupidi redduntur. Accedunt *causæ antecedentes*, aut validæ *contusiones* cranium effringentes, aut fortes *incisiones* cranium dividentes.

*Sanguinem* dicta in loca effusum *ad suppurationem tendere*, manifestat *febris* superveniens intensior, plus minus *acuta* pro circumstantiarum varietate: item *ardor* in ista parte, in qua fit suppuratio: Accedunt insignes *precordiorum anxietates*, *vigilia* & *deliria* &c. In specie ex rigore & febris suppuratio se manifestat. Interdum in loco quodam externo, v. g. si sanguis sit coagulatus in abdomine, circa inguina *abscessus* oritur, in quo & per quem sanguis congruatus & suppuratus feliciter postmodum evacuatur. Quod si pus factum fuerit, adeoque *empyema* adsit, remittit febris & reliqua symptomata, quin potius quædam *fluctuatio puris* percipitur. Speciatim *empyema thoracis* (si sit post pleuritidem, quæ præter ea, quæ pleuritidem suppuratam comitantur, si materia intra 14. dies sputo non rejiciatur, in pus mutatur; *rumpitur* autem vomica circa vigesimum, interdum 30 aut 40 diem; dum vero *rumpitur* vomica, rigor fit & febris intensior supervenit) insequitur *tussis continua* & frequens, item obscura & quasi è profundo producta; *sonus est obscurus*, quia tota hæc actio diaphragmatis occasione fit, non vero pulmonum: Illud enim à materia gravatur. Inter tussendum sentiunt in cavo pectoris *concussionem* aliquam, quia materia diaphragmati incumbens per tussim agitata & sublata recedit, adeo ut sæpe nil excernatur. In progressu verò post multos conatus purulenti quid excernitur, & tandem etiam aliquid saniosi. *Febris* adest, quæ in principio magis *acuta* esse videtur, in progressu verò mitior & *lenta* magis redditur, ad hecticarum fere naturam accedens, quæ vesperti præsertim exacerbatur & circa noctem vehementior est. *Respiratio* est gravis ac difficilis cum sensu gravativo, quando stant aut sedent. Si decumbunt, sentiunt aliqualem *fluctuationem* & decumbendo sine molestia ferè respirant. Sic quando calceos aut ligare, aut solvere volunt, videntur *suffocari*. Tunc enim à pondere incumbente introrsum versus, diaphragmatis motus fere impeditur; *anxietates* subinde vexant, *sudores colligativi nocturni* superveniunt, item *palpitatio cordis*; sentiunt frequenter *evaporationem* ad os, instar aquæ ferventis, mala è regione partis affectæ subinde phlogosi quadam *rubet*. Malo ulterius progrediente percipiunt saporem cinereum & putridum. In pulsu hoc est singulare quod creberrimis vicibus *intermittat* unum vel alterum pulsum, idque speciatim, si tangatur in carpo lateris affecti, altero in carpo appposito pulsu subinde rite se habente. Si in dextro latere est *empyema*, tunc decumbentes in eodem bene habent, sin autem decumbunt in sinistro latere malè habent & contra.

Pro-

Progre  
effusus est, va  
tò evacuari, a  
vel per factum  
bres interdum  
ra, non raro  
phthisin & ta  
infert.

Quoad  
ed incumben  
cys evacuet  
per debitas v  
Via con  
ex, ad quas sp  
guis collectus  
ari, dum mat  
Adeoque si v  
facienda & c  
costas sectio  
pure. Den  
optima & pr  
do quoad le  
more, aut nu  
ed optiores

Post casu  
dam corporis  
instituat, &  
copiosè in c  
ratione loci  
vena secetur  
teriora thora  
ferè sufficit.  
ductu natu  
hauriendum.

Resolv  
eminent:  
bellis minor,  
lap. S. osteo



*Prognosis* pro quantitate sanguinis effusi & qualitate loci in quem effusus est, variat. Nam sanguinem collectum plus minus congruatum subito evacuari, aut hoc si non fiat, suppuratum facile per vias naturæ consuetas, vel per factum & apertum quovis in loco abscessum excerni optimum est. Febres interdum periculosa superveniunt sanguinem suppuratum, interdum ulcerata, non rarò gangræna partium internarum. *Empyema pectoris* ut plurimum phthisin & tabem causatur; sanguis in capite collectus ut plurimum mortem infert.

Quoad *cuvam*, in sanguine congruato, si sit à vulnere, seu casu ab alto, eò incumbendum ut 1. *congruatus solvatur*. 2. *Per convenientes vias quancocyus evacuetur*. 3. Si hoc fieri nequeat, ejus *suppuratio adjuvetur*. 4. *Pus per debitas vias emittatur*. 3. *Lesio partis curetur*.

*Via convenientes*, per quas tam sanguis quam pus evacuandum venit, sunt ea, ad quas sponte vergit *natura*, & ferè monstratur per locum in quo est sanguis collectus, seu evacuetur per *urinam*, seu *sudorem*, seu *alvum*; vel quas docet *ars*, dum materias in cavitatibus collectas optimè evacuat earum *perforatione*. Adeoque si *vulnus est in abdomine*, apertio major, si punctum factum est vulnus facienda & ejus debita *paracentesis* instituenda. *Thoracis apertio* & inter costas sectio convenientissimum est remedium pro evacuando sanguine & pure. Denique in capite optimum remedium est *trepantio*. Hæc sanè inter optima & promptissima auxilia recensenda, quæ citò & tutò satis adjuvat, modo quoad legitimum usum temporis habeatur ratio, & non perverso nostro more, aut nunquam, aut tardè nimis instituitur, quia quò celerius instituitur, eò optatior est successus.

Post casum g. ab alto aut etiam quamvis occasionem sanguine in cavo quodam corporis collecto, & hinc plus minus congruato, in primò principiò V. S. instituitur, in corpore præsertim plethorico, ne sanguis confertim nimis & copiosè in cavitatem irrumpat. Habenda semper ratio *regularum revulsione* ratione loci, in quem influit sanguis, ut nempe in contrario seu opposito loco vena secetur seu aperiatur. Dum nempe sanguis influit in *abdomen*, vel per interiora thoracis vasa, in *thoracem*, secetur in pede; Sin in capite V. S. brachii ferè sufficit. Sectâ venâ subito sanguis omnis congruatus *resolvendus*, & vel ductu naturæ per vias consuetas *evacuandus*, vel per meatus arte apertos, arte *hauriendus*.

Resolvunt sanguinem grumosum vulneraria plurima quæ inter in specie eminent: *Rubia Tinctor*. *tormentill*. *symphitum maus*. *absinthium*. *hypericon*. *bellis minor*. *chærefol*. *C. B. fenicul*. *it. rhabarb. rad. vicetox*. *pimpinell*. In specie *lap. S. osteocoll*. cum ac. dest. vini propinata, hinc sanguis hirci legitime collectu



perquam nobilis. *Bolus armena, succinum, spermaceti* à ℥℥. ad ℥j. in vehiculo calido propinandum; *mumia, carbones tilia*, ad ℥j. in aq. *chærefol.* propinata. *Pinguedo humana* ad ℥j. in potu cerevisiæ est optima in calu ab alto: Hinc *pulv. Augustan. contracasum. species diamumia Myns. essent. mumia, hyperici, extract. flor. bellid.* ꝯ. *diaphor* & quælibet ꝯ *ialia fixa*, acidum plus minus absorbentia &c.

In propinandis his remediis *in casu ab alto* ac sanguine coagulato observatur necessario *cantela*, ut nempe his semper addantur talia, quæ sanguinem resolutum per *vias urinarias* amandent, quod convenientissimum est, præsertim *si in pectore* locisve vicinis sanguis hæreat. *Si magis in locis aut vasis maioribus remotis hæreat* sanguis, *sudor* præsertim provocandus; *si per alvum* educendi animus sit, *rhabarbarum* aut *senna* conveniunt v. g.

℞. *Chærefol.* Mj.

*rhabarb. el.* ℥ij.

*fol. fenn.* ℥i℥.

℥. *tart.* ℥j. ad ℥℥.

coq. in f. q. aq. f. ebulliant leniter. Colaturæ adde

*lap. ℥.* præp. ℥ij.

*pulv. contra cas.* August. ℥℥.

*Syr scabios.* q. f. pro grato sapore.

M. detur pro aliquot dosibus.

*Lindanus* refert exemplum, quod, dum ædificaret, faber quidam lignarius è summo deciderit tecto, frigerit duas costas, sanguinem multum spuens, quod videns dedit ei *portionem vulnerariam ex lap. ℥.* ex quo sanguinem protinus mejere cepit & quidem integras matulas, & brevi restitutus fuit; etiamsi quoque sanguis in ipsum cavum pectoris effusus esset, usus tamen fuit *decocto brassica rubra, artemisia, consolida Sarracen. & bellid. min.* Huic decocto infudit aliquid *spermatis ceti*; hinc sumsit seorsim *lap. ℥.* & illis affudit ad eminentiam digiti transversum *acetum*, cumq; deferbuissent, dedit hujus aceti cochl. j. & miscuit ℥iiij. l. v. decocti prioris, unde felicissime fuit curatus. Ac sane potius præstat à *diureticis* incipere, in fine autem non incommodum aliquod *sudoriferum* subnectere. Adeoque convenit in dictis casibus *mixtura polychresta ex lap. ℥. cum ac. dest. &c.* vel præscribatur talis *pulvis contra casum ab alto*

℞. *Lap. ℥.* præp. ℥j.

*rhabarb.*

*sperm. cet.*

*mum.*

*sang. hircin. leg. præp. aa.* ℥℥.

M. dos. ℥j. in decocto *chærefol. l. feniculi*, &c.

Cura



*Cura Empyematis*, seu quando pus factum est, & in cavitate fluctuat, præsertim *thoracis*, tribus scopis absolvenda venit. 1. Pus evacuandum. 2. Acrimonia ejus noxia corrigenda. 3. Læso partis inducta restituenda.

Quoad puris evacuationem, hæc per convenientes vias instituenda venit. *Via convenientes sunt vel naturales vel artificiales*: Illæ quibus natura molitur evacuationes, & quæ tubinde per varia loca inimitabili arte purulentias evacuat, ut dum v. g. pleuriticorum, vel alias in thorace suppuratorum purulentias, nunc per *urinas*, nunc per *alvum*, nunc frequentissime per *sputum* evacuat, imo per *purulentam*, in toto corpore *scabiem*, quo de *vid. M. A. N. C. Ann. 2. p. 230.* solvi observatum fuit. Sanè pus *Empyici* per *urinam* excretum c. dolore quasi nephritico & stranguria refert *Horst. l. 3. obs. 10.* Simile *vid. ap. Panarolum, it. Borellum Cent. 1. obs. 17.* Ipsemet curavi mulierem gravi pleuritide correptam, suppuratam, cui supervenit fecidissima materiæ purulentæ urina, qua per 10. vel plures dies continuante cum sensibili alleviatione ipsa sanabatur. *Præcavebam simul phthisin ac tabem* per pulveres & antihæctic. Poterii, myrrh. l. ℞. ꝑ. diaph. bals. sulphuris terebinthinat. &c. Elix. Prop. rarò propinabam, quia hoc semper alvi fluxum sistebat, ut necesse esset, eam denovo provocare clysmate. Sicut jam *supra* hujusmodi variæ excretiones circa *hepatis & lienis abscessus* insinuatae fuerunt. Facit huc quod refert *Hildan. Cent. 3. hist. 39.* Nempe ulcus diuturnum in brachio ex ictu sclopeti, quod, quia per *urinam* pus excernebatur, ulcus siccabatur: Quàmprimùm vero ulcus recenter fluebat, tum patiens rursus *urinas* laudabiles nullo pure permittas reddebat. *Per quas vias materiæ Empyematis in pectore* v. g. deferatur ad *urinam*, aut *alvum*, aut etiam ad *os* pro expuitione, plures Autores litigant. *Conf. Senn. l. 2. prax. ubi de pleurit. quest. 3. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 150. 201. M. A. N. C. Ann. 3. p. 393. & Ann. 6. p. 75.* His in casibus si molitur aliquid natura, semper minister ejus est Medicus, dum, quo illam vergere videt, eò simul motum illius promoveat. Si vero rupto abscessu & collecto jam empyemate pectoris, eam nil moliri observat, pro copia puris dum vires adhuc constant, evacuanda, imprimis vomitus convenit, cujus insignes utilitates pluribus *Piso de colluvie serosa* declarat. Hinc *sputum* imprimis promovendum, ut hujus medio ceu per proximas vias, modumque magis ordinarium puris fiat evacuatio. Pro quo scopo *Nicotiana* est egregia, cujus usum *supra* ex *Ferdinando* declaravimus.

In sputo hoc promovendo habenda simul ratio qualitatum materiæ purulentæ evacuandæ, quæ quò acrior fuerit, ac tenuior, eò magis *temperantia* simul usurpanda sunt: Quod si vero non acre sed crassius sit pus evacuandum, *incidentia & abstergentia* magis in usum vocanda. In specie *mel* & ex eo paratum *hydromel* seu *mulsa*, *oxymel squillium*, inter expectorantia primatum ducunt; in

qua



quamulsa hyssopus, scabiosa, parietaria, helenium, iris, marrubium liquiritia, iujub. passula pro indicantium varietate simul incoqui & propinari possunt. Vel fiat *mistura* expectorans

℞. ∇. hyssop. ℥iij.  
asthmat. ℥iij.  
oxymel squillitic. ℥vj.  
styr. Nicotian. ℥ss.  
emet. ℥ss. M. capiat pro lubitu.

*Artificiales via* pro evacuando pure sunt *paracentesis*, quæ ubi priores illæ *naturales* vel non suffecerint, vel non suffecturas suspicio est, *in tempore* institui potest. *In tempore dico*, ut quando natura *empyema* non expurgat per *urinam*, statim instituenda *Paracentesis*, ne pus in sanie conver tatur, ne vires frangantur, ac pulmo à sanie corrumpatur.

2. *Acrimoniam puris* & eius *noxam* corrigunt, hoc est ut aliàs dicunt, *ulcus abstergunt* & *mundificant* optimè remedia *sulphurea*, quodcunque acce temperantia & *balsamica* quasi vi ulteriorem progressum *apostematis* & *puris* inhibentia, uti sunt *sulphur* & *g nialia fixa* &c.

3. *Ea vero, quæ lesionem partis* post abscessum suppuratum *restituunt*, sunt *vulneraria*, præ cæteris *hedera terrestris*, *scabiosa*, *chærefolium*, item *lignorum* & *radicum decoctum* &c. Optimè hæc duo junguntur, sed semper habenda est ratio 1. *puris*, ut hoc vel prius, vel simul evacuetur. 2. *Febris adjuncta*, ne hæc plus majus intensa augmentetur. *Purulentias* ergo istas *abstergunt* & *corrigunt*, *g nialia fixa*, *g nium* præsertim *diaphoreticum* ad ℥j. c. decocto *chærefolii* vel decocto *radic. china* propinatum. Hoc *g nium diaphoreticum* suppurationes quas cunque curat, sanguinem congruatum & *empyema* pectoris tollit, atque tunc cum *rad. china* vel *lign. Guajaci* simul coquenda *hedera terrestris*, *tussilago* & *consolida major*, & si viscidum aliquid adest, etiam *hyssopus*; non opus est multa addere; simplex sufficiat *decoctum*, cum quo propinetur *g nium diaphor.* *Sulph.* pariter ejusque flores, item *bals. sulph. terebinthin.* aut *succinatus*, sunt egregia, mundificant ulcera & ulteriorem corruptionis progressum præcavent; quod si hujus igneus pertimescatur calor, permiscetur optime *saccharum Hni*, vel *antihæticum Poterii*, quæ optimè conducunt, item *tinctura sulphuris*, item *balsam. Peruv.* cui ut & *balsamo sulphuris* substitui potest *decoctum ligni quajaci*, adjunctis præsertim *vulnerariis* paratum, est egregium in *empyematis* cura; præsertim *Pavus Tr. de Vulneribus Capitis* egregiam habet methodum, mediante hoc *decocto* curandi *empyematicos*: Nec incomodè *ligna santala* hîc recipiuntur v.g.

℞. Rasur. ligni Guajaci ℥j.  
sassafr. ℥ss.

macerna

macera per 2. h

Coqu. ad rem  
die capiat, sul

Vuln  
præferenda,  
aut cum g  
æstimant

sacchari parum  
nique decoctum  
egregium est,  
quoque capri  
gium vid. M  
de Phibisi &

Leditur  
tus extra corp  
que sanguini  
tiones: Ex  
velica, mict

Ca  
in venis & a  
vasorum læ  
seu casum:  
iplas tunica  
diabrosis: 2  
indare possi  
detur possib  
Pari



macera per 2. horas in  $\nabla$ . comm.  $\text{℥viij}$ . coque ad consumptionem  $\text{℥viij}$ , adde

heder. terrestr.

comar.  $\text{℥i}$ . hyperici.

herb. veronic. aa.  $\text{mj}$ . ad  $\text{mij}$ .

rad. glycyrrhiz  $\text{℥ss}$ .

sem. fœnic.  $\text{℥vj}$ .

passul. minor. conquassatar.  $\text{℥iiij}$ .

Coqu. ad remanentiam  $\text{℥bj}$ . M. S. *Decoctum*, de quo eger ad minimum ter in die capiat, subjungendo & alia remedia.

*Vulneraria* inter præ cæteris excellit *hedera terrestris*, omnibus cæteris præferenda, cujus *decoctum*, aut ex succo paratus *syrupus*, item *pulvis* aliis addita, aut cum *genuo diaphoretico* assumpta, sunt nobilissima; hinc sunt qui maximè æstimant

$\text{℞}$ . Succ. hederæ terrestr.  $\text{℥iiij}$ .

prassij (id est marrubij)  $\text{℥ij}$ .

thuris, myrrhæ aa.  $\text{℥i}$ .

sacchari parum; redigantur ad consistentiam *syrupi* & subinde usurpentur. Denique *decoctum brassicæ capitata rubra* c. tantillo saccharo temperatum, perquam egregium est, promovendo simul materiæ purulentæ effluxum per *urinam*. *Lac* quoque *caprillum* cum saccharo rosato usurpatum, pro ultimo hoc scopo est egregium vid. *M. A. N. C. Ann.* 1. p. 78. Conf. c. his *Willis Pharm. ration.* p. 2. ubi de *Phthisi* & *empyem*.

## HÆMORRHAGIA.

*Leditur etiam sanguinis motus*, quando hic ex suis vasis & receptaculis penitus extra corpus effunditur, idque in *hemorrhagiis*, quæ vox in genere quamcunque sanguinis effusionem innuit, in specie postmodum varias fortitur appellationes: Ex vasis ani enim *fluxus hemorrhoidum*, ex vasis uteri, *meneses*, ex vesica, *miætus cruentus*, ex pectore, *hemoptysis* &c. dicitur.

*Causa* cujusvis *hemorrhagia* est, vel ipsorum extimorum osculorum in venis & arteriis apertio quasi spontanea & dicitur *anastomosis*, vel est ipsorum vasorum læsio & soluta unitas, quæ fit, aut per instrumenta acuta, seu punctum, seu cæsim: Aut per humores corrodescentes acres & extremitates osculorum, aut ipsas tunicas tenuiores perforantes: Quæ posterior species dicitur *diæresis*, seu *diabrosis*: *Ἀπ' ὧν* autem sanguinis seu tenuitas, ut per vasorum tunicas transiudate possit, citra osculorum apertionem, vel ipsarum læsionem, non adeo videtur possibilis: Sunt enim satis densæ satisq; validæ & tenaces venarum, multò

*Par. II.*

magis



magis arteriarum tunicae, ut haud videatur tantillum per easdem transfudare posse de ipsa massa sanguinea integra.

*Vasa* per quæ sanguis effluit, sunt imprimis arteriolæ; nam ex venis vix effluit, nisi *incisis* & *erosis*, ut in vulneribus: Sanguinem extillare ex arteriis, patet ex eo, quod omnis *hemorrhagia* v.g. *narium* fiat stillatim & subinde notabile spatium intercedat, inter unam alteramve guttulam cadentem, id quod *ratione arteriarum, non venarum* fit; quando enim cor sanguinem in arteriam pellit, idem ex arteria aperta propellitur. Quando vero arteria subsidet, non amplius adeo confertim effluit, & ita successivè stillatim sanguis erumpit, quod patet etiam in *arteriotomia*, in qua subsultando pro pulsus ratione, sanguis erumpit.

Est autem *hemorrhagia* omnis vel *spontanea*, vel non *spontanea*; *spontanea* est opus naturæ exonerantis corpus, ut in *fluxu mensium* patet, aut *hemorrhoidum*, aut *hemorrhagis narium periodicis* &c. Non *spontanea* est vel *critica*, vel *symptomatica*. *Critica* quam post materiæ coctionem natura in morbo facit, ut una per illam curet; & hæ duæ species *spontanea* & non *spontanea critica* nunquam curandæ, nisi sint immodicæ. Nam *spontanea symptomatica* vel morbus est, vel ex habitu corporis morbo, unde primario præcaveri & curari potest.

Deinde *hemorrhagia* est vel *habitualis*, vel *accidentalis*. *Habitualis* crebrius & vel brevi vel nulla præcedente occasione redit & affligit. *Accidentalis* vero raro, nec nisi magna data occasione contingit & affligit. *Accidentalis* est vel *cum febre*, vel *sine febre*; ibi ad turgescentem & ebullientem sanguinem simul plus minus respiciendum: item an *critica* magis, an *symptomatica* fuerit.

Quoad *causas* hæmorrhagiarum *remotas*, *anastomosis* fit vel *vicio sanguinis*, vel *vicio vasorum*, vel *utrimque*. *Vicio sanguineo* fit, propter eundem vel abundantem, vel turgescentem, vel fecermentem. *Vicio vasorum* vero propter hæc inæqualiter stricta aut laxa.

Adeoque *3plicitè anastomosis* fit 1. propter *abundantiam* vel *plethoram sanguinis*, aut *absolutam* eamque rariorem; aut 2. propter *plethoram respectivam* seu *apparentem*, eamque frequentiore, nempe propter *turgescentiam ejus nimiam*, dum majori motu intestino ab exercitio, aut corporis incalescentia, aut etiam effervescentia febrili, v.g. in *principio variolarum* turgescens & quodammodo ebulliens sanguis, sicque mole auctus ordinariis vasis & receptaculis contineri amplius nequit, quin per capillarium orificia distendens eadem sicque aperturam faciendo erumpat. Hinc *obesi*, item *vini potatores* frequentius *hemorrhagiis* obnoxii sunt; quò multum facit simul *suppressio ordinaria* cujusdam, quodam

dam in loco, sanguine pertractatus habendus aquositate sua tenuitate factamen & hic a culte rosæ ac hæc contingit & inde nata vrinæ defectu

Vitio  
nis circulus p  
tributio, vel  
fibrarum ner  
um, vasa recipi  
dam arteriofu  
motus impedi  
fatio in extrem  
natis hoc vi  
ita tamen ut p  
pulsationes in  
tum. Unde  
inferunt von  
ut plurimum  
hemorrhagia  
nerveæ parti  
& ita languif  
quidem influ  
tus, per venar  
cæ qua data  
infert. Sic  
inde gravissi

Pertin  
& crebrius  
ad diathesi  
stema pathe  
in loco a spi  
tensionis ser  
servatione



dam in loco sanguinis excretionis. Simul tamen in his & ad statum vasorum à sanguine pertranseunte plus minus irritatorum, hinc sanguinis motus variatione respectus habendus. 3. Anastomosis à sanguinis tenuitate obseri abundantia seu nimiam aquositatem oritur; quo facit & fibrarum & partium tonus laxior, ut ipse sanguis sua tenuitate facile orificia venarum permeet, eademq; ita aperiat. Ut plurimum tamen & hic acrimonia sanguinis plus minus salsa, aut acido salsa, adeoque occulte rosua accedere solet. Vulgo vitio hepatis male sanguificantis hemorrhagia hæc contingere dicitur; Vitium autem hæret in primis viis, læsa digestionem, & inde nata vel serositate vel acrimonia sanguinis. Dispositivè concurrunt nunc utrinæ defectus, aut sudoris confluxus suppressio, nimius potus &c.

Vitio vasorum denique fit anastomosis, quando per hæc æquabilis sanguinis circulus per arterias in venas interrumpitur, ita ut æqualis vel per arterias distributio, vel ex arteriis in venas transvasatio impediatur, idque ferè ob spasmus fibrarum nervosarum, tam ipsorum vasorum sanguifluorum, quam 2. partium, vasorum recipientium. Adeoque si ex priori modo contingat, ut furculus quidam arteriosus plus minus constringatur, adeoque per eundem liberior sanguinis motus impediatur, unde furculus vicinus majori sanguinis mole distentus necessario in extremitate aperitur, & facta ita anastomosi sanguis effunditur. Splenetici hoc videtur familiare, quibus interdum superveniunt sanguinis vomitus, ita tamen ut percipiant prius fortes pulsationes circa lienem, locaque vicina, quæ pulsationes innuunt motum sanguinis per arteriolas in splene nonnihil impeditum. Unde ramuli arteriosi vi aperiuntur in stomachum, & ita sanguinis inferunt vomitum. Virum novi habituali hemorrhagia narium obnoxium, qui ut plurimum molestiam quandam in sinistra thoracis parte percipit, antequam hemorrhagia narium superveniat. Quod si posteriori modo accadat, ut fibræ nervæ partium recipientium quacunque ex causa irritatæ, se fortius stringant, & ita sanguiflua vasa plus minus coarctent, ex impetu sanguinis per arterias ejus quidem influxus adhuc continget, sed non refluxus, qui plus minus impeditus, per venarum magis flaccidarum ac molliorum ora constricta per vicina loca qua data porta ruit, arteriolarum anastomosi facit, sicque hemorrhagiam infert. Sic nempe omnia narium irritatio ab euphorbio &c. hemorrhagias subinde gravissimas inducit, vid. Kerkring. specileg. p. 100.

Pertinent ad anastomoses hæc scorbuticorum hemorrhagia insignes admodum & crebrius ingruentes, non tam ob sanguinis crassius plus minus vitiatam, & ad diathesin acidam plus minus declinantem, sed quod horum nervosum systema pathematis convulsivis obnoxium admodum sit, unde irritatum quodam in loco à spinis salinis scorbuticis alicubi infixis mox tendi fibræ, pulsationis, aut tensionis sensus, hinc hemorrhagia oriri solent. Comprobat hoc notabili observatione Willis pharm. rac. p. 2.



In hisce anastomoseos causis tam ad sanguinem, quam vasa ut plurimum respiciendum venit, ita quidem ut frequentissimè acidum consuetum sanguinis motum ad organum præternaturalem concitans, aut itidem acidum plus minus salsum vasa eorumque ac partium vicinarum fibras vellicans, considerandum veniat.

*Diuresis & diabrosis* oritur, quando aut incisione aut punctura aperiuntur vasa, vel quando à causis internis fit erosio vasorum, quas inter interdum est imprimis *lympha acris* nimis & acido salsa, vasculorum orificia erodens, & inspirata quæcunque nimis acris huc pertinent, quæ tam irritare, quam erodere narium ac pulmonum vasa poterunt, unde dictarum partium hæmorrhagiæ.

Pro varietate causarum varius etiam est sanguinis effluentis modus, dum qui effluit, floridus, rubicundus, copiosus, fere anastomosis, propter aliqualem sanguinis abundantiam & turgescientiam insequi solet, cum quibus simul conferantur causa antecedentes: v.g. Si effluit tenuis, aquosus, loturæ carniū similis, ferocitatem nimiam & aquositatem sanguinis sequitur. Quod si sub hæmorrhagiâ accidit fortis regionis plus minus vicinæ pulsatio, hæc ferè vitiatū, plus minus circulum innuere solet. Quod si ab acris corrosa sint vasa, externæ causæ se ipsas offerunt. Sin in internis sit vitium, manifestò plus minus acris salsus sanguis effluens gustari solet.

Quoad prognosin, hæmorrhagiâ nimia quæcunque, ut virium prostrationes, animi deliquia & ἀσφύξια immediate inferunt, ita mediatè cachexias & hydropes: Moderata & consueta & plus minus periodica hæmorrhagiâ, quocumq; in loco fiat, si subiecti conditio respondeat & hoc facile ferat, salubris, cum deficientem varia mala, ut & excedentem insequi soleant. Moderata igitur talis non sistenda est. Periculosissima & curatu difficillima hæmorrhagiâ est, quæ ex diuresi oritur, præsertim si arteriæ plures, aut plus minus insignes læsæ fuerint; quæ ab anastomosi vitio sanguinis vel absolute vel respectivè abundantis nascitur, curatur facillimè. Quæ vero vitio sanguinis ferescentis, tardè & quasi medio modo se habet. Ita quæ vitio vasorum contingit, pro ratione morbi primarii plus minus curabilis esse solet.

In Cura ante omnia considerandum est, an curanda sit hæmorrhagiâ, an sinenda? de quibus supra: Deinde in habituali distinguenda est cura in eam, quæ fit tempore paroxysmi, adeoque est curatoria, & eam quæ est extra paroxysmum, adeoque præservatoria. Tertio probe considerandum, an ipsa hæmorrhagiâ sit morbus solitarius & primarius, an vero secundarius, & si hoc, an sit cum febre an sine febre. Hinc omnis hæmorrhagiâ critica, idque omnis spontanea per



per quaecunque loca, quæ naturæ solennis est & adlueta, curari non debet, nisi sit nimia. In quo casu priori subinde evacuatio quasi succedanea instituenda venit, v.g. per *venesectionem*, *cucurbitulas*, *hirudines* & *fonticulos*. &c. His *premissis* quoad causas proximas, *anastomoses* vasorum, usurpatis internis sanguinis impetum coercentibus, & externis *vasorum ora* adstringentibus & sanguinem profluentem incrassantibus, sunt occludenda.

*Diæreses* vero *vasorum* per interna, ac re quodvis temperantia & externa, *vasa* plus minus arrosa *adstringentia*, *consolidantia*, *conglutinantia* sunt restituenda.

*Externa* ista, eorumque administrandi rationem, in sequentibus, ubi de *hemorrhagiis in specie*, pluribus explicabimus. Hac vice *interna* cuiusvis *hemorrhagiæ* speciei plus minus applicabilia consideranda veniunt.

Quoad causas remotas, in *anastomosi* quidem vitio sanguinis, sanguis nimis vasorum ora aperiens, imminuendus nunc *venesectione*, nunc *scarificatione*. Idem turgescens compescendus, vel *precipitantibus*, vel *absorbentibus* fermenta ista acida volatilia, vel acidis fortioribus volatile acidum figentibus & coercentibus. Quo pertinet v.g. *Spir. vitrioli* hæmorrhagias narium scorbuticas subinde figens. Confer *M. A. N. C. ann. 3. p. 176.* Idem serosus nimis corrigendus vel *exsiccantibus*, aut imbibentibus, aut *incrassantibus*, & deinde vel *evacuantibus* serum per alvum, per vesicam, per habitum corporis. In *anastomosi* vero vitio vasorum acidum istud nervorum spasmos inducens corrigendum, per *ortialia* in morbis convulsivis & hæmorrhagiis habitualibus pro eradicanda radice optimis.

Quoad causas remotas diæreseos, si hæc fiat vitio sanguinis acrioris, ac re saltem temperantia, & sanguinis cras in corrigentia sunt optima, ut *passulata*, *vulneraria*, *lactucina* &c. si vitio vasorum erosorum, *vulneraria adstringentia* sunt convenientissima.

Pro his scopis obtinendis observetur

I. Convenire interdum *venesectionem*, seu aliam sanguinis evacuationem. Dico interdum: Nam perversa Chirurgorum est consuetudo, ut in omni hæmorrhagia sanguinem mittere velint. Verum hoc stultum est, quoties sanguis non abundat, eundem jam effluentem velle ulterius evacuare. Scilicet in quavis hæmorrhagia sanguis pure passivè se habet. movetur nempe eò, quo spiritus impetu & organorum moventium pellitur, & effluit, ubicunque vasosum ora aperta sunt, utut occasionalis causa interdum in sanguine hæreat. Non ergo sanguinem evacuando, sed causas occasionales, seu in sanguine, seu in parte, per quam fit effluxus, hæreant, removendo corrigendæ sunt. Unica sanguinis abundantia seu plethora, tam vera quam quibusdam in casibus apparens, est quæ



in hæmorrhagiis venæsectionem indicat. Ideoque etiam in solenni evacuatione sanguinis suppressa, sanguinis detractio locum habet, observando *revulsio- nis & derivationis regulas* &c.

2. *Purgationes* sunt ridiculæ, nisi abundantia nimia laticis a- quosi, nimis fluentem faciens sanguinem, sui evacuationem urgeat. *In tali enim casu* utique purgatio seri per inferiora convenit. Unde & tum rectè commen- dat eam *Riverius in Praxi* & confirmat hoc experientiâ *Rondeletius*, qui curavit quendam singulis diebus 2. vel 3. libras sanguinis rejicientem, solis syrupis sero- sos humores evacuantibus. *Seri enim copia* quod vehiculum sanguinis est, subinde fluxus hujus est causa, præsertim si acrius idem fuerit. *Quin & per sudorem* hoc commodè fieri potest: Ut ut enim *sudor*, dum actu erumpit, dissolvendo massam sanguineam eundem fluxiliorem reddat, postmodum ta- men ubi desit, sanguis sero depauperatus spissescit, & salibus superfluis aut he- terogeneis liberatus mitius evadit & dulcescit, sicque hæmorrhagia cessabit. In specie ubi cum febre fuerit hæmorrhagia symptomatica, per sudorifera, non qui- dem volatilia, sed additis opiatís compescenda venit. Confer hic *Willis Pharm. rat. p. 2. p. 418.*

3. *Opiata generalia* sunt hæmorrhagiarum remedia, dum & irrita- tionis sensum in hac vel illa parte undecunque excitatum sopiunt, & spirituum moventium impetum plus minus refrænant adeoque quosvis sanguinis inde concitados motus quietiores reddunt, quo ipsum catholicum ἡγάμα, id est, si- stens, meritò habentur. Experimenta hujus rei novissimè retulit Medicus quidam Hassiacus, *Mich. Bernh. Valentini*, in Epist. ad D. D. *Widtium*, *Archia- trum Spirenses*, de *Nova Matricis & Morbone Muliebris Anatome*, ubi fusè o- stendit, quantum opiata in ovarium æquè ac uteri hæmorrhagiâ valeant.

Ex dictis patet remedia ad hæmorrhagias usitata esse (1.) vulneraria & adstringentia, sanguinem partim inspissantia, partim vi alcalina, acida vitiosa ab- sorbentia, partim vasorum læsiones restituentia, ut *plantago*, *portulaca*, *bellis mi- nor*, *rosa* &c. vel (2.) absorbentia tam martialia hisque cognata, *corallia*, *ham- ates*, *terra*, *boli* &c. quàm animalia, ut *C. C. f. Δ. ebur sine Δ. unicornis verum*, *dens hippopotami* &c. Sane Otialia in habitualibus hæmorrhagiis hypochon- driacorum, scorbuticorumque subinde sunt stupenda, confer. *Lovverum con- tra Meuram p. 19. M. A. N. C. anno 2. p. 324. p. 176.* Sunt præstantissima, partim quod acidum vitiosum hæmorrhagiæ occasionalem causam absorbeant, partim quod radicem in primis viis, unde affectus hæmorrhagiarum spasmodici super- veniunt, excindant. Otialia nempe per se adstringunt, unde perinde est, seu aperi-

aperientia ser-  
& inde depet-  
producti in r-  
struaciones q-  
mis fluentes  
aperit eorum  
fructu pro e-  
driacis, scor-  
cedentes au-  
tate anima-  
corrigendo  
rea, aut ali-  
riorum, vel  
cinia &c.  
turgescere nu-

In hæmorrh-  
in vini potat-  
nimis calido

Item

Extractionem



*aperientia* seu *adstringentia* usurpentur, modo acida vitiosa primarum viarum & inde dependens sanguinis crasis vitiosa corrigatur, & affectus convulsivi hinc producti in radice emendentur. *Observavi hoc aliquoties, circa mulierum menstruationes*, quæ per *liquorem Martis solarem* & c. ientur deficientes & sistuntur nimis fluentes; quod pariter circa *Tincturam vitrioli* & *Zuvelfferi* observavi, quæ aperit eorum defectum, & tamen inordinato & sæpius recurrente fluxu cum fructu pro eodem sistendo eam usurpavi; adeoque in cachecticis, hypochondriacis, scorbuticis & c. ad sanguinis fluxus præternaturales quoscunque aut decedentes aut excedentes *Antialia* pro curatione utramque faciunt paginam. Citatæ *animalium partes* pariter nonnisi absorbendo, aut acida vitiosa fermenta corrigendo operari solent, vel (3.) *serum imbibentia* & *incrassantia*, ut *usta terrea*, aut aliunde *evacuantia*, ut *purgantia*, *diuretica*, præsertim ex classe *vulnerariorum*, vel (4.) *sanguinem attemperantia* & quasi *edulcorantia*, ut *passule*, *lacticia* & c. Ex his patent *facile remedium formula*, v. g. in hemorrhagiis *turgescete nimis sanguine cum impetu febrili & phlogosi vaga*

℞. ▽. plantag.

semperviv. maj. ana ꝑß.

syropi papav. alb. ꝑj.

tinctur. fl. bellid. cum

spiritu vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. M.

Capiatur cochleatim.

In hemorrhagia habitualibus ex eodem sanguine turgescete ex acido volatili, v. g. in vini potatoribus & c. adeoque in iis, qui vulgo ex sanguine biliolo & hepate nimis calido hemorrhagias pati dicuntur

℞. Dentis hippopot. præp. ꝑß.

corall. rubr. præp. ꝑj.

lapid. hæmatit. ꝑß.

facchari hñi ðij.

laudani opiat. ðß. M. S.

Dämpffend Pulver. Capiatur subinde mane quantitas cultelli cuspidis.

Item ℞. Extr. flor. ꝑij

ebor f. △.

dent. hippopot ana ꝑß.

corall. rubr præp. ꝑj.

lapid. hæmatit. præp. ðij.

c. f. q. syrup. ros. rubr. & papav. rhæad. f. electuar. M.

Extractum paratur ex flor. rosarum part. ij. fl. papav. rhæad. bellidis rubr.

ana



*ana part. i.* per multiplicem infusionem in  $\nabla$ . simplici, expressionem & inspissationem. Sic parabitur *extractum* succosum ad imitationem *Aug. Salæ*, ubi de *extractis vegetabilium*.

*In hemorrhagis habitualibus ex sanguinis tenuitate serosa*

$\mathcal{R}$ . Passul. minor. aut earundem pulpæ  $\text{ss}$ .  
rhabarb. el.  $\text{z} \text{ij}$ .  
Tartari vitriolati Tachenii  $\text{zj}$ . c. s. q.

syrupi pomorum fiat electuarium.

Utile & est per sudorem occurrere tali hemorrhagiae.

$\mathcal{R}$ . C. C. usti  $\text{zj}$ .  
terræ sigill.  $\text{zss}$ .

laudani opiat. gr. iij. pro duabus dosibus

cum sudore usurpandis.

*In hemorrhagiâ ab acriori sanguine à lymphâ aut erosione, aliisve modis concitata, sanè polychresta est mistura Sylvii l. i. prax. c. 9. §. 20, ad cujus imitationem*

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$ . plantag.  $\text{z} \text{ij}$ .  
cinamom.  $\text{zj}$ . ad  $\text{z} \text{ij}$ .

† vini  $\text{z} \text{ij}$ .

corall. rubr. præp.  $\text{ðj}$

terræ sigill.  $\text{ðj}$ .

laud. opiat. gr. iij.

syrup. myrtin.  $\text{z} \text{ij}$ . capiat cochleatim

*In usu igitur sunt ad hemorrhagias ex regno vegetabili: Portulaca, plantago, polygonum, millefolium, foliatener. quercus, rosa rubra, cortices granatorum, balauustiorum, bursa pastoris, sanicula, pyrola, bellis minor, ruta, hedera terrestris, radix urtica, Symphitum majus, tormentilla, sanguisorba, bistorta, &c. fructus myrtilli, item papaver, hyoscyamus, opium, & quælibet alia hujus generis anodyna: Sanè succum urticae majoris ad  $\text{z} \text{ias}$  aliquot internè assumptum ad quamvis hemorrhagiam mirè extollunt Practici, in specie Riverius & Zacutus Lusitanus, qui hoc ipso desperatam hæmoptysin curavit; Unde quidam Syrupum ex succo urticae in promptu habere solent. Pertinet huc radix aronis, urticae, & ex eadem paratum nectar adstringens Langij. Porro muscus & usnea cranii humani nobile est *Agrippæ*, quatenus per mumiam microcosmi imprægnata est, & externo & interno usu periculosissimas sistit hemorrhagias, internè ad gr. xij. ad  $\text{ðj}$ . externè verò si fieri potest vasis adnota. Refert Lindannus, se commodissimè, quas nullis remediis sedare potuit hemorrhagias, restituisse solum per usneam cranii humani. Unde Hillerus centur. 1. cur. 20. periculosissimam hemorrhagiam narium ex potu vini concitatam  $\text{zss}$ . usneæ cranii humani cum*

$\nabla$ . bur-

$\nabla$  bursa pastoris  
laudate fuerunt  
serosioris acido  
crebrior passul  
Rhabarb  
rando & crasi  
Camphora no  
sanguinis mir

Ex

$\Delta$  unicornu  
existente  
in specie con  
aut etiam rece  
vridis exiccat  
quæ vivæ cont  
quod nunc soli  
hemorrhagias  
medicamentu  
contineat, quæ  
innocenter us

rut cum vehi  
portulaca vel a  
quæ tria, ut ut a  
terno usu Sanè  
cur ab  $\text{zj}$ . ad  $\text{z} \text{ij}$   
Vel

Alii ex dictis  
in Joelis Prax  
postmodum  
test. loco hæm  
natas hæmorr  
fluxus corrigi

Exreg

Part II.



▽ *bursa pastoris* curavit. Confer *Beckerum in Medico Microcosm.* *Passula* supra laudatæ fuerunt & conducunt in specie hæmorrhagiis ex vitio sanguinis acrioris, serosioris acido salidioris &c. Nam tali ex causâ hæmorrhagias habituales natas crebrior *passularum minorum* comestio subleuat.

*Rhabarbarum* denique non tam pro sero evacuando, quam sanguine alterando & crasi ejus restituenda in hæmorrhagiis & serosiore sanguine confert. *Camphora* non negligenda, quæ & spiritus afficit & fermenta peregrina acida sanguinis mirificè corrigit.

*Ex regno animali* sunt animalium partes duræ, in specie *ebur sine* *Δ unicornu verum*, dens *hippopotami* &c. absorbent vitiosa acida. *Buso* Sole in *Δ* existente transfossus & in syndone rubro appensus, vel applicatus sub axillis in specie convenit in hæmorrhagiis, morbos seu febres malignas comitantibus, aut etiam recens contusus sub axillis applicetur. Juxta *busones* & *rana* in specie *viridis* exiccata, ejusq; pulvis in vino rubro propinatus mirè hæmorrhagias sistit, quæ vivæ contusæ pariter applicari possunt. Imprimis excellit *sperma ranarum*, quod nunc solitario cum paucis *aceto rosaceo* applicatū singularem vim obtinet hæmorrhagias compescendi Unde etiam ex eo parata *sperniola Crollii* nobile est medicamentum contra hæmorrhagias dos. *Δβ.* ad gr. xv. Nam licet *myrrham* contineat, quæ alias facilè hæmorrhagias resuscitat, nihilominus tamen *sperniola* innocenter usurpari pot. est, nunc solitaria, nunc aliis mixta, v. gr.

*β.* Lapid. hæmatit. præp. *Δβ.*

*sperniol. Crollii* gr. xv.

laud. opiat gr. ij. M. f. pulvis, divide in 2. partes æquales, detur cum vehiculo ▽ *portulacæ* & *semperervi maior.* imprægnata cum syrupo de *portulacæ* vel de *plantagine*. His accedunt *stercus asininum*, *suillum* & *caninum*, quæ tria, utut apparenter sordida sunt revera præstantia, tam interno quam externo usu Sanè præter pulverem ex his paratum, ex *stercoribus* istis expressus succus ab *ζj.* ad *ζiβ.* propinatus in convenienti vehiculo est efficacissimus.

Vel *β.* Succus stercoris asinini

syrupi myrtini an. *ζβ.* adde

▽ *plantaginis* *ζj.* M. pro haustu.

Alii ex dictis succis addito saccharo sparant syrupum, qui videatur in *Prævio*, it. in *Joelis Praxi*. Denique sanguis qui effluit, tostus & exsiccat, pulverisatus & postmodum ad *ζj.* in convenienti vehiculo propinatus, item externe, si fieri potest, loco hæmorrhagiæ applicatus, istam sistit. Lac denique ex acrimonia falsa natas hæmorrhagias, item dyscrasiam sanguinis scorbuticam & exinde sanguifluxus corrigit & emendat.

*Ex regno minerali* eminet & omniaq; *mineralia* supra laudata & hinc



quæ ad eas accedunt naturam, corallia, lapis hematites, terra & tiales, bolus armen. terra vitrioli dulcis, vitriolum & acidularum potus, spiritus vitrioli supra laudatus &c. In specie tinctura sulphuris vitrioli, item liquor stipticus, extr. & tus Hartmanni in praxi Chymiatr. c. 50. Tinctura antiphthisica &c. Ipse acidularum potus, aut eorum loco liquor & tus Solaris egregiè conveniunt, præternaturales nimios fluxus sanguinis sistendo & contra naturales aut deficientes aut inordinatos restituendo. Pertinet huc pulvis sympatheticus ex vitriolo & ris, qui sanguini effluenti inspersus ad quasvis hæmorrhagias convenit, si linteum sanguine madidum eo saltem adspargatur, aut linteum cruore effuso ebrium solutioni dicti pulveris immergatur. Denique nîrum depuratum, ac quævis nitrata egregiè compescunt hæmorrhagias ex turgescencia, aestuatione aut ebullitione nimia sanguinis concitatas, etiam si per iracundiam excitatæ fuerint. In specie consideranda venit

## HÆMORRHAGIA NARIUM.

In quorum intimam superficiem nunc superiorem nunc inferiorem terminantes arteriola hæmorrhagiam excitant; Subinde copiosissimus sanguis est & qui per plures fibras ex naribus effluit, quem tunc ex sinu cerebri falciformi, aut ejus valis apertis ad nares pervenire multi asserunt, quod tamen falsum, sicuti sufficienter hoc dogma rejecit *Schneiderus tract. de oss. cribriform.* Quin potius vasa ex quibus effluit, sunt propagines rami arterialis à carotide interna, qui juxta processum mammillares plures intersurculos quosdam per foramina ossis cribrosi transmittit ad membranam narium superiorem glandulosam, per quæ vasa, seu per quas arteriolas & lymphæ simul affertur materia, per glandulosam istam texturam excernenda, ita ut ex orificiis istis apertis & propter continuam à lymphæ humectationem naturaliter laxioribus, narium hæmorrhagia accidant. Confer Willif. pharm. rat. p. 2. p. 40. Præter causas internas cum aliis hæmorrhagiis communes, externas inter, pulveres sternutatorii fortiores inspirati, aut alia quævis inspirata acriora hæmorrhagiam hanc excitant. Imminentem eam ostendit motus sanguinis sursum versus, cujus indicia sunt dolor capitis & colli tensus, temporum vero dolor gravis plus minus pulsans, oculorum caligo vel splendor, lachryma involuntaria, rubor malarum, oculorum pruritus, titillatio narium &c. imo & pulsus in carpo durus & quasi vibrans, hæmorrhagarum recurrentium & quidem vitio vasorum signum esse solet.

Quoad prognosin. Quibus in febribus acutis & ardentibus lachrymæ involuntariæ profluunt, his sanguinis ex naribus ruptionem expectare convenit.



nit. *Tam largiores sanguinis evacuationes*, quam ejusdem plus minus, aut etiam planè non consueta saltim intempestiva *suppressiones* morbum excitant: *Hæ* quidem pathemata cerebri & nervosi generis epileptica, soporosa &c. *Illæ* syn- copes, achexias, singultum & convulsionem, *Stillicidium sanguinis*, id est exigua sanguinis & stillatim facta eruptio, in morbo acuto, præsertim die quarto malum signum est, nisi forsan causa externa, vel excitaverit, vel impediverit hæmorrhagiam. Notabile est quod *Hippocrates* jam olim monuit, in affectibus hepatis & lienis fluxus sanguinis è naribus non è directo factus, id est qui in nare diversa est, hoc est in dextra, si lien laborat & è sinistra, si hepar, malum. Nam tales hæmorrhagiæ, si debent esse proficiuæ, καὶ ἰξίϛ, id est rectitudinem fieri debent. *Quibus in febribus ardentibus aures obsurduerunt*, his non soluta febris, delirare necesse est. Solvit autem inter alia & sanguinis è naribus eruptio.

In *cura* præter hæcenus enarrata *interna*, eaque respectu causarum varia, in *paroxysmo* sanguinis impetus ad nares, quantum possibile avocandus, vel *spirituum impetum* sopiendo, vel *sanguinis ὀργασμὸν* aut *turgescientiam* refranando & deinde orificia vasorum aperta occludendo.

*Quoad priorem scopum ligatura* extremorum dolorifica, sanguinis in brachio vel in pede detractiones, frigidorum & adstringentium, *nuchæ*, *fronti*, item *scroto*, *manibus*, *mammis* in mulieribus, interdum & *hepari* applicationes; item *terror* quovis modo inductus, *dolores* graviores circa remotiora loca excitati, aut *lipothymia* inductæ conveniunt. Quibus & *specificæ* quædam, quæ singulari & sympathetica plus minus vi sanguinem cohibent, simul sociantur, ut *buso*, *lignum fraxini*, *pulvis sympatheticus*, *hamarites*, *jaspis* &c. Ægrum nunc in aere libero ac frigido, nunc clauso ac calido detinendo &c; Nam omnia hæc vel spirituum plus minus irritatorum impetum, vel sanguinis orgasmum & fluxibilitatem coercendo operationes suas exerunt.

*Quoad secundum scopum*, ea quæ naribus, eorumque apertis vasis applicantur, sunt *alumen*, *vitriolum*, *stercora*, *fuligo*, ac quælibet *adstringentia*, &c. de quibus omnibus in specie jam agendum. Confer tamen *Willis. pharm. rat. p. 2. V.* Ses subinde locum habent, utur raro, non secus ac *oncurbitula*. Observandæ tamen ubique *revulsions* & *derivationis* *leges*. Horum loco frigida & *adstringentia*, sanguinem plus minus coagulantia, ejusque nimium motum intestinum, fermentativum tam naturalem, quam præter naturalem refranantia, adeoque ab effectu *refrigerantia* dicta, *externæ* applicantur. Hic inter alia convenit imprimis *cataplasma ex aceto* & *argilla calcinata*, v. g. *ex furno pistoris cum aceto* invicem permistis ac fronti cum temporibus ac nuchæ applicatum medicamentum, sine lintei impositione est egregium. Idem *cataplasma* testibus in maribus applicatum ceu expertissimum habetur à *Riverio*, quod in mulieribus mammis applicari



cari potest. Alii bolum cum aceto, alii gypsum cum aceto dictis modis applicant. Item Epithema ex aceto, succo semper vivi maj. & θ, addito plus minus camphora testibus applicatum, mirabiliter hæmorrhagiam narium sistit.

Sunt qui talia etiam regioni hepatis applicant, ac desperatis narium hæmorrhagiis consulunt. Vide *Herstium l. 4. obs. 46.* ubi notabile occurrit exemplum, quod ex tali epithemate epatico suppressa quidem fuerit hæmorrhagia narium, sed insequente diarrhœa biliosa. Porro ex fuligine, albumine ovi & aceto mistis frontale parant, quod rarò fallere dicitur. Sic sperma ranarum cum paucis alumine fronti ac temporibus applicatum, vel linteam in eo aliquoties intinctum, iterumque exiccatum, idque repetitis vicibus, tempore usus fronti ac temporibus impositum egregiè hæmorrhagias deprimit. Ut supra venæsectiones & cucurbitulas scarificatas revulsionis gratia usurpari assertum fuit, ita pro eodem scopo non pauci applicant cucurbitulas non scarificatas hypochondriis hepatis & lienis regionibus. Sic *Amatus Lusitanus cent. 2. curat. 100.* mediante cucurbitula splenis regioni admota, & frigida testibus applicata ingentem hæmorrhagiam sedavit. Verum hic cautos nos esse debere monent Practici, cum interdum cucurbitulas tales admotas sequatur inflammatio viscerum sub cucurbitulis sitorum, quale exemplum refert *Hildanus in suis observationibus*, adeoque cauti in applicatione simus. Potius nucha ventosa magnè impositæ locum interdum inveniunt. *Conf. M. A. N. C. Anno. 6. p. 130.* Quo pertinent cucurbitula supra pedes admotæ, quæ miraculi instar hæmorrhagiam narium sistunt, autore *Foresto l. 13. obs. 14.* ad ista epithemata pertinet frontale *Poterii centur. 1. cur. 67.* ex croco & tith. bol. armen. & opio cum oleo rosarum mistis & temporibus applicatis, quo ipso contumacem hæmorrhagiam curavit. Terrores, lipothymia, excitati dolores, spirituum & hinc sanguinis motum partim sistendo, partim aliunde derivando subinde proficue existunt. Sic sunt qui ceu remedium revulsorium proponunt incurvationem minimi digiti; Cum enim vehemens illa compressio intensum dolorem pariat, hujus occasione forsan hæmorrhagiæ medela erit. Nec alia ratio videtur, quare contumax hæmorrhagia per cauteria actualia plantis pedum admota curata fuerit à *Zacuto Lusitano l. 1. prax. admir. observat. 66.*

*Specificæ* inter primarium locum habet *buso*, cujus jam aliquoties facta fuit mentio; hinc & emplastrum magneticum *Cnôpheli* ex *buso* locum habebit *vid. M. A. N. C. Ann. 6. append. p. 33.* Lignum sympatheticum ex fraxino certo tempore decisum, revera nobile experimentum, cujus naribus admoti felicem successum stupens observavi. *Hæmatites* in manu detentus subinde egregium est remedium. Differentia tamen hic est observanda, cum non omnis præstare soleat. Egregiam tamen observationem quoad ejus electionem *vid. in*

Boyle

Boyle de Gem  
baceis est diti  
neatur Sanè  
Schmuck in c  
dano Cent. 3.  
in aere frigid  
habitus mag  
cto, sin minu  
Quoa  
ribus intrul  
turunda in a  
trula, nobile  
Borellum Ce  
albedinem c  
stringendo o  
tus iste liquor  
usurparis fan  
At. Medic. F  
tur, quod qu  
pium atrament  
matum nariu  
li naribus im  
lum, cum po  
xum reprimi  
& naribus in  
actum dicto  
culis admittu  
fundo vasoru  
quæ fuligo cu  
tientis mista  
etiam à Will  
animalium v  
& insufflatu  
sullum roce  
dicta adstru  
valent, consp



*Boyle de Gemmis.* Si quid aliud, certè *Jaspis genuinus*, cuius rubeo venulis herbaceis est distincta, argento cinctus, hæmorrhagias sistit, si saltem in manu detineatur. Sanè ejus effectum à se expertum in casu 3. Medicorum desperato refert *Schmuck in curatione magica magnet.* p. 16. videbitis hoc confirmatum ab *Hildano Cent. 3. observ. 2.* item *Boyle tr. de gemmis* p. 101. Denique æger nunc in aere frigido, nunc in calido est asservandus. Prout enim sanguis & corporis habitus magis vel minus transpirabiles existunt, tales, si magis transpirent, in lecto, sin minus extra lectum continendi sunt. vid. *Willis. cit. loco.*

*Quoad auxilia & remedia tertii scopi eminet alumen.* Hoc vel ita integre naribus intrusum, vel cum *lacca pictorum* in formam pulveris redactum & ita cum turunda in aqua humectata applicatum, vel solutio ejus dicto modo naribus intrusa, nobile est stypticum sanguinem sistens vid. *M. A. N. C. ann. 1. p. 90.* item *Borellum Centur. 4. observ. 7. & 50.* Par ratio est *vitrioli.* Hujus solutio vel ad albedinem calcinati pulveris dictis modis applicatus, coagulando sanguinem & adstringendo orificia vasorum egregium est. Et sane ex hoc ipso ceu basi decantatus iste liquor stypticus Galli revera oritur, utpote, qui quocunque loco externè usurpatus sanguinem undecunque erumpentem sistit. *Conf. Willis. cit. loco.* item *Act. Medic. Hassniens. vol. 2. p. 353.* Par ratio, si à quibusdam atramentum laudatur, quod quocunque modo naribus applicatum & intrusum, præsertim gossypium atramento infectum, aliquantulum expressum & in turundæ formam formatum naribus confert, vi nempe styptica viriolacea. Sic tinctura sulphuris vitrioli naribus immissa eundem effectum fortitur, sic phlegma spiritus vitrioli acidulum, cum potentissime sanguinem inspisset & coagulet, naribus immissum, fluxum reprimat. Fuligo furni supra laudata cum albumine ovi mista turundæ illita & naribus intrusa, hæmorrhagiam sistit, aut etiam albumen ovi cum alumine subactum dicto modo applicatum. Nempe est in fuligine acidum, cum terreis particulis admistum, à quibus vis adstrictoria. Præstantissima fuligo est ista, quæ è fundo vasorum & cacaborum æneorum, quæ in culina usurpantur, colligitur, quæ fuligo cultello separata ac naribus intrusa, vel pulverisata cum sanguine patientis mista & turundarum forma naribus immissa sanguinem sistit, remedium etiam à *Willis. cit. loco,* tanquam expertum commendatum. Denique stercorea animalium naribus applicata, vel pulveris stercoris asinini & suilli naribus inspersus & insufflatus, vel eorum succis turundæ immissæ sanguinem sistunt, imò stercus suillum recens excretum solo odore sanguinem narium sistere dicitur. Sic denique dicta adstringentia naribus immissa hæmorrhagias subinde periculosas sistere valent, *conf. M. A. N. C. Ann. 2. p. 323.*



## GINGIVARUM HÆMORRHAGIA.

Porro ex *Gingivis* subinde gravis *hemorrhagia* oriri observatur, eaque adeo copiosa ut *Schenckius* lethalem ex *Gingivis* hæmorrhagiam observaverit. *Hæmorrhagia* talis *gingivarum* interdum critica est, interdum periodica. Criticam refert *Zacutus Lusitanus* lib. 1. prax. admir. obs. 86. Periodicam vero *Schenck* lib. 1. observ.

*Causa* *Hæmorrhagia gingivarum* est in specie vel *gingivarum laxitas scorbutica*, conjuncta cum corrosione vasculorum à saliva nimis corrodeute facta, vel quod frequentissimum est, post ineptam *dentis evulsionem* insequi solet. *Hæmorrhagia* hæc *gingivarum* quæ est à natura, ut critica aut periodica, non est sedanda, nisi succedanea substituatür evacuatio. Ista vero quæ est præter naturam, adeoque à scorbutico, sistenda per tincturam lacca *Mynsichi*, vel elect. *Deckeri*, quæ sunt in *Commentar. Pract.* ubi de scorbutico; Item decoctum rad. torment. cum alumine. Quæ vero est propter dentem evulsum, curatur cum bombace tinctura sulphuris virioli, ut vocatur, intincto & admoto, vel applicatur solutio virioli, quæ sanguinem sistit, vel imponatur gummi arabicum, quod glutinositate sua sanguinem ex arteriis emanantem restringit, vel fiat decoctum ad gargarisandum

℞. Rad. tormentill.

bistort. aa. ℥ij.

gallar. contusar. ℥℔.

femin. papaver. alb. ℥ij.

coq. in f. q. aqu. simpl. Colaturæ adde

bolli Armeni vel vulg. ℥ij.

opii parum M.

Confer *M. A. N. C. Ann.* 3. p. 134 aliis irritis cantherium actuale admoventi potest  
Conf. *M. A. N. C. Ann.* 2. p. 87.

## SPUTUM SANGUINIS.

p. 52. Utterius sanguis per os ejicitur in affectu qui sputum sanguis, seu hæmoptysis appellatur, idque ad differentiam sanguinis vomitus de quo supra. Sanguis iste, qui spuendo ejicitur, ex variis locis promanare & hinc in os derivari solet, ex summitate narium, palato, gingivis, faucibus, œsophagô & quibusvis aliis vicinis locis. In specie tamen istud sanguinis sputum in considerationem venit Medicam & hæmoptysis dicitur, quando sanguis ex respirationis organis, speciatim ex pulmo-



pulmonibus, rejicitur. Manat sanguis tunc ex arteriis in pulmonibus, vel ex arteriis trachealibus, ex arteria nempe aortæ oriundis, ut recte & accuratè has distinguit Willis Pharmacop. ration. P. 2. p. 151.

*Pars affecta in Hemoptysi nunc* est superior larynx ejusque cavitas, nunc intermedius ductus tracheales, nunc eorum ultimæ extremitates orbiculares, adeoque ipse pulmo. Quæ partis affectæ differentia probè attendendæ sunt ad explicandos diversos hæmoptoseos modos. Nam ordinariò quidem cum tussi fit hæmoptysis, nempe quando pulmo affectus est, aut profundiores trachææ rami; interdum vero sine tussi etiam gravis hæmoptysis contingere potest, quando nempe saltem superior trachææ pars affecta est, in quo casu plus minus aliquali scretu prævio sanguis erumpit. Conf. M. A. N. C. Ann. 2. p. 83. & Willis cit. loc. p. 153. Sicuti è contra non omnis sanguis, qui tussi rejicitur, præcisè ex thorace est. Nam si sanguis confertim ex faucibus erumpat, & laryngem plus minus irriter, sputum sanguinis cum tussi inferre potest, utut malum non sit in aspera arteria, vel thorace. Propterea & alia concurrentia pathemata probè consideranda sunt, utut frequentissimè sanguis, qui expuitione levi ex ore rejicitur, sit ex partibus palatinis, naribus aut vicinis superioribus; qui vel levi scretu expuitur, est ex faucibus, summitate arteriæ asperæ, & vicinis locis; qui vero tussi præfertim reiterata profunda & accidente conatu rejicitur, ferè ex thorace esse observatur.

Sanguis qui excernitur, nunc, idque frequentius, est floridus, spumofus, nunc idque rarius, obscurus, niger & semi grumofus; Nam sanguis qui ex pectore effluit, cum ex arteriis promanat, & vehiculo reciprocantis aëris rejicitur, floridus, tenuis ac spumofus erumpere solet. Qui vero diutius in pulmone, thorace, aut loco vicino hæserit & ita demum ejicitur, niger, obscurus, plus minus grumofus esse observatur. Ejicitur sanguis nunc paucus & parvus, nunc vero copiosus, prout nempe conditio vel valis aperti, vel impetus sanguinis undecumq; concitati tulerit.

Hæmoptysis nunc est recens, nunc inveterata & hæc vel periodica vel non periodica. Sanè Hæmoptoseum inveteratarum periodicarum innocuarum, quin potius cum euphoria ægrorum contingentium, plura hinc inde prostant exempla Conf. Bartholin. Acta Medic. Hassn. vol. 1. p. 146. sic anniversariam Hæmoptysin observavit Rhodius cent. 2. obs. 84 sic diurnam periodicam notat Amatus Lusitanus centur. 6. cur. 49. Casus revera est singularis, cum æger singulis horis interdum semel expuat sanguinem, noctu vero licet vigilet, nil excernat. Indolens subinde est hæmoptysis; nunc vero cum dolore plus minus conjuncta, vel constrictivo pulmonum, vel gravativo obtuso eorundem, vel rodente & plus minus irritante in aspera arteria &c. pro causarum nempe varietate,

Causæ



**Causæ** hæ quæ hæmoptysin inferunt, sunt *vel in sanguine, vel in vasis*, seu hæc *anastomosi*, seu *diarexi*, aperiantur. *Generales* istæ *causæ* ex superioribus notæ sunt. Nempe 1. *ruptio* ejusdem *vasis* in pulmone ex clamore fit. corporis motu, oneris gestatione, casu ab alto, tussi concitatori, copiosiore effusio req; risu, de quo vide *Zacut. Lusitan. l. 2.* 2. *Est erosio* in pulmonibus facta, aut ab *externis* inspiratis, v. g. *spiritu aquarum fortium*, vel à *causa interna*, eaq; omnium frequentissima, *lympha* nempe nimis *acri* tam *falsa*, quam *acida* erodente *scorbutica*, aut alia simili labe inquinata, quam subinde solet antecedere tussis ferina nocturna. Et hæc *hæmoptysis* est ista, quæ relinquit *vomicam pulmonum* & *Phthisin* pedissequas. *Pertinet huc*, quod post sanatum ulcus pedum supervenit sanguinis sputum, dubio procul ex retrogresso fermento acri & corrosivo partes pulmonales erodente, quale exemplum refert *Rhodius Cent. 2. observ. 54.* 3. *Est* evacuationis cujusdam *solennis suppressio*, præsertim in partibus corporis inferioribus. Sic nil frequentius est, quam quod *suppressionem mensium* & *hemorrhoidum* subsequatur *sputum sanguinis*, ex sanguine circa præcordia coacervato, stagnante & *anastomosi* valorum inferente. Hæ sunt *ordinaria* ferè *sanguinis sputi causæ*. Rarum est, quod cum potu hauriantur *hirudines* quæ in faucibus hærentes, & sanguinem emulgentes, sputum sanguinis inducant. *Exemplum* vide in *Schenck. l. 2. obs. 8.* & *Borelli Cent. 1. obs. 24.* Sic non minus curiosum est, quod *thermarum usus* in quibusdam hoc malum excitaverit, auctore *Willis Pharm. rat. P. 2. p. 155.*

Quoad *prognosin*, *hæmoptysis pulmonalis* sæpius *tabem* & *phthisin* post se trahit, præsertim si præcedentem insequatur erosionem. Sic *sputum sanguinis*, si est *primarius morbus*, magis periculosum est, quam si est *morbis secundarius*, ut in pleuritide, peripneumonia, &c. Sputum sanguinis periodicum si sine pulmonum singulari noxâ contigerit, minus periculosum est, quam si cum pulmonum vitio junctum fuerit.

Quoad *curam*. Hæc vel in *paroxysmo* vel extra *paroxysmum* instituitur.

**In paroxysmo** 1. *sanguinis impetus ad partem affectam sistendus*. 2. *Vasorum lesio tollenda*; prius sit *causæ vel remotione*, vel saltim *suspensione* & sanguinis motus certa determinatione, h. e. vel spirituum impetum, vel sanguinis turgescientiam vel copiam &c. revellendo, derivando, papaverinis &c. cohibendo. *Posterior* peragitur *vulnerariis* & *adstringentibus*.

**Curæ extra paroxysmum præservatoria** consistit in eo, ut *recidivæ* præcaveatur, 1. *causam* ex toto removendo. 2. *pulmones* plus minus læsos

læsos sanando  
post paroxysmum  
Pro his  
rur. i. V. S. quod  
effluat. Non  
mia interdum  
adeoque circ  
in genere inf  
sanguinis spu  
guarum so  
est ex corrosio  
næfectio.

2. I  
hæmoptis min  
sanè ipsi, uti  
affecti, copios

3. Præ a  
sunt perquam  
in hoc casu, p  
bus decantati  
mendatur. U  
habet

Facit huc elec  
lapid. hamati

Quoad  
fuerunt laud  
pote causari  
& plantago,  
usurpata sang  
temperat,  
prodest, præ  
Cujusl  
Pari 11,



lætos sanando. In quem finem posteriorem, si quid restiterit grumosi sanguinis post paroxysmum, sedulo hoc removendum.

Pro his scopis assequendis interdum necesse est in paroxysmo, ut præmittatur i. V. S. quò sub liberiore sanguinis circulo minus conferim per venam læsam effluat. Non tamen hoc in omnibus æque obtinet, cum in quibusdam phlebotomia interdum malum exasperare soleat. Conf. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 167. adeoque circumstantiæ supra circa venæsectionem in hæmorrhagiis instituendam in genere insinuatæ probè notandæ, observando simul revulsiones leges v. g. si sanguinis sputum ex mensibus suppressis, secetur vena in pede, ubi ex hæmorrhagia narium solemni suppressa, secetur in brachio &c. In ista autem hæmoptysi, quæ est ex corrosione ab acrimonia contentorum, inepta penitus & frustranea est venæsection.

2. Purgantia vitentur. Diuretica potius sunt optima. Nam hæmoptici minus ferunt cathartin, utpotè à qua facilè in tabem conjiciuntur. Ac sanè ipsi, uti & alii, cognatis pectoris affectibus ad phthisin facilè terminabilibus affecti, copiosissimè, etiam à levi purgante, adeoque non sine noxa purgantur.

3. Præ aliis Hæmorrhagarum speciebus præsertim in hæmoptoe opiata sunt perquam proficua, & inter hæc ipsa in specie sem. hyoscyami specificum in hoc casu, præsertim si malum est ab acrimonia corrodeute. Sane ab omnibus decantatum est hoc remedium, idque jam ab Hippocratis temporibus commendatur. Unde & Helid. Paduanus Electuarium ad hæmoptysin expertissimum habet

R. Sem. hyoscyami alb.

papav. alb. aa. ʒx.

rerr. figillat.

corall. rubr. aa. ʒv.

facch. ros. antiqu. q. f. M. Capiatur crebrius.

Facit huc electuarium Heurnii ex conserva rosarum cum semine hyoscyami, bolo, lapid. hæmatit. in comm. super aphorismos Hipp. §. 13. sect. 5.

Quoad remedia cætera, præter ea, quæ supra de hæmorrhagia in genere fuerunt laudata, specialius ea conveniunt, quæ acrimoniam vasa erodentem, utpote causarum internarum frequentissimam respiciunt. Imprimis portulaca & plantago, sunt insignis commendationis. Portulaca enim quocunque modo usurpata sanguinis fluxum sistit & simul acrimoniam corrosivam, si quæ subest, temperat, unde ejus succus & syrupus ad aliquot uncias propinatus egregiè prodest, præsertim opiatis sociatus.

Cujus loco paria ex plantagine remedia conveniunt, unde & decoctum por-



*uliacæ cum radice symphyti & herba prunelle in vino rubro paratum prodest.*  
Hinc & *hederæ terrestris* in sputo cruento plane mirabilis, idque imprimis post  
paroxysmum, partim, si qui adsunt grumi, resolvendo, partim læsionem indu-  
ctam consolidando, partim alterationem contentorum recidivam præcavendo.  
Hinc ejus *syrupus decoctum ac conserva* sunt polychresta. v. g.

℞. Conserv. heder. terrestris ℥ij.

trochisc. de carabe ℥j.

terra sigill. lap. hæmatit. præp. aa. ℥j.

laud. opiat gr. iij. cum s. q. syrupi de symphyto Fernelij.

E. Electuarium D. S. Anhaltende Lattwerg.

Hinc pariter *conserva rosarum antiqua*, item *pulvis summitatum & pilosarum ex-  
crescentiarum cynobati*, *Schlaffungen* egregia specifica sunt in hoc malo, non  
secus ac *oleum lini cochleatim* usurpatum mira præstat. Conf. *M. A. N. C. Ann.*  
*6 p. 308.* *Spiritus vitrioli à Castello* commendatur tanquam expertus in sputo  
sanguinis, quia coagulando sanguinem, eumque inspissando eruptionem ejus  
impedit. v. g.

℞. ∇. plantagin. ℥vj.

Syrupi de rosis siccis ℥j.

Spir. vitrioli rectificati vel ejus ol. ℥j. M. capiatur cochleatim.

Confer simul *Harimannus ubi de sanguinis sputo.* Sed cave, dicit *Lindanus*, ne  
propines, si vel minima suspicio ulcers in pulmone est; Prodest alias ad fervo-  
rem sanguinis restringendum, quatenus acre serum præcipitat, & ducit ad vias  
urinarias. Pro his aliis, si copiosè fluat sanguis, nobile est remedium hoc sim-  
plex ℞. *mala cydonior.* cruda, seu *matura* seu *immatura*, quocunque modo ha-  
beri queant, scinde minutim, in tenues lamellas, coqu. diu in aqua communi  
in diplomate, donec penitus mollescant; Ubi cocta sunt, separa aquam seorsim,  
laminas vero exprime fortiter. Hic *succus* detur à cochl. j. a iij ter quaterve in  
die. Hoc præmissa venæsectione sistit omnem *hemorrhagiam* pulmonum, eti-  
am si à corrosione fuerit. Deinde aquam illam *decoctionis pomorum* per residen-  
tiam clarificatam ℞. addito tantillo *sacchari candi*; vel *decoctum hordei*, in quo  
*passula corinthiaca coctæ*, absq; *saccharo* dà potui. Hoc ego nunquam sine certo  
auxilio usus fui. De *syrupo stercoris asinini* supra actum fuit. Ad hæmoptysin ve-  
ro in specie *stercus muris* à ℥ss. ad ℥j. cum *succo plantaginis* propinetur addito  
*saccharo* pauco. M. F. potio mane stomacho jejuno & vespri in introitu lecti  
danda per aliquot dies. Convenit in specie, si fuerit hæmoptysis ob ruptum pul-  
monis vas. Cætera, ut *lapis hæmatites*, *bolus armena*, *martialia*, in specie *tinctura*  
*sulphuris vitrioli*, *tinctura antiphtisica* ex supradictis jam nota sunt. In malo gra-  
viore autem ex causis externis sæpe *recidivante decocta pectoralia ex lignis* sunt  
egregia



egregia, de quibus conf. Willis Pharm. rat. P. 2. p. 167. & 171. Ex quibus facile  
variae possunt fieri formulae v. g.

R. Conserv. rosar.

heder. terr. an. ℥j.

lap. hæmatit. præp. ℥ij.

corall. rubr. præp. ℥j.

∇. sigill. ℥ij. c. l. q.

syr. papav. alb. F. Electuar. capiatur pro lubitu.

Curavi aliquando studiosum gravi hæmoptoe laborantem in magna copia, cui in  
paroxysmo propinavi misturam istam polychrestam supra p. 460. laudatam, cujus  
usu & sputum cessavit. Hinc pro reliquis grumosis resolvendis

R. ∇. chærefol. ℥ij.

† vin. ℥ij.

lap. S. præp. ℥j.

g. diaph. gr. xv.

syr. scabios. ℥ss M.

His præmissis ad imitationem Sylvii præscripsi decoctum pectorale ex lignis:

R. Ras. santal. rubr. ℥j.

lign. sassafr. ℥ss. macerentur per 12. horas in ∇. comm.

℥viiij. coq. ad consumpt. ℥ss. adde

Herb. heder. terrestris

comar. hyperic.

veronic. an. mij.

sem. fœnic. ℥vj.

rad. liquirit. ℥ij.

passul. min. conquals. ℥ij. coq. ad remanentiam ℥jv. Colat. D.

& capiatur bonus haustus manè, meridiè & sub introitu lecti. Interea ad de-  
mulcendum calorem hæcticum

R. Lap. S. præp.

antihectic. Poter. an. ℥ss.

corall. rub. præp. ℥j. M. pro 2. dos. vel 3.

It. ob sudores nocturnos debilitantes & emaciantes

R. Lap. S. præp.

antihectic. Poter. an. ℥ss.

arcan. duplic.

laud. op. ferment. gr. jv. M. pro 4. l. 3. dos. vespertinis, horâ

5. præterpropter à meridiè assumendis.



## CAPUT III

DE

URINÆ IN RENIBUS SECRETIONE  
LÆSA.

**S**anguis in totum corpus distribuitur ex corde, ut istud nutriat, & beneficio spiritus vitalis in esse vitali conservet. Verum præter hunc usum etiam in singulis partibus & visceribus internis idem sanguis aliquid patitur, non tantummodo, quatenus in quibusdam determinatam patitur alterationem, sed e contra quatenus fit separatio quædam singularis cuiusdam liquoris ab eodem, utpote cum videamus, in hepate & folliculo fellis bilem separari, in renibus urinam, in glandibus partem materiæ lymphæ &c.

*Primum viscus* notabile, cui sanguis post suum descensum exinde occurrit, est LIEN, cuius actio laeditur, quando vitiatum viscus, vel 1. intemperie ratione spiritus insiti. 2. quando laeditur in conformatione ex infarctu, indeque nato tumore, & tandem scirrhescentia. Denique quando 3. specificum eius fermentum plus minus alteratur aut deficit, vitio præsertim spirituum animalium copiosius aliàs ad lienem distribuorum.

*Vitia hæc lienis* nunc sunt hæreditaria, nunc idque frequentius aliis superveniunt morbis. Equidem non levis abusus circa affectus spleneticos occurrit, dum nescio quæ mala subinde spleni, licet insonti, attribuuntur; interim non penitus rejiciendi sunt, sed ferè se produnt per *symptomata convulsiva* seu spasmos ratione consensus nervorum, & hinc per *perurbationem mentis*. Præterea se produnt ordinario dolore gravi obtuso quasi contundente (minimè omnium punctorio, quem apud nullum spleneticum observare potui) & subsequentibus *spasms* &c. v. g. *Studiofus quidam* repentino dolore hypochondrii sinistri profundo corripiebatur, superveniente lipothymia gravi cum aponia ferè & spasms, motibus convulsivis ac doloribus lancinantibus in omnibus artubus, præsertim manibus; malum radicitus erat ex *splene*. *Mercator quidam* conqueritur de continuo dolore in hypochondrio sinistro quasi compressivo, levamen egregium sentit ex applicato *Empl. de Nicotian. cum ana Gum. Tacamahac.* Sed corripitur hinc *hemisrania* gravi partis sinistrae, urgente præsertim regionem temporum istius lateris, turbante simul caput insigniter. Remoto vero *Emplastro* in isto latere evanescit *hemisrania*, redeunte hypochondrii molestia. Totus affectus erat ex *splene*.

Mulier



*Mulier* dolore hypochondriaco sinistro profundo & quasi lacerante afficitur sentit exinde dolores lancinantes & lacerantes, universum abdomen torqueri, & totum intestinorum situm recurrentibus creberrimis doloribus affligi. *Affectus* revera erat *(pasmodicus, ob plexum lienarem nerveum, ex male habente splenæ in spasmos actum,*

*Studiosus nobilis* in pueritiâ diuturnâ quartanâ & hinc hydrope affectus, tandem ab hac mediante copioso urinæ fluxu curatus, redditus erat summè *spleneticus*, cum mentis perturbatione & melancholiâ. Nempe quoties insignior tempestatis, in specie verno aut autumnali tempore, immineret mutatio, toties sensum *palpitationis* in imo seu profundo hypochondrii sinistri, prope spinam dorsî ferè percipit, quam *dolor gravativus & obscurus lienis* in isto loco comitatur. Hinc caput turbari, anxius ipse reddi &c. incipiebat, adeo ut uno alterove die, antequam contingeret tempestatis mutationem imminere, dictis in locis & modis ipse perciperet, cum alias in dictâ regione nullam pulsationem perciperet, animosus & hilaris, optimè animo & corpore valens esset. Adeoq; & hic *quartana confirmata* splenem simul afficientes, & hujus male affecti *pulsatio hypochondriaca*, quam *Helmont* urget, & hanc insequentia *melancholica pathemata* consideranda veniunt.

*Lienis intemperiem* vitiatam corrigere difficile est; ejusdem tamen infarctus, tumores & scirrhus leviores aut incipientes emendant omnia dicta *aperientia*, item *gummaria*, uti superius *de morbis chronicis*. *Fermenti lienis* vero restaurationem vix nisi talibus, quæ spirituum animalium defectus restaurare valent, curare possumus.

*Alterum viscus*, cui occurrit sanguis, est *HEPAR* cum annexo *folliculo felleo*, quæ conspirant circa bilis generationem. Læditur harum partium functio 1. *læso spiritu insito*, seu ut vocant, *in morbo intemperiei*, dum intemperies vel excedit occasione acidî vitiosi ad instar spinæ infixæ spiritum lacessentis, vel dum deficit intemperies, occasione spiritus deficientis aut exhausti.

2. *Læsa conformatione* harum partium organica, in *obstructionibus*, tum moribus, scirrhis. 3. Suo modo addi potest, quando sanguinis vitio læditur functio harum partium, quando nempe ineptus est ut ex eodem aut generetur, aut separetur materia bilis, unde postmodum vitia bilis superveniunt.

Curantur hæc vitia, *intemperiei* quidem corrigendo vitiosum istud, spiritum afficiens, & confortando tonum dictarum partium per *amara* & moderata *styptica*, ut sunt *rhubarbarum*, *absinthium* &c. *Conformationis* vitia emendantur



tur per *aperientia* supra dicta. *Sanguinis* & *bilis* errata corriguntur per *aromatica* amara nunc plus minus acra, prout vitium bilis requisiverit, de quibus jam alia dictum.

*Tertium viscum*, cui occurrit M.S. sunt RENES, in quibus fecernitur *lixivium volatile*, seu latex  $\nabla$ ofus, & volatile salso oleoso imprægnatus, qui simul certo modo alteratur, ita ut *materialiter* quidem urina in sanguine præexistat, sed non *formaliter*. Testantur hoc *attributa* & *proprietates urinae*, in colore, odore, sapore &c. distincta admodum à latice sanguinis seroso, & in nullo alio succo reperibiles. *Medium secretionis* mechanicum sufficienter docet *Bellinus*, quod nempe per fibras fistulosas trajiciatur serum, urinae materia exactior quidem sed simul obscurior. Idem docere satagit *Malpighius in scrutinio Viscerum*. *Medium* verò alterationis est *fermentum* quoddam peculiare, ab effectu ac proprietatibus stercorarium & loci putrefactivum dictum ab *Hellmontio* c. 4. de *Luthiasis*.

*Laditur* hac secretionis urina in renibus. 1. quando nulla fit, & est *abolita*. 2. Quando est *imminuta*, & non sufficiens pro necessitate naturali. 3. Quando ea est *nimia* adeoque *aucta*. 4. Quando eadem est *depravata*.

*Urinam* dixi *lixivium*, constans duabus partibus  $\nabla$ osa nempe sibus salis oleosis imprægnata, & quidem hæc de *urina sanguinis* imprimis intelligenda, nam cum *urinâ potus* nil hic nobis negotii. Jam vero in istis *urinae secretionibus* utraque hæc pars constituens *urinam* probe attendenda, & nunc hæc nunc illa consideranda, cum juxta utramque partem lædi possit ejus *secretio*. Interdum enim v, g. *laditur secretio juxta laticem*  $\nabla$ osum, qui nimis copiosus, paucis contentis salinis saturatus, & tunc urina ut plurimum est pallida & tenuis, aliàs cruda dicta; è contra interdum contenta bina sunt nimis copiosa, vel propter defectum laticis exhausti, per inediam, sudores &c. vel propter copiam salium vitiosorum in M.S. cum urina excernendorum. Hæc in genere.

In specie *urinae secretionis imminuta* est, quando minus ejus per *renes* transcolatur quàm decet, ratione nempe proportionis ad serum in M.S. quando verò parum inest feri, ut quando hoc crebrioribus sudoribus exhaustitur, aut non sufficiente potu restauratur, aut alibi colligitur ut in *Ascite*, tunc non potest dici imminuta feri excretio, quia proportionaliter sero in sanguine residuo respondet. Tunc igitur est imminuta secretionis urina, quando proportionem non responder assumptis & inde collecto sero in M.S. Sicut *abolita* vocari debet,



debet, quando nil excernitur & tunc alias vocatur *Ischuria seu urine suppressio*, quæ generali hoc nomine oritur vel vitio renum non secernentium, vel vitio vesicæ non excernentis.

## ISCHURIA RENALIS

Jam consideranda venit, quæ vitio renum non secernentium oritur, cujus leviores causæ *imminutam secretionem* efficiunt. *Urinam esse suppressam, patet* excessante ejusd. in excretionem, quod quando vitio renum evenit, nulla urinæ in vesicâ adsunt vestigia, adeo, ut licet immisso cathetere, aut factâ etiam *suctione* exploratio instituat, urinæ nil excernatur. Accedit quòd nullus vesicæ tumor, nulla tensio ejus, nullus in pube dolor, nulla gravitas perinæ aliave similia *symptomata* adsint.

*Causa*, propter quas renes urinas non secernunt, sunt vel in ipso sanguine vel in ipsis renibus. In sanguine vitium hæret, quando massa ejus tota unâ cum sero, adeoque omnes ejus partes ita sunt dispositæ ac firmiter inter se connexæ, seu ut loquitur Willis Pharm. rat. p. i. p. 166. quando sanguinis compagesita est ferrata, ut commode ex eadem, per angustos renum porulos, secretio legitima fieri nequeat: Vitium, quod serè ab acido sui generis intimius Mm. Sm. cogente oriri videtur, licet ex utroque nunc acido, nunc alcali acrioribus existentibus vitium hocce in sanguinem deriveret Sylvius de Hydropel. 4. prax. § 167. & seqq. Videmus hoc sæpius in morbis chronicis cum Scirrho hepatis & lienis conjunctis, in quibus pauca est urinæ secretio ejusque simul crudæ seu paucis contentis saturata utut alias sint Salivatores, aut plus minus cachectici &c. Propinatis veto remediis appropriatis vitiosam sanguinis crasin alterantibus, & tumores viscerum referantibus copiosior & turbidæ urinæ sequitur effluxus. Pertinent huc etiam sanguinis vitia, quando propter abundantiam legitime licet circulatus, aliquali circa vasa emulgentia circulatione, nil tamen ex renibus admittit. Simul vero atque secta fuerit brachii vena, ejusque quantum imminuitur, copiosus urinæ fluxus sequitur. Vid. River. Cent. 1. obs. 1. & obs. 39. Simile exemplum curiosum habet Tulpus de Ischuria Lunatica l. 2. obs. c. 43.

Quoad Ischuriam ex vitio renum, hujus triplex serè subest causa. (1.) ex meatuum renalium obstructione seu infarctu. (2.) ex laeso fibrarum fistulosarum renalium tono, seu tonus sit resolutus, ut in atriâ, seu sit nimis quasi



quasi firmus, ut in *spasmodica contractura*. 3. Ex defectu aut inertia fermenti renalis transcolationem & alterationem urinæ non bene promoventis.

*Quoad primum vitium* inter ea, quæ obstruunt, sunt 1. sanguis *congrumatus* vel ex casu ab alto circa renes collectus, vel ex aliis partibus per sanguinis circulum ad renes derivatus, id quod causæ antecedentes confirmabunt. 2. *Est pus* vel ex ulcere renum, vel ex aliis partibus ad renes derivatum, quo ipso sæpe urina supprimitur, id quod pariter ex antecedentibus vel renum, vel aliarum partium vomitis aut suppurationibus suspicari licebit. 3. *Obstruunt renes humores crassi ac visciidi*, imprimis cum urina potus ad renes delati, vel etiam cum sanguine eò distributi, qui infarcientes poros inertos reddunt renes pro urinæ secretionem; quod pertinet observatio *Amat. Lusit. Cent. 6. cur. 12.* de puero *ischuria* laborante ob *crassiciem lactis* nutriticis. *Ignotesce hoc vitium*, quando talium humorum præsentia in corpore observatur, qui nempe intestina & primas vias obsident aut quando urina antea effluit solida, excernitur turbida ac crassa, cum sedimento copioso mucilaginoso, postmodum tale contentum in urina deficit, præsentem simul gravitate in lumbis. 4. Frequentissima causa renes obstruens ac urinæ trajectionem impediens est *calculus*, cujus frequentes admodum hinc inde prostant *observationes, de quo infra.*

*Quoad alterum renum vitium*, nempe vitium eorum *renum*, pertinet huc 1. eorundem *ἀτομία*, quam vulgò vocant *imbecillitatem renum* ex læsa facultate secretice aut alteratrice natam. Linquamus has facultates illis, & dicamus, subesse tunc *ἀτομίαν renum*, i. e. tale nervorum ac fibrarum fistulosarum renalium vitium, ut defectu imprimis spirituum influorum non sustineantur in debita tensione, quin potius & nervi & ipsi *canaliculi fibrosi* quasi flaccescant, indeque orificia conniveant, unde parum vel nihil eò transmeare ac ex sanguine secerni possit. *Exemplum illustre* vide in *Barthol. Cent. 4. Ep. 18. 38. & 39.* Pertinet huc observatio *Hochstett. Decad. 5. cap. 10.* ubi *ischuria* longior ex renum refrigeratione in marino nive frigefacto, unde postmodum *epilepsia* & mors. Forfan *pertinent huc* morbi acuti, febres ardentes, *variola* &c. subinde *ischuriam* conjunctam habentes. Unde *ischuriam* talem absq; dolore supervenientem aliis morbis acutis ceu signum lethale, ob extinctam facultatem habet *Horstius lib. 4. obs. 49 p. 242. & 259.* Pertinent huc *suppressiones istæ urina*, quæ ob *vertebrarum luxationem aut ictum*, aut lapsum, aut vulnus spinalis medullæ accidunt, ac in genere quævis alia *ischuria* vitio nervorum plus minus resolutorum eveniens quæ ipsa, utut magis vesicam lædere videantur, tamen quin & renes afficiantur, absque dubio videtur. *Atonia huic contrarium vitium est strictura* pororum & nimia fibrarum fistulosarum angustia, *spasmo* quasi quodam contracturæ, uti fit frequenter in *calculosis*, dum uno rene læso ac à calculo



Id irritato, alter subinde cessat agere. Conf. *Forest. l. 24. obs. 26. Schol. ii. Aët. Med. Haffn. vol. 4. p. 102.* Denique

*Tertium renum vitium* erat fermenti renalis alteratio, ejusdem nempe defectus, aut inertia, non sufficiens alterationi & promotioni urinæ, uti subinde in Chronicis quibusdam affectibus plus minus hydropicis, aut ad hydropem inclinantibus fere evidens est.

Quoad *prognosin*, grave ac periculosum est malum *urina suppressio*, ac ista, quæ fit *vitio renum*, periculosior est, quam ista, quæ fit *vitio vesicæ*. Vid. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 201.* it. *urina suppressio quæ fit vitio renum*, si sine dolore, magis, quam quæ est cum dolore. Superveniunt autem *suppressionem urinæ symptomata* varia, prout nempe feri urinarii in renibus plus minus alterati metastasis ac translatio in partes solidas varia, vel sanguinis aliorumve contentorum alteratio & immutatio plus minus gravis facta fuerit: Sic *angustia & anxietates præcordiorum, torpor sensuum & facultatum animalium*, non raro *epileptica pathemata*, interdum *ascites & pedum tumores œdematosi, vomitus, sudores, halitus plus minus fetidi ac urinoli*. Quod si in his *urinosis saporis aut odoris indicia observentur*, indicio est alterationis cujusdam, jam à fermento renali factæ, vel ita, ut urinæ per pelvim transitus sit interclusus. Quod si tales proprietates adsint, ne introeuntis quidem feri in renum parenchyma indicium erit; adeoque sæpè lethalis affectus est *Ischuria*. Et quidem si denuò ager ante 7. diem *mejerere incipiat*, servari possunt; si minus ut plurimum intereunt. Etsi enim postea *urina denuò profluere incipiat copiosa etiam & varia*, tamen partim ob infectam *M. S.* partim ob vitium partibus solidis affricum postmodum intereunt; adeoque rarum est, quod *ischuria 11. dierum curata fuerit, M. A. N. C. Ann. 6. p. 149.* Interim tamen quidam diutius, quidam minus diu urinæ suppressæ supervivere possunt. Sic *Riverius Cent. 4. obs. 45.* observat *ischuriam 11. dierum, it. Horst l. 4. obs. 45. 14. dierum ischuriam*. Ferè tamen intra 14. dies jugulantur ægri, raro ad 20. vivunt, & quidem si *sub urina suppressa vel sudor copiosus vel vomitus crebrior aliave in alio loco excretio fieri contingat*, diutius supervivere possunt ægri. Sic *Fonsecal. 2. Conf. 96.* refert, Monialem Patavinam, quæ supervixit, licet per 6. menses *urina fuerit suppressa*, quia sudabat quotidie circa ventrem & umbilicum. Exemplum notatu dignum refert *Piso, edit. Langwedel. p. 95.* Ipsemet observavi *Ischuriam vitio renum ad 17. dies*, quæ superveniente *Epilepsia denuò urinam reddebat, etiam curata ex recidiva tamen lethalem*. Si *urina suppressio est à calculis renum majoribus*, est ut plurimum lethalis. Si à *resolutione renum* contingat, ferè semper lethalis observata fuit. Adeoque ab



*Horstio* retentio totalis urinæ in morbo, sine doloris sensu, instantis mortis signum esse asseritur.

Quoad *CURAM*, ut suppressa urina revocetur, removenda imprimis suppressionis causa, adeoque vel *corrigendum sanguinis vitium*, vel *renum præternaturalis dispositio*. Nempe impedimenta in his removendo, tonus debitus conservandus, fermentum renale acuendum. Quoad *sanguinis vitia corrigenda*, sanè nunc levis venæsectio, nunc pro affectus primarii varietate alterantibus aliisque appropriatis M. S. vitiata crasis corrigenda.

Quoad *renum verò dispositionem* præternaturalem removendam, subinde necesse est, ac sæpe fructuosum, præmittere levem alvi solutionem tam per os, per assumpta *laxativa*, cum tartaro vitriolato propinata, quam per *clysmata terebinthinata* injecta, utpote cum his ipsis sæpè stimuletur uberior urinæ secretio. In specie si fiat *renum obstructio à sanguinis grumo* curanda venit per sanguinem grumotum resolventia, *diuretica*, quæ inter in specie eminet *rubia tinctorum*, ejusque radix, *heder. terrestr.* ac *chærefol.* ut. *Hyperic. lap.* &c. cum aceto assumpti, *sperma ceti*, *succinum aut succinata* quælibet & alia selecta *vulneraria*, plus minus simul diuretica. Sin à *pure obstruente* fit malum, per hoc *abstergentia*, istudque attenuantia, simul diuretica cura instituenda. Talia sunt *terebinthinata ac vulneraria* plura, in specie *tereb.* succus aut syrupus de *hed. terrestr.* essentia & extractum *agrimon. hyperici* &c. Sin autem *mucro tenaci* seu pituita glutinosa sit malum, præmissis *laxantibus* ac cruditates pituitosas per alvum evacuantibus (quod probè observandū est, ne intempestivo incidentium diureticorum usu copiosior cruditarum pituitosarum ad renes fiat delatio, sicque malum potius augeatur, quam imminuatur, conducunt hanc *dissolventia*, simulque urinam blandè stimulantia. Talia sunt in specie *olina*, ut *tartarus vitriolatus*, *tinctura tartari*, *spir. urinosi* & *aque volatilia*; hinc *raphanacea* quælibet, ut *succus raphani*, *rad. armor.* in vino infus. *Oxymel scyllitic.* *spir. his* in decocto diuretico, v. g. *rad. petroselin.* in jure *cicer. rubr.* præsertim *spir. vitrioli Philosophici*. item *succus limonum* egregiè incidens & dissolvens mucum, si ad ℥ij. vel iij. usque ad iij. assumatur, multum laudatur ab *Amat. Lusit. Cent. 5. obs. 71.* in quo casu etiam *succus parietaria cum oxymelle* sumptus experimentum *Helidæi Panduani* est. Quod si à calculo fuerit malum, curandum venit vel per *dissingentia*, vel saltem per hunc maturè removens *diuretica*.

Quoad *renum tonum conservandum*, si ischuria sit ex eorum atonia, restituendus venit per *nervina*, præsertim per *terebinthinata*, *juniperina*, *succinata*, *internè* & *externè* usurpata, quibus *externè* quoque *oleum scorpion.* *petroleum.* *ol. destillatum succini* imprimis adjumento est. Sin ex *contractura spasmodica fibrarum*

rum renaliū  
cinab. & ij.  
Praxi referat,  
nam provocat

Denique

nia sua plus  
sunt varia,  
sio, egregiè  
v. gr.

Hinc Parieta  
que egregiè  
inde parando  
propinati bl  
remedia, succ  
urina, quib  
turgida, qu  
egregiè pro  
in vino albo  
tula, de tereb  
terebinthinat  
Tinct. Epist  
fientibus quib  
leat, v. g.



rum Renalium orta fuerit ischuria, conveniunt opiata, it. cinnabaria imprimis cinnab. ꝯ ij cum hie volatili succini, quo forsan quoque facit, quod Deckerus in Praxi referat, Mubridatum cum decoctione aliqua diuretica datum mirificè urinam provocare.

Denique ea, quæ fermentum renale respiciunt, hocque acuunt & acrimonia sua plus minus renes stimulant, adeoque in specie appropriata sunt, talia sunt varia, imprimis sem. violarum, ex quo cum  $\nabla$  appropriata facta emulso, egregium est remedium simul alvum laxans ac urinam promovens, v. gr.

℞. Sem. viol. purp. ℥ij.

lithosperm. ℥j c. q. f.

$\nabla$  petroselin. F. emulso, adde

Test. ovorum pulverisat. in specie struthion. ℥j.

edulcoretur parum. M.F. Emulso.

Hinc Parietaria præsertim ex ruderibus antiquorum parietum collecta, adeoque egregiè nitrosa, egregium est diureticum, recipiendo ejusdem succum, aut exinde parando syrupum: flores cyani, calcatrippæ, præsertim juncti in vino cocti & propinati blandè urinam cient; radix raphani & quælibet ex raphano parata remedia, succus raphani, rad. armorac. vino infusa, multum valent in stimulandâ urina, quibus adde capita allii, particulis acribus volatilibus insigniter diureticis turgida, quæ ipsa concisa cum vino assumpta, vel cum spir. juniperi propinata egregiè proritant urinam. Sem. Erysimi acre ad ℥j. in formâ pulv. propinatum in vino albo egregium est remedium ad promovendam urinam. De liquore betula, de terebinthinatis & similibus jam aliàs diximus. In specie potiones Plateri terebinthinata, quæ hinc inde prostant in ejus Observationibus & repetuntur in Timæ Epist. p. 242. egregii sunt, utut non omnibus æquè convenient, cum mulieribus quibusdam propter mellis societatem hysterica pathemata excitare soleat, v. g.

℞. Terebinth. Venet. ℥℔. c. f. q.

vitell. ov. &  $\nabla$  gramin. F. Emulso

sed est ingrata.

Vel: ℞. Terebinth. Venet.

mellis ℥℔. vitell. ov. no. j.

succilimon ℥j.

$\nabla$  gramin. q. f. M.F. Emulso. D.S.

Harntreibende Milch auff etlich maß

Utre



Uterius *fol. ribes nigra* urinæ odorem spirantia egregiè urinam pellunt. Denique *succus pastinacæ luteæ*, seu *siferis* alterius *Marthioli*, perquam egregiè urinam promover, etiam aliis remediis non obsequentem. In specie *puerorum urinas suppressas*, miro effectui hic *succus* stimulat. Tandem *bia volatilia*, & hinc etiam *fixa* multum profunt. In specie *θ. volatile succini* nobile est diureticum & hinc *spir. Es θ. volatile urina ac θ. ci, spir. tartari, tinctura nephrit.* *Ammellungi* aut hujus loco *spir. carminativ.* Pertinent huc *lumbrici, scarabæi lucanici, aselli, cantharides & coccinill.* Hæc insecta de volatili perquam diuretico insigniter pol-  
lent, adeoque perquam in *Ischuria* conveniunt. *Lumbrici terrestres* vino infusi & expressi: Item *spir. lumbricorum per putrefact.* paratus egregiè profunt; *pulv. asellorum* aut hi ipsi *vino infusi* multum conveniunt ad proliciendam urinam. *Cantharides* multis suspecti ritè tamen *infusi* potenter urinam promovent. Vid. *Bartholin. Cent. 4. Ep. p. 93.* Sicut de *millepedum* efficaciam *Hildanus Cent. 6. obs. 50.* Quoad *bia fixa*, aut his familia seu cognata concreta *fixiora terrea, testa ovorum calcinata* ad ʒj. si propinentur, egregiè urinam pellunt. Pontentiores sunt *testa ovorum struthiocameli*, quæ in *spiritu vis* dissolutæ & sub nomine *liquoris nephritici* propinatae ut & *testa ovorum calcinat. vino infusa* & ita haustæ urinas p. I-  
lunt. Pertinent huc *salia fixa cineritia* ex plantis diureticis debite calcinatis pro-  
licita, ita nempe ut non perfecte alcalisata permaneant, sed potius *salia*, de quibus *vid. Tachen. in Hippocr. Chym.* adeoque *θ. stipul. fabarum, θ. prunella, genista* profunt, *salque simi columbini* potens diureticum est; cui non cedit *simus columbinus* *vino infusus* expressus & propinatus. Non secus atque *simus equinus* *vino infusus*, colatura ejus expressa bibita, egregiè urinam stimulat. *Causas* inter quæ *urina secretionem* impediunt, crebrior est

## CALCULUS RENUM.

*Calculus* ipse est productum tantummodo morbosum, effectus scil. illius af-  
fectus renalis, qui aliàs propriè *Lithiasis* dicitur & dicit *dispositionem re-  
num calculosam.* Productum vero hoc morbosum à *Paracelso* dicitur *Duelech*,  
nomine lapidi humano proprio. Generari *calculos* in omnibus corporis partibus  
notum est, frequentissimus tamen eorum nidus sunt *Renes*, & hinc *vesicula fel-  
lea*: Et si in aliis partibus inventi fuerunt, rarius tamen hoc factum fuit. Isti vero  
*calculi*, qui in vesica deprehenduntur, sæpè *ex renibus*, vel calculi minuti forma  
vel arenularum majuscularum facie successivè in vesicam descenderunt, ibique  
retenti pederentim in istam molem accreverunt, adeo ut credam, rarissimum ef-  
se vesicæ calculum, qui in eadem prima fundamenta ponat, utur majores calcu-  
li, qui amplitudinem ureterum tam naturalem, quam morbosè auctam superant,  
omne morbosum incrementum etiam in vesica acquisiverint. Dico morbosè  
auctam.



*auctam*: In iis enim qui sapius calculo laborant, ex crebriori calculorum majorum transitu ureteres interdum ad digiti amplitudinem distenti reperiuntur. Quando igitur in vesicâ hærent calculi majores his ureteribus, infallibile est, acquisivisse illos augmentum in Vesica.

*Quod atinet generationem calculorum renalium, materialiter & formaliter ex urina oriuntur.* Nam quod plures de *succo perroso, spiritu lapidifico, aut Gorgonio* proferunt, saltim nuda sunt nomina, nil explicantia, quin potius per modum *coagulationis* duorum huius, *† di & alcali* calculos generari puto, dum nempe *acidum* manifesti saporis, adeoque vitiosum, in urina occurrit sibi obvio *alcali volatili*, quocum coagulatur mutuo in concretum arenosum, siquidem simul *levem terrestrem substantiam* urinæ permixtam arripit & ita in durum, siliceum concretum invicem abeunt. Hinc adeo duræ evadunt exinde arenulæ calculosæ, ut mirandam earum firmitudinem in poliando vitro exploratam videre queamus in *Panaroll. Pentec. 4. obs. 25.* qui pariter *Pentec. 1. obs. 35.* arenularum tam albarum quam rubrarum diversitatem c. microscopio examinavit in *Pentec. 1. obs. 35.*

Nempe *triplex calculorum est diversitas, alborum, rubrorum, ruforum seu flavorum.* Albi fiunt, quando mucilago viscida ex attritis membranulis renis transudans simul à principiis coagulationis calculi coagulatur. Rubri ex minutissimis sanguinis guttulis ex vasculo quodam eroso aut lacerato destillantibus unâ concretis tinguntur. Ruffi seu flavi simpliciter urinæ solius videtur progenies: Primordia hæc calculorum sine eleganter per  $\Delta$  em examinata vid. in *Tachen. Hippocr. Chymic. cap. 14.*

Vulgò aliam producunt mechanico-Chymicam generandi rationem, si nempe ad imitationem *Helmontii*, coagulum fieri volunt à *spiritu quodam vinoso* concurrente c. *spir. urina*, non secus ac *S. V. rectificatiss.* coagulatur in *offam c.* permixto *spiritu urin. volatili*. Nam dubium adhuc est, quomodo fiat huiusmodi concretio & an vera an apparens sit coagulatio, & quare idem *spir. urinosus c. à calc. viv.* abstractus est, non amplius cum *S. V.* ita concrefcere soleat. Hoc ergo ceu paradoxo in medio relicto, *elementa* ista ulterius consideremus; nempe quoad *acidum*, observandum est, quod ordinariò ferè *arthritici etiam sine calculosi* & contra: & ad utrumque malum quasi epidemicum videmus expositos eos, qui *vina* bibunt copiosiora & acidiora, uti fit v. g. *Franconiâ, Moravia, Austria* & similibus locis: Nempe idem videtur esse *efficiens acidum*, quod artuum nervosas partes pungens & rodens *synoviam* in iisdem coagulat in *nodos*, quod in *renibus* similibusque locis *alcali* urinario occurrens, istud in *calculus* cogit. Adeoque in talibus *acidum* copiosius sub isto urinæ sapore occultatum oritur ex primis viis, ex vino copiosius ingurgitato, indeque citra vomitum re-



tento, hinc vitiosè digesto, quod dum ex stomacho dilabatur, uti suo isto acore toti est hostile, ita copiosorem finis urinæ contentis materiam suggerens, & in eadem alcali quoddam volatile ab acido debito non ritè saturatum reperiens, subito illud aggreditur & in *calculus* cogit. Propter hoc acidum vini vitiosum incolæ tales imprimis affecti sunt *paresi*, præcipuè ex colicâ seu artuum contractura ex colica, affectu apud nos rarò ac revera colicarum convulsarum gravissima species. Facit huc imprimis *exenteratio calculosi* cujusdam, cujus omnia contenta liquida acidum intensè spirabant. Conf. M. A. N. C. Ann. 7. p. 344.

*Efficientis* igitur locum acidum obtinet, nunc ipsius urinæ, nunc vero ex primis viis elapsum copiosius, inde urinam magis imprægnans & visciorem reddens & ita copiosiorum, aut firmiorum calculorum genefin promovens. Hinc enim vomitoria subinde à calculo præservant, contenta primarum viarum eliminando, non secus, ac plurima terrea lapidea, aut calcinata contra calculum laudantur, haud alio effectu quam quod acidum in primis viis absorbent. *Patiens autem in calculi genefi erit alcali volatile*, quod quia copiosius, minusque temperatum per renes in specie transcolatur, sub visco urinæ sapore, propterea in hisce locis copiosiores calculi. Sed observandum est quod ex urinâ visca, qua tali, non possint generari calculi; nam cum viscus sapor ex acido & alcali volatilibus, debita proportionem unitis originem ducat, tam cum acido, quam cum alcali permiscibilis est, sine ulteriore immutatione. Dum igitur alcali urinæ saturatum est sufficienter à debito suo acido, tunc utcumque acidum urinæ permisceatur, nullo modo calculus exinde generabitur. Apparet id in *stranguria*, in qua urina præternaturali insensibili acido ex primis viis imprægnata excernitur, sine tamen calculi progenie, quia visco urinæ tunc temporis naturaliter constitutum est, h. e. alcali volatile proprio acido saturatum, unde non potest coagulari ab eodem vel alio quovis vitioso acido, ac pallida quidem ac turbida nonnihil, non vero in arenulas spissata excernitur urina. Ut igitur visco urinæ volatile urinosum coaguletur præternaturaliter ab acido quovis in lapidem, necesse est, ut istud alcali separatum nonnihil, nec debuit saturatum existat, ut ita liberius ab acido plus minus naturali aut vitioso arripi & ita constringi in calculus possit; fit hoc, quando urina in renibus aliqualem putredinis præternaturalis notam incurrit, qua levi putredine solvitur nonnihil ejusdem mistura, & ita sapor ejus viscus dividitur ista alteratione, ut utraque salia activa manifestiora fiant, unde novo & planè heterogeneo coagulationis modo sociata, demum in calculus coeat. v. g. Videmus, quod urina clara & perspicua excreta, si ad tempus, in matula præsertim stannea steterit, speciatim tempore æstivo, ac corrumpi & leviter putrescere inchoet, cujus indicium fœtor existit, quod tunc arenulæ & successivè crusta calculeosa ejus parietibus se affigat; nempe nunquam urina nisi cum alcali fixo præcipitata, aut

putre-

putrefacta sunt  
laburram put  
putredo, præ  
sapore, acidu  
trecentia pot  
arenula & cal

Quo p  
qui ex nimio  
tidam reddi  
ponit. Eco  
& balsamic

A  
mento altera  
dispositio ren  
gibile est hoc  
vinum, acq  
ut probabile  
que modo ac  
modum à pa  
haustum, q  
Tr. infantis  
lum effluat

Ex d

ratione ferm  
volatili, co  
Acidum istu  
triculi natale  
enervatur, p  
de prompti  
untur calcul  
tis tamen pl  
minus acidu  
tur. Hinc  
calculi, qu  
partim alca  
muri. Cent  
ad magnitu



putrefacta suum  $\theta$ . volatile promit, ubi simul etiam *terrestrem* & quasi *fabulosam* faburram putrescendo de se reddit. Hinc in corpore, si concipitur talis urinæ *putredo*, præstò est *Lithiasis*, h. e. sub putrescente tantillum urinâ, divisoq; ejus sapore, acidum cum alcali novo modo coit & particulas has terrestres (sub putrescentia potius genitas, quam formaliter præexistentes) simul coagulat, hinc *arenula* & *calculi*.

Quo pertinet imprimis *historia Helmontii*, Tr. de *Lithiasi* de Jurisperito, qui ex nimio esu *asparagilubiasin* contraxit. *Asparagus* nempe eo ipso, quò fecundam reddit urinam, eam ad aliqualem *putredinem* & ita huius divisionem disponit. E contra *macis*, *juniperus* & *terebinth.* quia urinam suaveolentem reddunt & balsamica vi à putredine conservant, *calculi* suo modo sunt *preservativa*.

*Alteratio* vero hæc *putredinalis* fit in renibus ab horum *fermento* alterato, plusque minus enervato seu inerto reddito. In hoc enim consistit *dispositio renum* & *calculorum*, h. e. ipsa *Lithiasis*. Unde quia difficulter corrigibile est hoc vitium, difficilis etiam est *Lithiasis* eradicatio. *Fermentum* hoc *vitiosum*, acquisitum est primitus *vitio diata*, labefactantis fermentum renum & ut probabile videtur, occasione vitiosi acidi fermentativi ex primis viis, quocunque modo ad renes transmissi, enervantis *fermentum renum* insitum. Hinc postmodum à parentibus ad liberos transplantatum, aut etiam cum lacte *nutricis* simul haustum, quale exemplum *lithiasis* ex *nutrice* lacte contractæ refert *Helmont* Tr. *infantis nutritio ad vit. long.* Sicut in vulgus notum est, *hereditarium* malum esse *lithiasin*.

Ex dictis patet, *fundamentum Lithiasis* consistere in *alteratione fermenti renalis*, ipsum vero ejus productum seu *calculus* fit ex se urinæ volatili, coagulato ab acido urinæ, mediante alteratione urinæ putredinali. *Acidum* istud speciatim errore digestionis primæ, adeoque vitio fermenti ventriculi natales haurit, partim & ab hoc ipso fermentum renale labefactatur & enervatur, partim quoties acidum urinæ occultum hinc intensius redditur, unde promptior & firmior coagulatio: Unde sub quacunque *dieta* in *dispositis* oriuntur *calculi*, in non *dispositis* vero nulli, licet eodem nutrantur victu. In dispositis tamen plus min⁹ duri vel copiosi generantur iidem, prout ex assumtis vel plus minus acidis, vel plus minus coagulabilibus naturalem occasionem nanciscuntur. Hinc post *lacticinia* & *caseosa*, similiaque assumpta sæpius renasci dicuntur *calculi*, quoniam hæc partim acido vitioso in primis viis facile corrumpuntur, partim alcali terreo promptè in calculum coagulabili sunt imprægnata. Sic *Sal-muth. Cent. 2. obs. 97.* exemplum habet ex nimio esu *casei* lapidis vesicæ lethalis ad magnitudinem gallinæ concretæ.



*Producuntur ex istis causis occasionalibus*, ut plurimum parvula tantum arenula in renibus (rarius massulas majusculas compingi arbitror, quæ occasione novarum mutuaque adhesionis & coagulationis tandem in majores lapillos coeunt, adeo ut totum renum parenchyma his ipsis in lapidem mutatum observatum fuerit. Item tota pelvis, omnesque hinc producti tubuli lapideo tali concremento infarcti reperti fuerint. Conf. *Salmuth. Cent. 3. obs. 30.*

*Symptomata* quæ *calculosos* affligunt, sunt pauca, dum calculus est quietus; Siquidem calculi etiam insigniores subinde in renibus latent, absque ullo præternaturali symptomate. Conf. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 31. § 33.* adeoque tolerabile est tempus *extra paroxysmum*. Gravia vero & varia, dum calculus est in motu, ac ad ureteres & hinc ad vesicam truditur, tuncque est *tempus paroxysmi*. *Symptomata* omnia oriuntur ex attritu doloroso calculi ad membranas pelvis & ureteris, unde hæc *spasmo* correptæ & alias partes per consensum simili *spasmo* corripi faciunt. Adeoque plurima ista, & sæpe mira *symptomata* quæ calculi, aliosque nephriticos dolores insequuntur, *partim* ex *spasmi* variarum partium, *partim* ex retenta plus minus & per *metastasi* aliorum translata urina oriuntur. Omnia autem hæc *symptomata*, quæ saltem ex dolorosa impressione dictarum partium originem ducunt, non sunt propria calculo, sed etiam aliis doloribus nephriticis ab alia causa, & non præcisè à calculo natis, v.g. doloribus nephriticis scorbuticorum, per aciora salia istas partes arrodentia natis communia ut & eandem originem habere solent. Quin imò post multiplicia per consensum pathemata tam facile *symptomata nephritica, colica, hysterica* confundi solent.

Vexat autem agros *calculosos* in paroxysmo dolor renum plus minus acutus in regione lumbari, isque modò sinistrorsum modò dextrorsum vergens, prout dexter vel sinister ren fuerit affectus. Hinc ferè sensus gravans & quasi fortiter premens in dictis locis percipitur, adeo tamen molestus & cum tantis anxietatibus junctus, ut nec interdiu, nec noctu quiescere queant. Quod si ex renibus in ureteres pergant calculi, dolores urgentur, & lancinantes magis evadunt, qui interdum cessant, dum calculus ex uretere denuo in ampliorem pelvis cavitatem relabitur, nunc denuò recrudescunt, dum ad ureteres iterum pergunt.

Urina multiplici excernitur differentia, cum sub paroxysmo ingruente urina pauca, acres tamen seu admodum stimulantibus & visæ minguntur: Subinde perfecta ejus suppressio sequitur. Interdum imò crebrius urina est ferè cruenta ex vulnere partibus ab acutis calculi cuspidibus inflicto seu laceratis vasculis à calculi asperitate. Observandum tamen urinam subinde subrubram esse, & quasi sanguineam reddi, absque tamen sanguinis consortio, quin talis urina subrubra crassa &c. sæpe fit ex tartaro resolutò, ex cujus coagulatione colliguntur



guntur arenulæ. Non igitur terreatur Medicus, tanquam sit sanguinea, monente *Horstio in observat.* Arenula quoque in calculosis solent emitti, quibus tamen similes in non calculosis etiam emitti solent, adeoque si arenula emissæ sint friabiles, & quæ non solum fundum occupent, sed etiam undique lateribus vitri se affigant, sciendum quod tunc sint *salia scorbutica* coagulata; e contra, si duriores sint, & subinde grandiores, quæ fundum saltem occupent matulæ, tales *lithiasis* suspicionem inferunt. Porro copiosior *mucus* mediam urinæ partem subinde replens, *albus* & levis à calculosis excerni solet, qui nil aliud est, quam nutrimentum partium membranarum, pelvis, ureteris &c. à calculo læsarum plus minus & sic cum urina extravasatum, de quo vid. in primis *Willis de urinis* p. 364. & 365. Ulterius *stupor crurum* ferè è regione renis affecti est perceptibilis, cujus tamen ratio non æque in propatulo est.

*Dolor tenivus* è regione lumborum, juxta os ileon, deorsum in pubem ferè secundum ureteris nempe ductum, protenditur, & in viris *testiculus* istius lateris, cujus ren est affectus, spasmo quodam correptus retrahitur sursum ad os pubis. Interdum *tenesmus* simul corripit ægros, idque observavi in fœmina ac annotat quoque *Timæus in Ep.* pag. 242. *Anxietates præcordiorum*, vomitus subinde enormes insequuntur motum calculi renalis, item *respirationis difficultas*, quasi cinctulo restringerentur costæ inferiores, idque in consensum renum & diaphragmatis non immeritò videtur rejicere *Sanctorius in Comment. in art. parv. Galeni, part 2. digress. 85. p. 994.* Interdum adest simul *hemigrania* illius lateris, cujus ren est affectus, test. *Bartholin. Cent. 14. Ep. 16. p. 27.* Imò *convulsiones digitorum*, brachiorum, pavores dormientium &c. subinde calculo renum supervenire observantur, *dolorem* quoque *tutillantem* sentiunt in *extremitate glandis penis.* vid. *Alt. Med. Hassn. Vol. 4. pag. 103.* Frequentissima omnium symptomatum sunt *tormina colica* satis acuta cum *nausea* & *vomitu*, ac cognatis symptomatibus, juncta, idq; propter spasmodicas convulsiones nervorum ex plexu mesaraico in renes, intestina & stomachum distributorum. *Nervulis enim renalibus* ex dolore spasmo correptis continuatur idem spasmus ad plexus mesenterii usque, qui simili spasmo affecti. Adeoque calculus renum in viris *colicam convulsivam*, in fœminis *passionem hystericam* excitat; non raro in his quoque *partus dolores* mentitur.

Ut igitur ritè *distinguantur dolor colicus* per essentiam ab eò, qui fit per *consensum renum*, observandum est, quod in *Colica* nullus adfit *stupor cruris*; item quod in tali *colica* ægri se possint erigere, cum ii, qui calculo renum laborant, ut plurimum incurvati sint, quasi palus per vertebrae esset transfixus, & non sine dolorosâ molestia se possint erigere: *Colicus dolor* modo remittit, modò accedit, cum *nephriticus* ut plurimum sit continuus, in specie junctus fixus *dolor in dorso* ferè *calculum* innuit, licet alia simul concurrant *symptomata*,



nec in *nephriticis* talia murmura aut agitationes in intestinis concipiuntur atque in *colicis*; alia quoque urinarum est conditio. Alia huc facientia *vid. in Senn. l. 3. prax. ubi de calculo renum.*

Quoad *prognosin Calculi renum* periculosus est affectus, non tamen propter molestiam dolorosam & hinc nata pathemata convulsiva, aut propter vitiata urinæ secretionem, sed in specie, quoniam *inflammationes renum, Ischuria lethales* & gravissimi morbi nervosi generis supervenire solent, & *feminae calculo renum* obnoxia si gravida reddantur, facile moriuntur, aut abortum patiuntur, teste *Panarolo Pentec. 3. obs. 8.* Calculus quoque maior aut asperior, eò periculosior & contra. Dolori *nephritico* superveniens extremorum frigus, aut sudores frigidi, praesertim cum *Ischuria*, mortem in propinquo innuunt. Si *urinae* tenues antea excretæ, emittuntur crassæ cum arenulis & quasi frustulis lapideis, bonum signum est comminuti quasi calculi. Interdum *certas periodos* observat calculus cum teste *Helideo in obs.* si est motus in quarto, in septimo ut plurimum soleat prodire, cæteris nempe paribus. Sic *typum tertianarium* aliquando observavi in viro *ex calculo nephritico*, dum tertio quoque die à meridie dolores abdominis & lumborum spasmodici reverterentur, & per noctem durarent, donec sponte successivè remitterent.

*Cura* instituitur vel in *Paroxysmo* vel *extra eundem*.

In *Paroxysmo* respicitur ad motum calculi praesentis & inde nata pathemata spasmodica. Ergo ante omnia dolores & partium inde nati *spasmi*, & hinc ureterum *contracturae sistende*; deinde quantum possibile, *calculus* vel appropriatis *infringendus*, vel *diureticis* blandis *provocandus*.

*Extra Paroxysmum* vel si *absint calculi* praecavendum ne denuò regenerentur; Si vero denuò *regeneratus* sit, maturè cum urina eliciendus, ne nimium incrementum capiat.

*Pro his scopis observandum I. Ut diuretica* in paroxysmo sint moderata, quia alias viæ attritu calculi irritatae, dolorifica crispatione vel contractione se angustant; hæc omnia exasperantur, si fortioribus diureticis violentius protrudere velis calculum, adeoque quò gravior dolor in paroxysmo est, eò minus aut mitiora adhibenda diuretica. Quod si calculus maior sit *viis ordinariis*, ut ejicere eundem sit impossibile, vel *confringendus*, vel à re seu impossibili desistendum, cum *apertio per ferrum Chirurgica* sit, si non impossibilis, saltem periculi plenissima. Verum cum non semper conjecturando possit assequi,

an

an parum an  
tibus ludat  
est, promov  
quandiu hi c  
ac spasmus v

II.

observatur;  
istam urinæ  
quod faciunt  
per se est ric  
necesse esse  
ficiunt.  
cinnata ren  
am urinæ to  
dolorifica c  
tlinera via ar

III.

plus minus  
danda, ut p  
malum exal

Ext

(1.) ea qu  
evacuanti  
lo ab Hild

(2.)

tollunt.

(3.)

rigunt, pu  
balsamica

urgente d

aut emolli

Convenie

urina sal

an

coq. in f. q



an *parvus* an *magnus* delitescat *calculus*, cum non raro variis formis aut asperitatibus ludat, hinc tutissimum est, ut præsens *calculus*, quantum possibile est, promoveatur, dolores simul tam *internis* quam *externis* leniendo, cum, quamdiu hi continent, tamdiu membranarum ac utereturum major contractura ac spasmus vigeat, à quo penitus calculo via intercluditur.

II. Quia *præsentē calculo* ac dolore *nephritico* urgente, *urina* ferè *acrior* observatur, à qua dolores exasperantur. Ob id simul administranda talia, quæ istam *urinae acrimoniam* tollere, & ita dolorem nonnihil imminuere possunt, id quod faciunt omnia ea, quæ vulgò *emollire*, *viasq;* calculo *laxare* dicunt, quod per se est ridiculum. Si enim talia deberent laxare renes ac meatus urinarios, necesse esset, prius laxarent ventriculū & intestina, utpote quæ immèdiatè afficiunt. Talia igitur ex *althea*, *oleo amygd. mucilaginis* & similibus concinnata remedia conveniunt, non quatenus laxant *vias*, sed quatenus *acrimoniam* *urinae* tollunt, & inde natos dolores leniunt, quo lenito, crispationes & dolorificæ contracturæ ductuum tolluntur, & ita vel spontè ad debitam amplitudinē viæ antea arctatæ redeunt.

III. Cum *symptomata colica*, *flatulencia* & *borborygmi*, alvi obstructio plus minus similiaque pathemata in paroxysmo ægros crucient, ob id operanda, ut primæ viæ à sordibus quibuscunque sint liberæ, ne hæ ipsæ coacervatæ malum exasperent.

Extra paroxysmum ea, quæ præcavent, sunt

(1.) ea quæ *acidum* *urinarum* & *primarum viarum* corrigunt, aut *absorbent*, aut *evacuant*. Hæc inter imprimis sunt *Vomitiva* ad præservandum à calculo ab *Hildano Cent. 5. obs. 61.* specialiter commendata.

(2.) Quæ *renes abstergunt*, & ita *arenulas* & *calculosa rudimenta* maturè tollunt.

(3.) Quæ *renibus eorumque fermento appropriata* sunt, ejus vitia corrigunt, putredinis præternaturales notas *urinae* inductas impediunt, adeoque *balsamica vi* putredinalem dispositionem tollunt. *Præsentē igitur paroxysmō* & urgente dolore hinc *nephritico* nil æquè convenit, quam blandus *clyster*, aut *emolliens* aut *anodynus* injectus, qui sanè multum valet ad hunc affectum. Convenienter his additur *terebinthina*, & *th. succini volat.* quin nudus *clyster ex urina* saltem *pueri* conducit. Vel

℞. Herb. viol. parietar. malv. an. Mj.

rad. althææ ℥iſs.

flor. chamomill. p. iij.

coq. in f. q. urin. pueror. ℞. Colatur. adde.

Terebinth. cum vitell. ovi solut. ℥iij. vel ℥iſs.



oleum lilior. albor. ℥vj.

scorpion. ℥j. M. pro clysmate.

*Aut si contumacior sit alvi obstructio,*

R. Ol. lini, rapar. an. ℥v.

diacolocynthidos ℥vj. M.

Quin & clysmata ex lacte pro scopo anodyno usurpari possunt. Juxta hæc clysmata inprimis *fotus & inunctiones externa* sunt proficua. v. g.

R. Herb. malvæ, melilot.

flor. chamomill. sambuci an. Mj.

fem. lini-fœnugr. an. ℥j.

4. frigid. maj. an. ℥ss. M. F. Sacculi

No. ij, qui vel sicci calidi vel in aqua cocti applicandi lumbis pro doloris sedatione.

*Litus* fiant ex oleo chamorneli, lilior. alb. amygd. dulc. ungu. dialth. medull. cervin. pingu. anseris, ungu. dialth. Myrs. petrol. alb. ol. destilat. spic. junip. succin. &c. v. g.

R. Ungu. dialth. ℥ss.

ol. amygd. d. ℥ij.

scorpion. ℥ss.

petrol. alb. ℥j. M.

Vel:

R. Ol. amygd. amar.

chamom.

lilior albor.

scorpion. an. ℥ij.

petrol. alb. ℥ij.

ol. destilat. spicæ

juniperi an. ℥ss. M.

Vel: R. Ungt. rosat. camphorat. q. v. addendo laud.

opiat. q. s. M. F. Linim.

*Empl. de meliloto malax. cum ol. chamom. & petrol. bene confert.* Sanè *petroleum* eximiè commendat *Panaxolus* in observat. It. *Cataplasma* ex medulla panis albi ac lacte, it. ex succis & flav. præsertim cum *parietaria*, à quibusdam multum extollitur. Nec omittenda est *camphora*, ejusve *oleum*, quibusvis modo dictis ferè semper addendum. Hujusmodi *litus* crebro renoventur calidi, superimponendo postmodum *sacculos*, aut etiam post *balnea* eadem illiri solent. v. g.

R. Herb. malvæ

alth.

pariet. ana Mij.

Flor.



Flor. cham.

fambuc. an. Mij

sem. lini.

fœnug. an. ʒiij. M.

Ex his in aqua coctis fiat *balneum*, cui infideat æger, ipsum *magma decoctionis* vel applicando *renibus*, vel *sacculum ex decocto* residuum sub infessu renibus ad-  
movendo. Sub egressu balnei, isti litus crebro & studiosè applicantur.

Hisc ubi dolor fuerit placatus, primæ viæ repurgatæ & acrimonia humo-  
rū temperata, blanda diuretica in specie cum aliis *internis* usurpètur. Quoad  
hæc in principio subinde blanda alvi *laxatio* convenit respiciendo tamen si-  
mul renes & modicè calculi excretionem stimulando. v. g.

℞. Tartari vitriolati gr. xij

ʒ genistæ gr. v. l. vj.

scammon. rol. gr. iij. M. F. pulv.

Sed in specie *laxativa terebinthinata* hic conducunt. In quem finem *terebin-  
thina* inspissata ad *pilulas* redigi potest, ita ut singulo ʒj. vel ʒʒ. gr. iij. vel iv. *scam-  
monii* simul permisceantur, & ita pro dosi assumantur; Vel adhibeantur *pilula de  
terebinth. Myns.* vel fiant *pilula ex terebinth. ʒ Rhabarb. à Paracelso* laudatæ, vid.  
*Höfer in Hercul. Med. p. 175.*

Vel: ℞. Terebinth. puræ ʒj.

rhabarb. pulverizat ʒj.

cinamomi ʒʒ. F. Pil. pro aliquot dos.

Convenit quoque *sem. violarum* exque hoc facta *emulsio cum* ∇ *veronic. aut  
heder. terrestri* quæ simul laxat & urinam pellit; cui propter doloris rationem &  
*papaverina* simul addi possunt

℞. Sem. viol. purp. ʒiij.

papav. alb. ʒj.

c. f. q. ∇ alkekeng. F. Emulsio. adde

lap. perlar. præpar. ʒj. M. capiat pro lubitu.

Evacuatis ut a primis viis & subla is impedimentis, dum adhuc urget *dolor  
& hæret calculus*, propinanda talia, quæ quantum possibile est, dolorem tollere  
possunt, unde & subinde ad *opiatâ* appropriatis talibus mista accedendum  
venit, vid. *Ludov. Pharm. p. 449.*

℞. Lap. ʒj. cinnab. nativ. f. ʒii ʒʒ.

land. opiat. gr. i. vel ij. M. F. pulv.

Item: *Essentia urinaria anodyna* D. *Michael. it. Matvatia. juniperin. cum essen-  
tia*



cia opii mistura. Vel præscribitur tale decoctum ad imitationem Barbette in sua Praxi.

℞. Rad. alth. ℥j.

liquirit. ℥ij.

flor. malv. Mi.

sem. viol. ℥ss. coq. in f. q.

▽ hordei. ℞. Colatur. f. ij. adde

tyr. papav. albi ℥ss.

lap. ☉. præp. ℥j M. & ita propinetur.

Item fiant *Emulsiones* ex sem. 4. frigid. maj. Amygd. d. Nucl. persic. & similibus, quæ subinde hauriuntur ad dolorem leniendum & blandè urinam ciendam. Pertinet huc decoctum Foresti egregium l. 24. observ. 26. & quod scribit Sennertus l. 3. prax. ubi de calculo renum p. 812. Decoctum flor. chamomille singulariter excellit in paroxysmo nephritico, Conf. Sim. Pauli Quadripart. Bot. p. 445. Item semen Nymphaeæ, seu egregium remedium in paroxysmo nephritico extollitur à Taken. Hippocr. Chym. edit. 2. p. 97. Laudato modò decocto, Sennertus curavit virum desperatâ suppressione urinae ex calculo renis sinistri, ureteri impactò, laborantem, cum intensissimis doloribus, summâ virium prostratione & qui jam 6. dies ne guttulam quidem urinae emiserat. Sed usurpato hoc decocto urina confertim emanavit, lapilli cum impetu protrusi & æger curatus fuit. Vid. etiam obs. 28. & 29. cit. lib.

Hujus decocti singulis haustibus Timæus monet esse addendas aliquot guttas spir. blis dulcis &c. Sanè spir. blis extremo Δne prolectus, adeoque acidofalsus, singularis est ad promovendum & refringendum calculum. Vid. Tachen. Hipp. Chym. edit. 2. p. 97. loco ejus & spir. d. dulc. commodè à quibusdam usurpatur. Species has decocti Foresti correctas vid. in Zwelf. Pharm. Reg. 89. nec forsan esset incongruum, si his de sem. hyperici, aut sem. Dauci, aut bacc. juniperi aliquid adderetur.

Hiscè ita peractis, si sedatur dolor & calculus promovetur, res bene est. Ubi verò dolor sedatus & calculus adhuc hæret, accessus fiat ad ea, quæ diuresi blandâ urinam promoverè possunt, aut propinanda ea, quæ calculum diffringere valent. *Diuretica* inter sunt tintura nephritica, spir. carminativus, liquor nephriticus, terra foliata tartari &c. In horum tamen usu observetur, ut, ubi frustra fuerint adhibita, subsistatur & quasi feriæ relinquantur naturæ, quod monitum per experientiam confirmat Epiphan. Ferdinand. hist. 54. de paroxysmo nephritico, in quo per 9. dies plura remedia propinata & applicata absque usu & effectû fuerunt, sed cum postmodum per 10. & 11. dies quietem concessisset naturæ, hæc sponte sua liberavit ægrum, in fine duodecimi plures calculos ejiciens.



do. *Diuretica* hujusmodi usurpantur in specie in *paroxysmo calculoso* sub introitu balnei ut dum hujus usu relaxantur viæ & demulcentur dolores, illorum ratione melius promoveatur calculus. Sicut etiam *blandus motus corporis* calculi descensum ex renibus promovet, qui alias a gaudio in exitu promovetur, a metu verò vel terrore retardatur. Conf. *Act. Med. Hassn. vol. 3. p. 33.*

His autem omnibus præferenda erunt *lithonriptica* calculum confringentia remedia. De his, an sint, multi dubitant, adeo ut cum *Panarolo* & *Sylvatico* aliisque Magni Nominis Medicis, sed ordinario Chymia ignaris adhuc hæreant, an lapidem concretum denuò dissolvere, vel in minores particulas diffingere valeant remedia. Et quidem quoad hanc controversiam certum est, negotium esse difficile, non tamen adeo impossibile. Difficultatis ratio est. 1. *Quia est concretum terreo humum ex volatilibus quidem principiis, firmissimo tamen nexu junctis, oriundum, adeoque nec acida, nec alcalia eum dissolvere possunt, quia ex utrisque compositum.* Necesse ergo est, ut remedium calculum frangens ita sit constitutum, ut ferè de utroque, *acido* nempe & *alcali* participet, ut ita concretum tale denuò resolvere possit. 2. *Quia remedia requiruntur talia, quæ longo isto transitu, donec ad calculum humanos excretos certis liquoribus injiciunt, expectantur, quis liquor citius & felicius calculum frangat, ut eodem liquore & intus propinato eundem effectum obtineant.* Nam pauca observantur menstrua, quæ calculum diffingere valent, *oleum vitrioli* eum non solvit, *spir. nitr.* interdum non nihil operari videtur, sed parum est; & utut talia extra corpus in calculum operentur, quia tamen assumpta in ventriculo & primis viis insigniter alterantur, necessario aliam novam acquirunt naturam seu texturam, indeque vim diffringendi calculum exuunt. Ut taceam, non ejusdem duritiei & compaginis in omnibus *nephriticis* videri calculos, quin subinde multum variant duritie, firmitate ac similibus plus minus proprietatibus. 3. *Quia remedium lithonripticum non debet esse corrosivum, sed quod citra stomachi noxam possit propinari.* Nam partes attritu calculi antea plus minus læsæ ab acrioribus remediis admodum læduntur, indeque dolores aliaque pathemata exasperantur, sicque malè ad corrosivitatem in calculum frangentibus respicitur, cum non necesse sit, ut acia corrosiva saltem hæc præsent, cum revera dentur *menstrua* plus minus *acidula*, quæ validissima concreta etiam diffringant. Nil dicam de rore majali rite parato, menstruo minus acri, quod tamen magnam vim habet resolvendi & diffringendi. Et *Dn. Boyle de origine formarum* refert, se habere tale menstruum, minus acre, tam cum *acidis*, quam cum *alcalinis* sine effervescencia miscibile, quod ipsum tamen etiam *aquas fortes* subinde virtute superet (sc. ex *basi viridis*



aris & b. x. eo conficitur) ut taceam *¶*um mitem, metalla tamen amalgamando solvere, adeo ut corrosivitas menstrui naturam non definiat.

Quid igitur est, quod consideratur in menstruo? *¶*. Consideretur proportio formalis, quæ est inter particulas menstrui solventis & particulas ac poros corporis solvendi, ut hinc utriusque corporis particulae mutuo nexu se invicem jungeri valeant. Proportio ista materialiter originem ducit ex convenientia seu identitate in radice & essentia. Hinc concreta sulphurea per menstrua sulphurea, blina per menstrua blina &  $\nabla$  ea optimè solvuntur, i. e. requiritur in mensuris particularibus certa quædam habitudo ad ipsam rem solvendam. Vid. *Becherum in Phys. subterranea* l. 1 p. 399. *Willis. de ferment.* p. 63. Hinc v. g. aqua solvit saccharum, O, & c. non seivum, terebinthinam. Aqua fortis solvit metalla, non lignum, aut ceram & c. Ut taceam gustum male corrosivitatibus indicium exhibere. Multa enim nobis insipida & dulcia videntur, quæ in se admodum acria, & plus minus corrosiva, ut arsenicum, *¶*vula, sulph.  $\frac{8}{8}$ . *¶* vivus & c. Lingua ergo ineptus iudex est menstorum. Ut taceam acria & respectu certorum corporum acerrima nobis & ventriculo nostro esse innocua, nec nisi in objectum appropriatum agere, v. g. sicut videmus in aceto, quod solvit corticem testaceam lapideam ovorum, substratam vero membranam tenuem aut mollem non attingit. Idem in nobis fieri posse, dubium nullum. Sicut cantharides acrimoniam suam circa renes & vesicam explicant, stomachum tamen quem immediate ingrediuntur, non offendunt, unde simile circa calculum frangentia fieri nil repugnat, ita ut non necesse sit, ut in specie respectu nostri gustus sint corrosiva quæ calculum infringere dicuntur. Sic videmus quod persicaria, item semen Danci sint quibusdam experimenta contra calculum destinata, ac *Dn. Boyle in Phil. exper.* aliquot refert exempla per solum semen Danci fracti renum calculi. Persicaria secretum est quorundam Anglorum contra renum calculum & pulv. millepedum in vesica calculo aliquoties exportus fuit qualia nullo modo sunt corrosiva, sed tantum acria volatilia.

Dico igitur non esse impossibile frangere calculum in corpore humano per remedia orerenus assumpta nec opus esse corrosivis, modò appropriata sint, ad coaguli calculosi texturam subtiliter penetrandam ac dissolvendam, cujus & jam aliquot observata fuerunt experimenta, adeo ut observatum fuerit, etiam *¶* sine columbini bene præparatum aliquando dissolvisse calculum & frustulatim eundem ejecisse. Sed talia revera lithontriptica sunt perquam rara ac paucissima cognita. Horum igitur in defectu usurpanda interea veniunt meliora diuretica vulgò, sed male lithontriptica dicta quibusdam, quæ partim in paroxysmo, sedato dolore possunt propinari, partim extra paroxysmum ad præservationem possunt inservire, sive in præservationis negotio operentur acidum absorbendo, ut testacea, lap. minerales & animales & c. Sive vi diuretica renes & loca urinaria abstergendo,

do, ut raphanus  
vando, ut jun  
le licet, lithon  
In genere om  
quam renes ab  
bicularem pri  
hausta renes  
radicem, qua  
relinquunt.  
promovend  
nica, fraga  
penetranti  
num suo mo  
aliquot allior  
per haurire a  
perimentum

Cap  
stent per die  
vato detur  
non conten  
xini & hinc  
revera bass

Terenda ter  
rato ad putr  
dum destill  
capiendum  
mina hyper  
Semen hype  
aninephri  
electuariu

septimanâ  
Quoad sem  
Pars



do, ut *raphanacea*, liquor *betula* &c. seu *balsamica* vi fermentum renium conservando, ut *juniperina*, *terebinthinata* &c. *Diuretica* talia à quibusdam, male licet, *lithontripica* dicta, sunt *saxifragia*, *rubia tinctorum*, *ononis*, *bardana*. In genere omnes *raphanorum* species, quæ diuresi forti tam pellunt calculum, quam renes abstergendo præservant. Inter hæc *raphanacea* juxta *raphanum orbicularem* primatum ferè obtinet *radix armoracia*, quæ vino infusa & aliquoties hausta renes abstergit & calculos præsentis fortiter pellit. Alii *armoraciam* tam *radicem*, quam *folia* concisa infundunt vino, & vase clauso per 14. dies in cella relinquunt. Hinc per alemb. destillant, quem *liquorem destillatum* ad calculum promovendum mirè commendant. Porro *hedera terrestris*, *parietaria*, *veronica*, *fragaria*, *capita allii* præsertim huc pertinent. Sanè *allii radices* sile acri penetranti tam acidum calculi coagulatore corrigere, quam fermentum renium suo modo alterare videntur. Hinc quibusdam in usu est, singulis noviluniis aliquot *alliorum dentes* 6. 7. 8. 9. &c. minutim conscindere & in *spir. bacc. juniperi* haurire ad præservationem à calculo. Medicus quidam ceu optimum *experimentum contra calculum* venditavit seq.

R. *Hedera terrestr.* Mj.

Capitum *allii* No. j. l. ij. decerptis in frustula affunde S. V. ℥xij. stent per dies aliquot bene clausa, hinc de agitato liquore & probè conservato detur cochl. i. singulis noviluniis, egregiè præservare dicitur. In *fraxino* non contemnenda vis est contra calculum, præsertim in *ol. ac. se. volatili sem. fraxini* & hinc etiam in ejusdem *cortice*. Hinc quidam multum laudant hoc *oleum* revera *balsamicum contra Lithiasin*:

R. *Cort. rad. fraxin.* ℥ij.

*baccar. juniperi* ℥ij.

*terebinth* ℥ij. ad iij.

Terenda terantur & cum *terebinthina* misceantur, ac in ℥ij. ∇. in vase obrurato ad putredinem seu potius digestionem seponantur per 3. menses, postmodum destillentur: Obtinebis *ol.* præstantissimum à gutt. 8. ad 12. in vino albo capiendum. Præter dicta flores *geniste*, *virga aurea*, *sem. milii* ∅. in specie *semina hyperici* & *dauci* Cretici & *cimini* sunt egregia contra *lithiasin* simplicia. Semen *hyperici* intra digitos contritum *terebinthinam* spirat & sapit, adeoque vi *antinephritica* cum *terebinthina* conspirare se innuit. Unde ex eodem quidam *electuarium* parant ad calculi præservationem decantatissimum:

R. *Pulv. sem. hyperici* in autumn. l. Julio collect. & exsiccat. ℥ij.

*sacch. rosat. vel violac.* ℥ij. M. probè Dos. est ℥ss. qualibet

septimanâ duabus vicibus plus minus pro circumstantiarum ratione usurpatum. Quoad semen *dauci* imprimis videndus est *Helmont Tr. de Lithiasi.* Angli pro



hujus cura *semine* hoc frequentissime seu in substantia, seu cerevisia fermentanda infundendo usurpant, & ita multa præstant in præservando calculo. De *munipero* tam toto, quam ejus *baccis*, de *ligno nephritico* &c. res nota est. In *persicaria* multa latitant contra calculum, cujus  $\nabla$ . *destillata* & aliquoties cohobando à recenti planta abstracta, quibusdam experimentum contra renum calculum est, cujus potius curant, atque etiam bene præservant, quod pluribus explicat *Boyle in Phil. experim.* *Succus citri* seu *limonum* ad exturbandum calculum non injuria à quibusdam laudatur; non secus ac *succus betule* est elegantissimus, de quo vid. *Helmont de Lithias*. it. *Charlet. Tr. de spiritu Gorgonio*. Item de cerevisia medicata cum *Betula* vid. *Act. Med. Hassn. Vol. 1. p. 49.* *Kergerus de fermentat.* p. 178. *M. A. N. C. Ann.* 4. p. 276. *Ann.* 3. p. 278. Ex *vegetabilibus* his aliisque plurimis cum *S. V. Tartarizato essentia*, extracta &c. parari possunt. Porro *tria quorundam* ex dictis vegetabilibus, in specie  $\theta$ . *genista*, *stipitum fabarum stercor. columbin.*  $\theta$ . *prunell.* & in specie  $\theta$ . *volatile succini* egregia sunt diuretica antinephritica. In spe. ie  $\theta$ . *fimi columbini* egregium est; nempe *nitrum* & omnia *nitroso spir.* imprægnata eximias in solutione calculi vires obtinent. Unde *stercus columbinum nitro* plenissimum, it. *lotium capre*, ut & aliorum animalium *stercora* & *lotia*, propter  $\theta$ . *nitrosum* in ipsis contentum ad calculosos affectus sunt perquam usitata. De vi seu efficacia *stercoris columbini* in specie vid. *Forest. l. 24. obs. 25. in schol.* Quidam recipiunt *stercus columbinum*, macerant in *acetô*. per diem & noctem, postea filtrant. *Aceti* hujus partibus duabus addunt *mellis* depurati part. 1. M. & propinant ceu probatissimum remedium. Alias saltem  $\theta$ . ex *fimo calcinato* mediocriter in usu esse solet. Ad *nitrata* hæc pertinent suo modo  $\theta$ . ad calculum *Polemanni*: *R. nitr. purissimi lbj.* fluat in igne, injiciendo desuper frustum *sulphuris* magnitudine fabæ, quo deflagrato aliud superinjice, donec hujus *sulphuris*  $\mathfrak{z}\beta$ . absorpta sit, ubi omnia refrigerint, ac denuò pulverisata fuerint, denuò eodem modo procedatur, atque hoc tertia vice repetatur, semper successive *sulphuris* ad  $\mathfrak{z}\beta$ . adjiciendo, jam

*R. Nitr. ita præp.*

$\theta$ . *absinth. aa.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

*succin. volatil.*  $\mathfrak{z}\beta$ .

*facch. alb.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ .

*ol. destillat. succin. q. s. M. de hoc dol. quantum 3. cultelli cuspides capiunt una vice, bis, ter, quater in die pro circumstantiarum varietate; omnem saburram ex partibus urinariis everrit, & calculum recentem comminuit.*

Porro commendantur quoque *lapides* ad pellendos & præservandos calculos, ut *Lapis Judaicus*, *Lyncis*, *Spongia*, *Nephriticus*, & &c. ubi eò nomine saltem videntur convenire, quod acidum peccans absorbeant, acrimoniam feri

urinarij



urinarij in paroxysmo temperent, ac ob acidum absorptum & hinc mutatione in falsum tertium vim diureticam acquirunt. Hinc quibusdam in usu est *liquor nephriticus* dictus: *℞. Lap. S. judaic. lyncis, spongia, aquila, glaci, ana, q. s. l. v.* solvantur in *spiritu bis decrepitati rite destillato* (i. e. ultimo  $\Delta$  is gradu elicto) solutio filtrata coaguletur leni calore in vitro ad siccitatem. Materia hæc iterum pulverisanda, hinc in cella per deliquium dissolvenda, filtranda & ita pro usu servanda: *Liquor salus elegans diureticus* ad 20. l. 30. gutt. propinatur. *S. fluviantiles* egregie sunt antinephritici, unde *decoctum S. fluviat.* oculis prægnantium ad præservandum & curandum calculum laudatur. Vel: *℞. S. fluviat.* coquantur in vino in ollâ tectâ ad siccitatem usq; donec pulverisari queant: Hujus  $\mathfrak{zj}$ . mirè ad curam calculi ceu nobile experimentum quibusdam laudatur. Dictis modo concretis vicinæ sunt *testæ ovorum*, ex quibus exclusi sunt pulli. Optimæ sunt *testæ ovorum struthionum*, ex quibus cum *spiritu bis* modò insinuata ratione *liquor nephriticus* hî peregrinisaporis, sed præstans parari potest. Imprimis *testæ ovorum calcinata* à multis commendari solent, præsertim à *Bartholino in Hist. Anatom. & Cent. 4. Epist. p. 451. & 526.* ubi refert *aquam nephriticam* decoctionis talis calcis testarum ovorum mirè prodesse, & in specie  $\nabla$  *m calcis ostreorum* ad calculum in mucilaginem dissolvendum, multum prodesse refert. Hinc etiam ex Calc. Viv. comuni c. additis *tinctura & liquores nephritici* parantur; quo pertinet *Antinephritum Helvetii. ℞. Calc. Viv. q. v. affunde ac.* dest. optim. ad eminentiam 3. l. 4. digit. coque, frigefac, decanta, in spissâ & ad siccitatem evapora, candefac in crucibulô, hoc extrahe, vel S. V. vel vino Hispanico. Dos. gutt. 10. 15. ad 20 in calculo. *Externe contra Podagram*  $\mathfrak{zj}$ . infunditur in vinum & urinam propriam & eo lavet partem affectam. Denique *Lumbrici, Aselli* speciatim *Scarabei masales* præ cæteris conveniunt; imprimis *alæ* horum superiores ac duræ pulverisatæ & propinatæ in vino egregium dant antinephriticum; quod pariter valet de *scorpionibus*, si nempe pulv. factus ex 4. l. 5. *scorpionibus lavatis*, sicque vivis per 24. horas in vino *malvatico* relictis, postmodum in olla supra *folia salvia* positus in furno blandè crematis & pulverisatis. Dos gr. iij. a. jv. in ovo sorbili vel vino propinatur.

Haftenus de calculo renum occasione suppressionis urinae. Contrarium huic vitium est *immodica & nimia urinae excretio*, dum nempe plus effluit ex corpore, quam aut assumpta potulenta materia, aut serum in M. S. proportionaliter suggerere possunt. Sic *Schenck lib. 3. observ. ubi de Diabete.* refert exemplum cujusdam, qui quotidie supra 4. cantharos minxit, utut vix quadrantem ejus biberit. Idem notat exemplum puella plus paucis diebus mingentis, quam ut tota ponderaret. It. *Acta Societ. Reg. Vol. 1. p. 868.* referunt virum, qui per aliquot septimanas quotidie ad  $\mathfrak{xxij}$ . urinae emisit. Ac sanè, si quod aliud



aliud exemplum notatu dignum, talis urinæ profluvii suggerit Digby Tract. de pulv. sympath. Malum hoc dicitur aliàs

## DIABETES,

quo nomine tamen *duo vitia* vulgò insigniuntur, idque promiscuè, nec absque confusione. Nempe *primò* modo dicta *copiosa nimis urina excretio*, quam intensissima *sitis*, *debilitas virium*, *macies* totius corporis, *febris continua* lenta, *ardor* in regione lumbari & *macies* totius corporis ac alia paria *symptomata* instar *hectica* confirmatæ, aut instar *tabis dorsalis*, sæpius etiam mors subsequitur. Equidem non rarum est, copiosiores urinæ excretiones naturæ opus esse, quæ *motu critico* aut huic simili seipsam à morbis liberat, unde cum ægri euphoria contingit, nec adeo diu durare solet. Si vero excretio talis urina sit *Diabetes*, paulatim & insensibiliter crescere solet, ita ut æger in principio haud adeò cures, sed successivè uberior quantitas prodit, & quia tenuis,  $\nabla$ osa, unò nomine sic dicta cruda, quam & oris siccitas & *sitis*, virium defectus & viscerum internorum ardoris quidam sensus &c. comitantur. Quod si urinam aliquando contineant ægri, lumbi, coxæ & testes cum gravitate intumescunt. Alio autem sensu & *Diabetes* dicitur *nimis cita potulentorum*, aliorumq; liquidorum assumptorum aut plane non, aut parum mutatorum per vias urinarias excretio, ita ut non raro color, odor & sapor assumptorum liquidorum in excretis per urinam adhuc sint sensibiles. Sic Bartholinus Cent. I. hist. 68. talem diabetem calculosi recenset, vinum assumptum eodem colore reddentis. Uti etiam Hoferus in Herc. Medic. p. 171. vinum rubrum immutatum per vesicam excretum refert, adeò ut Medici quidam pro urina sanguinolenta habuerint. Horstius quoque in obs. p. 379. observat vinum & emulsionem sem. violarum eodem modo, ut assumpta fuerunt, denuò excreta. Imò observata etiam fuerunt *grana anisi*, *semina coriandri* integra, *semen ficuum* comestatum, it. *radicula apii* incisæ unà cum urina reddita. Hi duo affectus distinctissimi uno nomine *Diabetes* dicuntur, quæ tamen vox propriè posteriori affectui, nempe immutatæ potulentorum excretioni convenit. Dicitur enim *Diabetes* à *Μεβαίω*, quod est *citò transire*, ita ut *Diabetes* propriè sit affectus, in quo potulenta citò per corpus transierint & propterea melioris doctrinæ ergò *distinguenda Diabetes in veram & notham* seu spuriam. *Vera* est immutata per urinam excretio: *Notha* seu spuria copiosa & colliquativa urinæ excretio.

Quod igitur attinet *Diabetem veram*, oritur hæc ex nimia laxitate & aperturâ viarum, per quas urina potius ex primis viis ad renes vel loca urinaria amandatur, concurrente simul pyloro laxo, elabi sinente potulenta ceu fluidiora,



ra, antequam perfecte sint alterata. Via equidem tales adhaerendum sunt incognita; fieri enim nequit, ut *semina coriandri & anisi* excreta c. sanguine rapi & hinc inde per vasa capillaria circulari queant. Item quia *vinum rubrum*, aut *emulsio amygdalarum dulc.* sanguini permisceri, sine insigniori alteratione nequeunt, adeoque, qua datur, proxima via ex primis ad loca urinaria transeunt. *Confirmatur* hoc ex eo, quod inter *causas remotas* ad hanc *Diabetem* disponant imprimis *acidula*. Jam vero ut rectè asserit *Helmont*, *acidula* vix ascendunt supra Diaphragma, cum eadem vix haustæ, imprimis continuato usu subito per urinam transeant limpida & clarae. A tali igitur crebriore *acidularum* saepius haustarum transitu laxata istæ viæ etiam potulentis liberiores faciunt transitum. Sic *Hildanus Cent. 5. obs. 53.* ex usu *acidularum* observat *Diabetem*, in qua *lac amygdalarum* immutatum transivit. Et *Pigreus in sua Chirurgia* refert, se vidisse *grana coriandri* durante *acidularum* usu post pastum, roborando stomacho assumpta immutata cum urina reddita. Unde etiam *Perrus Pau in observ. p. 5.* in *Diabete* mortuo renes admodum flaccidos à frequenti liquidorum transitu invenit. Verùm, ut existimo, non *flacciditate resolutionis* seu *Paralyticæ*; aliàs enim potius supprimeretur urina, sed *flacciditate nimiae apertionis*, qua renes instar spongiæ porosi & flaccidi fibræque admodum permeabiles reddita fuerint. Rarum est, quod *Salmuth Cent. 2. obs. 53.* observavit talem *Diabetem* potus immutati in febre maligna.

Quod attinet *Diabetem notham* seu *spuriam* & copiosissimum istud urinæ profluvium, causa hujus investigatu perquam difficilis est. Et quidem *duo consideranda* veniunt. 1. Unde tanta materia urinaria quantitas?

2. Quare in specie eadem per vias urinarias amandetur?

Quoad prius aliquid lucis afferunt exempla eorum, qui insigniter, licet corpulenti ac obesi, per usum tamen remedium diureticorum admodum emaciati fuerunt, mediante copioso hinc concitato urinæ profluvio. *Conf. Helm. Tr. Ins. dñm vir. §. 59.* it. *Asthma & Tussis §. 44.* it. *Schenck, observ. l. 3. ubi de Diabete*, qui etiam refert, obesos crebrâ mictione subito extenuatos; sicut alias nimia corpulentia per *salvationem §. ialem* curata fuit. *Vid. Act. Med. Hassn. Vol. 1. p. 144.* Sicut à *Borello Cent. 2. obs. 12.* refertur, continuâ masticatione *foliorum Tabaci* crassitiem & pinguedinem corporis insigniter fuisse immutatam. In omnibus his per *colliquationis* modum tam contentorum corporis, quam ipsius pinguedinis hæc ipsa in texturam *serosam* resoluta, istis modis fuerunt excreta. Sicut *purgantia acriora* simili *colliquativa* vi humores alterare, & flaccidam feri texturam mutare solent. His positis arbitror M. S. & primario partem ejus chylousam, it. ipsum rorem & succum corporis nutritivum, & denique ipsam



ipsam adeo pinguedinem resolvi & colliquefieri, atque ita in formam atq; consistentiam laticis serosi fatiscere, subque tali formâ per loca urinaria excerni. Hinc enim *urina diabeticorum* horum excreat mira *dulcedo* ex pinguedinis aut roris chylosi liquefacti c. sibus urinariis misti mutua temperatura & in dulcedinem vergente texturâ. *Conf. Willis Pharm. rat. P. 1. p. 164. § 172.*

*Hujus colliquefientia causa*, & inde genitæ copiosæ urinæ est *acrimonia* insignis *volatilis*, *acido salsa*, similis acri isti volatili sali, qui in *cantharidibus*, *asellis*, *scarabæis minoribus* ac his cognatis insectulis deprehenditur, eaque ex primis viis derivata, mediante chylo sanguini & hinc universo corpori communicata, quod *acre volatile fermentum* attenuat, resolvit & colliquat sanguinem & nutrimentum corporis chylosum, & ex hoc productam pinguedinem. Id quod patet ex eo, quod in *Diabete incipiente* urina acris & ob ejus rosionem cum ardoris sensu excernatur. Item, quod hæc *notha Diabetes* curetur inter alia ferè per similia, atque *febris hectica*, talia sc. quæ acrimoniam contentorum contractam temperare valent, qualia sunt *lacticsmia*; & denique quod hæc *Diabetes species notha* inter alias *causas remotas* ex abusu *diureticorum* contenta corporis attenuantium ac renes stimulantium excitari soleat. Id quod constat ex observatione *Tulpii lib. 3. obs. c. 46. it. ex Amato Lusitano Cent. 2. obs. 94.* Ubi nata fuit *Diabetes* ex usu *vini meracioris* & *muria fœniculi marini*. *Schenckius* pariter ex diureticorum abusu *diabetem* natam memorat. Sic à nimio *succi betula* usu *diabetes* lethalis in *M.A.N.C. Ann. 2. p. 300.* It. à potu *spermatis ranarum* insignis *diabetes*. *Loffius in obs. p. 314.* Nempe omnia *diuretica* hæc in *acre bsum volatile* in primis viis abeundo, hinc acriorem reddunt *M. S.* ceteraq; contenta, hincque liquefactum humorem nutritium, stimulando simul renes sub forma feri urinarii excerni faciunt. Hinc est, quod *acida volatilia* potulenta ob vim diureticam, quam in primis viis acquirunt, etiam *diabetem* excitant. Sic ex *Cydoniorum* usu *diabetem* notat *Schenck. in observ.* Item ex *pomaceis*, it. ex abusu *vini Rhenani*, unde incurabilem *diabetem* notat *Willis Pharm. rat. 1. P. 5. p. 171.* Acre autem hoc colliquans fermentum ex primis viis fermento nempe venticuli digestivo, quavis ratione vitiatô aut alterato, oriri suspicor, adeoque prout venticuli prima digestio basis est reliquorum omnium, ita & hujus ratione vel macri vel pingues reddimur, ita & consequenter ex alterato eodem pingues emaciari denuo possunt, prout scil. *fermentum* ejus spirituosum *plus minus acre* vel temperatum fuerit, indeque similis notæ chylum corpori undique distribuat. Et sicut crebrius ex primæ digestionis errato indeque acri *colliquativo fermento* enato fluxus alvi *colliquativus* oritur, cum insigni ex corporis macie virium debilitate: Ita pariter simili ex origine aliud *acre volatile fermentum* contentorum corporis colliquefactivum & in serosam consistentiam resolutivum renasci potest.

Quoad



*Quoad posterius, quare* colliquati ita succi ac pinguedo in specie per renes urinæ sub forma expurgetur, non est solum textura resoluti & fere-  
scentis fluidi facile per poros renum appropriata renum textura transeuntis,  
quando ipsi renes simul affecti, & ab acri isto volatili acido falso fermento sensibi-  
liter vellicari & irritari videntur, cujus occasione non solum dolor, ardor, &c.  
circa renes in lumborum regione percipitur, sed etiam spirituum impetus, eò  
magis hinc concitatur, adeoque & M. S. eò uberius quasi movetur, non secus  
ac ex stimulo purgantium ad intestina, ex stimulo & ialium ad glandulas gingi-  
varum uberius moventur & excernuntur contenta corporis.

*Quoad prognosin* Diabetes vera parum habet periculi, siquidem in-  
terdum sponte cessat. Diabetes vero nostra est periculosa sæpiusque lethalis in-  
primis nisi mox in principio cognita curetur. Deducit enim homines ad Ta-  
bem lethalem. Eadem quoque post immodicum laborem, post nimium & is  
exercitium, post chronicas denique febres plerumque incurabilis est.

*Quoad curam, Diabetes vera* per adstringentia convenienter curan-  
da. Ubi tamen cydonia fugienda, utut sint adstringentia, quia sunt diuretica,  
ut quod non tantum observat Bartholinus c. l. sed etiam Schenckius loc. supra  
cit. Ergo & ialia, item quæ ex plantagine & tormentilla parantur; item decoctum  
prunor. sylvestrium, &c. conveniunt. Item Tinctura sulphur. vitrioli, bolus ar-  
men. terra sigill. cum conserva rosar. vitriolata usurpanda. Item decoctum plan-  
taginis in ∇. cha'ybeata.

In Diabete notha vero 1. alterandum est & corrigendum fermentum istud  
colliquefactivum & diureticum acre, tam per remedia ex fonte pharmaceutico,  
quàm dietetico. 2. Narcoticorum interpolato usu & renum irritatio & nimia  
secretio. forsan & nimia colliquefactio impedienda. Ea quæ priori scopo conve-  
niunt, pharmaceutica quidem sunt ferè absorbentia acido-austera, quasi figentia,  
& plus minus adstringentia; quæ vero ex fonte dietetico sunt alimenta succulen-  
ta, imprimis lacticia.

Observandum I. quoad Pharmacia in principio curationis  
vomitum laudari. Nempe apertè Brendelius Cent. 83. ex Platero dicit,  
principium curationis sit vomitus, jubendo, ut dum maxima torquetur siti, co-  
piosam deglutiat frigidam, hancque repente revomat, quod fiat singulis quatuor  
diebus. Certum hoc est auxilium pro revulsione. Item Zacutus dicit, pro-  
dest vomitus, iis præsertim, quibus salsa piritua in ventriculo abundat. Conf.  
enim Ferdinand. Conf. 37. item Horat. Augustinus l. 12. Epist. 3.

II. Quoad remedia dietetica in pluribus convenit huius affectus

cura-



curatio cum *hæticâ* febre, quia in sex rebus non naturalibus is ordo servandus, ut corpus refrigeretur & humectetur, firmentur renes & eorum exuberans caliditas attemperetur, ut loquitur *Zacut. Lusit. l. 8. Medic Prim. Hist. c. 17.*

Remedia igitur *Pharmaceutica* contra *Diabetem* notham usitata sunt, quæ præparantur ex *plantagine*, *portulaca*, *nymphaea*, *papav.* &c. seu eorundem *succi*, seu *syrupi*, aut *decocta* usurpentur. Hinc *Corallia* & varia ex his præparata, *Magist. Corallorum* cum *succo cini*, vel mixtura ex *Corallis* cum *†to polychresta Sylvio* usitata, de qua vid. *l. 1. prax. p. 573. & M. A. N. C. Anno 3. pag. 345. v. 8.*

℞. ∇. *Plantag.* ℥iij.  
ac. dest. vini opt. ℥vj  
corall. rubr. præp. ℥j.  
laud. op. gr. ij.  
syrupi portulac. ℥j. M. capiatur cochleatim.

His *lapis hematites* tam *naturalis* & ejus præparata varia, quam *artificialis* ex *vitriolo oris* & *Hisaccharo* parandus, primitus à *Glanbero* edoctus, tandem sub nomine *lapidis Chymici* contra *Diabetem* descriptus in *M. A. N. C. Ann. 2. pag. 227.* hinc *Tinctura antiphthisica*, *tinctura* sic dicta *sulphuris vitrioli* &c. item *succinum* & *succinata*, *Trochisci de Carabe*, *Troch.* de terra sigill. in specie ∇. calc. viva tam simplex, quam composita, subinde hausta nobile & singulare experimentum est contra hunc affectum. Conf. *Willis pharm. Rat. p. 1. p. 174. & 177.* Alia ut *CC. ustum*, *crocus oris adstring.* &c. vel sponte ex dictis manifesta evadunt.

Quoad auxilia *Dietetica*, eminent, ut supra monitum, lac præsertim *chalybeatum*. Beneficio enim *lactis chalybeati asinini* cum *Philonio Persicò* *Diabetem* desperatam curavit *Zacut. Lusit. l. 2. prax. admir. obs. 71.* Hinc etiam *Emulsionem* facta ex *amygd. dulc. sem. 4. frig. cum semin. papav. alb. &c.* eaque crebrius & copiosius hausta subinde usurpanda sunt. Hinc etiam cibi cum lacte vel aqua *chalybeata* præparandi, item ∇. *chalybeat.* cui *CC. rasura* in decocta fuerit, usurpanda. Externe *sacculi* & *fomenta* ex *plantagine*, *foliis quercus* in ∇. *chalybeata* cocti, subinde regioni renum applicentur, item *fluv. aut recentes contusi*, eorumque *succus recens expressus* dicto loco admoveantur.

Quoad depravatam *urinæ* in renibus *secretionem*, hujus ejusdem depravationis sunt varii modi, dum scilicet diversimodè adfecta *urina* in colore, *consistentia* & *contentis* excernitur; in specie

MI-



## MICTUS CRUENTUS

considerandus venit, quando nempe urina cruenta excernitur, ex sanguine nunc copiosius, nunc parcius ipsi commisto, unde interdum loturæ carniū similis apparet urina, interdum intensius rubet, vel potius ex opaco plus minus nigrescit, ita ut etiam linteum immersum suo rubore inficiat. Probè autem *Distinguenda* rubedo urinæ sanguinea, à rubedine bina, quando nempe contenta copiosiora salina oleosa cum liquore continente exactè unita, idque fere vi acidi, rubrum præsentant colorem. *Hæc rubedo, quæ est ex bibus*, perspicua est & clara, aut quæ præcipitata sedimentum vel intensè croceum, vel instar cinnabaris, vel incarnati nonnihil coloris suggerit. *Quæ vero est à sanguine rubedo*, est opaca, plus minus crassiuscula pro copia commisti sanguinis. Unde etiam *bibus orta* splendet quasi, sed quæ est à sanguine absque splendore observatur. Illa scorbuticis subinde accidere solet; hæc etiam in aliis ægris deprehenditur. Et *urina cruenta* si ex sanguine constat, si aliquandiu steterit, uno alterove die crassamentum seponere solet, ex intensè rubro quasi nigrescens & sanguinem grumosum exactè referens. *Sanguis iste, qui tingit urinam*, ut plurimum ex renibus emanat, & interdum in renibus ipsi permiscetur, interdum in ureteribus, interdum in vesica, interdum ex laxis arteriis in pene. Exemplum vid. in Graeff. de organ. generat. viror. p. 151. Rarius ex aliis partibus ad hæc loca urinaria deferitur, ut cum urina excernatur. v.g. post casum ab alto, dum sanguis extravasatus subinde cum urinâ excernitur.

*Mictus* huiusmodi *cruentus* non secus atque aliæ hæmorrhagiæ *oritur* interdum ex anastomosi arteriolarum ad vias urinarias distributarum; interdum idque frequentius & crebrius ab earum dieresi seu diabrosi. *Anastomosis* fit nunc vitio contentorum in specie sanguinis, nunc vitio ipsorum vasculorum renalium. *Dieresis* saltem vitio contentorum acrium, aut erodentium, aut alio modo lædentium vascula dictorum locorum, quò v.g. calculus pertinet, attritu suo asperiori vasa lædens & mictum cruentum inducens; hæc quoque causas internas. Quoad causas externas, quilibet violentus motus ruptioni circa loca urinaria occasionem suggerens, mictum cruentum infert. Talia sunt equitatio nimia, saltus nimius, casus ab alto in dorsum aut lumbos confusio vehemens circa loca inferiora facta.

In specie quoad anastomosis mictus cruentus nunc est spontaneus, nunc non spontaneus seu symptomaticus. Ille nunc criticus nunc periodicus, nunc



*vaquæ* &c. Præcedere autem solet dolor gravaturus & tensus, uti & comitari solet huiusmodi cruentam mictionem perceptibilis in isto loco, in quo sanguis summo impetu anastomosin infert. Sic Zacut. *Lusit. lib. 2. prax. adm. obs. 69.* *mictum cruentum uriticum* in febre ardente observavit: Sicuti etiam pleuritides per sanguinis mictionem solutæ observatæ fuerunt à Schenckio l. 2. *obs. ii. ab Hild. Cent. 2. obs. 31.* Præterea solennes sanguinis evacuationes suppressæ insequitur mictus cruentus. Hinc etiam Forest. l. 24. *obs. 7.* inquit, urinam cruentam ex alto delapsis statim emitti vidimus, idque sæpius etiam ex nimia *Qe* in adolescente nobili, in mulieribus etiam *mensibus suppressis*, & in viris *hemorrhoidibus* fluere consuetis & retentis. Truncatâ etiam manu vel pede aut pleno corpore, ex abscessibus ulcereque cruentam urinam emictam fuisse scimus, id quod ulteriori observatione confirmat de mictu sanguinis ex suppressis hemorrhoidibus per intervalla oriundo idem Hildanus *Cent. 1. obs. 11.* Quin & periodica quibusdam urinae cruentæ mictio observatur. Videatur præter Schenckium in *obs. Salmuth. Cent. 3. hist. 47.* Pertinet huc *viri abusus* ad mictum cruentum disponens, de quò vid. Zacut. *Lus. Med. Princ. hist. 139.* Item *Diuretica* fortiora aut aciora, v. g. post *spiritus terebinth.* nimiam dosin mictionem cruentam refert. *Hil. Cent. 5. obs. 52.* Pertinet huc etiam, quam vocant, *imbecillitas renum*, quorum poruli nimis aperti sanguinem unâ transmittunt cum lotio, adeoque à tubulis renum nimis apertis mictionem cruentam interdum accidere, rectè asserit Willis *Pharm. rat. p. 1. p. 166.* e<sup>a</sup> que huiusmodi mictus ferè indolens, minusque intensè tinctura urinae, minusque crassa. Tandem abusus *Q.* Anastomosin vasorum, & sic etiam urinam cruentam inferunt emitti, dum in abusu *Qe* o vasasanguifera circa partes genitales nimis turgida hifcunt, & ita sanguinem effundunt. Exemplum suggerit Forestus l. 24. *obs. 10.* Mictum sanguinis ex nimia *Qe*, spongia aceto calido infusa & lumbis circumposita, curatum.

Quoad *diuresin*, hæc frequentior causa mictus cruenti esse solet, dum nempe à serò acri vascula eroduntur. Quo etiam pertinent *exulcerationes renum & vesicæ* erosiones, quas non tantum cruentæ urinae, sed & sensus doloris plus minus rodentis, aut etiam alius in parte affecta molestus, comitantur; talis ex causa mictus nati cruenti scorbuticis, catarrhosis, & sero acido biliosi aut alijs plus minus corrosivo præditis, accidere solent. Vasculorum in locis urinariis lacerationes ab asperitate calculi, crebram urinam cruentam reddi faciunt. Faciunt hunc quoque *cantharides*, de quibus notum est, quod præpostere assumati, aut etiam extrinsecus invasicatoriis applicati mictum cruentum, admodum dolorosum inferre soleant, in quò simul penis erectio, & simul insignis



in signis ad quæ excitatio adesse solet. Vid. *Forest. l. 24. obs. 7.* Pertinet huc curiosa ista observatio & historia quam habet *Horstius l. 4. obs. 42.* mictionis purulentæ & sanguineæ ex ulcere colli vesicæ propter carunculam, ibidem loci ex acidularum usu suppuratam. Præter *cantharides* etiam ex *abuso* alii mictus cruentus observatus fuit à *Schenck. in obs.* Sicut ex aloes nimio usu urina cruenta enata refertur in *Act. Med. Hassn. Vol. 2. p. 167.* Pertinet huc mictus cruentus, qui in *Variolis* subinde accidit, & ex erosione originem habet, funestus admodum & ferè ad mortem deducens ægros. Forfan & isti mictus cruenti, qui in aliis *febribus malignis* observantur, huc pertinent, ut quando hæmorrhagia penis nimia in febris maligna dat hæmorrhagiam narium lethalem. Vid. *Hochstetteri Decad. 1. casum 3.* Quando & in *pestilentia* observata fuit urina sanguivolenta, quæ inter pessima tunc refertur signa.

Quoad *prognosin*, in genere quidem mictus cruentus copiosior aut sæpius recurrens, periculosum malum est, variaque symptomata inferens, quæ hæmorrhagias insequuntur. Nam v. g. ex mictu sanguinis diuturno *hydropem* observavit *Schenck. l. 3. obs.* Si ex *pueris* sanguis effluat, minori cum periculo junctum; periculosior est quando ex *vesicâ* emanat, cum metendum sit, ne in vesicâ subsistens periculosam urinæ suppressionem aut sui corruptela varia symptomata inferat. *Omniùm maximè periculosus est, si ex renibus præsertim erosio,* aut eorum ut vocant, *imbecillitate,* malum ortum fuerit.

In *cura* primariò multiplex causarum remotarum varietas attendenda, & hinc cura nonnihil varianda. In genere quæcunque ad hæmorrhagias *supra laudata remedia* & hic quoque conveniunt. In specie cum frequentissima causa interna soleat esse acrimonia feri erodentis & plus minus exulcerantis, hanc acrimoniam temperantia, adeoque maximam partem ad hæmoptysin commendata remedia locum habent, & hinc vulneraria consolidantia conferunt. Imò cum serum urinarium plus minus acre omnem mictum cruentum undecunque ortum exasperare soleat, semper una attemperandi scopus probè attendendus venit, unde *papaverina ac opiata*, item quæ *supra* circa exulcerationem renum & vesicæ fuerunt monita, locum invenient.

II. *Vena-sectio* interdum locum habet, nempe pro scopo vel *revulsorio*, vel *derivatorio*, quando nempe occasione solennis cujusdam sanguinis excretionis suppressæ mictus cruentus ortus fuerit, qua ratione per phlebotomiam mictum cruentum ex meri nimia portione in plethoricis curavit *Zacut. Lusit. cit. loc.*

III. *Purgantia*, quæ talia, non conveniunt, cum facilè acrimonia



monia sua exasperare malum queant. Saltim *rhabarbarum* est, quod convenit, & magis pro scopo *alterativo*, quam *laxativo*, adeoque in ferossiore corporis habitu, aut in acriori sanguinis crasi; item in *renum imbecillitate rhabarbarum* est optimum. Hinc *pilule ex rhabarb. cum succo plantaginis*; item *pulvis rhabarbari parum torrefacti*, & in specie *pilule ex terebinib. cum rhabarb.* aliquamdiu continuata nobile sunt experimentum *Hæferi in Hercul. Medic. p. 172.*

His ita præmissis *remedia* vel spontè patent, v. g. *mixtura ista polychresta Sylvii* etiam hic locum habet

℞. ∇ plantag. ℥ij.  
cinam. ℥vj.  
acet. still. ℥β.  
corall. rub. præp. ℥β.  
sang. Drac. ʒβ.  
Laud. opiat. gr. ij.  
styr. myrtin. ℥β. M.

Hæc mistura cochleatim sæpius assumpta curabit plerasque valorum rupturas, & supra multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollet, secundum experientiam *Græffu Tr. de org. genit. viror. p. 154.* Cum verò semper ad *acrimoniam* feri urinarii plus minus respectus habendus sit, præ cæteris conveni hic *portulaca*, quovis modo usurpata; it. *Plantago* & speciatim ejus *succus* ℥ij. vel iv. haustus; hinc *equisetum* ejusque *decoctum*, item *millefolium flore albo*, ejusque *decoctum* egregiè consolidat. Hisce in specie addatur *agrimonia seu eupatorium vulgare*, quod mirè convenit in quovis mictu cruento, in specie, si ex erosione ortus fuerit. Unde *Lindanius agrimoniam, quinquefolium & potentillam* miscet, seu selecta simplicia contra mictum cruentum. Hisce imprimis sociandum *hypericum* tam *planta*, quam ejus *semen* & cum hoc paratum *Electuarium Timæi* contra exulcerationem renum in *Casib. p. 124.* Unde est, quod laudant has species.

℞. Herb. agrimon.  
millefolii.  
summit. hyperici.  
Musci prunorum sylv. an. Mj.  
rad. symph. maj. ℥ij.  
sem. hyperic. ℥β. incisa & contusa D.  
S. Anhaltende species.

ex quibus potest fieri *decoctum* vel in *vino* ( cui tempore usus addatur parum de *lap. ʒ.*) vel in *lacte*, vel in *sero lactis chalyb.* & ita usurpatum à quibusdam laudatur, uti & *bellis minor*, ac tota ejusdem planta. *Decoctum ad mictum cruentum Myrsichti*, in specie *lac ovill. ℥iv. c. boli armeni ℥j.* propinatum omni mane, experimen-



rimentum est, aliquoties probatum à *Foresto*. l. 24. obs. 10. & *Timao* l. 3. cas. 4. sive sit ab acrimonia nimia feri erodentis, sive sit à simili causa: Ad hæc *succinum* & omnia *succinata*: In specie *troch. de carab.* sunt egregium experimentum; Conf. *Timæus* in *Epist.* p. 248. ubi *trochisci de carabe* cum *bolo Armen.* in  $\nabla$  *plantag.* ceu sapius probatum remedium laudantur.

*Curavi aliquando virum* mictu cruento laborantem ex acrimonia feri scorbutica natum, propinando *troch. de carab. c. lap. Sd.* & paucos *sacch.* Hj. Sed utur hæc juvarent, constantiam tamen sanitatis conciliavit *liquor Ss. Oar.* Dos. gut. 10. ad 15. omni mane ad aliquot dies continuatus. Hinc & *unctura antiphthisica* hic adhiberi potest, it. *lapis hamatites*, aut ejus loco *terra sigill.* præsertim si malum sit à *cantharidibus*, *lapis hamatites* cum copioso lacte, quod acrimoniam insigniter temperat, propinatus est egregius.

*Opiata* per se nota sunt, in specie *electuar. Helidai Paduani*, pro sanguinis sputo supra laudatum & hic locum habet. Quod si mictus cruentus ex affectu vesicæ, præter dicta *injectiones* similes conveniunt, quales supra in renum exulceratione laudavimus: In specie si  $\nabla$  *plantag.* ʒij. cum *troch. de carab.* ʒj. injiciantur. Fortior est *injectione* ex *emulsione papaveris albi* cum *lap. hamatites* præp. vel *succus plantaginis* cum *pulv. lap. hamatites* &c. Si à calculo & arenulis sit sanguinis mictus, quomodo curandus vid. *Riverius* in *Praxi*. Quod si sedato mictu cruento sanguis congruatus in vesica hæreat, sive suppressionem urinæ inferat, necesse est, ut dissolvatur per remedia appropriata, quæ tamen non nimis citò danda, ne aperiantur denuò vasa. Præstat hoc in primis *succinum*, quod sanguinem coagulatum dissolvit & cruentum cohibet. Cætera vid. supra, ubi de *Hæmorrhagia*.

## CAPUT IV

## DE

## URINÆ EXCRETIONE LÆSA.

**U**rina ex renibus per ureteres in vesicam destillans, tamdiu ibi continetur, donec vel nimia copia distendens, vel acrimoniam suam eadem irritans sui excretionem urgeat, unde aperto sphinctere in collo vesicæ, hæc sui constrictione urinam pellit, idque secundum liberum voluntatis arbitrium.

Vitiatur hæc urine excretio 1. Quando eadem aut aboletur, ita ut omnino supprimatur, id quod in *ischuria* ista specie fit, quæ vitio vesicæ evenit: Vel quando eadem imminuitur, id quod fit, cum parum vel tantum guttatim, idque non absq; ægri nisu & conatu excernitur urina, ut fit in *urina stillicidio*, 2. Quan-



do eadem *augetur* in ejusdem *incontinentia*, quando aut dormientibus aut vigilantibus *urina involuntariè effluit*. 3. *Depravatur* *urinæ excretio*, quando hæc ipsa cum dolore & labore ut in *stranguria* & *dysuria* excernitur. Quoad *suppressam urinæ excretionem*, siue

## ISCHURIAM VESICALEM,

hanc supra nunc ex *vitio renum*, nunc ex *vitio vesicæ* oriri assertum fuit. Quod si *vitio renum* aut *ureterum ischuria* accadat, adeoque nulla *urina* in *vesica* sit, nulla *gravitas*, nulla *tensio*, nullus *dolor* circa *pubem* percipitur, ad suntque potius *renum* & *ureterum afflictorum pathemata*. Contra si *vitium in vesica* hæreat, atque eâ *urinâ* repleta sit, quam excernere non possit, tumor & protuberantia circa *vesicam* contingit, æger quoque, quamdiu *vesicæ sensus* saluus est, de *tensione* & *dolore* molestissimo & insigni *urinam* emittendi *nixu*, frustraneo tamen conqueritur, ac Medicus, si *regionem vesicæ* contrectet, tumidam eam, sed non absque ægri insigni dolore percipit.

*Ischuria* hæc *vesicalis* fit vel *vitio vesicæ*, *urinam* non emittentis, vel *vitio canalis urinarii*, *urinam* non transmittentis. *Vesica* *urinam* non emittit, vel quia ipsa se non stringit, pro illius *excretionem*, vel quia *sphincter* ejus pertinacius se claudit. Non stringit se *vesica* vel *vitio paralytico*, dum non sentit *irritationem*, vel *vitio relaxati fibrarum toni* propter *nimiam distensionem*. In specie *sensus vesicæ* torpet affectis *nervis à paralyti*, aut *stupore* &c. iis *nervis* scilicet quibus *vesica* suum *sensum* habet. Ac etiam si *vesica* plena ac *urinæ copia* distenta sit, nullus tamen *sensus doloris* aut *stimuli* percipitur. Sic Amatus Lusitanus Cent. 4. obs. 10. observat *urinæ suppressionem* propter *vesicæ paralyticam resolutionem*, ex diuturnâ *morâ* in *aqua frigida*. Sic pariter Zacut. Lusit. l. 2. Med. Princip. Hist. p. 146. ex torpido *vesicæ sensu* *urinæ suppressionem* notat. Quo etiam pertinent *vertebrarum luxationes*, aut *ictus*, aut *lapsus*, aut *spinalis medullæ vulnera* isto in loco circa *os sacrum*, unde *nervi* ad *vesicam* distributi *maximam partem* prodeunt. Facit huc quod aliquando observavi in viro, qui non, aut saltem difficulter *urinam* poterat *emittere*, priusquam manu *regionem ossis sacri* probe fricaret, tunc *urinæ* sequebatur *fluxus*. Forlan usus *flagrorum in re Venerea* negotium hocce illustrat.

Quoad *relaxatum fibrarum vesicæ tonum*, non contrahitur *vesica* ex dicta causa ex *inopia* sui *distensione*, propter *urinam copiosorem* diutius retentam, unde fit, ut *nimis distentæ fibræ* se amplius *constringere* nequeant, & quamvis *rota* repleatur *vesica*, nil tamen *excernere* valet. Exempla refert Schenck in obs.



14. *Forest. l. 26. obs. 14.* Quod malum utut apparenter leve videatur, nihilominus tamen ordinario ferè *inflammatio vesicæ* & hinc *gangrana* lethalis supervenit. Videatur *Panarolus Pentec. 1. obs. 27.* Facit etiam huc *laxo nervorum vesicæ* constrictioni inservientium, qui ex inepta testis extractione læsi dolorosam mictionem & ferè urinæ suppressionem induxerunt. *Vid. Hildanus Cent. 5. obs. 61.*

*Quoad sphincteris vitium*, hujus relaxatio atque colli vesicæ apertura deficit, quando hic *spasmo* affectus, pertinacius se stringit, id quod interdum observare datur, in doloribus abdominis spasmodicis, quorum occasione subinde sphincter stringi & urinæ suppressi potest, id quod in *colicis convulsivis* subinde observavi, atque imprimis in dolore abdominis scorbutico, item in dolore nephritico scorbutico, seu non rarum pathema pluribus deducitur à *Dravvizio Tract. de scorbut. p. 170.* Forfan huc *cambarides* pertinent, utpote de quibus refert *D. D. Febr. de Scorzon. p. 88. & 133.* quod ex vesicatoriis, suris admotis, urinæ suppressio nata fuerit: Nempe stimulo continuo & irritatione sphincteris vesicæ, adeoque superveniente convulsiva ejusdem strictura, vel ex nato irritationis vicinarum partium tumore & hinc colli vesicæ compressione ischuria talis originem traxisse videtur.

*Quoad vitia canalis urinarii* urinam non transmittentis imprimis se offert ejusdem angustia variis ex *causis* enata. Hos intersunt imprimis tumores, undecunque in ejusdem radice oborti, seu intra vesicam existant, seu extra, v. g. Pertinent hac tumores prostaticarum glandularum circa collum vesicæ collocatarum seu sitarum. Fit se, nonnunquam, ut post nimium exercitium quod eum supprimatur urinæ, id quod observat *Platerus in observat.* Nam tumefactæ prostaticæ glandulose, si diutius subsistat tumor, necessario comprimunt ureterem, & ita impediunt urinæ transitum.

*Cum essem Roma*, moriebatur Princeps Tuscanus ex nimia urinae suppressione, quam neque catheter, neque candelæ cereæ, neque res illa alia prolicere poterat. Post mortem dissecto corpore nil mali in meatu urinario aut vesica inventum fuit, sed solæ prostrata glandulosa ad radicem penis sitæ tumefactæ inventæ fuerunt, à quo tumore lethalis urinæ suppressio. *Inflammatio colli vesicæ*, vel etiam perinæ angustia quoque meatum urinarium & urinæ suppressionem infert, quale exemplum habetur in *Zacut. Lusitano l. 2. Med. Princ. Hist. p. 149.* Angustatur & porro meatus urinarium quando obstruitur, vel propè sui originem in vesica, vel in suo progressu. In vesica frequentissime obstruitur à calculo vesicæ ut notissimum est. Post hanc obstruitur etiam à pituita viscida ac glutinosa. Sic *Zacut. Lusit. l. 2. pr. adm. obs. 64.* Urinæ suppressionem lethalem à filamentis crassis instar calami scriptorii inductam refert. Inter quos humores etiam sanguinis grumi it. crassius pus ex ulcere vel renum vel vesicæ, vel alius cujusvis partis

ad



ad vesicam delatum, suppressionem urinæ periculosam inferunt. *Indicium* huiusmodi suppressionum præter tumorem & dolorem vesicæ ex repleta vesica optimè suggerit *catheter*, qui intrusus per sphincterem vesicæ penetrat, & ita aperiendo meatum urinariū & removendo impedimenta urinæ fluxum promovet, dum interea antecedentes occasiones, aut præcedentes plus minus mutatae urinæ excretiones, aut juncta symptomata vel affectus alius causæ proximæ indicium suggerunt. Denique in suo progressu angustatur meatus urinarius, ita ut non possit transmittere urinam. Hoc in progressu fit vel ex calculo in eodem pertinaciter impacto, in specie circa glandem, vel fit ex caruncula post exesam aliquo loco urethram, ex quo erosionis loco caro parva, verruca instar, plus minus dura & sensilis, enascitur urethram penitus occludens; quæ caruncula frequentissimè gonorrhæam diuturnam malignam insequitur & per catheteris vel candela impressionem ubi sita sit, optimè cognoscitur.

Hæc superadduntur & *extraordinaria* quædam *cause*, quæ tamen potius renum, quam vesicæ vitio contingere videntur, dum quæcunque *validiora diuretica* intempestivè assumpta, nempe vel mox post alimenta, vel antequam primas vias abstergentia præmissa sint, subinde ischuriam inferunt, dum occasione celerioris & copiosioris feri urinarii secretionis tanquam vehiculi nutrimenti & excrementi una chylosa cruda, aut etiam alia contenta viscosa seu pituitosa ad loca urinaria rapiuntur, ibique mediante obstructione ischuriam inferunt. Sic ex usu *terebinthinae* post cibos crudos & viscidos assumptæ urinam suppressam observavit *Hildanus Cent. 5. obs. 59.* uti etiam ex potu *vini recentis*, nec ritè defæcati urinæ suppressionem observavit idem *Cent. 4. obs. 52.*

Quoad *prognosin*, suppressio urinæ periculosum est malum, diversimodè tamen pro causarum varietate: Illa, quæ ex *paralyfi vesicæ* fit ischuria, it. quæ ex *nimia corporis eius distensione* oritur sæpius cæteris periculosior esse solet.

In *cura* 1. *causa* impediens excretionem urinæ est *removenda*. 2. *Interne diuretica* præsertim *china* vel *acrimonia* sua urinam promoventia, propinanda. 3. *Externis* subinde vesica stimulanda. Si igitur malum est à vitio vesicæ, vel minus sensilis, vel aliàs quasi paralyticæ internæ, præsertim *malvaticum juniperinum*, *ol. destil. juniper.* aut *terebinth.* conveniunt, idq; ad imitationem *Thoneri* in *obs. p. 175.* qui ischuriam & stranguriam gravissimam, præmissis internis ab intemperie vesicæ frigida & humida cum humoribus phlegmaticis curavit per *ol. destillat. succini gut. vj cum aq. petroselini.* Hinc propinentur *purgantia* blanda, quæ dum alvum proritant, per consensum simul vesicam stimulando, etiam excretionem adjuvant. Vel pro eodem scopo injiciantur *clysteres*,  
primò

primò quidem  
cynthide & sin  
vi quasi urina  
urinæ patefiat  
vel ineptè vel  
obs. p. 250. it.  
amygd. dulc.  
ulurpetur fss  
7. 8. 34. me  
inji, ut ita

Prole

minib. ruta,

ex decocto ist

egregius est

31. herb filip

modo applic

& in vino co

parantur, ac

aut fixa imp

pam sub cin

bi. pellit uri

sam prolici

cataplas

Contusis in

aliquot gutt

num, it. pu

& cum ol. sc

Helidai. M

humoribus

desperata eg

litiem, add

etiam inu

peric. castor

unguentum

Pari



primò quidem blandè *emollientes*, postmodum etiam *acres excentaur. min. colocythide* & similibus. Item comprimatur abdomen, detineatur anhelitus, ut ita vi quasi urina proliciat, quod nisi fiat, *catheter* usurpetur, ut ejus medio urinæ patefiat exitus. Sed quoniam gravia & subinde periculosa symptomata vel ineptè vel crebrius applicatus catheter inferre potest, de quo vid. *Lyserus in obs. p. 250. it. Panarolus Pentec. 2. observ. 20.* tutius est *candela cerea, melle aut ol. amygd. dulc.* illita, si immittatur, ad imitationem *Sylvij Tr. de Cachex. §. 275.* vel usurpetur *fistula membranacea seu coriacea* ad imitat. *Helmont Tr. de Lithiasi c. 7. §. 34.* mediante qua simul per *syphonem* applicati liquores commodè possunt injici, ut ita istis mediis retenta proliciat urina.

Prolectâ sic urinâ fiant *injectiones* in vesicam ex *decocto pulegii, calaminth, ruta, castorei* & similibus nervinis. Item applicanda sunt *fomenta* ex *decocto* istarum plantarum, cum *anetho, chamomill. parietar. &c.* In specie egregius est *fotus cum spongia* applicandus ex *decocto sem. anisi & petroselini an. ʒi. herb. filipend. Mj. Zedoar. ʒii. baccar. lauri ʒi. coq. in vino & ∇.* & dicto modo applicentur proficuum in quavis ferè ischuriâ vesicali. Vel *ʒ. fol. ulisæ* & in vino cocta super pectinem imponantur. Fortiora sunt, quæ ex *allus & cepis* parantur, ac præ cæteris ferè conducunt, si nempe *allia & cepa cum oris* cocta aut frixa imponantur pubi, autore *Bartholino Cent. 4. Epist. p. 230.* Vel *ʒ. cepam* sub cineribus coctam adde *ʒß. pinguedin. anserin.* illine hanc umbilico & pubi pellit urinam. Quod si imponatur perinao, urinam à nimio coitu suppressam prolicit, prout expertus est *Hillerus Cent. 1. cur. 17.* expertum est tale *cataplasma* in multis casibus aliis nil juvantibus:

ʒ. Cepar. albar. crud. No. vj.  
capit. allij No. ij.

Contusis in mortario adde *pingu. anserin. q. s. ol. scorpion.* parum, adspargantur aliquot gutt. *ol. destillat. juniper.* M. pro cataplasmate, applicando regioni renum, it. pubis. Posthac egregium est *cataplasma ex parietaria* contusa, cocta & cum *ol. scorpion.* instar emplastri pectini imposita. Quoad experimentum est *Helidai.* Me rarò fefellit, dicit *Forestus l. 25. obs. 8.* etiam ubi obstructio esset ab humoribus crassioribus. Sicut &, dicit porro, in Ischuria puerperæ ex frigore desperata egregiè profuit. ʒ. *Parietar. Mij. charesfol. Mjß* incisa coq. ad molliem, adde *butyri recent. ʒij. & ol. scorpion. ʒjß.* applicentur calidè. Aliàs fiunt etiam *inunctiones* tam pubis & perinae ex *ol. scorpion. castorin. rutaceo, hyperic. castor. destillat. juniper. & similibus*, quam etiam circa os sacrum. Item *unguentum Dialth. c. ol. scorpion.* mistum pubi illinatur. Denique *ol. mastich. destillat.*



destillat. umbilico inunctum remorantem urinam pellit. Tandem *infessus* & *semicupia* fiunt ex emollientibus & ipsis etiam nervinis appropriatis, ita tamen ut paulò ante infessum exhibeantur blanda *diuretica*. In ardentibus aut malignis febribus si suppressio sit urinæ, vel ægri aliquamdiu circumducendi sunt deambulando, conf. Sydenham in obs. de morb. acut. p. 212. Vel

R. Unguent. dialth. ʒß.

ol. scorpion. simpl. ʒij.

destillat. junip. ʒß. M. quo illinatur regio pubis, vel imponantur fomenta & cataplasmata laxantia dicto loco &c.

Si fiat suppressio urinæ ex vesicæ extensione nimia, præter compressionem cum manu in specie convenit *fotus ex parietaria, aneth. flor. chamem. millefol. origan. puleg. & similibus melior. sem. lini, fœnugraci &c.* Vel quod expertum est *Cataplasma ex charesfol. parietar. & petrosel. in butyro frixis à Simon. Paulli in Quadripart. Botan. p. 157.* Superiora omnia applicanda ex cepis vel parietaria &c. extra applicari possunt, si prius modis supra dictis per catheterem &c. urina fuerit evacuata.

Quod si vitio Sphincteris supprimatur urina, litus in perinæo & pubis regione ex unguento dialth. c. ol. papav. confert. Internè vero volatilia c. opiatia mista, sed modo primarius curatus fuerit morbus, secundarium hoc symptoma sponte evanescit; sic v.g. Si à cantharidibus ortum fuerit, lac & emulsiones lacteæ sunt optimæ. Quod si vitium sit ex urethrae angustia, tumore inflammatoriò aut simili, discuti possunt & fotibus & cataplasmatibus ex charesfol. & parietar. &c. supra allegatis removeri debent. Si vero sit à grumo sanguinis, pro hujus dissolutione internè conveniunt solus. lap. S. c. fto, decoctum rad. rub. tinct. decoctum artemis. c. charesfol. troch. de carabe, spermacet. essent. hyperic. essent. traumat. &c.

Externè aliis frustraneis aptum auxilium est *stercus boum*, quàm recentissimè adhuc excretum, quo si pecten, pudendum & perinæum pauco tempore inungas, manabit urina. Si desit recens, utere sicco, oleis appropriatis ad Δ in permisto, autore Zacut. Lusit. l. 2. prax. admir. obs. 65. Aliàs fotus aut infessus ex emollientibus aut solventibus sanguinis grumos. Vid. Timæus l. 3. Cas. 41.

Si malum sit à purulentiâ nimia, succinum c. vino propinatum est egregium. It. ol. destillat. terebinth. aut bals. sulph. terebinthinatus & similia ferè, quæ modò circa grumos sanguinis fuerunt infusa.

Si obstructio sit à materia viscida & mucilaginosa, conveniunt internè *raphanacea ex Armorac. raphano communi & similibus*, quæ mucilaginem crassam potenter incidunt: It. *succus limonum* ad ʒij. l. jv. appropriatissimum est remedium



dium *Amat. Lusitan. Cent. 5. cur. 71.* Vel ad imitationem *Riverii in observ. communicatis*

℞. Vini albi dulcis ℥ij.

succi limon. ℥j.

Spiritus terebinth. ℥j. M. capiantur successivè. Item *succus pærietariæ c. oxymellite* experimentum est *Helidæ Paduani*; hinc *tartarus vitriolatus*, b. tartari, vel spir. bis dulcis locum inveniunt.

Quod si supprimatur *urina à caruncula* inter meatum urinarium genita; hæc quantocyus removenda est. Convenit in specie ℞. ℞ij præcipit. ℥ij. unguent. de Cerus. ℥jß. ( quibus pro magnitudine affectus aliquid olei vitrioli addi potest ) & supra ceream candelam ponitur & hoc ipso caruncula aliquoties, sed molestè in die attingitur, vel præcipitatus dulcificatus, (. *Turbul miner. cum Empl. Triapharm. candelæ cereæ* apponitur, & dicto modo usurpatur. In malo leviori candelæ ex cera alba, cui admiscetur ʒ. crudum pulverisatum, vel qui melior, *crocus metallorum* leviter aufert carunculam. Quod si gravi⁹ aut pertinacius fuerit, imagma ex ʒio sublimato ʒ virid. aris c. cereo applicetur. Conf. *M. A. N. C. Ann. 8. p. 152.* Observandum autem ne virgæ aut candelæ sint ex purâ cera, quia facilè nimis franguntur, sed admiscenda est *terebinthina*. ℞. Cera alba ℔j. Terebinth. venet. ℥j. liquefiat cera, post addatur *Terebinth.* quibus liquatis tingantur *elthychnia* fiantque candelæ. Unguentum fuscum *Felcis Würzic. melle rosato* etiam carunculam absumit. Conf. *Barb. in Chirurg. p. 269.* Quod si exesa fuerit caruncula, pro consolidatione relictæ ulcusculi unguentum album camphoratum immissum consolidat. Applicentur tamen candelæ corrosivis imbutæ cautè, ne ex nimia corrosione gangræna oboriatur, cujus exemplum vid. in *Lys. observ. p. 250.* Cætera pro hoc scopo usitata remedia vid. in *Sennerto l. 3. prax. it. Bozell. Cent. 1. obs. 79.* Quod si

## CALCULUS VESICÆ

meatum urinarium obturaverit, hic removendus venit. Et quidem calculi vesicæ tantum non omnes ex calculo renum primariam sui originem ducunt, conf. *M. A. N. C. Ann. 6 p. 147.* qui in vesicam delapsi velociter augmentum capiunt. Lasa enim ureterum tunica nervosa, ipsa etiam vesicæ calculi motu non nihil attrita, plorant hæ partes lasæ alimentum proprium, sub formâ mucilaginis crassæ & spissæ, quæ mucilago unâ cum urina calculosorum excreta habetur vulgò pro pituita, ex quâ per calorem arefacta generetur calculus, cum tamen revera sit alimentum proprium ureterum ac vesicæ, in vesicæ cavum destillans & ita concertum. Hæc ipsa tamen mucilago, ubi aliquantulum ejus subinde adheret calculo renali eò dilapso, in hujus augmentum cedit. Accrescentibus enim plurimis arenulis, aut advenientibus sibus coagulabilibus ex urina, simul in cal-



culi consortium rapiuntur & exinde calculi vesicæ augmentum oritur. Hinc vesicæ calculi majores lamellatim concreti reperiuntur, instar nempe ceparum cortice uno supra alterum concreto, facile tamen à se invicem separabili. Si quis unquam vidit lap. bezoar vel lapidem ex folliculo felleo bovis, is tales lamellas pariter in calculo vesicæ inveniet, ita ut in centrò parvus lapillus vel compactæ arenula reperiatur, quod elegantur declarat Boyle in Phil. experiment. Conf. & Borell. Cent. 2. obs. 62. & Velschius Hecat. 2. p. 32.

Vesicæ calculum igitur insequuntur imprimis impedimentum urinæ in vesicâ, ita ut sentiant ægri aliquod obstaculum, quod se opponit meatui urinario sub urinæ excretionem. Item anus in consensum trahitur, & unâ affligitur tenesmo; inò ex crebriori egrediendi conatu sapius procidentiam patitur. In penis glande est dolor & pruritus, adeo ut ægri interdum putent, calculum hære in balano seu glande. Vid. Hildanus Cent. 6. observ. 49. Penis subinde erigitur, idque ex irritatione membranæ vesicæ internæ cum membrana meatus urinarii. Sanè Helideus in Calculo Vesicæ certissimam notam asserit, si præter urinæ difficultatem inter mejendum etiam adsit desiderium excernendi fæces intestinorum, & si dum aliquam paleam aut simile quid humi tollere conantes se inclinent, in parte vesicæ sentiant punctiorem. Præterea salu vehementiori motum calculi in vesicâ percipiunt ægri, modò non sit adnatus. Nam interdum post attritam nimis vesicam membranæ ejus internæ increfcit, ut tanquam in capsula calculum recondat. Immisso in vesicam cathetere aut digito in podicem, facile ab experto ejus præsentia observatur. Item si inter mingendum urina supprimitur, æger vero pedibus in altum sublati libere postmodum mingere potest. Et denique in malò diuturno mucilago ista, cujus antea mentio facta fuit, copiosè cum urina excerni solet.

In prognosi, calculus vesicæ malum est curatu difficile. Facilius tamen in foeminis propter brevitem ac simul amplitudinem colli vesicæ; difficilius in viris, quorum urethra longior & angustior. Calculus vesicæ nonnisi sectione tollitur, nec sic periculo caret, quin secti aut extracti licet, sapius tamen aut inflammationem vesicæ lethalem post se relinquunt, aut superveniente fistula, rædiosam agunt vitam. Calculus, qui vesicæ firmius adhæret, incurabilis est.

Quoad curam Calculus vesicæ maturè removendus & excludendus; si nequeat ob magnitudinem, comminuendus, medicamentis aut assumptis aut injectis. Si nec hoc procedat, excindendus. Inter interna, quæ ad exclusionem ejus conferunt, sunt etiam omnia ea, quæ in calculo renum usurpari solent, diutius tamen continuanda, quia longiore morâ vis eorum nonnihil infringitur. Hinc  $\nabla$ . persicaria ab Anglis in calculo vesicæ laudatur, item  $\nabla$ . ex ceptis destilla-

ta, it. urina  
ridiè bibita la  
melle usurpari  
tinuato usu fr  
succellivè eji  
de hoc edidit  
cit Horat. A  
ria refert Boy  
culus, per ta  
ubi calculu  
nempe in m

Ex

ut alteretur  
hactenus nu  
solutionem st  
seopo comm  
tibus in usu  
in Vino deco  
ludè fieri pot  
excindendus  
ex Petroleo  
Contrarium

U

que duplici  
urinam cont  
mientibus sin

Ca

ris vesicæ,  
nonnisi vol

Ca

vio nervor  
impetu, fib  
alto in regio  
rivati fere on  
urinæ incon  
Schenckius li



ta, it. *urina hirci* hausta. *Herniaria* ac *Betonica* in iusculo carniū cocta, quotidie bibita laudantur à *Poterio Cent. 3. cur. 72.* *Decoctum malva cum butyro & melle* usurpatum fuit ab *Horstio in obs. p. 462.* In specie *millepedes* preparati continuato usu singul. re sunt specificum ad calculum vesicæ comminuendum & ita successivè ejiciendum. *Laurembergius*, qui hujus medio se curavit, singularem de hoc edidit *Tractatum* & ante enim primus hujus experimenti mentionem fecit *Horat. Augenius. Conf. Sennert. lib. 3. prax. ubi de calculo vesicæ.* Ac sane paria refert *Boyle in Phil. experim.* quod etiam in Anglia curatus fuerit vesicæ calculus, per talem usum *millepedum*, qualem ipse describit *Augenius.* Interdum ubi calculus est in motu & tamen non bene procedit, *Vomitus* convenit nempe in mulieribus, cujus rei exemplum vide in *Poter. Cent. 2. cap. 74.*

*Externa* in vesicæ calculo primaria sunt, quæ insciantur in vesicam, ut alteretur ab iis & consumatur calculus, rara tamen sunt admodum hæc, imò hæcenus nulla cognita. *Conf. M. A. N. C. Ann. 2. p. 249.* Sunt tamen qui solutionem stercoreis columbini calcinati cum decocto parietaria, vel ejus  $\nabla$ . pro hoc scopo commendat. Item cataplasma ex emollientibus anodynis & blandè pellentibus in usu sunt, præ cæteris decantatum cataplasma factum ex cepa alba cocta in Vino decoctionis parietaria & oleo scorpionum, admovendum pubi, quàm calidè fieri potest. Hujus usu convaluisse refertur à calculo vesicæ, qui jam eundem excindendum decreverat. *Litus* ex oleo scorpionum & pingui hircinâ & in specie ex Petroleo, it. ubi magis pellendum ex oleo destillat. succin. ceu nota transmittit, Contrarium *Ischuria* vitium est involuntarium urinae profluvium, seu

## URINÆ INCONTINENTIA,

quæ duplici modo affligit ægros. Aut enim dormientes solummodo affligit, ut urinam continere nequeant, quin stragula permingant: Aut vigilantibus & dormientibus simul præter voluntatem urina effluit.

*Causa hujus proxima* est deficiens constrictio musculi sphincteris vesicæ, qui aliàs fibris suis circularibus collum vesicæ tam arctè claudit, ut nonnisi voluntatis imperio relaxatus, urinae transitum permittat.

*Causa remota*, quæ constrictiōem hanc impedit, est I. *Paralysis* vitio nervorum eveniens, unde spirituum influorum deficiente radioso influxu & impetu, fibræ relaxatæ minus se stringunt. Contingit hæc interdum à casu ab alto in regionem lumborum & ossis sacri, ubi nempe nervi ad sphincterem derivati ferè oriuntur. Sic pariter laxatio vertebrarum circa istum locum subinde urinae incontinentiam infert. *Conf. Zacut. Lusit. l. 2. Med. Prin. hist. 143. item Schenckius lib. 3. it. Amat. Lusit. Cent. 3. cur. 11.* Etiam diuturnior mora in  $\nabla$ .



*frigida* pariter *resolvere* vesicæ sphincterem valet. Pertinet huc, dum *morbis acutis* ægrisque summè debilitatis supervenit urinae incontinentia ex defectu spirituum animalium, adeoque viribus penitus exhaustis, id quod & *apoplecticis* ordinario ferè accidere solet. II. *Est fibrarum sphincteris relaxatio* ex nimia distensione. Accidit hoc subinde mulieribus propter *nimiam fœtus magnitudinem*, unde vagina uteri distenta ac simul collum vesicæ necessario dilatatum subinde urinae incontinentiam relinquunt, quale exemplum suggerit *Platerus in observ.* III. *Fibrarum sphincteris laceratio*, quod fit non tantum in *vulneribus* istarum partium fortuitis, sed imprimis etiam in *lithotomia*, in quibusdam minus cautè instituta fibrisque sphincteris discissis, ut ob id postmodum urina retineri nequeat. Exemplum refert *Sculterus in Armamentario Chirurg. obs. 63.* Pertinet huc *obstetricum inertia*, quæ in partu subinde *dilacerantes vesicæ collum* urinae incontinentiam inferunt. Ut taceam in *difficiliori partu* rumpi quasi vesicæ sphincterem. Vid. *Heer obs. 14. it. Salmuth Cent. 1. hist. 39.* Quæ ipsa etiam in mulieribus propter *prolapsum sinus pudoris* oriri potest. Sicut *Barthol. Cent. 4. hist. 2.* urinae incontinentiam refert *ex ulcere vesicæ cum prolapsu uteri.*

Hæc est *vera & proprie dicta urinae incontinentia* *vigilantibus* pariter ac *dormientibus* conveniens. Verùm quoad *improprie dictam incontinentiam urinae*, sive quando *dormientes* tantum stragula permingunt, istud vitium ex debilitate facultatis retentricis, ut vulgò loquuntur, h. e. ex torpore aut defectu spirituum animalium, dum non satis firmant tonum fibrarum sphincteris vesicæ constrictoriarum. Unde videmus *tenellis in infantibus* propter spirituum torporem aut segnitiam vitium hoc frequens esse, quin & *senibus* ultimo senio interdum obvenit. Interdum etiam *consuetudo* hic supervenit, cujus occasione perminguntur stragula. Ad has urinae incontinentias in specie pertinet etiam vitium istud, quando hæc satis diu retineri nequit, id quod fere propter continuum ac sensiliorem in vesicâ stimulum contingit. Vitium hoc vesicæ interdum à calculo venit, qui incumbens collo clauso, mole aut asperitate, aliave ratione irritando mictionem urget. Id vitium etiam interdum obvenit gravidis ultimis gestationis menses, dum moles uteri aut premit vesicam, aut in partu distendendo jam vicinas partes, etiam vaginam distendit, sicque orificium vesicæ simul dilatat, unde vel pauca præsentis urina hanc excernere coguntur. Exulceratio quoque aut excoriatio vesicæ circa collum pariter crebrius stimulat ad excretionem, ut propterea frequentius mingatur. Denique *tussis* diuturnior & gravior hoc vitium infert, præsertim in mulieribus corpore magis obeso aut habitiori præditis, ut ægri tussientes simul urinam emittant, quod etiam observavit *Salmuth Cent. 2. obs. 30. it. Platerus l. 2. obs.* nempe concutuntur in tussi cum diaphra-



phragmate quolibet abdominis partes internæ, quibus concussis etiam vesica concutitur, idque eò magis, quò minus in obefiori corporis habitu partes externæ cedunt, ut ita quasi impetu protrudatur tanquam ex siphone urina. Denique id oritur malum ex angustia vesicæ, quæ urinam multam aut diu retinere nequit, tam nativa sub prima generatione, quam adscititia ex tumore vel proprio, vel vicinarum partium, ut v.g. in inflammatione abdominis, locisque vicinis.

Quoad prognosin, urina incontinentia ex vitio paralytico, in specie vitio cerebri aut spinalis medullæ difficillime curabilis est affectus. Urina incontinentia in senibus ut plurimum est immedicabilis; in pueris vero subinde sponte sua ætatis progressu curatur, ut observavit Timæus in Cas. p. 258. Sed necesse est, ut fiat intra 25. annum. Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne sit immedicabile malum.

In CURA imprimis causa est removenda, adeoque nervina & adstringentia hic primatum obtinent, quibus socianda simul specifica quædam, modo notisatis explorato, urina incontinentiam tollentia. Observandum tamen si malum sit à vitio nervorum, remedia ista nervina, non tam vesicæ quam lumbis, ossisque sacro, ubi ferè nervorum est exortus, convenire. Hinc calamintha & mentha cum vino ante pastum pota, item alchymilla & in specie agrimonia specificè commendantur. Plantago, hypericon, huiusq. semen, glandes & medulla glandium, castoreum, galanga, mastiche &c. Certe ʒj. mastichis in haustu vini data admodum à quibusdam laudatur. Item thus ejusque pulv. item gummi Arabicum ad ʒj, in vino assumptum laudantur, præsertim quando occasione stimuli præternaturalis non bene retinetur urina. Hinc foel sequentem pulverem ad incontinentiam urinæ paralyticam commendat

℞. Calaminth. Myrrh. Castorei an. ʒiij.

Glandium ʒv. pulverisata subtilissime propinentur ad ʒj.

Specificæ inter talia convenit guttur galli rostum & tritum, cum vino potum. Est unum ex decantatissimis specificis ab omnibus commendatum, tam ad diurnam quam nocturnam urinæ incontinentiam, ita ut etiam ad eam, quæ est à partu difficili commendetur ab Høfero in Herc. Medic. p. 340. Conf. in specie, quæ è Solenandro refert Sennert. l. 3. prax. Pulvis cineris erinacei etiam est bonum specificum quo D. Michael felici successu usus fuit. Ipsemet in pueror. 12. annorum post morbum acutum urinæ incontinentia laborante hunc pulverem erinacei cum medullâ saxorum mistum cum successu adhibui. Hinc Bartholetus in Encyclop. c. 104. contra urinæ incontinentiam adhibet pulverem interioris tunice ventriculi gallinarum cum cinere erinacei. Montagnana vero his, qui lectum permingunt, sequentem commendat pulverem



- ℞. Tunic. stomach. Gallin. pulverifat. ℥℥.  
herb. agrimon. ℥j.  
erinacei usti ℥vj. M.F. ex omnibus pulv. D. ℥j.  
cum vino vel jure.

*Medulla saxorum* egregium est experimentum à ℥j. ad ℥℥. in vino propinatatum. Vel:

- ℞. Pulv. medull. lap. ℥iij.  
granor. mastich. ℥ij.  
lign. aloes resinof. exactè pulverifat. ℥i℥.  
M.F. pulv. pro aliquot. Dos. D. pro dos. ℥j.

*Pudendum suis* live *vulva sua* quocunque modo *preparata* præstans est experimentum contra urinæ incontinentiam. Optimè fit ex hoc ipso *farcimen*, quod propinetur ægro vel exsiccatur pulveris. Egregiè convenit. Item *anis pudendi suis* convenit, quo ipso puer 18. annorum ab ineunte ætate hoc malo affectus curatus dicitur. *Conf. M. A. N. C. Ann. 2 p. 36. Mures exsiccati* & pulverisati, vel *mures* in butyro elixi & ita propinati sæpius expertum sunt specificum contra urinæ incontinentiam tam vigilantium quam dormientium. *Conf. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 124. Forest. lib. 25. observ. 22. Item sterces caprae*, vid Brunschweig p. 67.

Inter *externa* imprimis *balnea* & *fomenta* laudantur, facta ex *absinthio*, *mentha*, *st. rosar.* *balauft.* *tormentill.* Hæc balnea fieri possunt ex *aqua ferrariorum*; *Therma* imprimis utiles sunt in malo contumaciori. Novi sanè, qui à pastu mox, atque unicum potum hauriret, continuo eoque perquam doloroso vesicæ cruciatur & ad continuum mictum stimulo afficiebatur; Aliis multis irritis profuerunt *internè jacula* decoctionis carniū & gallinarum calida loco potus assumpta, *externè* verò *therma*. Hinc *inunctiones* cum oleo *absinth. menth. nardin.* *Castor.* *Bals. Peruv.* &c. *Empl. oxycroceum* vertebrae lumborum applicatum laudatur à *Joële*, item à *Timao in casibus* p. 338. *Pulvis bufonis vivi* in nova olla usti collo appensi, in sacculo, singulare experimentum est; ad quamvis urinæ incontinentiam à quacunque causa, nisi fuerit ex læsione à partu. Vid. *H. ab Heer. obs. 14.* & confirmatur etiam per experientiam à *Boyle in Phil. experim.* Aliàs hujusmodi involuntaria post partum emissio, tanquam paralytis vesicæ curata fuit ab *Horstio in obs. p. 287.* Quidam hoc *unguentum* ceu singulare commendant contra *profluvium aut stillicidium urinæ mulierum*, post partum difficilem

- ℞. Lap. calamin. in ac. destil. & ∇ros. bis vel 3. loti & subtilissime pulverisati ℥iv.  
lythargyr. argent. ℥ij.

cerus.



cerus. præp. ʒj.

ol. rosar.

chamom. an. ʒv. agitentur simul per 2. horas & cum axung, hirci ʒiij. F. unguentum agitando ad horæ quadrantem, donec consistentiam debitam acquirat. Hoc ipso pars affecta leniter illinenda, ac linteo cooperi- enda. Hæc ipsa promiscuè tam diurna quam nocturna incontinentiæ conve- niunt. In specie vero quoad nocturnam pulvis cupularum glandium in ∇. vel vino chalybeatis convenit. Item pulvis castorei junioribus ad ʒj. adultis ad ʒj. propi- natur. item pulv. August. pro lectimio. Conf. Hochstett. Decad. 6. cas. 2. in Schol. Quod si dictis modis non cessat malum, vascula quædam arte applicanda veniunt in maribus, quibus urina continuo depluens colligatur, ut cum minore fastidio vivant, quæ vid. in Hildano Cent. 6. obs. 54 & 55.

*Depravata urina excretio* est, quæ fit cum dolore, ardore & insigni difficultate. Hæc inter vitia communissima ferè est

## STRANGURIA,

dicta ὀνίτις ἢ σπασμὸς à gutta, Latine *urinae stillicidium*, quia urina gut- tatim excernitur cum acerbo dolore, tam in quàm post mictionem, remanente unà continua ad mingendum irritatione. Est autem affectus ferè similis *Tenesmo*. Nam ut hic se habet in podice, ejusque sphinctere, ita se habet stranguria in vesica, ejusque musculo constrictore. Communiter hoc malum oriri vo- lunt ex refrigeratione abdominis & in specie vesicæ. Unde Germanis vocatur die kalte Seiche.

*Causa proxima* est urina, idque ferè dum à causa externa oritur, aut in vesica fortius irritata, & plus minus interius abrasa, aut nonnihil excoria- ta. Illud in vitio magis accidentali, hoc in eodem magis habituali seu confirmato. Estque causa proxima continua irritatio vesicæ, unde continuus mingentium conatus cum ingenti dolore inter mingendum oritur. Quoad si hoc vitium est à causa externa seu urinae vitio, istud hoc loco considerabimus. Quando vero est à vitio ipsius vesicæ plus minus læsæ, istud sub *Dysuria* simul conside- rabimus.

Dolor iste percipitur tam in collo vesicæ, quam in specie in Urethra, & in hac intensior, quam in illo. Licet enim Urethra & interior vesicæ membrana sit continuata, & una eademque substantia, tamen vesica interius est oblita mu- co crasso, nonnihil viscido, qui eam oblinens defendit ab acrimoniâ urinae plus minus rosivæ. Verùm cum Urethra hoc unguento naturali careat, eò acer- bius

Pars II,

dd

bius

cerus.



bius cruciatur à transeunte *urina acida*, qui *acor* urinae est ex parte urinae unica causa stranguriam inferens. Hunc *urinae acorem* confirmat, quod in *Nosocomio Lugdunensi* ita affecta urina gustata, manifestum *acorem* linguae imprefferit. Confirmat hoc experiment. *Helmontii*. Tr. *Pleur. furens*, qui sumere jubet urinam naturalem & huic addere tantillum vini acidi & injicere in vesicam; sic enim subito percipit dolorem stranguriae simillimum. Id quod etiam affirmat cura, quae per talia, quae *acidum precipitant*, aut obtundendo demulcent, curatur. *Acor hic in urina stranguriae* autor natales suos habet ex primis viis ex cruditate nempe acida digestionis primae eaque ut plurimum vitiò assumptorum. *Causa*

*dispositiva* est *inertia fermentibilis* non debite perficiens in duodeno chylum: Sic enim assumpta, praesertim potulenta, non rite digesta, sed *acore* aut stomachico aut proprio adhuc tincta & inquinata è stomacho dilapsa rapiuntur per intestina, sine mutatione in usum, ad vias urinarias in vesicam, hanc *acore* suo stimulant, & stranguriam inferunt. Loquitur hoc quotidiana experientia, dum unusquisque observare potest, quod vel *vinum meracum*, vel *mustum*, vel *cerevisia* non rite defaecata, aut copiosius aut intempestive assumpta inducat stranguriam. Haec enim sunt talia, quae facile & potenter *acescunt*, & *acorem* suum pertinaciter retinendo haud adeò facile tam in stomacho quam in duodeno temperari possunt, quin hostilitate suà stranguriam in vesicam inferant. Aliàs undecunque nata *excoriationes*, *exulcerationes*, *attritiones* à calculo, ita vesicam disponunt, ejusque interiorem superficiem adeò irritabilem reddunt, ut nullius rei accedentis contactum, etiam urinae naturaliter constitutae, nisi cum summo dolore ac molestia adeoque continuà irritatione perferre queat, quin continua adsit stranguria. Unde & *ulcus vesicae* subinde dat stranguriam molestissimam.

Haec *ordinariae* ferè sunt *causae* stranguriae. *Extraordinarium* est quod oriatur stranguria admodum pertinax ac torminosa ex *incantatione*, qualem refert *Helmont*. Tract. de *Lithias*. quam per *succum betulae* curatam refert.

Quoad *prognosin*, stranguria si est ex vitio urinae, periculosum non est, utut molestum. In senibus tamen subinde incurabile propter defectum digestionis primae. Stranguria interdum, si diuturnior aut pertinacior fuerit, *ulcus vesicae* infert. Quae ex vitio vesicae est, curatu difficillima ac subinde periculosa existit.

In *cura* (1.) acra acidum urinae corrigendum. (2.) Vesicae qualiscunque laesio restituenda. Quoad prius, ventriculus rectificandus, inter quae in malo



malo contumaciori primatum obtinent *vomitória*, quarum utilitatem commendat *Riverius in prax.* & confirmat *Hildanus Cent. 6. cur. 52.* In quem finem etiam pro scopo averfario *purgantia* in specie ex *Jalappa cum terebinthin. extractum panchymagogum cum Qio dolci* propinentur. *Quoad posterum*, ea, quæ in vesicæ exulceratione supra fuerunt posita locum obtinent.

Inter *remedia priori* præsertim scopo satisfaciencia conveniunt in primis *glandes pulverisate, fructus alkekengi*, exque eorum succis paratum *extractum*. *Lapides*, & in primis acidum stranguriæ absorbent. Ac sanè in *cancris* absoluta est stranguriæ cura vi alcalina diuretica pluribus scopis satisfaciens. Hinc sunt, qui *℞. duos ℥os fluv.* quibus & in mortario contusis affunditur *∇ vel cerevisia, q.s. succum* exprimunt, & contra stranguriam propinant. Præ cæteris quoque *cortices Aurantiorum* egregium sunt stranguriæ experimentum, seu exiccata usurpentur, seu eorum *essentia*, aut quod optimum, *ol. destillatum* ad aliquot guttas propinetur. Convenit præsertim, si a causa externa assumptorum malum ortum fuerit, propter substantiam nempe his volatilis oleosi. Conducit quoque *nux moschata*, quæ ab usu cerevisiæ crudæ contractam stranguriam curat. *Folior. ribes nigra* odor & decoctum; item *gemmarum ribes nigra* ad *℥℔.* cum *sem. dauci* in vino rubro decoctum commendatur à *Forestol. 28. obs. 2.* *Decoctum raparum* specificum est *Gabelchoveri Cent. 3. pag. 9.* Ubi merito hoc *decoctum raparum* in affectibus urinariis, stranguria, dysuria &c. commendat. *Decoctum quoque herba & baccarum Alkekengi cum passulis* miras virtutes obtinere dicit *Amat. Lus. Cent. 6. Cur. 92.* *Balsamum Peruvianum* sunt, qui exhibent, pro quo præstat *bals. Copayba* in decocto petroselinii ad aliquot guttas assumptum. Non secus ac *ol. cera* si in decocto cicerum rubrorum propinatur locum invenit. *Lixivium ex testis ovorum calcinatis* cum vino paratum, aut *vinum in quo silices candefacti* aliquoties extincti sunt. Item *Nitrum* in vino datum, *spir. nitri dulc.* &c. Fortiora absorbentia sunt *℥. tartari, C. C. ust. ℥. stipit. fabarum*, & ubi alia frustra sunt adhibita, *borracis ℥j.* egregiè prodest. Denique *cepe* non ultimum stranguriæ sunt remedium. Nempe *cepa* minutim incisa infundatur in aquam simplicem per 24. horas, *∇.* infusionis bibatur, liberabit à stranguria. *Quod si pertinacius fuerit malum*, & vitio digestionis solo à cruditatibus ibidem detentis foveatur, id quod v. g. in *senibus* frequentius evenit, *potus vini Hispanici* aut *Malvatici*, aut *Malvaticum juniperinum* usurpentur, it. *S. V.* bibitus dum cubitum itur, præservat à stranguria. Hinc variæ possunt fieri formulæ. v. g.

℞. Tereb. cypriæ ℥j.

Refin. jalap. gr. vj. F. Pilulæ.

dd 2

Hinc



Hinc

℞. Ol. destilat. cort. Aurant. ʒj.  
zedoar. ʒß. M. D.

S. Sonderlich Del gegen das Schneiden.

Item

℞. Mithridat. ʒj.  
ol. destil. rutæ.

cort. aurant. an. gutt. ij.

cum pauco saccharo F. Bolus. S. Stillender Zucker.

*Opiata* tamen minus conveniunt in his malis.

Item

℞. Specier. diacurcum. ʒv.  
pulv. N. M. ʒij.  
lap. ʒ. ʒj.

destillat. Cort. Aurant. D. ad scatul. Dos. v. vj. viij. &amp;c.

Denique ℞. Malvatic juniperin. ʒiv.  
syr. cort. aurant. ʒj.  
spir. carminat. ʒj. M.

S. Safft wieder das Schneiden / auff etlichmal.

*Externe sebum commune*, seu *candelas* umbilico calidè largiter il-  
liniunt. Ratio est continuitas vesicæ & umbilici, nempe ratione Urachi. Lo-  
co *sevi communis* in specie convenit *Axung. Hirci* cum aliquot gutt. *ol. destilat.*  
*cera* subacta umbilico illita, v.g.℞. Axung. hirc. ʒij.  
ol. destilat. ceræ

cort. aur. ana gr. ij. vel iij.

M. pro litu.

Ad externa hæc pertinet *suffitus Rulandi* in seipso expertus, nempe *raphani* inci-  
dantur & incoquantur in vino, vase bene obturato, quibus ebullientibus im-  
ponatur vas sellæ, cui æger infideat, & vesicæ regionem suffumiget. Alias in  
malo pertinaciori ulnati sunt *clysteres emollientes* & *anodyn*i, in specie *ex lacte*,  
imò ipsa *injectio lactis* vel *simplicis*, vel *chalybeati* in vesicam locum invenit in  
stranguriâ.

## DYSURIA

sive *urina difficultas* est, quando cum magno conatu & labore ægri acce-  
dente non levi dolore urina effluit. Dolor iste concurrens inter mingendum  
quasi



quasi ardoris sensum inducit, propterea malum hoc *ardor urinae* dicitur. Conqueruntur enim ægri in tali affectu: *Es brennet / als wenn heiß Wasser ließe.*

*Cognatus est affectus cum stranguria, differunt* tamen i. quod in dysuria urina non guttatim, sed sine interruptione ac sæpius debitâ quantitate effluat. 2. *Quod dolor inter mingendum* percipiatur, non verò ante & post mictionem, uti in stranguria. 3. *Quod in dysuria* orificium vesicæ, aut meatus saltem urinarius erosus plus minus excorietur aut exulceretur. In stranguria verò interna vesicæ superficies plus minus arrosa &c.

*Causa* talis urinae difficultatis ac ardoris seu dysuriæ est aut in urina, quæ excernitur, aut in partibus, per quas excernitur. *Ha ipsæ enim* præternaturaliter affectæ ab urina etiam naturaliter constituta doloris sensum concipiunt. *Primo igitur urina* dysuriam, licet rarius graviolem, aut habitualement infert, quando eadem acris nimisque *thsa*, acido *thsa* aliave ratione mutata existit, id quod fit à copiosis salibus imbibitis, ut in *hypochondriacis* & *scorbuticis*. Sic enim dysuriam lethalem ex acrimonia feri scorbutici cum mirâ penis retractione observarunt *M. A. N. C. Ann. 4. p. 159.* Item *pus acre* cum exulcerationem renum seu aliarum partium cum urina permistum, tum dysuriâ infert: Item quando urina à *cantharidum* applicatarum externe corrosivo veneno imprægnata dysuriam parit. *Frequentius partes urinariae* malè affectæ dysuriam inferunt, seu *per essentiam*, seu *per consensum* fiat, imprimis quando collum vesicæ aut etiam meatus urinarii excoriati & exulcerati sunt à præterfluente urina naturali licet constituta, ingentem & acerbum dolorem concipiunt, & si quæ alia, certè hæc est frequentissima causa. *Hinc non raro calculus vesicæ* eandem attritu suo quasi abradens, aut alio modo circa collum lædens, nunc strangurias, nunc dysurias pertinaces excitare solet.

*Pertinent huic prostatica glandula juxta collum vesicæ malè affecta*, imprimis à contagio & eo, unde & gonorrhæa sunt subjectum & subinde etiam exulcerantur. *Exulcerata* vero dum præterfluens urina easdè alluit, immensè dolent. *Quia ita affecta* loco lymphæ blandioris elaborant succum acrem & virulentum corrosivum & ea infectum, qui dum urethram, per quam fluit, excoriat & lædit, hoc ipso dysuriam crudelem inferre solet. *Difficillimè curatur* tunc est talis dysuria, aut interdum in *ulcus penis* terminatur, quando & hæc ipsa virulenta cum quibusdam confesceat & moritur, ut observat *Schenck. l. 3. obs.*

Verum præter affectus *per essentiam*, etiam *per consensum* vicinarum interdum dysuria oritur. *Sic enim affecto utero*, aut affecto intestino recto nil frequentius est, quàm ut superveniat dysuria. *Hinc propter inflammationem intestini re-*



Hi & renelsum & dysuriam observavit *Amatus Lusit. Cent. 6. cur. 84.* Item ex consensu cum *hemorrhoidibus* dolentibus stillicidium & urinæ ardorem annotat *Schenckius l. 3. obs. ubi de hemorrhoid.* Observandum hic ulterius in modo dictis affectibus stranguriæ & dysuriæ simul subinde excerni *materiam crassam, mucilaginosam & pituitosam*, quæ nil aliud, quam nutrimentum vesicæ, aut partium illarum urinaryarum proximum, quod existis partibus læsis continuo exstillans unâ cum urina sub forma mucilaginis crassæ aut lacteæ excernitur, quæ ipsa mucilago hos ipsos affectus insigniter augere solet, & in specie conatum & exercendi laborem mirum intendere. Unde refert *Vesling. in obs. Anat. à Barthol. editis p. 146.* quod in demortuis ex dysuria deprehendatur vesica mucosa & lenta albicante materia plena.

Quoad *prognosin*, dysuria quidem per se *malum lethale non est*, molestum tamen & sæpe admodum contumax ac *diuturnum*, in qua diuturnitate nunc *ad urinæ incontinentiam* disponit, nunc *vesicam exulcerat*, aut factam jam ejus exulcerationem exasperat. *In senibus difficulter* curatur, nisi forsitan porus *vinum Malvaticum* eandem mitiget, sicuti idem *vinum Malvaticum*, uti etiam *pulv. stomachalis Quercetani* optimè convenit, si conjuncta cum ista mucilagine materia crassa & alba &c.

In *cura* attendatur ad causas, adeoque vel *acrimonia temperanda*, vel *partes urinariae* quocunque modo *læsa restituenda*. Pro hoc scopo *malva* & omnia ex eâ parata *specificè* commendantur, quatenus egregiè acrem urinam temperant, sensum vesicæ irritatæ demulcent & loca læsa quasi mucilagine temperante oblinunt. Hinc *conserv. flor. malvæ* mirè laudat *Amat. Lusit. Cent. 6. cur. 58. Conf. & Hochstetter. Decad. 6. cas. 2. Schol. & Syrup. de malvæ*; exemplum vid. in *Horst. junior. Epist. & obs. p. 50.* Item *mucilagine seminum cum decocto althææ* paratæ & cum hoc ipso propinatæ sunt *exporiston. Hartm. in Prax. Chym.* Potius ex his fiat *decoctum*, quod vel ita addendo *lap. S.* usurpetur, vel addatur *nitrum* & potus erit gratus. *Decoctum* pariter *Foresti* supra ubi de calculo renium, laudatum, confert. *Decoctum herb. & baccarum Alkekeng.* si æstas est & haberi possunt. Vel *decoctum florum Nymph. petrosel. sonchi lævis cum saccharo & nitro* adhibeantur. *Decoctum flor. malv. cum iujubis & sebesten* itidem convenit. Nam si quid aliud, certè *decoctum sebesten* ad 3v. omni manè assumptum insigniter ardorem & dolorem urinæ lenire dicitur, idque imprimis, si tantillum de *croco* fuerit additum. *Terebinthina* & omnia *terebinthinata* etiam hic conveniunt. Caute tamen *spir. seu ol. terebinthina* adhibeatur quia nimis acris est. Potius *pulveres* convenientes excipiantur *terebinthina*, sicque redigantur in *pilulas*, v. g. *Pilul. Quercetani contra dysuriam*, renium exulcerationem &c.

R. Thuris, Myrrh. Mastich. an ʒij.

fuc-



succini, croci, an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

camph.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

$\mathfrak{z}$  diaph. ad pondus omnium cum terebinth. F. Pilul.

Dof.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . utatur 10. diebus.

*Vel, quas Alii adhibent.*

$\mathfrak{R}$ . Succu liquirit. succin. thuris, an. q. v. incorporentur cum terebinth. cypr. F. Pilulae dentur manè jejuno ventriculo; *Joel* adhibet pulverem ex testis ovorum, sem. urtic. & succin. Nam succinata omnia laudantur. Hinc & troch. de carabe, de Alkekeng. contra dysuriam valent & in specie si exulceratio in partibus urinariis, adhibentur. Vesica caprae preparata, it. Apri sylv. masc. siccata & pulverisata ad stranguriâ & dysuriam presentissima dicuntur remedia, ut loquitur Hochstetterus decad. 6. cas. 2. Quorundam non inelegans est  $\epsilon\upsilon\pi\omicron\gamma\iota\varsigma\omicron\nu$  hoc:  $\mathfrak{R}$ . Dactyl. q. s. ossa limata rediguntur in pulverem, caro v. in particulas scindatur & sic etur in clibano, pulverisetur & misceatur cum pulvere ossium addendo sacch. q. s. Hujus pulveris manè & vesperi sumatur quantum cultelli cuspis bis vel ter capere potest, assumatur in sequenti mistura:

$\mathfrak{R}$ . Syr. dialth. Fern  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

de cich. c. rhab.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

$\nabla$  Nymph.

lactuc.

chamom. an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ .

cinam.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . M.

It.  $\mathfrak{R}$ . Lap. Percar.

Off sep.

$\mathfrak{z}$ . calcin.

pulv. N. Mosch. an  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Extr. opii  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . M. F. pulv.

Hiscæ denique accedant lacticia & his cognata oleosa, v. g. oleum amygd. dulc. perquam egregium sapius usurpatum. Item oleum amygd. dulc. cum syrupo dialthæ & pulv. ocul.  $\mathfrak{z}$ . in forma potionis mista & crebrius usurpata; commune  $\epsilon\upsilon\pi\omicron\gamma\iota\varsigma\omicron\nu$  est pulvis radium althææ cum saccharo mistus & usurpatus; emulsiones ex amygd. d. sem. melon. nucl. persic. addito lapide percarum, sunt egregiæ. Lac ejusque serum, quod interdum solum sufficit, & omnia lacticina in omni dysuria sunt optima, in specie si orta fuerit à cantharidibus, in quibus copiosum assumatur. Hauritur nunc crudum, nunc serum lactis, in quo decocti flores cyani & calcatripp. Sic enim fit magis absterisivum. Hauriantur autem lacticina copiosè & calidè, id quod pariter de omnibus potulentis intelligendum, ut, quantum possibile, calidè hauriantur. Cum certè frigidus potus assumtus, aut aer frigidus extra susceptus insigniter stranguriam & ischuriam soleat exasperare. Cum his internis crebro



crebro *clysteres* in usum sunt vocandi, nunc blandè *stimulantes*, nunc *lenientes*, nam quò contumacior est alvus, eò intensior est dysuria. *Externe serpillum* calefactum partibus urinariis applicatum dolorem sedat, & urinam promovet. *Cataplasma* ex *alth. malva, melilot. parietar. cum lacte*, aut oleo *scorpion.* pubi imponatur aut saltem *ruta & parietaria* in oleo *scorpionum* cocta & appolita præsentissimè juvant, dicit *Amat. Lusu. Cent. 6. cur. 92.* Item *unguentum expertum* ad urinæ difficultatem

℞. Unguent. Martiat. Agrippæ  
ol. laurin. an. ʒj. M. optimè blandeque eo ungatur regio  
pubis & subito fluet urina.

## CAPUT V DE LYMPHÆ IN GLANDULIS GENERATIONE ET MOTU VITIATIS.

**N**Otissimus est *sanguinis motus ad glandulas*, ut in iisdem aliquid separetur, quod ad constituendam *lympham* requiritur, idque tam in *glandulis conglobatis, quam conglomeratis*; ex hisce cavitati cuidam infunditur, ut est *lymphæ pancreatica, salivalis &c.* Ex *conglobatis* vero tam regionis inferioris quam superioris, circa venam axillarem sinistram sanguini commiscetur. *Naturam, usum, fiendi modum, ex theoria* præsuppono. *Vitiatur* hæc lymphæ secretio & in partes infusio tribus modis. 1. *Dum ipsa vitiosè generatur*, tam in quanto, quam in quali. 2. *Dum* eadem vel naturaliter, vel præternaturaliter constituta *vitiosè distribuitur* & ex glandulis conglomeratis in partes & cavitates infunditur. 3. *Dum* eadem qualitercunque constituta ex glandulis conglobatis per vasa lymphatica *in suo motu impeditur*.

*Prius vitium* varia & distincta hinc producit *pathemata* pro glandularum & partium vicinarum varietate. *Alterum vitium* dat affectus *catarrhales* propriè dictos. *Tertium vitium* dat tumores serofos seu *hydropes particulares*.

*Vitiatur lymphæ generatio* tam in quanto quam in quali, vel *objecti* vel *subjecti* vitio. *Objecti* seu materiæ ex qua (maximam partem est serum sanguinis) *vitio*, vitiata generatur lymphæ, quando hoc serū parcius vel copiosius,



*sius, tenuius, vel à contento chyloso rore crassius, dulcius & vitiosè acrius fuerit, nam & hinc necessario lymphæ varia vitia contrahit. Subiecti denique vel glandularum vitio vitiaur lymphæ generatio, quando earundem tonus & textura secretoria, & alia requisita ad lymphæ genesis necessaria non ritè se habent.*

*Frequentissimum vitium est, quando obstruuntur, hincque plus minus intumescunt, ut plurimum à materia lymphæ generanda viscidiorè, vel gelatina chylosa magis turgida, quæ undecunque coagulata aut inspissata, tam à frigore aliave causa externâ quàm interna, sicq; in pituitam abiens, tumores glandularum majores aut minores, molliores aut duriore, benigniores aut cum sensu punctorio maligniores constituit. Circa quorum affectuum theoriam & praxin consulendus venit Sylvius lib. 1. prax. c. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Ubi saltem hoc simul addidero, pro his affectibus curandis, illis præsertim, qui ex obstructis glandulis originem ducunt, præter ℞. dulcem pro expurgatione, optima remedia esse sudorifera ex lignis, præsertim junipero, parata, v. g.*

*℞. Rafur. lign. juniper. ℥ij.  
falsatias ℥jß.*

*cort. ligni Quajac. ℥j.*

*herb. rorismar. Mij.*

*bacc. junip. ℥jß. Infunde in ℥ q. ⅞ & vini aa. ℔ij, macerentur per 24. horas, coq. in M. B. in cucurb. cum suo alembico juncto ad medias, colatum & destillatum M. adde spir. ʒ ci ℥ij. syr. flor. Calend. ℥jß. ad iij. M. Hoc ipso præmissa purgatione & tali nupere scæminam cum mensium suppressione, tumores parotidum & glandularum in collo habentem, cum capitis gravitudine, narium obstructione, oris siccitate & difficili anhelitu & pectoris ac pulmonum quasi repetitione, interdum suffocationem quandam minante restitui, capiendò omni manè bonum haustum calidè & expectando hinc in lecto sudorem.*

## CATARRHUS.

*Catarrhi vocem quod attinet, in sensu Hippocratico quicumque decubitus alicujus humoris dicitur ab eodem Catarrhus, adeò, ut Diarrhæa, Diabetes & alii similes morbi Hippocrati catarrhi audiant. Verum proprio sensu catarrhi voce innuitur decubitus seu depositio seri, aut ichoris tenuis, seu serum hoc sit mite, seu acre, ad aliquam certam determinatam partem: & hoc est propriè catarrhus, nempe præternaturalis à sero plus minus vitiatò, in quacunque parte facta alteratio seu functionum lesio.*

*Veterum hypothesis est satis nota. Afferuerunt nempe in catarrho interno serum cumulatim in capite ex eodem destillare per foramina ossis cribiformis*

*Pars II.*

*cc*

*in*



in partes inferiores, easq; interiores, nares, fauces, oculos, aures, pulmones &c. In catarrho vero externo destillare idem serum, inter membranas cranii extimas, in totam corporis peripheriam, etiam ultimos artus usque, à quibus *destillationibus*, & ut vocant *defluxionibus*, tantum non omnes morbos, in specie arthriticos affectus deducunt. Serum istud in capite colligi voluerunt, partim ex intemperie ejusdem frigida, partim humida, idque primariò ex vicio partium inferiorum, in specie stomachi ac jecoris. Nam stomachus ex intemperie frigida copiosum phlegma generat; jecur vero ex intemperie calida incumbens stomacho istud phlegma in vapores & fumos resolvit, qui copiosè ex ventriculo exhalantes & evaporantes, in cerebro tanquam in alembico, collecti & à loci frigidityte denuò condensati in liquores seu  $\nabla$ as serosas condensentur, unde successivè quasi depluendo inferunt catarrhos. Et hæc est Veterum hypothesis adeò decantata & à multis adhuc recepta.

Sed sufficienter discussæ sunt illam tam *Helmont Tr. catarrh. delir.* quam *Schneiderus in prolixis operibus de catarrhis*, cujus omnis doctrina quæ 6. libris satis prolixis continetur, in hoc consistit, quod asserat & defendat, non à capite depluere serum in catarrhis, sed istud ex arteriarum vasculis à facultate sanguinis expultrice apertis, seponi & per membranas transudando, & pro varietate feri sanguinis per arterias exclusi & hinc inde sepositi, varios oriri catarrhos. In qua doctrina glaciem prius fregerunt *Schneidero*, tam *Helmont*, quàm etiam *Piso in erudito scripto de colluvie serosa*.

Sed ut propius ad rem accedamus, eo nomine non sunt culpandi Veteres, quod serum statuerint *materiam catarrhorum*, utur *lymphæ vitiosæ* moderni hoc adscribant. Nam serum Veterum collectum est latex *Helmontii*, & hodierno loquendi modo *lymphæ* est. Serum autem catarrhorum est materia, quoties nunc immediatè ex arteriis cum sanguine excretum & motu suo plus minus impeditum & in spaciola partium mollium effusum, etiam varios affectus, quos vulgò pariter catarrhos appellant, infert. Nunc vero idque primariò, mediatè, mediante nempe sui in lympham mutatione, & hinc ex glandulis conglomeratis in certa loca effusione catarrhos propriè dictos, seu *defluxiones*, aut rectius loquendo cum modernis, *influxionem* constituit. Adeoq; propriè dictorum catarrhorum materia est *lymphæ glandularum conglobatarum*, tam naturaliter quam præternaturaliter constituta, copiosè & imprimis uberius in partes effusa. *Fontes catarrhorum sunt glandula conglomerata*, unde saltem loca talia glandulosa propriè dicti catarrhi affligunt. *Scaturigo prima* catarrhorum denique est M. S.

Cum igitur frequentissima *glandularum conglobatarum* & *conglomeratarum*

textura



textura in cerebro cohæreat (nam totus ejus cortex minutissimarum glandularum est congeries) item cum in locis cerebro vicinis, oculis, faucibus, larynge, aspera arteria, collo, auribus &c. copiosæ sint glandulae, & modo dictæ partes præ reliquis, injuriis & læsionibus aëris externis sint expositæ, non mirum est, si propriè dicti catarrhales affectus frequentius capiti ipsiusque partibus vicinis, hinc faucibus ac aspera arteria, ac consequenter pulmonibus sint molesti, i. e. ratione efficientis remota. Et materialis proxima ad catarrhos hæ partes sint dispositæ.

Dixi modo, membranas ex *Schneideri* sententia esse fontes catarrhorum, per quas materia transudando in catarrho defluat. Unde *Schneiderus* membranas suas pituitarias dictas anteriorem & posteriorem accuratè delineat, aliasque accuratè describit, per quas catarrhos transudare vult, utut in ultimo tomo de catarrhis addat his ipsis etiam glandulas, tanquam opercula vasorum. Rectius igitur alii his glandulis originem catarrhorum adscribunt, imprimis cum membranis istis pituitariis *Schneideri* à tergo copiosarum glandularum textura adhæreat, ex quibus, ceu fontibus, catarrhi per vasa minuta excretoria membranas perforantia excernuntur, sicuti naturaliter per hæc vasa lymphæ fauces & nares, aliasque partes oblinens excernitur.

Per has igitur glandulas conglomeratas lymphæ aut nimis abundanter exclusæ, aut vitiosè simul præparata & excreta catarrhos constituit, i. e. defluit lymphæ aut copiosa, aut vitiosa ex glandulis imprimis conglomeratis circa caput, fauces, collum, laryngem, asperam arteriam, aliasque vicinas partes. Unde non tantummodo functionum læsiones, sed pro vario lymphæ vitio varia symptomata superveniunt. Et sanè hoc sensu nil obstat, quin gonorrhæa virorum, fluor albus mulierum, salivationes quælibet, quin & interdum diarrhæa ad catarrhos referri queant.

Vidimus catarrhorum materiam, vidimus fontes, quare pergo ad causas, à quibus ita movetur lymphæ. Equidem ipsa ceu humor sui generis spontaneo impetu non nisi fluidi gravis ratione, deorsum movebitur, adeoque purè passivè sese habebit ad hoc, ut copiosior, aut plus minus vitiosa per glandulas conglomeratas moveatur, & ita spirituum influxum moventem & organorum seu instrumentorum dispositionem catarrhalis influxio imitabitur. Ut igitur per glandulas quasvis conglomeratas catarrhalis lymphæ fiat excretio, causa præcedens semper est læsio quædam, in parte quadam plus minus sensibili, in cujus vicinia sunt glandulæ, cujus læsionis occasione lymphæ, ob fibrarum stricturnam uberius ex glandulis vicinis exprimitur, & ita semper restaurata continuus quasi rivus eò derivatur; quæ ipsa lymphæ, quò plus vel min⁹ à statu naturali recesserit, eo magis vel minus gravem affectum catarrhalem constituit, v. g. sicut spina digito infixæ causa est sanguinis effusionis & inflammationis in loco, ubi plura sunt vasa sanguifera,



fera, ita similis spina v. g. *acidum* inspiratum laryngi si infixum fuerit, ibid. lymphæ uberiorem effusionem, indeque *raucedinem*, *tussim*, materiæ mucosæ copiosam ejectionem faciet. *Lesio* ista prout *nunc magis superficialis*, adeoque irritatio saltem quædam partis fuerit, vel prout *nunc gravior*, quæque non sensum saltem partis afficiat, sed etiam texturam ejus & spiritum insitum simul alterare valeat, etiam *catarrhum nunc leviozem, nunc graviorem* infert. In quo posteriori, loco laudabilis alimenti, vitio spiritus insiti, ex propriæ digestionis & coctionis lésione, vitiosum continuo excrescit excrementum, quod similiter novum alimentum corrumpendo, partem magis magisque lædet, unde *catarrhus habitus* seu perennis catarrhi scaturigo, ut in *phthisi* manifestum est, de quo *infra*.

*Causa* adeoque *materialis proxima* irritans & *nunc* saltem sensum, *nunc* spiritum insitum magis afficiens, speciatim est *acre acidum* quod dictæ catarrhali defluxioni ceu *causa proxima* subternitur sive inservit. Non est excludenda hîc *causa efficiens proxima formalis*, quæ est spiritus impetum faciens & occasione istius irritationis catarrhalem lymphæ excretionem efficiens.

*Causa remota* est vel *externa* vel *interna*. *Externæ* causæ sunt aëris injuriæ: *Internæ* sunt vel digestionum particularium errata, vel sunt ipsa feri, ceu materiæ lymphæ, præternaturaliter constituti vitia; speciatim sapor ejus vitiosus, acris &c. ut in *scorbuticis* manifestum est. e. g. Festuca oculo intrusa, hujus dolorem, tumorem, copiosæ lymphæ continuæ effusionem infert; quæ mala à *causa interna* nata dicuntur *catarrhus*, si scil. talis, quasi festuca quædam à *variolis* oculis infixæ manserit, cujus occasione crebrior recidiva catarrhi excitabitur. Quod si in *scorbuticis* acrior lymphæ oculum utpote teneriorem forsitan læserit, & similia symptomata inferat, etiam *catarrhus* dicitur. Item si sub laboribus Chymicis gas acidum sulphuris seu  $\text{H}_2\text{S}$  inspiratum irritaverit laryngem, *tussim* & ex præternaturali lymphæ effusione, *raucedinem*, tandem *creatum* copiosum infert. Malum hoc simile est, ac si continuata inspiratione tali larynx & pulmo magis læsus, ex deficientia spiritus insiti, sub nutritione alimentum proximum continuo depravet, unde continuus excitabitur *catarrhus*, qui *phthisin* tandem inducet. Sicut deniq; si *citra occasionem* talem datam lymphæ in se acrior, acidior, *thior*, naturaliter aliàs laryngem humectans pedetentim hunc læserit, successivè hinc *tussim*, *raucedinem*, spiritum copiosum, idem sic dictam *phthisin catarrhalem* infert. Tandem in specie *externas* inter causas primatum obtinent *inspirata aëris*, ratione quorum interdum sunt *epidemicæ catarrhi*, idq; interdum non absq; *malignitate*; it. *febræ catarrhales malignæ*, *epidemicæ* observata fuerunt.

*Epide-*



*Epidemici* tales *catarrhi* originem ducunt, quoties *externa* inspirata *partim* *lympham inquinant* ac serum, ejusque praternaturali alterationi occasionem præbent; *partim* quoque *irritant* loca, per quæ transeunt, unde ibidem lymphæ catarrhalis vitiatæ fit excretio. *Sæpius tamen sine hoc vitio*, etiam alia ratione aër vitiosus catarrhis occasionem præbet. *Quod ii pertinent*, qui cum aëre *fumos acres metallicos & ziales* inspirant in laboratorii Chymicorum & Aurifabrorum &c. quorum acidum gas, membranas narium, faucium, laryngis & sub his reconditas glandulas copiosas continuâ *irritatione* ad fibrarum contracturam & copiosam lymphæ excretionem stimulat; *quin & ipsam lympham non raro vitiant*, quam actiorem, spissiore, aut alio modo vitiatam reddunt. Sic *frigus* pariter *externum*, aëre mediante haustum diutius, similiter has partes lædendo, eas quoque ad catarrhales defluxiones disponit, non secus atq; in *sterminatione*, acrimonia inspiratorum irritantur narium membranæ & vasa lymphatica excretoria, ut exinde lymphæ copiosa, subinde muco crasso imprægnata profluat. Ita si nares aliæve vicina loca à praternaturali quadam causa irritentur, idem evenire solet. *Imo interdum irritatio hæc & læsio eò usque procedit*, ut etiam alimentum partis læsæ exinde vitiosè alteratum appositioni fiat ineptum, adeò ut sub forma muci crassi, spissi, varii coloris, & consistentiæ unà non raro excernatur.

*Causæ interna* irritantes, & ita occasionem catarrho subministrantes dictæ fuerunt, quod sint *vel in ipsa parte, vel in sero*, seu lymphæ effusa. *Ibi* est aliquid praternaturale, ut plurimum acre, ex digestionē privata enatum, quasi fermentum, hostilis irritationis occasione, lymphæ ex loco vicino effusionem inducens. *Hujus exemplum* sit *character phthiseos hæreditarius*, successivè *phthisin catarrhalem* inferens; vel acidum istud fermentum circa dentium vitiorum radices hærens, dolori, tumori ac similibus pathematibus catharralibus occasionem præbens. Hinc etiam ipsa *lymphæ* praternaturali *acrimonia acidosissima* affecta, dum per partes distribuitur, eas irritat, ac dolorem commovet, & ita ad uberiorem sui excretionem stimulat.

*Inter causas* ad talia lymphæ vitia *disponentes* imprimis consideranda *stomachi digestio*, dum nempe ventriculus impotens non sufficit digerendis & concoquendis ingestis, sive quod ejus fermentum sit nimis iners, sive quod ipsa assumpta imprimis potulenta copiosiora vim ejus infringant. Unde locum invenit vulgatum istud: *Güsse/geben Blüsse*/ idque tum imprimis, quando accedit aut *pauca urina excretio*, aut *imminuta sensibilis sudatio*, vel insensibilis transpiratio. Hinc nimirum præter *frigus aëris* ambientis ex imminutâ insensibili transpiratione *frequentiore in hyeme sunt catarrhi*, quam aliis anni temporibus. Qualescunq;



fuerint causæ, quando dictis ex causis in ventriculo non ritè concoquuntur assumpta, sed chylus emergit  $\nabla$ osus, nimis blus &c. ipse etiam sanguis & serosior & acrior generatur, inde necessariò etiam lymphæ quibus vis in glandulis vitiosè elaboratur. Unde & *tabes* ex acrimoniâ sanguinis, *rancedines*, *tusses*, *coryzæ* similesque ex acriori lymphæ orti affectus catarrhales aut præcedunt, aut comitantur: Quas *taies à destillationibus ex capite* oriri, erroneè autumarunt Veteres. In specie *scorbutici* obnoxii sunt acribus & corrosivis catarrhis vitio sanguinis & feri natis, cum & lymphæ salivalis adeò acris sit in iis, ut gingivarum fibras rodendo eas flaccidas reddat & hinc omnino exedat. Unde & aliarum glandularum lymphæ similiter affecta non rarò dabit catarrhos.

Jam quoad *differentias catarrhorum*. Catarrhus omnis est vel *accidèntialis*, vel *habitualis*. Ille, qui ex improvîso & quasi fortuito casu parti supervenit, & ejus spiritum insitum afficit, adeoque faciliè delebilis existit, & talis est, qui ferè *à causis externis* & inspiratorum vitio oritur. *Hic vero est*, qui sæpius in eodem loco gravius repetit & successivè spiritum insitum graviter labefactat, ac vel levi occasione datâ repetit, & *nunc* ex vitio hæreditario, *nunc* contentorum notabili dyscrasia supervenit. *Causa habitualis catarrhi* est *partim loci affectu tonus semel lassus*, ex spiritus insiti deficientia, unde glandulæ aliæque partes vicinæ ex læso tono laxantur, adeoque ex læso tono facilius & sæpius ex interna causâ nati catarrhi eandem partem afficere & replere solent: *Partim remanens à læsione catarrhali fermentum præternaturale* in glandulis locisve vicinis, quod subinde plus minus commotum, irritando istas partes catarrhales influxiones provocat, non secus ac simile quid in ulceribus relictum *recidivas* horum inferre solet. Unde vulgus per experientiam edoctus dicit: *Wo einem die Blüsse einmahl hinziehen/da kommen sie gern wieder*, quod *Helmontius* uno nomine per *robur partis inæquale* scitè explicat.

Deinde *ratione qualitatis lymphæ* catarrhalis effusæ hæc est aut *mitior* seu insipida, aut *acrior*, seu nonnihil acido salsa corrosiva, à qua acrimoniâ partes membranosæ mox dolent, insigniter rubent ac tument, adeoque dispositionem phlegmonoden seu inflammatoriam contrahunt, ut v. g. in *Epiphora oculorum*, *catarrhis* subinde est manifestum; imò interdum partes affectæ exulcerantur &c. Ab his ceu supervenientibus symptomatibus vulgus *catarrhum* in *calidum* ac *frigidum* dividit. Ille est, qui ex acriori lymphâ oritur, & modò dicta symptomata secum trahit: *Hic* qui ex insipida seu dulci uberius effusâ scaturit.

Porro *tempora paroxysmi catarrhalis* probè distinguenda sunt, pro quorum ratione catharrhus nunc *tenuis*, nunc *crassus* dicitur, nempe *in principio*, dum lymphæ sincera fluxerit, *catarrhum tenuem* seu *crudum* consti-

constituit.  
exasperatur,  
allociat, *lym*  
id quod fit  
incrassatâ &c  
*declinatio*  
eis mutandi  
*dictum*,  
mediate in  
cunque fac  
tione natum  
plus minus  
functionem  
modo capite  
rit, non secu  
dationem, n  
cipitur. A  
ret, in *lymp*  
veniunt.  
tione, & h  
nocturni, q  
& dolore  
tarrho tribu  
pleuresi nob

Cat

catarrhi.  
sanguine el  
tuit; quoa  
nem irritat  
sudorem;  
istâ partes  
fermentis,  
modo quod  
catarrhales



constituit. Dum vero copiosiori lymphæ irritatione laxatur pars, successivè exasperatur, & superficietenus excoriatur, & nutrimentum partis proprium se associat, *lympham* antea tenuem, *spissiore*, antea acrem, *temperatam* reddit, id quod fit *in incremento* & *status paroxysmi*, & hoc *materiam* tenuem incrassatâ & *coctam* vocant cujus excretionè & partis laxe spontanea restitutione *declinatio paroxysmi* absolvitur. Hæc ipsa tantum non omnia mutatis paucis mutandis applicari etiam possunt ad *catarrhum minus propriè dictum*, ex feri cum sanguine infusione per arterias, nunc *immediatè*, nunc *mediatè* in *lympham* mutati, sed ob fibrarum aliqualem, ob irritationem undecunque factam, stricturem, aliquali remora & in parte plus minus coacervatione natum, hincque partis variam tam ex læsione plus minus sensibili, quam feri plus minus insipidi aut acris, parioris vel copiosioris effusi alterationem & functionem læsam. Sic enim *frigus externum post corporis æstum* & motum nudo capite exceptum, aut pleno ore haustum promptissimè ad catarrhos disponit, non secus ac *ex refrigeratione* partis cuiusdam *nocturnæ*, post aliqualem sudationem, manè dolor in istò locò plus minus sensibilis Catarrho adscriptus percipitur. *Nempe subito clausis poris*, id quod insensibiliter aliàs exhalare deberet, in lympham acrem spissatur; unde pathemata ex ejus irritatione varia superveniunt. *Sic ex feri scorbutici* in loco quodam, speciatim in pedibus, facta irritatione, & hinc dolorosa alteratione *dolores lancinantes* & *lacerantes*, præsertim *nocturni*, qui catarrhis tribuntur, oriuntur. *Sic pariter ex dentium irritatione* & dolore & hinc fibrarum stricture natus tumor maxillæ serofus, itidem catarrho tribuitur. Ex ferro paulò acriori *pleuram* fortuitò irritante natus dolor in *plevresinotia*, catarrhis quoque tribuitur.

*Causas* hi affectus catarrhales agnoscunt easdem, quas illi supra dicti catarrhi. Nam, quoad *materialem*, serum vel *immediatè* ex arteriis cum sanguine elapsum, vel *mediatè* in lympham prius commutatum, hanc constituit; quoad *causam efficientem occasionalem* insequuntur *lesionem* irritatam vel ex occasione *externâ*, præsertim refrigeratione partis, v. g. post sudorem; vel ex *ipsius feri* pro materia lymphæ distributi *acrioris*, in specie acidissimi partes nervosas aut membranofas vellicantis, vel *habituali in malo*, ex *vitioso fermento*, ob læsam digestionem privatam spiritus insiti vitio collabefactam, natò quod datâ occasione quavis excitatum, ex irritatione tanquam spina infixâ *catarrhales affectus* infert. Deni-



Denique omnibus his catarrhis interdum sociata est *febricula*, plus minus intensā, ob id *catarrhalis* dicta, prout majus vel minus vitium lymphæ, præsertim glandularum conglobatarum, sanguini in axillarem sinistram infuso junctum fuerit. Hinc enim *effervescentia febrilis* major aut minor excitatur, & vespertino aut nocturno tempore præsertim hæ febriculæ exasperantur, & præcedentibus levissimis dorsi refrigerationibus subinde sunt molestæ.

Sed, si omnia hæc rectè consideremus, manifestum evadit, omnem catarrhi hactenus traditam doctrinam non tam *morbū* ipsum, quam *productum morbosum* respicere, adeoque à posteriori saltem rem declarare: Si quidem tam lymphæ ista ex glandulis conglomeratis effusio, quam feri plus minus vitiosi à sanguine refluō separati, aliqualis in parte retentio, non nisi effectus sunt, ex consequentia læsionis ejusdem morbosæ in parte ista catarrho obfessa præviæ, ita ut & in *Theoria*, seu fiendi modo primariò ad læsionem istam & irritationem ejusque causam, quam sequitur catarrhalis influxio, & in *Praxi* ad irritationis illius mitigationem & læsionis correctionem, harumque causarum remotionem respiciendum sit potius, quàm ad catarrhi istius exiccationem & discussionem. Istis enim deficientibus nunquam ruent catarrhi; Sicut iisdem sublatis sponte hi ipsi languescent & evanescent.

*Symptomata*, quæ insequuntur catarrhos, pro partium affectuum varietate variant. In genere tamen præcedunt eodē ut plurimum *gravitas capitis, sensuum torpor, artuum lassitudo, refrigeratio & horripilatio dorsi levis* (es ist ihnen/ als wenn kalt Wasser über den Rücken ließe) accedit *febricula* subinde, eaque imprimis vespertino & nocturno tempore exasperatur, postea corpus insigniter incalescit, *tussis, rancedo, sputum copiosum*, & similia eum febriculā augmentum capiunt; hinc supervenientia *excreta varia per nares, os &c.* Vel pathemata ejusd. partis *dolorosa*, quæ præsertim vespertino aut nocturno tempore exasperantur, ipsum catarrhum jam factum comitantur. *Quamdiu serum* catarrhi est *tenue & acre*, vespertino aut nocturno tempore magis affligit; *dum vero crassior aut viscidior* lymphæ peccaverit, æqualiter ferè omni tempore affligit.

*Intensiora* porrò omnia sunt *symptomata* in calido catarrho, contra remissionem in eodē frigido dicto. Præ cæteris *affectus catarrhales scorbuticorum* contumaces sunt ac crudeles, & qui correcti licet in uno loco, superstite tamen in M.S. & ventriculo fomite subinde alio in loco denud scaturiunt. *Quodsi externam præcedentem læsionem insequuntur*, facilè hoc manifestum evadit: *Quod si ex interno particularis partis cujusdam vitio* originem ducant, crebrior *recidiva*

diva, & mut  
iplam vitio sp  
xiam innuit  
celo oriantur  
quando idem  
agri sunt Spu  
ne subinde co  
& Asthma.

Quo  
minus peric  
pessimi om  
tarium fuer  
culosior cen  
malum habi  
infere possit  
undecunque  
ratem, parti  
ritus inlin  
acidiorē.

In sp  
capitis path  
choroidem  
riam, alias  
lymphæ vit  
via capitis  
catarrhus,  
gravius mal

In C  
Causa effici  
excretio, to  
similibus se  
tur. Hinc  
bus volat  
privata læ  
hinc pars  
& absterg  
canteria



*diva, & mutationis tempestatum*, aliis imperceptibilis, prompta sensatio, partem ipsam vitio spiritus insiti debilitatam, & ita & particulari vitio catarrhali obnoxiam innuit. *Quod si ex dyscrasia sanguinis & feri*, vitio digestionis in ventriculo oriantur catarrhi, crebriores catarrhosi affectus hoc ferè persuadent, aut quando iidem ex uno loco remoti in vicino se denuò manifestant; aut si tales ægri sunt *Sputatores*, quando multum *sudant*, & de ventriculi digestionis læsione subinde conqueruntur. *Vid. Helmont. Tr. Catarrh. delirant. & Tr. Tussis & Asthma.*

Quoad *prognosin*, catarrhus à causa & læsione externa proveniens minus periculosus, quàm qui *internum* habet fomitem. *Peiores sunt scorbutici*, pessimi omnium, qui ex vitio partis privato, seu *hereditarium*, seu *non hereditarium* fuerit, oriuntur. Catarrhus quò sapius in eodem loco recurrit, eò periculosior censendus est, cum crebriori *recidivâ* spiritus insitus debilitatus, facile malum habituale contrahere queat, & v.g. in pectore & pulmonibus *phthisin* inferre possit. *Catarrhi, qui senes affligunt*, graviores sunt ac difficilius curati, undecunque orti fuerint, partim propter digestionum quarumcunque debilitatem, partim propter partium solidarum deficiens robur, ex languore spiritus insiti, partim propter serum & lympham, in talibus acriorem & ferè acidioram.

*In specie periculosi sunt senibus, si caput petant.* Hinc enim varia & gravia capitis pathemata inferunt. Nam glandulas minutas cerebri, in specie plexum choroideum circa lympham esse occupatas, non secus ac pinealem, & pituitariam, aliasque consimiles earundem structuræ &c. confirmant. *Ab his igitur lymphâ vitiosius secreta*, tam in quanto, quam in quali & cerebrum inundans, gravia capitis symptomata infert. *Quò facilis excretionem* quacunque facta levatur catarrhus, eò melius, quia minus periculum est, ne ex graviore læsione partis, gravius malum ipsi immineat.

In *cura* catarrhorum semper tria capita primariò attendenda. (1.)

*Causa efficiens*, & inde parti inducta læsio, unde stimulat lymphæ catarrhalis excretio, tollenda & removenda. Unde si malum sit à causa externa, opiatum aut similibus sensus irritationis tollatur, & consequenter lymphæ affluxus præcaveatur. Hinc *suffitus, inunctiones cum oleis destillatis aromaticis, & sudorifera exhibita* volatilibus oleosis sunt optima. Si vero subsit vitium partis ex digestionem privata læsa, aut quasi reliquæ fermentativæ, hæ ipsæ ex parte removeantur, & hinc pars ipsa firmetur. Faciunt istud nunc *sudorifera*, partium sordes eluentia & abstergentia, nunc loci vel affecti, vel in vicinia apertio per *vesicatoria*, *cantheria* & *fonticulos* applicata, & si fieri potest, leni *suppuratione* factâ, per abscessum.



sum contumax vitium est removendum, v. g. *tumor catarrhosis mala* crebrius recurrens, vitio dentis ex privata digestionē laesa catiosi, huius evulsionē radicitus curatur. *Tonsillarum tumores* catarrhales sæpius recurrentes, radicitus extirpantur, suppuratiōe perfectā, ut huius medio, quicquid heterogeneum fermentativum partem obsederit, hocce medio removeatur. *Sin vero lymphæ ipsius vitium fuerit causa* catarrhi, hæc ipsa vitiosa, acris, falsa & acida, aromaticis aut volatilibus, item oleosis temperatis corrigenda & nunc per urinam, nunc optimè per sudorem eliminanda. Fomes vero ejus, imprimis digestionis primæ vitia emendanda.

(II.) *Causa materialis*, lymphæ nempe aut effusa, aut effundenda, *removenda & corrigenda*. Removetur vel *imminuendo* vel *avertendo* eandem. Corrigitur, si proprietates ejus vitiosæ, præsertim *acrimonia acido* bsa partes nerveas vellicans & rodens *temperetur*; quo etiam *intraffantia* sic dicta pertinent.

(III.) *Loci seu partis affecta læsio curanda* ac restituenda & si quid subsit glandularum aut obstructarum, aut alio modo læsarum vitium, corrigendum, ut huius ratione partim catarrhos debite curemus, partim eosdem *præcaveamus*, id quod imprimis *adstringentia & aromatica* præstant; illa tonum partium nervolum, hæc robur partium vitale conservant.

Pro his scopis ritè obtinendis *observandum*

I. *Remedia*, quæ hic conveniunt *evacuantia* primum locum obtinent; *per alvum* verò talia minus sunt commoda, sed, quæ potius feliciori & promptiori successu lymphæ augmentum *per urinam* & hinc etiam *per sudorem* evacuando impediunt. Et talia ex *hibus volatilibus*, v. g. *succini*, CC. item *ex lignis sudoriferis* erunt optima. Ubi tamen catarrhalis affectus fuerit contumacior, aut ex stomachi vitio dependeat, vel etiam corpus impurum offendat, subinde necesse est, ad *purgantia* progredi, imò ubi contumacius fuerit malum, ad *vomitoria* accedendū suadet *River. Cent. 2. obs. 90*. It. in catarrhis sæpius recurrentibus, v. g. in senibus & similibus, præsertim quando ex feri vitio accidat, ac partes nerveas magis affligerit, semper *ante novilunium* aut evacuantia appropriata, aut alia à catarrhis *præservantia* usurpanda. Inter quæ eminent *succinata*, *myrrhata* & similia oleosa, quasi balsamica, partes læsas roborantia & lympham seu serum corrigentia.

Inter *purgantia* præsertim pro senibus catarrhosis ferè usitatiorēs sunt *pilula de succino Cratonis*, nempe

℞. MP. de succin Craton. ℥ss. ad ℥j.  
Extr. absinth. gr. v.

Resin.

Alias salappa  
netur. At si  
suis curationib  
facit, quod 7  
nigr. Mens. C  
mali fuerit in

II. I.

nia vitiosa, C  
nti, ut vocan  
mis sunt crud  
modi catarrh  
miur, catarr  
aromaticis ap  
expectando.  
rhalsibus T  
experientia  
Riverius. I  
tempore vo  
quando m  
suspendend  
quando cat  
rit affectus  
talibus casu  
cument ali  
fuerint opia

III.

sæpius reci  
terdum ef  
vant, ne  
liter, aut to  
fonticuli h  
minant, ca  
succum in



Resin. jalap. gr. iij. vel iijj.  
 scam. sulphurat. gr. j. & c. f. q.  
 ol. succin. F. Pil. D.

S. *Gluspillen auff imahl.*

Aliàs *Jalappa* ordinariò præscribitur seu solitariè, seu cum *q̃ dulc.* mixta propinetur. At si tenacior mucus se junxerit, *colocynthis* locum invenit. *Poterius* in suis curationibus propinare solet decoctum *melanagogum* c. *lign. sassafras.* Quò facit, quòd *Thonerus* dicit, quòd perfecta cura catarrhorum consistat in *Helleb. nigr. Mens. Octobr. collecto*; *Pilula aloephaginae* aliæque similes usuales, si radix mali fuerit in stomacho & primis viis, usurpari possunt &c.

II. In catarrhis quibusvis, præsertim si concurrat simul lymphæ acrimonia vitiosa, *opiata* profunt. Hinc à Veteribus in principio mali & catarrho tenui, ut vocant, *pilula de cynoglossa* fuerunt in usu, quarum ingredientia, cum nimis sint cruda, earum loco ferè *laudantium opiatum* in usum venit. *Opiatis* hujusmodi catarrhus præsertim nocturnus evetitur, læsionis irritantis sensus opprimitur, catarrhalis defluxio inhibetur. Sola tamen vix usurpanda, sed *succinatis* & *aromaticis appropriatis* mista, præsertim diaphoresin auctiorem ab eorum usu expectando. Decantathorum *opiatorum* usum *Helmont* in affectibus catarrhalibus *Tr. ius Duumvirat. §. 62. 64 65.* Salutarem horum usum confirmat experientia, cum iisdem ex Modernorum consuetudine frequenter usus fuerit *Riverius. Vid. Cent. 3. obs. 15. 69. 74. &c.* Assumuntur talia *opiatz* cum primis tempore vespertino, aliquot horis ante introitum lecti, aut etiam paulò ante, quando moveri solet catarrhus. *Observandum tamen* ne abutamur his ipsis, suspendendo nempe & inhibendo catarrhalem motum, *istis nempe in casibus,* quando catarrhali influxione alius morbus solvitur, *vel quando Epidemius fuerit affectus catarrhalis, vel quando jam ad incrementum pervenerit malum;* In talibus casibus enim non statim suspendenda materia catarrhi. Plus enim nocumènti aliàs contingit, nisi *divertentibus, sudoriferis, diureticis* & similibus mista fuerint *opiata.*

III. In subjectis, ubi catarrhi ferè sunt incorrigibiles aut contumaces, aut sæpius recidivantes &c. in talibus palliativum *fonticulorum* remedium, interdum est adhibendum; item *vesicatoria,* sed hæc saltem à posteriori juvant, ne nempe nimium feri aut lymphæ catarrhalis inundatio partem debilitet, aut tonum ejus nimium destruat. *Voluntaria enim hæc ulcera,* præsertim *fonticuli* his affectibus tantum medentur, quatenus productum morbosum eliminant, causas vero ipsas non eliminant, & cum vitioso latice utilem alimentitiū succum in pus corruptum emungunt, ut ita imminuta nonnihil materia catarrhali



rhali horum insultus mitior reddatur. Nam totius *fonticuli* effectus specialiter in cruoris & laticis seu feri imminuta & continua exhaustione consistit & sic à posteriori iis conferunt affectibus *per accidens*, qui à sudoribus lenibus quibusdam vitio digestionis, aut læsæ in sanguine fermentationis, aut vitio corrupti feri in M. S. enascuntur, ita ut labes illæ à priori propter subjecti ineptitudinem, v. g. propter mensium naturalium defectum, propter characterem hæreditarium incorrigibiles sint. In talibus casibus ergo unà cum sanguine laudabili & sero evacuatur simul quod est nocivum &c. Sicut interdum natura ipsa per *spontanea* ulcera ab aliis malis se liberare solet.

IV. Quoad *venesectionem* negotium hoc per se locum non invenit. Sin vero subjectum sit *plethoricum* & consueta sanguinis evacuatio suppressa &c. quibus & aliis similibus occasionibus intenduntur symptomata catarrhum vel constituentia, vel consequentia, consulta est V. S. observando *revulsionum* & *aversionum* regulas. Quin etiam cum confestim nimis fit decubitus catarrhalis in quadam parte, ad impetum istum refranandum V. S. in loco opposito secundum *revulsionem* & *aversionem* instituta subinde solet in *Praxi* admodum esse proficua.

V. *Postopiata*, remedia vel *sudorifera*, quæ partes eluunt, earundem fordes mediante sero commodo abstergunt ac ipsum serum simul minuunt; vel *aromatica*, vel *balsamica*, quæ tam ipsum corrigunt & emendant, quam partes solidas roborant, sunt utilissima in paroxysmis catarrhalibus. Hæc ipsa enim indicationibus supra factis maximam partem satisfaciunt.

*Simplicia* igitur in catarrhis usitatoria magisque *appropriata* sunt *serpillum*, *satureja*, *thymus*, *majorana*, *mentha*, *betonica*, *salvia*, præsertim, *rosmarinus* & *lign. sassafras*. Item *juniperinum*, *quaiacum*, *bacca juniperi*, & omnia ex *junipero*, earumque *baccis* parata: *Rob.*, *decoctum ligni*, *malvaticum juniperinū* &c. *Myrrha* quoque, *acorus adulterinus*, *rad. caryophyllata* &c. *Succinū* & quælibet *succinata*, *cinnabaris* tam *nativa*, quam *galis*, *glia volatilia* tam *simplicia* quam *oleosa* &c. Quoad *lignum sassafras*, nobilissimum est ad catarrhos remedium, adeo ut à *Brunnero* in consilio proprium dicatur alexipharmacum. Odorem & saporem habet fœniculatum, aromaticum, adeoque corrigendi vitia feri & lymphæ, simulque per sudorem & urinam evacuandi, ut taceam ejus stomachicâ virtutem. Unde *decoctum lign. sassafr.* item *tinctura eius*, v. g. *Myns.* item *essentiam catarrhal.* D. Michael. ex ligno *sassafr.* cum *spiritu serpilli* parat. Est enim *serpillum* commendatum ad catarrhos simplex, unde etiam *▽* suam *benedictam serpilli* tantopere commendat *Myns. in Armam.* Pertinet hæc *▽* ista

contra

contra catarrh  
▽ seu essentia  
estque egregi  
libus &c.

In catarrh  
pini, imprimi  
sassafr. rûe p  
ultrapantur  
videre est in  
fractu præ  
ex quo del  
nullum dub  
men ceu ra  
tum catarrh  
decanatum  
Prax. Chym

6. ve 7. ren  
vilis comp  
bilis est in

quo semper  
Hadrian  
Prax. Senn



contra catarrhos descripta ab Hoffmanno in clav. in annexo thesauro p. 6. quæ  
 ▽ seu essentia sassafrata ad cochl. i. alterumve manè & vesperi propinari potest,  
 estque egregium præservativum & curativum in catarrhis, apoplexia & simi-  
 libus &c.

In catarrho scorbutico miscenda sunt remedia sassafrata cum summitatibus  
 pini, imprimis si immineat paralytis notha scorbutica. In tali casu essentia lign.  
 sassaf. ritè parata essentia pini mista, aut decoctum utriusque simplicis fructuosè  
 usurpantur. Loco ligni sassaf. etiam aliorum lignorum decocta adhibentur, ut  
 videre est in observat. Lotichii: item Gabelchovero qui decoctum rad. china cum  
 fructu præscribunt. Alii non sine ratione commendant decoctum ligni lentiscini  
 ex quo destillat mastiche: Cum igitur mastiche sit nobile contra catarrhos,  
 nullum dubium est, quin ligni lentiscini decoctum sit egregium. Cui ligno ta-  
 men ceu raro potius decoctum ligni juniperi potest substitui. Pertinet huc deco-  
 ctum catarrhale Mynsichti; item vina medicata contra catarrhos, quæ inter  
 decantatum est illud Paracelsi ex rad. caryophyll. & acori adulterini. Vid. Hartm.  
 Prax. Chym. c. 21. Vid etiam Poter. Cent. 3. c. 68. Sic Lindannus

℞. Lignum sassaf. ℥ij.

rad. caryophyll. ℥j.

herb. rorism. re. ent. ℥ss. affundit

vini generosioris ℥viij. coquit leni in Δ, vase clauso, hor.

6. ve' 7. removel ab Δ ut refrigescat & bibatur subinde inter cibandum; vinum  
 vilis compositionis sed egregiarum virtutum; Caryophyllata radix dicit, admira-  
 bilis est in emendendo sanguine & confortando ventriculo &c.

℞. Lign. Guajac. ℥iij

Rhodin.

sassaf. gum. an. ℥iij.

Cor. Tamarisci ℥iij.

Herb. absinth. Mj.

scolopend.

lupul.

menth.

hyssop. an. Mss.

Rad. helen.

cent. maj.

Zedoar.

cinamom. an. ℥j. affunde vini mens. IV. stent in infuso, de

quo semper sumatur haustus bonus in principiis passus. Pertinet huc vinum

Hadriani Papæ dictum, contra catarrhos, alias admodum decantatum vid. lib. I.  
 Prax. Sennert. ubi de catarrh. p. 712. Præter hæc succinum certè est appropria-  
 ff 3 tiffi-



tiffimum affectibus catarrhosis remedium, tam internè quam externè usurparum, sed solito modo *preparatum*, seu quod melius cum *essentia serpilli*. Fit enim *essentia sic catarrhalis* D. Mich. it. *Elaosacch. ex oleo destill. succin. & volatil. succin.* & cum eo ritè paratus *liquor CC. succinatus*, sunt expertissima contra catarrhos, quorum loco & alia *& volatil. spir. & ci anisat. bals. nervin. D. D. Schafferi Archiatri Francof. Celeberrimi*, ex 6 vol. CC. 6\*. ol. mac. & spir. vini & c. possunt usurpari, tam *curativè* sudorè movendo, quam *præservativè*, contenta corporis alterando. *Myrrhata* ad aliquot grana propinata, aut cum *tinctura tartari in essentiam* soluta proficua sunt. Item ipsum sulphur, & ex eo ritè parati *flores* optimè conveniunt in catarrhis, seu in formâ sicca usurpentur, seu in forma liquida, *bals. sulph. succinat. juniperin.* De *Opiatis* supra dictum est, ad quæ pertinet *theriaca* tam recens, quam *vetus*, à Veteribus imprimis ad præcavendum, item ad sistendam excretionem catarrhalem nimis ruentem usitata.

Quoad *externa* applicanda locis glandulosis & locis catarrhos fundentibus vicinis, hæc ipsa nunc sub formâ *suffinis* usurpantur, ut melius penetrant, præsertim in capitis ejusque partium catarrhis, nunc *litus* forma conveniunt, qui parantur ex *oleis destillatis succ. menthae, majoran. &c.* Observando tamen ut si ejusmodi *olea* penetrantiora & membranas sensiles magis afficientia partibus extus admovenda sint, talia subjecta vim eorum penetrantem ferre queant, cum qui capitis sunt debilioris, ab hujusmodi fumosis lædantur, & vel solo odore sternutatio & incipiens coryza iisdem excitetur. Ulterius *emplastrum de betonic. gumm. tacamahac.* sunt optima anticatarrhalia, si *malaxata cum oleis appropriatis* emplastri forma applicentur. Pertinet huc *fumi tabaci haustus* in catarrhis caput infestantibus non contemnendus nam ejus & volatile penetrat, abstergit & resolvit hostile illud irritans, lympham vitiosam corrigit, unde crassam ac viscidam attenuat, abundantem evacuat & ratione virtutis narcoticæ insigniter conducit ad motus catarrhales feroces sistendos. Quod si *tabaco* addatur *sem. anisi, coriandri, succin. &c.* erit eò magis appropriatum.

Quoad catarrhos, qui *membra externa obsident*, in specie qui ex refrigeratione post aliqualem sudorem superveniunt, & dolorem plus minus lancinantem inferunt, in his cavendum ab *oleosis*. Hæc enim inuncta crustam quasi inducunt cuti, porosque replent. In tali casu optimum est *Gummi Tacamahaca* solutum in vino, atque extensum super alutam imponere parti, si non bene hæreat, addi debet tantillum *terebinth.* Hoc resolvit illas humiditatees, unde sub *emplastro* illo plerumque sudant membra: Cum hoc ipso licet interdum conjungere *gumm. carannæ*, hujus part. j. ad illius p. ij. Quod si fiat, ut cutis non bene ferre queat *gummatum* applicationem, sed tollatur in pustulas, potius *tinctura* cum *S. V.* extracta usurpanda veniunt; nempe infunduntur ea *aromatica*

thæ, quæ vim  
v. g. sem. 4. c.  
parata essent  
partis, quam

Speci

vulgo

Gracis, Latin  
actis per nar  
coloratus in  
intrus oblinu  
narium, oris  
rium membra  
odoratum.  
relinquit, sp  
lymphæ fiat ex  
effluat, vocat  
rium primit  
ruborem nar  
infert.

Ca

munes, in sp  
naturæ spon  
purgantur, s  
dem inclemen  
expositas infi  
sequuntur, o  
inclementor  
membranarum  
à qua in nar  
do, oriuntur  
nec ab æt  
nutrimentum  
fluendo, in  
laryngem in  
tem concreta



rica, quæ vim habent attenuandi, penetrandi, resolvendi & ita simul calefaciendi v. g. *sem. 4. cal. majora, eruc. sinapi, majoran. salvia, serpilli &c.* ex quibus ipsis parata essentia seu *tinctura* diluta applicantur externè & tam præmissa frictione partis, quàm cum frictione imponantur & desuper lintea probè calefacta.

*Speciales inter catarrhos frequentissimus catarrhus narium*, qui vulgo

## CORYZA

Græcis, Latinis *gravedo* dicitur. Est quando copiosa lymphæ, tenuis & acris per nares defluit, quam successivè liquor crassus, spissus varieque subinde coloratus insequitur. *Naturaliter* equidem à lymphæ insipida moderatè crassa intus oblinuntur nares, cujus vasa & fontes vid. in *Stenone de glandulis oculorum, narium, oris &c.* quæ ipsa lymphæ blande humectat non tantum internam narium membranam & defendit ab externis inspiratis, sed etiam suo modo faciliat odoratum. Ipsa tamen continuo aëris inspiratu attenuata, crassiores partes relinquit, spissioris sub mucis formâ emungendas. *Quodsi præternaturalis lymphæ fiat excretio* ita, ut copiosa, tenuis, sicque minus temperata, sed acrior effluat, vocatur *coryza*, dum lymphæ ista acrior rodendo membranam narium primitus *sternutationes* frequentes, deinde ex rosione *dolorem*, hinc *ruborem narium*, interdum etiam earundem *excoriationem & exulcerationem* infert.

*Causa* hujus coryzæ præter causas generales omnibus catarrhis communes, in specie præter vitium lymphæ & M. S. internum, quæ interdum motu naturæ spontaneo per hæc loca, tanquam emunctoria quædam auspicio expurgantur, sæpissimè oriri solet ex errore externo, in specie aëris vitio, seu ejusdem inclementia hybernâ aut autumnali. Hybernus enim talis aër partes sibi expositas insigniter frigore alterat, quam faciei, labiorum & manuum fissuræ insequuntur, optimè per lotionem cum *urin. human.* curandæ. A simili igitur aëre inclementiore læsa interiora narium & simul faucium ac laryngis ex irritatione membranarum copiosam fundunt lympham, puram, tenuem, adeoque acrem, à qua in naribus coryza, in faucibus asperitas & dolor, in larynge tussis & raucedo, oriuntur, unde profluunt in principiò saltim serosa & viscosa, acria tamen, donec ab aëris & simul lymphæ vitio læsa & nonnihil excoctæ partes, plorent autimentum propriū, sub formâ mucilaginis crassæ, quod narium suprema obstruendo, inspirationem tollit, in faucibus hærens, secretum copiosum infert & laryngem incrustans, frequenti tussi rejicitur: Quin non rarò in saxeam duritiem concrevit, observante *Henr. ab Heer obs. 28.* Præter aërem etiam *sternu-*

*tatoria*



*catoria acriora*, nimisque frequenter usurpata, continuo stimulo membranarum irritando, copiosam lympham effluere faciunt, imò *coryzam* produciunt, si continentur. Hinc etiam *fumi minerales* inspirati *coryzam* inferunt.

Quando est à *causa externa* *coryza*, eidem *frequentem sputationem* ac *tussim* supervenire videmus, partibus scilicet istis, per quas aer rigidus transit, copiosis glandulis obstitis, omnibus tamen latis & irritatis, hinc catarrhum plorantibus; imò ex partibus istis ita affectis exhalantia miasmata *fermenti* quasi naturam obtinent, unde & *contagiosa* percipitur *coryza*, ita ut ista effluvia aliorum naribus attracta, seu per lintea, seu per pocula communia irritativa sua acrimonia & hinc partis ac lymphæ alteratione, similem *coryzam* etiam alteri sano inferant. Hinc falsum est, quod *coryza* sit semper salubris, ut vulgò dicunt; *Der Schnuppen sey gesund/ und nehme viel böses weg.* Nam utut hoc verum sit, si à causa internâ oriatur, non tamen semper procedit negotium, cum talia potius fiant in naribus & faucibus, quam quod aliò deferantur. Conf. *Helmone Tr. Tussis & Asthma.*

Quoad *prognosin*, *coryza* periculo caret, modò non acrior lymphæ exulceret interiora narium, & ita *ozenas* vel *narium ulcera* producat.

*Cura* communis cum aliis catarrhis; in specie si à *causa interna* oriatur, maximè tum conveniunt *externa vel naribus* applicanda, *vel vertici* inungenda, *vel in ore* masticanda, vel inspiranda. Omnia hæc eò conspiciant, ut *vel lesionem* inductam, vel irritationem sistant, *vel mucum* productum abstergant & evacuent. *Præ* in principio, *posterius* in statu morbi locum obtinet. Quibus ipsis pro conditione subjecti patientis & ipsius *catarrhi*, vel *epidemic*, vel *non epidemic*, copiosioris vel parioris, nunc blandè *laxantia*, nunc in specie *sudorifera* socianda veniunt.

Ista ergò quæ pro *priori scopo* naribus applicanda, sunt *balsamus apoplecticus*, vel alia *olea destillata aromatica*, quæ naribus sedulò illita à *coryza* eosdem præservant. In specie *ol. destillat. anisi* mox in principio illitum ante excoriationem narium est egregium, uti etiam in progressu ad crassitiem materiæ superiores narium partes obstituentis attenuandam egregium est *ol. anisi*, si eo illinantur intrinsecus nares. Quod si jam nares cum rubedine doleant & excoriatae sint, cū *polenta* subigatur dictum *ol. anisi* & ita applicetur. *Camphoræ* & *ol. amygd. dulc. soluta* & naribus extrinsecus inuncta egregium experimentum habetur pro sistenda *coryza*; quæ etiam subito sisti dicitur solo odore percepto ex *cornubus raspatis*, v. g. in præparatione pectinum, vel si alia *cornua* applicentur naribus. Pertinent huc *suffitus*, qui inspirati alterationem ab aëre tollunt, quos inter excellit

*suffitus*

*suffitus ex gum-*  
*ptis, qui &*  
*proinde hos a-*  
*quoque solent*

*Pertinet huc*  
*nimis crassa*  
*suffitus acris*  
*evacuatur, co-*

*Ulterius pul-*  
*proritando f-*  
*niam crassam*

*Pulv. sternu-*  
*helleb. nigr. p-*  
*ex vitriolo a-*  
*gr. v. l. vj.*  
*tebras emul-*

*Quod*  
*Pernovian.*  
*Paris*



*suffitus ex gummi animæ* optimus omnium; naribus, ore & toto corpore exceptus, qui & vitium lymphæ corrigit, & lationem jam inductam mitigat & proinde hos affectus curat; præterea ex *succino, mastiche* & similibus parari quoque solent. v. g.

℞. Succin.

Gummi animæ an. ℥ij.

Thuris.

Mastich. an. ℥j.

Benzoes ℥ij. M. F. pulv. D.

S. Rauchpulver zu den Glüssen.

Pertinet huc & *suffitus tabaci* aliquot gutt. *ol. destillat. anisi* prius imprægnati; ubi nimis crassa nimisque viscida fuerit materia, quæ nares obstruit, optimus est *suffitus aceti super ferrum candens effusus*. Ut autem in statu jam coacervatus mucus evacuetur, convenit *nodulus*, v. g.

℞. Fol. majoran. p. iij.

sem. nigell. contus. ℥ij.

ol. destillat. majoran. gt. iij.

succin. anis. an. g. vj.

M. F. Nodulus D. cum stylo S. Riechpüschlein.

Uterius *pulveres sternutatorii* appropriati non nihil conveniunt, quoties lymphæ proritando fluxum, ejus beneficio membranas narium abstergunt, quin & materiam crassam & viscidam eliciunt. v. g.

℞. Pulv. tabac. Indic. ℥℔.

majoran.

fl. lilior. convall. aa. ℥ij.

ol. destillat. anth. gt. vj.

caryoph. gt. iij.

Ambra gr. vj.

moschi g. ij. M.

*Pulv. sternutat. Helmontii* etiam hoc puncto expertus; fit ex *anasacch. & grad. belleb. nigr. pulverisat.* & naribus attractis. Optima denique *sternutatoria* fiunt ex *vitriolo ad albedinem calcinato in ∇. majoran.* diluto & hinc filtrato, ita ut gr. v. l. vj. pro ℥j. sufficiant. Liqueor is naribus attractus qualvis narium latebras emungit. Optimè quoque obstructionem narium resolvit in statu coryzæ.

℞. Ol. Nicotian.

jriani an. ℥j.

stillatit. maj. gt. vj. M. naribus intrinsecus illinendum.

Quod si caput perturbatum sit grave & obnubilatum, convenit vel *balsam. Pernuvian.* vel ubi fortius agendum *ol. destillat. succini*, aut ejusdem *balsamus*

Part II.

gg

vertici



vertici illitus, unde dolor capitis tensivus ejusque perturbatio successivè remittunt. Quod si pro derivatione lymphæ catarrhalis prius pro præservatione partium oris aliquid agendum sit, conveniunt *trochisci ex Mithridatio & olivano* facti & in ore retenti. Catarrhum enim & læsionem partium sistunt, & in principio inprimis conveniunt. Ex his quæ modo dicta sunt, *faucium phlogosis & dolor, gustus abolitio, raucedo & tussis, coryza* graviori ordinariò supervenientes faciliè deduci possunt, cum omnia partim ex læsione per causam externam facta, partim per lympham ex glandula pituitaria superiore in *coryza* depluente & hinc ad fauces descendente, & ita loca vicina magis magisque irritante originem ducunt. De qua membrana pituitaria & per hanc transudante *coryza* vid. *Schneid. partim Tr. de ossè cribiform. p. artin Fr. de Catarrhis.*

Quoad *curam* horum observetur, quod præter *suffitus* supra insinuatos specialius *opiat a tempore vespertino* adhibita conducant. Deinde ubi ex lymphæ acriori partium affectarum dolores, rubores, phlogoses, superveniunt, *acrimoniam temperantia* usurpanda, quæ aliàs *incrassantia* dicuntur, & quæ inter *papaverina* eminent. Si jam viscidior mucus hinc genitus istas partes obsideat, *incidentia*, seu *expectorantia* vulgò dicta usurpentur, *de quibus pluribus jam supra, ubi de Tussi.* Mulierculis nostratibus præservativum tussis & raucedinis ab aëre frigido præbent *passula majores, macerata in spiritu anisi*, quarum aliquot manè jejuno stomacho masticatæ & deglutitæ præservant fauces & asperam arteriam à læsionibus aëris hyberni. Inductos vero jam catarrhos faucium & laryngis ferè curant *per ficus* quibus in frustula dissectis S. V. infundunt & hunc deflagrare sinunt, continuò agitando; hinc frustula illa semiasata vespertino tempore comedunt & sic tussim & asperitatem faucium egregiè demulcent.

*Inter speciales catarrhos est etiam epiphora, de qua supra. It. tussis, raucedo, de quibus supra.*

*Quod si lymphæ vitiosè moveatur ex glandulis vel circa glandulas conglobatas, per vasa lymphatica, ita ut in suo motu stagnet, & hinc loca vicina occupet, adeoque tumorem inferat aquosum*

## HYDROPE PARTICULARES

sequuntur: & ut in *hydrope universali* semper ad glandulas & vasa lymphatica plus minus respectus habendus sit, quoties aquosas collectiones plus minus intendere, aut pertinaciores reddere valent; tamen cum vix in universo corpore lymphæ motus per vasa lymphatica impeditus suspicari queat, propterea magis *hydropes particulares* hujusmodi lymphæ in motu impedimentum respicere



respicere videtur. Sanè ubique per corpus & quælibet viscera dispersa sunt lymphatica, ita ut in his lymphæ contenta, si in motu suo impediri contingat, cum interim continuus ejus sit proventus, non potest non in ista parte, ubi fit motus impeditus, *tumor aquosus seu hydrops particularis* excitari, tam in partibus internis, v. g. ex lymphaticis pulmonum, aut lymphaticis glandularum pectoris, hydrops pectoris, ex lymphaticis hepatis, aut lienis, aut testium hydrops ascites & hydrocele, ex lymphaticis capitis hydrocephalus, quam in partibus externis ex lymphaticis artuum, tumores serosi particulares.

*Causa*, propter quam non moveatur lymphæ in ordinariis vasis, est aut ruptio, aut erosio vasorum lymphaticorum. Si enim in loco quodam glandulæ, aut ex his derivata lymphatica obstruantur, & tamen lymphæ collectio in glandula, aut ejus cursus in vase ita impediatur, necessario lymphæ in parte colligitur. Vase ita obstructo à materia viscida, hoc à lymphâ per istud pulsâ insigniter distenditur, tandem rumpitur & ita lymphæ successivè effunditur; vel si ipsa lymphæ acrior, aut alias quicunq; humor corrosivus ipsi permixtus est, lymphatica tenella exinde eroduntur, unde etiam naturalis lymphæ motus in istâ parte impetitur, adeoque aut ruptio, aut erosio vasorum lymphaticorum occasionem his tumoribus aquosis particularibus maximam partem suggerit. Hinc est, quod *hydatites viscerum*, *Wasserbläsigen* in visceribus, in specie hepatis & lienis observatæ, sint aut prodromi, aut comites *hydropis abdominis particularis*, ut rectè observat Schenck. l. 3. obs. it. Plater. obs. p. 596. Similes hydatites in pulmone subinde observantur teste Pisonè in Tr. de Colluvie serosa, in hepate ap. Panarol. Pentec. 5. obs. 16.

Præ aliis autem partibus in hepate & pulmone observatæ fuerunt hydatites, quoniam viscerum horum vasa lymphatica exteriora magis ambiunt, & hinc humorum horum collectiones fiunt magis conspicuæ. Sunt enim hæ hydatites vesiculæ aquâ turgidæ, natæ ex vasis lymphaticis, in quibus lymphæ stagnat, eaque sensim distendit, à qua intra valvulas intercepta spatiosa ista intermedia tumescunt & ita vesicularum vasorum faciem representant. Quod si rumpatur una alterave harum minutarum vesicularum, lymphæ à membrana tenui viscus ipsique superstructa vasa lymphatica investiente decidunt, ut ita vesicæ sensim majores & grandiores oriantur, donec & his ruptis vix collectæ in cavum fiat effusio, & ita hydrops inferatur.

Illustrant hæc magis *ascites seu hydropes abdominis vesicales*, h. e. in quibus v. tumorem faciens non in cavo ejus fluctuaverit, sed potius copiosis & innumeris vesiculis inclusa observata fuit. Vid. Sennert. ubi de hydrop. Tulp. l. 2. obs. 34. Hofer in Hercul. Med. p. 143. Horst. l. 10. obs. p. 513. 529. Baribol.



Cent. 4 ep. p. 370. It. *Act. Med. Hassn. vol. 1. p. 17* Hæ ipsæ *vesiculae aut lymphaticae sunt vasa*, à lymphâ stagnante modo supra dicto in vesiculas elato, aut saltem vesicæ hæ sunt ex ruptis lymphaticis, ita tamen ut lymphæ effluens à membranis ambientibus supra dicto modo coerceatur.

Cæterum frequentior præ cæteris hydropis particularis speciebus est *hydrops abdominis*, five

## ASCITES

idque duplici ex ratione. 1. *Quia plura continet viscera*, eaque omnia plus minus copiosis propriis lymphaticis instructa, quibus accedunt lymphaticæ ab inferioribus partibus ad receptaculum commune adscendentia. 2. *Quia mesenterium instructum est vasis lacteis*, chylum vehentibus, quibus exelis *ascites* sequitur. *Lactea* igitur hæ cum sint ejusdem naturæ cum lymphaticis, iisdem pathematis quoque erunt obnoxia. Et hanc chyli in abdomen per nonnulla lactea, ex occasione quarundam glandularum obstructarum destillationem, unam ex communissimis causis ascitis arbitratur *Sylvius lib. 1. Prax. c. 17*. Hæc quæ dico de vitii vasorum lacteorum & glandularum mesenterii confirmant *exempla asciticorum*, in quibus reliquis visceribus salvis, mesenterij tantummodo glandula obstructæ aut scirrhusæ inventæ fuerunt, it. quando ex ulcere mesenterii, in quo necessario exesa fuerunt lactea, observatus fuit *hydrops*, quod confirmat *Rondeletius in sua praxi c. 35. Conf. etiam Tulp. l. 2. obs. c. 32. & 33. it. Höfer in Herc. Med. p. 143. it. Höchstetter Decad. 6. Conf. 6*. Et ubique prostant observationes *hydropis* nati ex affectis mesenterii glandulis. Hinc enim destillat serum plus minus chylosum in abdomen, ruptis lymphaticis aut lacteis, ex hac causa, quod frigidum haustum, aut sub æstu febrili, aut nimio calore, aut exercitio corporis interdum *subitaneum sequatur ascites*, *Conf. Piso de colluv. seros. Sennertus l. 3. de Hydrop. p. 411. Riv. Cent. 2. obs. 65*. Rationem hujus rei reddit *Sylvius loc. supracit. c. 17*. hanc, quod pituita intestinorum naturalis à calore attenuata & hinc fluidior reddita ex intestinis in vasa lactea penetret, quæ postmodum à superveniente frigore denuo spissata vasa lactea & glandulas obstruat, unde vasis distensis & ruptis magis vel minus *hydrops subitaneus* sequatur, prout plures vel pauciores lacteæ hoc modo fuerint affectæ. *Vide in specie Sylvij Tr. de Hydrop.*

*Definitur* igitur *ascites*, seu *hydrops abdominis particularis*, quod sit collectio  $\nabla$ arũ seu colluviei serosæ &  $\nabla$ osa in abdominis quadam insigniori cavitate, v. g. vel in ipso abdomine intra peritonæum, vel intra duplicaturam peritonæi, vel intra cavum omenti, vel intra partium membranas vesiculari forma, quorum modorum hinc inde ap. Practicos leguntur observationes. Non possum, quin,



quin, quæ de Ascite particulari habet *Lindanus*, proferam: Quæritur, dicit, quid sit *Hydrops siccus Hippocr.* sect. 4. §. 11. Omnes autores dicunt, hic intelligendum esse Hydropem *Tympanitidem*. Sic sequuntur præcessorem *Galenum*. Ego ex *Hippocrate* & aliis monstravi, esse intelligendum *Ascitem*. Sed quomodo? Sunt duo *Ascitis* species, una est, in qua ab aquis collectis non tantum venter tumet, sed etiam scrotum, & pedes ubi interdum pustulæ aperiuntur & effluit humor. Hæc *ordinaria* est species. Sed videbitis *aliam*, ubi nullus in scroto tumor, neque in pede, sed in abdomine humor colligitur, pedes autem contabescunt & marcescunt, ut squamas concipiant. Cætera vix offibus hærent, facies est squalida. Et hic est *Hydrops siccus Hippocratis*. Dicitur igitur *siccus* ab illa ariditate, squalore & macie totius, & hydropica aquea sunt lutea, quæ expurgantur. In *hydropse sicco* urinae sunt splendide, instar  $\Delta$ is, planè croceæ, instar ictericorum, sed non habent illam crassitiem, paucissimæ, vix duo vel tria cochlearia, in  $\Delta$ em effusæ ardent. Hæc *Lindanus*. Idem *Hydropem* hunc ab *intemperie calida*, ut vocat, oriri asserit, quando sanguis colligatur & uritur in ichorem acrem. Talis esse solet, quæ immediatè post febres ardentes sequitur. Hæc *Lindanus*. Exemplum huiusmodi *Ascitis* particularis vid. in spec. in *Hochstett. Decad.* 10. cas. 7. p. 419. nem *Act. Medic. Hassn.* vol. 1. obs. 78.

Quoad causas, equidem *Lindanus* eam semper à colliquatione oriri asserit, quod tamen vix universale videtur. quando plausibilis etiam fit *lymphæ chylosæ alteriusque impeditus motus* per vasa lactea, unde pariter omnia illa supra enarrata symptomata derivari possunt, quam causam hic allegat *Sylvius lib. 1. prax. c. 17*. Sed præter hos *sciendi modos* scitu- ulum movet, quod vel *sanguinis* subito facta *suppressio*, vel etiam extrinsecus facta in quodam loco *contusio*, & ita in interna quadam parte sanguinis effusi facta *congruescentia* interdum disponat ad hydropem huncce, ut v. g. ex *suppressione lochiorum* talem *ascitem* particularem, in qua copiosissima aqua in omenti cavitate collecta fuerat, observari, & pariter in quodam mechanico, qui ex *contusione* extrinseca in latus sinistrum facta, brevi post abdomine & scroto tumidus factus & sic tandem interiit. Forsan huc facit experimentum *Lovveri de Corde* p. 124. & 125.

Quoad *prognosin* periculosus est omnis *Ascites* particularis, minus tamen isto, qui est *universalis*, omnis tamen curatu difficilis.

In cura incumbendum, ut *aquositates collectæ evacuentur*, & hinc cause interna removeantur. Prims fit per *purgantia*, *sudorifera*, speciatim *diuretica*, & inprimis per *paracentesin*, hæc optimam. Quo-



ad posterius, de cura hydropis hujus sicci ita pergit *Lindanus*: In hoc Ascite, dicit, nulla curatio melior est, quam non purgare, sed uno & simplici remedio, uti, nempe vino Rhenano & nitro dare quotidie nitr. ʒss. idque per 24. horas, nō, simul & semel, sed multis vicibus, & quoties bibunt aliquid depuratissimi nitrī, v.g. ʒj. addere, & nil præterea agere. Nam quantò magis expurgabis, tantò magis mox intumescunt, & lotia eò magis indies splendescunt, & inflammantur. Temperandus itaque sanguis. Nitrum enim sedat sitim, attemperat æstum & ciet urinas. Et quando hæ non amplius splendent, jam superatum est malum, & tunc oportet addere bonum aliquod conditum corroborans & confortans.

Quod si vitium hæreat in vasis lymphaticis aut lacteis, obstructions factæ solvantur, erosiones consolidentur, id quod bina *diuretica* aut *sudorifera* mukum obstruentem dissolventia præstant. *Conf. Acta Med. Hassn. Vol. I. obs. 195.* Consolidatio ferè spontè procedit. Sed in specie quoad hanc medendi methodum, *vid. Sylv. l. I. prax. c. 19.* Quod si vitium sanguinis congruati aut aliâ ex causa collecti morbum intulerit, per *appropriata* naturæ succurendum, de quibus jam supra

Hydrops inter particulares etiam observatur secundò.

## HYDROPS PECTORIS,

affectus equidem rarus, hujus tamen bina notabilia *exempla* vid. in *Pison. Tr. de Colluv. serof. Conf. etiam Willis Pharm. rat. vol. 2. sect. I. c. 13.*

*Causæ* sunt eadem cum aliis hydropis speciebus, nempe *nunc vitium est in M. S.* quando v.g. simul cum hydropse universali, vel cum hydropse omnium partium inferiorum simul etiam conjungitur superveniens hydrops pectoris; *vel vitium est in vasis lymphaticis & lacteis*, per quæ impedito lymphæ motu hujus ex vasis ruptis effusio & hinc in pectore collectio supervenerit, unde frequenter *ex hydatidibus in pulmone* observatis *hydrops pectoris* natus fuit. *Vid. Barth. Cent. 2. Hist. 66.* Nam & hic lactea pariter & lymphatica subinde primariò consideranda esse, non saltim confirmatur à *Barthol. Cent. 3. ep. pag. 327.* sed etiam in primis à *Willis Pharm. rat. vol. 2. p. 261.* Curiosa est observatio *Meaeræ in histor. Med. p. 153.* Hydropis nempe pectoris ex discussa hydrocele oborti. Sane jam olim *Laurentius in sua Anatome* observat singularem consensum pectoris cum testibus, adeo ut ipse notaverit, à tussi vehementi ortam *hydrocele*m. Aqua hæc in *hydropse pectoris nunc* in utraque thoracis parte, *nunc* rarius in altera ejus medietate hæere observatur.

Observatur autem in thoracis hydropse dolor gravans in pectore ob materiæ aquo-

aquosa colle-  
ger corpus m  
difficilis, ea  
ctu intendi a  
Hassn. vol. 2.  
venit, subind  
pis pectoris v

Quo-  
drops, cum  
curatus fuen  
adeò diutur  
eant agri.  
obs. 4. & 16.

In c  
teriores pector

Pharmacopœia

locum habe

nias & hinc

rui cum (m

Conf. & W

Sic benefici

4. obs. 71.

ratis qua m

sanguinis sp

Porro

qui uno no

solet esse t

autaneas &

cerebrum,

rebri, sua c

inferens.

cit. Resalim



aquosa collectionem, & plerumque  $\nabla$  fluctuantis sonitus in pectore, dum ager corpus movet. *Tussis* accedit *sicca*, cum nil excerni queat, *respiratio* est *difficilis*, eaque continua, subinde urget *Orthopnœa* & inprimis vesperi ac noctu intendi admodum difficultas respirationis observatur. Vid. *Act. Med. Hassn. vol. 2. p. 2. 98.* *Appetitus prostermitur*, subinde *palpitatio cordis* supervenit, subinde quoque *febricula* accedit &c. de quibus symptomatibus hydro-  
pis pectoris videndus inprimis *Piso loc. cit.*

Quoad *prognosin*. Rarò felicitis & fausti ominis esse solet hic hydro-  
drops, cum sæpe ad mortem deducat. *Et licet* idem medicamentis quibusdam curatus fuerit, aut ager post apertionem thoracis levamen senserit, non tamen adeò diuturnum esse solet hoc allevamentum, quin recidivante malo intereant acri. Vid. *Tulp. lib. 2. obs. 16. River. Cent. 1. obs. 83. Salmuth. Cent. 2. obs. 4. & 16.*

In cura removenda sunt aquæ, & firmandæ seu roborandæ partes *interiores pectoris*. Pro evacuatione conveniunt eadem, quæ in Ascite, tam *Pharmaceutica* quam *Chirurgica*. Quoad *Pharmaceutica*, eadem locum habent *evacuantia*, quæ in Ascite universali, inprimis *succus bryoniae*, & hinc *succus ireos nostratus* laudatur ab *Hartmanno in prax. Chym. Riverius cum suc. bryon.* curavit aliquot hydro-  
pes pectoris, vid. *Cent. 4. observ. 3. Conf. & Willis cit. loc. p. 269.* Hinc ea, quæ sudorem movent, sunt optima. Sic beneficio *decocti sudoriferi* in fene hydro-  
pem pectoris curavit *Riverius Cent. 4. obs. 71.* Quoad media *Chirurgica*, omnium optima *paracentesis thoracis* quæ maximè salutaris. De qua vid. *Willis Pharm. rat. vol. 2. p. 163, ubi de sanguinis spatio.*

Porrò ad hydro-  
pes particulares pertinet etiam tertio

## HYDROCEPHALUS,

qui uno nomine est *hydro-  
pes capitis*. Hic ratione subiecti ordinario solet esse *triplex*. *Prima species est*, quando aquæ colliguntur *intra partes cutaneas & cranium*. *Secunda est*, quando  $\nabla$  colligitur *intra cranium* & ipsum *cerebrum*, seu *infra meninges*. *Tertia*, quando  $\nabla$  colligitur *in ventriculo cerebri*, suâ copîâ *cerebrum* & ipsam *calvariam* distendens, & ita *hydrocephalum* inferens. *Priorum exempla* sunt frequentiora: *Posteriores* mentionem facit *Vesalius de structur. corporis humani l. 1. c. 8.* Præter hunc simile exemplum refer-



refertur à *Tulpio l. i. obs. c. 24.* de puero quinquenni, *hydrocephalo* mortuo, in quo libræ 5. aquæ in capite inventæ sunt. Cerebrum autem amissâ figurâ globosâ induit figuram convexi fornici, & ab exuberante aquâ adeo fuit distenta medulla ipsius cerebri, ut instar membranæ crassiusculæ adhæresceret cranio, manentibus tamen semper salvis operibus naturæ; seu in utroque ventriculo seu latere colligantur  $\nabla$ , seu in alterutra saltim medietate cerebri  $\nabla$ arum *hydrocephali* collectio fiat, cujus exemplum vid. in *Tulpio Cent. 2. observ. 25.*

Quoad *causas*, frequens in primis malum est *Hydrocephalus* infantibus, propter ossium capitis facilem dehiscenciam & eorum obsequenciam, rarius adultis. Materia collecta ferè est *lympha*, adeoque & hic ad *lymphæ* ductus respiciendum est, ut non tantummodo vult *Paulus in Anatome Anatomia Bilsiana p. 85.* sed vel maxime confirmat *Hertod. in Crocolog. p. 282.* de puero, *Hydrocephalo* mortuo, in quo mortuo vasa *lymphatica* cerebri partim turgida, partim rupta visa. Quoad *remotas causas* infantes in primis ad *hydrocephalum* disponentes, inter alia est *simus* infantis in utero, dum forsan nimis inclinato capite aliquandiu sit situatus, *hydrocephalum* ex impedito *lymphæ* reditu contrahit; qui infantes *hydrocephalo* laborantes in utero matris necessario partum difficilem inferunt. Aliàs & *imaginatio materna* signando fœturi potest inducere *hydrocephalum*. vid. *Hildan. C. 5. obs. 3.* item *Marcell. Donatus Hist. Medic. mirab. l. 2. c. 1.* Rarius observatur *hydrocephalus* in adultis, in quibus propter ossium cranii firmiorem compagem futuræ discedere nequeunt, adeo ut potius alios morbos aquæ in cerebro collectæ inferant. Non tamen sunt nulli; nam puellam *hydrocephalam* notat *Panarolus Pentecost. 5. obs. 47.* septimo anno pereuntem, in qua aqua partim per quasdam futuras dilatatas, partim per cranium perforatum egressa erat, utut externè extra cranium partes in adultis intumescere posse in *hydrocephalo* extra dubium sit. Sic *Piso in elegantiscripto de Colluv. ferof.* notat *hydrocephalum* in puellâ 22. annorum qui semel hinc recurrebat, scil. lentè subsidens vix dum mense à decubitu peracto brevi post periodicè repetens. *Zacut. Lus. l. 3. prax. admir. obs. 12.* stupendum refert *hydrocephalum* curatum in viro, cujus caput caput bovis æquavit. Interdum præter solas aquas observantur simul flatu collecti, *hydrocephali* tumorem augentes.

Conditiones & circumstantiæ tumoris facilè rem innuunt, visui quidem ac tactui *hydrocephalus* patet, sed si adsint flatulentiæ, caput leviter pulsatum instar tympani resonat. Si vero digito prematur tumor, hic aut non recedit, aut si non nihil recedat, ad pristinum illico redit statum. Sin verò humor sit collectus,



*Est*, & quidē extra cranium, caput quasi splendescens observatur, nullum, si percutiatur, edit sonum, digito prementi facili cedit, & non statim ad pristinum revertitur. *Quod si inter cranium & cerebrum contineatur, tumor* tactu non adeo mollis est, nisi valida fiat compressio, frons quasi exprorectus est, intentis oculis vident, qui tumidi & lachrymantes conservantur, ac concurrunt ferē insignis sensuum hebetudo. Quibus absentibus circumstantiis, tumente nihilominus insigniter capite, suspicio est, in cerebri ventriculis radices egisse hydrocephalum.

Quoad *prognosin*, hydrocephalus externus seu supra cranium facile curatur, internus seu intra cerebrum difficillimē, quia supervenientibus variis iisque gravissimis affectibus moriuntur ægri. Inter cranium & cerebrum collectæ aquæ subinde, utut difficulter, curari solent.

*In cura* 1. aqua evacuanda. 2. Cerebrum appropriatis roborandum.

*Qua evacuant*, vel sensibilibus, per quasvis vias & modos exhauriunt: Vel insensibilibus discutunt. *Evacuantiæ* pro robore subjecti patientis sunt determinanda, præsertim in infantibus, in quibus *Æius dulc. cum syr. ros. solut.* propinatus convenit. Sicuti adultis eadem quæ in Alcite in usu sunt, conveniunt, v.g. *Elaterium, succus rad. ireos recent. &c.* *Clysmata* quoq; tam infantibus quam adultis egregiē profunt. Sic *D. Michael* famulum cuiusdam Mercatoris huius loci hydrocephalo laborantem *clysmatibus* restituit. Laboraverat autem antea hydrope in partibus inferioribus, quo soluto tumor quasi ad caput raptus fuit, ita ut non tantum cutim valde distenderit, sed & oculos ex cavernulis foras protruderet, quin & organa aliorum sensuum laderet, & idem bruti ad instar in lecto jaceret. Sed iussu *D. Michaelis* *clysmæ ex herb. soldanell. gratiol. fol. ebulli, asari, flor. sambuci, genist. persicor. cort. interior. sambuci, frangula, rad. ireos nostrat. esula & pulpa colocynth.* in urina coctis parabatur, quo applicato factis simul aliis faciendis sanitati restitutus fuit.

Alias *tinctura tartari* infantibus commodē propinatur pro stimulanda urina, sicut *Poter. Cent. 1. obs. c. 2.* pro hydrocephali cura *destillatum Paracelsi antihydropicum* commendat. Verum istis & similibus internis præferenda ferē *externa discutientia*, & vel insensibilibus resolventia, vel sensibilibus evacuantia. Inter illa sunt *cataplasmata* & *fomenta* facta ex *chamomill. melilot. artemisia, stoechad. Arab. calamintha, roremarin. absinth. origano, pulegio*, quibus *sarinæ fabar. lupinor. sterc. columbin. caprill. sem. anisi & cumini* ac similia addi possunt. Item usurpetur *unguentum Foresti* l. 3. *Chirurg. obs. 6.* R. Ol. chamom.



mom. ℥iv. sulphuris ℥j. probe invicem mixtis & ita illitis, cui si addatur parum olei destill. succini, vel alius unguentis addatur bals. sulph. terebinth. aut juniperin. erit discussivum eo potentius. Avicenna jam olim commendavit cochleas in decocto cephalico, stoechad. Arab. calaminth. &c. contusas & capiti applicatas, quæ alias in scroti tumore mirabiles sunt. Conf. etiam *M. A. N. C. Ann. 4. App. p. 46.* Insigniter quoque conducit *fotus ex lixivio calc. viva*, quo feliciter in puerorum hydrocephalo *Aquapendens* usus fuit. Alii decoct. calc. viv. sulphuris & virioli recipiunt, quo percolato caput fovent, ut dispareat tumor. Denique *essentia rorismar. salvia, hyperici*, pro externo litu crebrius repetendo ad discutiendas  $\nabla$ as, à quibusdam adhibentur. *Forestus* pueris recens natis hydrocephalo correptis sola *olei hypericonis* continuâ inunctione, additò *pulvere myrtulorum*, auxilium attulit. Sed non conferentibus his, subinde necesse est, ut *sensibiliter evacuentur*  $\nabla$ æ, mediante *sectione Chirurgica*, quæ aliquò modò tolerari potest in hydrocephalo externo: In interno, verò qui cerebri ventriculos occupat, & hinc extorsum plus minus fertur, periculosissima est, teste *Huldamo Cent. 3. obs. 17.* Qui verò est intra cranium & cerebrum, non nisi cautè & perquam circumspectâ sectione tractandus venit, observando cautelam, ne unica vice nimium exhauriatur. Conf. hic *Marc. Aurel. Severinus in lib. de efficaci Medicinâ.*

## CAPUT VI

DE

## SPIRITUUM ANIMALIUM GENERATIONE VITIATA, INDEQUE MOTUS &amp; SENSUS LESIONIBUS: IN SPECIE

De

## VIGILIIS &amp; SOMNO VITIATIS.

**S**anguis deferitur ad cerebrum ac cerebellum, ubi ab eodem separatus spiritus vitalis abit in spiritum sic dictum animale, à quo & sentiendi habemus potestatem, & movendi activitatem, cum ratiocinationis sublimiori actione, in qua ut spiritus animalis verè & soli anima nemperationali, tanquam principali agenti, instrumentaliter inservit, ita pro ejus spiritus varia constitutione, non tantum in latitudine sanitatis diversitas operationum animalium in singulis individuis observatur multiplex, sed etiam in constitutione morbosa, variæ in sensu & motu, quin & intellectus operationibus læsiones oriuntur.

Natu-



*Naturalis spirituum animalium diversitas* ex variâ crasi & misturâ M. S. & hinc diversa constitutione cerebri dependet. Prout exim diversa est M. S. diversi etiam emergunt spiritus tam vitales quam animales. Quoad cerebrum variat hujus constitutio, tam secundum compositionem seu texturam naturalem, quam conformationem mechanicam. Quoad compositionem naturalem, præter constitutionem seminalem sub generationis primordiis natam, multum varietas ejus dependet à sanguine & spiritu influo, variata enim hîc ejus nutritione & naturali textura, plures aliæ proprietates, qualitates dictæ & inde emergens temperatura in caliditate & humiditate, siccitate & mollitie &c. variant. Sicuti in ipsa conformatione mechanica ratione pororum, meatuum & ductuum diversitas deprehenditur, quæ omnia & spiritum animale, ejusdem constitutionem, generationem, distributionem & motum variant. Hinc ista in actionibus animalibus insignis differentia cholicorum, melancholicorum &c. ex quibus ingeniorum diversitas deducenda. Ergo spiritus insiti animales plus minus vitiose geniti & præternaturaliter alterati unâ cum organorum corporeorû, tam cerebri, quam aliorum varia constitutione quasvis lesiones in sensu & motu inducunt.

*Generantur spiritus animales vitiose* 1. quando *deficiunt*, unde hebetudo sensuum, imbecillitas corporis, defectus in motu apparent, ut videre est in senibus, aut qui gravi ex morbo convalescunt.

*Deficiunt spiritus* vel propter sui consumptionem, labore, & re, studiis quibus omnibus nimis agitari in cerebro adeò subtilisantur, ut promptissimè dissipabiles existant; vel propter deficientem sanguinis spiritus ascentiam, in constitutione præsertim ejus cacoehymico-cachectica; vel propter lesionem cerebri, concussionem, meatuum obstructionem &c. In quibus casibus pori ac meatus cerebri aut subsidentes, aut compressi, aut omnino aboliti & sanguinis debitum circulum, ac spirituum animalium ex eo separationem impediunt. Defectus hic spirituum curatur per medicamenta spirituosâ assumpta, vinum generosum, & apoplect. Q. E. Matthiol. essentiam ambra, & quæ aliàs in lipothymis adhiberi solent. 2. *Vitium* est quando *abundant* & hinc impetû quendam extraordinarium actionibus animalibus conciliant, v. g. in iis, qui alimenta laudabiliora usurpant, potui vini generosi moderatè indulgent, qui agiliores & hilariores fiunt. Vitium minus curandum, quando sponte vel per medium, vel motum corporis aut animæ cessat. Deniq; 3. *Vitiose generantur spiritus animales*, quando *depravantur* iidem in sua crasi, unde motus eo-



rundem variae exorbitantia & anomaliae, unde crasseos vitiatae ratione vel stupidi vel torpidi vel copiose & inordinate mobiles, minus subtiles, plus minus acres & intemperati generantur. Vitia pro specialium hinc dependentium affectuum ratione diversimodè curabilia.

Antequam autè in specie *affectus facultatis animalis* cōsideremus, notandum 1. *Systema nervosum cerebri, cerebelli, spinalis medullae & partium annexarum* similium, non nisi ex fibris nunc delicatissimis, nunc minus delicatis, sed paulò firmioribus constare, quæ ratione suæ texturæ in naturali statu *tensæ* quidem sunt, sed simul continuum quasi nixum aut impetum aut vim quasi elasticam obtinent ad motum, quæ vis, modo impetu interno spirituum animalium roboretur, motum animale quemvis, tam spontaneum quam naturalem infert: Si vero impulsu externo commoveatur, sensum externum facit ita, ut spirituum diversè constitutorum diversi motus & fibrarum nervearum diversa textura & constitutio totam facultatem animaleam & totam sic dictam animam sensitivam absolvant.

2. *Cerebrum & nervos singularem consensum habere ad extra cum motu Dna*, ut in affectibus cerebri & partium nervolarum notissimum. Unde tales secundum *Destinationes* mutabiles, non nisi partibus nerveis contingunt & propriè *ephemerides* ægrorum dicuntur.

3. *Mirabilem consensum habere cerebrum & partes connexas cum visceribus abdominis*, in specie *ventriculo*, ita ut ob id origines morborum subinde confundantur, v.g. ex læso cerebro vomitus, ex imminente vomitu, vertigo &c. Hæc ipsa *Helmontium* admodum turbant, hinc observata ejus practica & res facti in *Tr. Duumviratus, jus duumviratus, sedes anima, demens idea, ignota actio regiminis*, sunt optima, sed theoriæ & reflexiones speculativæ nil valent. *Consensus* notissimus est, ut monitum; Sic ex læso capite vomitus, ex imaginatione subversio stomachi, ex stomacho vigiliæ, vertigo &c. Imaginationis læsio in picanibus, in melancholicis, hypochondriacis; item motus convulsivi partium externarum, ex affecto abdomine, v.g. in hystericis, unde etiam remedia adhuc quædam in stomacho facultatem animaleam afficiunt, v.g. *hyosciami semen, opium*, vid. *Helmont Tr. jus duumviratus* §. 22.

4. *Spiritus animales seu materiam admodum subtilem conditiones etiam subire materiales & seu sulphureæ, seu blæ, seu lucidæ, seu alius sint naturæ & conditionis*, tamen pro varietate constitutionis, variare etiam eorum attributa, & consequenter nunc plus, nunc minus proprietates amicas vel hostiles nervis, totique eorum systemati existere.

In specie quod *affectus facultatis animalis* attinet, de iis optimè agit

Willis.

Willis. Tr. de a  
ordinarie, ut o  
ganis sensuum  
ita promptè va  
ratio est somn  
liter. Vissu  
paucior sit, g  
live

Agrypn  
mus, aut fa  
cujus influxus  
impressiones  
tæ, similiter i  
siones submi  
mit, adeoque  
communis vi

Can

I. C

extra corpus

vigilia. II.

aut cerebri.

biliores & qu

isti in contin

tus ex aliquo

irritatio quæ

nutrimentum

communicat

Pr

tum organum

dum nervi d

vent. Hinc

capitis, quàm

Quia & dyss



Willis. Tr. de anima brutorum, part. 2. Spiritus animales in naturali subtilitate moti ordinariè, ut omnium subjectorum sensilium, mediantibus fibris nerveis in organis sensuum promptè recipiunt impressiones, & hic sensuum passiones sustinent, ita promptè varios motus obeunt, quo in statu animal vigilare dicitur, cujus privatio est somnus, quæ duo necessaria vicissitudine se mutuo insequuntur naturaliter. Vicissitudo hæc si tollatur, ita ut somnus vel penitus deficiat, vel saltem paucior sit, gavius aut levior oritur agrypnia Græcis, Latinis pervigilium, sive

## VIGILIÆ NIMIÆ.

Agrypnia omnis causa proxima est motus spirituum animalium, aut nimis, aut saltem continuum in organa machinæ corporeæ vel interna vel externa, cujus influxus, ut vocant, seu motus ratione, promptè sensilium objectorum impressiones recipiunt, & postmodum pro ratione motionis in organo impressæ, similiter ipsi in cerebro commoti varias animæ rationali discursuum occasiones subministrant. Ubi verò in sensibus externis nil percipitur, animal dormit, adeoque saltem ratione exteriorum sensuum & hinc consequenter sensus communis vigiliæ vel somni oriuntur.

Causa perpetui aut nimii spirituum influxus est.

I. Objectum sensibile fortius organon quoddam tam intra quam extra corpus afficiens, adeoque tunc per modum symptomatis saltem se habent vigilia. II. Est ipsum vitium morbosum aut spirituum animalium aut cerebri. Spirituum animalium vitium est, quando quavis ex causa mobiliores & quasi magis elastici redduntur iidem. Cerebri vitium cujus occasione isti in continuo motu conservantur, est, aut pororum ejus nimia apertio atq; hiatus ex aliquali ejus ariditate seu siccitate, commodique nutrimenti defectu; aut irritatio quædam ipsarum fibrarum cerebri aut membranarum ejus propter nutrimentum acius aut blus, aut propter serum acius undecunque cerebro communicatum.

Primam causam quod attinet, quando objectum quoddam fortius organum sensuum afficit, necessario spiritus moventur, quæ motiones secundum nervi ductum ad cerebrum usque continuatæ cæteros spiritus similiter movent. Hinc videmus, quod clamor fortior, dolor quicumque tam externus, v. g. capitis, quàm internus, v. g. nephriticus, aut iliacus, item tussis vigilias inducant. Quin & dyspnœa vigilias infert, ob sensibilem illam molestiam, quam in pulmo



nibus & circa cor excitat. *Objectum tale afficiens sapius in primis viis investigandum.* Sanè in omnibus *agrypnis* pertinacioribus vel *vitium est in spiritibus animalibus* & cerebro, vel per *consensum est*, ex vitio primarum viarum, digestionisque plus minus vitiatæ ratione & undecunque præternaturalis, quæ oritur vel ex assumptis vitiosis, vel malè digestis, vel vitiosè alteratis, vel perversè distributis, quæ irritando partes sensiles in illis locis, etiam nobis non sentientibus *agrypnias* inferunt, v. g. qui largius cœnant, insomnes noctes ducunt, quibus *alvus clausa* est nimis, somnum interruptum habent. *Agrypnia infantum*, item *pavor*es in somno ex primis viis præsertim circa stomachum radicem habent. Ad hunc *primarum causarum fontem* pertinet etiam ipsa *Anima Rationalis* in curis vel meditationibus occupata. Cum enim hæc utatur ceu instrumento motu spirituum animalium, necessario *graves curæ aut meditationes* vigilias nimias inferunt. Quò faciunt ex parte *percinacissima melancholicorum agrypnia*, quas interdum ad aliquot septimanas patiuntur, cum in his *Anima Rationalis* tantum non in continua objecti melancholici consideratione versetur.

Quoad *secundam causam vitium spirituum animalium* varium, à quo iidem ad concitiores & pertinaciores disponuntur motus: Pertinet huc totius *cerebri fervor* & incalcescentia in *febris ardentibus* &c. cuius occasione velocius iidem mori necessario inducunt vigilias; unde in *estate, ætate virili & cholericis* promptiores sunt *agrypnia*, somnique minus profundi. In specie *miasma malignum*, aut spiritus animales irritando, aut cerebrum ejusve membranas præternaturali sensu afficiendo pertinaces vigilias inducit in febribus malignis, quas propter consensum deliria insequuntur. Pertinent huc *animi affectus*, ut amor, ira, motus &c. in quibus ob inordinatos motus nimis coacti spiritus haud facile cessant, quin *agrypnias* inducant.

Quod verò attinet *cerebri vitia*, hic ejusdem *nutritio* imprimis consideranda venit. Hinc *inedia* pervigilium inducit. Nempe alimentis imprimis temperatis roridis humectatur cerebrum & blandè irroratur, ipsique adeo spiritus quasi  $\nabla$ osiores facti placidiore motu somnum inferunt; sed sub *inedia*, cerebro minus humectato, sed magis poroso facto, ipsique spiritus subtiliores redditii vigilias inducunt. Faciunt huc *alimenta acriora assumpta*, tam *aromata, ut piperata, cinamomum* &c. quam alia, ut *alliata, cepe, eruca* &c. à talibus enim irritatum quodam modo cerebrum ac genus nervosum alteratum vigilias inducit. Hinc *& nimia, tabaci abusus* Conf. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 346.* pervigilium inducunt.

In specie *senibus frequens* symptoma est *agrypnia*, idque partim *cerebri*, partim *digestionis primæ* vitio. Nempe *cerebri* pori, nutritione in senibus nonnihil naturaliter deficiente, nimis aperti ac patuli, liberrimum spiritibus com meatum undique continuò permittunt, quorum placida quidem sed continuata motione

somaus

fornus defici  
vias insensiles  
etiam deficien  
liciores ferè  
pervigilia mu  
nuatam specul  
prima acidior  
res, & qui me  
iam fibræ me  
res, minus qu  
motu præter

Quoad

sario vitium  
convulsivos  
delirium male  
quam in ætate  
melancholici  
vata sunt ead  
nut minus  
turniores, eo  
in facitatem  
nem 6. men

In CM

ratio, adeo qu  
aut 2. spirituum  
cis corrigenda  
endum.

Ex qu

aut purga  
sam occasio  
gias pertin  
igitur ad pe  
temperata, b  
phæa, papav  
gidamaj. &  
perant ham  
interunt. y. g



somnus deficit. *Quoad digestionis primæ vitium* vero, non solum circa primas vias insensiles molestiæ spiritus turbant, dum minus commodè ea procedit, sed etiam deficientis chyli nutritivi causa, cerebrum partesque nervæ aridiores ac sicciore ferè redduntur. Denique *melancholici* præ aliis molestissima patiuntur pervigilia multiplici ex fonte. Nam præter *phantasmatis* melancholici continuatam speculationem, supra insinuatam, eorum M. S. acrior, & *vitio digestionis primæ* acidior esse videtur, unde spiritus & ipsi minus volatiles aciores & fixiores, & qui motum impressum semel in cerebro diu retinent, generantur, sed etiam fibræ medullares cerebri nutrimento minus temperato sustentatæ, frigidiores, minusque fluxiles reddunt. Unde ex pertinaci spirituum per eosdem poros motu præter alia pathemata continuæ oriuntur vigiliæ.

*Quoad prognosin.* *Vigilia nimia* non sunt contemnendæ, cum necessariò virium debilitatem inferant, præsertim in febribus acutis deliria ac motus convulsivos post se trahunt. Hinc *Hippocr. sect. 7. aph. 18.* à vigiliis convulsio aut delirium malum. Deinde *vigilia in ætate consistente, aut muliebri*, plus nocent, quam in ætate juvenili aut sexu virili: *In morbis chronicis*, speciatim affectibus melancholicis, interdum satis diu citra noxam continuantur vigiliæ. Sic observatæ sunt eadem 45. dierum. *Schenk 1. 1. observ.* refert vigilias 14. mensium. Sed utut minus malæ sint in chronicis talibus vigiliæ, quam in acutis, tamen quò diuturniores, eò magis tandem symptomata mala post se trahunt, ac nonnunquam in fatuitatem terminantur. Sic *Panarolus Pentec. 5. obs. 4.* refert, puerum biennem 6. menses infomnem, postea fatuum redditum.

In *cura* causarum remotarum seu antecedentium imprimis habenda est ratio, adeoque vel 1. *objectum* partes sensibiles plus minus irritans *removendum*; aut 2. *spirituum animalium impetus* blandis anodynis, aut bene correctis narcoticis corrigendus, aut 3. *temperatis nutritivis* cerebrum ipsisque spiritibus prospiciendum.

Ex quibus patet, quod *universalia* vulgò dicta, nempe *venasectiones* aut *purgationes &c.* per se nil conferant, utut per accidens auferendo causam occasionalem prodesse possint. Sic enim refert *Deodatus valetud. p. 25.* Vigiliæ pertinaces aliis irritis per *catharticum melanagogum* curatas. *Remedia* igitur ad pervigilia sunt ferè vulgò sic dicta *refrigerantia & humectantia*, hinc *temperata*, blandè nutrientia, tandem *papaverina*. *Lactuca* ejusque esus, *nymphaea*, *papaver rhaas*, *portulaca*, & plura inde parata remedia; In specie *sem. 4. frigida maj.* & ex iisdem nunc solitariis nunc *c. sem. papaveris* factæ *emulsiones*, temperant namque acrimoniam humorum, blandè nutriunt & successivè somnum inferunt. v. g.



℞. Amyg. dulc. ℥ij.

sem. 4. frigid. maj. an. ℥j

papav. alb. ℥ij. c. f. q.

▽ nymphae F. Emulsio.

Cui postmodum pro affectuum ratione & alia *appropriata* ulterius addi possunt. *Decoctum hordei cum papav.* & *liquirit.* commendatur à Lindano: Sicuti *hordeaceorum* temperatum usum proficuum expertus est Borell. Cent. 4. obs. 89. Sed *papaverina* in primis sunt, ex quæ his paratum *opium*, quod vigilias compescit. Ad quæ etiam quoad narcoticam vim referenda *hyoscyamus*, *mandragora*, *stramonium*, & hujus species *datura Indorum* dicta. Hisce *crocus* & suo modo *absinthium* addenda sunt.

Sed de *opiatorum* usu in agrypnia bene observandum quod iis nec semper, nec in omnibus utendum sit. *Est enim* quando vigilie sunt instantis criseos signum, ubi ferè omittenda *opiata*, nec naturæ labor impediendus. *Est etiam* ubi senes diuturnis vigiliis torquentur, ubi potius *confortantia* conducunt, ut *spec. diamosch.* *diamb.* *ambra* &c. *Est etiam* ubi vigilie sunt in angustia pectoris, in dyspnœa, in hydropè, ubi *opiata* vix tuto usurpantur. Metus enim est, ne somno fortiori suffocentur ægri. *Est etiam* ubi vires exhaustæ sunt, spiritusque deficient, ubi quoque minus *opiata* conveniunt. Et si quando usurpanda sunt, usurpentur eadem in quantitate parva, partitis vicibus, adeoque repetitò crebrius in parva dosi eorum usu.

Quoad *externa*, ad agrypniam in genere usitata, sunt *lotiones* manuum, pedum, ex *fol. lactuca*, *nymp.* *solani*, *vitis*, *flor. chamomill.* *cap.* *papav.* &c. v. g.

℞. Folior. vitis.

salicis.

nymphae.

flor. chamomill. an. Mj.

cap. papav. c. sem. contus. No. jv.

coq in f. q. ▽. simpl.

*Decocto* isto laventur manus & pedes, ac linteis involutæ spontè exsiccentur. Quin etiam *decocto* isto tempora foveri possunt. Hinc fiunt *inunctiones* ex *medulla crurum vituli* recenti, temporibus aliquoties tempore somni illita, euporisto remedio. Item *ol. Nymph.* *anethin.* *papav. alb.* *nucist.* *erpress.* *ungu.* *popal.* *balsam. hypnotic.* *Mys.* v. g.

℞. Ol. papav. express. ℥j.

N. M. expr. ℥ß. M. S.

Schlaffsâßlein.

Vel



Vel ꝛ. Ungu. popul. ꝑij.

opii cum S. V. extr. gr. ꝑv. ad viij. M.

Illinatur temporibus.

*Emulsio* pariter ex nucleis persicorum ꝛ sem. papav. albi cum ꝑ. nymph. vel latte muliebri parata, fronti ac temporibus cum linteis multiplicatis applicata convenit. *Liquor vermiculorum* in globulis cynosbati repertorum, itidem temporibus illiniri potest. *Cerumen ex auribus asini* potens dicitur narcoticum, sed periculosum. De hoc cerumine quantitate pisi temporibus in Agrypnia illitum probatum dicitur remedium, sed observandum, ne augeatur dosi, alias profundissimum somnum inducet. *Turundam* ex grano uno atque altero laudani opiat naribus efficacissime inditam vid. in *Timæ Casibus* p. 94. *Rulandus* sequenti utitur *Ephemerate*:

ꝛ. ꝑ. rosar. ꝑij.

opii ꝑij.

croci ꝑij. M.

Hoc lintea imbuta & tepide temporibus applicata pro inducendo somno, sunt optima. De *senum vigilis* jam monitum fuit, nō tam anodyna, quam *confortantia*, plus min⁹ aromatica digestionem primam promoventia convenire, adeoque remedia sic dicta calida, potus vini dulcis, aqua vita & aromata, essentia absinthii; in specie vinum dulce senibus convenit. Conf. hic elegans *H. ab Heer obs. 5*. It. remedia ambrata & moschata. Vid. *Wedelii Opio* ꝑ. 38. Sic pariter agrypnia in affectib⁹ sic dictis frigidis, v.g. in catarrhis per usum piperis albi, it. per electuaria ex aromat. ꝛ calidis optime sopiuntur. Alii in vigilis nimis à cruditate ventriculi S. V. usum post cœnam commendare solent. Sic pariter in agrypniis cum virium exhaustionem spirituumque absorptionem analeptica talia ex vino dulci sunt optima, aut si propinanda papaverina, eadem aromaticis socianda sunt, quem morem Veteres in *Philoniorum* compositione observarunt. Jctus quidam ex diuturno literarum studio, 4. menses sine somno fuit, ita ut jam putaretur fatuus, nullis præsidiiis proficientibus *Philonii Persici* ꝑij. cum *Malvatico* exhibitâ bis vel ter, ad somnum rediit, autore *Zacuto Lusit. lib. 1. Med. Princ. hist. 13*. Sic mulieri Patavina in somniâ per 15. dies tandem pane cum vino malvatico cum uteretur, somnus conciliatus fuit, autore *Schenckio observat. lib. 1.*

Contrarium vitium est

## SOMNUS NIMIUS,

dum ægri aut nimium sunt in somnum propensi, aut actu nimis dormiunt. Distinguendus autē ante omnia est somnus præternaturalis ni-

Pars II.

ii

nimis

Vel



*minus ab impotentia vigilandi*, dum agri ex nimia virium prostratione ab operationum animalium imbecillitate oculos apertos tenere & membra movere nequeunt, sed instar dormientium jacent, utut revera vigilant, nec perfectum somnum capiant. Quod patet ex eo, quod accessu personæ cujusdam inconsuetæ, aut ad ejus loquelam oculos aperiant, sed mox collabi iterum sinant, & quod interrogati præ imbecillitate respondere vix possint. Talibus *restauratio & confortatio* conveniunt.

*Distinguendus* porro est *nimius somnus præternaturalis* à somno nimio *non naturali*, post lassitudines aut labores oborto, qualem somnum trium dierum & noctium ob prægressam lassitudinem vide in *Plater. lib. 1. obs. p. 5. Conf. m. Salmuth Cent. 3. obs. 66.* Quod etiam facit, quando post sanguinis excretiones, alvi profluvia, dolores magnos, animi pathemata graviora aliquandiu continuata, adeoque in genere in omni spirituum, præsertim subito exhaustorum defectu somnus nonnaturalis imminet. *Observandum* quoque quod *imminentes lipothymia sub specie somnolentia* sive propensionis in somnum interdum imponant, ex spirituum animalium defectu oriundæ, v.g. *Hysterica* in graviori paroxysmo subinde admodum *somnolente* sunt, quibus tamen lipothymia imminet. *Mulieres* quædam post partum debiliores *somnolente* fiunt, sed revera lipothymia imminet. Post largiores *V. S.* aliasque sanguinis effusiones somnolentia observatur, sed quæ revera lipothymiam minatur.

Sed quoad somnum p. n. *nimum*, adeoque *affectus soporosos*, affectus multi huc pertinent, variis nominibus iisque confusè admodum insigniti, utut parum referat. Genuinam affectuum soporosorum explicationem nominalem vide in *Lindani Meletematibus Physicis & Medicis p. 282.* Placet hîc *Sylvii* terere vestigia, adeoque p. n. somnolentia & inde dependens somnus *vel solitarium* malum est, *vel eadem delirium* ferè comitem habet; & hoc loco quidem si somnolentia jungatur cum delirio tali, in quo excitati agri ferè delira loquuntur, ac denuò in somnum relabuntur, vocatur

## COMA SOMNOLENTUM & CATAPHORA.

*Sicuti quando talis somnus est cum delirio*, ut propter gravia insomnia revera vigilant agri & habitu corporis externo summè in somnum propendeant, ac etiam plus minus summè dormire videantur, quoad internas tamen operationes animales revera vigilant, cum tales dormientes delirent, faucibus apertis clamitent, membra inordinatè moveant, varia loquantur, est

COMA

Comata hæc  
julis sambuci  
rectè dicitur  
non simul cal  
quidem in in  
statu & decli  
subinde com  
vari solet, in  
sagit.

Pertin

seu Veteri

Et insigni obl  
tur ferè omni  
habent, mic  
relabantur,  
profundo s  
lenta adest,  
acerbatur.  
mentorum  
His a

somnus adeo  
tendo prof  
nomine est  
oriatur, re  
prieque ca  
dormiunt  
rore extern  
Pertinent  
focationis  
ana, it. qui  
Hinc etiam



## COMA VIGIL.

Comata hæc observantur sæpe sine febris; observatum enim fuit coma ex crudis julis sambuci comestis absque febris in *Act. Med. Hassn. vol. 1. p. 64.* Sanè ut rectè dicit *Wedelius de opio p. 46.* rarissimos esse affectus soporosos, in quibus non simul calor p. n. percipiatur; ita coma ut plurimum est *symptoma febris*, siquidem in *intermittentibus* præsertim chronicis, non quidem in principio sed statu & declinatione paroxysmi, ægri profundè dormiunt, quin & in *continuis* subinde comata observata fuerunt, speciatim in *febb. malignis* coma vigil observari solet, in quo delirium vehementius subinde convulsionem imminentes prælagit.

Pertinet ad hos effectus

## LETHARGUS

seu *Veternus*, Arabibus *Subeth* dictus, qui est sopor profundus cum delirio & insigni oblivione, conjunctus cum febre lenta. In hoc affectu ægri obliviscuntur ferè omnium, ita ut lethargici matulam petentes, dum eam adhuc in manu habent, mictionis tamen aut potionis perficiendæ obliviscantur, ac in somnum relabuntur, excitati licet vix respondent, ac delira loquuntur, ferè sicut ii, qui ex profundo somno excitati naturaliter non adeò appositè respondent. *Febricula lenta* adest, eaque continua, quæ tamen ferè vespertino ac matutino tempore exacerbatur. Calor nec acris nec mordax, pulsus frequentes & magni, urina ut jumentorum redditur turbida.

His affectibus accedit &

## CARUS,

somnus adeò profundus, ut ager vix, aut nulla ratione excitari queat, quin stertendo profundè admodum dormiat, salva tamen manente respiratione. Uno nomine est proximus ad Apoplexiam gradus. Nam si ab interna causa oriatur, revera erit Apoplexia levior; si vero ab externa, carus dicitur. Proprieque carus est sopor à vino, & hinc dicuntur carotici, qui post vinum profundè dormiunt, adeoque carus non tam morbus quam symptoma est, natum ex errore externo, v. g. nimia ebrietate, S. V. abusu. Vid. *Salmuth Cent. 2. observ. 97.* Pertinent huc fumi carbonum hausti, gas potuum fermentescentium, qui cum suffocationis periculo carum inferunt. Item nimius odor croci, abusus fumi Nicotiane, it. qui diutius versantur aut dormiunt sub juglande, solent in carum incidere. Hinc etiam nuces Græcis dictæ sunt *καρυαί*. & ij vapor pariter carum infert, au-



torre *Palmario* dum vapore hydrargyri naribus excepto faber quidam aurarius statim gravi somno correptus concidit. Adeoq; his sunt proprie *carotici*, qui ex errore quodam externo in tantum profundum somnum incidunt. Quo etiam ii referendi, qui post *contusiones* aut *concussiones* capitis caro sepulti jacent. Ad hos affectus pertinet etiam quando cum somno *insomnia* juncta sunt, ut in *Incubo* & *Noctambulis*. In

## NOCTAMBULIS

revera est *somnus vigilans* & *vigilia somnians*, dum clausis organis sensuum externis dormiunt, validâ vero Animâ Rationali, cum sub imaginationis actione per spiritus paulò fixiores agitados vigilent. Ab hoc enim possessore moventur quidem nescientes tamen quorsum. Uno nomine est *validum somnium*. Nam sicut nos ipsi in somno loquimur, quæ somniamus, modò linguam, laryngem, maxillam inferiorem, interdum quoque pedes aut brachia movemus; ita *noctambules* moventur ad istas actiones, ad quas somnium dirigit. *Clausis quidem oculis* in locis, quæ aliàs sæpius peragrarè solent, *conniventibus* vero in locis minus consuetis, in quibus etiam subinde non sine nocumento versantur. *Symptoma* est *hypochondriaci familiare*, adeoque quasi gradus quidam levior *delirii* aut *melancholici hypochondriaci*, ac simili etiam ratione curandum venit. *Auscultat* vero *De phasibus*, unde nunc plus, nunc minus affligit, unde etiam tales à quibusdam *Mondsuchtige* dicuntur.

*Quoad causas somni* p. n. ejusque variorum modorum, ut *somnus naturalis* dependet ex imminuto spirituum in organa externa influxu, ex aliquali eorundem torpore, dum minus volatiles minusq; subtiles, sed potius phlegmatici facti minus prompti sunt ad obeundas functiones animatas per solitas expansiones & excursions; ita pariter in quovis præternaturali somno nimio torpor spirituum animalium, ceu *proxima causa*, considerandus venit; *remotam* hujus torporis suggerunt ea, quæ naturaliter somnolentiam & nimium somnum inferre valent: Nempe aut *nimia visitas*, aut *pituïtositas* M. S. & in specie hinc *cerebri*, indeq; *phlegmatica spirituum animalium constitutio*, vel ea quæ specialiter spirituum animalium impetû sistere, adeoq; *narcosi* seu stupore afficere valent. De priori res certa est; de posteriori causa controversitur, an etiam in corpore necessario humores ita p. n. alterari queant, ut vim *anodynam* & plus minus *narcotisam* acquirere queant: Et affirmatur. Sicut enim ex *musto* per fermentationem, sicut ex *ligno* & *carbonib* per combustionem tale generatur *gas narcoticum*, quod antea in se non habebant, ita simili ratione nil obstat videretur, quin humores diversimodè alterati similem vim acquirant. Hinc *Helmont venenum inebriativum* soporosos affectus

ctus producit  
rolis præfertur  
cap. 3.

Quoad  
rum torporer  
copiosarum,  
bro repetien  
hoc, nunc il  
crementis or  
tum, per de  
tam in Ana  
alia loca sero  
les torpidior  
inde refertis  
peditur, und  
subinde obse  
Abscessibus,  
naturaliter n  
secus ac ii, q  
Sicut in cata  
nem nimis  
pensionem  
lotione proc  
pressio urina  
ma vigila se  
p. 380. refer  
capite ejus in  
tio Deckeri  
mum pus p  
ex viro seri  
annis eode  
Quo  
hanc in ex  
torum sim  
cei subje  
bus Sed  
in primis v  
narcoticar



ctus producere ait. Et talem vim anodynā etiam subinde in affectibus soporosis præsertim lethargo pro causa similiter agnoscit Willis de anima bruti part 2. cap. 3.

Quoad aquositatem & inundationem cerebri, indeque natum torporem spirituum animalium facile fieri potest, ut ratione glandularum copiosarum, tam cerebrum corticis formā ambientium, quam hinc inde in cerebro reperiendarum, serosus latex aut lymphā motu in suo impedita cerebrū nunc hōc, nunc illo loco inundet, vel etiam ex M. S. mediante colluvie serosa variis recrementis onusta in cerebrum destillet, qua ratione loco criseos lethargum subnatum, per decubitus materiæ morbosæ in cerebro observat Willis cit. loc. qui ipse tam in Anatomia cerebri, quam part. 2. de Anim. brut. cap. 3. in lethargicis quoque alia loca sero inundata observavit; à tali causa non tantummodo spiritus animales torpidiores, ac quasi phlegmatici redduntur, sed etiam porulis cerebri hinc inde refertis debita spirituum expansio, & hinc in nervos radiatio admodum impeditur, unde pathemata soporosa lethargica. Hinc est, quod ex hydrocephalo subinde observatus fuerit lethargus, teste Hild. Cent. 7. obs. 20. it. Severinus de Abscessibus, in infantibus ex hydrocephalo lethargum observavit. Nempe ob id naturaliter infantes in somnum magis inclinant propter cerebrum humidius, non secus ac ii, qui constitutionis sunt phlegmaticæ naturā magis somnolenti sunt. Sicut in catarrhis capitis & cerebri lymphā copiosius congesta, ante sui excretionem nimis humectando cerebrum, extraordinariam quandam in somnum propensionem provocat. Facit huc, quod coma somnolentum à crebriore capitis lotionē procuratum referatur in M. A. N. C. Ann. 3. p. 541. Hinc est, quod suppressio urina à calculo renum, subinde insignem soporem soleat inferre. Sic coma vigil a sero enatum in sene refert Piso Tr. de Colluvie serosa & Sanchez in obs. p. 380. refert quendam, qui cum laborasset comate vigili cum febre continuā, in capite ejus inventi sunt cerebri ventriculi multā aquā pleni. Facit huc observatio Deckeri in Barbett. p. 36. de lethargo gravi sternutatorio curato, copiosissimum pus per nares alliciente; sic lethargum periodicè repetentem cum arthritide ex vitio seri observat Piso cit. loc. Sicuti similem lethargum periodicum singulis annis eodem die recurrente notat Borell. Cent. 4. obs. 67.

Quoad vim narcoticā ex causis internis enatā, spiritus figentem, hanc inexpugnabilis ista dormiendi necessitas & junctum delirium, effectus opiorum simillimi, confirmant. Atre oleosum certo modo afficiens non immerito ceu subjectum hujus virtutis suspicatur Sylvius l. 2. prax. ubi de soporosis affectibus. Sed non necesse est, ut præcisè ad caput ferar. Sufficit interdum si etiam in primis viis hæreat ad instar herbarum, gas veri inspirati, aut opii assumti vim narcoticā exercentium. Nam & virus in hypochondriis contentum & adhuc deli-



delitescens caput tentare solet. Facere huc videtur, quod in peste quidam perquam somnolenti evadant. Facit huc Borell. in obs. 96. Cent. 1. de quodam, qui saepe lethargum patiebatur ab aurâ venenatâ, ex pollice emissâ, per causticum actuale pollicis admotum curatum. Facere huc videtur curiosa observatio Riverii Cent. 1. obs. 26. soporis gravis excitati ob vapores uterinos, in passione hysterica. Forſan pertinet huc Lethargus à lumbricis oriundus observatus, de quo Holler. Cent. 1. cur. 35. notat, lethargum cum precedente dolore circa tempora & auditus gravitate solis mensibus circa oppositionem recurrente à lumbricis nato. Idem Holler. Cent. 1. obs. 84. cataphoram notat ex lumbricis. Quoad febrem lentam, quæ lethargo est juncta, videtur hæc esse ex genere earum, quas lymphaticas supra, ubi de febribus, notavimus. In Comate vigili præter dicta in specie malignitatis narcotice ratio est habenda, à qua & somnus & delirium oritur, sicuti id narcotica virulentiora præstare solent.

Quoad prognosin, in genere docet rectè Hippocr. Somnus & vigilia, si modum exceſſerint, malum, sect. 2. aph. 16. Coma in febrib. ardentibus exitiosum esse solet, præsertim vigil, cum ut plurimum lethale, cum lethargici septem diebus moriuntur, quos si effugiant, sani evadunt. Sanatur autem aut evacuata vel spontè, & criticè, vel artificialiter materia peccante per alvum, aut erumpentibus parotidibus die criticò, aut si fiat copiosa ejus per os vel nares emunctio: Quibus si adjungatur febris & reliquorum symptomatum remissio, spes est, ægrum convaliturum: E contra in lethargo accrescentibus lethargicis symptomatibus, si erumpat sudor frigidus, imprimis in capite, lethale est. Tremor Lethargo superveniens est periculofus; è contra superveniens phrenitis, salutare; superveniens vero phrenitidi lethargus lethalis.

Quoad curam: Affectus soporosi vel à causa externa vel interna originem ducunt. Si à causa externa, assumtis vel inspiratis, post vomitum convenit. & castoreum. Si à causa interna, habenda est ratio, an per se & primariò morbum constituent, v. g. Lethargum, an vero aliis morbis in statu demum aut declinatione superveniant. Si per se morbum constituent, attendendum an vis narcotica, an vero colluvies recrementosa, in specie serosa, eos inducat. Quod si verò aliis morbis superveniant, & metastaseos materiæ morbi- ficæ suspicio subsit, vel si per se ex colluvie recrementosa originem duxerint, vomitoria & purgatio, it. venesectio averſoria & derivatoria, item sternutatoria & vesicatoria, sunt optima, quibus tandem acria & volatilia, spirituum torporem excutientia subjungantur. Sin vero ex vi narcotica plus minus malignâ originè ducant affectus soporosi, post vomitum vel præmissū vel omis- sum,



*acria volatilia*, sensuum organa fortius vellicantia & spirituum torporem ac immobilitatem corrigentia, vel in specie *acria*, *acida*, *volatilia*, virulentia narcotica speciatim contraria. Hinc olim & Comati vigili malignarum: Item Comati soporoso *vesicatoria* & *cataplasmata* pedibus applicata sunt optima. Inter *evacuantia* autem principatum obtinet *VOMITUS*, si commodè potest institui. Sic enim *Riverius Cent. 4. obs. 28.* puerum 5. annorum veterno correptum acri clystere & vomitu curavit, cujus defectu *purgatio* instituatur cito, neglecta temporum electione. Neque enim cogitabundus debet esse Medicus in purgandis lethargicis, & quidem forti fiat medicamento, alias frustra laboratur. Inter *purgantia* excellit *scammon*, cum *castoreo*, quod jam à *Tralliani* ætate fuit celebratum, v. g.

℞. Castor. ℥j.

scammon. præpar. ℥j. M.

D. in vehiculo oxymell. vid. *Borell. Cent. 1. obs. 82.* Aliàs *extractum melanagogum Quercetani* à ℥j. ad ʒβ. Item *Extr. Esul. aut Troch. Alband.* pro stimulo conveniunt, v. g.

℞. Herb. absinth.

cent. min.

fol. rutæ an. Mj.

rad. pyrethri ʒvj.

pulpæ colocynth. in petia ligat. ʒj.

coq. in f. q. ∇. comm. colatur. ℞. ʒix.

adde

Elect. hier. cum agaric. ʒj.

fellis tauri inspiss. ʒj.

vitell. ovi N. 1. M. pro clystere.

Juxta huiusmodi *evacuantia* & subinde *V.S.* vel saltem pro scopo *aversorio* aut *derivatorio* locum habet, in casu nempe quo à colluvie recrementorum mediante sanguine & sero cerebrum inundante malum ortum fuerit. Tali in casu *venarum jugularium apertionem* suadet *Willis loc. cit.* Quibus non sufficientibus altero die *cucurbitula scarificata* intra scapulas aut *hirudines* propè aures applicari possunt. Quod si nec sic resuscitari videatur æger, præmissis talibus ad *vesicatoria*, item ad *sternutatoria* accedendum venit; ad illa quidem pro scopo *aversorio*; ad hæc pro scopo *excitatorio* ac simul *evacuatorio*, sed nonnisi istis prius præmissis. v. g.

℞. Pulv. cantharidum ℥j.

euphorb. gr. xij.

castor. gr. xv.

fermen-



fermenti acerrim. ℥℥. M. pro vesicatorio.

Nam acria ac dolentia in talibus agris omninò requiruntur. Applicari nunc possunt vertici, *nunc syncipiti*, pro scopo derivatorio, *nunc cruribus*, pro scopo revulsorio. *Sternutatoria* per pennam insufflanda sunt naribus

℞. Pulv. nicotian.

lil. convall. an. ℥j.

rad. hellebor. albi ℥j.

ol. destillat. majoran. gr. iv.

castor. gr. xij. ad xv. M.

vel *sternutatorium Timai* in affectibus soporosis expertum, quod habet in *Casibus* pag. 20.

℞. Ellebor. albi

castor.

piperis albi an. ℥j.

ol. destillat. rutæ, majoran.

salviæ, an. gr. ij. M.

Hiscæ etiam *via volatilia* v. g. *θ. volatil. θ\**, aut *spir. θ\*j. cum calc. viv.* paratus commodè permiscuntur, cum fortiter penetrent, cæteris addita, vellicando; *sternutatorium* ex turbit cum pulvere *glyzyrrh.* vid. in *Barbett. praxi cum comment. Decker. p. 76.*

Cum hisce modò narratis propinanda internè *appropriata*, quæ aut spiritus excitant acrimoniâ suâ subtili penetrando & sensuum organa vellicando, aut eosdem plus minus restituunt, & augent, aut virulentia narcotica resistunt. Præsertim hic ducit *Castoreum*, & quævis inde parata interna & externa, præsertim ejus *essentia cum spiritu θ\* urinoso* parata in largiore dosi propinata est egregia. Hinc *acria volatilia*, nempe *spir. θ\*ci, spir. formicar. volatil. spir. sem. snapi*, cum vehicul.  $\nabla$ . *lil. convall. spiruosa* propinati, sunt optimi, quibus *Wedelius* plus præstitit in affectibus soporosis, quam spiritibus aromaticis sulphureis. Vid. *opiolog. p. 46. 47. 52.* Hinc ulterius etiam *acida volatilia* à quibusdam usurpantur, præsertim in casu, quando suspicio est latentis virulentia narcotice. Veteres *oxymelle squillitico* fuerunt contenti; hodie *spiritu* inprimis *vitrioli volatilis* utimur. Excellit hic *spiritus antepilepticus vitrioli Quercet. cum urina* pueri paratus; loco cujus *spir. virid.* per se præparatus usurpatur. Hinc *spir. vitrioli cephalicus D. Michael. ex cap. mort. vitriol.* regeneratò cum *spiritibus vegetabilibus* paratus &c. propinatur in  $\nabla$ . *lil. convall. rute, ceras. nigr. serpill. & similibus.* De *essentiis & oleis vegetabilium* & hic usurpandis, v. g. *Ess. & ol. Anth. majoran, lil. convall. croci & similibus* hisce, tam *simplicibus* quam *compositis*, cum per se nota sint, nil addere placet. Forasan usus herba

*Thee,*



*Thee*, cum naturaliter somnum arceat, citra virium dispendium, commodè cum aliis appropriatis usurpari possit. Quibus ac similibus ritè administratis in fine curæ *sudorifera* ex lignis inprimis parata curam claudant.

Cum his internis & *externo* usu simul usurpanda, quæ spiritus excitare, eorumque torporem discutere valent, *acria*, penetrantia, & sensuum organa plus minus vellicantia. Tempora igitur nares ac frons oleis *cestrulat. suecini, majoran. anth. aut balsamis cephalicis* illinantur, quæ ipsa etiam linguæ infra affricentur; item *spiritus thymi volatilis*, in vitro angusti sed longi colli naribus subinde admoveatur, ad excitandos soporosos, sicut *†. castoreo* infusum, & linteo vel spongiâ naribus admotum, est egregium; vel imprægnetur spongia succo *apii & acet. rosaceo*, adspargantur *pulv. castorei*, & ita crebro naribus admoveantur. Quod etiam facit *†. radicum Riverii* simili modo usurpatum à Plantis pedum & quædâ affricanda veniunt, inprimis *sinapi cum †o subactum* & forti frictione plantis pedum applicatum lethargicos excitat. Item fiat *Cataplasma* ex *rad. raphani recent. cum rutâ, fermento* l. q. *†o & be com.* subacta plantis pedum admoveantur, quale inprimis convenit in comate febrili tam somnolento, quam in specie vigili; vel ex *rutâ, pipéritide & ranunculo* cum *sapone nigro & be marino* similibusque acribus invicem mistis paratum *cataplasma* dicto modo pedibus applicetur. Quod si ex abusu narcoticorum inductus sit somnus nimius, optimum remedium est *†. præsertim cum castoreo* imprægnatum, v. g. ex opio seu croco aut similibus natus sopor caroticus *aceto* curatur.

*Famulus cujusdam materialista* cum aliquando *℥j.* crudi opii pro reconciliando somno recepisset, binas noctes & dies continuo dormivit. Tertia die vocatus Medicus recipere jubet *† squilliticum* in quo *extract. castorei* dissolutum fuit. Qua mixturâ frontem ac tempora, pulsus manuum ac plantas pedum, ac inprimis genitalia irroranda & sedulo fricanda iussit, sicque successivè ex mortis faucibus ereptus fuit. Quod si ex vaporibus venenatis, inspiratione Gas liquorum ferrescentium & inconcinno narcoticorum usu oriatur Carus, vomitus maturè instituendus, & hinc *acida* ac *castorina* usurpanda erant.

℞. ▽. menth.

rutæ

†. rutac. an. ℥j.

essent. castor. ℥vj.

lyr. menth, ℥ij. M. capiatur crebro.

Si ex ebrietate oriatur affectus soporosis, præmissio vomitorio internè convenit *spiritus thymi*; fronti vero ac temporibus *† applicandum*, Epithema ex

Part. II.

kk

succo



succo semper v. maj. †. & nitr. testibus admovendum, ac subinde removendum.  
Perinet ad hos affectus etiam *Catoche*, sive

## CATALEPSIS

*dum agri instar statuæ in sua positura ita persistunt*, impulsæ tamen moventur, sed denuò in ista per motum acquisita figura fixi perstant, oculis pertinaciter hiantibus, torvum vident, in eodem quo eos posueris seu collocaveris membrorum positu permanent. *Non dormiunt tales agri*, sed videntur dormire, & tamen moventur, ac in eo situ perstant. Non autem est *ab intrinseco*, sed tantum *ab extrinseco*, nempe ab impulsu instar cujusdam machinæ. In his *quomodo verè constituti sint spiritus animales*, vel quodnam speciale eorum vitium, dhuc *inexplicabile* est. *Fixatos* esse eos, minusque mobiles, quam naturaliter esse debent, certum est. Simul tamen etiam eosdem continua sua præsentia membra actuare & in tono debito conservare & animare ex eo confirmatur, quòd partes mobiles sint & figuram quamvis retineant. Unde ad *convulsiones* refert *catalepsi* *Valentinus Diss. Inaug. de Convulsionibus*, ejusque *causam* dicit esse nimium spirituum motum, quatenus uno impetu cerebrum relinquentes, utrumque musculum antagonistam irruunt, nec inde statim retrocedere possunt, unde rigor ille notabilis: Hoc fusè confirmat ex *antecedentibus*, *concomitantibus*, *juvantibus* & *noceantibus*. Hinc *D. D. Dolani* *catalepsi* *apoplexiam inversam* haud inconcinne vocat in *Encyclopadia Med. Pract. Tur. de catalepsi*.

*Causam* spirituum animalium *coagulationem* quandam, à spiritu quasi urinoso asserit *Sylvius Prax. l. 2. c. 24.* Sed rem dubiam relinquit. Rarus est affectus, & qui varias habet *antecedentes causas*. Sic *Forestus obs. 44.* *Schol.* refert, puellam, cum nubere cogeretur, hoc affectu fuisse correptam. Idem *loc. cit. l. 10. obs. 41.* à frigore quosdam rigidos instar catalepticorum fuisse redditos. *Fonseca lib. 2. consult. 92.* refert *catalepsi* singulis septimanis recurrentem, 6. horas durantem, in muliere *post mensem suppressionem* obortam. *A vermibus* quoque aliquoties *catoche* observata est, *Vid. Marcell. Donat. l. 2. c. 2.* & *Schenck in observat.* In *paroxysmis febris intermittens* *catochen* observavit *Dodonaus obs. 44.* *A vapore carbonum accensorum* simillimum *catalepsi* affectum refert *Platerus l. 1 obs. p. 28.* Jucundum est, quod refert *Tulpius l. 1. c. 22:* *Juvenis Britannus* impensius amori indulgens, ex *inopinato repudio* matrimonii *catalepticus* factus est: Cum verò illi acclamaretur, cupitum habiturum amicam, quasi excitatus ex profundiore somno actutum ad se rediit & profiliit. *Remedia* hactenus proficua sunt *vomitiva* *Galica*, *spir. vini rectificatus*, seu interne seu

seu externe u  
num Catochi

SPIRIT  
SENSU

VERT  
minia

imitatur, cla  
apertis oculi  
quibus parite

Ratione

circumgyran  
urur promil  
tur, quin po  
dicitur. Il  
visus tandem  
culos versari

tenebrico  
tinnis concid

appellatur,  
tordum lev  
gradui supe  
vix est insu  
comiterur  
cunt: &  
gdb. Sicut  
antecedere  
viores paro  
Quoaa



seu externè usurpatus. Item *cataplasma acria*. Sic *Henr. ab Heer* refert Capucinum Catochicum factum, per *acre suppositorium* excitatum.

## CAPUT VII

DE

SPIRITUUM IN CEREBRO ET HINC  
SENSUUM ORGANIS INORDINATA AGITA-  
TIONE, INDEQUE ORTA VERTIGINE.

## VERTIGO.

**V**ertigo à *vertendo* dicta est iste affectus, cum omnia circumagi, & omnia nos ambientia corpora in circum rotari videntur. *Naturaliter* hoc imitatur, clausis oculis celeriter corpus circumagitando. Sic enim facta quiete apertis oculis omnia circumagi videntur. *Nonnaturaliter* hoc fit in ebriosis, quibus pariter omnia videntur in gyrum agi.

*Ratione graduum triplex* est vertigo. I. Quando corpus tantum & exteriora circumgyrari videntur, denuo evanescēte *Φαινόμενον*, estq; *Vertigo simplex*, utut promiscuè sic dicta. In cæteris enim gradibus, cum nulla rotatio observatur, quin potius visus obtenebratur & plus minus abolitur, improprie vertigo dicitur. II. *Gradus est*, quando oculi velut affusa caligine obscurantur, ita ut visus tandem crebro pereat, aut etiam varii colores, flavi, cœrulei, virides ante oculos versari videntur, inlequente tali caligine & vocatur *scotomia* seu *Vertigo tenebricosa*. III. Hæc oculorum caligo cum tantum invalescit, ut *ager proximus concidat*, nisi proximis prehensis adminiculis se fulciat, *vertigo caduca* appellatur. Hæc vertigo quia ceu proximus gradus est ad epilepsiam, cum interdum leves convulsiones & deinde epileptica affectio subinde huic ultimo gradui superveniat, propterea *parva epilepsia* quibusdam Practicis dicitur. Nam vix est insultus epilepticus, à quacunque oriatur causa, quem non antecedit aut comitetur proximè vertigo gravior. Unde ingruente insultu epileptico ferè dicunt: *Es werde ihnen ganz wunderbar vor den Augen / schwarz / grün und gelb*. Sicuti aliàs graves spirituum animalium *eclipses* & deliquia insigniora & antecedere & comitari solet vertigo, v.g. lipothymiam, dolores ingentes, graves paroxysmos hystericos.

Quoad rotationis istam apparentiam vulgò existimant, rotationem spirituum



animalium in cerebro esse causam istius apparentiæ, quod tamen falsum est. *In oculis enim fit ista rotatio*, sive motus iste inordinatus, qui vertiginem infert. Nam visui res gyrari apparent. In organo igitur visionis erit vitium, cum in cerebro non videamus. Nemo sane concipere poterit, quomodo spiritus in cerebro agitatus apparere res faciat rotari extra oculum. *Vertigo sc. fit in organo videndi*, non in vidente ipso, uti neque in objecto viso. Organon tale est oculus. Porro *quando oculis videntur obversari nebula, flocci, musca &c.* res hæ videntur esse in aëre, cum tamen revera sint in oculo, in specie in humore ejus  $\nabla$  eo, unde cum *res externa gyrari videntur*, hoc fit in oculo, non in cerebro, vel objecto externo. Nemo est, cui non *flammula* noctu, in tussi graviori vel percussione oculorum, in aëre versari videantur, quæ omnia tamen revera sunt in oculo. *Quod si dicere velis*, visionem formaliter fieri in sensu communi non in oculo, unde gyrati spiritus in medulla cerebri circa principia nervorum, ubi fit sensus communis, vertiginem inferant. *R.* Distinguendo inter *circumgyrationem* ipsam & ipsius motus *apparentiam*, ejusq; à nobis *perceptionem*; hanc concedo fieri in sensu communi, non vero *actualem circumgyrationem*, quæ causa est talis vertiginis. Totum hoc negotium apposito simili desumpto à speculo illustrat *Joh. Faber in Patholog.* quem vide.

Sed præter oculos *simul & alii sensus afficiuntur*, imprimis in secundo & tertio vertiginis gradu. Nam similiter & *tinuitus*, aut *rancus* interdum *sonus* in auribus percipitur & licet apprehendant ægi adminicula nonnulla, quibus se fulciant, sapius tamen minus firmiter eadem comprehendere valent, ita ut tandem concidant.

*Causa* igitur *vertiginis* ex dictis patet. Est scilicet *motus inordinatus spirituum animalium in oculo* concamerato agitatorum; hinc necessario motu rotundo in gyrum moventur, verum non in solo oculo, sed in reliquis etiam sensuum organis præsertim *auribus* similis fit inordinata agitatio, unde in iisdem *tinuitus*; in partibus vero externis minus firma objectorum apprehensio. Jam vero *sicuti visus naturalis fit per contactum radiorum visualium ad tunicam retinam*: *Sicut contactus aeris interni, moti ad tunicam cochleæ nerveam, auditum excitat*; ita & *spirituum circumgyrata & inordinata motio & in tunicam retinam illisio*, ibidemque facta impulsio objectorum externorum circumgyrationem apparere facit, quatenus nempe similis in tunica retina motus, qualis fit, quando objecta externa, quæ revera in gyrum moventur, motum talem in tunica retina excitant. Sicuti appulsus spirituum ad tunicam cochleæ *sonitus* istam speciem apparere facit. *Et hinc est*, quod etiam in *vertiginosis*, item *epilepticis*, *hystericis*, *ebriis &c.* tam *varii colores* subinde, imo & *splendores* interdum ante oculos versari videantur, quia scilicet in dictis affectibus ab inordinato motu spirituum in fi-

bris



bris tunicae retinae, talis motus fit in retina tunica, qualis aliàs fit à radiis visualibus ab objectis luteis vel coeruleis, aut splendentibus in oculum illabescentibus & tunicam retinam determinato motu ferientibus. Imò si nimis inordinatus & tantum non interruptus spirituum istorum fit motus, praesertim ad oculum, in tantum visus exinde perturbatur, ut etiam *obscuratio oculi & caliginis apparentia* superveniat.

*Caliginis talis sensus* fit ex defectu objecti lucidi aut colorati in oculo, vel ex ejus nulla perceptione, nam utroq; in casu *tenebras & caliginē* nobis imaginamur. Quod si igitur in perturbato nimis spirituum animalium motu abruptatur eorundē ordinata & radiosa series & in specie in oculis iidem deficere incipiant, in iisdem deficiens visus caliginem quasi repraesentat. Uterius si ex spirituum istorum inordinato motu ad musculos fit continuatio, nunc ex eorum hinc inde quasi abruptorum defectu cessans objectorum apprehensio & casus, nunc ex inordinato influxu leves *convulsiones* superveniunt. Adeoq; non solum spiritus visorius in oculis immediatē perturbari videtur in vertiginis affectu, quin totum spirituum animalium systema impetuosius in cerebro concitari in graviore vertigine videtur, ita ut & reliquorum sensuum organa simul afficiantur. Qui affectus verò, quia imprimis in oculo est notabilis beneficio gyri, ob id à *principaliore* fit denominatio, & *vertigo* appellatur, cum *posteriores* duo gradus, ad *lipothymias* vitio spirituum animalium propius accedant.

*Causa* ergo vertiginis *proxima & generalis* ad quasvis earum *differentias* se extendens, est *inordinatus*, confusus & plus minus subinde hinc inde interruptus spirituum animalium, in cerebri medullā, praesertim circa nervorum origines, motus & in partes externas influxus, unde omnia cetera dependent symptomata, quae pluribus vide adducta in Willis de anim. brutorum p. 2. c. 7.

*Quaestio* jam est de *causa remota*, unde iste spirituum inordinatus motus in cerebro & hinc in organis sensuum oriatur. Quoad hanc, observandum, vertiginem nunc esse symptomata saltim membrorum aliorum, v. g. quando supervenit *passioni hysterica*, vel *ventriculo affecto*; nunc per se morbum constituere, quando v. g. ex vitio cerebri qualicunque immediatē oritur. Prioris ratione *per consensum*, posterioris *per essentiam* esse dicitur. Sed, verum ut fatear, rarissima est *vertigo per essentiam*, quandoquidē quotidiana praxis & Praetectorum observationes monstrant, *vertiginem* ferē omnem esse ex vitio partium inferiorum, utut diutius affligens & saepe recurrens, cerebri texturam quoq; per motus spirituum p. n. alterare valeat, ut deinde ex vitio cerebri proximo affligere videatur. Adeoque si est per essentiam vertigo, erit saltem à causa externa, afficiente caput & cerebrum, raro à causa interna. Si non est à causa externa, vel



alium morbum capitis insequitur, vel vertigini per consensum, ille per essentiam deinde supervenit,

*Partes quorum consensu fit vertigo*, est imprimis *ventriculus*, cujus varia peccata, imprimis vitiosus sui generis acor volatilis, orificium superius affligens vertiginem infert. Et hujus manifestum indicium est, quod tales jejunium ferre nequeant, quin sapius fiant vertiginosi tamdiu, quamdiu vacuus est stomachus, subito vero atq; unam atq; alteram panis bucellam comederint, malum cessat; unde etiam matutinis horis tantillum comedendo vertiginem sapius præcavent. Ordinariò vero hoc evenit *hypochondriacis* & juvenibus diligenter literis incumbentibus, item *senibus*. Pertinent huc *hysterica mulieres*, quæ admodum vertiginosæ sunt, imò ut plurimum præcedentibus scotomiis suffocatio dicta *uterina* inchoat, aut in eadem durante paroxysmo hysterico vertigine gravi subinde corripuntur. Nempe mali hypochondriaci quædam species est hæc suffocatio. *Senes* etiam sapissimè vertigine corripuntur *vizio stomachi*, concurrentibus tamen simul spiritibus animalibus debilioribus & vitiata simul cerebri textura, ita ut levi occasione paroxysmo vertiginis corripiantur. *Ebrietas* quoque ad vertiginem disponit, unde ebriosi omnes vertiginosi sunt, *Sie sehen alle doppelt* / in paroxysmo quidem per essentiam vizio spirituum animalium ab alimento nondum ritè assimilato, ut & spiritu vinoso inordinatè vel confuse agitatorum. *Extra paroxysmum* vero ebrietatis vertiginem saltem per consensum ventriculi patiuntur. Porro flatulenti cibi *cepa, allia, rapa, raphani* & similia *oleracea* etiamnum in ventriculo vertiginosos nonnullos reddunt, nempe ad vertiginem jam dispositos. *Vermes intestinorum* graves inferunt vertigines; sicuti etiam epilepticas convulsiones. Adeoque *vertigo per consensum ut plurimum ex vizio stomachi*. Præterea tamen ex *liene, renibus* aliisque partibus nerveis insignioribus ditatis per consensum itidem oriri potest vertigo. Sic etiam *calculus renum*, ex pelvi in uteræ commotus, in quibusdam inferre solet scotomias.

*Sed quomodo fit vertigo per consensum?* Vulgò ad vapores & exhalationes, effumationes ac halitus ex inferioribus partibus elevatis in cerebrum confugiant. Sed *impossibilis est horum vaporum transitus* viis omnibus sufficienter munitis, unde imprimis *Helmont* & præter hunc *Schneiderus l. 3. de catarrhis* hujusmodi exhalationes sufficienter discusserunt. Consideremus *calculum*, qui motu suo in vel extra pelvim ad vertiginem disponit. It. *vomiturientes*, qui cum labii tremore vertiginosi quid patiuntur. Nec est, quod obijciatur sensibilis *aure frigida*, quam tales percipiunt, *adscensus*. Nam in his casibus saltem est spirituum versus cerebrum radiativorū recursus inordinatus & quasi *reflitionis impetus*, qui reliquas earum copias in cerebro impetuosus commovens eosdem in motus in-

ordi-

ordinatos & c.  
recursus & refl  
lem nerveam  
ferur, form  
hoc non in om  
quidam vertig  
dolentem com  
vero ab object  
tes vertiginis  
pit per interv  
quidam vent  
caderet; tem  
sursum adscen  
tum, ita ut qu  
tiginem per con  
teria & occasi  
& partibus ne  
scientum repræ  
natrat vertigin  
cta ratione par  
sione objecti  
ginariis ascer

Quod si

mit isti per cons  
dem ut altera  
malum excu  
erumpant.

Quod si

quid heteroge  
v. g. in parox  
do in cerebri  
tibus; hinc  
unt. Hinc  
notat *Ballon*  
haustoplus  
Perimere huc  
ulla intermiss  
virulentia & c.



ordinatos & confusos cogit, sicque *vertiginem* infert. Dum vero spirituum iste recursus & resiliio plus minus vehemens, ab objecto inadæquato partem sensilem nerveam vehementius afficiente nata contingit, & ad cerebrum usque deferitur, *formicatio* talis, seu velut *aura frigida adscensus* persentiri videtur, utut hoc non in omnibus æquè contingat, e. g. *ex graviore* in quodam loco *dolore*, quidam *vertiginosi* redduntur, objecti dolorifici occasione, spiritibus ad partem dolentem commotis, & aliquid spasmodici plus minus efficientibus, fortioris vero ab objecto doloroso impressionis ratione repulsi, iidem & quasi resilientes vertiginis pathema inferunt. *Fonseca l. 2. consult. 30.* refert mulierem, quæ cepit per intervalla pati hebetudinem quandam repentinam circa oculos, cum quadam ventris perturbatione; quo tempore corpus regere non poterat, quin caderet; *tempore accessionis*, dicit, se sentire *fumum* quandam ex partibus ventris sursum adscendentem, parum tamen durare hoc symptoma; prona est ad *vomitum*, ita ut quotidie ferè evomat pituitosa & biliola. Affectus est, quem *vertiginem per consensum uteri* vocant, cum tamen circa hypochondria minera, materia & occasio sensibilis delitescat, quod *vomitum* persuadet, quæ commotâ, & partibus nerveis istorum locorum alteratis, supra explicato modo fumi adscensum repræsentat, donec *vertigo* superveniat. Sic *Bartholinus Cent. 6. hist. 75.* narrat *vertiginem* ortam *ex pede*, adscendente hinc quasi vapore, qui ex supra dicta ratione pariter fieri videtur, nempe aliquid quasi spasmodici antecedit occasione objecti irritantis, sed impetuosius inde resilientibus spiritibus, vaporis imaginarius ascensus, tandem *vertigo* accedit, quæ pluribus deducta *vid. in Willis c. 1.*

*Quod attinet Vertiginem per essentiam*, hæc subinde supervenit isti *per consensum*. Si enim repetit sæpius talis per consensum *vertigo*, fit tandem ut alterata cerebri texturâ a crebrioribus istis & inordinatis spirituum animalium excursionibus, levi datâ occasione spiritus in inordinatos tales motus erumpant.

*Quod si per essentiam à seipso incipiat vertigo*, originem ducit 1. *quando aliquid heterogenei spiritibus animalibus permixtum eorum motum turbat*, uti patet v. g. in paroxysmo ebrietatis, item sub potu fumi tabaci in non adfueris. 2. *Quando in cerebri medullam p. n. quid immixtum fuerit cum sanguine aut sero influentibus*; hinc enim *suppressioni sanguinis* consuetæ subinde vertigines superveniunt. Hinc *ex nimia* & *vertiginem*, cum aphonîâ & intolerabili capitis dolore notat *Ballon. in suis hist.* Ablumptis nempe spirituum animalium copiis, & exhausto plus minus cerebro facile quid *vertiginosi* cum sanguine instillare potuit. *Pertinere hæc videtur historia Fracastor. l. 2. cons. 3.* de vertigine tenebrosâ sine ullâ intermissione in Chirurgo, qui crebrò *lue gallicâ* infectos curaverat, unde à virulentia & ea generi nervoso ac cerebro infecta ipsi communicata malum or-

tum



tum traxisse apparet. Pertinet huc, quod refert *Piso de Colluv. Serosa* de vertigine 5. annorum cum motus imbecillitate, spontaneo frequenti vomitu eoq; contumaci  $\nabla$  a limpida spumosa a natura curata, quod tamen malum potius per consensum ortum videtur.

Pertinet huc ipsius *M. S. constitutio* præternaturalis cerebrum afficiens, & hinc spirituum motum turbans. Hinc plures in vertigine *M. S. halituosam* aut nonnihil *vaporosam* accusant, cujus ad cerebrum delati occasione spiritus inordinatè agitati vertiginem inducant, adeo ut *Lindannus* omnem vertiginis rationem ex tali sanguine halituofo deducat. Hinc in tali vertigine quæ vitio sanguinis fit, *V. S.* interdum optimè conducit. Conf. *Horst. probl. p. 22.*

Denique vertigines per essentiam fiunt ex vitio cerebri quocunque tam conformationis, quam digestionis propria, & hujus occasione geniti in eo excrementi plus minus vitiosi. Nam quod prius attinet, concussio cerebri, contusiones capitis, casus ab alto fortior, ob quoscunq; poros cerebri & canales ejusdem immutatos, fibrarum ordinationem plus minus immutare, spirituum ordinarium motum turbare, & ita vertiginem inferre valent, idque eo magis, si talibus occasionibus externis interna digestionis errata accesserint. Adeoque quoad posterius à recrementis nempe retentis vertigines & alia mala oriuntur. Sic *Zacut. Lusit. l. 7. Med. Pr. hist. obs. 12.* observat paroxysmum vertiginis per abscessum materiæ purulentæ ex aure aliquoties curatum. Sic *Wepferus de parte affecta in Apoplex. p. 67. & 70.* observavit vertiginem in juvene, in cujus capite in cerebri sinistra parte vesica aqua limpida plena inventa fuit. Sic *Schenck. in obs. ubi de vertig.* vertiginem miram refert ingenti purulentæ materiæ per dentium alveolos & os excretionem curatam.

Quoad prognosin vertigo gravior & diuturnior in primis citra manifestam causam externam inchoans, in junioribus epilepsiam, in senibus apoplexiam certissimè prænunciat. Sanè in senibus rarò fallit. Unde etiam in senibus periculosior longè ac curatu difficilior, quam in junioribus. Pro varietate graduum quoq; plus minus periculosa est eadem. Unde vertigo caduca omnium pessima.

In cura duo tempora consideranda. 1. Extra paroxysmum, ut præservatio instituat. 2. In paroxysmo, ut ritè curatio perficiatur.

Præservatio respicit fomitem morbosum; & cum malum frequentissimum sit per consensum stomachi vel primarum viarum, ob id vomitoria, & hinc remedia stomachica primatum obtinent, quibus subjungantur specifica.

In curatione vel vomitus, vel opiata, vel antiepileptica tam interna, quàm externa sunt optima.



Pro his scopis ritè obtinendis *observandum*, quod in genere supra monitum fuit, *vertiginem* dici quibusdam *epilepsiam parvam*, & hanc subinde illam insequi. Hinc vertiginem sistunt in specie ea, quæ *Epilepsia* succurrunt & contra. In specie observetur

I. In vertigine per consensum *vomitória* esse optima, ipsâ præeunte naturâ in exemplis supra citatis, præsertim in malo contumaciori per consensum, vix sine vomitu curabili.

II. *Vena sectio* per se vix convenit. Interdum tamen ubi sanguis est copiosus cum vitâ sedentariâ, aut qui facilè ebullit ac turgescit, qui idem videtur cum flatuoso quibusdam dicto, aut quando à sanguine plus minus fovetur malum, convenit V. S. de quo vid. *Horst. in probl. decad. 2. quest. 3.*

III. Quoad *purgantia*, *MP. de succin. Craton. cum stimulo extract. colocynt.* It. *pilul. mastichina* præ cæteris conveniunt in vertigine per consensum stomachi. Item *extract. hellebor. nigr. cum ꝑio dulc.* uti egregium est purgans Epilepticorum, ita etiam vertiginosis prodest. Præ cæteris in malo inveterato per consensum conducunt *pilula usuales*, omnibus novi- & pleni- lunis instantibus vesperi capiendæ, paratæ ex *aloe, gumm. ammon. myrrha* &c. ut mundæ ferrentur primæ viæ ac fomes ex abdomine emanet.

IV. A *sternutatoris* abstinendum est, utpote quæ genus nervosum nimis commovent, indeque facilè spirituum inordinatos motus provocant, adeò ut periculum sit, ne ad epilepsiam magis disponantur ægri; ut taceam sternutationes oculis minus esse convenientes, sed potius nocivas.

V. *Fonticuli* in senibus & subjectis cacochymico serosis, uti præservativè ab apoplexia, ita curativè in vertigine sunt proficui, brachio inusti.

VI. *Curato paroxysmo* & institutâ totius corporis purgatione de *provisione* opera danda, ne redeat paroxysmus, adeoque in primis prospiciendum ventriculo. Hinc v.g.

℞. Galang. ʒβ.

cubeb. ʒij.

sacchar. ʒiβ. M. F. Tragæa, de qua ℞. ʒij.

inspergatur pani bis cocto vino generoso intincto & ita comedatur una alterave horâ ante cœnam aut prandium: Vel ad imitationem *Lindani* usurpetur pulv.

℞. Granor. Pæon.

coriandr.

Nuc Mosch.



visci quercin.

cubeb.

galang. an. ℥ij.

piperis longi

zingiberis.

tormentill.

rosmarin. an. ℥j.

M. F. pulv. de quo sumatur manè & vesperi ℥℥. sive cum, sive sine sacch. pro lubitu. *Elixir. menth. cum spir. mastich.* ab omnibus usurpata sunt proficua.

Vel ℞. Conserv. flor. anth. ℥j.

salv. major. an. ℥℥.

zingiberis Indic. condit. ℥℥.

sem. sinapi, eruc. an. ℥ij.

cardamom. cubeb. galang. an. ℥j.

℥. volatil. succin. ℥℥.

spir. ceras. nigr. ℥j.

c. f. q. syr. flor. tunic. F. Electuar. D. S.

*Haupt und Magen Latwerge.*

De quo omni manè & sub introitu lecti capiat pro lubitu. Hisce equidem *vertigo accidemalis*, seu minus *inveterata*, præsertim per consensum curari solet: *In habituali* seu inveterato malò verò undecunq; nato, requiruntur præterea, istis tamen non neglectis, *specificæ appropriatæ*, qualia sunt *pæonia, cubeba, semina sinapi, cinnabaris vel nativa, vel ℥ij, succinata* quælibet, præsertim *ol. ejus destillatum*, & hujus loco *ol. petra album*. Deniq; unum ex primariis *stercus pavonis*, quibus præterea etiam addi solent *Doronicum, charesol, salu. rosmarinus, baxus*, & in genere quælibet cætera cephalica & epileptica. *Doronic.* quidem singulariter in quibusdam laudatum, sed vereor ne ex præconcepta magis opinione, quam rei veritate fiat. Putant enim *rupicapras Alpinas* ejus usu reddi aptas, ut citra vertiginem montes ascendunt, quod ipsum tamen naturæ proprium & consuetudinis videtur beneficium. *Funambuli* quoq; ejus usu contra vertiginem se munire dicuntur, quod tamen patiter dubium. *Hepate rupicaprarum* vertiginem curatam refert *Velschius Hecat. 2. p. 36.* Dubium tamen annon additum *Eleosaccharum curi paris cum hepate* fuerit virtutis. *Salvia decoctum* in  $\nabla$ . vel vino, tam interno usu quam externo, si eò abluatur caput, ac applicetur fronti & temporibus laudatur à *Deckero in praxi*. Sanè aliquando *essentiam compositam* ex solo *charesol. & rosmarin.* proficuum in vertigine per consensum expertus sum. *Rosmarinus* ejusque *essentia* commendatur à *Ferdinando* in contumacissimâ vertiginè, in specie, si exasperetur malum in frigore hyberno, id quod

seni-

senibus ferè fa-  
ne intrus & ex  
quotidie temp  
verò;

imò si gutt. 8  
habetur rem  
sicque bibita  
macho come  
sem. sinapi pa  
In pavone fin  
tta vertiginem  
cum contra v  
uti aliquando  
scripsi

manè jejunc  
Omni vesp  
pro dosi. I  
tum, ut pul  
quotidie bis  
quidâ: Q  
virtutis, ad  
per noctem  
vertiginoso  
ratur distin  
capiendum  
artificialis



senibus ferè familiare. *Buxus*, in specie ejus *oleum*, uti in epilepsia, ita in vertigine intus & extus singulare habetur remedium, extra quidem inungendo *oleo* quotidie temporum arterias post aures, pulsus in manibus ac pedibus; interne verò:

℞. Conserv. flor. anthos ℥iij.

ol. buxi.

N. M.

menthæ an. ℥iij.

c. f. q. syr. de cort. citr. F. Electuar. dos. ℥ss.

imò si gutt. 8 l. 10. in *aqua pœonia* aliquot ℥iis exhibeantur, præstantissimum habetur remedium. *Cubeba* masticatæ stomacho jejuno, aut etiam vino infusa, sicque bibita multum conveniunt, non secus ac *semen sinapi crudum* jejuno stomacho comestum. Expertum est etiam ad vertiginem cum *caricis pinguis* & *sem. sinapi* paratum *Electuar.* quod pro usu præservativo vertiginis est egregium. In *pavone* singulare latet specificum, cujus non tantum *carnem* comestam contra vertiginem admodum laudant, sed in specie *stercus pavonis* nobile est specificum contra vertiginem; usurpari potest vel formâ *pulveris* ad imit. *Willis l. c.* sic uti aliquando viro cuidam insigniter vertiginoso præmissis præmittendis præscripsi

℞. Sterc. Pavonis ℥ij.

rad. pœon. mar. ℥j.

pulv. caryophyll. ℥iij. capiatu de his quotidie bis larga dosis

manè jejuno stomacho & bihorio ante cœnam, usurpavit bonò cum successu. Omni vesperâ sub lecti introitum accepit simul *spir. 9xci anisat.* gutt. 30. vel 40. pro dosi. Item in forma *electuarii* ℞. *Sterc. pavon.* in sartagine leniter exsiccatum, ut pulverisari possit M. cum *conserv. rosmarin.* & *majoran.* q. f. de quo quotidie bis capiatu, quo feliciter usus est *Lindanus in praxi.* Vel in formâ *liquidâ*: Quâ ratione *Petr. à Castro Medicus Veronens.* remedium admirandæ virtutis, ad præservandam vertiginem esse dicit ℥j. *stercor. pavon.* maceretur per noctem in vino albo, omnia postmodum per linteum trajecta exhibeantur vertiginoso, continuando à novilunio ad plenilunium usque. An præcisè requiratur distinctio sexus, ita ut *stercus masculi* pro maribus, *femella* pro foeminis sit capiendum, in medio relinquo. Deniq; *cinnabaris* tam *nativa*, quam *factitia* seu artificialis egregia est contra vertiginem, seu per se seu cum aliis adhibeatur. v. g.

℞. Stercor. pavon. pulverisat. ℥iij.

cinnab. nativ. ℥ij.

cubeb galang. an. ℥ss. M. F. pulv. pro cuius vehiculo

℞. ∇. chærefol. ℥iij.

liquor. CC. succin. ℥j. M. pro vehiculo dicti pulveris, capiendo



aliquot cochlearia; Cum eadem in specie *volatil.* & *ol.* nobilia sunt contra vertiginem internè & externè. Hinc internè *Elaeſacch. bis volatil. succin.* Extra *ol. de ſtil. ſuccini* vertici illitum eſt egregium. *Ol. ſuccini* loco *petroleum album* uſurpari poteſt. Memini enim me aliquando juveni ſtudioſo hypochondriaco crebrâ vertigine, ſeu jejunaſeu paſtus eſſet, affecto, præmiſſis præmittendis, & etiam aliis adhibitis convenientibus, fruſtra tamen omnibus, conſuluiſſe, ut in fine ſinguli paſtus 6. 7. ad 8. gutt. in ultimo hauſtu capiat, eoſque leviter præcordia inungat, id quod optimè profuit. Sic alii juveni præmiſſo vomitu dedi:

℞. Conſerv. menth. ʒj.  
 flor. anth. ʒvj.  
 petrol. alb. ʒjʒ.  
 ʒ. volatil. ſuccin. gr. xv.

c. ſ. q. ſyr. menth. F. Elect. de quo manè doſin caſtaneâ capiat; bono cum ſucceſſu accepit. Aliis nil juvantibus ſacra anchora erit *laudan. opiât.* imprimis appropriatis, præſertim *succinatis*, miſtum, quod quoscunque ſpirituum animalium inordinatos motus compoſcit, eoſque figendo ſedat.

*Quoad curationem in paroxyſmo:* In paroxyſmo vertiginis crebriore, dum ægri corriunt & ad tempus jacent, præ cæteris conveniunt *Vomitoria*, quæ optimè eoſ exſolcitant, aut horum loco acres *clyſteres*, uſitati aliâ in Apoplexiâ & Epilepiâ: Hinc infundunt appropriata ſpirituosa, nempe *▽ mma-joran. ſalv. ceraſ. nigr. ſpir. ceraſ. nigr. lil. conval. ſpir. vitrioli volatil. aut cephalicum*, vel adduntur iſtis ſpir. & *bia volatil. succin. CC. & c.* it. *caſtor.* tam in ſubſtantia quam ejus *effentia*, præſertim in ſexu ſequiore commode adhibetur. *Externe balſ. peruv. vel apoplect.* vertici, temporibus ac naribus applicantur. v. g.

℞. ▽. Salv. ʒij.  
 menthæ ʒj.  
 ſpir. lil. conval. ʒijj.  
 ʒ\*. vel hujus loco  
 liq. CC. ſuccin. ʒjʒ.  
 laud. op. gr. ij. vel iij.  
 ſyr. fœnic. ʒijj. ad vj. M. In mulieribus loco *ſp. lil. conval. eſſent. caſtor.* addenda venit. Exhibeatur cochleatim.



## CAPUT VII

DE

SPIRITUUM ANIMALIUM NIMIO  
ET INORDINATO SUBINDE AC VITIOSO  
MOTU IN PARTES EXTERNAS MOTUI DI-  
CATAS INDEQUE ORTA

## CONVULSIONE &amp; EPILEPSIA.

**D**ictum fuit superius, quod ex inordinato motu systematis spirituum anima-  
lium in cerebro sequatur sensuum varia perturbatio, quam vocamus *ver-*  
*iginem*, quæ ipsa interdum eò procedit, ut etiam concidant ægri, quæ *Vertigo*  
fit proximus gradus ad *Epilepsiam*, ita ut continuato post casum ipso spirituum  
animalium inordinato motu extra cerebrum ad partes motui destinatas, exinde  
*convulsiones* & tandem *Epilepsia* superveniant.

*Motum* omnem corporis fieri per fibras, easque per spiritum animale  
moveri, concurrente tamen adjumento sanguinis, præsuppono, seu fibræ istæ  
in unum musculi systema coëant, seu intertextæ eadem membranofum corpus  
constituant, seu partes istæ fibrosæ ex cerebro nervos accipiant, in *motu volun-*  
*tario*, seu ex cerebello in *motu involuntario* propterea *naturali* vocato. Quod  
si igitur præter voluntatis imperium moveantur musculi, & non absque insigni  
violen tia & adjunctâ plus minus molestia contrahantur & agitentur partes, seu  
internæ seu externæ, *spasmus* Græcis, Latinis *convulsio* appellatur.  
Græcis  $\sigma\acute{\alpha}\sigma\mu\varsigma$  dicitur à  $\sigma\acute{\alpha}\nu$  quod est trahere, propterea, quod quasi summâ  
vi & insigni violentiâ trahantur partes potius & quasi dacerentur, quàm quod le-  
gitimè moveantur.

*Convulsio* hæc seu *spasmus* duplex est, vel *conductio*, vel *concussio*, id quod  
communiter explicant per convulsionem & motum convulsivum. *Con-*  
*ductio* est *convulsio tonica*: *Concussio* est *convulsio donica*, quod signi-  
ficat *inaequalem membri motum*, unde vocatur *motus convulsivus* ultro citroque,  
seu quod idem est, invitam membri contractionem & extensionem, unde  
 $\sigma\phi\upsilon\gamma\mu\acute{o}\varsigma$   $\kappa\lambda\omicron\nu\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$  seu pulsus vibrans, quando scilicet arteria quasi in motu retracta  
vibrando pulsus edit. *Tón* vero est, quod *Celso* vocatur *immobilitas* & *ri-*  
*gor membri*, quod membrum conjunctum sit immobile, ita ut *Conductio* seu  
*Convulsio Tonica* membri contractionem rigidam & in unâ sitis figura perma-  
nentem



mentem innuat: *Concussio* vero sive *Convulsio* innuat variam agitationem, vibrationem, modo extensionem, modo contractionem.

*Contractura* cognata est *Convulsioni tonica* affectio, quâ membrum semel convulsum semper postmodum rigidum manet. *Conductionis species* sunt famosæ illæ tres: *Tetanus*, *Emprosthotonos* & *Opisthotonos*; quod & aliæ species pertinent. Nam pertinet huc *Priapismus* & *Satyriasis*: it. *Spasmus Cynicus* cum adjuncto symptomate, quod dicitur *Risus Sardonicus*. Huc pertinet vitium, quando contrahitur *cachinnus* obrigescens, ex inepta V.S. læso nervo. Pertinet huc ille affectus innominatus, quando *genua rigida* propter contractum nervum ac tendinem, quæ per cavum genu transeunt.

In specie famosi sunt isti 3. affectus: *ἐμπροσθόνος* est conductio musculorum mastoideorum. Hinc est, quod mentum pectori affigatur. Contrarium vitium est *ὀπισθόνος*, conductio musculorum occipitis. His occiput trahitur versus dorsum & posteriora. *Τέτανος* denique est conductio & anteriorum & posteriorum occipitis musculorum. Hinc enim non possunt caput ad ultimum latus vertere, sed caput rigidum & etiam immobile manet. Sunt tamen qui non solum capitis versus truncum, sed totius trunci tales conductiones sub his nominibus intelligunt. Conf. *Sylvium* l. 2. c. 23. §. 19.

Ad *Emprosthotonon* referendus est casus, quem describit *Hippocrates* sect. 4. §. 34. quem *aphorismum* vulgò, sed malè de Angina interpretantur. Comprehendit enim morbum, quem vocamus *den Hals umbtreen*/ quando tunc musculus mastoideus convellitur & rigidus manet. Sic enim caput circumducitur, aspera arteria comprimitur, & tales ægri tandem suffocantur.

Quoad *Convulsionem tonicam* debet huc referri, quando unum seu plura membra moventur inæqualiter, qualis convulsio est *Epilepsia*. Pertinet huc *cramba*, seu *spasmus flatulentus*, cui in primis ebriosis, item qui ad *arthritidem* inclinant, sunt obnoxii. Dixi quod ad *concussiones* etiam pertineat *Epilepsia*. Est enim revera talis motus convulsivus, in quo membra corporis variè trahuntur, vibrantur & agitantur, sensuum exercitio quocunque ut plurimum abolito, cujus sub sua latitudine species tres sunt.

*Gradus primus* isque abusivè *Epilepsie* tributus est, quando ægri subito concidunt, aut saltim, seu sedeant, seu stent, omnibus sensuum functionibus subito privantur, & quasi somno altissimo sepulti, citra ullam animalem functionem ita persistunt, utat nullus spasmus sensatus, seu externarum partium

partium conv  
v.g. in hysterica  
Hic Epilepsia  
ad vertiginem  
lepsiâ veram

Secu

donibus corp  
integre perfit  
res convulsi,  
hinc inde per  
xylinam nunt  
ignorant. E  
lepsi. conf. item  
2. hyst. 90. Sa  
omiss. c. 6. de  
câ percutieb  
ut longius cur  
sum habet V  
Sic Epilepsia  
N.C. Ann. 3  
relectus fun

Ter

ita ut omnis  
pus agitur;  
dunt, pedib  
jicitur, ling  
æger tanquan  
de perturbat  
Hic tertium  
m u, sed vulg  
subinde pro  
defendat.

Quo

rum epileptic  
rio & perqu  
ordinatus, u



partium convulsio accedat. Licet si per consensum fiat partium abdominis, v.g. in hystericeis aut spleneticis, subinde spasmi partium nervolarum concurrant. Hic Epilepsia motus potius est proximus ad Epilepsiam gradus, nempe pertinet ad vertiginem caducam, quam Epilepsia dicimus proximam, cum facile sibi Epilepsiam veram comitem adsciscat.

**Secundus gradus Epilepsia** est, quando variis motibus & agitationibus corpus percussitur, sensibus quibusvis tam internis quam externis aut integre perstantibus, aut in delirium abreptis, dum interim quoad externas partes convulsi, sub convulsionibus istis saltare, cantare, ridere, lachrymas fundere, hinc inde perecurrere, pectus percutere, ridicula narrare solent, & post paroxysmam nunc omnia secum actorum in paroxysmo recordantur, nunc eadem ignorant. Exemplum talia stupenda vid. in Willis de morb. convulsiv. ubi de Epilepsia conf. iem Cranzium, ubi de Purpura p. 33. Timaeum in Epist. 9. Bartholin. Cent. 2. hist. 90. Salmuth. Cent. 2. hist. 41. Pertinet huc Epilepsia cursiva Boetii in aff. omiff. c. 6. de puero 12. annorum, qui paroxysmo Epileptico vexatus, semper recta percurrere non posset. Vocat ob id Epilepsiam cursivam: Similem casum habet Valentinus Tr. de Convuls. qui & Epilepsiam rotatoriam observavit. Sic Epilepsia, in cuius paroxysmo diu & multum agra ridet vid. in M. A. N. C. Ann. 3. pag. 526. item Epilepsia miranda, in quibus sensus omnes & intellectus sunt illasi vid. in Fehr. de Scorzoner. p. 96.

**Tertius Gradus** est, qui ex utriusque modo dictis est conflatus, ita ut omnis tam sensus quam rationis usus pereat, simulque variis motibus corpus agitur; dentibus strident, brachia jactitant, pollices arcte in manu claudunt, pedibus tremunt, corpus insigniter attollunt, incurvant, spuma per os rejicitur, lingua morsu laeditur, &c. Quibus omnibus successive remittentibus aeger tanquam sopore oppressus jacet, & ad se rediens, nil omnino scit. Saltem de perturbatione capitis & omnium artuum gravi lassitudine conqueritur. Hic tertius modus est vulgatissimus. Primus nonnihil rarus, secundus rarissimus, sed vulgo ignoratur. Idem gradus secundus est terribilissimus; nam tales subinde pro obsessis a Damone habentur, nisi Medici scientia innocentiam agri defendat.

Quoad differentias convulsionum & motuum convulsivorum epilepticorum vulgo dictorum, conveniunt quid in motu involuntario & perquam robusto; differunt vero quod in Epilepsia sit interruptus & inordinatus, uti & in ceteris convulsionibus; in convulsione vero seu concussione



sit continuus. *Illud igitur quod subjectum est motus naturalis*, necessario etiam subjectum erit p. n. Cum igitur *fibræ nervæ* sint *subjectum* omnis motus naturalis in corpore humano, tam voluntarii in musculis, quam non voluntarii in partibus corporis internis membranosis & ubicunque sunt membranæ, ob id necessario *fibræ* erunt *subjectum commune* convulsionum & Epilepsiarum, *musculi* vero & membranæ *subjectum* erunt *adequatum seu proprium*.

*Fibræ nervæ* dico. Nam ipsi *nervi* nil aliud sunt, quam congeries talium fibrarum juxta se situatarum, quæ tunicâ duplici à meningibus cerebri continuata investitæ, corpus nervi constituunt. *Fibræ* igitur & partes per fibras motæ erunt *subjectum convulsionis & Epilepsie*.

Ex quibus fluit *differentia*, quando *Spasmi & Epilepsia* dividuntur in *externas & internas*. *Externa* sunt, quando membra externa afficiuntur, v. g. convulsiones brachiorum, oculorum, pedum, thoracis in asthma convulsivo, oris &c. *Interna* vero convulsiones sunt, quando viscera interna membranosa mirè torquentur, uti fit in colicis convulsivis, passionibus hysteris & similibus, dum intestina, mesenterium & annexæ partes convulsionibus affliguntur.

Talis etiam affectus est, quando in *nephritide* convulsus stomachus vomitus, & convulsa intestina tormina colica in nephritide patiuntur. Quales convulsiones in *hypochondriacis*, ac quod idem est, *hysteris* plures observantur, cum in his subjectis, quàmplura vaga hinc inde observanda symptomata ex talibus spasmodis internis oriantur. In specie, quando *plexus nervæ*, quales plures sunt in abdomine, speciatim *magnus* iste in *mesenterio* afficiuntur. Cum enim ex his deriventur nervi in varias abdominis partes, facillè totum abdomen affectis his plexibus, aut saltem plures illius partes convelluntur, & cum hi plexus ex *p. n. vago* oriundi, conjuncti sint *nervis intercostalibus*, ob id sæpius affectis istis plexibus & *pectoris & capitis* partiū convulsiones tandem insequuntur, adeò ut istarum partium internæ convulsiones ad cerebrum usque continuatæ, terminentur deinde ex turbato universo spirituum animalium ordine, in convulsiones partium externarum. Quâ ratione *passionibus hysteris* non rarò supervenit epilepsia toties repetens, quoties ad conatum parturienti se accingunt. Nam isti *dolores parturientium* nil aliud sunt, quam partium abdominis, in specie uteri, mesenterii, & subinde intestinorum convulsiones. Pertinent huc *tensiones hypochondriacorum* & ubicunque sunt membranosæ partes, si illæ  
spasmo

spasmo aut con  
brana tympan

Quoad  
externarum ex  
murmurationi  
ctione aut intu  
riora versus res  
testinorum, et  
supervenit sub  
laqueus gula  
adeò pathem  
cum tantis q  
libet e contra

Quoad  
voluntariis, ex  
bras ad sui cor  
piâ elastica ex  
ctione fibrarum  
digitum & br  
sio brachii. c  
luntaria, diffi  
non absque v  
Prax. c. 23. S. 3.  
trium movet  
tationem influ

Sic idem  
cum risu Sar  
motus, ergo  
differentia, q  
naturalis, dan  
inordinatè, se  
per nervum  
convulsivum  
pius levi ex c  
spiritus anim  
inordinatè,  
tio præcisè d  
Pars



spasmo aut convulsione afficiantur, tendi, indurare, obrigescere & instar membranae tympani fortius tendi solent ex fibris ex spirituum impetu ita afflictis.

Quoad *diagnosin*: Convulsiones huiusmodi & epileptici insultus partium externarum ex motu membrorum facile patent: Interna verò cognoscuntur ex murmurationibus & borborygmis abdominis & subitanea huius aut contractione aut intumescencia & tensione & duritie ejus, subinde & umbilici interiora versus retractione, ex sensu contorsionis partium internarum, in specie intestinorum, ex dolore lacerante circa lumbos, ubi annexum est mesenterium, supervenit subinde respiratio difficilis, interdum sensus suffocationis, aut quasi haqueus gulae injiceretur &c. Subinde externarum partium epilepsia supervenit, adeò pathemata hysterica dicta, cum epilepsia in radice conspirant, ut tantum circumstantiis quibusdam variant & omnia antepileptica hystericis prosint; quælibet e contra hysterica epilepticis sunt proficua.

Quoad *causas* præsupposito spiritu animali ex cerebro pro motibus voluntariis, ex cerebello pro motibus involuntariis per nervos distributo, qui fibras ad sui contractionem disponat, seu solitariò hoc faciat, seu adjutus simul copia elastica ex sanguine suppeditata, necessariò idem spiritus movebit in contractione fibrarum morbosa, v. g. uti spiritus in nervum brachii influens movet digitum & brachium ex meo arbitrio, ita si fiat punctura nervi & inde convulsio brachii, cum hic motus convulsionis sit idem cum priore contractione voluntaria, differens tantum in eo, quod convulsio invito convulso contingat & non absque violentia insigni, concurrente simul interdum dolore. *Conf. Sylv. l. 2. Prax. c. 23. §. 30.* Hinc sequitur necessariò spiritum animale, qui secundum arbitrium movet brachium, etiam in brachio convulso ex impetuosiore ejus per irritationem influxu, istius convulsionis brachii causam esse.

Sic idem omninò est, seu sponte & per jocum rideo, seu epilepticus insultus cum risu Sardonio contingat, eadem est musculorum in utroque risu actio, idem motus, ergo etiam idem movens, nempe spiritus animalis. Hæc tantum interest differentia, quod ut ordinatè & placidè moti spiritus, idque dictante prius anima naturali, dant motum naturalem partium & risum naturalem, ita idem spiritus inordinatè, confusè & rapidè in stimulo morbofo agitati & quasi cum impetu per nervum in partem explosi, convulsiones & motus convulsivos & v. g. risum convulsivum, inferant. In epilepsia tamen habitualibus, h. e. inveteratis & sæpius levi ex causa recurrentibus, item hereditariis ferè suspicor deviare tum ipsos spiritus animales è naturali sua crasi & constitutione & magis elasticos, faciliùs inordinatè, idque cum impetu mobiles reddi, ut in quo alterata hæc constitutio præcisè consistat, determinari certò nondum queat.



*Causa igitur proxima formalis* convulsions & epilepsie erit impetuofus, rapidus & maximè violentus spirituum animalium motus; interruptus diversimodè, inordinatus & confusus, in concussionibus & epilepsiis; ordinatus vero & continuus in conductionibus, seu in specie sic dictis convulsionibus.

*Causa remota seu materialis aut occasionalis* motus istius spiritus animalis, in generali consideratione est duplex: *Prima est irritatio* quedam in parte sensili ac nervea, qua occasione spiritus impetuosiùs moti, convulsionem nunc leviozem, nunc graviozem, nunc continuam in convulsione tonica, nunc interruptà in clonica seu epilepticis motibus inferunt. Sic puncto nervo ob irritationem in loco puncturæ, quæ consistit in subtili & celeriore fibrillarum ejus vibratione & agitatione, commoventur simul spiritus per nervum illum blandè radiantes, quorum motu p.n. ad cerebrum usque continuato simul commoventur reliqui spiritus, ita ut hi ipsi aperto quali tramite cum impetu per ipsum nervum ferantur & ita convulsionem fibrarum istarum & muscutorum, ad quos terminatur nervus, inducant.

Sic ex irritatione stomachi à medicamento g.iali fit vomitus, ex irritatione cordis fit hujus palpitatio. Sternutatio, quam tantillum hellebori narium membranae infixi concitat, quid aliud est, quàm epileptica thoracis convulsio, unde & à suppressa gravem epilepsiam ortam refert Salmuth in observat. Similiter & in aliis convulsionibus epilepticis tantillum irritans, saepe remoro in loco, occasionem epilepsie suggerit. Conf. hic notab. loc. in M. A. N. C. Ann. 6. obs. 77. p. 112.

*Secunda causa est aliquid p.n. excrementitium, aut in cerebro hærens* quod certis intervallis commotum spirituum morum turbat, aut ipsi spiritibus ibidem permistum, eosdem vitiosè agitans. Uterque modus, si spiritus in motus perturbatos inordinatos & vagos cogat, non tantum sensuum omnium tam internorum quam externorum, ad quos placidus & moderatus, isque ordinatus spirituum requiritur motus hebetudines, sed etiam ex inordinato motu eorum in partes extra cerebrum tam internas, quam externas, varii motus convulsivi superveniunt. Sic videmus animi affectus graviores, v. g. terrores nimios propter inordinatum ac insigniter turbatum spirituum animalium motum epilepsias subitaneas non rarò inducere, id quod præsertim in infantibus notum. Conf. Hochstetter. decad. 4. c. 8. in Schol. Schenk. in observ. Gabelchover. Cent. 4. cur. 59.

Utriusque causa remota a ratione epilepsia est vel per essentiam, vel per  
con...

consensum  
sentum, rarò p  
fomes irritati  
quando in con  
epilepticis mot  
lepsia, frequen  
bosus intillet  
inferat.

Quod si  
præcognitio  
corripuntur  
dolor aut me  
postmodum  
lepsia est in pa  
scitur, vix mo  
facile patet.

In epile  
ctionibus ani  
graviori in m  
rebrum aut  
epilepsia qu  
per contentu

Quo  
irritation  
di. Sic enim  
acre relictum  
incipit. & pl  
gravi vulner  
tat cum men  
vulsionem,  
resolutione  
nerint, utru  
lem paroxy  
& acrior in  
propagines  
Cent. 2. obs.  
bus creberr



*consensum.* Priori modo epilepsia, quæ oritur, est frequentissimè per consensum, rarò per essentiam, nisi in membranis cerebri aut in ejusdem ventriculis fomes irritationis hæreat, tunc enim ferè per essentiam esse videtur. Ut v.g. quando in contusione cranii occasione festuca cerebri membrana gravius læsa epilepticis motibus occasionem præbet. *Quæ ex posteriori causa* contingit epilepsia, frequentior est per essentiam, nisi mediante M.S. ex alia parte fomes morbosus instilletur cerebro, ibique spiritus plus minus afficiendo epilepsiam inferat.

*Quod si per essentiam sit epilepsia*, ferè nulla paroxysmi futuri seu invasuri præcognitio præcedit, sed dictum factum ex improvise motibus convulsivis corripitur. *Ubi vero est per consensum*, ibi ut plurimum alteratio quædam, dolor aut motus quidam singularis in parte quadam præcedit, cujus occasione postmodum epilepsia supervenire percipitur. *Inspecte hoc fit, quando focus epilepsie est in partibus remotioribus.* Ibi enim imminens paroxysmus ferè cognoscitur, vix mota quasi aura, qua sursum adscendente epilepsiam in promptu esse facile patet.

*In epilepsia per essentiam* capitis affecti signa adsunt, torpor quidam in functionibus animalibus internis, aut saltem quædam depravatio adest: Interdum graviore in malo fatuitas sequitur, & præcesserunt ferè causæ externa, quæ cerebrum aut partes capitis lædere potuerunt. Imprimis D. motibus auscultat epilepsia quævis, magis tamen ea, quæ est per essentiam, uti etiam ista, quæ est per consensum, sed diutius duravit.

*Quoad epilepsiam & motus convulsivos, qui sunt ex irritatione*, seu per essentiam seu per consensum, plures hujus observantur modi. Sic enim post cerebrum vulneratum & non ritè sanatum, propter fermentum acre relictum, item post casum ab alto, ubi sanguis sub cranio putredine corrumpi incipit, & plus minus acescere, epilepsia oritur. Superiori anno cum quidam gravi vulnere læderetur in latere capitis dextro, quod os bregmatis penetraverat cum meningibus & cerebro, observavi paucis post diebus supervenisse convulsionem, sed levem lateris læsi seu vulnerati: E contra perfectam paralytin ac resolutionem totius lateris sanæ. Sed cum paroxysmi epileptici subinde supervenerint, utrumque latus, ejusque partes promiscuè convellebantur. Sed extra talem paroxysmum paralyti pars sana, spasmus pars agra laborabat. *Lympha vitiosa & acrior* in cerebri ventriculis collecta irritando horum membranas, piæ matris propagines, epilepsiam infert, vid. Schneid ubi de catarrhis l. 2. p. 103. Conf. Borell. Cent. 2. obs. 78. Ex vitio stomachi frequens est epilepsia. Item lumbrici in infantibus creberrimè epilepsias inferunt. Retenta corrupta, in specie suppressa excretio



& inde nata acrimonia irritando partes circa genitalia sensilem per consensum epilepsiam infert, v. g. *Forestus l. 20. obs. 115.* observavit convulsionem *ex utero* totius corporis, *ob seminis corruptionem*; nil proficientibus remediis aliis, facta titillatione per mulierem in genitalibus cum ol. liliaceo, cui zibethum immixtum erat, illico sanata est. Sic *Hildannus Cent. 6. obs. 25.* refert mulierem epilepticam *ex utero* cum convulsionibus ad eum modum, quo cum viro coire consueverat, à viro longè antea absente per coitum mox curata, neque amplius, cum Medico conjugali vivens, convulsionibus correpta. *Ex ulcere in crure* sanato epilepsia, quo rursus aperto ea cessavit vid. in *Amat. Cent. 2. hist. 6.* It. *ab occluso ulcere in crure*, ex quo ascendens aura epilepsiam infert vid. in *Barthol. Cent. 3. hist. 20.* *Horst. l. 2. obs. 10.* *Hildan. Cent. 2. obs. 10.* *Variola & morbilli* ante sui eruptionem, vel etiam post non sufficientem excretionem familiarissimè epilepsiam inferunt. Sic *melancholia* subinde in epilepsiam abit vid. *Salmuth Cent. 2. obs. 42.* Sicuti è contra epilepsia subinde in *melancholiam* transit. *Colica* non rara est, nempe *convulsiva* ista, quæ epilepsiam infert, non secus ac *purgantia acriora, helleborina* ac similia notoriè convulsionem inducunt. *Nixu pariendi* in dispositis epilepsiam excitari supra insinuatum est. *Arthritis* desinens in epilepsiam terminabatur, quæ cessavit revertente arthritide autore *Riverio Cent. 3. observ. 85.* Præ cæteris *scorbutici & hypochondriaci* creberrimè affectibus spasmodicis motibusque convulsivis & epilepticis variis observantur obnoxii.

*Locus ubi hæret fomes morbi*, seu ubi fit ista irritatio, est varius, nunc *internus*, nunc *externus*.

*Internus*, ut mesenterium, genitalia, lien, quorum plura hinc inde observantur exempla. In specie ex liene epilepsia vid. in *Schenck. obs. Tulp. l. 1. cap. 9.* *Horst. in observ. &c.* Subinde etiam ex partibus *externis*, longè à capite remotis per irritationem concitata epilepsia. Sic *Henr. ab Heer obs. 24.* refert Epilepsiam ex subitâ animi consternatione & terrore ob sollicitudinem stupri, in cuius paroxysmo agra continuò fricabat *pollices pedis*; facto cauterio in iis cum butyro & ij sanata. Pariter *Borellus* refert epilepsiam ex pollice ortam per cauterium ibid. applicatum curatam *Cent. 2. obs. 95.* *Salmuth Cent. 1. obs. 90.* habet epilepsiam concitatam per auram ab extremis adscendentem, per ligaturas partibus istis injectas præservatam. *Lindannus* refert de juvene, qui habuit cariem ossis in pollice pedis, ex quo sensit surgere auram quandam epilepsia pro dromum. Poterat prælagire paroxysmum, & quamprimum in pede sentiebat moriunculas istas, statim fasciis cruralibus, quas ex fune confecerat, arctissimè constringebat, & si hoc faceret, impediabat paroxysmum; si non faceret, statim corripiebatur. Semper, dicit *Lindannus*, quasi ex eo, an sentiat aliquid in capite,

pite, qui respo  
linus Cent. 1. ob  
dum minimi r  
est observatio  
manus medio a  
mo digiti dolo  
& tandem mo  
medicamentis  
corio human  
sus fallacia el  
spatium, per  
ex aucto & l  
sensim inche  
quæ ob cor  
secundum ner  
pium nervor  
ibid, violenti  
erumpere inc  
tum omnium  
externas, etia  
convulsio se  
sius irruenti  
nantur agri  
quod mater  
broia sursum  
ligatura supra  
te pars infer  
& irritationis  
Istu  
objectum auc  
est inprimis a  
gnatas, huj  
exerit acidit  
dum, præse  
Ad principia  
unde orunt



pite, qui respondebat, se nil in capite, nisi vertiginem quandam sentire. *Bartholinus Cent. 1. obs. 82.* refert epilepsiam singulis noviluniis cum tumore digiti pedum minimi recurrentem, cauterio isti inflicto curatum. Tandem notabilis est observatio 25. *Cent. 6. Hildani* de muliere epileptica ex aura quadam è sinistra manus medio digito adscendente reddita. Paroxysmus quotidie redibat, de summo digiti dolore quæritabat: Tum manus contrahitur, brachium convellitur, & tandem motu convulsivo totum corpus percutitur. Cum nullis uti veller medicamentis, facta circa carpum & brachii partem musculosam ligaturâ ex corio humano, evanuerunt omnes insultus. Aura hæc assurgens, non nisi sensus fallacia est. Nec enim movens adest, quod auram istam propellere, nec spatium, per quod moveri aura ista queat, sed potius, dum in loco irritationis ex aucto & simul inordinato spirituum ad locum irritationis motu, in isto loco sensim inchoat convulsio: *Primo est tantum fibrarum levior contractura,* quæ ob continuatum spirituum impetum sensim continuata *successive secundum nervi distributionem sursum continuando pergit,* donec ad principium nervorum usque continuato isto convulsione motu, spiritus animales ibid. violentius agitati, facto quasi agmine & impetu per plures nervos vicinos erumpere incipiant. Unde ex inordinato isto motu intra cerebrum non tantum omnium sensuum perturbatio, sed etiam ex simili depravato motu in partes externas, etiam convulsiones superveniunt. *Dum vero inchoat spasmus seu convulsio secundum nervi ductum,* ex spiritibus propter irritationem impetuosius irruentibus, sed ex parte simul nonnihil resilientibus sursum pergit, imaginantur ægri, præsertim cum *formicationis* quidam sensus interdum superveniat, quod materia quædam subtilis tanquam aura quædam ex uno vel altero membro ita sursum repat, & in cerebro consequenter epilepsiam inferat. Juvat autem *ligatura* supra partem primario dolentem injecta, quoniam ligatura tali median- te pars inferior quasi stupida, indeque minus sensibilis & irritabilis redditur, unde & irritationis sensus & spirituum impetus & fibrarum contractura impediuntur.

*Istud, quod ita irritat & occasionaliter epilepsiam infert,* præter *objectum auctum* nervos afficiens, ut sunt *festuca cranii*, ex *causis internis* est in primis *acidum* nervis inimicissimum, & quod vellicando eos aut partes cognatas, hujusmodi mala infert. *Locus irritationis* & ubi spicula sua exerit acidum, est in primis *triplex* & nunc 1. *Circa principium.* 2. *Nunc circa medium,* præsertim circa plexus. 3. *Nunc circa insertionem* ejusdem nervi contingit. *Ad principium nervi* etiam cerebrum & cerebellum itemque medulla spinalis, unde oriuntur nervi, pertinent.



*Quoad epilepsiam modosque convulsionis natam ex vitio cerebri & spirituum animalium* ipsorum, *aliquid heterogeneum vitiosum cerebro cum sanguine instillatum*, spir: vitiosè movens hîc considerandum; *vel aliquid p. n. ipsis spiritibus permixtum*, quod quibusvis occasionibus, seu immediate, vel mediante spirituum agmine paulò vehementius commoto, v. g. in animi affectibus excitatum motus spirituum inordinatè turbando & agitando paroxysmos infert. *Quicquid horum sit*, sedulò habenda est ratio *huius epilepsie*, etiam non adeò raræ. Nempe pertinet huc *epilepsia hereditaria*. Nam utut hæc ipsa radicem possit habere etiam in quodam abdominis viscere, nihilominus tamen certo spirituum vitiosè constitutorum & in crasi suâ deficientium, simul videtur subesse erratum. Pertinent huc *huc fumi & ales*, ex quib<sup>9</sup> per nares attractis convulsionibus obortas notat *Salmuth Cent. 3. hist. 39.* Ut nil dicamus de *miasmatis* minimis & *ialibus*, quocunque modo cerebro communicatis, ad epilepsiam disponentibus, ut quando ex *unguento & ial* contra tineam applicato epilepsia oritur, autore *Timeo in Resp. p. 106.* Nam potius ex irritatione ab acrimoniâ & ialium particularum hæc nata videtur. Potius huc pertinent *febres malignæ*, aut etiam *benignæ continuæ* malè judicatæ, quæ occupando cerebrum ibique spiritus animales turbando, præter deliria, *convulsionibus epilepticis* ordinariò inferunt, quas tractio & *subultus*, aut quædam *vibratio tendinum* circa carpum imminentes inhiunt. Pertinet huc *epilepsia lethalis post aurium dolorem*, discussa, sed non suppurata materia, quam refert *Horstius in obs. l. 2. obs. 21.* Item quando ex *suppressa hæmorrhagiâ narium* paralytis lateris dextri, & ab hac sanata epilepsia nata fuit, autore *Bartholin. Cent. 4. hist. 69.* Ex *suppressa* quoque *urina*, renum vitio, supervenire epilepsiam, *urinario sero* cerebrum inundante, non rarum est. *Suppressi consueti sanguinis effluxus* v. g. hæmorrhoidum, mensium, subinde epilepsiam inferunt, cerebri ac spirituum alteratorum vitio. Quò etiam facit incipiens *gravidatio*, cujus occasione quædam epilepsie fiunt. Denique *apoplexia* interdum in Epilepsiam transit & contra. vide *M. N. N. C. Ann. 6. p. 311.*

*Inter pathemata, quæ epilepticos vexant*, non ultimum est *stridor dentium*, maxillarum vehementissima constrictio, idque ex convulsivo impetu. Sed *dentium constrictio*, quod probè notandum extra epilepsiam interdum observabilis, ex paralyti aliquando musculorum maxillam inferiorem deorsum trahentium, non semper ex convulsione est. Conf. *Thyrmayer Conf. l. 2. p. 174. it. spuma*, quæ ante os epilepticorum interdum conspicitur. Hæc saliva est rarefacta ab aëre dum constrictis & coangustatis spasmo plus minus faucibus, saliva plus minus copiosè expressa, ab aëre per illas angustias vi explosa agitata, in talem



talem spumofam texturam abit. Hinc etiam ex naribus interdum materia talis excerni solet. Conf. Pechlin. in Tr. de aëris & alimenti defectu.

Quoad differentias Epilepsia, hæc est vel *universalis*, vel *particularis*, quando unum alterumve membrum, aut aliquot saltem partes corporis epilepticis convulsionibus vexantur. Vid. Sennert. Institut. l. 2. p. 3. sect. 1. cap. 9. de Epilepsia, ubi curiosa Epilepsia particularis recensentur exempla.

Quoad prognosin: Vertigo citra manifestam causam juniores frequentius aut fortius affligens Epilepsia est prodromus. Item Ephialtis crebrior sub somnum invasio signum est imminentis Epilepsia testibus ferè omnibus Practicis. Ipsi Epilepsia obnoxii, quando splendores aut coruscationes oculis observari videntur, item varii colores, paroxysmi imminentis sunt prænuntii. Conf. Bartholin. Cent. 3. Histor. 45. Item M. A. N. C. Ann. 2. p. 170. Convulsio, quæ fit ex consensu minus periculosa est, faciliusque curatur quam ea, quæ est ex cerebro per essentiam. In febb. malignis supervenientes convulsiones sæpius mortem portendunt. Si toto corpore a convulsionibus immunum aut labrum convellatur, aut palpebra aut lingua, pravum symptoma putandum. Nam aut mors portenditur, aut epileptica convulsio. Epilepsia hæreditaria vel nunquam vel rarissimè curatur. Epilepsia ante pubertatem eveniens curabilis est: Post annum vero 25. ferè usque ad mortem durat Hipp. sect. 5. §. 70. quod tamen ut plurimum verum est, cum Rhodius in suis observat. aliquot exempla contraria adducat. Epilepsia laborantes juniores cum ætatis mutatio, tum loci & vitæ liberat Hipp. Sect. 2. §. 45. nempe in pueris pubertatis mutatio ac Venus, in puellis vero menstruorum initium morbum hujusmodi tollere solet. Conf. Forest. l. 10. obs. 35. in schol. In paroxysmo epileptico si ad usum sternutatoriorum non sternutet æger malum indicium est, argumento naturam succumbere ac nimis prostratam esse. Si mulierem utero gerentem fortis Epilepsia invadat, magnum periculum minatur, saltim periculum abortus imminet, id quod tamen non semper absolutè verum deprehenditur, siquidem Rhodius Cent. 1. obs. 60. refert matronam prægnantem, quæ dum utero gereret, post 6. 7ve menses epilepticis insultibus affligebatur, partum vero enixa, optimè convaluit. Sic etiam Schenckius in obs. non omnes prægnantes epilepticas abortum pati annotavit. A copiosis sanguinis fluxu singultus aut convulsio mala Hippocrat. Sect. 8. §. 3. Ab hypercatharsi convulsio aut singultus malum Sect. 5. §. 40. Convulsio ab helleboro lethalis Sect. 5. §. 1. Convulsio à medicamento purgantis assumptione mortifera Sect. 7. aph. 25. Ab ileo vomitus, singultus, convulsio aut delirium, malum Sect. 7. §. 10. In acutis febb. convulsio & circa viscera dolores vehementes, malum Sect. 4. §. 46. Convulsiones, quæ graves phrenitides sequuntur,



tur, lethales sunt. A vigiliis convulsio aut desipientia malum *Sect. 7. §. 18.* Febrim convulsioni supervenire melius est, quam feбри convulsionem *Sect. 2. §. 37.* Et spatino aut tetano si febris accesserit, morbum solvit *Sect. 4. §. 57. Conf. Tulpus l. 3. obs. 42.* Quartanâ correpti non admodum convulsionem patiuntur: Si vero prius tentati sint, superveniente quartanâ liberantur *Sect. 5. §. 70.* Exemplum quartanæ solventis epilepsiam vid. in *Salmuth Cent. 2. hist. 84.*

*Quoad curam*, hæc instituenda venit tam extra paroxysmum præservatoria, quam in paroxysmo curatoria.

*Quoad præservatoriam*, ante omnia attendendum ut causa remota materialis removeatur aut corrigatur, seu per essentiam, seu per consensum fuerint convulsiones. Hinc spirituum crasis aromaticis ac volatilibus commodè, perverfus verò mor<sup>9</sup> anodynus corrigendus In specie considerandum an convulsiones & epilepsia sint affectus primarius & per se morbum constituent, adeoque plus minus habituales sint, an vero saltem affectus sint secundarius, & symptomatis rationem habeant, adeoque accidentales. Hinc considerandum an per consensum saltem, an vero per essentiam ortum traxerint. An causa remota externa vel interna fuerit, an sedes fomitis sit intra corpus, an veto extra corpus, in membro quodam particulari. Pro quibus omnibus circumstantiis omnino varianda venit cura, dum alia ratio Epilepsia in febb. malignis, alia è contra, quæ ex scorbuto, alia quæ ex utero, alia quæ ex membro particulari.

*Observandum igitur I.* Cum Epilepsia & convulsiones, quæ in specie ut morbi curantur, adeoque chronici sunt, & in genere ferè ex hypochondriaco aut scorbutico malo fluunt, utut ab hoc minus affligi videantur ægri, originem ducant ab acido vitioso, eoque plus minus volatili, & huius incunabula ferè semper in aut circa primas vias lateant, ob id in genere acidi destruendi, & primarum viarum evacuandarum habenda est ratio. Pertinent huc nempe varia tentamina curandarum epilepticorum, v. g. per acidulas. Conf. *River. prax. c. 7.* aliaque *trialia*. Sic *Henr. ab Heer obs. 1.* Epilepsiam cum Opisthotono gravissimo, cuius paroxysmos præcedebant oscitationes & pandiculationes cum cordis angustia quarta vel quinta die recurrentes, per fontes spadanos curatam refert. Pertinet huc cura Epilepsia per annum durantis per decoctum saponis Hispanici in lacte vaccino assumptum. Vid. *Barbette prax. ubi de Epilepsia.* Item *M. A. N. C. Ann. 1. obs. 95.* & quando marina, testacea, ossea, ut unicornu verum, crystallus & similia pro cura Epilepsia laudantur, quæ non nisi absorbendo acidum operari possunt. Sic *Barbette Cent. 3. obs. 34.* refert epilepsiam, in cuius paroxysmo corpus instar dolii intumescibat, per *θ. absinth. corall. & perlarum* curatam.

*II. Quod si in membro quodam particulari eoque in specie externo radix mali*

mali fuerit, uti  
bet, inustus ve  
quando mor  
tionem simila  
ni apertiones, ju  
Tulpio l. 1. c. 8.  
qui citatò loco  
nem curatam,  
occasionibus  
obs. 10. Imò  
Schenck. in ob  
curati. Item  
scalis apertio  
cta oriatur epi  
l. 6. obs. H  
locis admove  
narrat puerum  
sanatum.

III.  
nerantibus, n  
emendandis  
Vid. *Senn. lib.*  
decoctis ligno  
propriat addi  
40. & 41. Th  
p. 92. Non fe  
rum cum app  
universali  
pro virium ra  
cocta ista ligno  
cessivè vitiosi  
ro talium dec

IV.  
pressio, vel h  
auralia quæ  
varietate, S  
Pa



mali fuerit, uti *ligatura* fortis desuper injecta paroxysmum imminuentem cohibet, iniustus vero *fonticulus* aut applicatum *cantherium* fermentum irritans evacuando morbum tollit, secundum exempla supra allegata: Ita ad hujus imitationem similia *auxilia Chirurgica*, *setacea*, *fonticuli*, *vesicatoria* & *cranii apertiones*, juvare observantur, ad naturam nempe imitationem, quæ referente *Tulpio l. 1. c. 8.* duo infantes per ulcera capitis spontanea ab Epilepsia curavit, qui citatò loco refert, Epilepsiam spontè à natura per lenem in fauces influxionem curatam, in *Hild. Cent. 1. obs. 41.* Sicuti ex scabie retro pulsa aut similibus occasionibus nata Epilepsia per *vesicatoria* curanda venit, teste *Hildano Cent. 3. obs. 10.* Imò *cranii apertio* interdum proficua observatur, nempe ut refert *Schenck. in obs.* quidam vulneribus capiti inflatis ab antiqua epilepsia fuerunt curati. Item *Rhodium Cent. 1. obs. 66.* refert, epilepticum juvenem ob lapsum à scalis apertione crani curatum. Sic quando ex calvaria, ex lue & ea cariosa facta oriatur epilepsia, præsertim mediante *astis* eradicanda venit. *Vide Schenck. l. 6. obs.* Hæc ipsa pariter ad *fonticulos* quoque, item ad *vesicatoria* certis locis admovenda accommodari possunt. Nam *Panarolus Pentec. 4. obs. 30.* narrat puerum epilepticum, aphonum, stolidum, *vesicatorio* in futura coronali sanatum.

III. Observandum: *Quod si ex fomite in humoribus à nativâ crasi degenerantibus*, non ad eò exactè à priori cognito oriantur convulsiones, pro istis emendandis *diætæ sudoriferae ex decoctis lignorum* observantur proficua. *Vid. Senn. lib. 1. prax. ubi de epileps. item Höfer. Hercul. Med. p. 10.* Commodè his *decoctis lignorum*, *viscus corylinus*, *quercinus*, *tiliaceus*, ac similes tanquam appropriati addi possunt. Sic de ligni *quajaci* usu in epilepsia, conf. *Scholz. conf. 40. & 41.* *Thonerus* Epilepsiam à colica per *decoctum lignorum* curavit *l. 2. obs. p. 92.* Non secus ac *Schenck. in obs.* vertiginem difficilem per *decoctum lignorum* cum appropriatis curatam refert, Sed bene prius præmissa debent esse *universalia* ac *primas vias* evacuantia. Certè continuato usu & evocato pro viriū ratione *sudore* multum valent in quibusvis affectibus chronicis *decocta ista lignorum* diaphoretica. Alterant simul humorum dyscrasiam & successivè vitiosum quod est, evacuant, id quod vel lues & ea persuadet, continuo talium *decoctorum* usu curabilis.

IV. Observandum, *quod si cum Epilepsia juncta sit sanguinis consueti suppressio*, vel hujus occasione excitatur plus minus epilepsia, *Vena sectio* aut alia quævis sanguinis missio erit proficua locis in variis, pro circumstantiarum varietate. Sic enim Epilepsiam *apertis hemorrhoidibus* curatam refert *Rhodium*



*Cent. 1. obs. 61.* Idem *obs. 64.* epilepsiam in puero octenni ob sanguinis abundantiam venæsectione curatam refert. Item *Zacut. Lusit. lib. 1. prax. adm. obs. 26.* refert epilepsiam sævam post partum *hirudinibus* internæ uteri parti applicatis curatam. Idem *obs. 27.* gravidam septimo mense epilepticam V. S. in talo tuto curatam memorat. Item gravida nonimestris ex suppressione hæmorrhoidum epileptica, *sectis in talo venis & hirudinibus* ano applicatis curata fuit *obs. 28.* Inprimis notabile videtur, quod idem *Zacutus Lusit. lib. 1. Med. Princ. Hist. 26.* notat, gravidas epilepsia ab utero correptas, *sectâ in brachio venâ*, periisse, in talo vero non.

V. *Observandum* quod appropriata epileptica, in specie, ubi *Epilepsia* est per *essentiam*, aut si per *consensum* sit, sed ejus fomes in partibus internis hæreat, non prius convenient, nisi præmissa fuerint *universalia*, & quidem si *vomitibus* necessarii videatur, id quod fit, si fomes mali hæreat in primis viis, ubi *Galina* inprimis conducunt; sicut inter *purgantia* additus *q. ius dulcis* primatum obtinet. Hinc *pulv. panchymagog. mineralis Harim. ex q. dulc. & q. o. vita* est proficiuus, vel ad imitationem Riverii

Rx. q. dulc. ʒj.

*scamm. sulphurat. gr. iv. l. v. M.* pro dosi, ex quibus cum *conserv. fl. anthos* etiam *bolus* parari potest. Hujusmodi *purgantia* vel propriè talia vel etiam saltem *laxativa* usualia, convenienter ante novi-vel plenilunia usurpari possunt. Sicuti etiam aliàs *appropriata Epilepsie remedia* sub *Dæ* mutationibus, præsertim ante novi- aut plenilunia usurpanda jubent Practici.

VI. *Observandum: Opiata* magna solent esse remedia epilepsie, dicit *Fonséc. l. 2. conf. 80.* Nam ferociiores motus spirituum compescunt, eorumque motus inordinatos indeque sensuum perturbationes tollunt. Hinc ad præcavendum paroxysmum epilepticum tam, idque primario, *epilepsia interna*, quam *externa* mirè conveniunt appropriatis mista opiata. Qua ratione *pilula ex laud.* opiato cum *ol. camphore* paratæ ad imit. *Harim. in prax. Chym. ubi de epilepsia*, sunt egregiæ. *Opium* enim ac *camphora* ad Epilepsiam quasi specifica sunt. *Externæ* vero *oleo buxi* propter vim anodynam (cui alia anodyna vel narcotica substitui possunt) inungenda sunt tempora, nares & pulsus, ut *Fonséca* monet. Sed abstinemus ab his narcoticis, ante præmissa *universalia*. Deinde non tam ad *curationem* crebrius, sed saltem ad *preservationem* aut atrocioris paroxysmi mitigationem, adeoque rariùs usurpentur, quia epilepsias diuturnas subinde fatuitas supervenire solet & periculum est, ne *opiatorum* abusu hæc ipsa magis promoveatur.

Appro-

Appr  
merabilia, *sele*  
nea, in specie  
cus paronis,  
castoreum, ex  
secundina hum  
speciatim cory  
cinnabaris na  
tam fixum, q  
spiritu volat.  
cristallus.

In spec  
Sumia sunt eg  
d. volat. & o  
ni cum d. vol  
Helmont. S  
bere colligie  
ratur & hinc  
sanguinem e  
donec situm  
cit. Post  
pro affectib  
Dof. ʒb. sic  
crescente pro  
empto, desu  
cinatum à ʒi  
lis & lambd  
in Epileptic  
tinus loco sup  
inunctum p  
Succi  
runt spiritum  
circulanda  
Juxta crani  
adimitat. A  
& multò m  
est innumia



*Appropriata talia epileptica* sunt equidem tantum non innumerabilia, *selectiora* tamen sunt ex regno animali, *partes animalium ossea & cornea*, in specie *cranium humanum*, *unicornu verum & dens Hippopotami*, *stercus pavonis*, cuius loco epilepticis quidam magis commendant *stercus leonis*, *castoreum*, ex his parata *gia volatilia*, *liquor CC. succin. spiritus sanguinis humani*, *secundina humana*. Ex regno vegetabili eminent *visci*, *quercinus*, *tiliacus*, & speciatim *corylinus*, *lilia convall.* *pæonia*, *opium*, *camphora*. Ex regno minerali *cinnabaris nativa*, vel  $\text{S}^{\text{ii}}$  & alia *sulphurea* & alia *fixa*. Item *sulphur. vitrioli tam fixum*, quam in *spiritu volatili*, v.g. in *spiritu vitrioli epilept.* vel etiam in *spiritu volat. vitrioli antepileptic.* *Hartm. Succinum* ejusque  $\theta$ , *volatil. & oleum, crystallus*.

In specie quoad *regnum animale* imprimis *remedia ab homine desumpta* sunt egregia, quæ inter eminent *sanguis humanus*, & ex hoc parata *spir.  $\theta$ . volatil. & oleum* specifica sunt hæc remedia, in primis *spirit. sanguin. humani* cum  $\theta$ . *volatil.* acuat, qui etiam ad epilepsiam hæreditariam laudatur ab *Helmont*. Sed observandum secundum *Lindanum*, *sanguinem humanum* debere colligi ex homine recens decollatò, qui in vase vitreo cum *spir. vin.* digeratur & hinc lege artis  $\theta$ . *volat. spirit. & oleum* exinde præparanda. *B. D. Michael* sanguinem exinde collectum & congruatum decantato fero deponebat, donec situm contraheret: Sic enim copiosiore *spiritum* ac  $\theta$ . *volatile* elicit. Post *sanguinem* est imprimis *secundina humana*, ex qua putrefacta *spiritus* pro affectibus mulierum polychrestus, præsertim contra epilepsiam paratur *Dof. Zß.* sicut & *pulv.* ex eadem exsiccata paratur *Dof. Zß.* Da in primis decrescente propinanda. *Cranium humanum* ex homine violenta morte interempto, desuntum, tam *rasura* ejus *pulverisata & præparata*, quam *sine  $\Delta$ . calcinatum* à *Zj.* ad *Zij.* propinatum. *Os triquetrum* ex concursu futuræ sagittalis & lambdoideæ, quod juxta *Paracelsum*, in Epilepticis reperitur illudque in Epileptico Parricidâ *Giesæ* decollato & Anatomie subjecto vidit *Valentinus* locò supra citato. It. *olea* egregia sunt, *oleum destillat. ejus rectificatum* vertici inunctum præfens dicitur remedium ad arcendum paroxysmum epilepticum.

*Succinum* permistum cum *cranio humano* & sublimata invicem, suggerunt *spiritum & oleum* antepileptica excellentia. Si fætor est inimicus, *olea* circulanda veniunt cum *spiritu vini*, hinc aliquoties à calcinatis rectificanda. Juxta *cranium, cerebrum* est egregium antepilepticum, cujus *spiritus & oleum* adimitat. *Hartmann.* præparata sunt egregia antepileptica. Hæc ipsa pariter & multò magis de *usnea cranii humani* intelligenda sunt, in qua confermentata est mumia capitis microcosmici, egregia contra epilepsium. Quin & *ossa huma-*



na reliqua ex homine violenter occiso desumpta ad affectus convulsivos sunt egregia. Juxta hæc *dens Hippopotami* est singulare specificum in convulsione quacunque *Philosophice preparatus*. Fiunt ex hoc *dente annuli*, qui membro convulso inserti, aut pedum digitis in spasmo flatulento applicati sunt optimi. *Castoreum* excellens antepilepticum, in specie, si ad imitat. *Barbette* infundatur cum *θ. volatili in spir. vin.* vid. *prax. c. 1.* vel *castoreum cum spir. θ. & ci vino* si in *essentiam* extrahatur, imprimis convenientem in convulsivis motibus partium internarum, hystericeis, colicis & similibus. Sicut etiam in quacunque partium convulsione tonicâ ab omnibus autoribus commendatur externe usurpatum. Quæ supra dicta sunt de *stercore pavonis* circa vertiginem, eadem quoque de Epilepsia intelligenda sunt. Vid. *Borell. Cent. 2. obs. 15.* De *Alce* ejusque *ungula*, de *hirundinibus* nil dico, cum hæc per se notissima sint. De his & similibus ex *animali regno* antepilepticis remediis judicium vide in *Ludovici Pharmacopœia* pag. 239.

Quoad *regnum vegetabile*, inprimis hic se offert *Pæonia mas* debito tempore collecta, jam à *Galen* tempore commendata, tam *radicis pulvis*, quam *grana* seu *sem.* *nigra pæonia* interno usu laudata. Sicuti etiam tanquam amuletum *radix* hæc appensa, mirè ad præcavendam epilepsiam laudatur, de quò vid. *Forestum lib. 10 obs. 59.* *Bartholinum Cent. 4. hist. 69.* Item *observat. communicat. River.* Quoad tempus collectionis incerti sunt Auctores. Optimum videtur, ut colligatur ☉ in ☿ nem ingrediente, tempore meridiei. Amicus retulit se aliquoties *radice maris pæonia* effusa die Julii  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{2}$  intra horam 11. & 12. amuleti instar appensa aliquoties curasse epilepsiam, tunc nempe temporis ordinario ☉ ☿ in ingreditur. Conf. *M. A. N. C. Ann. 6. Append. p. 63.* *Lilium convall.* ejusque spiritus perquam egregius est ad epilepsiam. Juberet autem *Lindanius* recipere hujus flores bene maturos, ante ☉ is ortum, quando rore majali adhuc madent, cum in hoc rore singularis vis lateat. Hinc protinus atque collecti fuerint, abscindendi à suis pediculis & immitrendi in lagenam, quæ bene claudatur, deinde ita destillentur, & qui ex una parte *florum* destillat *spir.* iterum novis *floribus* infundatur & destilletur. Hoc sæpius repeti debet, & egregium habebitis spiritum antepilepticum. *Viscus quercinus*, hinc *tiliaceus* & qui omnium optimus est *corylinus*, nobilissima sunt remedia contra epilepsiam contumacem, seu habitualem inveteratam, præmissis præsertim vomitoriis multum conferunt, *Dos. ʒss.* Sed observandum hujusmodi *viscos* repetito usu figere & concentrare fermentum epilepticum in sua quasi minera, unde facile fieri potest, ut alii morbi, præsertim febres acutæ exinde superveniant, quippe post eorum usum subjungenda sunt subinde purgantia, ne quid remaneat, quod alios morbos inferre queat. *Viscus*  
tilia-



*tiliacens* in memoriam revocat curam epilepsiae per *acidulas vegetabiles* ex *tilia*, de qua vid. *M. A. N. C. Ann. 6. Append. p. 52. Viscus corylinus* iste Martio tempore collectus decrefcente ☽. amaleti instar contra epilepsiam laudatur. Multa in *corylo* latent, unde etiam *oleum* famosum *heraclinum* *Rulandi* ex hoc ipso distillandum. Nihilominus vix cedit *corylo lignum buxi*, adeo ut *oleum buxi* habeatur succedaneum *olei heraclini*, quod etiam in defectu ejus commodè substitui potest, si ad gut. 10 in aq. flor. *tiliae* ad aliquot dies propinetur. De *sulphure vegetabili* ex *lycopodio* seu *musco terrestri clavellato* nobile est antepilepticum, praesertim pro infantibus; nobilius tamen est *sulphur* simile ex *julis coryli*. Carbo *artemisiae rubrae* ipso *Johannis* die sub *artemisia* effusus mirè in epilepsia valet, uti per experientiam probat *Petrus Diff. Harmonic. l. 1. p. 83*. Novi mulierem, quae hujusmodi carbonibus curavit aliquot pueros epilepticos, sed fraudem detexit *Deckerus in comment. Barbeite Prax. ubi de epilepsia*. De floribus *tiliae* res nota est, quod sint optimum ad epilepsiam remedium, unde *☿ spiritus* se profunt, in vulgatissimo usu. Haec sunt primaria ex regno vegetabili, quibus subinde addam & alia remedia cephalica plus minus aromatica, unde multiformes compositiones, ut ☿ epilept. *Langii*, *Dorncrellii* &c. Exempli loco sit sequens compositio:

℞ Fol. & flor. *salviae* ℥vj.  
 fl. *liliorum convall.* ℥iij.  
 lavend. odorat. ℥ij.  
 rad. *paeon.* ver. ℥iij.  
 fol. & flor. *majoran.* ℥i.  
 cinamom. elect. ℥vj.  
 caryoph. ℥iij.  
 macis ℥ij.

Infund. cum vin. *Rhen.* opt. ℔ xiv. macerentur per 14. dies, hinc destillentur. Potest parari cum & sine *castoreo*, item post rectificationem potest addi q. s. de *spir. ☿ ci.* vel simili volatili, ut fiat remedium eò generosius.

Quoad regnum minerale, primatum obtinent *sulphura* ☿ si fixa praes aliis decantata, quippe quae de natura ☿ri participant. Eminent hic *cinnabaris* ☿ ii, e contra hujus defectu *cinnabaris nativa* selectior, quae vocari solet *magnes epilepsiae* propter insignes virtutes antepilepticas. Pertinet huc *sulphur subtilius* & fixius ex *scoriis reguli* ☿ ii ultimo artificiosè praecipitatum, quod egregias habet virtutes anodyno epilepticas. Juxta fixa ☿ iatia, *vitriolum* optimum est remedium ad curam epilepsiae, imprimis autore *Paracelso*, qui *spiritum vitrioli volatilem* seu appropriatum contra epilepsiam remedium commendat. Ex hoc *spiritu vitrioli volatili*, *spir. tartari volatili* & *spiritu theriacali camphorato* paratur aliàs à *Paracelso* specificum in peracutis, communiter *mislura simplex*, sed non



vulgaris ista, spiritibus nullius pretii adulterata. Pro spiritu vitrioli veri & simplicis substitui possunt volatilisationes vitrioli beneficio urina humana, aut beneficio spirituum volatilium vegetabilium. Quoad urinam humanam, notus est spiritus vitrioli volatilis, antepilepticam Hartmanni seu potius Quercetani. Nempe caput mortuum vitrioli per regenerationem denuò imprægnatū & imbibitū ita ad consistentiam pulvis destilletur per retortam in Δe aperto, quod prodit, digeratur aliquamdiu in loco calido, seu rectificetur per alembicum in arena & prodit spiritus volatilis striatus nonnihil nebulosus, quæ insequuntur guttæ, quibus apparentibus mutetur recipiens, ut & seorsum separatur, dum nebula postmodum denuò surgunt & sapor acidulus se manifestat prius receptaculum cum spiritu volatili denuò apponatur & ita volatilisatione continuetur, donec nil amplius prodit, spiritus vero in receptaculo sub nomine spiritus epileptici vel cephalici asservetur. Superfunt succinum egregium antepilepticum & convulsionis remedium, cuius volatile admodum potens in curandis convulsionibus, febribus malignis in specie supervenientibus. Hinc liquor CC. succinatus, aut volatile succini eadem methodo cum spiritu sanguinis humani mistum, sunt compositiones egregiæ antepilepticae, quibus interdum camphora additur, quæ figit quodammodo spiritus animales & ad motum naturalem reducit eosdem. Unde & camphora vim somniferam obtinet. Crystallus denique montanus preparatus in epilepsia per consensum abdominis, ubi opus est forti penetrantioris acidi absorptione multum præstat.

Ex modò recensitis simplicibus plures & tantum non innumeræ fieri possunt compositiones & formulae, v. g.

℞. ▽ flor. tilia  
salv.

melissæ an. ℥ij.

liq. CC. succin. ℥ij.

spir. Theriac. camph. ℥i℥.

essent. opii ℥j.

syr. d. Pæon. ℥j. M. D. S. Träncklein gegen die schwere  
Noth Aliquoties de die 3. vel 4. cochl. pro dos.

Item ℞. ▽ pæon. ℥ij

cerebr. hum. spirituof. ℥vj.

spir. sanguinis human. essent. ℥i℥.

unicorn. ver. præp. ℥j.

cinnabar. ʒ. ℥℥.

laud. opiat. gr. i℥.

syr. de stæchad. Arab. ℥i℥. M.

Quoad



Quoad *externa* ad epilepsiam commendantur imprimis *amuleta*, quæ inter excellit *sambucus crescens super salicem*, de quo præter *Hartm. in Prax. ubi de epilepsia* egregium experimentum, vid. in *Bartholin. Cent. 4. obs. 69.* Præterea *innunctiones cum oleo destillato succini, anthos, ruta, majorana*, it. cum *bals. Pernuv.* conducunt, nec ubi perspecta est *idiosyncraska ægri*, quæ nempe potest ferre talia. Sunt enim quidam, qui ab ejusmodi odoratis magis læduntur, nimis affectis & commotis ab iisdem spiritibus.

Hæc quoad *preservationem extra paroxysmum.*

Quod *curam in paroxysmo*: Si sit gravior ad excitandum epilepticum mirè conducunt omnia ea, tam interna quam externa, quæ quosvis sensus seu eorum organa fortiter vellicare & ita spirituum inordinatas commotiones ceu fortiora objecta in ordinem revocare possunt. Hæc inter graviori in malo mirè conducit *vomitus*. Quoniam autem propter arcte clausa labra ex convulsione musculi temporalis nil potest ingeri, ob id, ad manuuctionem *Borelli* aperiendum est os, admovendo pollicem cum minimo digito ad oris latera, fortiterque comprimendo. quo facto instilletur forte *vomitorium*, vel *penna oleo acrior*, intincta faucibus immittenda & ita vomitus stimulandus. Loco vomitoriorum *clysteres acres* perquam egregii, quibus *castoreum* sociandum & pro stimulo *Δα benedicta, syrupus emeticus* aliaque *infusa* similia & alia addenda. Sicuti in epilepsia interna *bia volatilia* à *Dj.* ad *3ß* clysteribus addita proficua observari solent. Sunt, qui *sternutatoria* naribus admovenda jubent, quod tamen cautè fiat, cum sternutatio quasi particularis sit epilepsia, ne graviori paroxysmo occasio suggeratur; potius *bia volatilia macra* eorumve spiritus naribus admovenda, aut urgente necessitate naribus ac linguæ instillanda, ut excitentur epileptici. Egregiè confert item *ol. destill. succini* gut. iij. vel iv. in aqua appropriata intus propinatum in paroxysmo egregiè conducit. *Lingua, in paroxysmo vehementius sanciat* à dentibus curatur in *perspersione pulveris lap. S.* & illinitione *extr.* cujusdam *vulnerarii saccharati*. Vid. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 295.*

Quæ hæcenus in genere de convulsionibus dicta fuerunt & in specie ferè motibus saltem convulsivis epilepticis seu clonicæ convulsioni applicata, eadem quoque ulterius *convulsionibus*, in specie sic dictis, seu *tonicis* accommodari debent. *causa* hujus convulsioni in specie sic dictæ est *irritatio partis nervæ*, admodum sensilis continua, in eodem loco, & eodem ferè modo. Cujus occasione continuata nec interrupta, raro copiosè influunt spiritus animales & ita in continuata contractura fibras & consequenter partem ipsam retinent. *Irritatio hæc nunc est manifesta*, seu ab agente qui sensibus patet, inducta, nunc est

*occult.*



occulta, seu ab agente minus sensibilata. Ex manifesta irritatione fit convulsio in *V. S.* si nervus lædatur punctim. Item in purgationibus nimis, qua ratione ex assumptione *gilla vomitiva* convulsionem 30. horarum lethalem refert *Heer obs.* 26. Pariter *Galina* & *Galina* non rite preparata & intempestive adhibita eandem dant calamitatem. De *Euphorbio* simile exemplum habet *Tulpius l. 1. obs.* 15. Item *lesiones* partium externa, ut cum ex fractura tibiae, ex ictu sclopeti spasmus opisthotonum, tandem tetanum & sic mortem notavit *Hochstetterus Decad. 5. cas. 6.* Sic ex clavo pedis digito infixio opisthotonum refert *Schenck. in obs. ubi de convulsione.* Per venæsectionem laeso nervo convulsio lethalis oborta, referente *Schenck. l. c.* Ex lationibus nervorum in cruribus spasmus cynicum idem notat. Et in genere quævis *lesiones nervorum*, membranarum, tendinum præcipue in articulis, convulsiones inferre solent. *Vulnera* quoque capitis huc pertinent. Siquidem ex cutis vulnere in latere sinistro capitis, spasmus ingentem cynicum & universi corporis tetanum observavit *Hildanus Cent. 5. obs. 9.* *Mercurialia unguenta* huc pertinent, ex quorum usu convulsionem capitis ad latus sinistrum, ut nasus & humerus rectâ lineâ copularentur &c. refert *Bartholinus Cent. 4. hist. 48.* Deniq; ex epota  $\nabla$  fort. membrorum insignem contractionem vid. in *Act. Med. Hassn. vol. 1. p. 210.*

Quoad irritationem occultam, non rarum est, febres quasvis præsertim acutas & malignas malè judicatas terminari in convulsiones. Sic convulsionem à tertiana per metastasin, febrim solvisse, testatur *Bartholinus Cent. 2. hist. 93.* Ex erysipelate & feбри spasmus opisthotonum refert *Schenck. in observ.* Hinc podagra laborantibus supervenit interdum convulsio, contra *Galeni* assertum, de qua vid. *Höfer. Hercul. Med. p. 14.* Nec rarum est in arthriticis, it. hypochondriacos & similibus, si acidum illud volatile peccans se insinuet profundius in partes musculorum fibrosas & tendinosas, easdem rigidas duras & intractabiles reddat, ibidem nutrimentum earum spermaticum chylosum coagulari & in materiam tartaream quasi gypseam transire. Unde omni penitus motu sublatò pars ista postmodum contracta & immobilis manet. Pertinent huc *variæ recrementa inter cerebrum deposita*, spasmos inferentia. Sic *Rhodius Cent. 2. obs. 49.* refert de muliere convulsa, in qua omnes cerebri ventriculi serò limpidò bilioso referti fuerunt, ex quibus etiam in spinalem medullam profluxit. Et *Schenckius* in opisthotono mortuo capite duo cochlearia  $\nabla$  acris intra membranam duram & cerebellum invenit. Facit huc observatio *Tulpii Cent. 1. cap. 32.* Ubi convulsiones corporis cum dolore capitis expulso pure ex naribus curatæ. Deniq; in India Orientali epidemicum malum est varii generis convulsio, de quò eleganter scribit *Bontius de Medicin. Indor. c. 2.* Pertinet huc *spasmus flatulentus*, vulgò dictus *der Krampff* non crura saltem, sed etiam alia musculosa loca subinde affligens, ex subtili acri humore seroso, musculos subinde affligente, oriundus.

Ex

Ex dictis  
nunc in ipso  
seu subiectum  
essentiam, nunc

Quoad C  
de ac irritatio  
salia præmitte  
tur, sicuti urg  
ita, accedend

Rem  
leptica, in spe  
succinum, pos  
pertinaciori  
ma; hinc cinn

Quoad  
tuosa applica  
unt, è contra  
ris lumbrical  
ex lumbricis  
refr, quæ ip  
seguens lim  
juncta.

Ubi ab inun  
unctione cel  
essent. ex infu  
vulpinum, ca  
assatis.

Pingu  
convulsio  
deatur præ  
Por  
ravir Rulan  
acriora ac p  
cni mistum  
Par



Ex dictis patet, quodnam sit *subjectum convulsionis*, ita quidem ut nunc in ipso *subjecto inhaesionis* seu parte contracta simul sit fomes seu radix mali, seu *subjectum radicationis*, nunc vero differant, unde *convulsio* partis nunc per *essentiam*, nunc per *consensum* esse dicitur.

Quoad *CURAM*: In hac imprimis *causa removenda*, partes nervæ leniendæ ac irritatio easum *sopienda*; hinc eadem roborandæ, adeoque semper *universalia* præmittenda sunt, quæ inter *clysmatum* injectio perquam proficua observatur, sicuti urgente interdum graviore dolore simul ad *opiata*, sed *appropriatis* mixta, accedendum.

*Remedia interna* sunt quælibet *carminativa*, *cephalica* & *antiepileptica*, in specie *castoreum* & omnia ex hoc ipso præparata; *Salvia*, *lavendula*, *succinum*, *rosmarinum*, ejusq; *decoctum*, *spir. vin. theriacalis*, *spir. vin. camph.* item pertinaciori in malo *decoctum lignorum* præsertim *Guajaci* & *juniperi* sunt optima; hinc *cinnabaris* & quælibet alia epileptica præsertim *volatilia* conducunt.

Quoad *externa*, conveniunt ea, quæ sub forma *unctionis oleosæ* & *spirituosæ* applicantur, quæ minus sunt glutinosa & viscida, minusque poros infarciunt, contra quod *penetrantiora* magis & spirituosiora, eò sunt meliora. Præ cæteris *lumbicalia* hic conveniunt. Nempe, *liquor oleosus per deliquium in clibano ex lumbricis terrestribus*, item *oleum decoctionis lumbricorum*, *spir. lumbricor. terrest.* quæ ipsa quoque de *formicis* intelligenda sunt. Sic in convulsione à cholera *sequens linimentum* expertus est *Forest. lib. 10, obs. 110.* cum intensissimo dolore juncta.

℞. Olei irini,

vermium terrestrium an. ℥ij.

castor. pulver. Div. M. continuò agitando.

Ubi ab inunctione abstinebatur, statim redibant convulsionem, continuata vero unctione cessarunt. Præterea *spir. vin. crocatus*, *spir. aut aqua theriacal. camph.* *essent. ex infusione nervinorum* &c. Oleosa & pingua quæ usurpantur, sunt *oleum vulpinum*, *castorei*, *oleum ex catellis*, *oleum ex anseribus nervinis infarctis* & sic affatis.

Pinguedo per affationem ita prolecta *unguentum* dicitur, quo unicò saltim convulsio curata fuit in *observ. Rivierio commun.* & in *Praxi ubi de paralyti*, ubi videatur præparandi modus.

Porro *oleum laurin.* *oleum lini*, cujus inunctione duos tetano affectos curavit *Rulandus in curat. empiric.* *Pinguedo humana*, *medulla animalium*. Olea *acrida* ac penetrantiora contra convulsionem sunt *petroleum*, quod cum oleo *succini* mistum, maximè prodesse dixit *Empiricus*, in contracturis à causa frigida &

Pars II.

o o

ad



ad paralytes oleum Philosophorum, olea item distillata juniperi, succini, spicae galbani & hinc galbanicum Paracelsi, quibus etiam subinde oleum de euphorbia additur, quod optimum, sed quia nimis fortè, caute adhibendum. Hinc

℞. Oleum tereb.

lumbri. terrestr. an. ℥i℥.

pingu. human. ℥j.

canis ℥℥. M.F. litus.

*Penotus* sequens *linimentum* mirè prædicat. ad convulsionem brevi tempore dissolvendam

℞. Ol. terebinth. ℥℥.

caryophyllor. gut. vj.

mucilag. bryon. q. s. pro consistent. M. & inunge locum affectum.

Denique *unguentum nervinum*, dialth. spasmodic. *Mynsich.* commodè applicari possunt imponendo desuper *emplastrum nervinum* usitatum. Hæc in genere.

*Quod si in specie fiat convulsio ex punctura nervi in ineptâ V. S.* optimum est instillare vulneri ol. destillat. terebinth. seu ol. lateris. vel ol. cere, & imponatur emplastrum

℞. Euphorb. ℥j.

terebinth. ℥℥.

cera parum. M. pro emplastro quod desuper imponatur; vel vulnus dilatetur, imponatur ol. terebinth. sed conferatur in specie hic *Sylvius l. 2. c. 23. §. 84. it. Scultetus in armament. Chirurg. obs. 64.* Alias contra partem dolentem nimisque tumidam ex V. S.

℞. Pingv. vulp.

taxian. ℥iij.

ol. destill. spic. ℥℥.

mastic. ℥ij.

vini ℥iij. M. ad  $\Delta$  millinatur calidè; sicut in dolore, tumore, ac livore partis *Cataplasma* sequens egregium

℞. Herb. agrimon.

chærefol.

Flor. chamomill. an. Mj.

Rad. symphyt. maj. ℥iij.

sigill. Salomon. ℥j℥.

Sem. lini, fœnigræc. an. ℥℥.

coq. in f. q.  $\nabla$ . ad consistentiam cataplasmi. & subinde applicentur.

*Quod si fiat convulsio ex articuli luxati restitutione*, curandirationem docet *Scultetus in armament. Chirurg. obs. 28.*

*Quod*



Quod si ex vulnere partis fiat convulsio, illinatur pars ol. seu potius liquore oleoso lumbric. terrestrum, ol. destill. terebinth. vel vulneri instilletur bals. sulph. terebinth.

Quod si fiat convulsio ex ictu venenati animalis, vel in leviori malo ol. scorpion. illitum convenit; vel in graviore cucurbitula scarificata, vel cauterium actuale supra partem laesam imponatur. Aut etiam emplastrum magneticum arsenicale, malaxatum cum ol. busonum aut scorpionum imponatur. Internè Theriaca cum gentiana mista propinetur, imperando subinde sudorem. Si ex hypercatharsi, vel violentiore purgante oriatur convulsio, internè opiata & theriacalia sufficiunt.

In spasmo flatulento sufficiat levis fricatio partis aut panno aspero aut manu calidâ, aut illinatur spir. baccarum juniperi, aut spiritus theriacalis. Ad huiusmodi spasnum flatulentum expertum dicitur unguentum Cratonis

℞. Axung. Anser. rec. ℥jv.

ol. destillat. caryoph. ʒß.

cinam. gt. v. M.

In spasmo gravidarum præsertim flatulento exporiston est matricaria. Herba illa contrundatur, ut fiat succulenta, imponatur cervici, nunc sola, nunc cum verbena mista.

In Contractura, à causa internâ volatilia acidum corrigentia & hinc temperata, illud obtundentia, & succum nutritium laudabilem suggerentia sunt optima. Sic contracturam totalem ex arthritide relictam, continuato lactis usu curavit Tackius in Phas. Soph. 2. p. 128.

Affectibus hisce convulsivis cognatus est Tremor. Nam in hoc cum motu naturali & voluntario simul aliquid convulsivi concurrit, dum in motu membri v. g. sursum erecti, membrum subinde remittit, & in contrariam partem nonnihil abducitur, prævalente tamen motu intento primariò. Unde

## TREMOR

prout ratione graduum major vel minor est. Sic etiam vel simplex est vel convulsivus. Ille est minor & vulgaris tremor, qualis post crapulam, aut affectus animi vehementiores, in specie iracundiam observatur. Hic vero est major, qui in remissione paroxysmorum epilepticorum accedit, donec omnino cesset cum paroxysmo isto tremor. Et dicitur hic tremor convulsivus,



*vus, spasmus reuocatus*, adeoque tremor ad motus corporis depravatos omnino revocandus venit. Nam qui tremore laborant, membra libere movere, sed protensa ac suspensa sufficienter continere nequeunt, quin vibretur potius & modo subsultando, modo declinando pars vitiosè moveatur. In hoc *differunt tremores à motibus convulsivis* propriè sic dictis, quod tremor fere semper coniungatur cum motu voluntario, v.g. manus vix unquam tremit, aut pes, nisi ad cursum adigatur, ita ut semper motui voluntario coniungatur Tremoris symptoma. In motu vero convulsivo ipso, agro nescio, ac præter voluntatem ejus, motus convulsivi accidunt.

Tremor ipse nunc est *universalis*, nunc *particularis*, nunc *magnus*, nunc *parvus*. Vulgo causa Tremoris rejicitur in *facultatem motricem debiliorem & gravitatem membri*, ita ut illa sufficienter movere membrum nequeat, quia hujus gravitas, ob illius imbecillitatem præponderat. Sed quacunque ratione explicetur hæc sententia, & quicquid etiam intelligatur per *facultatem motricem*, tamèn insufficiens est ratio, quia in tremore omnino sufficienter movetur membrum, extenditur pes, arripitur aliquid manu & retinetur, sed depravatè. Vitium nempe cujusdam inquietudinis & inordinati membri motus adjunctum est, adeoque non imminute, sed depravatè membrum movetur. Deinde si oriretur à *facultatis motricis imbecillitate*, fieret tardior & imbecillior membri motus, non vero depravatus. *Causa igitur genuina* tremoris est *actio duorum pluriumve musculorum simultanea*, seu eodem tempore instituta, seu sint antagonistæ musculi, seu non, sed tantum tales, qui aliquo modo ad membri motum concurrere solent. Inter actiones talium musculorum alia est *principalis*, alia minus *principalis*, & p. n. adjuncta, ita ut dum unus musculorum brachium extendit, alter simul agens, illud torquet aut flectit, vel alio modo vitiosè movet. Unde prior actio dat motum voluntarium intentum, posterior vero præternaturalem & quasi convulsivum supervenientem unde iste affectus tremor. *Causa duplicata* hujus p. n. musculorum actionis sunt *spir. animales*, qui sicuti naturali motu influentes movent membra naturaliter, ita etiam p. n. motu depravatè eadem agitant: & quidem *spirituum in tremore vitium* est talis motus inordinatus, ut cum in unum musculus agilius & copiosius influere debent, motu fere uniformi in geminos seu binos, pluresve distinctos distribuuntur & ita difformem motum inducunt. Itaque vel ex proprio vitio, vel ipsius partis recipientis vitio contingit.

*Proprium vitium* est, cum iidem spiritus confusè admodum moventur in animi affectibus gravioribus, ita ut pro voluntatis arbitrio, minus ordinatum motum



motum instituere queant, v. g. in ira terrore &c. & cum eadem facultate narcotica nonnihil fixiores, depravatè per nervos ferantur. Quæ ratione post *potum vini generosi* nimium membra subinde tremunt, non secus ac post inconcinnum *narcoticorum* usum. Sic *Forestus lib. 1. Conf. 38.* ex largo *vini potu* refert. Conferatur *Bartholin. Cent. 5. hist. 38.* ubi varia tremoris exempla habet. Sed hujusmodi tremores à spirituum vitio magis *transitorii & accidentales* videntur & qui facile denuo cessant.

Quoad *Tremores graviores plus minus in-veteratos* aut *habituales* aliosque, ad partem ipsam spirituum motum recipientem respiciendum est. Circa quam ipsam suspicari licet, vel sæpius in tremore aliquid *irritativi* circa nervi principium, progressum, aut insertionem occurrere, cujus occasione sub motu voluntario spiritus influi non præcisè ad determinatum muscolum, sed simul ad alios vicinos ferantur, sicque tremulum motum inferant. Hinc *Castro Tr. Qua ex Quibus p. 102.* Tremores qui febribus superveniunt, revera motus convulsivos esse asserit & *Hochstetterus Decad. 4. cas. 7. p. 415.* tremores ad convulsivos motus non absurdè refert. Vel suspicandum quod in *habituali & in-veterato*, modo *nervus*, per quem influere, vel *musculus* in quem radiare debent spiritus animales, ita sint vitiati, ut ob poros aut meatus vitiatè conformatos, aut fibras non ritè situatas, aut etiam nonnullos meatulos omnino interceptos, legitimus motus spirituum animalium nonnihil pervertatur, ita ut & in muscolum motui intento primario destinatum & simul deviatione quadam in vicinum ferantur.

His ipsis *causis ac fiendi modis faciliè causa remotiores occasio- nales* tremoris accommodari possunt, quas inter eminent inprimis *venenæ & ialia*, cum notum sit, quod ii, qui talia tractant v. g. *Aurifabri* subinde trementes fiant. Item, quod iis, qui incautè *cingulo sapientia* ad propellendam scabiem utuntur, interdum tremor superveniat. *Refrigeratio nimia* partis itidem ad tremorem disponit, teste *Borello in observ. 84. V. S.* curatum. Hinc etiam *potus nimium frigidorum*, v. g. copiosæ aquæ frigida, in febb. aut *potus nive* vel *glavie* immoderatè refrigeratus, autore *Sennerto*, ubi de Tremore, tremores partium inferunt, *Mensum & lochiorum suppressiones*, it. *secundinarum* aut *fœtus mortui retentio* tremorem inferunt. Conf. *Lang. l. 3. Ep. 2.* Facit huc observatio, curiosa *Foresti l. 10. observ. 101.* ubi mulieri ob obstructos menses vitio uteri singulis diebus vapor quidam seu spiritus adscendebat, potissimum sub noctem ex imo ventre, qui tandem repens per venas & arterias, etiam colli, ita ut ipsam & ibidem interius sentiret, qui ad musculos maxillarum adscendens, ad



tempus hærebat, palpitationem quandam & jectigationem manifestam indicens, mox in genis ruborem inferens & dolorem, sine tamen Epilepticâ procidentia, per *uterinâ aperiencia* autem curata fuit. Idem *Forest. obs. 10.* mulieri non fluentibus mensibus, mense Majo venam secavit, unde & menses statim restituti fuerunt: Post singulis mensibus fluebant, & semper eodem tempore simul experiebatur palpitationem in brachio, eodem ipso in loco, in quo V. S. fuerat instituta non sine molestia ac dolore. Hæc singulis mensibus patiebatur, eadem ad ciendos menses sectâ venâ saphena curata fuit. Febribus subinde supervenit tremor. Sic etiam *Epiphanius Ferd. hist. 41.* observat tremorem criticum tertianam continuam solventem.

Quoad *prognosin*: Tremor si superveniat aut succedat paralyfi, non est malus. Indicium enim est paralyseos remittentis, & motus naturalis non nihil redeuntis. Tremor ipse à *causis internis* pendens, utut minimè sit periculosus per se, quoniam tamen de facili degenerat in alios graviores affectus, v. g. *Paralyfin. Apoplexiam, Lethargum, Spasmm* &c. ob id ratione horum consequentium non est negligendus. Tremor qui arripit senes vix curari potest, quia eos ad mortem ut plurimum comitatur. Tremor hereditarius, it. qui ex vitiosa diætâ successivè, sed tamen confirmate fuit genitus, raro etiam perfectè curatur. Si tremor permutetur in convulsionem, malum; si in febris ardente tremoribus succedat delirium, ex metastasi materiæ morbificæ, res est periculosa, cum delirium periculosius sit symptoma quam tremor. Hippocrates dicit, qui tremores ad manum resiliunt, mali sunt. Aliquando enim si ægri manus attentè contractetur, contremescentem illam, quasi revelli subitò animadvertimus; est spasmus tromodes, seu motus ex convulsivo & tremore compositus, & periculum non leve portendit, imminens scil. convulsionem, aliaque symptomata, idque præsertim in morbis ardentibus. Tremor, qui supervenit mulieribus post partum, ex retentis quibuscunque in utero, periculosus affectus, subinde enim lethales epilepsias inducit. Denique Tremor & Epilepsia à Lethargo oriens, malum signum est prostrationis scil. omnimodæ facultatis animalis ejusq; functionum. Si tremor in labro inferiori, ferè portendit imminens vomitum, qui tremor tamen potius motus convulsivus est.

In *cura* imprimis removende sunt cause quæcunque & appropriatis nervinis & cephalicis, tam internis, quam externis tremori succurrendum. In genere ea, quæ in paralyfi, item convulsionibus laudantur, etiam tremori conveniunt. Saltem pro causarum varietate etiam cura non nihil varianda, v. g. in malignis danda alexipharmaca; in retentis uterinis vitiosis dentur pellentia ex secundina: Si ex fumis metallicis & salibus imprimis mineralia conducunt.

Ad



Ad *evacuandum* corpus *q̄* alia cum extractis laxativis sunt optima. Alias inter *remedia nervina* magis *appropriata* principatum fere ducit *salvia*, & quælibet ex ea parata. Sic *Forest. l. 10. obs. 99.* laudat *cerevisiam salviatam*: It. *essentia salvia* cum *essentia castorei* mista, tam in usu interno, quam pro *externa* membrorum frictione conducunt. Succedit *melissa* & spirituosæ ex eadem parata remedia sunt convenientissima. *Paonia* & *bacca juniperi*, egregia nervina. Unde *essent. juniperi* continuato aliquandiu usu, item *Rob Juniperi*, imperando simul sudorem sunt convenientissima. It. *decoctum ligni juniperini* per modum *diætæ sudoriferæ* propinatum. Sanè in quibuscumque facultatis animalis & nervosi generis diuturnis ac inveteratis morbis nil utilius adhiberi poterit, quam *decoctum lignorum* itè paratum, & hæc inter in specie *ligni juniperini* per aliquot septimanas continuatum, præmissa corporis debita evacuatione. Substantia nempe aromatica dicti *decocti* mediante sudore penetrat undique per universi corporis poros ac meatus, dissolvit mucositates, abstergit sordes, purificat sanguinem & corporis habitum, & ita in paralyticis, convulsivis tremoribus, apoplecticis & similibus affectibus æquè polychrestus eorum est usus, ac in catharralibus affectibus. In *senum tremoribus* præ cæteris laudatur *simus pavonin.* c. f. q. ▽ vitæ subactus, & in potu usurpatus tribus vicibus matutinis. Dosis fini est ʒj. una vice. Vid. *Borell. obs.* Quæ suprà de *oleo buxi*, *corylyno* contra convulsiones fuerunt insinuatæ, item quæ de *cinnabarinis*, pariter etiam tremori applicanda sunt.

Sin a *q̄* io vitium fuerit singulariter laudat *decoctum enula Hochstetterus Decad. 3. cas. 4. p. 233.* & ex eò *D. Michael in Collegio Practico*, quod hoc est: R. Radicis enulæ campan ʒiij. feniculi ʒjss. coq. in vini quartariis quinque, i. e. libris ijss. medicinalibus. Infusa per diem naturalem, coque ad casum tertiæ partitis, divide colaturam in partes 4. bibat partem unam manè & vesperi, ac sudet coopertus, & exilit sudor citrinus, qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Alias in tali casu remedia *Q̄aria*, ac ipsum adeo *Q̄foliatum* assumptum, non omittenda sunt. *Q̄* ium enim alliciunt, & ita è corpore secum rapiunt.

Inter *externa* ad tremorem quemcumque ceu experimentum optimum laudatur *frictio membrorum c. urin. hum.* Loco cujus *sp. lumbricorum*, *formicarum*, & ci pro membris fricandis in loco calido præsertim nucha & spina dorso possent substitui. v. g.

R. ▽. artic. A. E. ʒiiij.

sp. lumbr. ʒjss.

formic. ʒj.

Essent.



Essent. castor. ℥ij.

M. D. S. Eusserlich Gliedewasser.

Item *lixivium*, in quo decocta sunt *folia fraxini* pro lotionē partium tremulantium itidem quibusdam laudatur.

## CAPUT VIII

DE

SPIRITUUM ANIMALIUM INFLUXU  
ABOLITO, INDEQUE ORTA  
APOPLEXIA.

**D**um omnes functiones in sensu & motu subito cessant, ita ut taliter affectus non secus ac fulmine percussus & attonitus jaceat, simulque vox auferatur, respiratione plus minus imminuta, cum aut sine stertore, dicitur *Apoplexia*, *der Schlag*. In hac ut plurimum saltem functiones & motus spontanei laeduntur, minus vero *motus naturales* dicti, utut in graviore interdum & hi plus minus afficiantur; hinc *respiratio* etiam plus minus afficitur. Quoad *pulsus*, hic subinde adhuc vegetus, certè perquam durus percipitur, interdum est pusillus interdum vero vix observabilis. *Color faciei & oculorum* ut plurimum rubet, facies tumida est, & corpus simul calet, utut interdum & in paroxysmo diuturniore facies pallere observetur. *Membra* omnia sunt *laxa* & si brachium vel pes levetur, pondere suo statim dilabatur. Ager tactus, irritatus vel acclamatus, nec sentit nec loquitur, ore hiantē & interdum *stertente* profundum dormit. Resolvitur subindè simul ani sphincter, unde *faeces alvi* aut injecta enemata inscio sponte suâ effluunt. Quando igitur motus & sensus dicto modo totius corporis perit, est *Apoplexia*.

*Hemiplexia* est affectus talis dimidii corporis, qui vel dexteras vel sinistras tantum partes afficit, à sagittali futura usque ad perinæum. Et hoc est mirum, quod una saltem medietas privetur sensu & motu, altera verò sentiat & moveatur.

Denique addit his *Lindannus speciem Apoplexiae*, quæ proprio nomine caret: Quando in toto corpore perit sensus & motus, excepto tantum capite, ubi quicquid infra collum est, manus, pedes, omnia resoluta sunt, excepto capite, dum lingua loquitur, aures audiunt &c. quæ species tamen rarè observata dicitur.

Ultim<sup>4</sup>



*Ultima Apoplexia species est Paraplexia seu Paraplegia* quæ tantum in uno alterove membro majore vel minore contingit, ut sensus & motus in totum pereat & privetur. Tres hos ultimos modos, seu species Autores passim referre solent ad paralyfin. Sed ut rectè monstrat Lindanius, Hipp. Aretæus & alii omnes Antiqui distinguunt apoplexiam à paralyfi, & quos affectus ex interna causa natos hodie ad paralyfin referimus, illi ad Apoplexiam retulerunt, quod nisi fiat, haud commode explicari poterit, quid sit *Apoplexia levis & vehemens*, dum Hippocr. sect. 2. aphor. 42. dicit: Apoplexia levis facile solvitur, Apoplexia vehemens nunquam sine febre. Variè hic se torquent Commentatores. Sed ex dictis explicatio facilis, dum *vehemens Apoplexia* est illa totius corporis *universalis*, de qua nemo curatur, nisi febris superveniat.

*Apoplexia vero levis est vel Hemiplexia, vel Innominata vel Paraplegia levis* dicta, respectu istius *universalis*.

Quando igitur sensus & motus corporis ita perit vel in totò, vel in parte, quæritur de causa? Per motum æquabilem spirituum animalium in cerebro & cerebello, & ex his per nervos in partes organicas fit omnis animalis functio. Cessante igitur hoc motu spirituum animalium æquabili & naturali, etiam cessat subito omnis animalis actio.

Quoad causas igitur Apoplexiæ, considerandæ & causa generationis & causa permutationis. Causa proxima generationis *formalis* est deficiens spirituum animalium motus in cerebro & cerebello, & hinc eorundem cessans influxus in membra reliqua.

Et quidem si cerebelli culpâ fiat, non tam Apoplexia erit (in qua, nisi fortissima fuerit, saltem motus spontanei plus minus abolerentur, non vero naturales in pulsu & respiratione) quam *syncope cardiaca*, in qua cordis motu penitus sublato circulationis sanguinis cessatio, ejusdem in cerebrum distributio & spirituum animalium & vitalium necessaria annexio omnino tollitur, & mox pulsu & respiratione plus minus interdum ad sensum penitus sublatis, sine sensu & motu, mortuorum instar jacent, seu sanguinis vitio, quod rarius, seu nervorum cardiacorum culpâ, v. g. convulsorum, ut in affectibus hysteris & similibus; seu spirituum in suo ex cerebello influxu inhibitorum causa eveniat. Conf. Willis de anima brutorum p. 2. cap. 8.

*Causa remota materialis seu occasionalis* est vel interna



vel externa. Utriusque præcipue interna ratione fit *Apoplexia* vel *accidentalis* vel *habitualis*. Hæc quæ post certas prægressas, in corpore occasiones & dispositiones interdum supervenit; illa vero quæ subito, interdum fortuito sine præcedente certa in corpore alteratione ægrosprehendit.

Utraque est vel *privativa* vel *positiva*, ut cum *Helmont*, *Tr. de Lihias*, c. 9. hanc *differentiam* arripiamus.

*Privativa* est, quæ citra directam spiritibus inductam alterationem, saltem ex impedimentis quibusdam, propter quæ legitime iidem aut generari aut distribui nequeunt, oritur, adeoque a posteriori & indirecte saltem supervenit, v.g. quando ex *suspensio*, aut *casu ab alto*, aut à *sanguinis* intra cranium *effusione*, aut *meatum cerebri obstructione* qualicunque apoplexia oritur.

*Positiva* *Apoplexia* est, quæ à tali fit causa, quæ spirituum animalium crasin & constitutionem vitare, eosdem ad motum & inde dependentes functiones planè ineptos reddere, & ita narcosi & stupore quodam afficere, vel instar Gas liquorum fermentescentium eosdem quasi extinguere valet. Qualis vis in opiatis, carbonum fumo & fulmine notissima est.

*Privativa Apoplexia* fit vel ob *sanguinis deficientem naturalem circulum* ad & per cerebrum, & inde cessant in spirituum generationem, idque vel *viarum* vel *sanguinis* ipsius culpâ, vel ob *spirituum denegatum motum* in cerebro, & effluxum, ob pororum & *meatum cerebri vitium*, vel *obstructorum* vel *compressorum*, sive in ejus centro medullari, adeoque ipso corpore calloso fiat, seu in ejusdem *progressu* circa corpora striata & caudicis medullaris initium, idque nunc in *universo cerebro*, nunc in *altera* saltem ejus *medietate*. *Sanguinis motum circulare* deficientem & inde natam Apoplexiam illustrat *ligatura* fortis collo injecta. Hanc si fortius stringas, eo ipso momento, quo arteriæ carotides & venæ jugulares in collo constrictæ sanguinis circulum ad cerebrum tollunt, eo ipso quoque momento omnis motus sensusque perit in talibus, ut ut adhuc ad tempus supervivant. Pater etiam in canibus, in quibus si facta cutis colli apertione ligentur fortiter arteriæ carotides, ita tamen ut parvæ arteriæ cervicales adhuc relinquantur liberæ, canis & inde somnolentus & torpidus jacet, & tamen ferè ad biduum supervivit, actionibus animalibus maxime imminutis, de quibus quicquid superest, beneficio arteriarum cervicalium adhuc liberarum obtinet, idem tamen moritur.

*Causa* igitur *Apoplexia*, ut loquitur *Hippocr.* est *obstructio venæ*. Per *venam* intellige hoc loco & *venam* & *arteriam*. Hic enim mos fuit Veterum



rum non distinguere hæc duo vasa. Unde etiam *Celsus* inquit: *Vena* credimus rei incertissima, ubi *arteria pulsans* innuitur. Verum hic loci non existimandum est, deficientem influxum sanguinis, per unum alterumve arteriarum carotidum ramum inferre Apoplexiam, sed potius ex impedito sanguinis per venas refluxu, & hinc ejusdem in cerebri cerebelliq; confiniis aut stagnatione aut extravasatione potius apoplexiam oriri. Contra istud enim, sanguinis nempe *denegatum* affluxum ad cerebrum, disputat eleganter *Willisus de anim. brutorum* sect. 2. cap. 8 p. 263. & majus periculum ex sanguinis abundantia, quam defectu apoplecticis imminere asserit. Hinc *Sylvius l. 1. c. 21. §. 36.* vasa arteriosa obstrui aut comprimi posse, indeque apoplexiam oriri non putat. Unde non nisi raro & saltem externa causa violentia talem apoplexiam ex *denegato sanguinis per arterias influxu* dependentem oriri æstimem, quin potius propter impeditum circulum, ex *denegato refluxu*, & hinc cerebri aut repletionem, aut compressionem, aut a sero extravasato repletionem, sicque spirituum impedito motu apoplexias hujusmodi privativas vitio sanguinis circuli contingentes oriri arbitror.

*Impeditur* autem *sanguinis refluxus* vel *viarum*, vel *vasorum*, vel *sanguinis* ipsius culpâ. *Viarum* vel *vasorum* culpâ, quando ex contusione, laceratione, rupture, aut similibus occasionibus sanguinis naturalis circulus impeditur. In sanguine hæret vitium quando hic crassus, grumosus aut plus minus coagulatus in vasis cerebri stagnat & hæret, seu in vasculis meningum, seu in cerebri sinibus, seu in venis jugularibus. Nam sicuti idem sanguis subsistens in pulmonibus *syncopen cardiacam* vitio sanguinis natam, speciem quasi *catarrhi suffocativi* infert; ita in cerebro, aut ejus vasis, si idem contingat, est *Apoplexia*, adeoque ex his causis nati hi affectus non nisi loco affecto differunt. Nec ullum est dubium tales ægros apoplecticos & a sanguine stagnante suffocatos, eodem malo interire. Unde etiam a *Fracassato in Epist. ad Malpigh. de Cerebr.* in pulmonibus apoplecticorum vasa sanguifera interdum disrupta aut turgida inventa fuerunt. Sed de his & *Apoplexia* ex hac causa natâ conferatur imprimis *Wepferus de Apoplexia ejusque locis affectis.*

*Veteres* & horum affectu in *Apoplexia*, cerebri ventriculos repleri & exinde spirituum animalium motum tolli asseruerunt. Sed experientia restatur, sæpius aliis morbis mortuos, exhibuisse ventriculos cerebri repletos & obstructos, sine insecuta *Apoplexia*. Refert *Lindanus* Amstelodami dissectum fuisse caput viri, qui per triennium dolore capitis maximò laboraverat, cujus ventriculi ita repleti fuerunt humore seroso & limpidò, simili lymphæ vasorum lymphaticorum, ut integrâ pinta Hollandica inde eximeretur; <sup>non</sup> tamen factus fuit apoplecticus. *Fernelius* exemplum refert apertum esse caput apoplectici & in cerebro nihil, sed in venâ jugulari repertos esse sanguinis grumos.



*Nymmannus* scripsit de *Apoplexia*, ejusque sedem ponit in torculari *Herofchyli*, ubi observavit sanguinem factum grumosum stagnare & hinc apoplexiam inferre. Ignoravit Autor circulationem sanguinis, unde spirituum influxum cum sanguine denegatum causam asserit, cum potius ex impedito refluxu, hinc sanguinis stagnatione & cessante in cerebro circulo apoplexia inde oriatur.

*Spirituum motus deficit ex pororum conniventia* & subsidencia, cujus plures possunt esse occasiones v. g. à *contusione* & *concussione* capitis. Quà ratione *ex alapa inflata* apoplexiam natam *Hercules Saxo*. *Benvenius in obs.* & ex eo *Schenckius* referunt; it. *materia tenui subtili quasi lymphaticâ*, successivè interiora versus irruente & ita poros & meatus obstruente: Quam causam in habituali poplexia inprimis accusat *Willis cit. l. 1.* It. à *sanguine grumoso* v. g. post capitis contusiones extravasato; it. *ab abscessu* in meningibus rupto, aut alia materia vitiosa vel *extrinsecus* cerebro affusa, aut *intrinsecus* cerebro instillata, aut circa ejus basin collecta, ibique medullæ & nervorum principium obsidente.

*An pituita extrinsecus circa spinalem medullam colligi*, eandem comprimere, & ita apoplexiam & cognatos affectus inferre valeat, prout asserit *Sylvius l. 2. cap. 21. §. 48. & seqq.* ferè dubito, ob lentum pituitæ motum, nisi vehiculo feri aut lymphæ, à motu naturali quacunque causâ aberrantis, ad ista loca delata & collecta fuerit. Sanè præter sanguinis collectiones intra cerebrum, plures *feri & lymphæ*, in & circa cerebrum *collectiones* in apoplexia mortuis observatæ fuerunt. Sic *Marcel. Donatus l. 2. Hist. med. mir. c. 6.* refert quod in forti apoplexia perempto, secto cranio tota cerebri substantia *aqueo humore* perfusa fuerit & oppleta, quæ & in cerebri ventriculis redundabat. Dissectis carotidibus ingens sanguinis crassi melancholici emanavit copia. *Columbus Anatom. c. 15.* Apoplecticorum capita dissecta exhibuisse cerebrum magna *aqua glutinosa* copiâ distentum. Refert *Horst. obs. Anat. 3.* in Principe apoplexia mortuo observatum cerebrum grande, *serò & pituitâ* plusquam refertum, maximè in ventriculis, arteria autem venosa ac aorta nigro tumore perfusa sive repleta, qualem Princeps antea in lingua & faucibus per aliquod tempus habuerat. Adeò ut privativa Apoplexia nunc *sanguinea*, nunc *serosa* dicenda sit, pro meliore nempe ejus curatione. *Vid. obs. Anat. in Bonetti Sepulchreto.*

Sed ultra hanc *privativam*, *Apoplexiam* etiam alteram dari *Positivam* confirmant tam *opiata* in majori dosi usurpata, quàm *carbonum*, aut liquorum *fermentescentiû Gas*, ut & *S. V.* vel vini generosioris abusus, quæ positivâ efficacîâ apoplexiam narcotica & stupefactiva qualitate inferunt. Sed cum hæc fiant saltim à *causa externâ* tamen etiam à *causa internâ* oriri, primus docet & accuratè defendit *Helmont*, & probabile fit ex eo, quod alii affectus *soporosi*, speciatim



ciatim comata, lethargi & catalepsis ex causa interna oriuntur; quidam ergo & Apoplexia, quæ vix essentialiter ab istis differre videtur. *Helmont nempe Tr. de Lubia cap. 9. §. 41. & seq.* in eo est totus, ut propriè sic dictam apoplexiam à causa interna enasci asserat, eamque *positivam*, nempe à certo quodam *veneno narcotico & glaciali* in ventre hærente, & digestionis propriæ errore enato, occasione cujus Archæus horrescat, fugiat, & ideas cadaverosas illius recrementi pariat, quo ipso cerebrum cum pedissequis potentiis in sui obsequium trahat, per actionem regiminis stomachi aut diuini viratus. Unde & subitaneo tali casu terror in spiritibus istorum locorum incolis excitatur, propter quem terrorem subinde debilius medullæ latus contrahitur, unde paralylin apoplexiæ supervenire dicit.

In hac hypothese duo consideranda. I. *Res ipsa, an sit?* II. *Modus rei, an ita se habeat?*

*Quoad prius excitari apoplexiam à causis internis*, spiritus animales vitiantibus & stupidos & torpidos reddentibus (ut nostro loquendi modo rem declarem) & ita *positive* operantibus, iisque circa stomachum seu ventriculi superius orificium constitis seu hærentibus, i. e. *apoplexiam positivam* ex præcordiis excitari, *confirmatur* (α) *à iuvantibus*: Vomitus & huius loco clysmata acria bene profunt. Item subtilia aromatica, odorifera & omnia stomachica brevi recreantia; (β) *à nocentibus*: Halitus carbonum oretenus inspiratus graves vertigines item carum inferit, ex affecto imprimis stomacho, nam ob id vomitus iuvat: Carus vero & apoplexia nonnisi maioris & minoris ratione differunt. Hinc cupediarum artifex à Gas carbonum inebriatus mortui instar in carbones candentes incidit, sine sensu totū femur comburendo. *Grembsius in arbore integr. & ruinos hominis lib. 3. c. 1. §. 37.* hanc *Helmontii* sententiam de veneno narcotico in præcordiis apoplexiam excitante confirmat notabili exemplo per *tobaci ab-usum*; Sic ex usu fungorum excitata apoplexia, vomitu, quo fungi ex stomacho rejecti fuerunt, imprimis curata vid. in *Act. Hassn vol. 2. p. 295.* (γ) *Ab adjunctis*: Curavi mulierem apoplecticam ex causa interna sponte sua enatam. Hac excitata conquerebatur in paroxysmo unice de angustia & anxietate præcordiorum, über grosse Herzens-Ängst una cum insigni in somnum propensione. Aliud verò est defectus virium ex spirituum animalium defectu præcisè, aliud somnolentia ex eorum torpore. Summè debiles ad ultimum vitæ articulum sunt infirmes; isti verò aliàs validi ex improvise somnolenti fiunt, & quidem recrudescente subinde paroxysmo, præcedebat præcordiorum angustia, quam sequebatur somnolentia: Illa cessante & hæc cessabat. Unde & alio tempore aliquot septimanis à primo insultu propinatum propter alium scopum vomitorium *giale*,



le, cum anxietate præcordiorum virium imbecillitatem & insignem ad somnum propensionem inferebat. (d) *ab antecedentibus*: Sic *vertigo* per consensum stomachi est prodromus apoplexiæ in senibus. Plura huius novi exempla. *Parente meo* certo imminet apoplexia. Plures sunt anni, quod vertigine per consensum stomachi laborat & hereditario vitio ad apoplexiam inclinat; unde certus sum, quod hæc vertigo ex stomacho certo prædicet apoplexiam. Omnes ejus ex materna linea Parentes apoplexia tactæ fuerunt. *Avia materna* hoc affectu interit; *mater* quoque eo correpta fuit. Jam ab omnibus Practicis asseritur, *hereditarium malum* esse apoplexiam. *Conf. Forest. l. 10. obs. 75.* Sed talis character *hereditarius apoplecticus*, qui à parentibus in liberos transfertur, antequam ipsi apoplexiâ correpti fuerunt, revera *positivi* quid in apoplexia subesse innuit, à quo *vertigo* etiam ex stomachi consensu & tandem apoplexia superveniat. (e) *Remedia quædam appropriata*, v.g. *cinnab. ʒii. ʃ diaphor. Poterii &* similia, non nisi intra primas vias *posuivè* operantia ad apoplexias & paralyfes sunt egregia.

*Quoad posterius, modus fiendi subitaneus* & frequenter *momentaneus* negotium per *humorum defluxum*, aut *viarum oppilationem*, quæ per successionem saltem fit, vix sufficienter explicat, adeoque aliud quid subest, necesse est, quod subito malum inferat, id quod *Gas rerum fermentescentium* sua narcosi & momentanea operatione optime illustrare videtur. Ob id etiam *Willis* non acquiescit in solo humorum serosorum aliorumve in cerebri medullarum p. n. translatione, sed simul *vim virulentam* spiritus animales fugantem & extinguentem unâ accusat. Equidem sapissime *signa* quædam *circa caput* & animalem facultatem præcedunt, quæ imminentis apoplexiæ metum incutiunt, *Vid. Sylvium l. 2. c. 21. §. 22. & seqq.* Sed hæc ipsa medio se habent modo, ita ut & cerebri affectum per essentiam, ut & per consensum insequi possint, non secus ac vertigo etiam ex stomacho in senibus talis prodromus in habituali apoplexiâ esse solet. *Unde sedulo semper investigandum*, an aliæ concurrentes circumstantiæ plus minus affectum capitis per *æpasmobæiæ*, an verò per *depressionem* designent. Sicuti non rarum *Epilepsias universales* per abdominis consensum excitari & *remedia*, quæ abdominis aut hypochondriorum spatia non excedunt & deliriis & spasms & cephalalgis optime subvenire, v.g. *ʒ alia, cinnabarina, vomitoria, clysmata &c.*

Hæc quidem *quoad rem ipsam* satis clara esse videntur, sed *quoad modum rei* res intricatissima est. Ad Veterum *vapores* & halitus, aut Chymistarum *effluvia volatilia stupefactiva* confugere minus sufficit: *Ignoram regiminis actionem Helmontii* profiteri est palliare propriam ignorantiam; *consensus*, qui per nervos explicabilis est & hic vix locum habere videtur, nisi dicere velimus,

mus,



mus, per consensum irritatorum nervorum circa præcordia stringi cerebri fibras nervorumque principium, cuius contractura occasione spirituum in partibus externis deficiat motus, qui in cerebri medulla perturbationem sensum & rationem tollat. Per sanguinis circularem motum negotium quodammodo illustrari posset, sed & hic quamplurima obstant: Narcosi percuti & stupefieri spiritus animales, seu figi ac quasi plus minus coagulari, plausibile est, sed quomodo hoc ex præcordiis fiat, res hæret. Nempe sicut opiata, sem. hyoscyami, fungi, gas carbonum etiam in stomacho inferunt affectus soporosos & caroticos; ita similis virulentia narcotica circa præcordia existens in regione stomachi, apoplexiam, paralyin inferre poterit. Modus tamen rei later. Sufficiat pro meliori ad praxin manu ductione differentiam apoplexiæ in positivam & privativam insinuasce, observando simul, excitari ab externis causis frequentius accidentales, sicut ex internis habituales & has inter, quæ ex causis internis oriuntur, forsan æquè frequentes esse apoplexias positivas quam privativas.

Consideremus jam causas remotas, sed si has ipsas, prout à Scripto-ribus consignatæ deprehenduntur consideremus, eadem ferè ad privativas, minus ad positivas apoplexias pertinent, ut ut notabilis & curiosa sit observatio Wil-  
lis. de anim. brutor. part. 2. c. 8. Deinde magis accidentales ferè, quam habituales sunt apoplexiæ istæ, quas referunt. Ad hæc remotæ istæ causæ, exceptis iis, quæ manifesta læsione caput afficiunt, potius *προνυμειναι* sunt, seu antecedentes quæ causam continentem movent, aut saltem sunt subinde causæ procatar-  
eticæ, quæ dispositionem morbosam internam commovent, ut eæ proximas constituent. Ut taceam in Observationum Anatomicarum considera-  
tione ex inspectis cadaveribus facillimam, modò non frequentem esse fallaciam à non causa ut causa, ita ut vel p. n. quid forsan repertum, pro causa morbi mortis-  
que habeatur, vel etiam productum quoddam morbosum pro genuina illius ha-  
beat origine.

Remotas inter eminent quævis contusiones & concussiones cerebri, tam-  
cum, quam sine manifesta ejus læsione factæ; sive collabantur & angustentur saltè  
pori, seu sanguinis simul vitietur circuitus intra cranium, v. g. ex nimio sonitu apo-  
plexiā observavit Fontanus curat. & Respons. l. 1. p. 49. Ex concussione à casu apo-  
plexiam lethalem observavit Horstius in obs. l. 2. obs. 13. Item ex casu ab equo verti-  
ginem, quæ tandem in apoplexiam lethalem desit Deodatus in valetudin. p. 121.  
Ex ictu oculi nimio apoplexiam in utero observavit Fernelius lib. 2. de abdit. rer.  
caus. c. 15. sanguine forsan ex internis oculi venis disruptis ad basin cerebri pro-  
cum-



cumbente. Sic ex percussione oculi cum raphano apoplexiam natam refert *Scul-  
ret. Armament. Chirurg. obs. 21.* Frigus repentinum aut nimium quocunque  
modo alterando sanguinem aut spiritus ad apoplexiam disponit. Quo facit *aphor.  
Hippocr. 23. sect. 3.* & confirmatur à *Forest. l. 10. obs. 70.* E contra astus nimius item  
interre potest apoplexiam. Vid. *Schenck. l. 1. obs. 1.* Potus vini generosi nimis,  
item ebrietas inordinata plures, optimi alias habitus ad apoplexiam disponit.  
exemplis hinc inde obviis, v. g. in *Fonsec. l. 2. consil. 59. Forest. l. 10. obs. 39.* In specie  
*Henr. ab Heer obs. 8.* rectè asserit, quod nos Septentrionales imprimis ex inglu-  
vie & comestationibus corripimur apoplexiâ. Lotio capitis cum  $\nabla$  tepida &  
hinc ejusdem expositio aëri frigidiori apoplexiam infert, autote *Amar. Lusit.  
Cent. 1. cur. 36.* Sic cum quidam in tertianâ intermittente die intermissionis se  
diutius exposuisset  $\odot$  ardori, diebus canicularibus, apoplecticorum more repen-  
te concidit & altero die extinctus est *Pisè de colluv. seros.* Ex tumore cranii ex-  
terno sanato apoplexiam natam refert *Barthol. Cent. 4. obs. 86.* Morbi melan-  
cholici in apoplexiam quoque abeunt, quod præter *Mæbium in Instit.* etiam ob-  
servavit *Forest. l. 10. obs. 78.* Post nimia purgantia sanguis Draconis pro adstri-  
ctione alvi adhibitus apoplexiam infert, teste *Bartholin. Cent. 2. Ep. p. 680.* In  
specie suppressio quædam consueta sanguinis evacuationis per hamorrhoides  
aut uterum, aut nares apoplexiam intulisse observatum. *Zacut. Lusit. l. 7. Med.  
Princ. Hist. c. 7.* refert juvenem florentis ætatis, qui per scalas altè decidit, hinc  
sanguinis ingens fluxus secutus quo tempore æger se rectè habebat, sed ea sup-  
pressa in apoplexiam incidit, quæ non nisi copiosa V.S. sublata fuit. Sic *Hildan.  
Cent. 3. obs. 1.* refert apoplexiam lethalem ex consueta sanguinis per nares eva-  
cuatione suppressa, post horas à morte 12. sanguis copiosè ex ore & naribus ma-  
navit. Sic ex non ritè fluentibus lochiis puerperam apoplexiâ correptam V.S. cu-  
ratam *Fontanus* narrat in *Curat. & Respons. l. 1. p. 25.* Unde non rarum est subin-  
de in apoplexia mortuis sanguinem congruatum in cerebro ejusque ventri-  
culis fuisse repertum. Vid. *Barthol. Cent. 2. histor. Anatom. 60.* Item *Borellus  
Cent. 2. hist. 34.* Venus e contra nimia potissimum in senibus ad apoplexiam  
multum disponit. Vid. *Henric. ab Heer obs. 18.* & *Plater. in obser. v.* A scabie retro-  
pulla apoplexiam in Viro consistentis ætatis vidit *Mæbium Instit. p. 65.* Vapores  
Qales pariter apoplexiam inducunt. Vid. *Lang. Ep. l. 1. epist. 43.* Hinc qui Vene-  
tiis specula Qio illinunt, ad apoplexiam declinant. Vid. *Aët. societ. Reg. vol. 1.  
p. 18.* Apoplexiæ ex fulmine notæ sunt ex *Marcello Donato & Schenck.* Sed præ-  
terea vapores thermarum sulphurearum apoplexiam inferre notat *Schenck. l. 1.  
obs. 2.* Sicut ex nimio fœtore ex vaporibus puteorum cœnosorum apoplexiam  
refert *Marcellus l. 2. c. 6.* Imprimis affectus animi graviores quicunque tanquam  
causa procatartica apoplecticos insultus excitant, speciatim ira. *Exemplum  
Forest. habet l. 10. obs. 60.* Item terror, vid. *Hildan. Cent. 6. obs. 12.* Quin imò ima-  
ginatio

ginatio in disp  
obs. 76. Senex  
terierat, cum  
genarium ipi  
pit & domum  
quenti anno a  
scabie monitum  
variolas, cum  
dies apoplecti  
Ut aut

an priva  
Ex externa, v.  
supervenire  
minato & ita  
apoplexiæ ori

Dist  
rho suffoc  
gustia. Quia  
tamen spiran  
dum ferè na  
ferè deficit, in  
servent, alii p  
nempe plus v  
tur. Prætere  
erumpit, pul  
actionibus ar  
plurimum de  
loc. affect. in  
diu id, quod  
nis solum est  
cardiacæ nul  
hysterica etia  
quod in su  
dominis; Ita  
ferè nullus f  
Paris



ginatio in dispositis multum confert. Curiosum est, quod refert *Forest. lib. 10. obs. 76.* Senex quidam sexagenarius crassus & obesus, cujus frater apoplexia interierat, cum illi inter ambulandum annunciatum esset, quendam senem octuagenarium ipsi familiarem subito mortuum esse, statim ei pes sinister tremere coepit & domum relatus apoplexiâ correptus est, à qua convaluit. Cæterum sequenti anno apoplexia correptus interit, ut ante pater & frater. Quod *supra de scabie* monitum, de *variolis* observandum quoque. Nam puella post expulsa variolas cum se citius aëri pluvioso exposuisset, ad fossam aquæ residens, intra 2. dies apoplectica interit.

Ut autem ritè *distinguat*ur apoplexia, qualis sit, *an positiva, an privativa*, ab antecedentibus & adjunctis cognosci debet. Illa sunt causæ externæ, vitæ genus, habitus ægri, diæta &c. Facile enim *positiva* *privativa* supervenire & complicari mutuo possunt; Illius occasione sanguinis motu sufflaminato & ita circa cerebrum eodem stagnante, *syncope cardiaca*, similis affectus apoplexiæ oritur, ut *supra* monitum.

*Distinguntur* tamen quod in *syncope cardiaca* seu *catarrho suffocativo* difficilius spirent, & signa adsint gravissimæ in pectore angustia. Qui apoplexia verò corripitur, ut ut aliàs vix manifesta vitæ habeat signa, tamen spirandi difficultate vix vexari solet, cum aut parum, aut tardè aut interdum ferè *naturaliter* spiritum ducat. Pulsus quoque, qui in *syncope cardiaca* ferè deficit, in affectibus apoplecticis ferè durus observatur, ita ut aliqui pulsum servant, alii pusillum habeant, rarò, nisi in fortissima apoplexia, nullum, prout nempe plus vel minus præcordiorum sanguis stagnat, aut nervus cordis afficitur. Præterea in *syncope cardiaca* externa frigent, facies pallescit, sudor frigidus erumpit, pulsu evanescente & respiratione penitus ablata. In apoplexia abolitis actionibus animalibus nihilominus respirant, arteriæ pulsant, extrema calida ut plurimum deprehenduntur, & facies rubicunda observatur. Vid. *Wepferus de loc. affect. in Apoplex.* Præterea in apoplexia quavis fortis stertor est, quamdiu id, quod à cerebro accedit musculis thoracis, ad complementum respirationis solum est ablatum, durante adhuc ebullitione naturali in corde. In *syncope cardiaca* nullus est stertor, quia cor ipsum subito occupatur. In gravi passione *hysterica* etiam ægræ instar apoplecticarum jacent. *Distinguntur* tamen quod in *suffocatione uterina* dicta præcesserint symptomata affecti abdominis; Item quod in *suffocatione hysterica* pulsus observetur simul parvus, aut ferè nullus fiat, qui sæpe in apoplexia admodum sensilis est. Deinde apoplectici faciei



faciei color in ferè retinent, imò rubicundi ac tumidi subinde in facie apparent, qui in suffocatione uterina omninò perit, cum facies palleat.

Quoad *prognosin*, Apoplexia est acutissimus & periculosissimus affectus, ut testantur *aphorismi Hippocrati*, *sect. 5. §. 5. sect. 6. §. 51. sect. 2. §. 42.* Vehementia & periculum apoplexiæ ex noxa, quam respiratio adfert, imprimis cognoscitur. Nam qui apoplexia moriuntur, suffocati intereunt. Unde quò liberior est respiratio, eò minor est apoplexia & contra. In specie, si in tantum lædatur respiratio, ut spuma circa os appareat, lethale habetur secundum Hippocrati, *sect. 2. §. 43.* Strangulati & suffocati non tamen mortui, ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparet. Multum hic litigant Autores. Optima est interpretatio Lindani: Strangulatio hic non à collo, sed per eos intelligitur hos, quibus subito à causâ interna respiratio intercipitur. Hæc à multis potest intercipi, v.g. in suffocatione uterina. Itaque Hippocrates hoc vult: Potest respiratio intercipi & non redire, sed an reditura sit, cognoscas, si spuma oriatur circa os, tunc certus esto, eam suffocationem esse circa cor, à stagnatione sanguinis circa illud. Quando natura extremo conatu voluit sanguinem propellere, inde suborta in pulmone spuma est & ad os detrusa & si aperto ore spuma prodierit, desperata res est. Hæc Lindani. Nempe spuma non præcisè mortis, sed supremus viventium conatus est in talibus ægris. Omnis oritur ex aëris & humoris plus minus viscidæ mixturæ, adeò ut etiam sanguis in spumam albam subrubicundam abeat, ad instar cerevisiæ obscuræ, per agitationem tamen cum aëre in candidam spumam abeuntis. Non ergo levis ista spuma adeo periculosum signum est, quæ ex saliva intra fauces agitata oritur & qualis in paroxysmis epilepticorum ordinariò observatur, sed illa ferè fatalis est, quæ ex imo pectore seu ipsis pulmonibus ex sanguine plus minus stagnante per aëris reciprocum motum attenuato & ita in spumam rarefacto oritur & ita in fauces foras ebullit; adeò ut observati sint in apoplecticis in Schenck observat. quibus post mortem per os, nares & prominentes oculos fervida spuma prodierit. Apoplecticis, si à difficili respiratione sudor proveniat, lethale est, syncopiticus nempe existit. Apoplectici melius habentes post universalia aut aliquo modo excitati, si denuò somnolenti, aut plus minus torpidi sint, iisdem recidivæ periculum imminet, si quidem perfectè licet curati, facillè tamen recidivant. Cætera vid. in Schenck.

Cura Apoplexiæ instituenda est tam in paroxysmo, ut resuscitetur æger, quam extra paroxysmum, ut observaris debitis evacuationibus simulque usurpatis caput & ventriculum roborantibus reditus paroxysmi præcaveatur. Neque enim æger, apertè licet convalescens, deferendus nec curandi scopi sunt dimittendi; aut enim stupidi manent aut varia accidentia eos vexant, adeò ut si sumus negligentes in curatione, facillè contingat, paroxysmum reverti, ac ægros mori.

In



In ipso paroxysmo duo imprimis remedia generosiora sunt, quæ aut liberant ægros, rectè administrata, aut eos trucidant malè usurpata. Et hæc sunt vomitus & venesectionio. Quorum alterum ut plurimum necessariò adhibendum, subinde, si conditio ægri respondeat, utrumque. Nam de clysteribus eorumque usu; item suppositorum quæ acriora & fortiora semper sunt applicanda, omnes concordant Medici Practici, quod in omni paroxysmo apoplectico, atque etiam post eundem necessariò & semper usurpanda sint. Sed quoad vomitum, hic optimè suscitatur ægros & quod aliàs irritando clysmate intendunt Practici hoc efficacissimè obtinemus vomitu, præsertim cum experientia ejusdè usum sæpius comprobaverit vid. Lang. Miscell. p. 11. 12. & Petrus à Castro in Method. Med. se vomitoriis ultra spem plurimos desperatos excitasse affirmat & alia valde prelaudat. Conf. ulterius Julius Caesar Claudinus in Empyriis p. 349. & Poterius, qui croc. metall. vulg. gr. iij. vehementissimum apoplecticum excitavit, inuncto simul ori ol. cinamom. Item Riverius & alii plures. His saltem metus est in vomitu, ne suffocationis imminentis acceleretur periculū. Posito etiam quod ex impedito sanguinis circulo fiat apoplexia privativa, haud videtur conveniens vomitus, imò periculum est, ne sub vomendi conatu sanguis ac ferum circa collum & caput retineatur & hinc istæ partes magis obruantur, cum naturaliter sub vomendi conatu facies rubescere, oculi tumescere & collum inflari soleat.

Quoad venesectionem, promoveri equidem hujus medio sanguinis circularis motus in quavis apoplexia plus minus impeditus, potest, interim Celsi de venesectione est pronunciatum, quod sanguinis detractio aut occidat, aut liberet apoplecticum. Unde etiam eandem rejicit Barbette in praxi, quia eam sæpe lethalem reddat; & meretur observari effatum Henr. ab Heer obs. 8: „Nostrates qui in gluvie, comestationibusq; ferè apoplexiam incurrunt, phlebotomiâ vix unquam curantur, adeò ut centesimus ægrè educto sanguine evadat. Et in tali casu revera vomitus præ V. S. longè magis necessarius videtur. Cum tamen semper & in omni apoplexia tam positiva, quam privativa vitium in sanguinis circulo, aut per cerebrum, aut per pulmones plus minus impedito adesse soleat, pro hoc promovendo instituenda venit V. S. quam pluribus commendat Sylvius lib. 2. cap. 21. §. 96. &c. Hinc enim depletis non nihil vasis & ita facilitata sanguini via, vomitoria, quando necessaria videntur, usurpanda, quæ tunc minori periculo omninò in usum vocari poterunt, adeoque ut plurimum V. S. & vomitus locum habent in paroxysmo apoplectico, modo vires respondeant, quæ exinde mensurandæ, qualis æger ante paroxysmum fuerit. Nam v. g. in senibus admodum, loco vomitus clysmata acria, loco V. S.



*cucurbitula*, in scapulis scarificatae usurpanda: Tamen in apoplexia *privativa* magis V.S. & cucurbitulae, in *positiva* vomitus & clysinata conveniunt, hinc illis praemissis, in *privativa volatilia*, in *positiva aromatica sulphurea*, *mineralia fixa* ac *metallica* & *sublimiora arcana* conducunt. Quae omnia ex *circumstantiis secundum res naturales, non naturales* & *p.n.* in cuiusvis aegri cura semper observandis, diversimode adhuc limitantur.

*Pro venesectionis negotio illustrando* confert cura *cujusdam ancillae*, mox à mediâ nocte insultu apoplectico tacta; Accedens manè hora 8. illam habitus carnosus, succi pleni, robustam, facie & membris insigniter rubram, quasi sanguis undique stagneret, offendi, membra difficillimè & saltim brachia aequaliter movere poterat, de summa praecordiorum anxietate, tremula & vix intelligibili voce conquirebatur, innuendo scrobiculum cordis; hinc praescribo *vomitiorum* in dosi intensiori aliquoties, sed non vehementer purgabatur supra & infra. A meridie V.S. in brachio ordino & praescribo misturam ex *spiritu thiaci* ceu basi cum aliis *spirituosis aromaticis* nervinis. Cordi vero jubeo applicare linteam multiplicatum *spir. vin.* calidè probe impraegnatum, idque saepius repetere. Accedens altero manè eam paulò meliorem offendo, facie adhuc admodum rubicunda cum pulsu duro. Hinc cum haemorrhagiam observassem, non obstante jam factâ V.S. jubeo etiam in crure, brachio, in quo V.S. facta fuerat, opposito, circa talum venam incidere. Nocte sequente adhuc supervenit fluxus menstruus, unde continuatò usu *spir. thiaci* interno & *spir. vin.* externo, cum interposito semel *pulvere laxativo*, intra octiduum convaluit. Et ita in hac ancilla corpulenta & staturæ brevis, ast robusta natura ultra duplicem V.S. adhuc haemorrhagiam narium & uteri provocavit. Videbatur mihi in subiecto hoc sanguinis circulus admodum lentus, non praecise ex copia, sed ex fibrarum nervearum ac membranosarum strictura quasi spasmodicâ, qua occasione sanguinis refluxus nonnihil moratus, ruborem istum faciei & artuum exhibebat, sanguine ipso ob tardiores transvasationem ex arteriis in venas, praeter V.S. nunc oscula vasorum narium, nunc uteri per anastomosis aperiente.

*In paroxysmo* igitur ante omnia opera danda ut *excitetur ager* & ut *servetur respirationis actio* & *usus*, quantum possibile, integra. Hinc *prioris ratione* in loco non nimis clauso, aut vapido, sed aëre libero perflato situandus aeger; quin & ventus artificialis subinde circa eum faciendus. *Posterioris ratione* sensuum organa quaecunque & partes quae vis sensiles fortius affricanda. Mox igitur V.S. instituenda, quae peracta vel *vomitiorum* ordinandum, vel *clyma acre* injiciendum. *Non differenda vomitoria*, ut monet *Lindannus*, cum in forti apoplexia occasio praecipua & si quid revellere potest, ac consumptum



pitum ægrum suscitare, certè vomitoria possunt. *Necesse est autem ut augeas dosin eorum, uti & aliorum remedium, quæ excitare debent ægrum.* Spiritus enim stupet & sensus imminuitur, augenda igitur dosis, alias nil ages. *Propincitur vomitoria in forma liquida, ut sponte quali per gulam diffluere queant, sociando semper simul*  $\nabla$  *m spirituosam, v. g. cinamomi aut aliam similem, ut ejus medio simul spirituum vigor nonnihil promoveatur.* Hinc *syrupus emeticus ad*  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . præscribendus. *Clysteres, qui infunduntur sint acriores & fortiter stimulantes, facti ex herb. salvia, origan. calaminth. rad. pyrethri, cyclam. quibus incoquatur pulpa colocymbid. aut addatur decocto infusum, aut decoctum croci metallorum turbidum ad*  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . l.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ . Commodè etiam  $\theta$ . *gemme* additur, quin imò in casu præcipiti *clyisma ex musculo quodam communi c. Mj. l. ij. bis communis* acuato, & ita infuso, cui simul *infusio*  $\mathfrak{z}$  *ialis, aut syr. zialis emeticus tripla vel quadrupla dosi ex tempore addi potest.*

*Occurrebat curanda mulier vegeta, sed jam ætatis nonnihil decrefcentis correpta affectu ex apoplexia & epilepsia quasi mixto.* Vocatus manè præmissa V. S. (utut non tam ea, quàm adstantium ratione facerem) præscribo potionem cum *syr. emet. Sal.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ . capit sine alteratione, denuò ordino  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . ejusdem, capit sine alteratione. Tandem adhuc  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . ejusdem in pauca potione præscribo, ut successivè propinent, & sic tandem aliquoties supra & infra purgata melius habuit. *Posito, de primâ misturâ aliquid deperditum fuisse, cum ex ore aliquid deflueret, tamen ad minimum*  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{x}$ . hujus *syrupi* intra bihorium accepit, nec tamen adeò insigniter purgata fuit. *Interea dum hæc faciunt, æger subinde agiandus, plante pedum fricanda, dolorifica frictiones & punctura extremorum instituendæ.* Quantum enim frictio plantarum pedum cum *muria acri*, aut hujus loco cum *aceto & oleo cum setaceo* profit ad excitandos tales, vide in *M. A. N. C. Ann. 8. p. 159.* Puncturatur vero efficacia vid. in *Henr. ab Heer obs. 21.* Præ cæteris odores acres, præsertim ex *hibus volatilibus* penetrantioribus objiciendi, aut *sternutatoria* infundendo, ac *linguam & palatum* fricando, præsertim in juncta aponia; quò facit inprimis *Electuarium Timæi contra Apoplexiam & Epilepsiam* & omnes soporosos affectus, item contra suffocationes uteri;

$\mathfrak{z}\mathfrak{x}$ .  $\theta$ . volatil succin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

theriac Androm.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$ .

pulv castor.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

ol. destillat. rutæ.

succin,

rorismar. an. gt.  $\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ .

M. F. Electuarium.

dissolv. quantum cuspis cultelli capit, in  $\nabla$  *a quadam apoplectica vel epileptica &*



ægro infundatur, ut deglutiat, simulque linguam ac palatum fortiter frica hoc electuario. Si post horæ quadrantem ad se non redeat, repete & naribus de sequente pulvere infla

℞. Helleb. alb.  
majoran.  
flor. lil. convall.  
pyrethri.  
castorei an. ʒj M. F. pulv. sternutatorius.

Item suffitus succinatus naribus admoveatur, aut fricetur lingua & palatum cum spir. theriacal. probè camphorato, spiritu ceras. rectif. cum paucis guttis ol. destill. cinamomi aut caryoph. acuat. Camphora & ol. ejus his ipsis inflandis & affricandis commodè adduntur vid. Hartm. in sua praxi. Extractum Salvia, cui aliquantulum olei destillat. succin. & camphora additum fuerit, pro fricandâ lingua est egregium. Facit huc oleum apoplecticum Rhumelij in Antidot. P. I. p. 167. dum oleum succini non rectificatum miscet cum dimidio ol. rorismar. infundit & font. & per vesicam destillando ol. rectif. dos. gt. vj. ad xij. pro usu interno.

*Externè vertex, tempora ac nucha* iisdem illiniri possunt. Sed *observandum* ut hujusmodi odorata oleosa non nimis largiter aut copiosè dictis locis illinantur. Nam redeunt ad se ægri de insigni capitis perturbatione & gravitate ex oleorum hujusmodi fumosorum illinitione conqueruntur; quin & illinenda talia convenientissime quoque circa regionem stomachi applicari debent, superimponendo laterem calefactum. Usitata sunt bals. apoplect. ol. majoran. lavendul. spir. salu. &c. Cum his ipsis administrationum modis & aqua vite spirituosâ, apoplectica &c. instillantur ori & faucibus, acuenda præsertim sbus & spiritibus urinosus. v. g.

℞. ∇. apoplect. opt. ʒj.  
liliorum convall. ʒß.  
Q. E. matthiol. ʒß.  
Syr. flor. tunic. ʒß. M.  
Vel ℞. ∇. liliorum convall.  
menth. an. ʒjß.  
spir. cerasor. nigr. ʒvj.  
liquor. CC. succinat. ritè parat. vel  
spir. ʒxi ʒjß.  
ol. destillat. succin. gt. vj.  
syr. flor. tunic. ʒß. M.

Cum his spirituosus ∇is internis etiam externa à quibusdam expetuntur;

℞. ∇. moliss.



lil. convall. c. vin. an. ℥ij.

apoplect. ℥j.

acet. rutac. ℥ij. M. S. Anstreichwasser / pro temporibus & naso.

Istis præmissis, si non redeat ad se æger, unum alterumve repetendum venit, v. g. vomitoria subinde reiteranda, injectis desuper clysteribus, & quæ externos sensus afficiant, continuando. Quin & vesicatoria ampla cervici & cruribus applicanda. Si redierit æger ad se nonnihil, sed non sufficienter, interna spiritalia continuanda, vesicatoria applicanda, quin & cucurbitula nunc cum, nunc sine scarificatione scapulis & brachiis admovendæ, aliaque administranda, prout æger ad se rediens de uno alterove symptomate magis vel minus querulus fiat.

*Extra paroxysmum* instituenda *circa præservatoria*, tam in iis, qui jam semel apoplexiâ tacti fuerunt, ut præcaveatur crebra recidiva, quam in iis, qui futuram aliquando apoplexiam metuunt: Cujus prodromi sunt (in habituali tunc dicta) vertigo, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illachrymationes, scoromiæ, incubus, stupor frequens brachii aut pedis aut etiam, refrigeratio extremitatum partium. In his pro præservatione tam alterativa, volatilia aromatica, quam evacuantia repetitis vicibus instituta sunt optima. *Alterativa* inter succinata, castoreata, cinnabarina, partes animalium ossea, & spir. urinosi, & horum ratione sem. sinapi ac eruc. sunt optima. Ut taceam cephalica & nervina aromatica ex compositione spirituum & varum apoplectica-rum & epilepticarum nota.

In specie tamen salvia & qualibet ejus remedia à pluribus laudantur. In sem. sinapi & eruca revera singularia latitant, ad præcavendam apoplexiam seminum. Hinc quidam manè jejuno stomacho gr. x. vel xj. sem. sinapi leviter masticata deglutiunt ad præcautionem

Vel R. Cardamom. ℥℔.

coriandr. ℥ij.

sinap. alb. ℥℔. pulverisentur & fumantur circa introitum lecti.

Alii idque commodius in forma electuarii usurpant:

R. Caricar. pingu. No. vj. incisæ adde

Sem. sinap. alb. f. eruc. ℥vj.

cardamom. ℥j. M. exactè

adde simul cochl. r. spir. lavendul. F. Electuar. De quo omni manè dosim juglandis magnit. cap. Adeo sanè ab omnibus laudatum præservativum in sinapi consistit. Hinc spir. sinapi cum vis apoplecticis misceri & ita subinde usurpari potest.

Notandum quoque & de cerasis nigris dulcibus, quod horum spir. mirificè laudetur



laudetur tam ad præservandam Epilepsiam, quam curandam & in specie linguam restituendam. Vid. *Kesleri processus. Spir. secundine hum. spir. sangu. hum.* ab *Hartm.* laudatissimus, *Spir. fuliginis, spir. bxi cum camph.* junctus optima remedia sunt; it. *cinnab. & ij, diaphor. Poter.* Hinc de specificis cephalicis pro præservatione capiendis res nova est, cum in genere quævis antepileptica etiam ferè ad apoplexiam laudentur.

*Evacuantia* inter eminet *℞. dulc.* cum vegetabilium *extractis* propinatus; hinc *sudorifera ex lignis* declinante paroxysmo aliquandiu continuata sunt maximè proficua. *Fonticuli* it. *setacea* egregiè conducunt senibus, & etiam familiari sunt in usu. Sed observa quod hæc in apoplexia *positiva* præcavenda, parum auxilii afferre soleant, benè autem in *privativa*. Unde dum observationes prostant *nunc* proficuum, *nunc* inanium horum remediorum, causa videtur esse non observata differentia apoplexiæ. Denique *salvatio* in declinante apoplexia pro eradicando morbo non ineptè à *Barbette* in praxi proponitur, & à *Deckero* in *Comm.* commendatur, p. 21.

*Apoplexia terminatur vel ad salutem* ægri, remotâ & correctâ causâ proximâ, *vel ad mortem*, cessante tandem cordis motu pulsatorio, unde suffocati intereunt ægri; *vel denique ex universali in particularem* transit apoplexia, *nunc* pauciora, *nunc* plura occupantem membra, adeoque *nunc Hemiplegia*, *nunc Paraplegia* fiunt.

## PARAPLEGIAE

hæc nunc *Apoplexiam* sequuntur, sicque *morbus secundarius* sunt, nunc vero *per se* inchoant, sine præcedente apoplexia, utut plus minus alios morbos sequantur, suntque *apoplexiæ particulares*. Notabilis est permutatio ista *Foresti* l. 10. obs. 80. de apoplexia mutatâ in paralyfin (rectius in paraplegiam) deinde in epilepsiam, & ex ea denuò in apoplexiam lethalem. Sane *apoplexiæ* & hinc natæ *paraplegia* ac epilepsiæ singularem habent & mutuam convenientiam & quasi in radice identitatem. *In modo fiendi* saltem aut affligendi *differviunt*; hinc & permutatio mutua eorum & quoq; in cura remediorum identitas. Hinc certè *Gorraus* in *defn. Med.* inquit, paraplegiam signare *Hippocrati* paralyfin, quæ apoplexiæ vel epilepsiæ succedit. Non enim rarum est, epilepsias in paraplegias mutari & contra. Sic epilepsiam, quæ in paralyfin totius ferè corporis

corporis exce  
notat *Hildebr*  
lepiam ex ter  
iisse, nihilomi  
& *Curat. l. 1.*  
vat, quæ post  
2. obs. 41. not  
epilepticos.  
mutuo paraly  
4. obs. 3. dum  
pèrechialian  
mutu aliquid  
Cent. 1. ubi  
quasi paraly  
convulsionem  
lem observat  
sphaula in a  
paraplegia, q  
tur, vulgo pa  
Practici: O  
propriè loqu  
bus seu par  
ne, qui ordi  
tiam & Pra  
quant affec  
superstite fer  
lore. 3. *Isti*  
solet ejusden  
Quo  
accusant, q  
tim non in  
partium re  
est, quod g  
niant, ita in  
*Quercetan*  
nes & epile  
2. obs. 45.  
insecuta fu  
Para



corporis excepto brachio dextro abiit, in qua sensus, ablatò motu, perierunt, notat *Hildesheim in Specileg. de affect. cap. c. 7.* It. *Schenckius in obs.* refert, epilepsiam ex terrore contractam post biennium in paraplegiam alteri<sup>9</sup> lateris transiisse, nihilominus singulis mensibus circa novilunium affligens. It. *Fontan. Resp. & Curat. l. i. p. 32.* Paraplegiam oculi sinistri post epilepsiam in gravida observat, quæ post partum gemellorum mortuorum apoplectica interiit. *Horstius l. 2. obs. 41.* notat ex epilepsia paraplegiam lateris dextri, & hinc denuò insultus epilepticos. Pertinet huc notabilis observatio *Ann. 6. M. A. N. G.* ubi mutuo paralytis & epilepsia se exceperunt. Item confirmat hæc *Bartholin. Cent. 4. obs. 3.* dum paraplegiam lateris sinistri & convulsionem lateris dextri in febre petechiali annotat. Sanè non secus in *apoplexia & paraplegia*, quam epilepsia simul aliquid convulsi<sup>9</sup> subesse videtur. Notabilis hîc est *Hildani observatio 4. Cent. 1.* ubi ex solâ nervuli in aure irritatione, ob immissum globulum, stupores quasi paralytici, dolores & atrophia brachii istius lateris ac tandem epilepticæ convulsionem. *Ex irritatione ista*, quid aliud quam *spasmus* fieri potuit? Similem observationem de dolore & stupore cum eiusdem atrophia ex corallina sphaerula in aurem illapsa refert *Schenck. in obs. ubi de aurium morbis.* Hujusmodi paraplegia, quæ apoplexiam, epilepsiam, aliosque morbos immediatè sequuntur, vulgo *paralytes* vocantur & hoc nomine tractant Theoriam earum ac Praxin Practici: Omnium loco sufficiat *Willis de anim. brutor. part. 2. c. 9.* cum tamen propriè loquendo paralytis longè alius affectus sit ab his apoplexiis particularibus seu paraplegiis, ut infra monebitur. *Probè hoc observetur in Autorum lectione*, qui ordinariè paralytes & paraplegiam confundunt, unaque methodo Theoriam & Praxin tractant. In paraplegia, seu apoplexiam, seu alium similem sequatur affectum, *3. gradus* sunt *distinguendi.* 1. *Motus solum deficit*, superstitè sensu. 2. *Sensus & motus deficiunt*, restitante tamen adhuc partis calore. 3. *Istis deficientibus* pars simul continuò frigida percipitur, quam insequi solet ejusdem *stacciditas* notabilis, & hinc *marasmus*.

Quoad *causas paraplegia*, communiter *obstructionem nervorum* accusant, quæ tamen nec cum modo fiendi, nec cum cura bene convenit. Saltem non *universalis causa* hæc esse videtur, siquidem & *per consensum* aliarum partium remotarum paraplegiam fieri observatum fuit. Nempe sicut notum est, quod graviore *passiones hystericas* subinde epilepticæ convulsionem superveniant, ita iisdem *paralytes & hemiplexias* supervenisse observatum fuit, in specie à *Quercetano in Tetrade gravissimorum affectuum.* Item *Lumbrici* uti convulsionem & epilepsias excitant, ita etiam ad paralytes terminantur, teste *Salmuth Cent. 2. obs. 45.* Hinc etiam apoplexiam paraplegia lateris sinistri & convulsio dextra insectæ fuerunt. *Vid. Schenck. in obs.* Ut taceam paraplecticos desperatos quosdam



dam subinde ex graviore animi pathemate, ita vel terrore ex improvise curatos fuisse, autore *Horstio l. II. obs. 15.* adeoque

Paraplegia ista pro fiendi ratione nunc *privativa*, nunc *positiva* esse videntur, & in his positivis aliquid convulsivi omnino intercedere, dicta modo ratio, & cum affectibus convulsivis facile permutationes omnino persuadent. Sed cum in specie apoplexias non lethales ferè ordinariò insequantur paraplegia, hujus *permutationis ratio* est inquirenda: Equidem *apoplexiam sanguineam universalem*, quæ ex sanguinis extravasatione evenit, ut plurimum lethalem esse existimo. Alia *sanguinea privativa*, quæ tantum ex motu sanguinis intercepto in vasis cerebri oritur, si universalis sit, quomodo in paraplegiam transeat, sanè obscurissimum, nisi forsan V. S. largior sanguinis motum promovendo, saltem alterius cerebri lateris affectum *particularem* reddat, qui ante *universalis* erat, ita ut saltem in altera cerebri medietate, aut saltem circa nervorum exortum & sanguinis consistentis & turgescientium inde vasorum vitio paraplegia oriantur: Imò si *apoplexia privativa sanguinea paraplegia supervenerit*, probabile est ex sanguine congrumato aut subistente plus minus laticem aquosum fecisse secessum, & vel interius profundius penetrasse per cerebrum in caudicem medullarem, vel exterius defluisse, secundum situationem spinalis medullæ & ita unius alteriusve nervi læsione vel oppensione paraplegiam intulisse in *privativa & lymphatica*, aut huic cognata, si unquam observetur, *pituitosa apoplexia*; unde lymphæ materiæve peccantis in caudicem medullarem interiora versus progressus, adeoque obstructions, vel ejus secundum radicem spinalis medullæ defluxus & certis in locis compressio paraplegiam inferre potest, ut satis plausibile videtur. Imò forsan aliqualis irruatio contractioni fibrarum & membranarum circa principium nervorum originem subministrare & hinc sufficientem spirituum influxum impedire poterit.

*Positivam apoplexiam etiam excipere paraplegiam*, res nota est, sed *modus* est admodum oblitus. Esse tunc paraplegiam *contracturam partium nervosarum* circa radicem spinalis medullæ, quæ impediuntur spirituum pro motu transitus, ut *Helmont* asserit, non improbable est; sed *quomodo fiat*, revera intricatum; interim tamen sicut calculus in rene subinde crus istius lateris stupidum & semiparalyticum reddit, aut quando colicam intestinorum convulsivam ex improvise, vel crurum paralytis, aut hemiplegia insequuntur, si causa materialis communicetur ex simplici partium nervosarum concursu; ita similiter probabile est, per consensum nervorum, eorumque fibras circa sui radicem in caudice medullari, aut in hujus progressu contractas, spirituum sufficientem pro motu impediri influxum, sicque partes, ad quas isti nervi distribuuntur, sensu & motu plus

plus minus priv  
& convulsivum

Quoad p  
vior tamen & c  
est ultimus. S  
aut doloris mol  
bri paralytici d

Quoad  
nita fuerunt, et

at a sunt ead  
paraplegia est  
dum vita cur

lo colocyntidis

enda venit, no  
instituere, nil  
male succeder  
propinandum  
quæ sequitur  
cum habet in

etoria, nu  
bique vero V.  
nis excretio fu

His & f

tur sudori

Poter. cinnam

quor CC. succ

usu habuit

minante cur

cum d. 10 &

in specie Cen

adulto affect

d. M. pro 2

bilis excreta



plus minus privari. Ex hoc enim permutationis ratio effectuum paralyticorum & convulsivorum & earum identitas optimè explicari possunt.

Quoad *prognosin*: Paraplegia quævis malum difficile est curatu. *Le-vior* tamen & curatu facilior est *primus gradus*, gravissimus & contumacissimus est *ultimus*. Si *parti paralytica vel tremor superveniat*, aut fornicationis sensus, aut doloris molestia, bonum signum est pro restitutione. Quò magis calor mem-bri paralytici deficit, eò minor spes superest.

Quoad *curam*: Eadem ferè, quæ in apoplexia universali curanda mo-nita fuerunt, etiam in paraplegia observanda. *Remedia* verò ipsa *appropri-ata* sunt eadem quæ *epilepsia* aut *apoplexia* medentur. *Vomitus* in quavis paraplegia est optimus, & quidem forte necesse est *vomitorium*; quem in finem *Æium vita* cum *scammon*. adhibet *Hartm.* sicuti inter *purgantia* pro stimu-lo *colocynthis* usurpanda. Subinde etiam *V. S.* sed in latere opposito institu-enda venit, non tamen semper æquè necessaria est. *Lindani* verba sunt: *V. S.* “instituere, nisi plethora adsit, magis jugulat, & puto ideò multas curationes “malè succedere, quod in principio sanguinem mittimus, statim vomitorium “propinandum idque ab initio. Adeoque *vomitória* imprimis in paraplegia, “quæ sequitur apoplexiam positivam conveniunt. Sicuti *V. S.* magis lo-cum habet in eâ, quæ sequitur privativam, ubi etiam *fonticuli*, it. *vesi-catoria*, nuchæ admota, & *cucurbitule* intra scapulas conveniunt. Utro-bique vero *V. S.* adhibenda in *plethoricis*, aut in quibus solennis quædam sangui-nis excretio suppressa fuerit.

His & similibus præmissis inter *remedia interna* præ cæteris laudan-tur *sudorifera*, tam generalia illa *ex lignis*, quam in specie *⊙ diaphoret.* *Poter. cinnab.* *Æij*, *coralliatæ*, *cranium hum. it.* *bia volatilia*, *spir. sangu. hum. li-quor CC. succin.* hæc omnia sunt præstantia. *⊙ diaphor.* certè in frequentissimo usu habuit *Poterius* & elegantes curas in paralyticis præstitit: Paravit ex *⊙ ful-minante* cum *dupl. flor. sulph. fixat.* & cum *spir. anisato* digesto. Sicuti alias idem cum *Æio* *Æij* præparavit nobiliori modo & effectū *vid. Pharm. Spagy.* in fine & in specie *Cent. 2. obs. cap. 66. 87.* & *Cent. 3. c. 14. Cent. 1. c. 73.* Aliquando viro adulto affectu quasi paralytico correpto dedi *conserv. flor. tunicar.* *℥j.* *⊙ diaph.* *℥j. M.* pro 2. dof. Prima dosis cum blando sodore tormina abdominis & mira-bilia excreta excitavit, altera vice verò copiosum sudorem emanare fecit cum



euphoria. Alias decocta sudorifera ex lignis, interpositis huiusmodi appropriatis sunt optima. Speciatim decoctum ligni sassafras est egregium, ex quo & bacca lauri paratum decoctum efficaciter paralyticum restituit. Vid. Poter. Cent. 2. obs. 26. it. decoctum sassafr. cum rosmarin. inprimis convenit, quod singulare quid obtinet in huiusmodi nervorum affectibus. Item helenium, ejusque rad. di-  
 ctis decoctis additum, bene convenit. v. g.

℞. Rasur. ligni sassafr. ℥ij.  
 herb. rosmar. recent. Mj.  
 baccar. lauri ℥ij.

coq. in ∇. & vino an. ℔jβ. in cucurbita suo alembico munita, decoctum & de-  
 stillatum M. adde

spir. juniper. ℥jv.

℔xi ℥ij.

syr. flor tunic. ℥ij. M.

Cum his internis optimè externa vertici, aut regioni spinæ dorsi, aut in para-  
 plegia in specie sic dicta, saltim loco, unde exoritur nervus partis affectæ illinen-  
 da conveniunt: Ol. destill. succin, lavend spica. Galbanet. Paracels. optimum  
 est. It. S. V. camphoratuster quotidie in loco calido bene affricando parti pa-  
 raplecticæ. Conveniunt it. essentia ex infusis nervinorum, vel ∇. articularis ad  
 exira cum essent. castorei, extracta cum ∇. spir. usque li. convall. cum vino, pro  
 frictione spinæ dorsi est egregia. His ipsis spirituosus aquis & b. volatilia, in spe-  
 cie spir. Es b. volatil. lumbric. terrestr. ac formicarum addi possent. Quod si spina  
 dorsi probè his ipsis perfricata fuerit, applicandum desuper linteum cum guram.  
 anima probè suffumigatum atq; calidum; vel præmissis cum ∇. spirituosus fricti-  
 onib; istis, olea supra laudata desuper illinenda sunt, ut apertis his mediis poris pe-  
 netrantioris efficacix sint hæc ipsa, quibus etiam ol. tarrari vel ex pinguedinibus  
 aut partibus animalium destillata & rectificando super ossa calcinata à fœtore  
 liberata addi possunt. Illinuntur hæc olea nun. ita simpliciter, nunc ubi nimis  
 acris fuerint, parvasque pustulas excitent, subigenda sunt vel cum pinguedine  
 humana vel miscenda cum ol. lumbric. terr. per decoctionem & ita illinenda. Ipsa  
 membra paralytica ita illinere superfluum videtur, cum malum in illis non hæreat,  
 sed ipsa saltim passivè se habeant. Nihilominus tamen cum huiusmodi frictio-  
 nibus & litibus asperis, calidis ac penetrantibus irritentur partes sensiles, &  
 huius medio provocetur plus minus spirituum impetus, propterea & ipsas partes  
 ita resolutas his modis tractare consuetum est, & propter hunc finem solent  
 Oplum tam crudum, quam, quod præstat, secundum Wurzium præparatum  
 dictis litibus addere. Balnea denique ex formicis seu stusse sicca, revera singulare  
 quid obtinent in paraplegiis curandis. Conf. M. A. N. C. Ann. 4. p. 137. c. g.



2. Spir. vin. Camph. ℥ij.  
 Spir. lumbrie. terrestr. ℥ij.  
 Essent. castor. ℥vj. M.  
 3. Liquor. lumbrie. terrestr. in cliban. parat. ℥ij.  
 ol. destil. spica.  
 junip. an. ℥ij.  
 lavend.  
 majoran. an. ℥ij.  
 succin. Dij. addi etiam potest.

O plumei Dj. M.

Partibus affricetur, hinc bals. seu ol. inungatur, quibus & desuper subinde circa locum affectum *emplastrum ex nervinis & aromaticis* imponi potest. Pro *△is* *articularibus ad extra*, quidam

2. Sem. sinap. p. r.

baec. junip. ℥ij. contusa infundantur in spir. vin. eundemq; imprægnatum partibus affricant, pro quo scopo & iptum magma simpliciter adhiberi potest. Alia plura remedia contra paraplegiam vid. in *M. A. N. C. Ann.* 6. Append. 44.

Cognatum Paraplegia malum est

## PARALYSIS,

utut vulgò erroneè confundantur. Nam *Paraplegia* sunt *apoplexia parietales*; *Paralyses* vero sunt resolutiones membrorum tales, in quibus primariò motus deficit, superstitè plus minus sensu. *Stupor* è contra est affectus, in quo deficiente in partibus sensu superest motus. Græcis *ἀναισθησία* dictus, quæ tria mirum invicem confunduntur. Genuino sensu *Paralysis* apud Priscos propriè significabat resolutionem nervorum à *ῥεξις*, resolvo, idque inprimis interprete Celso, hoc in puncto accurato. *Nervus* enim, Græcis *νεῦρον*, ab ipso dicitur vel tendo musculorum vel ipsam ligamentum, quo nectuntur artus. Id vero quod hodie vocamus *nervum*, Prisci generali nomine *venarum* complexi fuerunt.

*Paralysis* igitur ex genuino sensu erit *resolutio & relaxatio* istius constructionis, quam debet habere nervus, seu tendo & ligamentum, quibus mediantibus connectuntur & proximè moventur artus, quæ ipsa instrumenta quando sunt laxiora, non possunt movere istas partes. *Talis affectus est*, quem describit *Bontius in sua Medicina Indorum* sub nomine *Boriberi*. Conf. etiam *Tulp. obs.* 1. 4. c. 5. item *Act. Med. Hafn.* vol. 4. p. 145. Est nempe hic affectus *genuina Veterum*



rum *Paralyfis*, seu universum corpus, seu certas saltem partes occupet. Nempe cessat primario motus in membro paralytico, sensu plus minus superstitite. malumque est in ipsa parte affecta, minus vero in nervo. Quod si *paralyfis*, quæ fit motu læso, est levior, ita ut remaneat sensus tactus, vocatur *paresis*, qualis est ista, quæ imprimis scorbuticos affligit, aut post colicam accidit. Quando vero sensus & motus unà pereunt, dicitur *paralyfis*, gravior scilicet species. Quomodo autem sensus superesse possit, motu deficiente, licet uterque ab eodem prodeat principio, optimè declarare videtur Willis de anim. brut. p. 2. p. 280.

Ex dictis patet, quod propriè *paralyfis* sit ἀρρωία fibrarum nervearum & musculorum præcipuè in tendinibus & ligamentis, quæ propter ἀρρωίαν resolutæ ineptæ sunt, ut convenienti robore membrum firmare possint, qui levior affectus dicitur *paresis*. Hæc vulgo dicitur *paralyfis notha*, sed ex falsa hypothese, quia putant paralyfin oriri ex obstructione nervorum, & insequi apoplexiam, qualis obstructio, cum non sit obvia in paresi, propterea eam *paralyfin notham* indignant.

Facilis aliàs est *distinctio* inter *paralyfin* & *paraplegiam*. Nam differunt I. origine: Nam *Paraplegia* sequitur imprimis cerebri & spinæ morbos & frequentissimè comitatur Apoplexiam, Epilepsiam, Convulsiones &c. cum dicti affectus subinde sint mutuò permutabiles. *Paralyfis* vero sequitur imprimis scorbutum, aut colicam convulsivam: Frequentior est regionibus, in quibus copiosum vinum bibitur. Item causis externis subinde supervenit. II. *Subjecto*: Nam in *paraplegia* primario nervi, in *paralyfi* imprimis afficiuntur tendines & musculi. Hinc medicamentorum topicorum diversa in utroque affectu applicandi ratio, quæ in *paraplegia* magis origini nervorum partis affectæ, in *paralyfi* ipsi parti affectæ applicanda. III. *Symptomatibus*: Nam in legitima *paraplegia* sensus tactus ut plurimum cum motu tollitur, in *paralyfi* vero plerumque sensus tactus superest, quandoque etiam cum sensu doloroso tantummodo motus tollitur. IV. *Paraplegia* à principio ferè ad finem eodem habitu est constans & quodammodo perpetua & ut plurimum medicorum manus fallit. *Paralyfin* vero & *Paresin* constat sæpius per intervalla ægros vexare, cessare, redire, quandoque cum arthriticis quasi doloribus complicari, quin & interdum in convulsiones abire, nisi in malo confirmato pertinacem contracturam post se trahant. Adeoque in *paralyfi* motus perit, seposito ut plurimum sensu. Rarissimus è contra est affectus, ut pereunte sensu remaneat motus & tunc malè quoque ad *paralyfes* refertur, cum tamen ἀναισθησία sit, seu insensibilitas

tas, aliis stupor docet. Boyle  
toto corpore  
sana, suavit. M.  
exemplum per  
nam sub lingu  
adhuc incertu  
paraplegia ce  
ne cum oleo  
& stuporem  
Chym. edit. 2.

Rede

nel positiv  
etiam pertine  
fit obstructio,  
variolas aut  
causa privati  
confusione in  
nera dissecan  
casu ab alio.  
unde paral  
vertebra cox  
capitis excita  
ardore decid  
autore Barthe  
mortem ex c  
nurg. obs. 10.  
M. A. N. C.  
paralyfin in  
post paraly

Po

five ejus ca  
figeratio n  
more morā  
obervata fi  
tis, qui dicit  
permittunt,



ras, aliis stupor dicta. Sunt, qui hoc negant. Practicorum tamen experientia aliud docet. Boyle de usu Phil. experim. p. 2. p. 73. refert historiam de virgine in cujus toto corpore sensus tactus fuit abolitus, ipsa, quoad externas functiones omnes sana, suasu Medici per repetitum exercitium & eum curata. Curiosissimum est exemplum perfectæ ἀναισθησίας in toto corpore cum ἀσπληνία quæ per sectam venam sub lingua curata in M. A. N. C. Ann. 3. p. 454. Quomodo negotiū hoc fiat, adhuc incertum est, in cura tamen præter decoctum lign. sassafr. & quælibet ejus præparata seu appropriata laudantur à Brunnero Cons. 28. p. 162. Elixir Galbaneti cum oleo juniper. sicut fl. hyperic. essentia cum fructu usus est Hillerus Cur. 83. & stuporem cruris usu externo spir. vin. rectificatissimi curavit Tachen. Hippocr. Chym. edit. 2. p. 147.

Redeo ad Paralyſin & Paresin, cujus causas etiam sunt vel privativa, vel positiva. Illæ in nervorum dissolutione & compressione consistunt; quod etiam pertinet, quando nervorum particularium per μείσασιν causa morbifica fit obstructio, aut compressio, aut alia nondum satis cognita alteratio. Ut quando variolas aut erysipelas faciei repulsum sequuntur paralyſes, quæ tamen omnes à causa privativa excitata paralyſes, revera potius paraplegiæ sunt, hodie consuetâ confusione invicem confusæ. Hinc etiam ad paralyſin referunt, quando per vulnera dissecantur nervi, aut quando sunt compressi aut distorti in luxationibus, aut casu ab alto. His enim modis denegatur spiritibus animalibus debitus influxus, unde paraplegiæ potius, quam paralyſes. Sic Höferus Herc. Med. p. 9. ex luxata vertebra coxæ proxima, paralyſin partium inferiorum notant. Sic percussiones capitis excitant paralyſin vel potius paraplegiam in opposito latere. Hinc quidā ex arbore decidens ob contusionem in osse sacro, paralyſin dictam pedum incurrit, autore Bartholin. Cent. 5. obs. 8. Similiter paralyſin sinistri lateris, convulsionem & mortem ex contusione musculi temporalis à lapsu notavit Glandorp. specul. Chirurg. obs. 10. Quod pertinet gibbus paralyſin sensum inducens, cujus cura vid. in M. A. N. C. Ann. 2. p. 333. Sed hæc ipsa modo allegata potius paraplegiam, quam paralyſin inducunt, non secus ac quando à varis faciei repulsis primo arthritis, post paralyſis & brevi mors secuta fuit, notante Salmuth Cent. 2. obs. 35.

Positiva igitur paralyſis est, quæ propriè paralyſin constituit, siue ejus causa sit externa, siue interna. Externas inter humectatio & refrigeratio nimia, indeque nata resolutio tendinum & fibrarum. Hinc ex diuturniore morâ in ∇ frigida pluviosa, item ex frequenti natatione in frigida paralyſes observata fuerunt. Vid. Zacut. Lusitan. l. 1. prax. admir. obs. 34. & 37. Hinc etiam iis, qui diutius in pluvia versantur & vestimenta madida super corpus exiccari permittunt, in uno alterove membro paralytici evadere solent, qualia exempla vid.



vid. in *Horstii observ.* De torpedine pisce res nota est, quod sub tactu stuporem & paralyfin inferat, de quo ipso accuratam Anatomen edidit *Stephan. Florenzin.* ubi observat in certo quodam corporis ejus loco saltim residere vim istam, unde emissæ effluvia torporem inducant. Præter quam torpedinem etiam certa conchylum species noviter reperta fuit, quæ & ipsa sui tactu stuporem paralyticum induxit, teste *Kirchero in regno naturæ magnet. sect. 4. c. 4. p. 182.* Denique Quis, ut insensibilissimus est partibus nerveis, ita *Orisabri*, item qui specula inargentant, subinde paralyfin contrahunt. *Vid. Forest. l. 8. obs. 5.* Hinc etiam illi, qui in fodinis Quis Friulienfibus laborant. *Vid. Acta Societ. Reg. volum. 1. p. 18.* Suppressio consuetorum excernendorum itidem ad paralyfin disponit, in specie sanguis suppressus; sic mulier ob suppressa lochia post partum paralyfi crurum & febre ardente correpta, sectâ venâ in talo curata. *Zacut. Lusit. l. 1. prax. admir. obs. 35.* Sic ex suppressa hæmorrhagia narium paralyfin lateris dextri notat *Bartholin. Cent. 4. obs. 69.* Nempe non rarum est. V. S. adfectos, si eam intermittant, torporem quandam & lassitudinem quasi paralyticam in uno alterove membro percipere, non nisi sanguinis missione solvendam. Affectus denique animi graviores & ipsi paralyfin inferunt. Sic ex subita consternatione natam paralyfin vid. in *M. A. N. C. Ann. 4. p. 14.* non secus ac ex nimio mœrore & inedia paralyfin natam refert *Zacut. Lusit. l. 1. Med. Princ. Hist. 46.* Quæ ipsæ paralytes non tam ad positivas quam privativas pertinere videntur. In specie paralyfin positivâ infert, idque ex causa interna *acidum volatile* seu *spirituosum*, haud tamen adeo acre, sed ferè *austerum*, nunc feri, nunc forsan ipsius spiritus influi vehiculo ad partem quandam nerveam delatum, cujus occasione fibræ unius alteriusve tendinis aut musculi affici ac quasi nonnihil intorqueri aut corrugari videntur, unde motus defectus cum sensu plus minus deficiente, aut saltim aliquali stupore juncto.

Talis est contumacissima illa *paralyfis*, quæ *ex vino*, quæ *ex scorbuto* & hinc quæ *ex colica* oritur. Notum est in quibusdam regionibus *vini potatores* subinde reddi paralyticos cum partis nunc stupore, nunc partis quodâ sensu verminante & obscurè lancinante; & hujusmodi paralyfibus inveteratis, tandem membri contractura supervenit, affectus, qui ex *acido volatili austero* derivari potest, cum notum sit, acida corrugare plus minus partes nerveas, adeoque in his casibus vel tonus naturalis fibrarum solvitur vel corrugatio plus minus naturalis inducitur. *Observantur tales frequenter in Austria, Moravia*, ex potu vini istius loci. Sicuti alias quælibet *vina præmaturè sulphurata*, quæ minus sub fermentationis debita absolutione sulphur & feculentias potuerunt præcipitare & sulphur narcoticum exhalare, ad hujusmodi para-

paralyfin disponit  
stomacho non  
volas partes, ubi  
fus vel defectus  
magis volatilis  
tum infecit, p  
renum *lubiafin*  
tractura lactien  
hanc disponen

Scorb

planè singulari  
insensibilitas cu  
clari tonus m  
vaga vel minu  
altero pejus ha  
nunc digiti, au  
tunc unus alte  
rimum, aut sal  
mum vago, ra  
sunt, sed itant  
re possunt;  
*scorb. sect. 3.*  
fibras diversim  
infert, ita ut h  
eos & convuls  
scorbaticis me  
lysi affectum i  
num vel acide

Par est

istam quæ est  
alias à Practi  
ciora & con  
exasperatur  
tur, quod im  
vite videatur  
subit motus  
recte conside  
nalis materi  
Pars



paralyfin disponunt. Nempe *acidum* est *volatile* nonnihil *austum*, quod in stomacho non rite correctum pergit ad membra & partes extimas & extra nervosas partes, fibras, tendines & ligamenta defigitur, adeo ut pereunte motu sensus vel defectuosus vel vitiosus remaneat, donec & hic deinde pereat. *Quod si magis volatilifatum*, adeoq; & spirituosius vinum fuerit, ac *synoviam* articulorum infecerit, *podagram* infert, aut inficiendo spiritum insitum, aut fermentum renum *lukiasin*. Unde præmissis præmittendis *paralyfes* tales & hinc nata contracturae *lactini* usu inter alia optimè curantur. Vide de vino ad paralyfin hanc disponente *M. A. N. C. Ann. 2. p. 70.*

*Scorbutus* frequenter huiusmodi *paralyfin* inferre solet, eamque planè singularem: *Sensim* incipit & procedit & primo saltem vagus stupor aut insensibilitas cum fornicationis sensu partem prehendit, unde successivè labefactari tonus membri & magis magisque paralyticus reddi incipit. *Est autem vaga* vel minus constans nisi nimis inveterata fuerit, ita ut æger uno die melius in altero pejus habeat, uno die ferè incedere, altero die decumbere cogatur. Hinc nunc digiti, aut manus, aut pedum intumescere, nunc detumescere observantur; nunc unus alterve digitus stupeat, qui brevi melius se habet. *Sensus manet plurimum*, aut saltem aliquis stupor inducitur; subinde cum dolore gravi ut plurimum vago, raro, fixo, juncta est; jacentes ferè commodè membra movere possunt, sed stantes vix denudè pergere, nec absque dolore aut stuporis sensu incedere possunt; sicuti hunc ipsum affectum omnium optimè delineat *Dravvitz de scorbut. sect. 3.* Sanè *acidum volatile austum* est, quod hic peccat, quod nerveas fibras diversimode afficiendo nunc aliquid convulsivi, nunc aliquid paralytici infert, ita ut huiusmodi paralyfis quasi medium quid sit inter morbos paralyticos & convulsivos in specie sic dictos. Unde non rarum est, ut in talibus ægris scorbuticis membrum nunc spasmò contractum rigidum reddatur, nunc paralyti affectum idem flaccescat & plus minus stupeat, prout nervi vel fibræ tendinum vel acido irritantur, vel austro intorquentur.

Par est ratio istius *paralyseos*, quæ insequitur *colicam* & quidem istam quæ est magis *habitualis* & quæ vulgò à tenui acri humore oriri dicitur & aliàs à Practicis *colica biliosa* vocatur. Alvus est pertinaciter clausa, tormina atrociora & contumacissima vexant, purgantibus quibusvis per os assumtis maxime exasperatur malum, umbilicus interiora versus retrahitur, *Quod si vel male tractetur*, quod imprimis fit, si iretur acrioribus aut purgantibus aut plus minus defævire videatur, successivè unus alteriusve aut plurium membrorum stupor, hinc subitè motus impotentia, tandem perfecta paralyfis supervenit. Si negotium hoc rectè consideretur, revera est *colica* ratione modi convulsiva, ratione causæ occasio-  
nalis materialis *scorbutica*; ridus verò & fomes in plexibus mesenterii nerveis est:



*Acidum austerum* imprimis *scorbuticum* est, quod has turbas dat in abdomine. *Dubium* saltem est, quomodo colicam talem paralyfis artuum insequatur, cum interdum subito atque cessat dolor, membra observentur paralytica. Nempe in principio mali paralytici saltem convulsivi quid subest, unde spirituum interrupto influxu stupor & aliqualis insultus paralyticus supervenit. Hinc colica talis in paralyfin, subinde in convulsionem, subinde in arthricos dolores in principio mutationis suæ terminatur, donec ipsum acidum volatile circa mesenterii plexus resolutum, materialiter partes istas ita malè affectas attingens, perfectam paralyfin & tandem ex fibrarum tendinosarum congregatione contracturam efficiat. Nempe sicut renum calculum stupor crurum non raro comitatur, ita & hoc malum non nihil remittens, ex simplici consensu unius alteriusve membri ex nervi spasmò & spirituum interrupto motu paralytica dispositio insequitur, donec malo inveterato ipsum quasi περ πωτον αδειαν fiat, quod quoad originem, saltem per δευτερον αδειαν erat. De cetero par ferè huius cum paralyfi scorbutica videtur esse ratio.

Quoad prognosin, qualibet paralyfis curatu est difficilis, eò magis, quò magis inveterata est, unde partes contractæ. Quò magis vagum est malum, eò major curationis spes, quo plus de sensu superest, eo melius.

In cura observanda diversitas affectionum, eorumque origines, quæ paralyfes uno nomine dicuntur. Adeoque in genere 1. causa corrigenda & removenda. 2. Appropriatis & in specie nervinis aromaticis ac volatilibus partium nervosarum tonus restituendus & roborandus.

In privativa igitur paralyfi, plus minus paraplegiis cognata, si ex causis internis, præsertim ex metastasi materiæ morbificæ oriatur, eodè modo agri curandi sunt, ac de paraplegiis monitum. In quem finem sudorifera moderato usu sunt optima; quin & in malo contumaciori nil obstat, quo minus salivatio instituat, de quâ vid. imprimis Willis de anim. brut. P. 2. p. 9. Sin vero à vitio externo, contusione, luxatione &c. malum ortum fuerit, conveniunt in genere litus ex aromaticis & nervinis, in specie bals. peruv. balsamus paralyticus, Myns. emplastrum nervinum cum tacamahaca mistum. In specie internæ & externæ ol. destill. lavendule. Litus cum petroleo, vel solo, vel ol. juniperino non nihil acuat hic est egregius. Quod si oriatur paralyfis membri ex humectatione & relaxatione tendinum ac ligamentorum, seu à causa interna seu externa oriatur, convenit in specie tunc ol. terra cum axung. human. & asferina mistum & parti affectæ illitum. Item empl. ex tacamahaca & galbano, cum ol. destill. succin. & Philosoph. malaxat, & circa articulos applicatum; item si eò usque procedat malum, ut ligamenta



menta ita quoque reſoluta paralyſin aut relaxationem ferè membri inferant, con-  
fert *Empl. ſtiſticum Crolli cum ol. Philoſoph. & terra malaxatum*. Integne cum  
*theriaca* ſudor crebrius provocetur. Sed de his affectibus vid. imprimis *Barbette*  
in *Anat. Pract. c. 5. & 10. Sin à ſiali veneno* malum ortum fuerit, convenit in pri-  
mis decoctum *fenic. et helenii*, ſupra ubi de tremore laudatum. Sicuti ubi per ſu-  
doreſ *venena ſialia* ſufficienter excluſa fuerint, *lac. & ſerum lactis* commodè  
propinari poſſunt. Sic enim *Höſer. Hercul. Med. p. 9.* paralyſin ex ſumis metalli-  
cis in *ſfabro per ſerum lactis* curatam refert. *Sin excretionis cum ſedam ſuppreſſio*  
paralyſin inferit *V. S.* & hinc ſudor conveniunt. Quodſi acidum volatile fuerit,  
quod in ſpecie paralyſin inferat, obſervandum erit, quod in tali calu propter fo-  
mitem altius in ſanguine vel primis viis radicum, præter ſpecielem paralyſeos  
curam ſimul præmiſſis debitis alterantibus aliſque appropriatis fomes iſte eradi-  
candus veniat, ſemper ad acidum auſterum plus minus volatile reſpiciendo. Pro-  
pterea quælibet fortiora purgantia ſedulo hic fugienda, quia ſi italia in prin-  
cipio adhibeantur, uno latere paralyſi tentatus, tandè in altero ſimul afficitur; ſal-  
tem *helieborinis* mitioribus iſſque partitis vicibus purgatio blanda inſtituenda ve-  
nit, id quod pariter in ſcorbuticis probè obſervandum venit. Imò ſi ſcorbuticis  
membrorum affectibus correptis, imprimis paralyticis fortiora propines purgan-  
tia, facillimè morbos convulſivos iſſdem conciliare poteris. Hujusmodi igitur  
in paralyticis affectibus conveniunt omnia epileptica & apoplectica fixa, uti ſunt  
*unicornerum verum, cinnab. & ii, diaph. & diaph. & al.* Hinc quælibet volatilia uri-  
noſa, in ſpecie *ſpir. tart. volatilis* & hinc *unctura bezoard. ſpir. & ſpir. lumbric. terr.*  
*ſpir. & d. volatile viper.* & hinc aromatica appropriata. *Rosmarinus, caſto-*  
*reum*, remedia ex lignis, *theriaca & extracta theriacalia* ac ſimilia. Iſtis præmiſſis  
ſimul diata temperata & probè nutritiva lactea inſtituatur, cum lac præmiſſis  
præmittendis ſit optimum in his, ne nervea loca ſucco ſuo blando defraudentur.

*Si ſcorbutus in reſeſſu ſit*, hæc ipſa quoque locum habent. Ob-  
ſervandum autem in ſpecie, quod juxta volatilia iſta urinoſa primatum obtineant  
*uriones pini & abietis*, præfertim cum *rad. chinæ* præparati, v. g.

*Rx.* Turion. abiet.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ .

rad. chinæ  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

incifa & contuſa coq in  $\nabla$  & cereviſ. ad medietat abſumptionem. Decoctum co-  
letur, bibatur bis quotidie, expectando præfertim manè blandum ſudorem. De-  
coctum *betonic. c. bacc. junip.* quoque laudatur. *Vid. Dravvix de ſcorbutico p. 167.*

Iſtis debite præmiſſis ſerum lactis cum antiſcorbuticis miſtum, & ipſum quoque  
lac egregium eſt, curamque abſolvit: Sed ut monui, neceſſe eſt, præmiſſa ſint uni-  
verſalia non tam laxantia, quam primò fixa abſorbentia, hinc volatilia, quibus  
præmiſſis tandem ad iſta appropriata acceditur, Quod



*Quod si denique colicam insequatur paralyfis*, cautius vel maxime fit Medicus in *purgantibus fortioribus*, cum ejusmodi colicæ exinde exasperentur & provocentur magis paralyfes & convulsiones. Nervus totius *cure* ad abdomen dirigendum, adeoque *clysmata lenientia & abstergentia*, it. ex lacte & terebinth. optima sunt. Quo frequentius injiciuntur, eò magis profunt & eò magis à paralyfi præservant. Hinc internè *sem. 4. calid. maj.* eorumque in fine decoctum, aut alia ex iisdem parata remedia teste *Helm.* sunt appropriata intestinorum solamina, quibus & adjungatur *Helenii decoctum*, præmissis præmittendis, ejusve *essentia* pro blando fudore propinatum. Decoctum mili, seu ut alias vocant Syrup. *Divi Ambrosii* mirabiliter laudatur in hujusmodi paralyfi ex colicâ per sudorē hanc ipsam removens. Quibus si *linnum sassafras* addatur, foret eò melius. Serum lactis cum *antiscurbuticis* & similibus medicamentum nobile est in hac colica & inde nata paralyfi. Hinc ceu summum appropriatum accense- tur *galbanetum Paracelsi*, tam simpliciter secundum modum *Harim.* paratum *Prax. Chym. c. 12. §. 8.* quam præstantius illud *Dravvix p. 193*: Hoc ipsum non solummodo umbilico inungitur frequenter, sed etiam ipso membro paralytico, si prius *spir. tartari*, aut *spir. b. ci vinoso* fuerit probè perfrictum, quod *galbanetum* hoc quotidie ter ungatur ad imit. *Harim. Prax. Chym. c. 13. §. 4.*

Observandum tamen quoad *externa*, hîc, *scorbutus* subsit, non semper hujusmodi calida acria convenire, quoniam interdum magis videntur exasperare malum. Potius igitur temperata prius tentanda, antequam ad acriora illa fiat accessus. Observandum quoque quoad *externa*, non semper convenire unguenta aut pingua poros cutis plus minus obstruentia, adeoque præstat interdum, uti *ussitibus, fomentis, lotionibus*. Adhæc quoad *externa* observandum est monitum *Quercet.* ut in administratione topicorum Medicus debeat expendere, an paralyfis sit ab humore *visco.* aut *pituitoso*, sero quocunque modo vitiat, & æger sit similis constitutionis, parsque paralytica prius intumuerit, quod tunc medicamenta subtilia, calida & penetrantia commodè adhiberi possint. Quod si verò sit constitutionis *biliosa* & pars affecta jam emarcescat & plus minus in atrophiam labatur, ab iis abstineat Medicus.

Inter *externa* igitur hæc, præter *galbanetum* modo laudatum & quodcum eo ferè coincidit, *oleum Divinisimum Fallopi* vid. *Velsch. Hecat. 2. p. 56. it. balsamum Paralyticum Myns.* Conveniunt etiam *de articulares ad extra dictæ*, Quarum loco omnium sit hæc formula:

℞. Fol. Nicotian.

origani.

sambuc. an. Mi.

rad.



rad. angelic.

pyrethr.

aron. an. ℥j.

euphorbii.

eastorei an. ℥vj.

piperis utriusque ℥iij.

flor. stœch. Arab.

lavend.

lilior. convall. an. ℥ß.

sem. erucæ ℥ß.

Concil. & contul. affund. S. V. digerantur, filtrentur, & hac ipsa essentia fricentur partes externæ paralyticæ. Vel abstrahatur ab iisdem S. V. aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicentur.

Notandum autem quod huiusmodi *externa* applicanda post provocatos sudores eorumque absterfionem, post aliqualem ægri requiem, dum porro adhuc sunt aperti, melius applicentur, quia promptius operantur. Porro *tinct. seu essentia succin. cum S. V. rectific.* parata, membris paralyticis contractis aut quomodocunque refrigeratis rite cum successu inungitur. Hisce commodè & *his volatilia* addi possent, v. g.

℞. ▽. Articular. ad ex. ℥iij.

spir. 6\*. c. calc. viv. ℥j.

lumbic. terrestr. per putr. ℥ß.

M. S. Eusserliches Gliedewasser.

Item *spir. tart. rectificatus* mistus cum duplo S. V. perquam egregius est in paralyfi ex colica. Pertinet huc *urin. hum.* quæ ratione *his volatilis* iidem pro membris laudatur paralyticis & hinc frictio membrorum cum *urin. pueri* calidâ. Vel secundum *Stöckerum in praxi*

℞. Urtic. maj. Mij.

chamom. Mj.

eumini ℥j.

his ℥iij.

pistentur omnia in mortario, decoq. in *urin. hum.* ad quartæ partis consumpt. & in tali balneetur membrum manè & serò; postea pannis ex decoctione madefactis involvatur de nocte & die; postea membrum cum *ol. vulpino* inungatur donec sanetur. Nempe *urtica & urticationes*, vetus jam sunt remedium, & conveniens tamen imprimis in paraplegiis. Hinc *Ferdinand. hist.* 46. dicit, quod *premissis urticationibus* optimum sit pungere corpus urticis & testor Deum, me hoc genere remedii pluries esse usum, & semper maximâ cum utilitate & felicitate



tate, & nunquam votis sum deceptus. Qui ferre possunt olea destillata, his eadem maxime sunt proficua, v. g. *juniperi, spicae, lavendulae*, it. *ol. destillata rectificata ex tartaro, lignis, Galbano &c.* quibus etiam adde *petroleum*, quod pariter est egregium. Hæc olea, *ol. nucis* excepta illinuntur & affricantur partibus affectis. Quibus vero acria ejusmodi non aequè conferunt, ut sit quibusdam scorbaticis, temperata magis conducunt, atque tunc inprimis convenit *pinguedo humana, viperina, castorina, anserina*. Hæc ipsa nunc solitaria, nunc cum *petroleo*, aut *ol. terra* & paucis oleis quodam destillato nonnihil acuta & bene calida, præmissa debita frictione applicari possunt, idque inprimis, quando atrophiam membri metuitur, tunc temperata talia magis conducunt, præsertim *pinguedo anserum aromatica* & ex iisdem assando prolicita est egregia v. g.

℞. Anserem masculum deplumatum, evisceratum & vino

lotum, hinc

thuris alb. mastich.

myrrh. an. ℥ij.

unguent. martiat. ℥vj.

Anser consuatur, & in veru debito modo asseretur, quod prodit abjicitur; subsequens vero *pinguedo* asservatur pro usu. Hinc liquoris istius cuilibet ℥j. addatur pulveris *verminum terrestrium* ℥j. & ita illinantur; Vel potius existis fiat pasta, destilletur lento Δe per retort. & habebitur oleum egregium pro unguentis paralyticis. Parili ratione venter *ciconia* impleri & hujusmodi linimentum elici potest. Non negligenda sunt in paralyticis affectibus *balnea ex formicis* it. *vinaceis*. Ista ex *formicis* revera egregia sunt in paraplegiis, it. in paralyfi ex resolutione & relaxatione tendinum ac ligamentorum. Hæc vero ex *vinaceis* nobilissima sunt in paralyfi scorbatica, paralyfi ex colica, aliisque ex acido vitioso natis: Siquidem horum usu & partis paralytica debito totu & infessu sensus motusque restituitur vid. *Borellum Cent. 4. obs. 42. Vinacea* asservantur, donec spontanea fermentatione incalescere incipiant, & ita iisdem membra aut partes paralyticae immergantur, quæ mediante sudore egregium levamen percipiunt. Si per se incalescere nolint, insperione cum *calce vivo* animari & ita repetitis vicibus usurpari possunt.

Quoad *formicas*, integrum eorum *cubile* sacco inclusum injicias aquæ ferventi, cujus vaporis excipiendo insideat æger in vanno probe recto. Sequenti die in dicta ▽. ebulliat iste sacculus, & ita denuò in vanno vaporem excipiat æger, idque bis vel ter, quamdiu penetrantem odorem spirant. Postmodum ac sequentibus diebus etiam insideat isti decocto semper cum sacco denuò calefacto, idque aliquot vicibus, donec melioratio percipiatur. Denique aliis ferè nil

juvan-

juvantibus ult  
paralyfibus  
tamen infitua  
neæ & paraly  
Willis cur. loc.

LÆSIO

Conside  
cerebr

accidunt, C

sum omniu

omnes reliq

æcus sunt;

& paralytic

iple interdum

eoque omni

seu per impr

impressus di

so, ut illud

objecti in

appellatur

lucis fulg

branæ in c

specie si fib

quod eas n

stui junctæ

Fibra

tantum quæ

fibrarum



juvantibus ultimum aſylum ſunt *therma*, magis tamen in paraplegiis, quam paralyſibus convenire videntur, ut utrinque proficiat ſint, cum diſcretione tamen inſtituantur, dum melius conducunt iis, qui conſtitutionis ſunt ſanguinea & *artica*, minus qui conſtitutionis bilioſa ſeu cholerica. De quo confer. *Willis cit. loc. prope finem.*

## CAPUT IX

DE

## LÆSIONIBUS SENSUUM EXTERNORUM,

in ſpecie de læſo TACTU, indeque orto  
DOLORE.

CONſideravimus affectus, qui ſpiritibus genitis & hinc eorum motui intra cerebrum ac cerebellum, ac denique eorundem influxui ad partes externas accidunt. Conſideremus jam *ſenſus externos*, prout hi afficiuntur. *Senſuum omnium communisſimus eſt tactus*, per totum corpus diffuſus; nam omnes reliqui ſenſus non niſi quidam *tactus ſpeciales* ſunt, & per modum contactus ſiunt: Præter *abolitionem & imminutionem* tactus apoplecticam & paralyticam privativam, item præter ejus *abolitionem poſitivam* in ſtupore, hic ipſe interdum *augetur*, ſimulque *depravatur*, in affectu dicto dolore, eoque omnibus ſenſibus communi. Nam ut omnes ſenſus ſiunt per tactum, ſeu per impreſſionem quandam objecti ſenſilis in organon fibroſum, qui motus impreſſus dicitur *ſenſus externus*; ita, ſi in organon tam vehemens fiat impreſſio, ut illud nimis moveatur, ſemper juncta eſt ſimul quædam moleſtia, ex nimia objecti in organon impreſſione reſultans, quæ communi nomine *dolor* appellatur, e g. ex vehementi & p. n. motione membranæ retinæ ex adſpectu lucis fulgidæ poſt tenebras ſequitur *viſio dolorifica*: Ex nimis forti motione membranæ in cochleâ, ex ſonitu vehementiori, contingit *auditus doloroſus* &c. In ſpecie ſi fibrillis nerveis objectum quoddam tactile in ſpecie ſic dictum occurrat, quod eas nimis fortiter & non abſque quadam vehementia moveat, ſequitur tactui juncta moleſtia, ſeu in ſpecie dictus *dolor*.

*Fibras præſuppono tactus organon*; naturali quidem in ſtatu illa tantum quæ extra cutim in papillas protuberant; p. n. vero in ſtatu, etiam quodvis fibrarum ſyſtema tangendo affici & hinc dolor in iisdem ſentiri poteſt. *Fibra harum*



earumque subtilissima fibrillæ ubi ex fortiori & vehementiori objecti actione & motione celerrimè vibrantur, vix fieri potest, quin à se invicem violenter separentur, divellantur, aut quasi lacerentur; adeò ut ex situ æquali & ordine naturali vitiatis, quædam ab aliis divulsæ quasi contractivâ vi abbrevientur, quæ & alias illas in naturali situ violenter quasi trahunt ac lacerant, ad eum modum, quo dolorem ex puncto nervo explicat *Sylv. l. 2. c. 27. §. 168.* hinc molestia illa accidit, quam *dolorem* nominamus, unde remoto licet objecto nihilominus adhuc *doloris continuatio*. Affectis fibris vibrationis istius occasione spiritus animales & ipsi ad certum motum determinantur, ad cerebrum nempe, ubi *in sensu communi fit formalis doloris perceptio*, seu sensus doloris internus. Conf. *Willis Pharm. Rat. p. 1. sect. 7.*

Hinc fit, ut non rarò dolores sequantur convulsiones ac motus convulsiivi, si scilicet sint aut diuturniores, aut graviore, ex inordinata & veloci spirituum animalium ad partem dolentem occasione fibrillarum nervearum motionis quasi ruptione, ut quando v. g. *ex punctura nervi* dolorifica convulsio succedit, aut quando à *nephritide* est vomitus: Imò in quovis dolore semper convulsio quædam, occulta licet, jungi solet, hinc enim tendi plus minus pars dolens & sæpe pulsatoria molestia simul supervenire solet, adeoque hic circulus observandus, ut & à dolore convulsio, & à convulsivo impetu doloris incrementum.

Hic est primus doloris actus. Quod si jam fibrillis læsis & nonnihil laceratis objecti, naturali licet impressione agentis, fiat contactus, tunc fibrillæ vel tantillo contactu vibratæ nimis & agitatæ novam doloris impressionem facere solent; nimirum vel levissimus specilli contactus in partibus vulneratis aut ulceratis tantum dolorem concitat, magis tamen in partibus nervosis ob fibrillas copiosiores, quam in partibus sanguineis ob fibrillas pauciores.

Ex his causa doloris proxima materialis, motus fibrarum organi ab objecto p. n. & formalis, spirituum hinc rapidior, singulariter tamen determinatus & ad cerebrum usque continuatus motus per se patent. Ille pro sensu doloris externo, hic pro sensu doloris interno. Remota est omne id, quod dolorem inferre valet, quod ipsum prout est varium, & ipsæ quoque partes, prout variant, tam varii doloris modi exsurgunt, indeque varias appellationes acquirunt, adeò ut tantum non innumerabiles dolorum sint differentia. Sufficiant nobis X speciales differentias dolorum, in primis ex causa interna ortorum, considerare.

I. Est Graviativus, Es drückt und ligt so schwer; dum agri sensum ponderis quasi prementis & gravantis percipiunt, v. g. in hepate tumido aut scirrhus,

thoso, in calculo sentiente tamen minus acri, aut à sanguine ac le

II. I

repetitis violentis actionis sensu a Oritur ex acritudine, unde dolor

III.

quasi cerebrum à viscido p

IV.

rigidus pertinet acri salso ment

V.

pietate in quatione. Cuiusque fibrillatione dolor arteriarum tuncionibus aut pium.

VI.

form einem do ossa frangibuto fit. stium afficiunt saltent

V

v. g. dum abdomen tibus, spasm efformanti ex causa re

Par



rhofo, in calculo renum ingenti, fed quieto. *Occupat partem ex se minus fenfilem*, feniente tamen nonnihil membranâ cinctam, à *materia aut vifcida & craffa* minus acri, aut fluida, fed ferè infipida, aut dulci infarctam, adeoque à pituita, à fanguine ac fero, aut lymphâ.

**II. Punctorius**, *Es ſticht ſo / item acutus, dum quali ex impro- viſo* repetitis vicibus acicula quali in loco quodam membranofò pungitur, ipſo pun- ctionis ſenſu ad magnum ſpatium ſe diffundente, obuius v. g. in pleuritide. Oritur *ex acido membranam pungente*, quæ hinc convulſivo ſpafmò crifpa- tur, unde doloris intenſio.

**III. Terebrans**, *Es liget und ſticht an einem Ort*: Fixus eſt, quali terebra aut palo pars perforaretur, e. g. in dolore colico, cephalæa &c. ori- tur à *viſcido* plus minus acido, parti cuidam impacto.

**IV. Rodens**, ſeu *mordax*, *Es beiſſet und friſſet*; quò & *pru- riginoſus* pertinet, quali *vermiculi* continuo fodicarent & raderent. Oritur ab *acri ſaſſo* membranofa loca rodente & vellicante.

**V. Pulsatorius**, *Es klopft und pochet / als wenn ein Huhn picket* in quovis arteriarum pulſu perceptibilis, v. g. in digiti à ſpinâ infixâ inflama- tione. Oritur *ex comprefſione arteria*, ex nimia partis dolentis repletionem ejusque fibrarum convulſiva ſtrictura, unde conſtrictæ arteriæ quavis ſui pul- ſatione dolorem partis intendunt, & ita pulſatorium dolorem conſtituunt, ipſa arteriæ tunicâ plus minus tenſâ, & quali convulſa; vix alibi quàm in inflamma- tionibus aut fortioribus membranarum tenſionibus, v. g. in Cephalalgia perci- pitur.

**VI. Oſtocopos**, aliàs *frangitivus*, it. *contundens*, *Als wenn einem die Bein mit Hammern zuſchmiſſen würden* quali in ſui profun- do oſſa frangerentur & ſummâ vi contundantur, qualis v. g. in lue Pæa & ſcor- buto fit. Affligit hic dolor præſertim nocturno tempore & immediatè perio- ſtium afficit. Oritur *ab acido in ſucco viſcido*, quali minus corroſivo, perioſtium nunc ſaltem vellicante, nunc rodente.

**VII. Tensivus**, it. *diſtendens*, *Es dehnet und ſpannet* v. g. dum in odontalgia dimidium caput tendi videtur, aut in colica flatulenta abdomen diſtenditur. Tensivus oritur à *membranis* partem ſolidam inveſtien- tibus, *ſpafmo contractis*. Diſtendens oritur ab iisdem, ſed cavitatem quandam efformantibus repletis, ſed ex irritatione ſimul ſpafmo contractis. Unde utraq; ex cauſa repletionem & tenſionem dolor diſtendens magis exacerbatur,



**VIII. Lacerans & lancinans**, *Es reisset / es würet und to-  
bet / quasi quis unguibus laceretur*, qualis saepe in cruribus percipitur. Mem-  
branis est proprius *ab acido acri*, puro, sed *austero* oriundo; scorbuticis non ra-  
rus, qui utut uno saltem in puncto subinde affligat, per consensum tamen mem-  
branarum aut nervorum subinde integrum quoddam membrum afficit.

**IX. Ardens**, *quasi ignis scintillula hinc inde urerent, ab acido sub-  
tili acri*, ferè *volatili*, partes fibrosas & membranofas afficiente, v.g. in Erysipela-  
te, in qua pars membranosa solida afficitur, tanquam si *spir. nutr. rectif.* aliquot  
guttulæ fuerint inspersæ; subinde vero in partibus dolor ardens talis perci-  
pitur ab humoribus contentis effervescentibus & à dominante acido volatili  
producitur.

**X. Algens**, *Es ist kalt / ab acido minus acri*, sed singulariter fibras  
alterante, & quasi stupore afficiente.

Ex dictis patet, ex *causis remotis internis* dolorem efficienter in-  
ferentibus inprimis esse *acidum vitiosum*, quod ut plurimum dolores infert. In  
omni enim acido particulæ sunt acutæ, simulque rigidæ, quæ se insinuant in fi-  
bras, eas pungunt, lacerant & quasi cingunt, & ita acerbos dolores inferunt.  
*Origo hujus acidi* ut plurimum est *ex stomacho*, primisq; viis, v.g. in arthriticis, scor-  
buticis; rarius est *ex privato partu*, in *digestione* propria læsæ, vitio v.g. in odo-  
ntalgia. *Acidum hoc*, prout nunc est *volatilius* seu spumofius, nunc minus volatile  
seu *fixius*: Deinde prout hæret in *subjecto humoso*, seu vehiculo subtiliore seu  
*tenuiore* & crassiore seu *viscidior*: Item prout *parti dolenti* *magis vel minus in-  
fixum* fuerit, etiam & pertinaciores & contumaciores aut frequentius recidivan-  
tes, aut facile curabiles, cum aut sine partis erosione juncti esse solent dolores, ad-  
eoque variis modis mutabiles & alterabiles. Sic contumacissimi sunt *dolores*  
*Æci*, & ut plurimum cum erosione partis juncti, propter acidum acre in mucò  
glutinofissimo pertinacissimè parti affixo. *Dolores scorbuticorum* arthritici vagi  
facile discuti solent propter acidum volatile spumofum, magis spiritu influo,  
quàm feri vehiculo partibus communicatum. Pertinacissimi sunt, & frequen-  
tissimè recidivant isti *dolores*, qui proprio *Æ privato partis vitio*, vitiata nempe  
ejus *digestione* oriuntur, & ferè tempestatum mutationibus auscultantes agro-  
rumque *ephemerides* constituunt, v.g. *post articulos graviter vulneratos* dolores  
remanent pertinaces, quavis tempestatis mutatione recrudescentes ex fermento  
vitioso in parte, ex spiritu insiti debilitate genito, ab externis commoto & partes  
sensiles notabiliter vellicante.

*Ferè ex istis causis etiam dolor nunc continuus, nunc interruptus  
esse*



esse & hic vel *non periodicus*, vel *periodicus* esse solet, & posterior frequenter *nocturnus*, v. g. scorbuticorum &  $\varphi$  eorum esse solet. *Continuus* præsupponit acre intensius parti in hærens; *non continuus*, acre remissius, saltem occasionibus quibusdam externis mobile & excitabile, vel minus firmiter agglutinatum.

Porro dolor nunc est *solitarius*, nunc *compositus cum tumore*, tam sanguineo, quam seroso, scirrhuso &c. *Tumor* interdum est *causa* doloris, interdum *effectus* seu productum doloris, v. g. inflammatorius tumor & suppurans causa est doloris ardentis, rodentis, pullatorii. E contra dolor est causa tumoris in arthritide, odontalgia &c. ex fibrarum stricturâ convulsiva, æquabilem contentorum motum & circulum remorante.

*Prognosis dolorum* variat pro circumstantiarum supra allegatarum conditione; in genere tamen nullus dolor in quacunque corporis parte negligatur, semper enim aliquid mali prænunciat. Conf. Hild. Cent. 5. obs. 7.

In *cura* dolor tollitur aut *causam removendo*, aut eam *temperando*, sicque dolorem demulcendo, aut *sensum partis stupefaciendo*. Quæ secundum faciunt, *anodyna*, quæ tertium *narcotica* dicuntur. Ea quæ causam remonent, sunt fere *alcalia* tam *fixa*, quam *volatilia*, tam *macra*, quam *pinguia*, seu *oleosa*, seu *aromatica*, pro circumstantiarum ratione seligenda: Quæ penetrant, acidum corrigunt, viscidum incidunt & attenuant, humorosum resolvunt & discutunt.

*Temperant* & demulcent *pinguia*, *oleosa*, *mucilaginosa*, quæ acre quodcunque obtundunt, mitigant, fibrarum spasmum & tensionem blandè emolliunt. *Stupefaciunt opiata*, *hyosciamus* & similia. Usurpantur hæc ipsa vel *internè* vel *externè*, observando simul ut semper habeatur ratio internorum, ut causa materialis peccans removeatur, idque primario per *sudorem* & *urinam*. Præsertim *sudores* ad corrigendos dolores etiam contumacissimos, subinde sunt summe proficui, dum eorum medio & viscidum, in contumacioribus doloribus simul peccans plus minus emendetur.

Inter *purgantia* excellit in primis  $\varphi$  ius dulcis. Conf. Velsch. Hecm. l. 2. p. 40. Quibus evacuantibus pro fomite morbofo corrigendo *stualia*, *Qa-ria* &c. adduntur. Sicuti *externè* pro causæ peccantis remotione nunc *V. S.* *hirudines*, *vesicatoria*, *caustica* &c. magis inserviunt. v. g. *Poter. Cent. 3. cur. 84.* dolorem refert *tibia* contumacissimum *sudoriferis* nullis curandum, aperta *tibia caustico*, curatum. Inventa ibi materia dura, subalbida & sebacea, qua sublata dolor evanuit. *Schenck. l. 5. observ.* dolorem omnium



membrorum refert, excitatis per phænigmos copiosis pustulis & evacuato sero, curatum.

Sanè dolores artuum graviores ex sero acri scorbutico nati, & in quibus nulla ferè partis alteratio sensilis observatur, per applicatum *vesicatorium* optimè curantur. Sic *Zacut. Lusit. l. 2. prax. admir. obs. 57.* refert, lumborum sævum dolorem impositis supra lumbos *hirudinibus* curatum. Idem *cit. loc. obs. 72.* refert immanem inguinum dolorem *salvatella sectione* curatum. *Horst. l. 8. obs. 9.* habet diuturnum & contumacem brachii dolorem, *dieta sudorifera* curatum.

*Auxilia* inter modo allegata potentissima sanè sunt *narcotica*, sed quæ *palliative* saltem curant, doloris symptoma sistendo, sed causam materialem, nec corrigendo, nec removendo. Unde in eorum usu cauti sumus. *Cautelas* non ineleganter expressit *Chicotius in Epist. & dissert. Med. dialogo de dolore*: *Sirodens humor excruciat, narcotica exhibeantur*, quæ minus hos affectus, quam alios lædunt, quippe & tenues & calidi hujusmodi humores sunt. *Hæc autem narcotica* non solum salutaria sunt, quod sensui torporem inducant, sed etiam ut humorum tenuitatem corrigentia. *Ubi vero crassi & glutinosi humores excruciant*, alienissima sunt, quæ torporem inducunt, nempe intensum dolorem mitigant, sed deteriorem reddunt partium adfectarum dispositionem, dum membra ad patiendum reddunt idonea, & sublato humorum motu, eosdem parti magis impingere solent. Hæc *Chicotius*. Adeoq; *narcotica* non nisi urgente necessitate & semper *premissis præmutendis*, nec sine *appropriatorum* consortio usurpentur.

Præter has circa *NARCOTICA* cautelas in quovis dolore curando ad 3. semper respiciendum. 1. *Ad partem affectam* plus minus sensilem, adeoque ferè plus minus carnosam aut nerveam. 2. *Ad causam efficientem occasionalem* plus minus acrem. 3. *Ad subjectum* seu quasi vehiculum causæ vel viscidum, vel glutinosum, successivè attenuandum, vel tenue & subtile, faciliè discutiendum, v. g. in nodis & gummatibus & eis nocentissimus est *spir. b. & c.* applicatus, cum implacabiles dolores inferat, in acidum acre impetuosius agendo. Unde effervescentiæ quasi concitato motu, & resolutio nonnihil subjecto viscido crudelissimè exacerbantur dolores. Nempe quo sensilior est pars, eo magis *temperata* conveniunt. Item quò acrior fuerit causa occasionalis, item quò viscidior est fomes, eo minus *volatilia* discutiunt, sed successivè emollientia magis conveniunt.

*Remedia igitur ad primam classem* pertinentia *alcalia* plus minus *aromatica*, sunt *absinth. aneth. chamomilla, menth. fol. lauri, bacc. junperi, sem. 4. calid. maj.* Sanè *absinthium* cum *parietaria* contusum, coctum & instar *cataplasmat*is applicatum in plurimis doloribus resolvendis & discutiendis perquam



quàm convenit, seu à causa externa, contusionibus nempe nati fuerint, seu etiam internè, ex acri humore seroso ortum duxerint, tam in capitis dolore, quam aliarum partium. Sic v. g. *Amatus Lusitan. Cent. 1. cur. 57.* dolorem spinæ ad os sacrum per *absinth. & parietar.* in ol. fixa curavit &c. Hinc *aque articulares* ad extra inprimis acuatæ cum *spiritibus urinosi* ad dolores præsertim lacerantes & lancinantes, inprimis scorbuticos nocturno tempore affligentes, conferunt.

v. g. R. ▽. Articular. ad extra ℥ij.

spir. θ\* ci c. calc. viv. ℥vj.

lumbric. terrestrium per putref. ℥ij. M.

illinantur externè, membra prius probè fricando. Et nota sunt *lumbricalia* & *formicalia* quævis per θ. suum volatile singulare egregia in quibusvis partium nervosarum doloribus. Quo etiam *urin. hum.* pertinet, & quolibet ex ea parata. Non secus ad huiusmodi dolores ab acido volatili ortos, inprimis *volatilia ex animalibus* petita remedia conducunt. Unde & *scarabæis cornutis* & *liquori* ex his parato singularem vim tribuit *Glauberus*. Pertinet huc etiam *camphora* potenter anodyna. Hinc *S. V. camphoratus* ad sopiendos dolores inflammatorios, in specie Erysipelaceos est optimus. *Rana* quoque huc pertinent, inprimis eorum *sperma*, *alcali temperato* singulariter anodynò turgidum, unde & arthreticos hisque cognatos dolores sopire valet. Sicuti *ol. ranarum* ritè paratum egregium quoque est lenitivum plurium dolorum. Pertinet huc *sapo Venetus* in *S. V. solutus*, & ita in liquida formâ illitus, ratione alcali oleosi dolores ex acido ortos, etiam arthreticos subinde compescens. Quod si ardoris sensus conjunctus sit, in *spermate ranarum* solvatur: Sin minus solvatur, fiat in *spir. lumbr. terr.* aut *S. V.* additâ *camphora* & *croco*, & ita cum pluma subinde applicetur. Nec negligendus hic est *Bals. Peruvianus*, egregiè anodynus ad nervos contusos & punctos egregius. Item in articulorum doloribus partium musculosarum à defluxionibus frigidis commendatur seq. mixtura:

R. Bals. Peruv. ℥j. dissolv. cum

vitell. ov. adde

spir. bacc. junip. ℥iij. M. & utere externè illinendo.

*Gummata* denique, tam *ammoniacum*, quam *Gambanum* in doloribus à viscido acido natis, & in specie *Gummi Tacamahac.* emplastri formâ applicata, in doloribus à s. ro vel lymphâ acidâ, adeoque catarrhis aliâs tributis sunt egregia. Unde & *emplastra diaphoretica* dicta in doloribus ex sero acri contumacioribus proficua observantur. Potentiora sunt & penetrantiora, sed acriora & non ubivis obvia ex dictis *gummatibus*. Item ex *animalium ossibus*, *pinguedinibus*, *cera* &c. *olea destillata*. Sic enim *Galbanetum Paracelsi* egregium est in doloribus partium nervosarum chronicis & sæpe recidivantibus. *Ol. cere* & *S. V. an.* in partium nervosarum doloribus ex contusione est egregium. Vid. *Riv. Cent. 4.*



obs. 51. Sic oleo destillato pinguedinis human. dolorem brachii diuturnum curavit Borrich. de Hermet. Sap. p. 371. His adde stercorea animalium egregiè anodyna, ex quibus optimum est humanum seu sterco vaccinum, vel recens applicatū, vel cum oleo ros. mixtum sub forma cataplasmat in dolore brachii & pedum egregiè conducit. Aliàs emplastrum de melilot, item ex terebinth. cum spir. b. ci itidem dolores potenter resolvunt, non secus ac emplastrum de ranis cum q. ro reliquis præfertur in doloribus contumacioribus, præsertim q. eis.

*Quoad alteram remediorum classē* temperant & demulcent imprimis lac & quælibet lacticia. Hinc althæa malva, melilotus, verbasci & sambuci flores, axungie animalium, mucilagines istarum plantarum, ol. amygd. d. 7. flor. Myns. lumbric. &c. Sic lac caprin. q. f. & mellis parum bullitum & applicatum loco dolenti ad sedandos dolores à Rulando adhibetur; oleū nempe & alcali dives est lac, unde præ aliis anodynum. Sic Rulandus

℞. Lactis ℥v.  
ol. rosar. ℥ij.  
nymph. ℥iij.

Quæ invicem calefacta linteis multiplicatis crebro parti dolenti applicat, quo dolor brachii totius ingens tanquam fomento curatus fuit. Pertinet huc cataplasma illud Chirurgorum polychrestum ex micâ panis albi in lacte cocta, addito croco & cataplasmat inftar applicatum Vel ad imitationem Rulandi in dolore lumborum ex defluxionibus aliquoties ab eo probatum

℞. Medull. panis albi, in aceretur lacte vaccino per cribrum æneum trajiciatur, adde vitell. ovi & cum butyr. rec. & seqq. oleis q. f. M. & hinc calido linteo applica. Olea sunt:  
℞. Ol. chamomill. aneth. lilior. alb.  
lumbric. terrestr. an. ℥i℥. M.

Pertinet huc & oleum ex flor. verbasci in clibano paratum, potenter anodynum. Item pinguedines animalium cum oleis subinde miscendæ. Sic ad dolorem ex scarificatione in scapula

℞. Ol. lumbric. terrestr. ℥℥.  
pingued. taxi.  
vulpis an. ℥ij. M.

Illinatur brachium; vel cum  $\nabla$  a hirundinum c. castor. idem illinatur. Huc spectat unguentum dialth. alabastr. bals. hypnotic. Myns. Unguent. anodyn. usitat. &c.

*Tertiam quoad remediorum classē*, obtundunt dolorem quælibet narcotica, in specie papaverina & hinc ex hyosciami parata quævis remedia, in specie ol. hyosciami expressum, externè potentissimum narcoticum.

Quoad



Quoad dolores in specie, curatur *gravativus* materiae remotio-  
ne. Hinc V. S. *sudorifera* & *purgantia*, item *fonticuli* in usu sunt. Externè *olea*  
*destillata penetrantia* inungenda. Item *emplastra ex gummatibus* & *narcoti-*  
*cis*, ut de *cicuta*, *nicotiana* & alia contra *scirrhus* ac *scrophulas* usitata.

*Punctorius* curatur per *via volatilia sudorifera opio* mista, v. g. *spir.*  
*thci anisat. cum essentia opii*. Externè *fomenta emollientia* & *temperantia*, & *li-*  
*tus* ex temperatis blande volatilibus mistis, v. g. *ungu. dialth. ol. amygd. dulc. ad-*  
*dito pauco ol. destillat. chamomill. & camphora. it. volatilia penetrantia*, ut *spir. vin.*  
*camph. spir. thci*, *sperma ranarum*, *saponata* &c. qualia in *pleuritid.* & *hinc ar-*  
*thritide* usitata sunt.

*Terebrans* requirit internè *incidentia* & *evacuantia*, praesertim ex  
*gummatibus*, item *q. dulc.* Externè *gummata*. Item *empl. carminativ. Sylv. empl.*  
*de galbano crocatum Myns. Empl. de ranis cum q. conducunt.*

*Pulsatorius* per *sudorifera* curatur, *acidum destruentia*. Externè  
*fomenta ex aromatibus vino incoctis*. Item *emplastrum de meliloto*, *malaxatum*  
*cum theriac. confert.*

*Tensivus* internè *volatilia temperata cum opiatis* postulat. Externè  
*fomenta demulcentia, anodyna, opiata, lacticinia* & ex similibus parata *cataplasma-*  
*ta*, *Cognatus dolor*

*Distendens* internè *carminantia*, externè *discutientia* requirit.

*Ostocopus* curatur *praemissis universalibus* per *sudorifera*, sed ali-  
*quamdiu continuanda*, adeoq; per *diatam sudoriferam*. Externè *empl. ex gum-*  
*mat. item de ranis cum q. rio malaxat. cum oleis destillat. foetidis tartari*, *Gua-*  
*jaci. CC. &c.*

*Ardens* curatur, si in internis partibus observetur, per *absorbentia* alias  
*effervescentes humores*, *praecipitantia dicta*. Externis in partibus removetur  
per *Hina*, item *ranina*, ut *sperma ranarum* &c. non per *acria*, malum magis exa-  
*cerbantia*, non per *pinguia ardorem*, obtinendo *poros*, magis *intendentia*.

*Algens* per *aromatica vel oleosa, olea destillata*, v. g. *galbanetum, spir.*  
*vin crocatum, v. articulare &c.*

*Lancinans & lacerans* in specie considerandus est, qualis mem-  
*bra scorbuticorum* subinde crudeliter affligit & ex subtili acido *membranis &*  
*tendinibus* se insinuante oritur, cum intenso dolore, ut ut plurimum ne mini-  
ma



ma partis dolentis percipiatur alteratio. *Dolores tales lacerantes scorbuticorum* fixi, diurno tempore fere acquiescunt & nocturno tantum tempore per 2. vel 3. horas ante mediam noctem exacerbantur & post hanc horam 2. vel 3. remittunt, in quo ipsi simillimi ferè sunt doloribus & eis & ipsis nocturnis. *Dolores hi lacerantes fixi* in quadam parte, utut sæpius pro fomite agnoscant scorbutum, interdum tamen etiam citra manifesta hujus indicia contumacissimi sunt tales dolores, in quibus *interna remedia* subinde parum ferè operantur, *externa* verò applicata malum interdum potius exasperant quàm corrigunt: Narcotica vero applicata, licet illud aliquantisper mitigent, tamen contumacius & rebellius reddunt. Præ cæteris de hujusmodi doloribus v. *Horst* l. 8. obs. 13. 15. &c.

Utut autem totum quoddam membrum cruciari soleant, in specie tamen saltim *membranam* quandam in loco quodam specialiter affici arbitror; attamen universum fibrarum membranarumque systema illius partis consentiendo & compatiendo mediante *occulta fibrarum crispatura* totum membrum dolere facit.

Memini virginem *scorbuticam* crebriori hæmorrhagiæ narium obnoxiam, hæc suppressa incidisse in hujusmodi *dolores lancinantes* nocturnos implacabiles, ab hora 10. vespertina ad secundam post mediam noctem constanter affligentes, hinc remittentes & somnum concedentes. Interdiu bene habebat, quavis nocte statò tempore dolores recrudescabant, idque per aliquot septimanas.

*Pro curandis* his & similibus doloribus V. S. subinde utilis est, ut contentis liberior concilietur motus, occasione doloris & fibrarum strictione plus minus deficiens; *vesicatoria* quoque in membro dolente convenienti loco applicata sæpius sunt proficua. Interdum ad *fonticulum* accedendum, qui tamen sedato dolore iterum consolidari potest. *Interne* præter *fixa absorbentia anodynis* mista, ut & *diaph. & tial. cinnab. & ii, partes animantium duræ & ossæ*, hisque præmissis *volatilia*, in specie ex *lumbricis, tartaro & urina* parata, *antiscorbuticis* mista, it. *decocta lign. sudorifera*, præsertim ubi contumacior observatur dolor, in usum vocanda sunt, sicuti videri potest in *Horstio* cit loc. Quò etiam pertinere videtur insignis ille dolor costarum aliis frustra tentatis per decoctum sequaturum à *Petr. Poterio Cent. 1. cur. 83.*

℞. Rad. vincetoxic. ʒiʒ.

fol. myrti Mi.

sem. hyperici.

rhabarb elect. an. ʒiʒ.

F. decoctio in l. q. aq. comm. in colatur. ʒvj. dissolv. Syrup.

capill. ♀. ʒiʒ. M.

*Decocti alias formula*, quam in ejusmodi casibus observavi proficua, est hæc:

℞.

Incisa minutim  
quantur ad ter  
versalibus. In  
caput aut fauc

Externa

ferim pingua  
subinde spir. vi  
vitæ dissol. cu  
primis spir. ta  
rit. Interdum  
seu simili temp  
cataplasmatis  
net. Conferri  
ravi ulum suffi  
braucht in Ge  
ctis lapidibus  
recto excipien

therma, h  
probè bulliti  
lancinantes p  
proficuum, p  
Mantiss. Spag  
In spec

seu Odor

nunc per cor  
ejus est aco  
vehiculo d  
ad dentem  
For san inter  
infra oculum

Ipsa equ  
Pars



℞. Rasur. ligni juniper. ℥iij.

cimar. pini junior & recent. Mij.

H. rorismar. Mj.

Incisa minutim macerentur in ∇. simpl. ℥vj. stent in M. B. per noct. manè coquantur ad tertiam: Colat. ℞. pro haustu matutino sudorifero, præmissis universalibus. In specie huiusmodi formulam utilem notavi, ubi glandularum circa caput aut fauces obstructions & tumores simul occurrerunt.

*Externa* non semper leniunt, quin potius interdū malum exasperant, præsertim pingua & unctiosa, quæ poros oblinunt, vitanda sunt. Conveniunt tamen subinde spir. vin. aut theriacal. camphor. ∇. hirund. cum castor. sapo Venetus in ∇ vita dissol. cum spir. cerasorum nigr. & lil. convallium mistus & externè illitus; imprimis spir. tart. volat. reliquis præfertur cum spir. vin. téperandus ubi acrior fuerit. Interdum quoq; galbanetum Paracelsi proficuum observatū est, sed spir. vin. seu simili temperatum, ne nimis crassum sit. Rad. consolid. maj. recent. contus. & cataplasinatis modo manè & vesperti loco dolenti imposita singulare quid obtinet. Conferri hic potest Hartmannus, ubi de Paralyssi. Proficuum etiam observavi usum suffitus seu fatus vaporosi, facti ex mistura lixivii coriariorum de Gerbrauchten Gerber Laugen/ana cum urina hum. Hæc mistura probè calida injectis lapidibus vel ferris ignitis in vaporem resolvitur, qui vapor membro desuper recto excipiendus, ut sudor hinc concitetur, utilis est in his doloribus. Denique *therma*, harumque infusus, aut luta thermarum & lapides thermales in ∇ probè bulliti, instar thermarum naturalium usurpati etiam huiusmodi dolores lancinantes placant. Quarum thermarum succedaneum & ut arbitror, æquè proficuum, potest fieri ex cal. viva & sulphure in ∇. decoct. ad imitat. Zuvelf. Mantiss. Spag. p. 401.

In specie aterbissimus & satis frequens solet esse

## DENTIIUM DOLOR

seu Odontalgia, quibusdam dentium podagra, eaque nunc per essentiam, nunc per consensum ex affectis gingivis enata. Si per essentiam fuerit, causa ejus est acor vitiosus, nunc ex vitiosa dentium nutritione proveniens, nunc feri vehiculo dum nutrimentum dentium chylosum hujus medio ad eos derivatur, ad dentem quendam depositum, ut in scorbutō & lue q̃ ea subinde obvium. Forsan interdum & collecti humores acres in cavernula ossium maxillæ superioris in fra oculum multum contribuant. Vid. Mæb. fundam. Physiol. cap. 9. p. 414.

Ipsi equidem dentes sunt indolentes, sed membrana eorum intima investiens,

Pars II.



ex expansione nervi orta & cuius *fibra* hinc inde per poros & meatus in dentium substantiam penetrando se insinuant, passionis illius doloris acerbæ *subjectum* existunt. Hunc dolorem vicinarum partium & fibrarum nervearum crispationes, levesque contractiones propter *consensum* *continuitatis* insequuntur. Unde quousq; hæc *fibrarum crispatio* dolorifica continuatur, iste dolor se extendere & subinde *hemisrania* accedere videtur; & dum ab ista contractione fibrillarum angustantur pori & stringuntur meatus, per quos sanguis & alii humores meando circulantur, nunc sanguis, nunc serum aut lym, ha in motu impedita stagnant, unde dolori dentium supervenit tandem ut plurimum *dolor maxille* sanguineus cum dolore tensivo & pulsatorio totum caput s. hemisphaerium occupans, saltim ex acido radice in dentis rodente. *Acidum* illud rodens dentes dolorificè & corrumpens ejusdem alimentum compagem osseam eorum subinde adeò rodit, ut *dentes cariosi* fiant & *excavati*, ac frustulatim tandem excidant. Imò ex alimento proximo non assimilato, sed corrupto in cavitatibus dentium cariosorum subinde *vermiculi* generantur, à quibus iste dentium dolor non leviter exasperatur.

*Causas remotas* quod attinet, istar, quæ nutritionem dentium privatum ledunt, sunt imprimis assumpta, *saccharata, dulcia, fervida*, nimis frigida, imprimis *acida*, spiritum insitum dentium labefactantia & hinc hujus materiam texturam vitiantia. *Remota causa, quæ nutrimentum vitiosum*, acore peregrino infestum *seri vehiculo* denti communicant, sunt imprimis *cacochymia sanguinis* & humorum quæ ea & scorbutica. Sanè sæpius in scorbutico acerbissimi sunt dolores dentium, sicuti in *lue* quæ hi ipsi sunt crudelissimi. *Vitiosum enim acidum* in talibus, dum dentes antea non bene se habent, facile iis se insinuat, indeq; rodendo dolorem excitat. Vel si alius dens per se dolere incipit, facile ejus occasione acidum p. n. superveniens dolorem istum & vicinorum locorum pathemata inducere potest.

Quoad *prognosin*: Per se equidem odontalgia non est periculosa, *contumacior* vero aut diuturnior etiam convulsiones, vigilias pertinaces ac alia similia symptomata gravia sibi associare potest. Quod ut ne fiat

In *cura* 1. dolor sistendus, acidum corrigendum, dens cariosus evellendus, ac tandem *vermiculi* enecandi; quibus tamen semper addantur appropriata morbo, à quo odontalgia tanquam symptoma dependet. Sic in dolore dentium scorbutico quo etiam ille pertinet qui ex malo hypochondriaco subinde excitatur, vulgaribus odontalgiis miscenda subinde appropriata antiscorbutica, quæ inter sufficit herb. cochlear. vel nasturt. Indic. vel nostrar. Decocta scilicet inde parata cum salvia, rosmarin. rosi, plantagine, pro oris collutione sæpè usurpanda. Sic dolor iste,



iste, qui in *luc* & ea obvenit, appropriatis etiam sopiendus, quæ inter eminet decoctum Guaiaci cum  $\nabla$ . comm. aut ejus *essentia*, de quibus vid. Strobelberger. Tr. de podagra dentium.

*Remedia* igitur quæ imprimis dolorem sistunt, sunt ante omnia *laud.* opiat. seu *pilule* ejus denti dolenti inditæ, vel *essentia opii* cum bombace denti immissa aut extrinsecus dentibus ac gingivis affricata. Interim notabile est, quod refert *Salmuth Cent. 3. obs. 34.* ex *laudano opiato* dentibus dolentibus intempertive adhibito, omnium sensuum stuporem, vertiginem & gravedinem capitis oborta fuisse. Et *Zacut. Lusit. lib. 1. Med. Princ. histor. 61.* ex opio in dento cavum sæpius pro ejus sistendo dolore immisso mortem observavit, adeo ut hic subinde universalia præmittenda. Opii virtute etiam operatur *theriaca* externè malæ è regione doloris applicata, si nempe *theriaca* illinatur linteo instar emplastri & ita applicetur. Quod si dolor & ardor erysipelaceus aduerit, tali *empl. ex theriac.* & *absinth.*  $\mathfrak{D}$ j. addendus. Internè *luc* tepidum simul crebrius in ore tenendum, præsertim quando suspicio est de latente scorbuto. Simili virtute operatur *Nicotiana*, cujus *sumus*, præmissa, ubi opus est *purgatione*, egregius est, sicuti ipsius *Nicotiana* masticatio dolorem quoque dentium sopit, teste *Riverio in observ.* cavendo tamen ne aliquid salivæ deglutiatur. Par ratio est *hyoscyami* dolorem dentium sistentis, si cum vino decoctum exinde paretur, vel etiam si decoctum eius in aceto vel  $\nabla$ . usurpetur. Non secus atque *Heurnii* experimentum fuit decoctum *Nicotiana* cum floribus *chamomille* in ore detentum ac gargarisatum. *Camphora* egregiè etiam confert, si tantillum intrudatur denti dolenti, vel si solvatur in *spir. vin. rectificatissimo* & sic denti dolenti applicetur. Item *spir. bxi* cum *calc. viva* & *spir. vin.* paratus dissolvit quoque *camphoram*, cujus solutionis cum bombace in dentem immissio convenit. Olea destillata pariter sunt egregia; in specie *ol. destillatum caryophyllorum* & quod præstantius est, *ol. destil. origani Cretici* denti dolenti instillatum *Rulandi* experimentum fuit *oleum Heracelinum*, loco cujus *ol. destil. buxi* convenienter potest recipi, cui præfertur *oleum sabina destillatum*, perquam egregium, sicuti ipsum *sabina decoctum* in cerevisia ordinaria vel vino paratum in ore juxta locum dolentem detentum, excretum & subinde ita repetitum excellens est, expellens simul dentium vermes. *Clandini* remedium fuit *ol. terrib. th.* cum tantillo *camphora*, aut *balsam. sulphuris* cum bombace inditus etiam confert. Vid. etiam *balsam. odontalgicum* in *M. A. N. C. histor. 6. append. p. 76.* *Essentia* quædam vegetabilium aromaticæ etiam conferunt, ut *essentia thymi, satureje, calaminthæ* &c. Si his ipsis gingivæ fricentur, aut cum bombace denti dolenti immittantur, quibus præfertur adhuc *essent. lignor. Guaiac.* aut *sassafr.* Omnium optima *essentia benzoina*. Hoc habent commodi, ut convenienter cum *essentia opii* misceri, & ita eo præstantius remedium constitui.



re queant. Loco horum etiam *Elixir. propr. sine acid.* dentium dolorem sistit. In specie vid. *unct. odontalgica* in M. A. N. C. cit. loc. *Sulphuris aurati* & tantillum cum bombace in dentem immissum, aut denti dolenti applicatum, absorptione acidi corrosivi sopit dolorem. Præter dicta subinde decocta quædam solent recipi & gargarizando usurpari ex orig. *Cretico, sol. tabac. persicar. rad. pyret hri, sabina, chamomilla, serpillio, hyoscyamo.* Hæc ipsa coq. in  $\nabla$ . vel aceto, & ita applica. Sed decocta in aceto cautè applicentur, seu penitus intermittantur, nam plus nocent dentium compagem solvendo & friabilem reddendo, quàm profunt stuporem inducendo. Sic *gummi iuniperin.* 3j. in aceto vini decoctum, quo ipso colluatur os, multum conferre dicitur in dolore dentium à lue & ea. Conf. *Amat. Lusit. Cent. 5. cur. 21.* Aliàs etiam laudatur: *R. flor. spicanardi,* coq. in vino, decoctum sæpius, & aliquandiu in ore detineatur.

Præter hæcenus recensita etiam *cura magnetica ac transplantatoria* in usu sunt. *Magneticas* inter eminet *Paracelsi cura quoad persicariam*, dum eam recentem in  $\nabla$ . maceratam imponit loco dolenti donec probè incalescat; hinc sepeliatur in fimo, ut citò putrescat, sic enim dolor cessat. Pertinet huc *ossiculum brachii bufonis* laudatum ab *Helm.* & in secretis habitum ab *Heurnio*, qui recipit os dextri femoris bufonis ab omni carne nudum: Hoc gingivas dentis fortiter fricat pro cura doloris. Alii *ossiculum brachii dextri bufonis* recipere jubent.

*Quoad transplantationem*, in primis cum *corylo*, hinc cum *sambuco* & *salice* ea instituitur, si nempe ab his, separato nonnihil cortice excindatur sub hoc festuca, qua ipsæ gingivæ & loca dentis affecti punguntur, usque dum sanguinem fundant, tum lignum cruentum denuo immittatur loco, unde excisum, cortex denuo applicetur & luto probè circumdetur. Conveniunt ejusmodi curæ in sæpius recidivantibus & quasi habitualibus odontalgiis.

*Chirurgis* in usu est applicare temporibus emplastra ex *Gumm. Tacamahac.* aut *Carannâ* malaxat. cum *Bals. Peruvian.* aut *ol. papaverino*, quæ sane in odontalgiis gravidarum non sunt contemnenda; & quidem si in maxilla superiore doleant, temporibus, si in inferiore prope aures sunt applicanda. Quidam ex *gummi elemi* & *masliche* eadem parant, alii *gummi ammoniac.* aceto solutum instar emplastri applicant.

Subinde cum odontalgia etiam *tumor maxilla* insignis junctus observatur, ut supra monitum. In tali à *Chirurgis* nonnunquam applicatur *Empl. de meliloto*, sicque abcessum faciunt pessimo sanè consilio. Subinde prope radices

dicēs dentium  
cellivè suppu-  
rur. Proial  
aut quod mel-  
eanda, quæ i  
melle probe m  
ejusmodi tum  
copiosiora ret  
crebrius adeo  
sidiis curari v  
Borell. Cent.

opus est, aut  
convenienti  
dendum ve  
animi usque  
sanguineo  
ras, alius irri  
his cedens re  
Foresto lib. 1

Præ a  
genere

dictus, non  
suprema, qu  
lentes pecul  
ossibus cran  
bus contex  
rias cerebra  
tam interna  
propter ej  
nica, quan  
guine, nec  
insequitur  
re semper



dices dentium affectorum parvus tumor durus emergit intense dolens, qui successivè suppuratur, & hinc per foraminulum sponte apertum materia excernitur. Pro talis tumoris suppuratione promovenda lac tepidum in ore tenendum, aut quod melius *frustula ficuum* vel crudarum, vel nomihil affatarum applicanda, quæ insigniter suppurationem promovent. Abscessus apertus  $\nabla$ . cum melle probe mundificandus. Tantillum enim fermenti remanens crebriorem ejusmodi tumoris *recidivam* facit. Subinde contumaces adeò, ut propter seri copiosioris retentionem circa partem dolentem periculosa sint odontalgia, imò crebrius adeo periodica, ut subinde quibusvis, etiam generosissimis artis praesidiis curari vix queant. Exempli singularia vid. in *M. A. N. C. Ann. 8 p. 104. Borell. Cent. 3. obs. 7. Hild. Cent. 4. observ. 21.* In talibus, ubi purgatione opus est, aut saltem metus gravioris mali, eadem instituenda videtur; *Salappa* est convenientissima, juxta quam & ad sanguinis missionem interdum accedendum venit. Hinc *Thonerus l. 1. obs. 1. p. 114.* dolorem dentis per V. S. ad animi usque deliquium curatum refert. Idem citato loco dolorem dentium à sanguine copioso fervido per *cucurbitulas* scapulis, cervici, cubito applicatas, aliis irritis curatum memorat. Sic dolor dentium contumacissimus nullis cedens remediis per impositionem *cucurbitulae* maxillae sanatus observatur à *Foresto lib. 14. obs. 6.*

Præ aliis multiplex & non raro sævus est dolor, qui caput affligit, in genere

## CEPHALALGIA

dictus, non quidem quod integrum caput doleat, sed ista tantum capitis medietas suprema, quæ ossibus cranii circumscribitur; nam reliquæ partes in capite dolentes peculiaribus ferè appellantur nominibus. In ista regione capitis, quæ ossibus cranii circumscribitur, solum sunt *membrana*, ex *fibris nervis* sensibilibus contexta & ab istis nata nervorum tunica, uti & ista *membrana*, quæ varias cerebri cavitates & anfractus investit, quæ cruciantur in dolore, & hæc tam interna quam externa. Interna v. g. *dura & tenuis meninx*, utut de hac propter ejus tenuitatem dubitet *Lindanius*. Dura vero mater duplici constat tunica, quam vasa sanguifera multis anfractibus oberrant. Si igitur dilatentur à sanguine, necessario dilatatur tunica & divellitur ejus duplicatura, unde necessario insequitur dolor capitis. Hinc *internus capitis dolor* in membranis ferè semper tensivus, & hinc *pulsatorius* esse solet.



*Præter capitis dolorem internum* observatur etiam capitis *dolor externus*, quando nempe membranæ cranii, in specie pericranium, hinc panniculus carnosus, musculi, ipsaque adeo cutis in contusionibus, aut similibus læsionibus externis, item ex materia super cranium collecta in lue & ea acerbè dolent. *Dolor autem iste nunc caput universum* occupat, totum nempe ab ossibus cranii circumscriptum tractum, atque tunc in genere *cephalalgia* audit, qualis est iste dolor, qui post crapulam sub æris mutationibus in febribus continuis affligit, nec adeo diu durat, quin subinde facilius transeat. *Si vero talis cephalalgia sit diuturna & contumax*, mutato nomine *cephalea* vocatur, ob causam ut plurimum fixam in ipso capite, in certo ejus loco radicatam. *Quod si dimidium tantummodo caput* ratione futuræ sagittalis doleat, ita ut altera medietas sit indolens, est *hemicrania*, ut plurimum diuturna & valdè contumax. *Quod si unicum tantummodo pars capitis* inter sagittalem ac temporalem afficiatur, dicitur *ovum*, à magnitudine nempe loci dolentis. *Quod si dolor sit in uno parvo loco contumax*, & fixus, quasi clavus ibidem esset infixus, dicitur *clavus*, differens ab ovo saltem ratione magnitudinis partis dolentis. Sicut *clavus* etiam ferè continuus eodem modo affligens esse solet, cum *ovum* subinde intendi & remitti observetur.

*Fit interdum ut solum occiput doleat*, idque frequentius in mulieribus, in quibus iste dolor ferè conjunctus est cum sensu frigoris istius loci, quasi glacies intra calvariam esset recondita. Talis dolor in primis fit *per consensum uteri*, & sanè ut plurimum ex utero oriri observatur, utut connexionis ratio haud æquè nota sit. Ab adjuncto *cephalalgia* vel *calida*, vel *frigida* dicitur, prout nempe sanguis vel ipse magis fervet, vel ex membranarum spasmo circa capitis partes, præsertim anteriores, magis detinetur. Tunc enim *caloris* manifestus sensus, præsertim circa frontem percipitur. *Frigida* è contra dicitur, ubi nil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem gravedo capitis adest.

Nunc præsuppositis iis, quoad doloris *causam proximam* & quæ de dolore partium in genere dicta fuerunt, de *causa cephalalgia remota* dicendum. Cum vero varia sint causæ, in primis *distinguunt cephalalgiam in eam*, quæ est *per essentiam*, ubi vitium est in ipso capite; & in eam, quæ est

*per*



*per consensum* dum nempe vitio partium aliarum, imprimis inferiorum, caput dolet.

Sanè notissima est *cephalgia per consensum ventriculi*, non secus ac ex epate, liene, utero per consensum cephalalgia plus minus graves observatae fuerunt. Rarum est, quod & *hemicrania per consensum ventriculi* observatae fue int à Borello Cent. 2. obs. 1.. Sicuti è contra *hemicrania per consensum* causa subinde est dens cariosus. Conf. Thyrmayer Consil. l. 2. p. 128. & Hildan. Cent. 2. obs. 10. Cephalalgia hujusmodi *per consensum* partium aliarum absque ulla vaporis, halitus aut humoris transmissione oriuntur ex sola communicatione membranarum cum aliis partibus membranosis, intercedente simul certo nervorum conjugio. Nam sicuti ex contusione vel vulneratione membranarum cerebri concitatur vomitus, solo consensu, & sicuti ex jejuniò in hypochondriacis concitatur vertigo in cerebro, interdum etiam cephalalgia solo consensu, ita etiam solo consensu ventriculi ac aliarum partium capitis dolor intensus excitari potest. Quò facit observatio Foresti l. 3. obs. 46. de juvene biliòso, qui cum jejunus ambularet, dolore capitis tentabatur, assumpto vero cibo idem remittebat. Ac sanè fit non alio modo, quam per spasmos alibi inceptos, & nervorum ac membranarum ductu in caput usq; continuatos: Sic enim *per consensum* dolores oriuntur, vid. Willis de anim. brut. P. 2. c. 1. Unde etiam dolor talis *per consensum* saltem *tensus* & hinc *pulsatorius* observatur. Sunt nempe membranæ quæcunque totius corporis continuatae & connexæ membranis cerebrum involventibus. Conf. hic de motu musculorum Tr. Willisii operibus adunæctus; adeoque facile una pars alteram per consensum ex spasmò afficere potest; siquidem & ex renibus cephalalgia per consensum observata sunt. Vid. Bartholin. Cent. 4. Epist. 6. Foresti lib. 9. obs. 51. schol. sicuti intestinorum vermes subinde contumaces cephalalgias inducunt.

Quod vero in specie cephalalgiam per essentiam attinet, est vel *accidentalis*, vel *habitualis* e. g. caput vulnere graviore læsum per essentiam quidem, sed tamen sine causæ internæ fomite, *accidentali* modo dolet. Quod si vero post vulnus curatum remaneat vel atonia partis læsæ, vel ex nutritione deficiente subinde recrementa quædam generentur, quibus occasionibus sæpius redeat cephalalgia, talis *habitualis* erit.

Utraque est vel à sanguine ejusque motu vitiato. vel à lymphâ in glandulis cephalicis vitiosè secreta, aut malè distributa; quò vel horum duorum fluidorum mediò ad caput nunc transmissa, nunc in eo plus minus retenta excrementa varia vel à propriò digestionis privata errore & vitio genita vitiosa, & in specie viciòsior mucus, abscessus, vermes, lapilli &c. pertinent. Ac sanè in habitualibus hujus-



Huiusmodi cephalalgia semper ferè observatur simul *partis affectæ debilis constitutio*, & hinc facilius materiæ morbificæ occasionalis vel receptio vel regeneratio.

In specie *sanguis*, dum à nimia copia abundans, aut à suppressa solenni evacuatione coacervatus, aut *turgescencia* aliqua agitatus vascula meningum distendens cephalalgiam eamque frequentem inducit. Sic ex *turgescente & ebulliente sanguine* in febb. tam frequentes cephalalgia; hinc in *nimio æstu canicularium*, aut diuturniore in *Qe morâ*, ex sanguine magis dissoluto facilius turgescente, & impetuosius vasa meningum distendente cephalalgia oritur. Item quod ex *exercitio* quovis fortiori subinde cephalalgia oriatur. Hinc est, quod post crapulam ex *nimio vini & cerevisiæ potu* præter cruditates relictas, sanguis turgidus postero die cephalalgiam inferat cum artuum ferè lassitudine, nisi sudore præveniatur. Pariter *refrigeratio capitis* ex impedita transpiratione cephalalgiam infert, dum retenta effluvia transpirabilia sanguinis turgescentiæ in capitis vasis occasionem suggerunt: Ut taceam ipsa transpiranda salina partibusque membranosis infixæ dolores inferre. Pariter *sanguinis* occasione qualibet *suppressa consuetæ evacuationes* ejus ad cephalalgiam disponunt. Hæmorrhagiæ narium suppressæ contumacissimas habituales cephalalgias inferunt; ex mensibus it. obstructis idem evenit. Quibusdam uno alterove die antequam menses prodeant, turgescente jam nonnihil sanguine cephalalgia; superveniunt. Facere huc videntur *odores fortiores* cephalalgiam non raro inferentes. Sic curiosum est exemplum, quod ex odore *moschi & ambre* in viro dolor capitis ortus fuerit. Pariter non rarum est *rosarum odore* iis, qui tenuioris sunt in systemate nervoso texturæ, cephalalgiam inferri, quasi particulæ huiusmodi odoriforæ acrimonia suâ vellicent membranam narium superiorem, & ad hanc derivata à dura matre filamenta nervea, quibus unâ vellicatis, & dura mater simul tendi, hinc sanguinis circulus quasi remorari & dolor hic pulsatorius & sensitivus capitis supervenire solet. Quod etiam *Gas carbonum* incensorum, it. rerum *fermentescentium* pertinet, suo inspiratu pertinaces cephalalgias interdum inducens.

Porro *serum*, it. *lymphæ* aut vitiatæ ipsa, aut stagnando in quodam loco & præsertim peregrino sapore inquinata & graves dolores hemi cranias inferunt, eosque ferè si acrimoniâ fuerint prædita, *lacerantes & lancinantes*; si vero minus acria, *gravativa & cum sensuum torpore*. Curiosa est observatio hemi cranias ex his causatæ, per stillicidium *Triæ* frigidissimæ per nares curatæ; vid. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 455.* Pertinent huc imprimis contumaces & subinde vix tolerabiles *scorbuticorum cephalæ*, ex acri scorbutico sale sub feri aut lymphæ vitiosæ vehiculo, membranas capitis affligente. Confirmat hanc cephalalgiam & iste capitis dolor, qui in *coryza* incipiente ferè obvius est, ex sero quidem & lymphæ

success.

successiva coll.  
cephalalgiam l.

Denique

cremento ci

cur, qualia ferè

pos, ut plurimu

viscida plus mi

nio quovis in

oriri potest, u

peditu motu

soleat. Ac fa

in viscido acri

terdum ut hu

sentim à se in

cranii discessi

Cent. 2. ob. 8.

Aliquan

capitis dolore

Est hat gefna

Porro

nos infert.

ut assimilari

degeneret, q

in aliis ossibus

modum crani

bilis capitis d

institutas. po

cur. 6. Item

evacuato, pa

Interdu

cephalalgias

ubi cephalal

vara fuit.

tra ossa cran

pericranii g

Præter

ratarum, diu

nium ipsam

Par



successiva collectione gravativus, sed simul interdum quoque tensivus. Sic cephalalgiam lethalem a copia humoris serosi notat *Riverius Cent. 1. obs. 37.*

Denique ex congesto aut retento aut genito *Vitioso* plus minus acri *excremento* circa membranosa capitis loca subinde variæ cephalalgia oriuntur, qualia ferè in *clavo & ovo* observari solent. Unde dolor nunc quasi *ostocopos*, ut plurimum simul rodens & pungens observari solet, dum materia quædam viscida plus minus acris, vulgò dicta tartarea, aut sanguis congruatus sub cranio quovis in loco congestus istos dolores infert. Ex tali causa etiam *hemicrania* oriri potest, non tamen omnis, cum in hac subinde sanguinis plus minus impeditus motus in uno alterove vasorum ramulo medietatis capitis ferè peccare soleat. Ac sanè quælibet contumacior *habitualis cephalæa* ac *hemicrania* vix nisi in *viscido acri* excremento, vel deposito, vel genito in capite, oriri solet, unde fit interdum ut humor talis lentus & viscidus sese infinuet intra *suturas* cranii, quas sensim à se invicem *discedere* facit cum intensissimo dolore, de qua futurarum cranii discessione vid. *Boetius Tr. de affectibus omis. c. 4.* sicut etiam *Hildanus Cent. 2. obs. 8.* paria exempla refert.

Aliquando *B. D. Michael* in Principissa quadam observavit talem acerbum capitis dolorem, in quo manifestè *cranij sutura discesserant*, idque manifesto sonitu: *Es hat geknackt.*

Porro lues & ea capitis dolores horrendos & implacabiles, in specie *nocturnos* infert. *Acor* nempe *malignus* nutrimentum chylosum cranii ita corrumpit, ut assimilari nequeat, quin in materiam viscidam & acrem corrosivam sensim degeneret, quæ coacervata supra vel sub cranio, *tumores* illos infert, qui etiam in aliis ossibus reperiuntur, & *gummata Gallica* vocantur à qua & arroditur postmodum cranium, unde *caries cranii*; ex affectis vero simul membranis implacabilis capitis dolor. Pertinent huc *inunctiones* & *iales pro curâ luis* & ea minus ritè institutas, post quas subinde pertinacissimi dolores remanent, Vid. *Poter. Cent. 3. cur. 6.* Item *River. Cent. 2. obs. 21.* idque partim ex relicto, non satis salivando evacuato, partim ex ipsa & *ij* malignitate partes nerveas afficiente.

Interdum *abscessus interiores capitis* partes occupant, qui contumacissimas cephalalgias inferunt, Vid. *Borell. Cent. 1. obs. 73.* It. *Bartholin. Cent. 2. Epist. 74.* ubi cephalalgia contumax per eruptionem puris per nares in primis sedata observata fuit. Sic *Schneiderus obs. 223.* refert cephalalgiam crudelissimam à pure intra ossa cranii latente. In specie *Boetius de affectibus omis. cap. 1.* ex abscessu pericranii gravem & continuum capitis dolorem refert.

Præter abscessus hypocranios, ob *lesionum externarum occasionem*, licet curatarum, diuturnæ cephalalgia & hemicrania remanent, in specie quando cranium ipsum insignius lædunt, aut quando *fissuram* quandam in interiori cranii



lamina relinquunt, per quam succus nutritius, ejus alteratus hinc acrior factus successive destillat in tunicas & ita dolorem infert; aut quando aliqualis sanguinis circa membranas fit extravasatio, quibus occasionibus pertinacissimæ inferuntur cephalalgia. Conf. *Forest. l. 9. observ. 39.* Quod etiam pertinet notabilis observ. *Schenck. l. 1. p. 51.* ubi gravi pondere in caput suscepto & congestato laminae cranii internæ particula diffractæ tredecennalem dolorem capitis creant, quibus per nares excretis ille remisit.

Porro subinde graviter dolet caput ex vermibus in cerebro genitis, qualis dolor observatus fuit aliquando in febre Hungarica, in qua observatum fuit, vermes subinde per nares fuisse rejectos cum levamine. Conf. *Schenck. obs. de febr. Hungar. Barthol. Cent. 1. obs.* ubi pariter post variolas vehementissimus capitis dolor à verme in cerebello. Non secus ac *Forest. l. 21. observ. 28.* notat cephalalgiam intensam excreto verme per nares sublata.

Post vermes quandoque geniti in capite calculi pertinaces dolores inferunt, qui postmodum per nares excreti levamen attulerunt. Exempla vid. in *Schenck. cit. loc. it. Barthol. Cent. 1. hist. 33.*

His ferè causis iisque satis variis generantur cephalalgia, quas omnes accuratè distinguere arduum est, subinde impossibile. Et quidem per consensum esse dolorem capitis, ferè ex eo suspicatur, quando causa nulla caput lædens præcesserit, aut ubi nulla insignior, aut pertinacior functionum animalium læsio simul juncta fuerit. Dolor minus est constans, sed ut plurimum interruptus; è contra adsunt symptomata functionis in quadam parte inferiori læsæ, ita quidem ut prout pars ipsa plus minus affici sentiatur, etiam caput simul plus minus patiatur. Per essentiam vero affigere dolorem, ferè ejus continuitas, aut determinata periodicatio, aut nimia intensio, qualis per consensum excitari nequeat, ferè persuadent, præsertim si causæ antecedentes respondeant, cum ex talibus altius radicata in capite ferè colligenda sit. Quæ vero sit causa hujus doloris per essentiam, difficile est cognitu; nam vermes, calculi, mucus alicubi coacervatus determinata non habent indicia. Abscessus quoque hypocranii difficiles sunt cognitu, utut quantum possibile, eorum indicia describat *Bovius l. c.*

Alimpha aut plus minus acri materia oriri cephalalgiam monstrat gravamen capitis, somnolentia, frigus, ætas senilis. Modo dixi de periodicatione cephalalgia, cujus revera mirabiles prostant observationes. Sic enim dolor capitis latus, secundum Orbis motum diurnum periodicus & mirabilis affertur in *M. A. N. C. Ann. 4. app. p. 33. in Ann. 6. p. 236.* Sicuti è contra Lunæ phases & certas Lunæ periodos cephalalgias observare relatum est à *Schenck. in obs. c. 47. & 48.*

Quoad

Quoad  
ferina confici  
vulliones & ta  
in morbo acut  
inde signum el  
entia. Ubi  
Si dolor capitis  
cum febre acu  
gruit. Si dol  
guinis, aut p  
morbi.

Facit h  
bo partium in  
præcedat exo  
inferioribus  
caput dolore,  
biliosus vomit  
renerit. Q  
tingit, aut spl  
ditur in hype  
Inflammatione

Cur  
etiam pro van  
determinatis  
essentiam an p  
cilecuratur;  
Vomitor

per essentiam  
quæ inter f  
40. Alias le  
xior & aper  
leat subinde

I. Inter  
per consensu  
Vel



Quoad *prognosin*, in vehementissimo capitis dolore cum febre acuta, *urina conspiciantur cruda*, seu albæ & claræ, pessimum signum est, deliria, convulsiones & tandem mortem portendens. *Dolor capitis fortis* subito desinens in morbo acuto, non sequente allevatione per crisin, est lethalis, quoniam subinde signum est gangrænæ, aut omnimodæ sensus in membranis cerebri deficientiæ. *Ubi frigent extrema* in vehementiori capitis dolore, malum est signum. *Si dolor capitis circa frontem & tempora* sit continuus & admodum vehemens cum febre acutâ, apparente die quarto signo pernicioso, septimâ fere die mors ingruit. *Si dolor capitis superveniat manifesta quædam excretio*, aut  $\nabla$ æ, aut sanguinis, aut puris, seu per os sive per nares, seu per aures, signum est solutionis morbi.

Facit huc notabilis *aphorismus Hippocratis sect. 4. aph. 32*: *Quibus ex morbo partium inferiorum convalescentibus dolor capitis vehemens supervenerit*, si non præcedat excretio manifesta in cerebro futurus est abscessus, morbi materiâ ab inferioribus ad superiora conversâ. *Quicumque in febre non lethali dixerit sibi caput dolore*, aut præ oculis obscurum quid apparere, si *cardiognmus* accesserit, & biliosus vomitus expectandus erit, præsertim si rigor intra hypochondria supervenerit. *Quibus vero in ejusmodi febribus caput dolentibus visus hebetudo* contingit, aut splendores circa oculos observantur, aut præ cardiognmo aliquid tenditur in hypochondrio dextro, aut sinistro, neque cum dolore neque cum inflammatione, iis sanguis ex naribus fluit.

*Cura*; Cum cephalagiæ causæ sint tam variæ, facilè patet, quod etiam pro varietate causarum ipsa cura sit varianda, adeò ut non ita commodè determinatis regulis illa ipsa circumscribi queat. *Consideretur ante omnia, an per essentiam an per consensum sit cephalalgia*: Hac affectâ parte primariâ restitutâ facile curatur; illa vero difficulter. Utrinque semper præmittenda sunt *evacuantia*. *Vomitiva* in illa quæ fit per consensum sunt tutiora; in ista vero quæ est per essentiam, non nisi cautissimè adhibeantur; *purgantia* in hac conveniunt, quæ inter speciatim eminet *Æius dulcis* ritè paratus. Conf. *Velsch. Hecat. 2 p. 40*. Alias semper observandum ut in quibulvis cephalagiis alvus semper sit laxior & aperta, cum hæc obstructa dolorem exasperet, aperta verò dolorem soleat subinde allevare.

I. Inter *evacuantia* conveniunt *pilula mastichinæ*, quæ in cephalalgia per consensum stomachi sunt optimæ.

Vel R. MP. mastich. ʒj.  
Extr. helleb. nigr.



Extr. castor. an. gr. v.  
troch. alhand. g. j.  
c. f. q. Elix. propr. F. pilulæ.

*Quod si Qins dulcis sit adhibendus,*

℞. Extr. panch. Croll. gr. xv.  
Q. dul. ʒj.  
Extr. troch. alh. gr. jß.  
c. f. q. essentia croci. F. pilulæ.

II. Præmissis præmittendis in malo contumaciori *diata sudorifera* est optima, in specie, si per *essentiam* malum fuerit. Attenuat enim dissolvit, & mediante sanguinis circulo removet ex capite causam materialem viscidiorum ac fixiorem, idque magis, quando ex feri aut lymphæ vitio malum ortum fuerit, de quibus conf. *Forest. l. 9. obs. 50. Amat. Lus. Cent. 4. cur. 95. Sicuti Poterius Cent. 3. cap. 6.* dolorem capitis continuum ab hydrargyri usu concitatum decocto cephalico cum china & ol. sulphuris curavit. Alias internè quæ magis conveniunt, sunt ferè succinata quælibet, in specie ejus ʒ. volat, hinc diaphoretica ʒialia, it. volatilia tam urinosæ, quam ex vitriolo parata. His Z vel etiam Ess. D. genuina meritò accenseri potest, quibus & opiata, it. camphorata subinde permisceri possunt. Nam camphora in cephalalgia calida mirabilis est, si unum alterumve ejus granum internè usurpetur, aut externè spir. vini camphoratus, aut ol. camphoræ applicetur.

III. *Chirurgica* præsidia, præsertim circa humorum motum corrigendum occupata, multi usus sunt in cephalalgis, qualia sunt V. S. brachii, arteriotomia temporum, incisiones venæ frontis &c. quin & ad pertinaces & graviores cephalalgias vesicatoria, setacea, imò ipsum trepanum sunt optima. Illa ubi in vasis sanguiferis vitium hæserit; hæc ubi ex feri vitio malum oriatur. Sed necesse est, ut prius ritè præmissa sint universalis, aliàs metuendum esset, ne parili ratione atque cucurbitula non præmissis universalibus in capitis dolore sunt valdè noxiæ, vid. *Hild. Cent. 5. obs. 69.* etiam alia præsidia Chirurgica malum augerent.

In specie arteriotomia nobile præsidium est in contumacioribus malis, speciatim hemicraniis, cujus usum ipsa monstravit natura natura vid. *M. A. N. C. Ann 8. p. 120.* Et jam olim *Gesnerus l. 3. Epist. 96.* dolorem hemicranii quotannis redeuntem, sectâ arteriâ in tempore affecto curavit. Ipsa arteriotomia auxilium est facile, & qua copiosè sanguis emitti potest: Et refert *Lindanus*, sibi perquam usitatam esse arteriotomiam temporalem in hemicrania inveterata, emittendo in eodem latere ʒxx. ad xxx. Non est periculosum, neque difficile remedium, neque metuendum aneurisma. Nam si tantum terr. vitriol. dulc. cum



cum terra sigill. mista vel solitaria, vel c. albumine subacta applicentur firmiter, intra triduum arteria coalescit. Aliàs post arteriotomiam *incisio venæ frontis* in diuturnioribus cephalalgis commendatur. Sic *Forest.* l. 9. obs. 20. dolorem capitis quotannis in autumno admodum affligentem notat curatum per sectam brachii venam & detonsis capillis in fronte. In specie obs. 22. Vir 40. an. cum in occipitio diuturnum capitis dolorem habuisset, neque medicamenta juvarent, in fronte V. S. curatus fuit. Loco hujusmodi arteriotomiæ interdum possunt adhiberi *hirudines* utrinque ad tempora: Item pone aures, item ad nucham fieri potest applicatio. Conf. in specie *M. A. N. C. Ann.* 4. app. p. 51. ubi hemicrania hirudinibus fronti applicatis fuit curata: & *Ann.* 6. *M. A. N. C.* p. 20. idem effectus ab iisdem arteriis temporalibus applicatis, fuit secutus.

*Mulier diuturna cephalalgia sæpius recurrente* jam per plures annos afflicta, ita ut levi de occasione, vel ex capitis ab aëre inclementiore refrigeratione, vel ejusdem prope focum nimia exæstuatione, vel ex instante mensium fluxu, eandem recurrentem pateretur. *Dolor erat per essentiam;* utut enim sub dolore graviore vomitum pateretur, idque cum dolorum levamine aliquali, tamen hic ventriculus propter sui cum capite consensum subvertebatur. Causam remotam noverat nullam, nisi quod sibi puellæ hæmorrhagia narium familiarior fuisset, qua suppressa cephalalgia ista supervenerat. His intellectis cum alia auxilia essent frustranea, ad *V. S. vel hirudinum ad tempora* applicationem consilium direxi. *Frontis venam* incidi non permittebat, constrictionis faucium impatiens, ob id *hirudines binas* utrinque temporibus applicui & copiosius sanguinem evacuare permisi bono cum successu. Aliàs *incisio venæ inter in-*

*dicem & pollicem manus* præsens observatum fuit hemicrania remedium. Vid. *Rhod. Cent.* 1. obs. 76. Quod confirmare potest sententiam *Riverii*, qui ad cephalalgias contumaces *fonticulum inter indicem & pollicem* manus excitatū commendat in *Praxi*. Siquidem aliàs diuturnis in doloribus fonticuli aut in brachio, aut in nucha excitati sunt optimū remediū. Quin imò interdum *vesicatoria* toti capiti raso graviore in malo applicata conducunt. Vid. *River. Cent.* 1. obs. 37. quæ aliàs saltem vel pone aures, vel prope nucham applicari solent. Sic *Tulpius Cent.* 1. obs. 37. dolorem capitis periodicum per vesicatoria occipiti admota curavit. *Hildanus* verò *Cent.* 4. obs. 6. dolorem capitis vagum extra cranium contumacem & alterā tantum capitis partem occupantem *setaceo* curavit. Cujus tædiofissimi auxilii loco *fonticulus* infra nucham excitandus venit. Apud Vete-



res subinde occurrit mentio fonticuli in capite, in concursu sutura coronalis & sagittalis facti ad graviora capitis & nervosi generis pathemata usurpati, qui jam ferè in desuetudinem abiit, cujus tamen medio cephalalgia inveterata scorbutica curata refertur in *M. A. N. C. Ann. 3. p. 138. Mulier gravissima laborabat cephalalgia frontis ac temporum*, Es zog ihr die Schläffe herunter und kam in die Rinnbacken/nachmals in den Hals und Nckeln/dass sie nicht zu bleiben wustet/idque in primis nocte à 9. hora usque ad tertiam seu 4. matutin. Causa occasionalis, ut ipsa referebat, fuit rat excretio & emunctio materiæ variæ, viridis & viscidæ quasi purulentæ per nares, qua deficiente & suppressa, ita ut nares penitus extucae essent, ille dolor supervenit. Accepit pilulas &iales, item spir. carm. de tribus, qui bene contulit aliquamdiu, sed sine perfecta sanatione. Naribus ol. Nicot. cum pauca camphora applicavit, sed frustra. Aliis ergo irritis, iussi applicari sibi curaret vesicatoria bina, utrinque juxta aures, quorum beneficio curata fuit.

Juvenis nobilis cephalalgia gravissima affectus cum intenso oculorum dolore, nullo licet p. n. in oculis apparente quæ præsertim vesperti erat gravissima; malum ægro aliàs subinde familiare. Præmissis primas vias abstergentibus & spir. carmin. de tribus, ordinavi cataplasma ex fermento acerrimo misto cum sem. sinapi contuso, pauco spir. vin. addito, nuchæ applicando, idque eò magis, quia oculi simul tumerent. Hujus usum perquam dolorificum, bonum tamen cephalalgiae remedium expertus est. Denique & causticum potentiale subinde usurpandum venit. Sic *Poter. l. 3. c. 3.* dolorem capitis periodicum in vertice, præcisè ad ciceris tantum quantitatem se extendente, sine ullo signo sensibus obvio, post paucam materiam purulentam loco affecto per potentiale causticum aperto curavit. Trepanum denique quod attinet, dolorem capitis hujus medio curatum vid. in *Rhod. Cent. 1. obs. 69. & 70.* In specie *Amat. Lusit. Cent. 1. cur. 2.* refert capitis dolorem intensissimum à lue Gallica jam curata, ortum & incurabilem, sed trepano, aperto cranio, curatum.

IV. His ita secundum circumstantiarum rationem diversimodè & adhibitis, opiata etiam subinde intermiscenda veniunt; sed in horum usu cauti sumus, quia subinde accidit, ut in gravioribus doloribus parva dosis opii aliquoties licet repetita, nihil adjuvet, unde postmodum fortiore usurpata dosi subitò lethargicus ferè oriatur somnus, ita ut vix denuò possint excitari ægri. Nam ut ut opiata sistant dolorem, quia tamen fontem seu causam relinquunt, eamque magis fixam reddunt, rem ferè in deterius collabi faciunt.

Anodyna igitur & Narcotica adhibeantur primum in parva dosi, adscendendo successive ad majorem dosin, idque saltem appropriatis additis. Quod si externè applicanda sint narcotica, futuris non admovenda esse monent Practici, metu soporosi affectus,

V. Quod

V. Quod

eminet imprim  
plicatis fron  
sistit cephalalg  
succedit. Sunt  
laudatæ verb  
4. app. 33. & san  
rh. leviter con  
anodyna & co  
capitis ex apol  
Vel ubi

decoq. & deco  
Radix rhu  
pertinacissimo  
contritam itro  
plicat. Locol  
ducit. Conf.

consistentiam  
Horum

& ita applicet  
hoc saltem in  
Pertine  
lent, v. g.

matris forma  
cum decoct. be



V. Quod aliàs attinet *Topica* in genere contra Cephalalgias usitata, eminet imprimis *verbena* contusa & in forma cataplasmatum ac linteis duplicatis fronti & temporibus admota, quæ amuleti instar pertinacissimam sistit cephalalgiam, ut expertus est *Forest. l. 9. obs. 52.* Non æquè ubique succedit. Sunt tamen qui *floribus papaveris rhæados* non minorem, quàm modo laudatæ *verbena* laudem contra cephalalgias tribuunt. Conf. *M. A. N. C. Ann. 4. app. 33.* & sanè aliquando cephalalgiam pertinacem nocturnam *floribus papav. rh.* leviter contusis fronti & temporibus applicatis curavi. Sequitur *betonica* anodyna & contra capitis dolorem egregia:

℞. *Betonica*, coq. in vino, apponatur capiti p. noct. in dolore capitis ex apostemate.

Vel ubi virtute anodyna opus est, discussione & resolutione:

℞. *Betonica*. Mj.

absinth. Mss.

cubeb. ʒj.

vini t̄b j. vel q. f.

decoq. & decoctum epithematis instar capiti applicetur.

*Radix rhodia* experimentum est *Petri à Castro Medici Veronensis*, qui in pertinacissimo capitis dolore ℞. *Rad. rhod. rec.* eamque cum pistillo lapideo contritam irrorat aq. *verbena* & st. *sambuci, ana* & instar cataplasmatum fronti applicat. Loco hujus decoctum *rad. rhodia* fronti & temporibus applicatum conducit. Conf. *Timaeus. p. 369.* Vel

℞. *Herb. verben. rec.*

*rad. rhod. rec.* cum tot. & c. f. q. ∇. *verben.* contund. ad consistentiam cataplasmatum & ita dicto modo applicetur.

Horum defectu sunt, qui *pulv. rad. zedoar.* recipiunt & ita applicant, v. g.

℞. ∇. *verben.*

*fl. sambuc.*

*betonica. an.* ʒj.

*pulv. zedoar.* ʒss. M.

& ita applicetur capiti tam fronti, quam ubi ita visum fuerit, etiam nuchæ. Sed hoc saltem in cephalalgia ex causa frigida.

Pertinent huc in specie & ea, quæ *aliquanti vi narcotica* plus minus pol-  
lent, v. g.

℞. *Nucleor. Persicor.* ʒss.

*sem papav. alb.* ʒij. c. f. q. ∇. *verbenæ F.* Emulsio epithe-

matum forma subinde fronti & temporibus applicanda, quæ loco ∇ etiam cum decoct. *betonic. aut rad. rhod.* parari possunt.

In-



Inprimis *semen hyoscyami* potens est remedium pro placando dolore.

℞. Sem hyoscyam. ℥j. acet. ros. ℥v.

M. in phiala bene obturata, ponantur in MB. per 5. vel 6. hor. ita tamen ut ne bulliat. Postea accipe fasciam ex linteo subtilissimo, qua ligetur caput infirmi, atque cum spongia hoc aceto madida humectetur fascia, ac remittet dolor. It.

℞. Ol. papav. è sem. expr. ℥j.

nucleor. Persic. ℥i℥.

hyoscyami.

anethi an. ℥j.

c. s. q. ceræ, vel N. M. expr. F. linim. temporibus applicandum. Item quod in familiari usu habuit D. Michael.

℞. Extr. s. verben. ℥j.

ol. hyoscyam. expr. ℥℥. F. linim.

Sed huiusmodi *narcotica externa* non nisi urgente gravius dolore locum habent, idque magis in accidentalibus quam habitualibus, tutius vero in iis, quæ per *consensum*, quam per *essentiam*; convenientius etiam si complicantur dolores cum morbis acutis, quam cum chronicis; sicuti & ipsi dolores tales si chronici fuerint, aut cephalæ, aut clavi, minus huiusmodi curari, leviter saltem palliari solent. Potius *præmissis internis Chirurgicis* remediis hi posteriores tractandi sunt, aut iisdem *empl. appropriatis*, v. g. de *tacamahaca cum bals. Peruviano* succurrendum. Porro *unguentum de alabastro* maximè commendatur à quamplurimis præsertim *Foresto*, in quovis capitis dolore, ex quacunque causa nato, in specie in cephalalgia febrium pariter pro circumstantiarum ratione & de *oleis papaveris, hyoscyami* aut *camphoræ* addi potest.

Denique ubi opus est *discussione* & huius medio doloris sedatione, item resolutione causæ cephalalgiam inferentis in cephalalgia à causa frigida ut vocant, optimi sunt *sacculi ex milio* & *be communi*:

℞. Milii leniter tosti part iv.

sis comm. tost. part. ij.

ex his fiant sacculi suffumigandi & ita applicandi capiti, vel

℞. Milii tosti Mij.

sis comm. parum tosti Mj.

herb. betonic.

fl. chamomill. an. M℥.

pulv. rad. rhod. ℥℥.

F. sacculi interpassati calidè capiti applicandi; conveniunt inprimis in dolore capitis senum.

VI. In specie sunt contumacissimi & atrocissimi *dolores scorbutici*,  
lan-



*lancinantes, rodentes, lacerantes, nocturno præsertim tempore gravius affligentes, nec facile nisi appropriatis scorbuticis tollendi. Hinc interne, decocta sudorifera, præsertim ex ligno juniper. cui rasura ligni buxi addita remedium magis reddit appropriatum, sunt usitata. Hinc et, quod sicut alias per consensum solet inferre dolorem capitis, ita in scorbutico est optimum remedium demulcendo acrimoniam his scorbutici. Externè vesicatoria propè aures applicata; item epithema ☉, infra dicendum; item fl. papav. rhead. rec. contusi & applicati conveniunt.*

VII. *In cephalalgia febrili præter ea, quæ internè febriles paroxysmos solvunt, externè convenit succus semper vivi aut portulacæ, si cum paucis acetis rosaceis instar epithematis capiti applicetur; vel convenit epithema Hartm. cum camph. in Pr. Chym. l. 2. c. 1. §. 18. vel quod describit §. 7. Inprimis epithema ex ☉. fluv. contusis & applicatis, aut ex succo ☉. expresso cum ☐ papav. rhead subactis, epithematis formâ applicandum. Item unguent. populeon. & alabastr. etiam convenit, v. g.*

℞. Ungu. alabastr. ℥iij.

ol. papav. expr. ℥ss.

hyoscyam. expr. ℥j.

M. S. Euserlich Sâßlem.

*Quod si in febb. ob nimios dolores capitis metuantur deliria aut convulsiones, adcoque, ut alias dicunt, raptus materiæ ad caput:*

℞. Fol. rut. rec. Mij. - iij.

rad. raph. incis. no. ij. - iij.

℥ comm. Mj.

ferm. acerrim. Mij.

acet. rutæ. q. s. F. L. A. pulmentum, applicetur plantis pedum,

& repetatur si exsiccatum fuerit. Revulsorum est irritationis ratione remedium, unde & in comate vigili febrium egregium est. Vid. *Barbette in obs. de peste.*

VIII. *Quoad dolorem capitis fixum seu cephalalgiam à materia viscida, glutinosa ac acri enata, atque ut vocant cephalalgiam frigidam, item in cephalalgia senum cura per ligna sudorifera conducit; inprimis balsam. succini vertici illitum. Præceteris præstantissimum est empl. Vigonis de ranis cum ☉io capiti rasio impositum, quo ipso cephalalgias antiquas desperatas curavit Platerus, quod vid. in eius observ. Item empl. hujus parti. i. potest addi empl. de betonic. & ungu. de alabastr. pars ℥ & sic horrendam cephalæam mirabiliter curavit. Ipse aliquando in vetula octuagenaria, quæ jam ab aliquot annis gravissima occipitis laboraverat cephalæa felici successu hoc empl. malaxatum cum oleo succini usurpavi. In genere ubi suspicio est materiæ crassæ & viscidæ,*

Pars II.

yy

scidæ,



scidæ, non habetur melius hoc *emplastro* remedium, propter *Œium*, qui attenuat, resolvit & fluxilem facit materiam istam, quæcunque etiam sit. Hinc in *discessione suturarum* feliciter etiam idem adhibuit *D. Mich.* in casu supra allegato: Ubi præmissis præmittendis & injectis subinde *clysmatibus domesticis*, in quibus de seqq. aliquot uncias solvi iussit

℞. Elect. hieræ cum agarico ℥iv.

de bacc. lauri ℥ij.

pulv. helleb. nigr. ℥i℥.

fellis tauri inspissat. ℥iij. M.

cujus ℥ij. adde clysmati sæpius repetendo. Capiti vero ad imitationem *Plateri* applicuit hoc *emplastrum*:

℞. Empl. de ranis cum *Œio*.

Cerati de betonic an. ℥i℥.

Empl. pro bregmat. ulit. ℥vj. Malax. cum *unguent. alabastr.* inducatur alutæ & applicetur capiti forma emplastri. *Alias in hac suturarum discessione* convenit præmissa capitis ligatura & derasis capillis, *ceratum ex pelle arietina* cum *gummi elemi* & pauco *cerato de betonica* loco affecto applicando. Illud *emplastrum de ranis cum Œio* optimum quoque est in doloribus capitis *Œeis*.

IX. *Quod si dolor capitis sit à causa externa*, ictu aut casu ab alto, optimum est *Ceratum Alexandri Benedicti*, qui hoc ipso curavit senem ex trabis percussione dolentem

℞. Gummi heder. ℥iij.

Refin. purgat ℥℥.

cera ℥iij.

ol. rosac. ℥iij.

gumm. ammon. ℥ij.

terebinth. ℥iij.

succi corymb. heder.

farin. fabar. q. f. F. empl.

Conf. de hoc etiam *Henr. ab Heer obs.* 21. Item *Forest. l. 9. observ.* 35. in *schol.* Alias ad dolores ex percussione etiam *unguentum alabastrum*. proficuum observatum fuit.

X. *Si cephalalgia sit à vermibus*, pro cura observari potest curiosa histor. quam refert *Hildesheim Spicileg.* 1. de affect. cap. c. 45. Nempe cum æger præmissis *universatibus* & copiosis vermibus per alvum rejectis nihilominus in gravi capitis dolore persisteret, ipse vero non vulgarem suspicionem haberet vermium, sincipiti applicavit empl. tale



℞. Pulv. Aloes.

lumblicorum an. ℥ij.

tellis tauri ℥j.

ol. absinth. & ceræ q. s. extendatur super alutam.

Pro faciendo fumo hunc pulverem ordinavit

℞. Pulv. centaur. min.

marrub. beton. an. ℥ij.

zedoar. ℥ß.

angelic. ℥ij.

succin. ℥j.

g. crudi ℥j.

minij ℥jß.

boli Armen. ℥j.

aristol. rot. ℥ij.

absinth. ℥ij M. F. pulv. pro fumo.

Cum hoc emplastro usus esset, & fumum ter quaterq; admisisset, tandem 13. oblongi vermes villosi seu lanuginosi vivi, instar erucarum, per fauces & nates prodierunt, quos ipse digito apprehensos extraxit; continuavit medicamenta, sed tantos dolores & cruciatus postea non sensit, quantos antea, sed tamen omnes nondum semotos dicebat ipse, cum adhuc in sincipite laterent aliqui: Post aliquot menses prodierunt adhuc duo, non tamen ita magni ac priores.

XI. In *cephalalgia ab ebrietate* & crapula convenit *piper* vel integrum, vel in partes divisum deglutendum, quia absument cruditates in *ventriculo*. Item caput leviter irrorandum, testes vero in *triangulo frigida aceto* mistam immergantur.

XII. In *hemicrania* præter *arteriotomiam* aut *hirudinum* applicationem supra laudatam, singulariter laudatur *rad. cucumeris asinini seu sylvestris*, si ex eadem cum *verbena* & *absinthio* F. cataplasma, vel ex eadem radice additis emollientibus F. cataplasma, in specie pro solvenda hemicrania per abscessum ac suppurationem, de qua vid. *curiosa obs. Horst. lib. 2. obs. 10.* Loco cataplasmatum etiam fieri potest tale *decoctum*.

℞. Rad. cucum. asin. ℥j.

fol. absinth. Mß.

fl. violar. p. i.

coq. in vinô & aqua, & decoctum applica loco dolenti in hemicrania. Nempe fit hoc ad imitationem Medici Veteris *Pauli*, qui in hemicraniis recipiebat *rad. cucumeris sylv. virid.* minutim concisam & *absinthium*. Hæc incoquebat *hydrotro* ad putrilaginem usque, cum *hydrolao* calente mediocriter partem dolentem inun-



inungebat, hinc *rad. & absinthium* desuper applicabat. Loco *cucum. sylv.* etiam *rad. bryoniae* recipi potest, si nempe hujus  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . cum *fol. absinth.*  $\mathfrak{M}\mathfrak{j}$ . decoq in  $\nabla$ . cui spongia nova subinde immergatur & calide loco dolenti applicetur, & postmodum *unguent. alabastr.* Sane *Forestus*, *Gabelchoverus*, *Fonseca* & plures alii practici multum commendant *rad. cucum. asinum.* ad hemicraniam. Sunt, qui in specie ad hemicraniam commendant

$\mathfrak{R}.$  Euphorbii  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

cerae  $\mathfrak{ij}$ .

ol. dulcifs  $\mathfrak{ss}\mathfrak{j}$ .

hoc ipso dimidium frontis, & musculi temporales inungi commodè possunt.

XIII. In dolore capitis muliercularum seu dolore occipitis frigido, specificus est *sacculus Harem. ex succino* cum essent. *piperis* irrorat. *cit. loc. §. 19.* It. *empl. ex tacamahac.* & *succino* conveniens est in hujusmodi muliercularum doloribus. *Vid. Barthol. Cent. 3. epist. 14.*

## DOLOR OCULORUM.

Post dolorem capitis subinde dolent oculi, nunc per causas externas quascunque oculos incidendo affligentes, & dolorem infligentes: Nunc propter *ophthalmiam* seu inflammationem, si lymphæ eosdem humectans inprimis acrior & acido visior fuerit, unde rosio, morficatio, dolor &c. Specialis dolor est, qui oculos subinde vexat, estque sensus vehementissimæ compressionis, & quasi simul ejusdem lacerationis, Das drücken in Augen / cum manifesta alteratione, quam credo oriri ex spasmo membranarum oculi.

In CURA, remota causa tollitur effectus; adeoque si res externa in oculos illapsa fuerint, quanto citius eadem removenda; in quem finem convenit imprimis *hormini semen* oculo immissum, quod ipsum à lymphæ oculari humectatum reddit mucilaginem, quæ inviscantur ea, quæ in oculos inciderunt, & ita extrahi possunt. Item *perla* vel *parvus lapillus* &c. immitratur in oculum, & hinc inde facta agitatione ejici solent, quæ inciderunt. *Magnes* admoveatur oculo in scobe oris aut scoria chalybis. *Conf. Hild. Cent. 1. obs. 13. & Cent. 5. observ. 21.* Quomodo alias *instrumentis Chirurgicis* externa ista ex oculis eximenda sint, vid. *Hild. Cent. 2. obs. 13. Cent. 4. obs. 17.*

In inflammatione à causa interna hæc ipsa appropriatis curanda venit, in specie propter oculorum dolorem decoctum *porrorum dulcium* applicetur, idq; solum, si sit à causa interna, vel sociatum cum albumine ovi bene agitato, si sit à causa externa. Hic & arteriotomia in oculi hoc dolore subinde administranda



ministranda venit. Vid. *Ast. Hassn. vol. 1. p. 13.* Si adsit lymphæ corrosiva in oculo, adhibentur in specie *tutia* preparata, aut *fl. zinci*, quæ absorbendo acrimoniam lymphæ corrigunt & temperant. Quod si specialis ille dolor compressivus & lacerativus occasione natæ undecunq; oculis molestia urgeat, profunt imprimis *Decoctis ophthalmicis* & *giales*, it. *fomenta Poterii in Cent. 3. c. 9. ex decoctis ophthalmicis* extra adhibitis; It. *verbena, fenicul, euphrasia, ros. sumach, tutia* in aqua & vino decocta applicata, vel

R. Mucilag. sem. plantag. cydon.

hormini seu sclarea

c. spermat. ranar. extr.  $\mathfrak{z}$ ij.

crocigr. vj. camphor. gr. jv. quæ mista applicentur.

Quibus quidam & *lac. muliebre* addere solent, vid. *Hild. l. 1. obs. 2. p. 3.* *Folia Nicotiane* contusa leniter & recentia oculis imposita, vel si nequeant haberi recentia, modico S. V. irrorata oculorum dolorem tollunt. *Lindanus* perquam laudat *saccharum Zale* contra oculorum dolorem;

R.  $\nabla$ . plantag.

fenicul. an.  $\mathfrak{z}$ j.

sacch. cand.  $\mathfrak{z}$ ial.  $\mathfrak{z}$ j. l. ij.

tutia prepar. gr. viij. M.

Ab omnibus laudata & ex experta est *pulpa pomorum dulcium assatorum.*

R. Pomor. dul. No. iij. coq. in f. q. aq. fontan. ad molliem, trahantur per setaceum, pulpæ trajectæ adde album. ov. conquis. N. j.

Sacch. albis.  $\mathfrak{z}$ ij. camph. gr. xj. crocigr. v. M.

Convenit in quovis undecunque nato oculorum dolore inflammatorio, vid. *Opera Timæ, Chirurg. Barbett. & Armam. Chirurg. Sculteti observ. 22.*

## AURIUM DOLOR.

Porro dolent quoque aures in *otalgia*, idque imprimis ratione membranæ internæ, meatum auris investientis. *Causa*, quæ dolorem infert, frequentissima est *inflammatio*, de quâ superius, juncta cum sensu ardoris ac pulsationis, subinde lancinationis molestissimæ; & quidem licet non videatur primitus dolor ab inflammatione, tamen superveniente puris fluxu & levamine res ipsa se prodir. Conf. in specie, quæ notabiles aurium dolores notant, *M. A. N. C. Ann. 6. p. 117.* D. inde dolorem etiam infert *humor* iste, ex quo naturaliter concresecunt *cerumina*, quæ si p. n. reddatur *acris* & *hirs*, membranam internam pungit & nonnihil arrodit. Nam utut hæc ipsa *cerumina* sint spissiora flavescentia, & in adultis subamarecant, in infantibus vero dulcescant, eorum



tamen genesis est ex quodam humore, quod patet ex eo, si quis cerumina aurium expurgans cum stylo altius intruso vellicet membranam, hinc digitum profundius immittat, illum humore subtili irroratum & humectatum extrahet, imò si copiosius forsan fluat, aperte sensus fluxionis percipi potest; hic ipse resolvitur per aerem & inspissatur tandem in cerumina. Ex hac causa natus dolor contumax & gravis non tamen adeò molestus & fere rarior observatur. Denique *lympa vitiosa* acido peregrino tincta in catarrhalibus affectibus ad otalgiam disponit, modo hæc ipsa causa cum priore non coincadat, quod omnino videtur. Sunt etiam vermes in aures irrepentes, qui graves dolores aurium eosque varios inferresolent, cum sensu rosionis, puncturæ, pruritus &c. item cum sensu reptionis, seu progressus vermium in interiori auris meatu.

**Prognosis;** Dolor aurium præsertim inflammatorius periculofum malum est. Nam deliria, graves cerebri affectus & mortem inferre potest, idque eò magis, si in profundo hæreat dolor, & nervum acusticum magis afficiat. Infantibus frequens malum esse solet & quod facile supervenienti materiæ cujusdam plus minus purulentæ excretioni se jungit. Seniores vero gravius & periculofius laborant.

Quoad curam, sistunt eundem fomenta ex althæa, fœnugr. fl. chamomill. melilot. betonic. &c. applicata, præsertim, si malum sit à causa externa, vid. Hild. Cent. 1. obs. 5. & 6. It. Forest. l. 12. obs. 3. Item fumus Nicot. cum fistula inversa auri immiffus; vel folia Nicotiana, aut recenter parum contusa applicata, vel humectata S.V. & ita admota. Præ cæteris utilia ol. insectorum, asellorum, scarabeorum, scorpionum. Nempe aselli in oleum violarum aut nymphæ infusi & expressi præstantissimum faciunt anodynum. Non cedit his ol. scarabeorum, si hi in ol. rosac. injiciantur vivi cum ∇. pauca & ad aquæ consumpt. coq. hinc exprimantur; denique

℞. Ol. scorpion. ℥j.

amygd. dulc. aut si opus est aliquali deterfione

amar. ℥ss. M.

Quæ blandè calefacta auri dolenti instillantur, patiente super aurem decumbente, aut etiam cum bombace paulò profundius imittantur. Porro, ubi nulla est inflammationis suspicio, optime convenit decoctum caryophyll. aromat. in vino, auri instillatum, ipso caryophyllo desuper applicato; urina pueri aut potius spir. ejus non adeò acris auri immiffus est egregius, it. convenit spir. otalgicus Mynsicht. aut Barbette in Anat. Pr. l. 2. c. 1. ubi vel spir. abstractus vel saltem essentia abstracta auribus instillari, aut cum bombace applicari possunt. Hic ipse quoque non tantum in obauditione, à quacunque causa sine inflammatione, sed etiam in tinnitu aurium & surditate est egregius, si duæ vel 3. guttæ instillantur & postmodum

modum auris  
mis acutus,  
sed cautè hoc

si dolo

lantur, aut  
gia auribus a  
Qua ratione  
eniam lac infu  
aurium inter  
absinth aut

Vel

tus ex myrrh

Vel

Sem. hyoscian  
gatur in aure  
ex ore &  
ol. destillat.  
etiam suffitu  
Sigrillus in a  
N.C. Ann. q  
tur sanguine  
sa injiciatur.  
lum ex pilis c  
palices infim  
Volent

dicto in gen  
in genibus  
odontalg  
appellatur.  
fernum oco



modum auris obturetur cum *bombace moschato* aut *ambrato*. Ubi dolor est nimis acutus, *spiritui* huiusmodi *otalgico* tantillum *essentie opii* addendum venit, sed cautè hoc fiat, ne auditum lædamus. Conf. *Forest. l. 20. obs. 1. 3. 4.*

*Si dolor aurium sit à vermicibus*, opera danda est, ut ii expellantur, aut intus enecentur, & ita extrahantur. *Lac tepidum* cum *spongia auribus* applicatum subinde allicit dulcedinis odore eosdem ut prodeant. Qua ratione etiam *pomum assatum* dulce auribus applicatum eos allicit. Vel etiam *lac* infundi potest. Sic enim *Panarolus Pentec. 4. observ. 27.* notat dolorem aurium intensissimum per *lactis* infusionem, evocatis vermicibus curatum. *Succus absinthii* aut *cucum. asinini, ol. nucl. persicorum rec. expr. ol. diacoloc. Quercet.*

Vel ℞. Ol. nucl. persic. rec. ℥j.

diacolocynth. Q. ℥ss.

℞. dulc. gt. ij. M. instilletur auribus, vermes enecat. It. *suffi-*

*tus ex myrrha* cum *essentia myrrhe* auribus instillata.

Vel ℞. Aloes, myrrh. an. ℥ij.

summit. absinth. Mss.

coq. in vino, pro injectione in aurem.

*Sem. hyoscyami* cum cera redigatur in candelas, quarum incensarum fumus dirigatur in aures, unde vermes mox excidunt. Sic vermes per suffumigia *amara* & ex ore & naribus excepta per aures expulsos vid. in *Salmuth. Cent. 2. obs. 39.* *ol. destillat. junperi, it. bals. sulph. tereb.* enecat animalia in aurem ingressa; sicuti etiam *suffitus gumm. ammon.* quædam ejecit. Conf. *M. A. N. C. Ann. 3. p. 480.* *Si gryllus in aurem irreperit, oleo infusionis gryllorum* denuò ejicitur. Vid. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 45.* *Si hirudo forsan in aurem irreperit, auris externa* perfundatur sanguine recenti, ad hunc enim prorepunt, vid. *Barth. Cent. 4. hist. 84.* vel ∇. *sa* injiciatur. Quod si *pulex in aurem se insinuaverit*, commendat *Riverius globulum ex pilis caninis* compositum, cum stylo in aurem immittendum, cum huic *pulices* insinuant.

Volent præterea frequenter articulationes quælibet in affectu

## ARTHRITIS

dicto in genere, quæ in specie, pro articulorum varietate, in pedibus *podagra*, in genibus *gonagra*, in manibus *chiragra*, in dentibus à *Strobelbergero* *odontalgia*, in coxendicis articulis *ischiadicus morbus* seu dolor appellatur. Præter quas partes tamen & *scapulas* & *vertebras colli* & interdum *sternum* occupat; imò observavi in sene admodum *podagrico* & *alteram nasi* quâ



quasi medietatem fuisse affectam. *Arthritis* fere per paroxysmos affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo satis commodè habent ægri. Quoties imminet paroxysmus, alvus ferè segnior evadit, ægri molestiam quandam haud bene explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur & circa articulos tensio percipitur. Hinc supervenit dolor circa articulos, qui in incipiente podagra, ut plurimum pollicem pedis majorem unius, hinc & alterius pedis successive occupat, hinc repetente aut procedente crebrius malo, alia etiam loca successive, *genua*, hinc *brachia*, occupare solet. Dolor, quam percipiunt ægri, fere triplex est, *pungens*, *lacerans* & *pulsans*, plus minus tamen intensus & interdum simul accedit cum tumore simul *erysipelaceo* in *arthritide calida*; in qua etiam arthritis omnia symptomata sunt atrociora, sed simul paroxysmi sunt breviores, quam in *podagra* dicta communiter *frigida*, in qua dolores remissiores, & tumor plus minus *oedematosus* cum nullo vel levi saltem rubore affligit, diutius tamen persistente paroxysmo, nec tam facile evanescente tumore. Ægri ut plurimum anxii sunt circa præcordia in paroxysmo, præsertim in incremento ejus, minus in statu; conqueruntur ægri de ardore seu aestu circa regionem stomachi, hinc frigida appetunt, it. de gravissima siti & anxietatibus præcordiorum, stomachi monstrando regionem, quæ sunt eò graviore, quò minus potui se onerant. Appetitus penitus est prostratus, *clysmata* autem & blandè laxantia optimè anxietates has leniunt. Subinde accidit, ut cum crebrius repetito, sed inani vomendi conatu affligat, sicque anxietates insigniter exacerbet; imò observavi, quod cum *lipothymis* gravibus subinde repetentibus paroxysmus in principio & incremento ægros, præsertim in inveterato malo laborantes vexaverit, quæ pathemata tamen in ejus statu dum dolores & tumores increverunt, & plures partes occupatæ fuerunt, penitus remiserunt. Accedit fere semper *febris symptomatice continua*, non adeò quidem acuta, minus tamen in principio paroxysmi affligens, mitius in statu, quam ad febrium catarrhalium naturam accedere asserit Sylvius l. 4.

Hæc ipsa *symptomata* etiam in dolore ischiadico fere occurrunt, ubi dolor præter hos, & in articulo, ubi femoris caput inseritur *coxendici*, imprimis percipitur, etiam *clunes seu nates* hinc intra ossis sacri & lumborum regionem plus minus occupans; quin nervorum & membranarum connexarum & deorsum protensarum ratione, inferius versus *suram* & *pedem* usque, & ad extremum malleolum tandem extenditur, nocteque fere gravius affligit, & quia partes primario dolentes in profundo, sub tegmine copiosiorum musculorum, delitescunt, fere nulla extrinsecus mutatio facta conspicitur.

Sæpius

Sæpius eo  
occupant, & sub  
dicum constitut  
brius redeant p  
tantur articuli,  
ticam quasi con  
ant, subinde lax  
membra, aut fa  
motum articul

*Ischiadic*  
nem, aliquand  
ferum si in par  
lis vestigia rel  
calimotu & a  
pervenientib

*Pars*

ta, adeoque m  
& colligantia.  
tioni proximi  
profundo in  
quod articulo  
rasset / quæ  
mentum liga  
intra articulo  
articulationes  
inquinari impi  
niunt, dum p  
synovia ista a  
seu *gypseam*  
articulos er  
omnino rep  
rum topho

Quoad  
borum *Prin*  
tamen gene  
& partes v  
*Prima hui*  
gestionem pi  
*Pars*



Sæpius equidem dolores alii istam *superiorem cruris & coxarum regionem* occupant, & subinde pertinaciter affligunt, non tamen præcise dolorem ischiadicum constituunt. Conf. *Senn. Tr. de Arthrit. cap. 6. p. 45.* Quod si crebrius redeant paroxysmi, ac pro more vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli, ac motus eorum multum imminuitur, adeo ut tandem ad paralyticam quasi constitutionem redigantur, flaccescant simul, & in nutritione deficient, subinde laxentur. Interdum circa articulos contrahuntur & rigida manent membra, aut saltem intra articulos contracturæ seu *tophi & nodi* colliguntur, qui motum articularum impediunt.

*Ischiadicus dolor* speciatim ad claudicationem, nonnunquam coxa luxationem, aliquando cruris atrophiam disponit. Imo si inveteratum fuerit malum, præsertim si in paroxysmi declinatione sudores neglexerint ægri, pertinacia in articulis vestigia relinquit arthritis, adeo ut levi occasione & vel fortiore saltem articuli motu & agitatione mox nonnihil recrudescat, aut saltem punitionibus supervenientibus se manifestet.

*Pars affecta* erit pars admodum sensilis circa articulos saltem situata, adeoque nil aliud, quam *membranea ligamenta*, ipsos articulos vincientia & colligantia. Quin imò his affectis ipsum *periostium* in locis ossium articulationi proximis pati simul, probabile videtur ex acerbitate lacerante doloris, in profundo inprimis siti & apparenter ossium capita immediate afficientis. Sed quod articulos in specie afficiat, videtur esse ex *synovia*, seu *▽. glareoli*, das Gliederwasser / quæ est ros dulcis chylosus seu alcali temperato turgidus, qui ceu nutrimentum ligamentorum & membranarum, ipsorumq; fortan ossium, abundans intra articulos collectus pro motu facilitando & instar axungie oblinens ossium articulationes: Hoc ceu appropriatum specifici arthriticorum acidi objectum inquinari inprimis solet, quo facto mox varia circa articulos pathemata superveniunt, dum partes vicinæ membranaceæ necessario rodi incipiunt, hinc successive synovia ista ab acido peccante instar albuminis ovi spissari, & tandem in *cretaceam* seu *gypseam substantiam* coagulari solet, ut patet ex *tophorum* seu *nodorum* intra articulos collectione, qui incisionis via exempti *calceum & gypseum tophum* omnino repræsentarunt, & effectum, non causam arthritidis constituunt, quorum tophorum examen Chymicum vid. in *Kerkring. Spicileg. obs. 28.*

Quoad causam efficientem omnium optimè eadem in *Tachen. Morborum Principe* expressa & explicata videtur; nempe *acidum vol. spirituosum*, sui tamen generis seu specifici saporis, spiritui influo maritatum synoviam inprimis & partes vicinas membranaceas inquinans & affligens, primarius tortor est. *Primarius acidi spirituosus origo* est ex primis viis, quam potius ex depravata digestionem prima cum *Tachenio*, quam ex Pancreate aut glandulis cum *Sylvio* de-



rivare placet, adeoque non in pedum articulis ipsam podagram esse rectè dicitur, sed ejus solum fructum, cujus radix habitat in stomachi fermento vitali, ita ut licet dolentem pedem absideris, podagram proinde non sanaveris. *Quod si mature non occurratur malo*, acidum illud spirituosum furtive & successive acido stomachi fermentativo se associat, donec fermenti more pederentem hoc superet, ita ut in posterum nec naturali nec artificiali separationi obediat, adeoque inveteratum incurabile sit, ut elegantur loquitur *Tachenius c. l. p. 438.*

*Hinc nempe 1. hereditaria* observatur *podagra*, cum spiritu influo geniali odore acido podagrico communicato foetui. *Nobilem curavi juvenem*, qui ab ineunte 8. ætatis anno sapius podagra correptus fuerat, quod parens ejus & ipse insigniter podagricus in ipso paroxysmo eum genuerat. *Hinc 2. etiam animi pathematibus gravioribus aut diuturnioribus* curata observatur podagra, ut *subitanea consternatione*, aut *ira* insigni aut *mœrore* diuturno, ut in divitibus vel pauperioribus factum. *Conf. Barthol. Cent. 6. hist. 28. Lotich. observ. p. 489. Salmuth Cent. 1. obs. 48. Tachen. Morbor. Princip. p. 356.* quò etiam pertinet *tortura* ex *Hildan. Cent. 1. observ. 79.* Nempe perturbatio animi & spirituum peculiaris motus ac alteratio extinxit *fermentum podagricum*, aut saltem plus minus alteravit illud, principaliter quidem in stomacho primario, qui cum reliquis præsideat digestionibus, & has exinde alterari necesse est, vid. *Tachen. c. 1. p. 357. 360.* quantum nempe animi pathemata fermenti digestivi & hinc digestionis primæ negotium alterent; quo etiam *confidentiam agri erga Medicum* vel remedia pertinere per se notum est. *Hinc 3. ut plurimum etiam arthritici nephritici esse solent*, eodem acido spirituofo utrobique autore. *Hinc 4. lacticia*, modernorum methodò, sed continuato usu, ut invertantur quasi humores corporis, spir. & fermentum digestivum, curant arthritidem. *5. Vini abusus* volat. acidiratione spir. in primis afficiens plures in hoc malum præcipitat. *Observanda tamen differentia inter vina*, dum ea quæ plus de tartaro vel acido facile fermentante in nobis continent, nocentiora sunt. Quo alia vegetabilia plus minus tartarea pertinent, ut rectè asserit *Glauberus.* *Hinc 6. abstinentia vini* e contra quosdam ab arthritide deliberasse observata est. Vid. *Sennert. c. l. pag. 15.* Sic *Lotich. in obs. p. 88.* refert podagram ex abstinentia per integrum annum cessantem, sed hujus copiosa ingurgitatione recidivantem.

Ex eo est, quod in arthritide producenda tria ista vulgò nota ceu *causæ remote principales* conspirare videantur, dum *Bacchus* ceu *Pater*, vini quo innuitur nocivum acidum, ex nimio abusu à fermento stomachico min<sup>o</sup> debite superabile ac corrigibile: *Venus* ceu *Mater*, quaten<sup>o</sup> repetito congressu post copio-

copiosos spiritus  
succus nutriti  
ceus observari  
augendo, adeo  
thritidis foetu  
mina arthritid  
rent podagra,  
secundum Sen

Par ratio  
Hippocrates p  
dagra asseru  
nuerunt; h  
sior nata & u  
inter podagi  
vol. 4. p. 154  
Scorbutu  
atrocius afflig  
rit à Bartholin  
6. p. 205.

Acido  
moto, quod  
turam debet  
se insinuat  
mul aliqual  
mam partem  
rum cesset a  
quam acido  
cessante fibr  
tionem per  
Sen

affligentes r  
insiti aliquid  
rum nervo  
bus infixa  
ne ac motu  
commotio  
co, inprin  
penetrante



copiosos spiritus influos, chylo temperato alcalinò prædives sub genituræ forma succus nutriti<sup>9</sup> excernitur, & hinc nervosum systema insigniter debilitatur: & *ira* ceu *obstetrix*, commovendo contenta corporis & spir. & acidum volat. in nobis augendo, adeoque & spiritus influos asperiores reddendo, in producendo arthritidis foetu occupata rectè dicuntur. *Dictis ex causis* & *vir magis, quam femina arthritidi obnoxia* dicuntur, cum ex Hipp. sect. 6. aph. 20. mulieres non laborant podagra, nisi menses deficient: Utut hodie contrarium experiri liceat, cum secundum *Senecam* non natura, sed vita mulierum mutata sit.

Par ratio est *Eunuchorum*, quos nec podagra laborare, nec calyos fieri olim *Hippocrates* pronunciavit. It. *puerorum*, quos ante  $\varphi$  is usum non laborare podagra asseruit. Quæ ita quidem sub præsci ævi innocentia & temperantia obtinuerunt; hodiè vero ex parentum & avorum vitis ipsa progenies adhuc vitiosior nata & ulterius exorbitans dictorum veritatem eludit. Non secus ac *Ciconia* inter podagræ remedia relata, tamen & ipsa podagrica observata in *Actis Hassæ*. vol. 4. p. 154.

*Scorbutici* quoque admodum obnoxii sunt podagræ, quæ subinde eos atrocius affligit. Curiosum est quod *contagiosa* interdum observata fuerit à *Bartholino Hist. Med.* 59. idque mediantibus vestibus in *M. A. N. C. Ann.* 6. p. 205.

*Acido* igitur *arthretico spirituosus* cum spiritibus quavis occasione insignius commoto, quod v. g. in motu corporis aut animi, aëre frigido, humido, pororum aperturam debitam prohibendo, post effervescentiam in sanguine febrilem imprimis se insinuat synoviæ, & hujus medio articulorum loca affligit, & cum hac ipsa simul aliqualem probabiliter effervescentiam facit, donec acido spirituosò maximam partem ab eadem intra articulos suscepto, ulterius illa spirituum & humorum cesset agitatio, sed in articulis malum adhuc hæreat, non citius cessans, quam acido spirituosus saturatus ab alcali & in flum volatile mutatus; hinc dolore cessante fibrarum contractura cessat, & pori aperti magis liberiores transpirationem permittunt, quo factò omnia reliqua symptomata absunt.

*Sed observandum crebrius vel recurrentes paroxysmos vel diutius articulos affligentes* relinquere sui vestigia, h. e. ultra partis dolentis debilitatem, ex spiritus infiti aliquali deficientia, obruti plus minus à spirituosus acido peregrino & fibrarum nervearum relaxato tono, ipsis partibus membranis solidis antea dolentibus infixæ permanere de acido peccante occulta spicula, quavis & facili occasione ac motu in actum dolorosum excitabilia & spirituum reliquorum hinc facta commotione paroxysmum novum provocantia. Nempe ex acido isto podagrico, imprimis in fermento digestivo stomachi commotò & hinc totum corpus penetrante anxia ista præcordiorum pathemata originem ducunt. *Patet autem*



ex dictis, utut in quovis paroxysmo debilitentur plus minus articuli seu partes solide, fluidas tamen tam humorosas quam spirituosas eo ipso quasi depurari, siquidem non tantum acidum illud spirituosum spiritibus satiatum, dum synovia inquinat, illorum spirituum consortium plus minus deserit, sed etiam subinde alia M. S. heterogenea fermenta, febrili effervescencia secreta, nunc una circa loca dolentia colliguntur, ex fibrarum partium dolentium contractura; nunc per sudorem excernuntur in declinatione, sicut in incremento hi ipsi moderate proluciti maturant articulorum ab acido podagrigo invasionem, & hinc abbreviant insigniter paroxysmi tempora.

Hac ipsa etiam patefaciunt, quare tam varia & mirabilia pathemata subinde accidunt, acido podagrigo alias partes ac frequentissime nervos plexus occupante extra articulos, quæ omnia superveniente paroxysmo cessant, vid. M. A. N. C. Ann. 6. p. 307. Sic arthritidem in Colicam & contra mutabilem refert Castro; Epilepsiam gravem notat Lotichius; sicut paroxysmo non rite procedente, nec acido volatili sufficienter excluso, vel ob internarum partium defectum spiritibus istis languentibus & acido podagrigo nimis in contentis corporis dominante, vel ob externorum ineptam applicationem, tam diuturna virium prostratio & languor & appetitus defectus supersunt: Interdum palpitationes cordis, sæpissime tussis sicca, aut sæpius adhuc asthmata occulta convulsiva, subinde ipsa mors superveniunt.

Quoties arthritici, quibus plures articuli aliàs occupari solent, paroxysmò corripuntur, qui non more consueto successivè articulationes istas quoque occupet (nisi per curam præservatoriam malum plus minus in radice mitigatum fuerit) ii vel diutius languidi permanent, vel brevi post novo paroxysmo corripuntur, vel alius gravioris morbi, aut etiam mortis ipsius periculum subeunt: Id quod notavit etiam Sennertus de arthritide c. 4. ut & Hoferus Hercul. Med. p. 222. Hinc in podagricorum vel leviter confirmatorum & aliis morbis correctorum cura ad acidum podagricum simul respiciendum venit, quod in omnibus aliis morbis symptomata intendere & morbum vel graviolem aut contumaciorem reddere solet, idq; tamdiu fere, donec vel ipsum vi naturæ aut artis correctum fuerit, aut artus occuparit, quo facto omnia remissiora & leviora mox apparere solent.

Ex hætenus enarratis prognoseos maxima dependebit ratio. Nam 1. arthritidis morbus lethalis non est. Sæpe enim arthritici diu vivunt, senesque fiunt, unde quibusdam sine gesunde Kranckheit dicitur, & potius ex podagra deficiente, quam eadem ordinaria ratione superveniente moriuntur.

2. Curatio eius perquam difficilis est, tam in quam extra paroxysmum idque eò magis, quo magis inveterata fuerit. Hinc quoniam sæpius in primis paroxysmis

roxysmis negligenter distinguit inter illam incurabilem referretur. Interea hilominus tam aque rebellis

3. Si in bilis est, membris & ligamentis lata collecta diuturno co

4. Si in unt, perniciosa, eò diffidentibus ag

5. Soloxysmo diffi

successu temp

gricus in ma

intercutaneis

quantur. (

plane deficit

mum est, &

Quoac

caretur. 2.

Qu

tura vigeat,

tibus parox

vendus, imp

tia nimis sy

nistratone

I. A

prop. Na

tus sine ma

muntur. I

minu insu



roxyfimis negligitur, facile successivè incurabilis evadit. *Rhumelius* eleganter distinguit inter *podagram hereditariam*, *nodosam* & *solutam*: & hanc curabilem, illam incurabilem ait. Sed tamen m. *soluta*, nisi recens, subinde inter incurabiles refertur. Inter omnes arthritidis species *ischiadicus dolor* gravissimus est, nihilominus tamen in principio facilius, quam cæteri curari solet, sicut in progressu æque rebellis esse solet.

3. Si in arthritide contingat luxatio, difficulter sanatur, aut prorsus infanabilis est, membranæ & ligamenti nimis laxatis, repositum membrum membranæ & ligamenti non firmiter; ut taceam intra articulos ex synovia coagulata collectam materiam curam impedire. Hinc Hippocr. sect. 6. §. 59. quibus "diuturno coxendicum dolore infestatis, coxa excidit, rursusque incidit, iis mucroes superveniunt.

4. Si dolores sensim ingravescentes ad ingulum & superiores partes transeunt, perniciem minantur. Item quò plura & frequentiora conveniunt symptomata, eò difficilior curatur, ut sit quando ab externis repellentibus, aut stupeficientibus ægri in anxietates, lypothymias aut alia mala incidunt.

5. Solvitur arthritis fere 4. modis. (1.) Ordinario fere in totum finito paroxysmo discutitur morbus in articulo, ut nullum sui relinquat vestigium, nisi successu temporis superveniant topi. (2.) Rarum est, quando tumor podagricus in materiam ichorosam aut sanie purulentam mutatur, quæ partibus intercutaneis erosæ foras exsudat. (3.) Quando topi post paroxysmos relinquuntur. (4.) Quando incipiens paroxysmus sua tempora non absolvit, aut plane deficit, acido podagrigo alias partes extra articulos occupante, id quod pessimum est, & mille mala post se trahit.

Quoad curam duo respicienda sunt tempora. 1. Tempus paroxysmi, ut curetur. 2. Tempus extra paroxysmum ut præservetur.

Quoad paroxysmi tempus, cum in hoc imprimis motus natura vigeat, cuius impetu ille excitatur, unde ex deficiente naturæ robore deficientibus paroxysmis ægri in periculoso sunt statu, ob id non sistendus, sed promovendus, impedimenta removendo, acidi specifici vim maturè infringendo, urgentia nimis symptomata mitigando, semper simul pro legitima remedium administratione 4. particularia membrorum tempora attendendo, adeoque

I. Ingruente podagra vomitus convenit, sed præmissio usu lap. Co. præp. Nam acidum ejus oritur in stomacho, hinc imminente podagra appetitus sine manifesta causa est prostratus, & sudores consueti alias sponte supprimuntur. De quo vomitus usu vid. Sylv. l. 4. cap. 8. §. 152. & 156. Sin minus vomitus institui queat, purgantia blanda, sed mistis temperantibus acida,



v.g. osibus hum. præp. vel calcinatis &c. conducunt, aut pilula aloëtica cum appropriatis propinentur, ad imitationem Tachenii p. 439.

II. *Opiata* solum nunquam proficua nec internè, nec externè. Sic enim malum contumacius reddunt, utut dolores remittant, motumque naturæ impediunt, & ut vocant: *Sie behalten das podagra im Leibe*. Imò *abusus opiatorum* ad paralyfin arthriticos disponit, vid. *M. A. N. C. ann. 4. p. 335.* adeoque cautè usurpentur, nec nisi præmissis universalibus, nec nisi adjunctis purgantibus, aut sudoriferis, aut specificis. Suspicio tamen commodè propinari posse eadem ingruente paroxysmo, præmisso vomitu cum specifico sudorifero. Quoad *mistionem cum purgantibus* illustrant hoc pilule antipodagrica Rhumeli, quas vocat: *Veni amice, surge & ambula.* &c. MP. aloephag. ʒij laud. op. ʒss. M. F. Pilul. divid. in part. 4. æquales, cujus una pars in vino assumenda & 3. vel 4. horis jejunium imperandum. Conf. etiam quoad opiatorum usum *Velschium Hecat. 2. obs. 27.* Mistio vero cum diaphoreticis etiam vulgo nota est.

III. Sicut ergo *diaphoretica* opiaris maritata intra paroxysmum, sic *diuretica* extra paroxysmum in cura præservatoria sunt optima, quæ duo in plurimis conspirant, ita ut unum alterum sublevet; *Utrobique* ergo profunt *alcalia* tam fixa quam volatilia, acidum podagricum & corrigentia & correctum eliminantia. Imprimis verò *diuretica* tam in præservando quam curando sunt optima, magis tamen in præservando, & speciatim nulla purgantia, nulla violenta sudorifera tantum valent, quantum appropriata diuretica, imprimis volatilia, qualia sunt *spir. 9\*ci*, *spir. carminativus de tribus*, qui aliquoties multum præstitit in abusu vini, ad præcautionem variorum malorum, quatenus utinam movit. Sic egregia *lumbricalia* in podagra ad diuresin, item *arcanum duplicatum Myns.* præmissis fixis est nobile. Hinc *scarabæi*, speciatim unctuosi, *die blaue Meyesenfer* nobile suggerunt remedium ad podagram per urinam, utut cum dolorosa stranguriâ operentur. Vid. *Borelli Cent. 4. obs. 24.*

IV. *Extra paroxysmum* porro *dieta* exactissimè est observanda arthriticis, quam præ aliis commendant maximè Recentiores. Sicut enim hæc neglecta fecunda podagræ mater est, ita observata eadem hunc suum fœtum abortivum rursus abolet. In specie verò *dieta sudorifera* & *dieta lactea* hæc remedii vim obtinent, cum funditus iisdem podagra eradicata sit. Antiquis illa magis in usu fuit, hæc vero Modernis, sicut de hac posteriori vid. *Greselius* qui integrum Tractatum edidit de cura lactis in arthritide. Cui sociari poterit *disputatio* lectu dignissima de cura lactis podagricorum solatio, à D.



à D. D. Waldschmidio Marpurgi nuper habita, ubi aliquot hujus rei experimenta videbitis.

*Remedia* quod concernit, eadem prorsus hîc conveniunt quæ supra de doloribus in genere sunt laudata, varia nempe *nervina*, *aromatica* & *volatilia*, *calefacientia* vulgò dicta, quæ *sale* suo *volatili* acidum podagricum invertere & per transpirationem insensibilem eliminare solent; quibus in specie semper adjungantur *specificæ* & *appropriatæ*, *chamædrys*, *chamæpythi*, *uva arthretica*, *spir. 4\**. *spir. & sal. vol. lumbricorum* &c. quæ vid. in Sennerto, Riverio, Willisio & aliis, ubi & plures inde concinnatæ *formule* occurrunt.

Quoad *externa* fugiantur nimis *unctuosa* pingua, quæ poros oblinendo malum sæpiusculè potius exasperant, & insensibilem transpirationem inhibendo tandem contumaces *contracturas* inferunt, unde loco *unguentorum* potius *emplastra* varia *nervinis* constantia, & *cataplasmata calida* sunt adhibenda, quæ ipsa tamen sæpius renovanda, ne actuali suo frigore postmodum stricturam pororum inferendo malum exasperent. Excellunt hæc *saponacea* & ex iis paratus *balsamus antipodagricus Rhumeli*, item *Sapo Venetus in S. V.* dissolutus & applicatus, siquidem *in forma liquida* quæ adhibentur, majorem sæpe & tutiorem effectum relinquunt; hinc  $\nabla$ . *artic. ad extra*,  $\nabla$ . *calc. viv. spir. lumbric. spir. 4\** & alia supra laudata, sunt optima.

Ex *Chirurgico fonte* *vesicatoria ex cantharidibus* imprimis conveniunt, tam *præservativè*, quàm *curativè*. Quin & *fonticuli* sæpius non sine fructu excitantur, qui ut in affectibus serosis præprimis conveniunt, ita paroxysmos arthreticos quoque egregiè præservare solent. Quo & *cantheria* tam *potentialia* quam *actualia* referenda & hæc inter *MOXR Sinitica* inustio, quæ haut ita pridem specificè ad hunc affectum innotuit, cui tamen & *moxam Germanicam* substitui posse rectè asserit Dn. D. Wedelius in *M. A. N. C.* Dec. 2. Anno 2.

## CAPUT X

## DE

## VARIIS VISUS LÆSIONIBUS.

Post *tactum* sensus externos inter eminet *visus*, qui 4. modis, *leditur*. I. Quando penitus *abolitur*, in *cecitate*. II. Quando saltem *imminuitur*, ut in *visus hebetudine* variâ, quando objecta longa obscure, aut propinqua licet



licet & minuta, difficulter conspici possunt. III. *Depravatur*, idque variè, *vel* quando res una apparet duplex; *vel* quando res integræ dimidiatæ apparent; *vel* quando res videtur perforata; *vel* denique quando res videntur apparentes, quæ non sunt, ut *floculi*, *musca* &c. Pertinet huc *duplex* illa *visus læsio*, 1. quando objecta remota optimè, propinqua vero difficillimè videntur, & vocatur *senum visio*. Huic 2. contrarium vitium est, quando propius admotæ, etiam minutissima, optimè videmus, remotiora difficulter & vocatur *myopia*.

IV. Denique vitatur visio, quando videtur *augeri*, quod fit, quando objecta, etiam naturaliter constituta, nimis *colorata* & *splendida* apparent, ita ut visus omnibus majorem gradum tribuat, unde fieri solet, ut talis visio non absq; dolore & oculi læsione percipiatur.

Hæc in genere de visus læsionibus. In specie jam considerabimus *affectus oculorum* frequentiores, & quidem eò ordine, quò radii visivi oculi membranas & humores trajicere solent: Ubi 1. *læditur visio*, quando *ingressus radiorum per pupillam impeditur*, propter corneæ perspicuitatem ablatam, quod fit in specie ob *tunicam* quandam ab uno oculi angulo, ut plurimum à cantho majore circa nasum frequentius enatam, quæ successivè accrescendo, ad pupillam pervenit & corneam obtegit, & sic foramen pupillæ clauditur, & nullus radio visivo transitus conceditur. Græcis malum id dicitur *πτερυγιον*, Latinis *ungula* seu

## UNGUI.

*Tunica* hæc non semper uniformis existit, nunc *planatenuis* & *albida* esse solet & propriè *tunica* appellatur & *unguicula*. Interdum est *carnosior* & tunc dicitur *PANNUS* ein *Gell über dem Auge*. *Causa* hujus excrescentiæ est eadem cum reliquis excrescentiis in corpore: Nempe nullæ excrescentiæ fiunt, nisi præcedente læsione in uno vel altero oculi angulo, ut dissolvatur continuitas in carne. *Modus* est hic: Quando in ophthalmia lachrymæ *stimo-acidæ*, aut acres carnem in angulo majore arrodunt, hincque membranam adnatam lædunt, nutrimentum inde transudat & coagulatur in concretum ejusmodi membraneum. Prout igitur nutrimentum elapsum plus minus vitatur, etiam tunicarum *diversitas* oritur, ut alia dicatur *benigna*, alia *maligna*. Hæc *maligna* seu *cancrofa* est, quando pannus lividus, obscurus & dolorosus est; quin imò, si fortius penetravit ista rosio, & vasculæ sanguinis lædit, hinc sanguis novas vias efficit & repræsentat venulas. *Benigna* vero est, si pannus est candidus, clarus, tenuis, nec crassus, & indolens.

Quoad



Quoad *prognosin*: Unguis gravis tandem cœciritatem infert. *Recens* facile curatur, *vetus* difficulter. *Tunica cancroſa* non attingenda, item ſi cum pterygio incipit & progreditur.

In *CURA*, *Tunica* hæc præternaturalis removenda, aut medicamenti abſtergentibus & blandè erodentibus, aut operâ *manuum Chirurgicâ*: Hinc blande adstringentibus poruli firmandi.

Conveniunt igitur ſacch. candum, mel, vinum alb. oſſa ſepia, CC. uſtum, teſta ovorum calcinata. Item  $\nabla$ . ophthalm.  $\nabla$ . euphraſia. chelid. maj. fœniculi, quibus infundatur *crocus metallorum*; vel  $\mathcal{R}$ .  $\mathcal{S}$ .  $\mathcal{Z}$ j. diſſolve in  $\nabla$ . roſ. & fœnic. aa. q.  $\vee$ . M. pro collyriô. In ſpecie conveniunt *fella piſcium*, *fella luci piſc.* ejusq;  $\nabla$ . deſtillata. It. hujus *eſſentia* mirè conveniunt in reſolvenda hæc tunica: Propinandi modum vid. in *Sennerti Prax. lib. 1. pag. 796*. It. in *Hartmanni Prax. Chym. p. 99*. Vel  $\mathcal{R}$ .  $\nabla$ . leucop. bulb.  $\mathcal{Z}$ j. in quo diſſolv. *fella luci piſcis*  $\mathcal{Z}$ j. M. Filtr. & oculis applicentur. Loco *fella luci* ſecretum eſt ali. rum *fel humanum*, deſtillatum ex cucurbitâ, per alembicum æneum. Ex ſtercore *anſerum juniorum*, menſe April. collecto etiam  $\nabla$ . per alemb. deſtillata eſt egregia ad hæc & alia oculorum vitia. Si pertinacius malum, ad  $\nabla$ . *Sapphirinam Chirurgorum* progrediendum, mox poſt  $\nabla$ . deſtillatas, quæ variè dilui poteſt. In ſpecie *ſuccus chelidon. maj.* expreſſus, dilutus cum *roſe fœnic.* inſidente, abſumit tunicas. *Vitriol. album* laudat *Poterius Cent. 2. obſ. 8*. Facit huc *collyrium Lotichii*, quo unguem ſecundum *D.* motum nunc accreſcentem, nunc decreſcentem delevit:

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$ . roſarum.  
euphras.  
fœnic. aa. q.  $\vee$ .

His aquis miſceatur ſequens pulvis, quæ miſtura cum pennâ tunicæ illinatur, cavendo pupillam:

$\mathcal{R}$ . Lap. hæmat.  $\mathcal{D}$ ſ.  
vitriol. alb. gr. xv.  
myrrh.  
croci aa. gr. v.  
ſacch. candi  $\mathcal{D}$ j. M.

Hactenus de *impedito radiorum ingreſſu per pupillam*. Sed præter hunc evenit ſæpe, ut *pars cornea perſpicua*, foramini pupillæ obteſa viſum obſcuret, quando *cræſcit*, aut vitioſum colorem contrahit, qui radios impedit, quo minus penetrare, aut ſi penetrent, vitioſo colore tincti ſint.

Vitium hoc fit *primò*, quando in nutritione corneæ perſpicuæ alimentum nonnihil craſſius & viſcidius ſuggeritur, id quod in *cauſa* eſt, ut obſcurata



nonnihil corneâ, ægro omnia obscura & quasi per nubeculam appareant, unde & NUBECULA oculi appellatur. Secundo fit hoc vitium, quando CICATRICULA ab erosione tunicæ corneæ v. g. in variolis generatur, quæ si crassior sit & albedinem repræsentet, ALBUGO dicitur seu

## LEUCOMA.

Tertiò fit hoc vitium, si post ictum aut casum in oculos sanguis congruatus in albo oculi hæret & vitiosos colores efficit, quod malum SUGGILLATIO dicitur.

*Causæ antecedentes* horum malorum ex ægrorum relatione patent.

Quoad *prognosin* cicatrix difficilis est curatu, idque eò magis, si crassior & diuturnior fuerit *nubecula*. *Suggillatio* facile removetur in pueris, modo tractabiles sint.

In *cura*: *Nubecula* materia crassa removenda: *Leucomatis* macula & *cicatricula* abstergenda: In *suggillatione* sanguis congruatus resolvendus & discutiendus.

Conveniunt igitur seqq. *remedia*: *Sem. sclarea* sive *hormini sylvestris* *Scharlach* oculo impositum, quod maculas & albuginem abstergit. *Succus fœniculi c. bals. Peruviano*.  $\nabla$ . *mellis simpl. & composita*, quam habet *Amatus Lusitanus Cent. 4. Cur. 35.* *Succus anagallid. fl. cœruleo, succus chelidonii*,  $\nabla$ . *sapphirina*. Vid. *Riv. Cent. 3. obs. 45.* Vel experimentum *Plateri*

$\mathcal{R}$ . Pulp. pom. odorat. quartarium, incide minutim & in  $\nabla$ . ros ac fœn. coq. ad pultem, add. mucilag. fœnugr.  $\mathfrak{z}$ ij.

alb. ovor. n. ij. vel iij.

lapid. hæmat. præp.  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{z}$ j.

cortic. granat. pulverisat.  $\mathfrak{z}$ ij. M. F. cataplasma oculo imp.

Idem cataplasma etiam *Horstius* laudat *lib. 2. obs. 39.* Tandem *liquores* parati ex *fl. cich. aut fl. cyani*. Vid. *Sennertus & Hartmannus*.

*Ad suggillationem* valet *fotus* ex  $\nabla$ . *chærefol. fl. cyani* cum lint. multiplicatis. It. *Decoctum rad. symph. & sigill. Salom.* Vel *linimentum* contra livorem *faciei Mynsichti pag. 503.*

Porro per pupillam transiens radius visivus ulterius penetrat *humorem aqueum*, qui limpidus esse debet; Si verò in humore hoc aqueo inter pupillam & hum. crystallinum impedimentum aliquod se offerat, quod radiis transitum neget, visio tollitur. Fit hoc si in humore aqueo *membrana* quædam colligatur & concreseat, quæ vulgò

## CATA-



## CATARACTA

dicitur, malum vero ipsum SUFFUSIO appellatur, Germanis *der Stahr*.

*Causa* hujus *cataractæ* est materia illa, unde in suo esse conservatur humor aqueus, quæ impura reddita, perspicuitatem humoris aquei tollit. Hæc ipsa materia si particulis excrementosis referta, ita ut hæc tandem in *membranam* concresecant, quæ pupillam vel in totum vel ad partem obtegat, suffusio oriri solet.

Hæc est *suffusio vera*; præter quam & *suffusio notha* datur, *jejunis* imprimis familiaris & iis qui *stomachi debilitate* laborant. Item in *statu februm* talis subesse solet, dum *flocculi*, *musca* aut similia ante oculos versari videntur.

Distinguendum autem est inter *suffusionem* & GLAUCOMA: Hoc enim tale *humoris crystallini* vitium est, quando ex perspicuo obscuratus & albedine fusca inquinatus est, quod quidem vitium *senibus* tandem naturaliter accidere solet.

Quoad *prognosin* horum pathematum, ea *suffusio*, in qua uno oculo connivente alterius pupilla dilatatur, curari potest aut per medicamenta aut per ~~medicamenta~~ aut per Chirurgiam. Si vero pupilla non dilatatur, incurabilis est. *Cataracta confirmata*, ubi ægri lumen admotum vix vident, medicamentis non, Chirurgiâ difficulter curatur. *Recens* facilius, *vetus* difficulter curatur. Quo *magis alba*, eò major salutis spes; *nigra* fere nunquam curatur.

Pro *cura* *substantia* ista *heterogenea* ante sui concretionem *discutienda*, concreta *resolvenda* & *dissipanda*, aut saltem Chirurgicâ manu *deprimenda*.

*Remedia* quæ hæc conveniunt, sunt præprimis  $\nabla$  *ophthalmica* & *ales*, vid. *supra*, ubi de *ophthalmiâ*. Juxta has *Forestus* mirè laudat liq. *hepatis mustelæ piscis*, *Ferdinandus* verò  $\nabla$ . *destillat. ex stercore humano*, cui infund. *fel mustelæ piscis*. It.  $\nabla$ . *ophthalmica Quercet. ex vitriol. & urin. pueri*, vel  $\nabla$ . *ophthalmica Zingiberata Hartmanni in Praxi Chymiatri. cap. 43.*

Ex Chirurgiâ præter *depressionem acu faciendam* conveniunt quoque *vesicatoria* in nucha, *fonticuli*, *setacea* & hujus farinæ alia.

Tandem si radius visus pertingat quidem rectâ per totum oculum, usque ad tunicam retinam eamque feriat, nulla verò sequatur visio, utut nulla sensilis in oculo appareat læsio, tunc vitium dicitur



## GUTTA SERENA,

& est omnimoda *cæcitas*. Vitii hujus *causa* quærenda est ferè semper in nervo optico ejusque *expansione*, quæ *tunicam retinam* constituit. Quando nimirum *nervi optici* vel *obstructi* vel *compressi*, vel alio modo *lesi* sunt, ita ut spiritus animales per illos influere nequeant, necessario *cæcitas* supervenit, hinc interdum fit ut post alios morbos superveniat gutta serena, ex obstructo nervo optico; sic ex scabie retropulsâ cæcitatem habet Sennertus l. 3. Prax. It. ex sublatâ natta Horstius in obs. Ex ulcere pedis intempestivè clauso similem guttam serenam notat Timæus in Consil. pag. 60. Sed præter hanc *causam* in nervo optico, hujus *expansio* in bulbo oculi, quæ *tunicam retinam* constituit, quandoque causa est guttæ serenæ, quando in *tensione* sua deficit & ita *flaccida* evadit, ut à nullo radio visivo moveri possit.

Quo facit, quando ex *causis externis* obpercussione oculi, *casum* incipitur, fortemque *sternutationem* laceratur quasi vel alio modo vitiatum. Quo diuturnus Ois *aspectus* pertinet, aut continuata *De plena inspectio*, cujus exemplum habet Henricus ab Heer in obs.

In *prognosi* senes naturaliter quoad *visum* hebescent, interdum relaxata tunica retina omnino excecantur, malo incurabili. In genere omnis gutta serena difficulter curatur. NYCTALOPIA, si interdum rectè, vespere parum aut nihil videtur, raro curatur.

In *cura* conveniunt ea, quæ per experientiam *visum* confortare observata fuerunt, tam interna, quam externa. Internè pil. aloëphangina, infusum senne cum ð. Tart. in ∇. euphr. & fœniculi. Pil. ex extr. panchym. cum ol. fœnic. Pulv. hermodactyl. qui singulariter laudatur à Deodato in valetud. p. 153. Porro aromatica conducunt, sed acrimonia manifesta, allium, cepæ &c. fugienda. Appropriata inter palmam ducit euphrasia, indeque parata vinum, essent. &c. Hinc Valeriana ejusque radix, chelidon. maj. levisticum, fœniculum, saffrastra, rosmarin. bacc. junip. ruta. It. ex formicis parata, in & externè.

Prousa externo alias infusa & alia prostant & ∇. ex sellibus. It. sequens unguentum.

℞. Mellis anthosati & despumati  
zingib. pulveris.

earyophill.



caryophyll. min. pulv.

salis aa ʒss. M. F. unguentum, de quo particula instar sem. si-  
napi oculo imponatur, & continetur aliquamdiu, donec affectus succedat.

## CAPUT XI DE AUDITUS LÆSIONIBUS.

**P**ost visum sequitur *auditus*, qui duobus fere modis læditur: I. Quando *imminuitur* in OBAUDITIONE, aut omnino *aboletur* & tunc vocatur

### SURTITAS.

II. Quando *depravat*, ita ut soni, qui non sunt, audiri existimentur, in TINNITU AURIUM, de quo postmodum. Quoad *causas imminuitur* aut *aboletur auditus* vel *vicio auris externæ*, si est abscissa; vel *vicio meatus auditorii* obstructi ab externis illapsis aut cerumine; Vel oriuntur hi affectus *vicio membrana tympani* vel ruptæ, vel exesæ & exulceratæ; Vel tandem *vicio nervi auditorii* læditur auditus, si *vitiōse conformatus* & in alium locum, quàm aurem internam derivatur; aut etiam si est *obstructus* aut *compressus*, adeo ut spiritibus animalibus omnem transitum intercludat.

Quoad *causas externas* vitia hæc oriuntur vel à *casu ab alto*, aut etiam *nimio sonitu*, hinc fit interdum, ut ab *explosione sclopetorum*, huic non assueti surdastri fiant; Morbis item *acutis* sæpè surditas supervenit, ad statum properantibus & per hæmorrhagiam criticam finituris.

Vitia hæc obauditionis & surditatis cum per se pateant jam ad *prognosin* transeo, ubi *surdi ab ortu* rarò curantur. *Surditas, quæ per se morbum constituit*, chronicum & difficile curatu malum est. *Surditas in acutis* cum urina cruda delirium portendit: Si verò coctionis signa in urina apparent, bonum & hæmorrhagiam criticam promittit.

**Cura** pro varietate causarum varianda. Si ergo *surditas in morbis acutis* sit critica à Medico rarò curanda, quia spontè cessat. Si à *cerumine obturentur aures*, id *emollientibus* attenuetur per *succ. absinth. spir. urine &c.* & postmodum eximatur: Sin ex aliis causis fuerit malum, fere semper tympani & nervi acustici habenda est ratio, ut horum tonus *appropriatis* restituatur, *aromaticis* nempe & *nervinis*.



Hinc *remedia* inter *ambra* & *moschus* excellunt, vel  $\nabla$ . *origani* c. *vino* destillata vel  $\nabla$ . *card. bened.* instillata. It. *essent. absinth.* C. B. *castorei*, *caryophilorum*, *spir. acusticus Mynsichtii* vel *Barbette*, cum *bombace auribus* admotus. Facit huc *oleum destillatum succini* cum *ol. nucl. persic.* permistum, insigniter à *Lindano* laudatum. It.  $\nabla$ . *magnanimitatis*, *spiritus* item *formicarum*. Vel

$\mathcal{R}$ . Rad. *Helleb. nigr.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
calam. aromat.  $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

pulp. *colocynth.*  $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$ .  
bacc. *laur. excort.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
sem. *cumini*  $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

*spir. vini*  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ . M. stent in *infus.* per aliquot  $\sigma$ . postmodum colentur & exprimantur, cujus guttæ aliquot auribus indendæ sunt. Si est ex casu aut percussione, egregia est  $\nabla$ . *cyclaminis* per alembicum destillata; vel *emplastrum ex tacamahaca* & *cerat. de betonica* aa. q. v. capiti imponendum. Vid. *Hochstätter. Dec. 9. p. 320.*

Sequitur jam alterum auditus vitium, nempe

## TINNITUS AURIUM,

quando aut *sonitus* quidam aut *tinnitus* percipitur, qui non est. *Sonitum* vocant das Gausen und Brausen der Ohren: *Tinnitum* verò das Klingen der Ohren.

*Causa* est vel in *aere auris interno*, vel in *tympano*. Illic si *aër* ille implantatus vitiosè moveatur, *sonus* & *sibilus* auditur sive *raucus* sive *acutus*: Hic verò *tympanum* variis ex *causis* commotum & vellicatum, auditum pariter depravare solet. Hinc *causas externas* inter, quicquid *membranam* hanc irritare, aut *auram* auris naturalem commovere potest, *tinnitum* auris inducere solet. Huc *percussio capitis*, *casus ab alto* & alia pertinent. Item *tinnitus* ille qui in *dolore capitis* vel in *febris acutis* adest, ob *turgescientiam sanguinis* excitatus. Conf. *Tulpius lib. 1. obs. 35.*

In *prognosi* *tinnitus aurium* in *feb. ardentibus* sponte curatur. Si vero per se morbum constituat eumque chronicum, raro curatur & tandem ad *furditatem* disponit.

In *cura* eadem *remedia* conveniunt, quæ in *furditate* laudata sunt; in specie *suffitus ex absinth.* & *verbena* admodum laudatur ab *Hartmanno in Prax. Chym. p. 106.* It. *suffitus ex succino*. It. *ex gumm. ammon. ol. nucl. persic. spiritus*  
urina



*urina* cum bombace auribus inditus. Facit huc seq. experimentum ad inveteratum aurium tinnitum admodum laudatum

℞. Hell. alb.

castor. aa. ℥ij.

cost. ℥ss.

ruthæ ℥ij.

euphorb. ℥ss.

amygd. amar. ℥j.

coq. in ol. ruthæ, quod oleum tepidè instilletur auri.

*Si tinnitus fiat ex casu*, experta est *mixtura Placeri*:

℞. Aq. vitæ cochl. j.

succ. cep. cochl. ss.

ol. destill. spicæ gutt. 4.

M. & auribus instilla.

*Interna* in affectibus aurium præmissis universalibus sunt *sassafrata*, *succina* &c. quæ eò melius operantur, si *sudor* post eorum assumptionem expectetur.

## CAPUT XII

DE

## LÆSIONIBUS GUSTUS &amp; OLFACTUS.

**R**Estant adhuc inter *sensus externos gustus & olfactus*, quos hæc simul considerabimus, cum maximum inter se *consensum* habeant, ita quidem ut vitio uno vitietur & alter.

*Uterq;* autem *læditur dupliciter* dum I. *Imminuitur* aut *aboletur*, ita ut parum vel nihil sive odorari sive gustare possimus. II. *Depravatur*, quando odores vel *sapores* alii, quam sunt in rebus, percipiuntur, iique putridi & fœtidi.

*Causa imminutionis* utrobique est vel in defectu spirituum animalium v. g. in apoplexia, paralyfi &c. Vel in organis horum sensuum malè conformatis vel alio modo vitatis. *Causa* verò *depravationis*, quando organa horum sensuum ab humoribus variis vel halitibus peregrini saporis inficiuntur. Sic in *luc & rea* ob ulcus narium. It. ob *scorbutum oris* olfactus depravatur; Sicut *gustus* in *ictericis* fere amarus esse solet. Quò forte *picantium gustus*

refe-



referendus est. Sic in catharris tam gustus quam olfactus & depravati & prorsus sæpe sunt aboliti.

Quoad *prognosin*: Pathemata hæc in catharris sine periculo sunt, quibus curatis sponte cessant; idem de aliis morbis sentiendum. Sin verò *inve-*  
*terata sint*, difficilia sunt curatu.

In *CURA* causa removenda & organa horum sensuum confortanda sunt, in *imminutione* eorum aut *abolitione*. Illic ad catharrum respectus est habendus. Hic verò nervina varia & aromatica conveniunt, v. g. *majorana*, *pulegium*, *ros-*  
*marinus* & ex his parata olea, essentia &c. Hinc *balsamus majorana* ex oleo factus  
naribus illinendus; vel *suffitus* fiant ex *gumm. anim.* *succino* &c. Quæ & in  
*olfactu depravato* locum habent.

In *gustu* verò *depravato* causa prius removenda & tum linguæ to-  
nus restituendus. Hinc si *gustus sit ictericus*, *VOMITUS* sæpe convenit; quo  
facto *serum lactis acidulatum* eum abolet, non secus ac *radix cichorei* condita.  
Aliàs verò *raphanus* ante pastum usurpatus & masticatus gustum acuit teste *Hæ-*  
*fero in Hercule Med.* p. 75. *Hartmannus* gargarismum habet & linimentum quæ  
vid. in *Praxi* ejus *Chymiatricâ* c. 85. §. 3. & 4. *Succus acetosa* & ex eò cum *sacch.*  
paratus *syrupus* multum valent, teste *Zacut.* *Lustano*, quibus os subinde col-  
luendum & abstergendum.

## CAPUT XIII

DE

SENSUUM INTERNORUM & RATIONA-  
LIUM FUNCTIONUM LÆSIONE.

HActenus de operationibus, quæ homini cum brutis sunt communes. Jam  
accessum faciamus ad læsionem operationum ipsi propriarum. Operatio  
talis est *intellectus* & inde promanans *RATIOCINATIO*, quæ II. modis  
læditur, aut enim I. *imminuitur* vel *aboletur* v. g. in *senibus*: Aut 2.  
*depravatur in deliriis*.

*Abolita ratiocinatio* STULTITIA, DEMENTIA & DESI-  
PIENTIA appellatur. *Imminuta* verò STUPIDITAS seu TARDITAS  
INGE.



INGENII dicitur. Nunquam verò hæc accidunt, nisi & *sensus interni* simul plus minus laborent, imprimis

## MEMORIA,

cujus *lesiones* heic potissimum considerandæ, quæ ipsa aut *imminuitur*, aut prorsus *aboleatur*; Depravari enim nequit. *Imminuta* ergo aut *abolita causam proximam* & *universalem* determinare impossibile est, cum à priori lateat nos ipsius memoriæ actus. Observandum saltem *lesiones* ejus sequi *lesiones capitis*. Unde ad *causas remotiores* maximè respiciendum, quæ nos ad feliciorē Praxin quasi manu deducere poterunt.

*Remota* igitur *causæ* sunt vel *fortuitæ*, vel *non fortuitæ*. Illæ v. g. casus ab alto, contusio cranii &c. Hæ res sunt vel nonnaturales vel præternaturales. Illic imprimis assumpta, excreta, pathemata &c. Hic morbi varii, imprimis acuti considerandi, memoriā abolentes: Item diuturniores epilepsiæ & melancholiæ. *Naturalem stupiditatem*, curatu impossibilem hîc prætermittimus.

Quoad *prognosin*: *Memoria subitanea lesio* absq; causa externa, apoplexiæ prodromus. *Quæ est ex silitis*, difficillimè curabilis, & facile in maniam degenerat. *Quæ à morbis acutis*, malignis, aut venenis oritur memoriæ lesio & inde nata stupiditas ferè incurabilis est.

In *CURA causarum remotarum* activitas pensanda: Hinc *cerebri* & *spirituum animalium* constitutio consideranda, & si *fervidi*, sunt attemperandi. Sin verò *nimis torpidi*, aromaticis excitandi.

*Remedia* quod attinet, in genere omnia *cephalica* dicta, *spirituosa* & *aromatica* laudantur v. g. *rosmarinus*, *meliss.* *ocym.* *lil.* *convallium*, *stæch.* *Arab.* Aliquot *cubeba* jejuno stomacho comestæ profunt, in juvenibus tamen cautè adhibeantur. Porro *castoreum*, *succinum*: *Pulvis Trubemii* maximè laudatur ad roborandam memoriā. Vid. Hartmannum in *Prax. Chym. it. spec. dianthos*, *diamoschi dulc.* *confectio anacardina*. De *formicis* res nota est deque *▽. magnanimitatis*. Excellit hic *▽. magnanim.* *Laurembergii* in sua *Mnemon.* It. M. A. N. C. anno 3, in appendice. Porro *aq. Sophorum Dorncrellii*, *▽. cephal. Myns. Q.* *E. Matthioli*, *spir. cerebri hum.* &c.

*Externe ol. myrrha* per deliq. temporibus & vertici illinatur. It. S. V. in quo *piper* infusum, quo in memoriâ læsâ ob abundantiam succorum frigidorum nonnemo feliciter usus est; simile quid habet *Hildeheim* in *Specil. p. 219.*



℞. Fol. betonic.

salv.

lavend.

rorismarini

ros. rubr. aa. Mj.

nuc. mosch.

pip. long.

galang. cypr. aa. ℥jv.

castor. ℥ij.

nuc. Ind. ℥β.

myrrh.

thur. aa. ℥iij.

croci ℥ij. M. infund. in S. V. dig. in MB. Filt. & hoc ipso liquore  
nares tempora & vertex illinantur pro ingenii robore.His præmissis jam accedamus ad *ratiocinationem depravatam*,  
unde

## DELIRIA

oriuntur, quando nempe *ratiocinatio à consueta ratione & ordine aberrat.**Causa* horum in genere consistit in spiritu animali, hujus nimirum sub-  
stantiâ & motu plus minus alteratis & vitiatis. *Mens* enim seu *anima rationalis*  
utpote immaterialis, & immutabilis eadem semper manet & à nullâ causâ ma-  
teriali lædi potest. In spiritu latet vitium, idque varium, unde *varia* oriuntur  
*deliria*.Unde quoad *differentias deliriorum*, in genere oriuntur vel à *causa*  
*interna*, vel ab *externa*, eaque sive *assumpta*, sive *extrinsecus admota*, idque vel ex  
*animali* vel *vegetabili regno*.*Externas causas* quod attinet, ex *regno vegetabili* sunt omnia nar-  
cotica, quæ juxta vim suam narcoticam & stupefactivam virtutem etiam obti-  
nent ita determinandi spiritus animales, ut diversi conceptus in mente formentur  
variaque inde deliria sequantur. Sic aliis somnia terribilia, aliis ut Turcis, sua-  
via conciliat opium. Sic hyosciamus ridiculum infert delirium, de quò Borellus  
Cent. 4. observ. 45. Plura eaque admodum curiosa de ejusmodi artificiali quasi  
dementia vid. apud Döring. Tr. de Opiò p. 72. & seqq. Sed præter vegetabilia etiam  
*animalia*, inprimis *rabida*, certa & determinata deliria inferunt. Sic in *RABIE* à  
*canis rabido* demorfi delirium incidunt, sub quo se in canes abiisse æstimant.  
Notus quoq; est *TARANTISMUS*, quando à *Tarantulis* demorfi earundem  
gestus



gestus imitantur. Nota est RABIES FELINA, ubi à *felibus rabidis* demorfi unguibus selacerant. Quo similiter RABIES LUPINA & SUILLA pertinent, ubi homines similiter tale delirium incurrunt. Huc quoque PHILTRA referantur, de quibus in fine.

A *causa* verò *interna* quæ oriuntur deliria, pro fomitis interni varietate & prout diversimodè spiritus afficiuntur, etiam sunt varia, nunc quidem *vaga* sunt & *indeterminata*, ut in febribus ardentibus & malignis; nunc *fixa* & ad certum objectum *determinata* in *melancholiâ*. Illa rursus sunt vel *cum* vel *sine* febre, hæc *mania*, illic *phrenitis* consideranda. Hæc de deliriis in genere. Ut verò singulas & frequentiores eorum *species* sigillatim absolvamus, initium faciamus ab iis, quæ à *causa interna* & quidem *cum febre*, oriuntur, quale delirium est

## PHRENITIS,

quæ prout nunc *levius*, nunc *gravius* affligit, ita nunc *paraphrenitis* nunc *phrenitis* dicitur, & hanc *ex inflammatione membranarum cerebri* oriri æstimant: Sed ut jam supra monui, primi Medicinæ Authores *diaphragmatis inflammationem* propriè *phrenitidem* dixere, *cerebri* verò *inflammationem sphacelum*; interim loquendum est cum vulgo, adeoque & hæc vice *phrenitidem* in vulgari sensu retinebimus.

*Causa* igitur tam *levioris*, quam *gravioris delirii febrilis*, est varius & confusus spirituum in cerebro motus, cujus occasione varia phantasmata ab anima efformantur, cujus nuntii sunt *interdicti sermones, risus, fletus, muscarum*, quæ nusquam sunt, *venatio*, *varia arinum motio*, imò *convulsiones* & alia.

*Causa remota* inconditi istius motus spirituum animalium est nimia cerebri incallescencia, ex effervescentia ejus in *paraphrenitide*, ex inflammatione verò in *phrenitide*. Cogitemus æstum talium febrium & vasa insignia ad cerebrum delata, & facile hujus fervor patebit.

*Causæ remotiores procatarticae* sunt *ætas juvenilis*, *aer æstivus*, *usus potuum generosorum*, in specie *vini*, quæ nos promptos reddunt ad *phrenitidem*, uti hoc fere videmus in ebriosis. *Suppressa* itidem *sanguinis evacuationes* malum hoc inferunt. Sic *ex lochiis puerperæ* non rite curatis *phrenitidem* abortam refert *Horstius lib. 2. observ. 25. & 26.* ubi & idem malum *ex sup-*



*pressionem hemorrhoidum* notat. Huc *animi pathemata*, imprimis *ira* pertinent, item *febres*, imprimis *malignæ*, quæ plerumque ejusmodi deliria conjuncta habent.

*Differentias* quod attinet, præter hoc, ut supra fuit insinuatum, quod *deliria febrilia*, sint nunc *graviora*, nunc *leviora*, eadem porro, in *phrenitide præprimis*, sunt nunc *seria*, nunc *ridicula*. Illic nunc cum furore & quasi irati proferunt omnia, & quasi præmeditatè delirant. Hic varia absurda & incondita cum quadam hilaritate & interdum cum risu adferunt, quæ *differentia* probè attendenda ob effatum *Hippocratis*, quando

In *prognosi* dicit, quod *deliria ridicula* sint tutiora & minus mala, quam *deliria seria* & cum jurgiis juncta. Sic *paraphrenitis* adeò periculosa non est quam *phrenitis*. Si vires sunt languide in verâ *phrenitide*, ut plurimum moriuntur ægri. *Phrenitis* si mutatur in *lethargum*, lethale. Si *phrenitidi convulsiones*, singultus, stridor dentium aut aponia superveniant, & inscia fœcum & urinæ dejectio adsit, lethalis est.

In *cura* I. *Effervescencia sanguinis febrilis compescenda*, eundem evacuando & ejus stagnationem indeque natam inflammationem in *phrenitide* vera resolvendo. II. *Spirituum turbatus motus figentibus* nonnihil, tam internis, quàm externis est sistendus; adeoque cum delirium saltem sit symptoma, principali morbo, nempe febre, curato, delirium spontè cessat.

Præmissa ergò *venæsectione*, eadem fere *remedia* conveniunt, quæ in curatione *februm acutarum* adhibentur. v. g. *Bezoardica*, *sulphurea*, *Galica*, *succi vegetabilium acidi*, *granatorum*, *ribium*, *berberum*, *serum lactis* & ex eò parati *julebi*, *spir. acidi minerales*, in specie *nitrum* & *spir. nitr. dulc. it. camphora* in- & externè. Sic porro *mixtura simplex*, *tinct. bezoardica*, *nitrum* & *atrum*; Quibus addatur tanquam singulare specificum, *herb. & flores anagallidis flore phæniceo*, usui externò & internò. Item *opiatæ* & *emulsiones papaverinæ*. Vel in *phrenitide maligna*:

℞. Cinnab. ꝯ. gr. xij.

bezoard. Dre gr. vj.

laud. opiat

camph. aa. gr. j. M. D. in duplò, in decocto anagallidis.

Inter *externa* commendantur *cataplasmata ex portulacâ & rosis* capiti circumliganda. It. *secum manus* contusam & instar *cataplasmatum* cum aceto plantis pedum & testibus admovendum. It. *succus* & *fluviat*. ad imitationem *Rulandi*, qui & sequens *epithema* maximè commendat



℞. ∇. rofar. ʒx.

opii ʒj.

croci ʒβ. M. tepidè fronti admovendum. Vel

℞. Sperm. ran. ʒvj.

fuccus ʒ. fluv. ʒiij.

opii aceto correcti ʒβ. ad ʒij.

camph.

crociaa. gr. vj. vel viij. M. Pro epithemate. Veteribus frequenti

ni usu fuit, animalia viva, anates aut columbas per medium dissectas & ita calidas capiti raso applicare, quod remedium *Lindanius* dicit esse inestimabile ad curandos phreniticos. Sed si dolor cesset & delirium, removenda sunt, cum post horam fœtor horrendus inde oriatur.

Haftenus de delirio à causa interna cum febre. Pergo jam ad deliria à causa internâ sed sine febre, quæ inter eminet

## DELIRIUM MELANCHOLICUM,

circa quod notandum primò, quod aliud sit *affectus melancholicus* seu *melancholia*, aliud verò *delirium melancholicum*. Illic homo fit mœstus, faciliè irascitur, ipsi nihil arridet, tristis est & cogitabundus, faciliè terretur, angustias percipit & sibi non benè conscius est, es ist ihm das Herz so schwer und weiß nicht was es ist. Huic affectui superveniens *delirium* est *delirium melancholicum*, quod est *morbus secundarius*, affectus vero iste, *primarius*. Sic in tempestate obscurâ humidâ reddimur anxii, tristes &c. hic est *affectus melancholicus*, qui si sit contumax & à causa interna, oritur *melancholia præternaturalis*, cui tandem varia deliria superveniunt, nunc amorosa, nunc ridicula, nunc rabiosum & maniatum.

Imprimis verò notanda est *differentia delirii melancholici*, quando aliud est *fixum*, aliud *vagum*. Hæc in plerisque ferè actionibus aberrant à recta ratione & vana atq; delira loquuntur. Illic verò circa unum & determinatum versantur objectum, circa quod varia sibi phantasmata fingunt, aut concupiscendo aut averfando. Fit tamen sæpe, ut quod primum *vagum* erat delirium, paulò post, quando objectum aliquod excellentius aut gravius in sensus incurrit & mentem fortius afficit, *fixum* evadat & determinatum.

Quoad causam proximam duo consideranda veniunt 1. habitus corporis & M. S. melancholicus tam naturalis, quam præternaturalis & morbosus 2. Superadditum delirium, cujus ratio potissimum in spiritibus animalibus, eorundemque natura & motu vitiatæ investiganda venit.



*Causa remota* verò & fomes morbosus est in sanguine: Nam prout variat M. S. crasis naturalis, ita etiam hominum mores subinde variant & hoc est quod jam olim dixit Galenus, quod mores animi sequantur temperamentum corporis. Unde tota die experimur, quosdam naturā esse letos, quosdam tristes &c. Hi verò qui p. n. sunt melancholici & inde deliri, ut plurimum sunt hypochondriaci; sicut malum hypochondriacum sapissimè tale delirium post se trahit, quod melancholia hypochondriaca audit; Faciunt hūc hamorrhoides suppressa & menses deficientes, quæ sæpe tale delirium inferunt melancholicum, quod melancholiam ex utero vocant.

Quoad prognosin: Delirium melancholicum recens facilè curatur, subinde sola victus ratione & familiari conversatione & mutatione aeris. Ubi autem inveteratum est, & ortum ab animi pathemate externò aut studiis immodicis difficilimè est curationis. Hereditarium difficile est curatu. In feminis rarior est melancholia, sed pertinacior, in specie in iis, quibus menstrua deficiunt; quæ est cum gaudiò & risu facilius curatur, quàm leria. Salutem speramus si symptomata fiunt mitiora, item si in scabiem degeneret. Interitus imminet, si resolvuntur vires, si cibum & potum respuunt, si nihil dormiunt. Rarum est, quod delirium melancholicum convulsiones superve-  
niant.

In cura delirii melancholici, ut jam supra monitum, duo attendenda, 1. habitus melancholicus corporis & spirituum animalium, 2. ipsum delirium. Ratione prioris curandi ut hypochondriaci. Ratione posterioris spiritus animales à perverso motu revocandi vel medicamentis vel rationibus: Medicamentis per anodyna mineralia, item opiata, camphorata &c: Rationibus vel assentiendo per stratagemata, vel contrariando per persuasiones.

Quoad remedia, vomitoria & Stialia primatum ducunt, quæ excellunt, si in debita dosi dentur, nempe auctiori. Sic tart. emet. cujus gr. ij. vel iij. aliàs dantur, hūc sæpe ad gr. vj. propinandus. Post hæc sunt purgantia per inferiora, quæ inter Stalia pariter excellunt & belletorus niger.

Quidam venesectionem adhibent, sed nescio ob quam causam. Potius alteretur sanguis, non verò protervè evacuetur. Inter remedia igitur  
alte-



*alterantia* sunt *Galina*, *Hina*, *Dria*, *coralliata*, *tartarea* & omnia ex his composita v.g. *extr. Or.* cum *succo pom. tinctura Or.* *zuvelfferi*, *tinctura Oris Oris*. Hinc excellit *H.* & ex eò paratum *sacch. H.* frequenter usurpatum dos. *℥j.* Vel ejus loco *cryst. min. H.* cum *spir. nitri* parat. *D.* & speciatim ejus *tinctura* sunt appropriata, vel *magisterium D.* quod vulgò *das Narrenpulver* dicitur. It. *aq. D.* quando in *∇. cephal.* exstinguitur. Huc pertinet *lap. lazuli* qui est naturæ *Dris*. Hisce addantur *corallia rubra*, non saltem quod acidum destruant, sed & quod sulphur eorum contra tristitiam appropriatum sit, unde *tinctura corallorum* in his affectibus est egregia. *Tartarea volatilia* his jungantur, vi enim diuretica & acidi destructiva melancholicos juvant, talia sunt *spiritus tartari*, *sal volat.* & alia. His *arcantum duplicatum* etiam non cedit & mihi in frequenti usu.

His ceu primariis ex regno vegetabili temperata addantur v.g. *fumaria*, *borrago*, *buglossa*, *anagallis*, *crocus*. Optima est *camphora* & ejus *essentia*; pertinet huc *tinctura hyperici Mynsichti*, optima ad deliria melancholica. *Crocus* optimum est simplex in melancholia cum & sine delirio. *Essentia* ejus summa cordis lætitia, ut à *Paracelso* vocatur, cum simul habeat vim somniferam. Hinc & *Lindannus* committat *syrupum borrag.* cum *croco*.

Sic *externa* inter *crocus* pariter eminet in nodulo appensus, est optimus ad tristitiam & angorem melancholicum, vid. *Borell. Cent. 2. obs. 90.* Melius tamen est ut *croco* addatur *camphora*, quæ est optima & in formâ *epithematis* quoque applicari potest v.g.

℞. *∇. flor. sambuci.*

*hyperici aa. ʒjss.*

*camphor. gr. vj. M. F. Epithema*, applicetur fronti & temporibus: Bene confert.

Sic & ex *internis* modo enarratis varix *prescriptiones* fieri possunt v. g.

℞. *Arcan. duplicat. gr. xv.*

*sacch. H. ʒss.*

*camph. gr. iij. M. Repetatur aliquoties, in specie vesperi, tempore somni, nam camphora melancholicos ad somnum disponit. Vel*

℞. *Sacch. H. gr. vj.*

*laud. opiat. gr. ij.*

*ol. camph. q. l. F. l. a. Pilule*, vesperi sub introitu lecti capiendæ; Vel

℞. *∇. borrag. ʒj.*

*arcan. duplic. ʒj.*

mag.



mag. corall. c. suc. citri ℥℥.

camphoræ gr. iij.

fyr. borrag. ℥℥. capiatur una vice. Vel

R. Extract. ♂. c. succo pom. ℥℥.

camph. gr. iij. M. F. Bolus.

In *dieta* assumantur *alimenta largè nutritientia*, nam benè edunt melancholici, si non appetant malum signum est; *lælicinia* dentur, nisi quid obster. *Vinum* pavores pellit & ægros erigit, non tamen in nimia dosi, ne inebriet.

## MANIA.

Pergo ad *summum gradum deliriorum*, quem Græci *maniam*, Latini *insaniam*, Germani verò *die Raserey* appellare solent; quando nempe melancholici incidunt in *delirium sine febre*, cum insigni tamen *furore*, & depositio omni pudore & exuta ratione planè feroces redduntur, ita ut quæcunque objecta arripiant, lacerent, calumniis laceissent, sui juris se suspendant & horrenda peragant.

*Causa proxima formalis* consistit in *spiritibus animalibus*, quoad *crasfin* suam vitiatis: *Causa proxima materialis* & *remota* vero querenda est in *M. S. acida*, vitio *viscerum inferiorum*, imprimis *stomachi*, talis reddita; unde cum melancholiâ in fundamento convenit. *Spiritus animales* quod *attinet*, hi degenerant à natura & sulphureo-volatili crasi, cum ex sanguinis dyscrasia acidâ inquinati, generentur quidem subtiles satis & agiles, sed acres *salini* & quasi *sulphureo-acidi*, indeque nimis mobiles & in motibus suis ordinariis minus coercibiles, hinc semper irrequieti & insomnes sunt.

*Causa remota*, ut dixi, hæret in *M. S.* Hinc est quod dicant oriri ex *constitutione atrabiliari*, unde in *radice* conveniunt melancholia & mania. Illic peccat acidum in hypochondriis, hic idem, sed acrius. *Causæ* igitur *remota* eadem sunt, quæ in melancholiâ, imprimis verò *philtia* disponunt ad maniam, vid. Borell. Cent. I. observ. 65. item Petrus in Dissert. Harmon. & alii. Solennes sanguinis evacuationes suppressæ, in iis præprimis, qui ad melancholiam inclinant. Sic ex hemorrhoidibus suppressis maniam notat Zacut, Lusitanus lib. I. Prax. admirand. obs. 51. Ex ulceribus inveteratis clausis Forstus lib. 10. observ. 24. Sic post diutinas febres, epilepsias & febres acutas mania sæpè sequitur.

Quoad



Quoad *prognosin*: *Mania* malum est diuturnum & curatu difficilimum. *Hereditaria* rarò perfectè sine recidiva curatur. *Mania ridicula* & tractabilis melior est seriâ. Si suppressa ante evacuationes redeant, bonum; sin autem suppressis mania superveniat, malum.

In *cura* opera detur, ut furor mitigetur & tractabiles reddantur insani, id quod fit 1. per vomitoria, iteratas venesectiones, somnifera & appropriata; quibus si paroxysmus est sedatus, curandi sunt ut melancholici, de quibus heri. Radix curationis est in vomitoriis validis & generosissimis, Sic habet *stærcke Ros-naturen*. Veteres *helleborum album* adhibuere, sed legitime præparatus esse debet: & alia enim non semper sufficiunt in his ægris. Si in principio interdum per inferiora purgandum, convenit extr. *helleb. nigri*, cui & alia per inferiora purgantia pro stimulo addantur.

His factis *venesectio* larga instituenda, sed non nisi paroxysmo curatò & furore mitigatò, tum larga instituenda, vid. *Platerus in obs. lib. 1. pag. 80.*

Post hæc *opiatâ* conveniunt ad spirituum motum mitigandum. Excel-lunt autem hic *sulphura mineralia anodyna*, post vomitorium applicata; Cum his semper usurpetur *nitrum crudum* vel *gum*, in potu copiose dissolvendum. His generalibus tandem & appropriata *specificâ* subjungenda, quæ inter primatum ducit *sanguis asini* arteriosus in mactatione retro aures collectus. *Dof. 3j. in ∇. anagallid. Hartmannus*, *Prævotius* & alii meritò hunc sanguinem commendant. Post hunc est *anagallis fl. phæniceo*, cujus decocto mirabilia se perfecisse *Quercetanus* refert; juxta hanc porro est *hypericum* ejusque *unctura Mynsichti*; hinc *solanum tetraphyllum* seu herba *Paris*, *polypodium quercinum* &c. De *foliis buxi* vid. *Hartmannus* & *Sennertus*. His semper *camphora* est addenda in & externè, item ejus *oleum cum bolo destillatum*, quod mirè coagulat materiam mania ut *Prævotius* dicit. Facit huc *mistura Fabri*, quam in sua *Parthologia* commendat.

*Externè* similiter in usu est *camphora*. Sic enim *Hillerius in suis obs.* epithema habet, quod est optimum, vel loco hujus *mistura Penoti* ad phrenesin & maniam experta, quam etiam laudat *Clusius*.

Haftenus de deliriis à causa interna, sive cum sive sine febre. Jam sequuntur *deliria à causa externa*, quæ duplicia, vel 1. à morfu animalium



*rabidorum*, vel 2. ab assumptis malignis narcoticis: *Illic rabies & hydrophobia*; *Hic philtro* sunt consideranda. De priori primum;

## RABIES

igitur *delirium est à morfu animalium* inductum, & si *metus aqua* simul adest, dicitur *HYDROPHOBIA*. Refertur ad *deliriorum* genera, cum in imperfecta rabie semper adfit delirium. Alas habet suos *gradus*: In perfecta furor adest, torvum vident, spuma circa os, stridor dentium & inflammationes oculorum apparent. Si à cane rabido morfi sunt, latrant ut canes & metum ▽. tanquam pathognomonicum signum conjunctum habent. In levi saltem est anxietas præcordiorum, mæror, tristitia & abstinentia à potu. Plurunque febris insimul adest.

Quoad *causas fermentum* hinc peculiare accusamus ab animali rabido per *morsum* communicatum; nam quod alii de *venenò peculiari* habent, id omne ad *fermentum* est applicandum. Hoc fermentum *ideas impressas* ab animali furenti homini communicat, M. S. penetrat, ita, ut ferè similis evadat sanguini animalis furentis: Hinc fieri non potest, quin easdem quoque actiones edat, quas canis v.g. aut aliud animal rabidum edit. Notandum autem *animalia in se venenata non esse*, hinc neque omnis morsus rabiem parit, sed animalis aut irati aut rabidi; ira enim & furor nocent.

*Causa occasionalis* & propinquior est *saliva fermentescens* & effervescent, per *morsum* insimul vulnere infusa & M. S. per arterias communicata. Hinc nisi vulnus sit factum, ita ut in M. S. penetrare possit, furor non fit.

Quoad *prognosin*, raro curatur rabies & spes in angusto hæret: Intra biduum vel triduum moriuntur. Quo plus sanguinis è vulnere effluerit, eò minus de rabie metuendum. Quo citius consolidetur, eò magis rabies metuenda.

In *cura* duo tempora observanda, 1. *morsus* & vulnerationis, 2. *rabiei* supervenientis. In priori venenum illico post morsum est extrahendum; quem in finem vulnus est ampliandum, ut cum sanguine saliva potius effluat, quam retrocedat. Alii *scarificationem* instituunt & *cucurbitulas* imponunt, ut fermentum extrahant. Alii *hepar animalis* imponunt vel *partem carnis*. Quo & *columbarum vivarum* & *dilaceratarum* applicatio pertinet. Vel *iberiaca* cum *succo rute* imponatur, ut venenum magnetica vi extrahatur. Quidam *ligaturas* magni æstimant. Alii vero *caustica* applicant tam *potentialia* quam *actualia*.

Quoad



Quoad alterum tempus, rabiei scilicet, id unice agendum, ut fermentum M. S. jam occupans ex corpore expellatur. Remedia sunt alexipharmaca, tam communia, quam specifica. Hinc theriaca, muhridatum, elect. de ovo precipuum obtinent locum; item essent. theriac. tinct. bezoard. cum es. abs. Sed omnia in dupla dosi exhibenda, ut:

℞. ∇. hyperici ʒjss.  
theriacal. ʒss.  
tinct. bez. ʒjss.  
essent. ʒj. M. pro dosi cum sudore.

Vel ℞. Fol. rutæ  
salviæ  
plantag.  
polypod.  
verben.  
absinth. vulg.  
menth.  
artemis.  
beton.  
hyper.  
cent. min. aa. q. v.

M. F. pulv. dos. à ʒj. ad ʒij. qui exhib. cum theriac. ʒss.  
& syr. acetos. citri.

Vel ℞. Pulv. rad. contrayerv.  
gentian.  
pimpin.  
vincetox. aa. ʒj.

M. F. pulv. Div. in 4. p. æ. D. S. Giffitreibende Pulver.

Ab his autem alexipharmacis per integrum anni quadrantem non est desistendum, nam sæpe post 40. dies aut aliquot menses, interdum & post integrum annum iterum se prodidit hydrophobia.

Quodsi verò sudoriferorum usus intermittatur, tamen specifica adhuc aliquamdiu continuanda, qualia sunt alysson, pimpin. allium, lactuca aliquot diebus mane comesta; oculi ʒ. unum ex optimis specificis sunt, unde & bezoar rabidcrum audiunt, unde

℞. Ocul. ʒ.  
CC. ust.  
mand. luc. pisc. præp. aa. ʒj.

M. D. S. Pulverlein auff 3. mahl. dos. ʒj.

ccc 2.

Vel



Vel cor & hepar animalis mordentis decoq. & patienti propinentur: Vel in pulv. redacta dentur.

In hydrophobia optimum remedium est *demersio in aquam frigidam*, hâc ipsâ enim idea deletur & delirium curatur.

*Externè* vulnus inungatur oleo hyperici vel imponatur tale *emplastrum*:

℞. Cera ꝑ℔℔.  
ol. oliv.  
sevi hircin. aa. ℥iij.  
coq. l. a. & adde  
thuris electi ℥℔.  
F. emplastrum.

Alii imponunt *emplastrum de ranis cum* ☿. Alii abluunt vulnus *succo ruta* vel *theriacâ cum ol. rosarum*.

Quod tandem attinet reliqua *deliria à causa externa*, in specie *ab assumtis*, sunt eadem varia; pertinent enim huc omnia ea, quæ *ab assumtis venenis*, in specie simul *narcoticis* excitari solent, quæ in principio corrigantur per *vomitum* & *vomitoria*, quibus præmissis assumantur *appropriata acet.* cum *castoreo* vel inde composita; Ad hæc *deliria* etiam pertinent

## PHILTRA,

quæ tamen *distinguenda* sunt ab *amore infano*, siquidem *amor insanus* est species quædam *melancholia* contracta occasione nimii amoris, non secus ac alii ex nimia tristitia, molestia & curis ad *deliria melancholica* disponuntur, quin imò interdum in graviore malo ad maniam dilabuntur. *Amor insanus* est *curandus remediis* partim *Ethicis*, partim *Medicis*. Quod *Ethica* attinet, persuasionibus æger ad meliorem statum est revocandus, quibus accedunt *remedia Medica* similia illis, quæ ad curandam *Melancholiam ex amore* nâtam dantur; dubiū hic de *pulsu amatorio*, an detur? *Experientia* quemcunq; informare potest vid. *Horstius Tom. 1. Operum circa finem*, cui annexa est *dissertatio quadam de pulsu amatorio*, an detur? *Specialis* negatur, hoc saltem obtinet, quod in talibus soleat esse *varius*, *inequalis* vel *inordinatus* insigniter, & simul ac fiat mentio personæ amata, mutatur in *majorem*, *celeriores*, *frequentiores*, quæ mentio ubi cessat, etiam ad æqualitatem vel ordinationem redit; sed hoc nil est peculiare, commune enim hoc habet cum omnibus *melancholicorum* pulsibus vid. *Forest. l. 10. obs. 30.*

Quod ergo *philtre* attinet, per ea intelligitur medium, quo unius sub-

jecti



jecti ad alterum inclinatio quædam singularis excitatur, ita quidem, ut ex præsentia talium subjectorum facultas animalis, in specie quoad affectus animi se optimè habeat, sicut talium personarum absentia est plus minus molesta aut gravioribus anxietatibus obnoxia. Unde *philtre* possunt usurpari inter *mares* & *fæminas*, inter *homines* & *bruta* &c. ut sic mutuus amor concilietur. *Philtre* talia sunt vel *vera* vel *notha*. *Notha* seu *falsa* sunt, quæ à vetulis seu mulieribus propinantur, sed hæc sunt vel *vana* & *frustranea*, vel sunt *Magica* & p. n. *Vana* & *frustranea* ex variis subjectis parari solent: Mulieres ferè frequentissimè usurpant suum sanguinem menstruum, quem nunc *solitarium*, nunc cum *sanguine leporino* mixtum propinant; Alii singulare quid spondent ex *umbilico infantum* decedente, alii *secundinas* adhibent. Alii *testiculos animalium salacium*, eosque sudore probè imprægnant; sed hæc omnia sunt *vana* & *frustranea*, quibus nil obtinetur, nisi quod interdum tales, quos postulant ut ament, in pessima mala incurrant, v. g. *maniam*, *stupiditatem*. In specie stupendum exemplum recenset *Heinr. ab Heer observ. 3.* *Vera* quod attinet *philtre*, quæstio est, an dentur? Sunt qui *negant*; sed male: *Veritatem*, nempe quod dentur, beneficio quorum inclinatio determinata hujus personæ in istam possit conciliari, *confirmat experientia*; ubiq; enim prostant *exempla* quibus coactus amor possit fieri. Sic quidam studiosus in balneo per esum intriti a lotrice tanto amore erga eandem deflagrabat, ut planè anxius redderetur, nisi quotidie eam visitaret. Sic ipse curavi quendam, qui à fæmina accepit dimidium pomum citrinum quarta hora pomeridiana, ex quo esu postmodum quotidie hæc hora tam perditio flagrabat amore, ut plane anxius curreret, donec hanc fæminam accederet. Dicis, hoc fit per *Magiam* & sunt *artificia Diaboli*. R. Posito subesse ludibrium Dæmonis, saltem Dæmon non potest agere supra naturam & consequenter secundum vires in natura fundatas. Notum id quoque est in canibus, dum quidam panes gestant sub axillis, ut probè sudore madescant & hos panes cani propinant. Notum est quod *Helmont de Magica vulnerum cur. §. 17.* habeat plantam, quam in manu tenuit & canis pedem apprehendit, unde canis eum secutus est. Nil dico de cura transplantatoria, quæ fit cum *persicaria* & similibus. Sufficit quod prostant exempla actionum in distantem & determinatam personam, tam in melius quam in pejus. Notum quoque est de amore naturali consanguineorum vid. *Barth. Cent. 5. observ. 29.* ubi vir quidam, quoties pareret uxor, tormina ventris patitur. Item M. A. N. C. *Ann. 2. obs. 215.* de Marito cujus uxor quoties est gravida, toties ille pica corripitur & vomitur: Quæ ostendunt firmum amorem subjectorum inter sese



etiam remediis naturalibus conciliatum; ut nil addam de *idiosyncrasia*, ubi quidam etiam sclem invisam maximè horrent & anguntur.

*Causa proxima*, sc. qua mediante dentur *philtro determinata* ad certam aliquam personam, optimè docetur ab *Helm.* in *Tr. de Mag. Vuln. Cur.* §. 17. ubi nempe ut supra dictum, plantam tenet in manu, & postmodum apprehendit catellum qui eum secutus est, relicto proprio Hero: Dicit igitur vim *philtro* consistere in *mumiali confectione*, mediante quâ ad certum subjectum trahatur alterius affectio: Per *mumiam* à stylo *Helmontiano* intelligitur spiritus insitus in specie in cadaveribus, in quibus influi spiritus evanuerunt, relicto saltem insito. *Secundario* tamen in vivis & influi nomine spiritus talis venire solet, qui & ipse sufficit transplantationi tali instituendæ, medio quodam tertio, quod vocatur *magnes*, puta ut spiritus mediante magnetismo translatus in alterum subjectum uniat spiritui intimo vitali, ex qua unione sequatur mutuus amor; nempe ex hoc fonte derivandæ sunt omnes *actiones magnetica, sympathia*, transplantationes & similia, quæ partim in *Theoriâ*, partim & in *Praxi* multum habent in recessu. *Philtro hæc vera* cum propter honestas causas instituantur & qua talia, nullum nocumentum inferant, non curat Medicus, sed saltem consideranda sunt *notha*. Quæritur an possit cognosci *philtro* tale *nothum* propinatum? Certa *signa* non prostant, sed saltem artificiosis conjecturis partim ab ægro, partim à Medico cognoscuntur. *Primum* obtinet quod tales ægri ex assumpto quocunque *philtro* se male habere circa stomachum dicant: Item si propinatum sit à muliere & similibus. Speciatim quibus propinata sunt *philtro* conqueri solent de *pestimo stomachi habitu* & hinc *perturbatione sensuum internorum*: Pessimus iste *stomachi habitus* subinde est adeo contumax, ut aliquot annos durare soleat & semper eò pejus malum, quo diutius durat à philtro indutum. Hisce superveniunt *mentis perturbationes* & *deliria* patiuntur, vel *insaniam*; mirum est, quod interdum *impetus amatorius* isque morbosus ex *philtro* concitatus observetur *periodicus*. Refert *Agricola* in *commentario* in *Poppium* de amore per *philtro* inducto, cujus paroxysmus singulis pleniluniis repetebat & per 6. dies continuabat; intermedio tempore ægrò satis bene se habente.

Quoad *prognosin*, ut variant *subjecta* quæ pro *mediis amatoriis* in *philtro* assumuntur, ita variant *nocumenta* ab iis inducta: Frequentissime tamen post *philtro falsa* supervenire solent *delirium melancholicum*, interdum *mania*, interdum *amentia*, quæ tandem ad *lentam mortem* terminari solent.

In *cura* laborandum est Medico, ut æstimatis omnibus circumstantiis &

per-



perpenſis minimis conjecturis inveniatur cauſa, qua mediante *philtera falſa* fuerint inducta. Inquiratur igitur an *philtera* inſtituta ſint per *Magica media*, an vero *materialia*? Nam ſi ſuſpicio ſit, quod *medis Magicis philterum* fuerit inductum, talis affectus curandus venit præmiſſis *Vomitivis* illis, quibus aliàs morbi ab incantatione ſolent curari, præmiſſo ſemper vomitorio, etiam interdum repetito; inter quæ excellit *viſcus corylinus* legitimo tempore collectus, tam ſolus interne aſſumtus, quam cum *adipe canina, urſina & caponum paratum linimentum* ſeu *unguentum*, vid. *Heinr. ab Heer*, item *Carricht. in herbar. edit. 8.* Juxta hunc viſcum *Valeriana minor* ſeu *phu. med. Dioſcorid.* vid. *Matth. Flor. hyperic. & aquileg.* *Corallia* quoque uſurpari ſolent interne & externe in forma amuleti. Facit huc *emplaftrum fœtidum Myſſicht.* item *Eleſt. metallicum compoſitum*, ex omnibus metallis certo tempore confectum. Amuleti formâ convenit *eleſtrum immaturum* *Paraceſi* etiam ab *Hëlmonſio* commendatum, ſed incertum eſt, quid ſit. Alii *zyncum* ſed male, alii *gulden Erbs* alii *folia auri Hungarici* ſubſtituunt.

Quod attinet *philtera*, quæ per *media naturalia*, utut fruſtranea inducuntur, optimum eſt in hiſce, ut præmiſſis *Vomitivis & ſudoriferis* uſurpentur *appropriata contra philtera uſitata*, eaque vel *generalia* vel additis ſimul *remediis maniacis*. Vomitoria inprimis ſunt *gialia* eaque valida & magna doſi uſurpata, ut *infuſum viri g.* ad *ʒiſſ.* Sic *D. D. Lang.* curavit Juvenem per *g.* vita ex *butyro g.* cum *D. & O.* paratum. Sic cuidam Juveni data ſunt de *g.* vita *gr. v.* quibus cum copioſe evacuatus fuiſſet, poſtmodum data fuit *theriaca cum pulv. ſerpent. ʒi.* in *∇. theriacali* vel *∇. C. B.* unde copioſo ſudore reſtitutus fuit. Ad talia videtur pertinere *urina equina* recens hauſta vid. *Salmuth Cent. 5. obſ. 71.* Poſt *philtera* ſubinde varia *inſecta* generari ſolent in talibus agnis: Sic ipſe obſervavi aliquando à tali tres longos *vermes* excretos fuiſſe. *Schenckius* varia *animalia viva* obſervavit vomitu excreta ab aſſumtis *philteris*. Præmiſſis ergo *vomitivis & ſudoriferis v. g. mixtura ſimplici* ad *appropriata* accedendum eſt, quæ inter excellit *naſturtium aquaticum*, ejus ſuccus & quæcunque ex eo parata remedia inprimis ſi ex *philteris jam imminet mania*, unde etiam remedia in hujus curâ uſitata propinari ſolent. *Secundina humana* contra *philtera* à quamplurimis commendantur. Uſurpantur nempe vel in forma *pulveris* vel *ſpiritus* in forma; Reſcipitur *ſecundina humana* & detracta membrana & vafiſ majoribus, eadem in *M.B.* in cucurbita medianre alembico deſtillatur & prodiſ ſic *uma* & remanentia in *pulverem* poteſt redigi; doſis eſt à *ʒi.* ad *ʒij.* Sed obſerveſtur quod hic *pulvis* non ſit diuturnus ſed in eo copioſi vermiculi ſolent generari, quàm obrem quotannis novus paretur. Melius igitur eſt, ſi ex

ſecund-



*secundina putrefacta* destilletur *spiritus urinosus volat.* qui à ℥j. ad ℥ij. expectando sudorem est egregius. Speciatim convenit si *sanguis menstruus* adhibuitur loco philtii. *Spiritus theriacal. camphorat. extract. theriac. hyperic. bacc. herb. Parid. pulv.* ad ℥j. adhibeantur expectando sudorem; *Essent. mumiæ human. Essent. viper. serpentum* & quæcunque remedia ex *homine* & *serpentibus* parata. *Premissis universalibus* hæc maxime commendantur. Quo pertinent *calculi humani* in forma pulveris ad ℥j. in ∇. *nasturtii* vid. *Heinr. ab Heer in observ. 13. & in observ. Spad.* Alias egregium experimentum est contra philtia *Electuar. Hartmanni* in *praxi Chym. cap. 2. obs. 13.* Hoc Electuarium prædixit D. D. *Michael*; In specie si philtium factum fuerit ex *sanguine menstruo*, appropriatum remedium sunt *margaritæ præp.* ut observavit *Borell. Cent. I. obs. 63.* Convenit etiam *theriaca cum pulv. Card. Bened.* in ∇. C. B. expectando sudorem, & quæ sunt alia.

Cæterum jam supra monitum, quod *malum hypochondriaco* sæpe & delirium accedat, unde haud inconueniens esse duxi, ut huic deliriorum tractationi etiam hujus morbi mentionem annectamus, & incidenter insimul sobolis ejus genuinæ nempe, *scorbuti* curationem absolvamus;

## MALUM HYPOCHONDRIACUM ET SCORBUTUS.

Utut *malum hypochondriacum* communissimum sit in nostris regionibus, propter varia tamen symptomata proprio nomine caret; saltem propter locum ubi frequentius urgent symptomata, nempe regionem hypochondriorum & epigastricam, sic vocatur. Ab aliis *malum flatulentum*: *Tartarus hypochondriacus* &c. cujus sublimior gradus *scorbutus* est; *Quæritur autem an scorbutus apud Veteres fuerit cognitus*, sicut *malum hypochondriacum*? *Ratio dubitandi est*, quod videatur morbus novus; nihilominus tamen multi asserunt quod *scorbutus* ab *Hippocrate de affectibus internis*, sub nomine *lienis magni* optimè sit descriptus. *Veteres tamen Medici adeo exactam cognitionem de scorbutu non habuerunt*, propter constitutionem aëris & Regionum. Jam consideranda sunt imprimis *symptomata*: Qui ergo *malum hypochondriaco* imprimis laborare dicuntur, ante omnia conqueruntur de *affectibus stomachi*, nam ut plurimum egregie appetunt, subinde *appetentia canina* laborant, nihilominus tamen simul *apepsia* quadam laborare observantur, ita ut post aliquot horas à pastu *dolores gravissimi convulsiivi in stomacho* percipi soleant; *appetunt acida*, quæ



quæ tamen insigniter lædere solent; ab omni pastu frequenter *eructare* solent, ita etiam ut non raro *inflatione stomachi* corripantur: *Ructus* qui erumpunt dum sunt jejuni, sunt *acidi*, dum vero saturati, nunc sunt acidi qui meliores, nunc *insipidi*, qui deteriores; hinc frequenter *flatulenti tumores* percipiuntur in abdomine & ab his flatibus præter *vagam intumescantiam* omnes conqueruntur de *borborygmis* & variis agitationibus in abdomine, speciatim in regione hypochondriaca sinistra, ut subsultus sensum percipiant ægri & *fluctuationes* crebrius recurrentes, quæ admota manu remittunt isto in loco ubi solent retrudi: Accedit pertinax *alvi adstrictio* ita ut sibi relictæ ad biduum vel triduum soleant pati defectum excretionis alvi; quæ *excernuntur* sunt pauca eaque interrupta, *globulorum formâ* & *indurata nigricantia*, hinc cum in hoc malo *fortioribus purgantibus* parum moveri soleant, blandiora *laxantia*, *emollientia*, *passulata*, *prunata*, & similia, tales solent satis copiosè, respectivè tamen, evacuare, si vero fortius purgent, læduntur; quæ *evomunt* sunt ut plurimum *vea* plus minus *pituitosa*, semper tamen *acida* & præter stuporem, quem dentibus inferunt, vasis orichalceis excepta, eadem in æruginem vertunt, utut quandoque tantillum bilis amarorem soleant importare. Sæpius patiuntur *cardialgias*, quæ frequentissimè à regione spinæ dorsæ gravius affligunt, ubi nempe orificium stomachi simistrum; interdum enim conqueruntur: *Es drücke Sie umbs Herze*/malum hoc semper est ex stomacho. Frequenter laborant *phlogosi vagæ* in specie *post pastum* dum adhuc assident mensæ, tunc insigniter solent erubescere, & eò citius, dum haustum vini assumunt, quod est signum ex primis viis originem esse mali hypochondriaci; frequenter laborant *abdominis dolore lancinante cum contorsionis sensu*, quæ oriuntur à spasmodicis intestinum; præter hos tamen etiam *iliacos* & *colicos convulsivos dolores* patiuntur, nunc in sinistro, nunc, quod rarius, in dextro latere, qui sunt à pituita ut vocant vitrea, à muco acido viscido in cellulis coli sub hypochondriis latente, unde hi dolores nunc *vomitum*, nunc *dolores iliacos convulsivos* per consensum faciunt. Hypochondriaci subinde laborant *difficili respiratione* eaq; multiplici, quæ duplex, nam 1. observatur respirationis difficultas in hypochondriacis, nunc etiam simul in scorbuticis, *ab omni cæna*, dum conqueruntur de difficili anhelitu, vitium est in stomacho & digestionem vitata. 2. Quando ægri tales *matutino tempore* patiuntur *hæritum* nonnihil *difficilem*, ita tamen ut simul *expuant copiosa, viscida, mucosa, tenacia*: Fit hoc ex vitio digestionis primæ & remanentis crudis à cæna vespertina & frequentissime, si hypochondriaci conqueruntur de *difficili anhelitu* & interrogati ubi sit hoc impedimentum, quod respirationem impediatur, dicunt: *Es spanne Sie*/monstrantes regionem diaphragmatis. Interim rogati an percipiant dolorem tensivum, dicunt non, sed tantum conqueruntur de *tensione*, quam si experiuntur hypochondriaci, non possunt respirare, propter *dolorem tensivum*, quem in hypochon-



chondriorum regione percipiunt. Quin & *asthmata sicca convulsiva* patiuntur hypochondriaci confirmati, imprimis ii, qui patiuntur *symptomata mulieribus hystericis communia*, sed rarius hoc fit; in confirmatis hypochondriacis interdum *tumores viscerum* adfunt, *duri, scirrhosi*, qui tamen potius sunt productum morbosum, quam radix morbi; *pulsationes circa regionem hypochondriorum*, imprimis circa lumbos & regionem lumborum superiorem sunt frequentiores hypochondriacis, ubi sunt dispersi rami arteriæ cœliacæ. Tandem cum dictis malis semper ferè conqueruntur de *affectibus capitis* & frequentissimum pathema est *vertigo*, dum ferè omnes hypochondriaci jejuni, sunt vertiginosi, si tamen saltem assumant buccellam panis remittit; Solet quandoque obvenire *obnebulatio capitis* & tandem *ingenitum torpor*, *memorieque lapsus*, ut hypochondriaci confirmati interdum necesse habeant valedicere studiis. Tandem interdum memoria planè deficere incipit; à pastu solent esse quasi *ebrii*, facilè terre fiunt præter causas manifestas & *anxiæ*, graviore cordis *palpitatione* laborant & fiunt quandoque *melancholici* & *tristes meditabundi* citra manifestam causam; observatur interdum, imprimis in viris, quod in graviore paroxysmo *palhemata mulieribus hystericis similia* pati soleant, adeo, ut revera *passio hystERICA* mulierum sit certa quædam species *mali hypochondriaci*. *Urina hypochondriacorum* est varia, extra paroxysmum ferè sanorum est simillima, dum paroxysmus gravior urget, solet esse *pallida* plus minus  $\nabla$ ea; si à remediis fiat turbida, signum est ritè operari medicamenta. Propter hanc variam symptomatum syndromen non mirum est, si *Medici* in tam varias abeant *sententias*, quoad *subjectum*, dum quidam dicunt laborare *splenem*, alii *mesenterium*, alii adducunt intemperiem siccam & calidam *stomachi*, alii, inter quos *Fischer de loco & foco mali hypochondriaci*, statuunt esse *cavitatem*, quæ fit intra stomachum, hepar & splenem pituita refertam, vid. *Hippocrat. S. 56. sect. 7*. Alii *malum hypochondriacum* non affligere certam partem sed esse *vagum*, quod tamen non est. Ratio quod tam in varias sententias collapsi sint Autores, videtur, quod non observent *differentiam* inter partem affectam, ratione causæ radicalis, & partem affectam ratione symptomatum; nam si consideremus *malum hypochondriacum* vel incipiens vel confirmatum, & nexum symptomatum, mox in propatulo est, *fomitent morbosum herere in stomacho* ejusque digestionem vitiatam & oriri simpliciter ex cruditate stomachi acida; hanc sententiam defendit *Hochstetterus in observat. Pars affecta ergo est stomachus &c.*

*Causa proxima* horum malorum complicatorum est *stomachi cruditas acida* sive *acidum ventriculi vitiosum* ex defectu vitioso digestionis primæ in stomacho enatum, à quo omnia reliqua symptomata originem ducunt. Ex  
chylo



chylo acido depravatur sanguinis crasis, hinc deficit ejusdem spiritualcentia; hinc acescit lympa, hinc hebetatur bilis irritaturque genus nervosum: Ex his quasi punctis omnes lineæ deducendæ sunt, quæ depingunt malum hypochondriacum, cujus centrum sit stomachus; nempe vitium hæret in fermento digestivo nimis acido, nec debite volatili spirituosum, unde egregiè quidem appetunt alimenta, assumpta prompte dissolvunt, sed min⁹ fermentant & degenerant in pastam acidam, plus minus viscidam, unde in intestinis concurrente bile copiosi generantur flatūs; si perversè effervescent cum bile, phlogoses generantur vage, à flatibus generantur borborygmi frequentes, lancinationes &c. Hypochondriacorum excreta sunt pauca & indurata, quia coagulantur ab acido, plus minus austero; sicut enim bilis volatilis fluidas reddit fæces ita acidum easdem coagulat, unde quia firmiores redduntur in cellulis diutius retinentur & segnuem alvi inferunt: A tali acido & dolores intestinorum lancinantes & convulsiones oriri res clara est; acidum cum chylo nutriente non ritè in primis viis correcto delatum ad M. S. ejusdem crasin inquinat, eamque plus minus crassam & minus fermentativam reddit; hinc non pauci palpitationes istas cordis derivant à grumoso sanguine plus minus coagulato, circa aurículas in ventriculis cordis hærente, unde sanguis & spissus & crassus observari solet; sanguis enim ita crassus minus spiritualecere valet, & spiritus animales non in debita luciditate generari possunt, unde tristitia, mæror, anxietas & similia pathemata melancholica superveniunt; quin imo, dum ipsum genus nervosum, quod chylo nutrirî solet, vitioso acido irroratur, necessario varii spasmi & symptomata convulsiva ægros affligunt, & in specie circa hypochondria tam variis doloribus affliguntur: Imò dolores tensivi hypochondriacorum iliaci, quos crebrò patiuntur & tensiones capitis circa tempora sunt nihil aliud quàm spasmi membranarum in dictis locis ab acido p. n. irritatarum. Vertigo, dolor capitis &c. quod ex stomacho oriantur notum est; Causa proxima ergo est acidum excessivum minus spirituosum, quod pro ratione aciditatis infert omnia ea symptomata.

*Causas remotas* quod attinet, earum 3. sunt in specie (1.) errata in victu, (2.) deficiens motus, (3.) vita curis ac studiis occupata, quæ disponunt ægros ad cruditates in primis viis: Errata in victu sunt simpliciter assumpta acida, difficulter digestibilia. Talia nempe sunt sale condita vel fumo indurata: Sale condita imbiberunt non parum de spiritu acido salis; fumo indurata de spiritu acido fuliginis multum continent; facit huc potus facile acescens, non rite defacatus, vel qui ad acescentiam inclinat, isque non adeo diureticus vel in acet. vergens, ad malum hypochondriacum disponit. Quoad motum, uti motus omnes digestionem promoveret, ita deficiens digestionem imminuit & ad cruditatem colligendam non parum confert; quibus tandem accedit vita curis ac meditationibus occupata, quia absumit spiritus animales, quorum defectu



acidi succi insigniter solent accrescere. Hinc *lucubrationes nocturna*, statim post cœnam, notoriè ad malum hypochondriacum disponunt.

Hoc malum ad gradum sublimiorem exasperatum & deductum vocatur SCORBUTUS, nempe quando acidum peccans in hypochondriis in tantum exaltatur & successivè quasi volatilifatur, exinde fit summum penetrativum & fermentativum, unde tandem nascitur *scorbutus malum contagiosum*, ex malo hypochondriaco *non contagioso*; speciatim vero 1. *scorbutus videtur imprimis afficere glandulas* quascunq; & in iisdem afficere & inquinare *lympham*. 2. Prout contradistinguitur malo hypochondriaco in specie, solet esse *infectus nervi* & pathemata in hisce graviora & frequentiora quam malum hypochondriacum inferre. Res ut pateat quod inquinet glandulas & aciditas ejus sit infesta nervis, considerata *symptomata scorbutica*: Nempe solent ferè semper conqueri de *laxitate* quadam *gingivarum* una cum vaga seu varia earundem nunc *excrecentia* & *intumescencia*, nunc *exulceratione*; & fricata *gingiva* nunc *sanguinem* stillant eumque intense salsum, nunc *liquamen* quoddam *serosum*; in talibus *saliva* admodum *salsa*, interdum imprimis matutino tempore manifeste *acida* deprehendi solet, ut in Juvene scorbutico observavi. Scorbutici frequenter solent esse *obnoxii tumoribus* imprimis *artuum*, iisque variis, qui nunc protuberant, nunc denuò evanescent. Scorbutici item subinde patiuntur *corporis prurium*, sed dum incipiunt se scalpere, locus intumescens totus insigniter rubet, sed breviori tempore evanescit; in alio loco iterum *prurium* & talem *tumescencia* infert, denuò tamen cessat. Rarum est quod tumores sint constantes & si sunt constantes occupant glandulas artuum, quæ formâ *scrophularum* solent tumescere. Scorbutici sunt frequentissimè *catarrhosi* circa caput, collum, fauces & regiones glandulis magis oblitæ, obnoxii sunt *excoriationibus* & *exulcerationibus*. Adest sæpe *levis pruritus* qui si scalpatur dat *ulcuscula* graviora & in varia ulcera degenerantia, quæ plorant serum adeo acre, ut quandoque calceamenta agri fuerint exinde rosa, & quidem talia ulcera sunt difficulter sanabilia quia facile degenerant in *gangrenam*; frequenter laborant *doloribus* nunc *vagis*, nunc *fixis*, imprimis *doloribus cruciantibus abdomen*, qui inchoant in dorso pergendo ulterius ad regionem umbilicalem & dictas partes quasi convellendo, unde putant se laborare *nephritide*, sed male; potius *nephritis notha* vocanda est, quæ interdum *umbilicum interiora versus retrahit*; verum quidem est, quod abdomen intumescat, & si intumescat, etiam indurescat, non à flatibus sed à spasmò & tensione membranarum; præter hos dolores abdominis qui constituunt *nephritidem notham*, observandi sunt *dolores artuum* iique imprimis magis *vagi*, qui sunt vel leviores vel graviores; leviores sunt instar *sensus vermicationis* in extremitate artuum, similes sere sensui isti, quando dicunt: Die Glieder

seynd



seynd eingeschlaffen/ & species est tactus depravati. Hi dolores *sensui vermiculationis* præcedunt, quibus superveniunt dolores vel *lacerativi* vel *lancinationis* sensu conjuncti; *vagi* sunt, propterea *arthritis vaga* die reißende Sicht appellatur: Sicut *dolor vermicularis* vocatur die grübelende Sicht. Rarius sunt *fixi* & occupant vel *dentes* vel *extremitates artuum*, qui sunt gravissimi. Hi interdum silent, *noctu* magis affligunt, & sic magnam habent convenientiam cum dolore in lui & ex obnoxiiis, unde etiam quidam dicunt, nullum affectum magis esse affinem lui & ex, præter scorbutum; Porro si qui alii, certe scorbutici *affectibus spasmodicis* sunt obnoxii, frequenter partium internarum, rarius externarum. *Urina scorbuticorum* est admodum *varia*, ut plurimum *flammea* instar spiritus nitri, & est nil aliud quam latex urinaris nimis salibus contentis saturatus, instar acerrimi lixivii. Hinc tales *urina flammea* subindè immutantur & fiunt naturaliter tinctæ, sed ita, ut lateribus matulæ se affigant *copiosa arenula rubra* facile friabiles, quæ sunt *salia coagulata* à vasis lateribus & hæ arenulæ sunt unum ex certissimis signis scorbuti. In specie *urina* subinde solet apparere supernatans quædam *pinguedo* instar pelliculæ, quæ pellicula ad latus adspecta solet esse admodum variata, instar *caudæ pavonis*; est nil aliud quam *hia coagulata*. Sic in Chymicis si aliquid evaporetur usq; ad pelliculam, ea apparet variegata. Si qui alii certe *scorbutici* sunt obnoxii *hæmorrhagiis* variis, *sputo cruento*, *diarrhæa cruenta* &c. nam ægri tales quando emittunt cruenta, non est dysenteria, est enim sine torminibus; non hæmorrhoides, quia post stercora produnt, sed est hæmorrhagia intestinorum; *scorbutici purgantibus tractati* facile incidunt *diarrhæam cruentam*, interdum perfectam *dysenteriam*. Frequenter *atrophia* & *tabes* superveniunt scorbuticis, ut rarissimum sit in scorbuto esse probam nutritionem.

Quoad *causam proximam* in scorbuto peccare *acidum* quodammodo corruptum patet 1. *ex consequentibus*, quia remedia *stictalia* & *volatilia* conveniunt, 2. *ex antecedentibus* symptomatibus, exulceratione & similibus, cum variis glandularum tumoribus. *Questio est*, qualis sit corruptio & exulceratio acidi in malo hypochondriaco peccantis, ut tam insignem nocendivim acquirit in scorbuto?

Si consideramus *causas remotas*, permultum obtinet *aër*; propter hunc enim hypochondriaci saltem *Septentrionales* evadunt scorbutici; *Orientales* & *Meridionales* parum aut plane nihil de scorbuto sciunt. Hoc autem inquinamentum *aëris* est, cujus natura admodum falsa in aquilonari, qui perflat loca paludosa & effluvia ista putrida secum aufert; Hinc ex *aëre* hoc à nobis inspiratio istud *acidum* exacerbatur, & degenerat in scorbutum; sic omnes *navigantes*, quo diutius versantur in mari, semper corripi solent scorbuto, & præ aliis *Belgæ* & *Angli* fiunt scorbutici dum navigant. Quin & qui jam conficiantur



cum malo hypochondriaco, si peregrinantur in loca puro aëre prædita, solent sponte ab istis malis purgari; iste ergo aër effluvis salinis acidis est prædius; & secundum *Hartmannum* sulphure temperato destitutus est, hinc malum hypochondriacum exasperat, istud acrius reddit & in scorbutum degenerare facit. Verum in quo in specie corruptio acidi scorbutici consistat, nondum à priori rectè definiti potest; *Signa*, si æger conqueratur de pathematibus circa digestionem seu supervenientibus symptomatibus capitis, sola ostendunt laborare ægrum affectu hypochondriaco: *Scorbutus nisi inveteratus sit*, est difficulter cognoscibilis, interim tamen cum scorbutus se quibusdam morbis associat, semper pejora symptomata adsunt atque in scorbuto simplici. *Urgitur cognoscatur latens scorbutus*, consideret *Medicus urinam* quæ nimis flammea vel cum arenulis istis ruffis imprægnata, vel & caudâ pavonis est instructa; præter *urinam attendat Medicus symptomata dolorosa*; si patiuntur dolores partium ultra naturam talis morbi, si in alio morbo superveniat dolor lancinans in lumbis, nisi adsit nephritis, signum est adesse scorbutum. *Confirmatur* si æger conqueratur de doloribus gingivæ, dentium, si hinc inde macula excrecant, quæ quo majores sunt, imprimis in cruribus, eò magis malum manifestum est; præter maculas pruritus scorbutus interdum solet inferre, pruriginosam similiter purpuram, quæ certum signum est scorbuti latentis.

*Prognosis*: Hi duo affectus recentes possunt facile curari; *Malum hypochondriacum* incipiens solus motus corporis curat, ritè institutus; verum si invaluerit, aut firmiores egerit radices, in specie in negotio digestionis primæ, difficilior curari solet; interdum palliativè saltem iisdem occurrere possumus. Accedit quod hujusmodi affectus inveterati postulent continuatum remedium usum, quorum tamen tedium ægri percipiunt. *Hæmorrhoides, urina fluxus* aut similis quædam hæmorrhagia periodica hujusmodi affectus insigniter levare solet. *Pulsus in hypochondriacis* quandoque intermittit, in scorbuticis vero imprimis ut sic, est admodum varius, subinde parvus ac debilis, ut æger omni momento, quoad pulsum videatur expiraturus, sed si non alia symptomata adsint, non terreatur Medicus. *Inveteratus scorbutus* ordinario in atrophiam & tabem solet terminari. *Macula in scorbuticis*, quo magis rubent, & quo sunt grandiores, eò melius est, quo magis cærulescunt aut livescunt, eò deterius, semper tamen bonum signum est, cæteris paribus, magis tamen bonæ sunt rubræ. *Continua symptomatum* solet esse mutatio in scorbuto v. g. nunc dolores vagi transeunt in parestin, asthma convulsivum, subinde epilepsiam; quando scorbutici atrocissimis doloribus artuum laborant, subito lethargo correpti in alium statum mutantur; quo fixior est scorbutus eò difficilior curatur: Præ cæteris gingivarum habenda est ratio, subinde abeunt in gangranam & secum trahunt exulcerationes faucium pessimas, vid. *Sennertus*.



In *CURA* mali hypochondriaci & scorbuti primus scopus est ut *acidum vitiosum corrigatur*, idque vel *generalibus* acidum ut sic temperantibus, vel *specialibus* acidum scorbuticum emendantibus. 2. *Correctum ut acidum peccans evacuandum*, idque per urinam & sudorem, 3. *stomachi* semper exacta *habenda est ratio*, ejusque digestio promovenda & 4. *sanguinis crasis* in scorbuto *emendanda*.

Pro scopis his obtinendis *observetur* I. *Venesectiones* quascunque minus convenire in cura mali hypochondriaci & scorbuti, unde *salvatella sectio* est ridicula. Interim tamen utut per se non convenient, tamen quandoque indirecte juvant v. g. in dolore crurum incipiente V. S. brachii interdum egregie confert. Sic etiam in cephalalgia scorbutica incipiente aut saepius recurrente V. S. in brachio convenit. *Fonticuli* per se nihil conferunt, à posteriori tamen si crebriores affectus catarrhales affligunt, scorbuticis conveniunt.

Obs. II. Quod inter *evacuantia* conveniant saltem *diuretica & sudorifera*, praesertim *diuretica hypochondriaco-scorbutica* sunt optima; certum est, si in malo hypochondriaco largiter fluit *urina*, maximum esse levamen; inter diuretica conveniunt *salina, non terrea, eaque non acida & volatilia falsa*, ex insectis. *Sudorifera* conveniunt in scorbuto, quando partes externae gravius affliguntur.

Obs. III. Quod *basis cure scorbutica & mali hypochondriaci* consistat in *vomitu*, ut sine ejus praemissione reliqua remedia parum vel nihil operari possint. Unde dicunt optimum esse si hypochondriaci literati omni spatio menstruo ad ebrietatem bibant & vomant; si adest dolor abdominis, vomitus optimus est.

Obs. IV. *Purgantia* proprie dicta semper nocent hypochondriacis, insigniter vero exacerbant scorbutum. Unde ab his quacunque occasione abstinendum; imprimis pathemata scorbuti dolorosa solent excitare purgantia; si adest dolor stomachi, nil juvant: Si urgent doloresa symptomata scorbutica in artubus, solent inferre dolores in abdomine & sic augent malum. In mulieribus hypochondriacis, hystericis ex levi usu purgantium facile dysenteria sequitur.

Obs. V. Ut in omnibus affectibus & speciatim in malo hypochondriaco, *alvus servetur aperta*, nisi enim fluida est, solent insigniter exasperari symptomata, capitis perturbationes & symptomata melancholica; si in scorbuto non est aperta, dolor artuum & abdominis exasperantur. Inter remedia, quae alvum semper servant apertam, excellunt *passula & passulata* & hinc *poma Borstorfiana*; hinc optimus modus est ut infundantur *laxantia in succo pomorum Borstorfiano-rum* qui potus convenit hypochondriacis,

Passula



*Passula* & *passulata* mire conveniunt; ut enim *dulcia saccharata* & *mellina* noceant hypochondriacis, quia fermentando acescunt & affectus recrudescere faciunt, interim tamen *passula*, quatenus sunt temperata, optime conducunt, imprimis viris, non mulieribus, seu usurpentur *in forma electuarii* seu potus v. g.

℞. Pulp. passular. minor. ℥iij.

arcan. duplicat Myns.

specierum diatrion pipereon aa. ℥j.

lyrupi depom. contus. q. s.

Capiat pro lubitu: Potest acui granis aliquot *extract. troch. albandal.* Melius autem est *in forma liquoris*,

℞. Passular. min. ℥jss. l. ℥ij. probè conquass. coque in

▽. simpl. colatur add. folior. sen. ℥iij.

cremoris tartari ℥j. stent aliquandiu in locò calido, postmodum

colatura detur & asservetur pro usu; capiat hypochondriacus haustulum & infervit etiam pro vehiculo reliquorum remediorum. // *Flores acacia* in vino infusi, si æger de tali vino bibat, alvum servat apertam. Præter dicta subinde sunt *clysmata* pro alvo aperta servanda & pro abdominis affectibus minuendis usitata, & quidem parantur vel *ex nutrientibus* & *emollientibus*; vel quod melius *ex urina puerorum*, quæ conveniunt in Melancholia hypochondriaca cum copiosis flatibus junctâ. Si contumacius sit malum, conveniunt *clysmata ex lixivis* additis aliquot ℥is *mellis* depurati; talia *clysmata* mire conveniunt intestina abstergendo, in specie si crassiori muco sunt oblecta. In doloribus abdominis conveniunt *clysmata ex lacte*, vel simplici cui parum *sacchari* sit additum, vel cui incoquantur *plantæ quædam carminativæ*. Conferunt si applicantur tempore vespertino, & si retineantur per integram noctem solent cum insigni ægri levamine applicari subinde; in specie si urgeant dolores nephritici, conveniunt *clysmata ex lacte*, quibus addita sunt *terebinthinata*.

Obs. VI. Conveniunt ergò in malo hypochondriaco *remedia* quæ speciatim dicuntur *antiscorbutica*, imò vix sine alterantibus scorbuticis curari potest.

Obs. VII. *Antiscorbuticorum remediorum* magnam esse varietatem; nunc enim sunt *acriora*, nunc *temperata*, nunc *aromatica sulphurea* &c. Observanda ergò est constitutio ægri, quidam enim non possunt ferre *volatilia*, ut *spiritum cochlearia*, propterea attendant Medici ad constitutionem ægri, ut habeatur selectus inter *remedia antiscorbutica*. *Acrida* enim & *volatilia* subinde magnam scorbuticis inferunt noxam, sinistre usurpata, nempe in subjectis biliosis & ubi acidum est volatilius & acrius, ubi sunt nociva propter phlogoses & effervescentias; propterea in his non conveniunt, nisi misceantur aliis *temperatis*, iisque blande *acidis*, qualia sunt v. g. *cichoreum*, *acetosa*, *succus citri*, *serum lactis*, quod optimum est.

Obs.



*Obs. VIII.* Quod his antiscorbuticis appropriatis, si volatilia nimis sint, *fixa*, acidum primarum viarum abstergentia utiliter præmittantur, *alia* scilicet & *alia* acidum in primis viis potenter destruentia: Hisce tandem *appropriata* volatilia subungi possunt.

*Obs. IX.* Quod *lacticia* in scorbuto præmissis universalibus & vitiosum acidum corrigentibus sint optima; singulare enim quid obtinet *lac* in corrigenda crasi sanguinis à scorbuto vitata, unde in scorbuticis, qui nimium sudant & ad tabem inclinant, præmissis universalibus *lacticia* nobilissima sunt remedia, in specie commode propinantur omni mane & vespere, semper bonus haustus.

*Obs. X.* Quod in cura scorbuti moneant Practici, ut abstineamus à *q. rio* & omnibus *q. iabus*, quia propter *salivationem* gravissima faucium & oris symptomata inferunt; item quia dolores nocturnos in artubus solent exasperare *q. alia* & in scorbuticis excitant graves phlogoses, æstuationes & angustias corporis.

Quod attinet *remedia in cura mali hypochondriaci* præmittantur *digestiva* dicta, sordes primarum viarum incidentia & detergentia, simulque vi *diuretica* naturam ægri ad liberiores urinæ excretionem disponentia; talia sunt: *Tartarus vitriolatus*, & *digestivum hypochond. liq. terræ foliat. tart. Tinct. tart. Tinct. & Zuvelfferi*, & *compositum, Tinct. & ex scoris reguli. pulv. &* & similia, capiantur quotidie bis bona dosi v. g. & *digestiv.* quotidie bis *ij. li-* quor *terræ foliatæ tartari* gutt. 40. 50. Præmissis his usurpentur *vomitória*, primas vias potenter emungentia, eaque reiterata. Post hæc vel loco horum usurpentur, blanda *evacuantiæ per alvum*; inter talia sunt: MP. de *gumm. ammoniaco Quercetan. MP. tart. Ejusdem, extract. catholic. cum gummi xco* & similibus; melius est si usurpentur *noduli* qui in talibus morbis chronicis sunt optimi *ex blandis laxantibus & alterantibus* parati, v. g.

℞. Rad. helenii

raphan. rustic.

polypodii aa. ʒvj.

Herb. absinth.

agrimon.

centaur. min. aa. m. j.

Flor. anthos

genistæ aa. p. iij.

Cort. Tamar.

fraxini aa. ʒss.

Fol. S. S. S.

Part. II.

ccc

rad.



rad. helleb. nigri aa. ℥ij.

zedoar,

zingib.

cinamom. aa. ℥jss.

℥. tart. ℥jss. Incisa &amp; cont. M.

Includantur nodulo, infundantur in vino, quod omni mane & vespere capiatur ut relaxetur alvus. Quidam in usu habent *pilulas aloeticas* sed malè, *aloe* enim nocet hypochondriacis aut scorbuticis; utrum enim uno die laxet, altero tamen obstruit, causa est in *resina*; si *extractum* volumus usurpare, usurpemus substantiam gummosam quæ potest separari terendo cum ∇. simplici, quæ substantia gummosa potest redigi in formam *pilularum* & tales *pilula* dos. gr. iij. blandè laxant alvum, & in tali casu mali hypochondriaci confirmati omnibus tribus l. 4. septimanis in usu sunt, egregia cum euphoria. His præmissis fiat progressus ad *Stialia*, vel alia similia *fixa*, acidum peccans inprimis emendantia; quantum enim præstent *acidula* nemini ignotum est, in quibus præponderat acidum forte. Usurpantur *Stialia* nunc *cruda*, nunc *preparata*, in iis qui non possunt ferre *lim. cruda*. Hinc in usu sunt *liquor St. Ois*, ℥. *Stis compositum*, sicut iis quorum stomachus est nimis sensibilis sufficit *extract. Stis cum pomis Borstorianis* vel cum *extract. Tamarindorum* vel *Tinct. vitrioli Stis Zvvelfferi*. Hæc aliquandiu continentur & post eorum usum blandus instituatur motus alvusque servetur aperta: Post *Stialia* fiat accessus ad *volatilia*, uberius penetrantia, nunc per *sudorem* nunc per *urinam* evacuantia. Hæc inter eminet *spir. \*ci*, isq; non tantum *simplex* sed & *compositus oleosus*, si mixturæ *calc. viv & ℥\**. addatur S. V. infusione *aromatum* imprægnatus & hinc forti Δe per retortam dest. prodit sic spiritus vim aromaticam referens, qui est optimus dosi gr. 30. In malo hypochondriaco, juxta hunc inferioris vix est notæ *spir. Tartari* isque ritè paratus & *volatilis*; præfertur autem his *spir. carminativus de tribus*, qui hypochondriacos mirabiliter levare solet dos. à gutt. 30. ad 40. Ut hæc *volatilia* magis reddantur *diuretica*, consultum est, ut initemur *Zvvelfferum*, qui miscet *spir. ℥\**. cum ana *liquor. terra foliat. tartari*, sic est forte diureticum; juxta hæc *bia volatilia* non omittantur *fixa*, inter quæ omnibus palmam præripit in malo hypochondriaco & scorbuto *arcanum duplicat. Myns.* quod imprimis frequens est scorbuticis, quando crebriores phlogoses agros fatigant, in talibus casibus est nobilissimum, unde in febb. intermittentibus & scorbuticis est sine pari: *Salia* etiam *fixa per calcinationem* parata ex plantis spleneticis aut hepaticis conveniunt; nempe dum Moderni usurpant *bia artificialia fixa*, Veteres consueverunt usurpare præmissis *Stilibus* vegetabilia *amaricantia*, hepatica & splenetica dicta, item *stomachica* v. g. *herb. absinthii*, *fœniculi*, *sumaria*, *cichorei*, *centaur. min. C. B.* *agrimon.*



*agrimon.* & imprimis *bacc. juniperi*, ex quibus concinnarunt *infusa* & *decocta*, quæ tamen in desuetudinem abierunt. Interim ex his per calcinationem parata *salia* non nimis volatilia sunt *egregia* & simul *diuretica*; His æ similibus accedente motu fere curari solet malum hypochondriacum.

Sed præter dicta in *scorbuto* adhuc alia sunt in usu *specificæ*, quæ *specificum* saporem & morbum scorbuticum emendare & tollere possunt. Hæc polt S.  
*alia* usurpanda, sunt in *duplici* differentiâ, nempe vel 1. *respiciunt saltem dyscrasiam sanguinis* & inde derivatos succos, vel 2. *respiciunt simul noxam illatam systemati nervoso* & partibus continentibus. *Priora* sunt volatilia plus magis acria; *posteriora* sunt oleosa sulphurea & quali balsamica. *Inter priora* excellunt *cochlearia*, *nasturtiorum* omnes species, *chelidonium majus* & *minus*, *trifolium aquaicum*, *persicaria*, *piperitis*, *flammula* *Z* is, *rad. raphani rusticani*, *gentiana*, *sem. sinapi*, *cruca* &c. Hæc ferè sunt primaria acria volatilia scorbutica, inter quæ tamen excellit *cochlearia* hinc *flammula* *Z*, & tandem *trifol.* *¶* *hic*: Quibus tamen cum omnia sint acria & volatilia, adeoque non semper conveniant omnibus subjectis, in specie junioribus, aut acido volatili præditis, pro aliquali temperatura addi possunt *acetosella*, item *citrum* & *citrata*. *Posteriora* quod attinet, sunt in specie *pinus* sive *abies alba*, quæ propter egregiam virtutem, *antiscorbutica* appellari solet, speciatim *strobuli*, loco quorum substitui possunt alternata *remedia ex lignis*, speciatim ex *lign. sassafras* item *rad. China*. Horum antiscorbuticorum varius solet esse usus; *Priora* usurpantur vel *cruda* vel *temperata*. *Posteriora* singularem habent texturam, videntur abundare *se volatili*, simul tamen acido in recessu satis penetranti, quod demonstrant ructus acidi. *¶* *Cruda* usurpantur *infusa*, nam coctionem diuturnam non ferunt citra virium jacturam, nisi saltem levis sit ebullitio. Infunduntur vel in *vinum*, & potum reddunt gratum, vel quibus vinum est hostile, & quibus acriora sunt hæc infusa, & phlogoses excitant, talibus commode in *sero lactis* aut *lacte* ipso infundi possunt; res ut pateat e. g.

R. Herb. cochl. recent.

nasturt.

funar. aa. Mj.

Rad. armor. n. j.

helenii. ʒj.

passul. min. ʒvj.

contusa aut conquassata noduloque inclusa infunde vino vel sero lactis vel lacti ipsi. De hoc infuso æger bibat omni mane jejunus bonum haustum & ante prandium, ita tamen ut primo minorem dosin accipiat, successive tandem augendo & sic continuat aliquandiu. Vel



℞. Succ. cochlear.

nasturt.

piperit. aa. ℥iij.

cichorei

acetosell aa. ℥ij.

Seri lactis capr. ℔iij.

Seponantur nonnihil ut depurentur per residendum, hinc colentur & servantur usui, dos. pro una vice sint ℥jv. v. l. vj. Vel

℞. Dicta simplicia & infunditur serum lactis, prius tamen confundantur & conquassentur, hinc succus exprimatur, qui blando tepore depuratus asservetur usui in vitris parvis, & quando necesse est aliquando ℥æ aliquot in sero lactis vel vino propinentur cum ana acetosell. contus. nam & hæc quacunque ratione aliquandiu continuata egregia est, vide *Act. Med. Hassn. p. 136.* Si fuerint acriora commodè temperantur cum succo citri, qui in scorbuto egregium est medicamentum. Tales succi puri etiam possunt affundi limatur. Otis & simili modo usurpari. Vel loco talium essentiarum Otis paretur extr. inspissando succos & tunc extrahatur tinct. Otis scorbutica. Hi succi delicatulis vel qui proni sunt ad effervescendum minus conveniunt, in quibus eorum loco possunt usurpari eorum præparata. ▽. destillata, spiritus, essentia &c. v. g.

℞. Flammul. illæque contus. affundatur vinum, destilletur per alemb. quod etiam potest fieri cum aliis antiscorbuticis & ita habetur phlegma spirituosum antiscorbuticum pro vehiculo aliorum remediorum. Spiritus nunc parantur per simplicem cohobationem, nunc per fermentationem; per cohobationem ita:

℞. Herb. cochl.

nasturt.

piperit.

Rad. ari

raphani rust. aa. q. v.

contusis affunde spir. baccar. juniperi ad eminentiam aliquot digitorum, stent in digestionem aliquandiu, destilletur per alemb. liquor novis speciebus affund. & aliquoties reiteretur, sic acrior fit talis spiritus compositus. Potest illi addi spir. aperitivus Penoti qui est acidus volatilis. Per fermentationem dubitant multi, an ex scorbuticis debeant parari spiritus, quia sub fermentationis negotio maxima pars his volatilis solet evanescere, quod testatur odor, qui tunc exhalat: Certum est pati aliquam jacturam, non tamen omnem, quando per fermentationem caute parati spiritus antiscorbutici adhuc sunt satis penetrantes; ut ergo omnibus satisfiat procedendum est ita: Paretur spiritus per fermentationem ex antiscorbuticis quibusdam: Hunc affunde speciebus recentibus & aliquoties cohobetur



habetur & rectificetur. Spiritus talis infundatur *extract. antiscorbutic.* inspisse-  
tur & extrahatur *tinctura* tandemque *essentia*, cum qua integra crasis antiscor-  
butica est recondita: Hujusmodi ergo spiritus usurpetur *dof. gutt. 20. 30. ad 3j.*  
in vehiculo convenienti. Hisce addantur *oleosa volatilia* ex dictis remediis pe-  
netrantissima, in specie ex *cochlearia*, quando jam incipit referari ejus crasis, tunc  
spiritus ex destillatione prodit penetrantissim<sup>9</sup>, cum paucissimo *oleo*, quod in for-  
mam *elaeosacchari* redactum est egregium. Hisce *volatilibus naturalibus*, associari  
commode debent *volatilia artificialia*, uti sunt *tria volatilia* supra laudata; con-  
gruum est ut paretur *spir. \*ci compositus*, ita ut mixturæ pro ejus præparatione  
infundatur *spir. cochlearia* vel *spir. antiscorbuticum* quidam *compositus*; tantum tri-  
buit *Barbette* spiritui huic, ut hoc solo perfectè curari scorbutum asserat. Inte-  
rim *spir. lumbricorum terrestrium* hisce volatilibus annumerandus venit, tam  
propter vim diureticam, quam quod affectibus scorbuticis dolorosis conveniat;  
Quidam etiam *essentiam myrrh. cum spir. \*ci* parant, vel *elix. proprietatis* cum  
spiritu dicto ad scorbutum commendant.

Post hæc sunt *antiscorbutica sulphurea balsamica* ex *pino* imprimis desumpta;  
Conveniunt autem quatenus non tantummodo acidum acre scorbuticum tempe-  
rant, sed etiam quatenus noxam systemati nervoso inductam & inde natos va-  
rios dolores emendant. Eminent hæc *abies alba* quæ tota convenit, in specie  
*strobuli* mense Martio collecti, tunc enim tactu sunt pingues & resinosi. Hi *stro-  
buli* usurpantur vel *crudi* vel *preparati*: *Crudi* si recipiuntur vel *recentes* vel *ex-  
siccati* & iisdem v. g. ad earum *3jss. l. ij.* infunditur cerevisiæ *Mjss.* coq. aperto  
leniter vase & ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, in fine, dum omnia fer-  
vent, infund. *passul. minor. q. f.* ubi refrixerint colentur, de colatura bibatur, im-  
primis matutino tempore calide *expectando sudorem* blandum, repetatur in  
die semel vel bis: Interdum *bacca juniperi recentes* interdum alia addi possunt;  
hujusmodi decocta spirant odorem *terebinth.* unde forsan nec *terebinthina* usus  
est incongruus in scorbuto. *Summitates abietis* concisæ & vel in  $\nabla$ . vel cere-  
visiæ, vel etiam simili vehiculo decoctæ & usurpatæ in dolorosis affectibus  
egregiè conducunt; Quod attinet *preparata*, est *spir.* vel *essentia strobulorum  
pini vel abietis*:

*Rx.* nempe *strobuli pini*, iisque contulis copiosam aquam affunde,  
instituitur fermentatio & potest paucum de facibus cerevisiæ addi, destilletur &  
prodit spiritus admodum suavis, qui pro usu asservetur. Hinc *Rx.* similiter *stro-  
bul.* iique coquantur in *f. q. 7x*, donec sapor & vis omnis sit exhausta, deco-  
ctum fortiter expressum inspissetur ad consistentiam mellis, ex quò vel cum *spir.  
proprio* vel *cochlearia* vel cum *spir. composito antiscorbutico* extrahatur *essent.* quæ  
*dof. gutt. 40. l. 50.* optima est. Verum in hisce remediis de *pino* observandum  
1. quod eadem non conveniant omnibus, quia nonnihil appetitum lædunt, 2.



quod junioribus & ferventibus subjectis propter oleum volatile non nimis diu propinanda sint, aliàs affectus externos varios, pustulas in facie, erysi pelata & tebb. ardentes inferre solent. Loco horum possunt substitui *lignorum decocta* & *essentia*, una cum *specificis antiscorbuticis* permixta, expectando sudorem; imprimis quando *pathemata catharralia scorbuticos affligunt*, sunt optima temperata additis *specificis antiscorbuticis*: Hisce subiungenda erunt *lacticia* seu *dieta lactis*, scorbuticis præ omnibus aliis ægris conveniens; nempe usurpatur *lac* vel *præmissis universalibus* & primas vias eliminantibus vel in quibusdam simul *cōsilibus*. Usurpatur autem vel *lac* vel ejus *serum*: *Serum* usurpatur in scorbuticis febricitantibus vel qui borborygmis in hypochondriis sunt obnoxii, ut & phlogosi vagæ. In reliquis vero melius est si usurpetur *lac* & imprimis *caprillum*, cum tantillo *sacchari*. Vel *lacti* instilletur *spir. ❄ci & cochlear. aa.* mixt. gutt. 40. & 50. continuetur aliquandiu, omni mane, interdum etiam vespere stomacho vacuo ante cœnam, successive in dosi *ascendendo* & tunc etiam *descendendo*; *lacti* etiam *medicato* incoquantur *rasur. rad. China & herb. fumararia* v. g.

℞. Lactis mens. ℞. cui adde  
rasur. rad. Chinæ ʒ℞.  
folior. fumar. recent. mj.

Tecto vase ebulliant & coquantur aliquandiu, colentur per linteum & pro binis dosibus *lac* ita paratum hauriatur, instillando semper aliquid de *spir. cochlearia*; *lac* ita paratum scorbuticis est admodum proficuum, in specie ubi laborat genus nervosum & adsunt dolores artuum & imprimis quando multum sudant. Sub hac *dieta lactea* cavendum est ab omni acido, & hausto *lacte* instituat aliquoties *ambulatio* ut proluciat urina. *Hæc ita sunt observanda in scorbutici cura.*

Restant adhuc quædam *urgentia symptomata*, quibus mitigandis etiam prospiciat Medicus & in talibus semper respicere debemus scorbutum uno oculo, altero vero ad *symptomata assigentia*. Inter talia sunt primo loco

(a) *affectus dentium & gingivarum*; nempe triplicia mala vexant scorbuticos circa gingivas & dentes 1. *Gingivarum laxitas & molliet*, indeque *vacillatio* 2. *Gingivarum intumescencia, cruentatio*, cui sæpe jungitur *caries dentium*. 3. *Gingivarum putredo serpens*: Omnium horum *affectuum origo* est ex saliva, de scorbutico imprægnata & inquinata, quæ texturam fibrarum gingivarum laxat, rodit & dissolvit, unde eorum *molliet*; ex de acri *excoriatio* tandemque *putrefactio cari*osa. Succurrimus partim oris elutionibus vel *uncturas* gingivis *affricando*, vel *pulveribus* vel *linimentis*. Quoad *collutionem oris*, in his eminet *salvia, rosmarin. flor. aquileg. balaust.* quibus simul *specificæ antiscorbuticæ* sunt addenda.



R. Passul. min. in forma ligni.  
Flores acaciae in vino infus. p. 400.  
Lactiania. p. 406. 401.  
Lignor. decocta <sup>vel</sup> essentia c. specificis  
antiscorbuticis mixta. p. 406.  
Decoct. Lindani 9" Catarrhos. p. 229.







addenda. His simul *adstringentia*, *tormentilla*, *bistorta* & similia addi possunt, sicut etiam *lacca*, *myrrh*. O. *spir. bis* utramque faciunt paginam, v. g.

Rx. Herb. *salvia* m. iij.

*nasturtii* vel *cochlear*, m. j.

Flor. *malv. hortens.* m. ij.

Rad. *polipodij* ℥vj

decoque in ℔bj. l. ij. ∇. fontanae add. *mell. rosar.* ℥j℔. O. *usti* ℥j. *lapid. prunell* ℥iij. usurpetur pro collutione oris. Item *decoctum summatum pini* cum *nasturtio* in vino abluendis gingivis est conveniens, item *salvia* cum *nasturtio* vel in vino vel in sero lactis. Si vinum est acrius interdum in ipso lacte coquenda veniunt & loco gargarismatis usurpantur; præ cæteris optimum est *θ. mirabile Glauberi* in f. q. spiritus solutum; post collutionem sunt *Tinctura* dentibus adfricandæ, quas inter palmam præripit *Tinctura lacca Myns.* nobilis in dentium aut gingivarum affectibus in laxitate, mollitie, exulceratione & gingivarum gangrænâ, rite parata est nobilis; potest tamen meliorari si *lacca* addatur *myrrha*. v. g.

Rx. *Lapid. medicamentos.* Croll. ℥j. solve in f. q. ∇. sedi minor. & *cochl.* solutio blandam post ebullitionem filtratur,

infundatur *lacca* ℥ij.

*myrrhæ*.

O. *usti*. aa. stent in digestionem & extrahatur tinct. qua imbuatur linteum & affricetur gingivis & dentibus scorbuto correptis. Vel

Rx. *Cremor tartari* ℥iij.

*gummæ lacca* ℥j.

*vitrioli Cyprij* gr. vj.

∇. *rosar. salvia* q. f. aa.

Mixta invicem, soluta & temperata gingivis scorbuto afflictis applicentur. Post *tincturas* sunt *pulveres*, quos non ingredientur *lapides* vel *tartarea*, gingivas enim lædunt; ergo optimus pulvis vid. in *Bartholin. Cent. 6. histor. 5.* specificari potest si irroretur cum *spir. cochlearia* & affricetur. Vel excipi potest *unguento aquileg.* vel saltem *melle*. Vel

Rx. *Pulv. bistort.* ℥iij.

Flor. *rosar. balaustior.* aa. ℥j.

O. *usti* ℥ij.

Hæc irrorentur aliquot guttulis *el. destill. caryoph.* & ita usurpentur.

Denique *linimenta* conveniunt, imprimis in graviore gingivarum exulceratione & fœtore, ex *melle rosato* imbuto *spir. bis* q. f. ad aliqualem acrimoniam; tale *linimentum* ad exulcerationes scorbuticas sit instar omnium v. g.

Rx. O. *crudi* ℥j℔.

fol. *salvia* ℥iij.

rad.



rad. ireos florent. ℥℥.

myrrh. ℥℥.

Omnia excipe probe pulverisata melle, redige in formam *linimenti* & affrica dentibus. Si *gravius sit malum*, fiat progressus ad *▽ virid. Hartm. & Plateri* quæ in exulcerationibus scorbuticis oris nobilissima *vid. cap. 52. in Prax. Chymiatricâ*. Quin ubi magis urget malum, accedendum est ad *unguentum Aegyptiacum*, melle dilutum, & locis exulceratis cum penicillo admotum. Veleuporiston *Rulandi*

℞. ▽. S. &amp; hydromell. ℥℥. in quibus dissolve

O. crudi ℥j. M.

*6* Inter alia *symptomata scorbutica* eminet 2. *dolor ventris* qui variè affligit ægros, ut plurimum conqueruntur circa vertebrae dorso se pati *dolores lancinantes & lacerantes*, unde totum abdomen simul dolore affligatur. Interdum *umbilicus versus interiora retrahitur*, interdum totum abdomen tumet. Imò frequenter decipiuntur ægri ut putent se laborare *nephritide*, sed male; & utut *urina supprimatur* non tamen statim adest *calculus*; complicati quidem interdum sunt *dolores nephritici & abdominis*, interdum seorsim affligunt. Conqueruntur de *angustis corporis*, imo subinde eadem patiuntur *symptomata*, quæ mulieres *hysterica*, & utut cessent *dolores abdominis*, tempore tamen extra paroxysmum conqueruntur de *dolore lancinante* circa regionem lumborum. Hi dolores sunt *spasmi* seu *motus convulsivi* intestinorum & mesenterii, quorum fundamentum erat in *plexu mesenterico nerveo* & ibi consitis glandulis, qui plexibus nerveis mesenterii vicinæ sunt. Quoad *curam* horum dolorum 3. *indicationes observanda* sunt: 1. *Intestina leviter abstergenda* sunt, blandis assumtis vel injectis. 2. *Impetus convulsivi & spasmi* in intestinis & membranis abdominis tam generalibus quam specialibus scorbuticis, opiatis & temperatis *sistendi* sunt. 3. *Scorbuti cura primariò attendenda*; in primis *omnia remedia & ex pino* sunt optima idque cessante paroxysmo aut extra eum. Quoad *primum* notetur experientia, quod *purgantia* maxime noceant, *symptomata* exasperent & dolores exacerbent, usurpentur ergò saltem blandè *abstergentia* intestina; inter *assumpta* eminet *serum lactis* & imprimis *ol. expressa, amygdal. dulc.* vel solum vel cum *decocto rad. alth. aut parietar.* haustum, blande lenit & intestina abstergit. Quæ *externe injiciuntur* sunt *clysmata* imprimis *ex lacte* vel solo, vel addatur *saccharum*; imprimis *lac* in quo dissolvitur *terebinthina* cum *vitello ovi* est egregium in abdominis doloribus, idque imprimis si diu retinetur. Vel in usu sunt *clysmata ex sero lactis* in quo *castoreum* à ℥℥. ad ℥j. sit subactum, add. *syrup. papaveris albi* ℥j. ad ij. Quoad *interna* convulsivi impetus sunt sistendi; præstant hoc *bia volatilia oleosa* cum opiatis mixta; in dolore abdominis elegans in specie remedium est *ex castoreo, cochlear.*



*cochlear* & *cor.* aurant. cum *spir.* & ci mixta, add. *laudani opiat* hysterici aliquid, hæc sub quacunque forma sunt optima. Imo si diutius duret paroxysmus & illa sunt usurpanda; præ cæteris *spir. carminativus de tribus* cum vehiculo antiscorbutico quoque est nobilissimus in abdominis doloribus, cujus loco etiam potest sumi *spir. tart. volatilis* mixtus cum *spir. lumbricorum* qui in sero lactis assumti sunt optimi. Externe imprimis convenit *emplastr.* *Poterii*, quod ad ischuriam commendat; interim tamen in huiusmodi doloribus imprimis cum *nephritide* notha conjunctis aut quorum radix est circa lumbos, etiam præmissis præmittendis internis lumbis sequens remedium applicatum egregium est, ex observatione nostra, cujus compositio est talis v. g.

*R.* Picis navalis ℥jv. terebinth. vulg. lbj. flor. sulph. aa. ℥ss. succini lbj. mastichis aa. ℥ij. M.

F. inde ceratum, quod in forma quadrata applicetur lumbis, gestetur aliquamdiu & in dictis affectibus est egregium; Vel abdomini imponatur *emplastrum* ex galbano cum *ol. castorei* vel cum *balsamo Peruviano* malaxatum, nam eadem externa quæ in hysterica passione usurpari possunt conveniunt etiam in doloribus hisce abdominis, vel etiam quod melius est *galbanetum Paracelsi* seu *ol. destillatum* ex galbano & terebinthina externe abdomini largiter calidè illitum, imponendo de super laterem calefactum, est efficacissimum. Ubi deficiunt talia in usu externò fomenta humida & cataplasmata instrata adhibeantur, qualia parantur ex baccis juniperi, floribus sambuci, nasturtii, hyssopami, & similibus in lacte coctis abdominiq; instratis vid. *Dravvitz*. Radicalis cura scorbuti postmodum attendenda, ubi præter illa & antiscorbutica imprimis remedia ex pino conferunt; decoctum strobilorum pini aut baccarum juniperi, sudore aliquoties repetito, cum *emplastr. de pino* sola sufficiunt, pro curandis his abdominis doloribus, ne autem recidivent, lacticia usurpanda sunt, præmissis illis, extra paroxysmum, nam dolores solent præcavere aut imminentes sistere.

Juxta dolores hos etiam sunt *scorbutici dolores vagi* seu *arthritidis vaga*; quæ in locis ubi scorbutus est familiaris sic solet appellari; ubi vero rarus est, ibi solent appellare dolores artuum à rheumatismis seu defluxionibus, qui ordinariò sunt scorbutici; differunt huiusmodi dolores vagi arthritici ab arthritide proprie sic dicta 1. quod arthritidis propria sit fixa, quæ articulos in specie affligit & ibidem sedem fixam format, vaga vero fixum locum non habet, sed modo in hoc, modo in altero artuum solet cruciare ægros. Curiosum est quod frictione pannu calidi dolores mox remittant, mox in alio loco se manifestent.



2. Quod *podagra* ubi diutius affligerit ægrum in articulis solet *facere tophos*, quod non fit in *arthritis vaga* scorbutica, ubi tumores non tales sunt propter materiam contentam, sed propter contracturas spasmodicas. 3. *Arthritis vaga* artius affligit partes musculosas, *arthritis vera* saltem articulos; dolores nunc sunt simpliciter *lacerantes*, nunc profundi *ostocopi*, subinde nocturno tempore affligentes, utut sint maxime *fixi* & quandoque *vagi*. Terminatur *arthritis vaga* nunc per *sudores* & *urinam*, nunc etiam excipit *excretio cutanea* instar *purpure* & tota superficies corporis fit aspera; loco cuius interdum *excrecentia parva*, item *pustule* superveniunt, quæ subinde excrescunt. Notabile est quod si arthritidem vagam excipiat talis *purpura*, ægri tantum *pruritus* percipiunt, ut etiam fricando cutim detrahant; talis *purpura* est cum rubore corporis totius, instar *Erysipelatis*. Non rarum est, imprimis in nostrò clymate, quod *arthritis vaga* complicata sit cum scorbuto, unde dolores & symptomata graviora esse solent. *Arthritis vaga* hæc præter dolores in artubus, simul solet affligere in specie, dum recrudescit paroxysmus, cum *gravissimis anxietatibus præcordiorum*, quod fit in principio paroxysmorum.

*Fundamentum huius pathematis* est *θ. scorbuticum* vellicans fibras nerveas motrices carneas, magis tamen affligens partes tendinosas in articulis. Pro *cura* ergo observandum ut in paroxysmo 1. *impetus his scorbuticis* refranetur; 2. *volatilibus appropriatis* vel per urinam vel per sudorem istud evacuetur; 3. *remediis appropriatis* paroxysmo declinante vel extra eum mali *recidiva* præcaveatur. Quoad *primum* pessimè faciunt, qui in principio paroxysmi usurpant *volatilia* frustranea, potius usurpantur *fixa* & impetum *his scorbuticis* peccantis refranantia. Eminent hic *arcan. duplicat. Mynsicht.* ubi simul usurpetur *θ. diaphoret.* vel *cinnab.* *θ. ij.* interdum *bezoard.* *ore.* interdum adduntur *his fixa alcalia*, quæ nunc spontaneo sudore, nunc per urinam levant ægros, ita ut symptomata remittant & dolores postmodum sint mitiores. v. g.

℞. Arcan. duplicat. Mynf. *θ. j.*

℞. diaphoret. *℞.*

laudan. opiat. gr. ij. in principio paroxysmi. Vel

℞. Arcan. duplicat Mynf. gr. xv.

℞. diaphoret. *℞.* M. potest addi laudani opiat. gr. j.

Postmodum fiat accessus ad *volatilia* eaque generaliter cum scorbuticis mixta, imprimis tamen fiat accessus ad *appropriata volatilia lumbricalia*, quæ sunt singulare specificum in arthritide vaga scorbutica, internò pariter & externo usu. Internè usurpentur *crudi*, vel depurati, scil. conquassati *infundantur* vino vel lacti aut *sero lactis*: Quod infusum mediocriter expressum hauriat æger quotidie bis aut ter; in vino, dum æger vinum ferre potest aut si absit febris; si vero adsit febris seu phlogosis, in lacte. Alii decoquunt saltem in dictis vehiculis & sic propinant,



nant, sed quia talia quandoque ægri horrent, propinentur *spiritus lumbrici* v. g. ex iisdem *spir.* per *putrefact.* qui in *sero lactis* vel *lacte* ad  $\text{℥}\text{ss}$ . egregius est; cum quo D. D. Michæel paravit *essentiam* contra *arthritidem vagam*, quando recipit plantas *arthriticas* & *nervinas* exsiccatas iisque affundit *spir. lumbricorum* & C. C. & proprio saturati & cum his extrahit *essentiam*, quam nunc solum ad  $\text{℥}\text{j}$  nunc cum *essentia pini* optimè exhibuit. Convenit etiam *liquor pistorius lumbricorum* in vase massæ panis incluso paratus, qui datur ad  $\text{℥}\text{ss}$ : Quibus imprimis *cartarea volatilia* addenda. Hisce etiam declinante paroxysmo usurpatis, conveniunt postmodum remedia, quæ malum ex ipsis artubus, quantum possibile eradicant & talia sunt ex *pino*; loco horum tamen non inconsultò *bacca juniperi* aut ex iis propinantur remedia, imprimis ex *recentibus*, nam & harum vis balsamica in *arthritide vaga* est egregia; unde *rob juniperi* expectando sudorem cum *antiscurbuticis* mixtum est optimum; *absinthium*, *helenium*, & similia decoquendo & expectando sudorem usurpari possent. Quoad externa, in more quibusdam est, ut applicent partibus dolore vago correptis *linimenta oleosa* ex *ol. lumbricorum*, *chamæmeli*, *pinguedine anserina*, *anatis*; it. *sebo hircino* & c. sed malè: Scorbutus enim & affectus dolorosi scorbutici (quod etiam valet in *paralyfi* & *contractura* scorbutica) non ferunt talia, quæ poros oblinunt, sed potius quæ conservant insensilem transpirationem salvam. Omissis ergo his *pinguibus*, ad quæ refertur *balsamum podagricum Rulandi*, rejicimus etiam *fomenta de lacte* aut *cataplasmata simplicium* in lacte coctorum; nam utut *cataplasmata calida* poros recludant, tamen si frigeſcunt & quia humida sunt, stringunt poros. Foris ergo sicci vel *suffitus* & *decocta lumbricorum* & *formicarum* calide toto membro excepta faciunt ut membra sudent, sub quo sudore sistitur dolor, in specie si linteis calidis abstergetur sudor; *spir. lumbricorum*, aut *liquor*, item *spir. formicarum* cum *calc. viv. destillatus* affunditur  $\nabla$ . vel S. V. item *spir. ❄* cum *calc. viv.* solitarie vel mixt. cum *spir. baccarum juniperi* tepidè illinantur. Si ardor & rubor in parte dolente & quasi *Erysipelas* excitetur, in dictis *spiritibus* solvatur *camphora*, quæ ardoris sensum solet sistere. Hisce add. *cataplasma ex stercore vaccino recente* subacto cum *lumbricis* contusis, & tepide admotum parti dolenti, repetitum dolores sistit; Deckerus in *Commentar. ad Praxin Barbett.* habet *tincturam balsamicam*, quæ videtur non inconcinna contra affectus quoscunque dolorosos.

Post *arthritidem vagam* *scorbuticam* nunc cum, nunc sine ea *scorbuticos* affligunt *affectus paralytici*, quos solet excipere *contractura* artuum

*paralytica* & quidem talis, ut saltem deficiat *motus*, *sensus* vero se rectè habeat, utut sit nunc *dolorosus*, nunc *sensus formicationis*, nunc *lancinans*, & est quasi compositus ex *lancinante* & *ostocopo*. Hæc *paralysis scorbutica* est grave malum quæ difficulter curatur, imprimis si inveterata sit, in specie *formicationis sensus*,



quo præfente vigil fit Medicus ut poffit præcavere paralyfin. Conveniens ergò eft, ut præmiſſis vomitoriis in ſpecie incipiamus curam, ubi tamen fit cautus Medicus & ſi ager inclinet in dolores abdominis ſcorbuticos, caveat à vomitoriis, ſic enim exacerbantur dolores abdominis; ſi vero abdomen eſt ſanum tutò poſſunt propinari imminente vel præfente paralyſi ſcorbutica; præmiſſis ergo illis vel omiſſis, præmiſſis etiam reliquis remediis nempe ſcribitur, ſi levius fit malum ſufficit lac vel ſerum lactis appropriatis antiſcorbuticis medicatum. In graviore vero malo juxta vel una cum lacte, remedia ex pino, ſumero cum aromaticis nervinis, in ſpecie cum roremarinò conveniunt, per ſudores evacuantia & curantia paralyſin ſcorbuticam. Quibus ſi accedat ſpir. tartari volatilis, vel ſimpl. vel compoſ. erunt magis appropriata; nam ad paralyſin ſcorbuticam imprimis valent tartarea volatilia interne & externe uſurpata. Externe præterea, quæ monita fuerunt quoad arthritidem vagam, omnia externa poſſent uſurpari; imprimis fricanda ſunt membra & tunc ſpir. dicti applicandi ſunt optimè. Sic convenit galbanetum Paracelfi, in ſpecie in paralyſi ſcorbutica, quod illinendum eſt tepidè à radice membri ad poſteriora verſus. Juxta hæc conveniunt imprimis vinacea, quibus collectis & ſibi invicem impoſitis donec incipiant incaleſcere, immergatur æger uſque ad regionem iliacam. Hujusmodi vinaceorum balneum ſiccum aliquoties repetitum, ſudorem largum partibus infert, & paralyſin ſcorbuticam ſolvit; ſi non ſufficienter incaluerint, adſpergatur calx viva.

(e) Quod attinet convulſionem ſcorbuticam comitem fere paralyſeos ſcorbutica & ſcorbuti, dum corrugantur fibra mufculorum & tendinoſa à ſcorbutico, differentia obſervanda eſt inter convulſiones & motus convulſivos; motus convulſivi curantur per lac, in quo ſubactus fit ſapo Venetus: Obſervat. proſtat in Barbette præx: Hi nihil fere particulare habent à ſupra dictis remediis contra arthritidem vagam & paralyſin; lac præ reliquis hic in uſu eſt, cui addunt remedia ex caſtoreo; in ſpecie cum ſpir. \*ci & ſpir. cochlearie vel compoſito ex \*cò cum cochlearia deſtillatò, extrahunt ex caſtoreo tincturam, quæ in hiſce affectibus eſt egregia. Hic extollunt quidam contra Paralyſin ſcorbuticam oleum ſequens: Nempe ſi oleo lini affundatur calx viva & abſtrahatur, fit oleum petetrantiſſimum; oleum enim lini per ſe deſtillatum fit adeo penetrans ut forſan nullum oleum ei par ſit.

(f) In ſuperficie artuum & partium externarum porrò ſubinde efflorefcunt macule, ſemper tamen fauſtò ſignò: Opera ergo danda ut uſurpetur cochlearia & convenit tinct. coralliorum antiſcorbutica, quæ dictas maculas potenter expellit. Jam vero ut ut nihil malum in reſeſſu habeant, quia tamen quibusdam cutis nitori ſtudentibus ſunt moleſtæ, & etiam interdum majores ad exulcerationem diſponunt partes, ſubinde necelle eſt, ut removeantur; quod fit mediante ſemine



*semine sinapi*, si tritum cum *aceto destillato* redigatur in formam *linimenti* liquidi, quo in balneo loca illinantur & affricentur, quod etiam conducit in *maculis herpaticis*; Quodsi acrius fuerit

℞. Semin. sinap. ℥ij.

ol. amygdal. recent. ℥℔. l. ℥vj.

fucci citri q. s. M. in consistentiam *linimenti* & affricentur eo artus, ter vel 4. de die.

## CAPUT XIV

DE

## SEMINIS GENERATIONE LÆSA.

**H**Actenus de affectibus utriusque sexui communibus. Sequuntur jam cuius proprii; ubi quidem inter morbos Sexui Virili speciatim infestos primò omnium *seminis generatio læsa* consideranda, quæ ferè triplex esse solet, dum aut *augetur*, aut *depravatur* aut *imminuitur*. Cum autem priores modi rarò occurrant, *immutatio* hæc maximè consideratur, quæ dicitur

## DEFECTUS SEMINIS,

cujus *causa* duplex est, vel *ex defectu materia*, vel *ex vitio testium*. In priori casu, ubi semen deficit, sunt *effeminati*, *torpidi*, *languidi*, *minus alacres* & *Eunuchos* omnibus moribus imitantur. Deficit ergò semen ex *defectu materia*, quæ est pars sanguinis chylosa, dulcis & pinguis, adeoque plus minus viscosa, siquidem ob id in actu generationis genitura spumescit, quæ spumescencia propria est subjectis viscidis à materia subtili imprægnatis. Quicquid ergò substantiam hanc lacteam pinguem potest absumere, illud causa est *defectus seminis*, ut *ira*, *prævus victus*, *nimius labor*: Hinc subinde *pingues* & *corpulenti* minus abundant genitura, quia materia quæ alias suâ natura in pinguedinem facessit, nimis impenditur in supplementum pinguedinis. *Secunda causa* est *vitium testium*, quod vel in *defectu fermenti seminalis* vel in *conformatione*, in specie *testium* consistit. *Fermentum* si est torpidum, enervatum aut minus activum, etiam deficit genitura: Nam in *spermate elaborando* duo sunt consideranda 1. *materia transcolatio* in testium substantiam, 2. *materiæ transcolatæ alteratio*, quæ fit à fermento testium. *Fermentum* tale, ut incumbit elaborationi feminis, ita cum sanguine & lymphâ ex testibus refluens M. Sæ permixtum insignem alterationem corporis excitat, & imprimis fermentum M. Sæ intendit; quo



facit Hippocratis aphorismus: Qui epilepsia corripiantur, in iis anno 14. fit morbi solutio. Fermentum hoc quid sit, non potest determinari; probabile est spiritus animales in testibus esse concentratos, quæ volatili suâ efficacia materiam chylosam eò delatam in substantiam spermatis transmutant. Confirmatur hoc, quia omnia, quæ spiritus animales figunt, seminis generationi obicem ponunt, v. g. acida, vitriolata, nitrata &c. Acræ vero volatilia seminis generationem solent intendere. Defectus ergo & inertia huius fermenti facit, ut deficiat genitura maris.

*Causæ remotæ* sunt variae. I. *Frigus externum intensus*, quod immittit generationem seminis, vid. Salmuth. Centur. 3. obs. 91. qui refert quod milites transeuntes per  $\nabla$ , cum refrixerint testes etiam in iis animositas sit immutata. II.  $\varphi$ . *vivus*, uti nervis inimicus, ita etiam testibus hostilis est: Testantur enim observationes, quod ex inunctione  $\varphi$  ij vivi ad fugandos pediculos enervata sit vis genitalis, restituta tamen per inunctionem ol. de still. spica tanquam aromatici. III. *abusus*  $\varphi$  ris, quæ dum frequentius exercetur aut nimis citò instituitur, enervatur vis testium, unde semen prius aquosum, postmodum defectuosum reddi solet: In tantum enim exhauritur fermentum ut non possit iterum restitui. Imprimis ad vim testium genitalem conservandam multum hæret in negotio digestionis; nimia enim  $\varphi$ . notoriè digestionem primam perturbat & eruditatibus occasionem præbet. Quando enim vis digestionis prima languet, appetitus  $\varphi$ . deficit, partim defectu materie, partim quod chylus non subeat rectam spirituscentiam. IV. Quando læditur plus minus testium conformatio, in specie per tumores; si enim tumidi redduntur testes impeditur debita materie collectio seminalis. Inter tumores eminet primò *inflammatio testium*, quæ à causa externa frequenter solet subnasci, imprimis à contusione testium, à nimia equitatione, item compressione violenta & similibus, quæ contundunt & laxant testium substantiam. Testes inflammati redduntur admodum dolorosi; dolor est partim lancinans, partim pulsans; accedit partium vicinarum rubedo & sensio; testes tumorem & duritiem contrahunt insignem: Tumores inflammatorii sunt periculosi, nam nisi cito discutiantur, in gangrænam transeunt. Secundus tumor est à flatibus, imprimis inter membranas testem involventes collectis, in *pneumatocele*, h. e. quando testes successivè fiant tumidi, cum tumore tenso, simulque scrotum in se est adhuc rugosum, ita tamen ut testis tumidus, si contingatur manu, minus veniat & nunc plus nunc minus solet esse intensus flatulentus tumor. Origo inflammationis huius testium est ex nutrimento spermatico membranarum testes obvolventium, quod vitiosè alteratum & corruptum plus minus, ab acido vitioso per fermentationem inductò transmutatur in flatum.

Nempe



Nempe hic omnia possent applicari quæ sunt dicta de origine flatuum in stomacho & intestinis. 3. Fiunt tumidi testes ab  $\nabla$ . intra eorundem membranas contenta, quæ dicitur aliàs *hydrocele*. Alias tumores testium dicuntur *herniæ*, sed improprie; quia tamen aliquam similitudinem habent cum *hernia vera*, quæ fit ex decessu intestinorum in scrotum, sic appellari possunt. *Hernia* ergo *hydrocele* oritur a lymphæ recursu ex testibus impedito, qui quando impeditur, supervenit tumor testium aquosus, cum vasa lymphatica in quodam loco obstructa rumpantur & lympham effundant intra membranas testes involventes: Et in hac *herniâ*, membranæ in quibus colligitur  $\nabla$ , quò diutius durat *hernia*, eò solent fieri spissiores & teniores, unde malum redditur contumacius. Distinguenda est *hydrocele* à tumore scroti hydropico; nam hydropici solent ordinariò incurrere tumorem scroti; nunc autem tumor scroti accrescit cum *ascite* & intenditur, nunc in *ascite* particulari abdominis, evacuata per paracentesin hydropicorum  $\nabla$ . supervenit tumor  $\nabla$  sui scroti, vid. Barbetre in Anatomia Practica: Prius fit, dum  $\nabla$ . collecta per processum peritonæi descendit intra cavitationem scroti; posterius quando scrotum utitur flaccidum post evacuationem  $\nabla$  repletur, quia  $\nabla$ . ultra peritonæum ac musculos abdominis est & tunc ubi relaxantur partes descendit. Observandum autem est, quod interdum *hydrocel*: proprie dictæ superveniat tumor scroti  $\nabla$  sui, dum membranæ testium à lymphâ distentæ rumpuntur & ex iisdem lymphâ destillat in cavitationem scroti, in specie istius loci, cuius testes antea fuerunt affecti. Malum hoc non facile cognoscitur, in specie quando malum confirmatum & membranæ sunt spissiores, tunc enim similis est *herniæ carnosæ*. Interim testi si *hernia*  $\nabla$  sa laborat, ut sit durus, potest ei induci fovea, quod in *carnosa hernia* non fit; item attendatur varietas  $\nabla$  & collectæ, scil. intra membranas internas tumor est oblongus instar ovi; si vero collectus est tumor intra tunicas intimas non potest percipi, nam testis ipse hunc relaxare solet: Et hic est tumor testiculorum qui vocatur *hernia carnosæ*, qui testibus solet adnasci; nempe involvit testium parenchyma membranosum musculosis fibris simul instructum: Si ergo fiat occasione quadam externa, ut lædantur partim fibra nerveæ, partim carneæ, circa dictas fibras læsas coagulatur & oritur excrecentia quædam carneæ mediî generis, intra fibras carneas & nerveas, quæ est nunc dolens maligna & canerosa nunc indolens. *Sarcocele* hæc seu *hernia notha*, & excrecentia carnosæ, nunc adnascitur testi ejusque summitati, nunc scroto seu membranæ scroti. Hildan. Cent. 4. obs. 64, refert quod *hernia carnosæ* plurimum fiant in testiculo dextro,  $\nabla$  se in sinistro: Sed nil est, quia promiscuè fiunt: Riolanus enim in anthropologia invenit in dextro testiculo hydrocelen. Probè autem observandum est non esse confundendam *herniam carnosam* cum

tumore



tumore proliatarum, quæ tumida redditæ speciem *sarcocoeles* incautis inferre solent vid. Barbett. in Chirurgia. Sicuti interdum materia genitilis in epididymibus collecta & ibi suppressa speciem *sarcocoeles* referre solet. In veterata hydrocele propter densitatem membranarum *sarcocoelem* interdum mentitur. Ultimus tandem est *tumor varicosus*, qui originem ducit ex venis & earundem valvulis, ob aliquod sanguinis impedimentum in ejusdem motu circulari, relaxatis & flaccidis factis; si enim sanguis circa valvulas hærens, ibidem stagnat, congrumatur, & vasa magis magisque reddit tumida, unde testes *tumorem varicosum* solent incurrere, ubi contactus testium inæqualis est, tuncque hinc inde *crispatura* quasi se offerunt, tumor autem inæqualis, nunc eminens, nunc depressus esse solet.

**Prognosis:** Defectus seminis per se malum non est periculosum, nisi quod Mares reddat generationi ineptos; interim tamen quatenus rebus obeundis minus agiles eosdem reddit, omnino curandus. Quoad tumores, difficiles sunt curatu *sarcocoele* & *hydrocele*: *Sarcocoele* si est dolens & maligna *testis*, non est tangenda: *Pneumatocoele* & *hydrocele* sunt sine periculo, nisi propter dolorem & tumorem sunt molestæ.

**Cura:** Variat hæc pro varietate causarum remotarum; 1. *succo chyloso* pingui & spiritibus plus minus turgido *materia seminis copiosa subministranda*. 2. *spirituosis volatilibus*, additis acrioribus & aromaticis, *fermentum testium* acendum & robustius reddendum. 3. *Tumores ipsi maturè discutiendi aut emolliendi, aut aperiendi, aut penitus exsectione testis curandi*. Inter ea quæ defectui materiae & enervato fermento testium dicata sunt, eminent, quæ vel *succum chylosum* pinguem suggerunt, vel quæ *acria aromatica* existunt; ubi *observandum* est, ut *cura stomachi* habeatur & digestio prima promoveatur. Jam ergo quoad *Materiam Medicam*, quæ copiosum succum suggerunt, sunt *lac* & *lactea*, imprimis tamen *muliebres* ex mammis suctum: Hinc *semina*, succo lacteo turgida & *amygdala dulces*, *pinæ*, *castaneæ*, *succolata Indicæ*, *ostrea* & *concha*, *vinum dulce* & *generosum*, imprimis *Hispanicum* & *Malvaticum* sub introitu lecti conveniunt. Ex his parantur *emulsiones*. Faciunt huc *ova* imprimis *vitellum ovi* recentè assumptum. Hiscè accensendi sunt *testes gallorum*; item *farcimina ex cristis* & *testiculis galli*. Quæ spirituositate & acrimonia volatili fermentum testium intendunt, sunt *radices satyri maj.* & *bulb.* In *satyr.* hiscè unus bulb. turget, alter flaccidus est; *radix zingiberis* tam *pulverisata*, quam in India *condita*, *syrup. de zingib.* *semen eruce*, *sinapi*, *fraxini*, *anisi*, *fœniculi*, *nasturtii*, *urtica*, *aromata*, in specie *cubebæ*, *caryophyll.* *galanga*, *cinamom.* *cardom.* *castoreum*, *borrax Venet.* *baccæ sabinae* pulverisatæ, item *baccæ ari* conveniunt. Ex his fiant

varia

varia species  
armare dicuntur  
prægnata  
mendatur;  
rebellum passim  
sanguine gal  
vim intendu

In legitim  
pinentur,  
vim genita  
optimum  
chari & pip  
Vel R. Vm  
tur aliquot  
Mixture, E

Terantur  
irrorerur

Mixta prob  
sum & ren  
Pars



varia species officinarum, diagalang. &c. Hiscè adde quæ καλ' ἐξοχην ♀ rem armare dicuntur, ut Ambra, Mosch. Zibeth cum ol. destill. aromat. subacta & imprægnata. Spiritus formicarum & ∇. magnanimitatis externè & internè commendatur; vel quod Comes à Pappenheim habuit in usu, sanguinem nempe & cerebellum passeris in actu ♀ reo transfossi vel interfecti; pertinet huc spir. galli ex sanguine galli aliquantulum putrefacto, item mixtura & electuaria quæ ♀ eam vim intendunt; Timens seq. habet:

℞. ∇. magnanimitat. ℥iij.

cinamomi.

Essent. satyrion. aa. ℥iij.

Tinct. coralliorum ℥ij.

Essent. ambr. ℥j. M.

In legitima autem eorum usu observandum, ut semper hæc invicem mixta propinentur, non stimulantia solum, quia imbecilles reddunt, non lactea solum, quia vim genitalem spirituosam minus suggerunt; ambo ergo combinanda. Hinc optimum est ad imitationem Solenandri ut lac recipiatur v. g. ℥ij. & addatur sacchari & piperis aa. ℥ß. quod in specie tempore æstivo optimū judicat Solenander. Vel ℞. Vinum generosum Malvaticum vel dulce & add. vitell. ovi recens, acuantur aliquot granis ambre vel specierum aromaticarum & bibant; faciunt huc Mixtura, Essent. & simil. in ejusmodi casibus usitata, v. g.

℞. Species dialat. ℥ij.

diagalang. ℥ij.

diambri.

diamoschi dulc. aa. ℥ij.

rament. pudend. cervi dum

erat in ♀. ℥iß.

nuc. pinear.

pistac.

amygd. dulc. aa. ℥ß.

sem erucæ

nasturtii

urticæ aa. ℥j.

Terantur & fiat cum melle conditum. Conveniens est si tale conditum sæpius irroretur cum ∇. magnanimitatis vel spiritu sanguinis galli. Alii

℞. Vitell. ovor. n ij.

ambr. cuspid. cultelli n. j.

sacchari cuspid. cultell. iij.

Mixta probè cineribus & calide blandè coire permittantur, quod una vice haustum ♀ rem stimulat. Electuar. contra defectum seminis usurpandum fit seq.

Part II.

ggg

℞.



℞. Conser. rad. eryngii  
 satyr. aa. ℥iij.  
 zing. virid. condit.  
 cortic. citri condit. aa. ℥β.  
 amygdal. dulc.  
 nucl. pin.  
 pistac.  
 dactyl.  
 pulp. nuc. Myrist. aa. ℥j.  
 priapi tauri ℥ij.  
 sem. pastinac.  
 erucæ  
 sinapi aa. ℥ij.  
 piper. alb.  
 galang. aa. ℥β. M.

Fiat *electuarium*, quidam addunt *cantharides*, sed non convenit: Conveniunt saltem *cantharides* ubi deficit erectio penis. Cum hisce sociantur *externa*, speciatim *balsamum apoplecticum*, aut *Q. reus Mynsichti*, scroto illitus; loco horum *ol. destill. macis* perinæo, regioni pubis & scroto blandè illitum est egregium, possunt addi aliquot guttæ *ol. destill. caryophyll. & spica*, vel dicta *olea* excipiuntur *axungia castorei* & dictis locis illinuntur:

℞. Ol. caryophyllor. dest. add. grana aliquot zibeth.  
 mosch. aa. q. s. F. *balsam.*

qui scroto testibus & regioni pubis illini potest. *Spir. formicarum* externe illitus intendit Q. rem.

Quoad *Tumores*, eos inter primatum ducit *inflammatio testium*, ad quam nil melius est *cataplasmate* ex *farina fabarum*, vel solâ vel cum *acet. destillato vini* mixta vel etiam cum *oxycrato*. Si vero *cataplasma* fit acrius, commode potest addi parum de *lythargyr.* sic dulcescit *ac. dest.* vide *Riv. Cent. 2. observ. 39. Cent. 3. observ. 1. Cent. 4. observ. 74.* Confert etiam *cataplasma* hoc si inflammatio testium fiat vel sequatur gonorrhæam virulentam; interdum *farina fabarum* add. *semen cumini* v. g.

℞. Farinæ fabarum ℥iij.  
 pulv. semin. cumini ℥β. M.

Cum vino redige in formam *cataplasmat.* Nobile etiam simplex est *agrimonia* vel sola vel cum dictis maritata, unde ex herb. *agrimonia* cum *farina*, vel ex *agrimonia* & radice *cucumeris asinin.* cum vino coctis fit optimum *cataplasma* ad testium



testium inflammationem; si dolores urgent addatur parum de *foliis hyosciami*. Cataplasma ex *foliis ruta* cum *acet. dest.* laudatur ab *Hartmanno*, item quod fit ex *foliis Nymphaeae & nasturtii aquatici*, quod cum *oleo rosarum* applicari potest; egregius etiam est *fotus* ex decocto *rad. China* in cerevisia, qui applicatur testibus, praesertim si inflammatio dictarum partium fuerit ex gonorrhœa vel benigna vel maligna. Fit interdum ut ex applicatis acrioribus externis oriatur inflammatio dictarum partium; optimus ibi *fotus* ex lacte est, cui incocti sunt *flor. chamom. sambuci*. Hisce irritis expectetur inflammationis suppuratio, ad quam promovendam optimum est *empl. Filii Zachar.* malaxatum cum *balsamo sulph. terebinthinato*, quod abscessus maturat; suppuratus abscessus scalpello aperiendus & apertus more aliorum ulcerum est tractandus; juxta hæc *sudorifera* sunt propinanda.

*Hernia flatulenta* curatur omnibus iis, quæ aliàs *carminativa* dicuntur, qualia sunt quæ de flatibus dicta sunt. His *externe* accedunt *fotus discutientes*, inter quos usitatus est iste ex duplo scil. *fabarum farin.* & parte una *seminis cumini*, in quorum defectu commode usurpari possunt *bacca lauri*, imprimis subacti cum *simo vaccini recenti*, quod *cataplasma* mirè dilcutit; neque inelegans est *fotus*:

R. Sem. coriandri ℥℥.

cumini

anisi aa. ℥ij.

O. ℥℥.

vini & ∇. aa. ℥℥. coq. invicem & intincti panni applicentur

loco *hernioso ex flatibus*; & hæc conferunt quoque in *hydrocele*, ubi tamen dictis *balsam. sulphuris*, vel *terebinth.* vel *juniperinus* commode additur, si nempe calide *herniæ flatulentiæ* illinantur imponendo desuper *empl. diasulphuris Rulandi*; si acius fuerit & excoriationem scroti minatur, potest temperari cum tantillo *ol. nuc. moschat. express.*

*Hernia aquosa incipiens* curatur remediis, confirmata vero non nisi per *Chirurgiam*: *Medicamenta interna* sunt, quæ serum superfluum evacuant & imprimis ex elaterio. *Externe*

R. Unguent. dialth. ℥ij.

balsam. sulph. terebinth. ℥ij. inungatur scroto calide; si est *debilius*, convenit hoc *emplastrum*

R. Emplastr. de baccis lauri

stercor. caprini aa. ℥℥.

sem. cumini, flor. sulph. aa. ℥ij.

ggg 2

malaxe-



malaxetur f. q. *ol. ruta & chamom.* applicetur scroto tam in *hernia*  $\nabla$  *sa*, quam in *tumore scroti hydropico*. Loco huius *emplastr. carminativ. Mynsichti*

R. Flor. chamamel. parietar. aa. mij.

fabarum farinæ  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

stercoris caprini  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

pulv. testar. cochlear.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .

c. f. q. chamamel. & acet. vini redigantur in consistentiam emplastri, scroto tumenti applicandi.

Verum in *hydrocele confirmata* nil præstabunt. *Signum confirmata* est, quando 1. tumor iterum circa testes est admodum durus & renitens tactui, hoc enim manifestat insignem spissitudinem membranarum, lympham in se continentium. 2. Quando hic tumor est perpetuo in magnitudine eadem, neq; habet suas vicissitudines & potius incrementum quam decrementum agit. Opera ergo *Chirurgica* est vel *punctura* vel *castratio*. *Punctura* tutissimè instituitur in *hydrocele*; in *tumore vero scroti hydropico* non caret periculo, quia scrotum facile in gangrenam abit, sed quia *punctura* non radicitus malum curat, subinde necesse est, ut *excindatur testis cum tumore*  $\nabla$  *so*: Discisso scroto extrahitur testiculus & supra tumorem vasa præparantia fortiter filo ligantur & simul testis excindatur.

*Sarcocele incipiens* potest tolli *pharmacia*, *confirmata* tamen nonnisi ipsius *carnis*, scroto vel testis adnatæ *abscissione* vel *testis ipsius exsectione* vid. *Barbett. in Chirurgia*. Hæc ergo pro sui cura postulat externè *gummata*, interne remedia *terrea alcalisata*, quæ in strumarum cura solent esse in usu. v. g. *pulv. contra strumas*, *pulv. ex spongia combusta*, ex *terr. sigillat. lap. spongia*; expertus est *pulv. ex rad. ononidis*, de quò vide præter *Matthiolum Scultet. in armentar. Chirurgico. Barthol. l. 4. obs. 52.* Externè primatum ducunt *gummata penetrantia & resolventia* & huiusmodi tumores nunc *emollientia*, nunc *suppurationem* promoventia.

Hæc saltem fiant in *sarcocele benigna*; in *maligna* non. Convenit igitur externè *emplastr. Paracelsi contra herniam carnosam*

R. Gummi. opoponac.

sagapen.

ammon.

galbani aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Dissolve in  $\nabla$ . *rosarum* & inspissa & c. f. q. *olei Philosophi*. redigatur in formam *empl. spissi*, applicetur super locum herniosum integrum & gestetur per aliquot septimanas; sic dicit *Paracelsus* tumorem aut suppurari, aut si fuerit recens penitus dissolvi & discuti. Si *suppuratur* loco convenienti, aperiatur & apostema apertum



apertum *emplastr. stiptico* debito modo ulterius tractandum & consolidandum venit. Si non metuat æger de impotentia & ea, optimum est applicare *emplastr. de ranis Vigonis cum* & rio quod est egregium, sed propter & rium periculosum ne destruat vis testium; facit huc *empl.* quod commendat *Lotishius*

℞. Gum. \*c. ℥jss.

bdell. ℥j.

farin. sem. sinap.

urtic.

lapid. spong. aa. ℥j.

aristoloch. rotund. ℥vj.

sulph. ℥ss.

terebinth. ℥j.

S. V. ℥jss.

ol. ovor. ℥jv.

cerae ℥vj. M. & redigantur in formam *emplastr.* herniæ carnosæ applicandi. *Thermarum* usus externus sarcocoles, si non plane discutit, earundem tamen excrementum avertere solet.

*Hernia varicosa* inveterata non curari potest citra *Chirurgiam*; in recenti convenit *emplastr. de mucilagibus*, mixtum cum aa. *gummi* \*ci in vino soluti; vel *oleum Philosophorum* probè rectific. illitum loco herniæ discutit eosdem tumores; vel ℞. *Unguent. Basil.* cum pinguedine & medulla animalium emollientium, misceatur & applicetur, donec emolliatur tumor varicosus. *Thermarum* usus solet & hic esse commendatus.

## CAPUT XV

DE

## SEMINIS EXCRETIONE ET RETENTIONE LÆSA.

*S*eminis retentio & excretio læditur 3. modis. 1. Quando semen citra coitum effunditur. 2. Quando in congressu nimis citò ejaculatur. 3. Quando nimis tardè in coitu emittunt. Quoad primum si fiat moderate tempore nocturno cum insomniis & reis, vocatur POLLUTIO NOCTURNA; verum si excretio seminis fiat nimis frequenter, copiosa, idque citra tentiginem, seu interdiu, siye noctu, vocatur GONORRHOEA. Hanc Gonorrhœam doctrinæ melioris gratia dividunt in veram & notham:

## GONORRHOEA VERA

est, quando liquor seminalis in testibus elaboratus effluit, isque crebrius & copio-



*suu*, tam noctu, citra tentiginem, quam interdum, flaccido etiam pene; fit hinc ut egri tales fiant graciles circa lumbos & impotentes in motu: Conqueruntur de lassitudine, capitis debilitate, visus & oculorum fulgor perit; tandem fiunt tremuli, appetitus perit & ad tabem dorsalem pergunt. *Pars affecta* sunt *vesiculae seminales*, in quas ex deferentibus deferitur semen, & in quibus solet retineri, donec vel spontaneo impetu vel in coitu debeat effundi.

*Causa gonorrhœa vera* triplicem agnoscunt fontem I. nimia copia & abundantia seminis, una cum laudabili ejusdem consistentia, unde non tantummodo stimulus & ris crebrior urget, sed ubi turgescere incipit, mox erumpit & cum voluptate ejaculatur. Fit hoc imprimis dormientibus quando diutius dorso resupinati incumbunt, sic enim loca posteriora admodum & intense incallescunt & à calore sanguis istorum locorum redditur fervidus, unde semen non nihil incipit turgescere & erumpere; rara est causa in vasis, quæ ut noctu faciunt ejaculationem seminis, ita interdum quoque; quod fit eo facilius, quando *vesiculae seminales* sunt laxiores seu flaccidiore, sic levi turgescencia semen per aperturam in urethram transit, quod autem effluit est laudabile. Disponunt ad hanc causam victus laudabilis & vita genus sedentarium & cogitationes de re & rea.

Secunda causa est nimia acrimonia seminis, ratione cujus irritantur partes genitales, & in specie vesiculæ seminales continuo pruritu & eo laborant, unde vicini muscoli & vesiculæ seminales ad sui contractionem incitantur, & semen exprimitur. Semen in principio apparet laudabile, atramen nunc est magis tenue & serosum, quod nempe est acrius, eo magis tenue &c. Acrimonia tunc peccans solet esse acida ut plurimum, quæ cum sero ad dictas partes delata, solet irritare has partes; hinc in scorbuticis & iis qui laborant malo hypochondriaco confirmato, subinde venit gonorrhœa, ex acido scilicet. Alias etiam à causis externis stimulatæ vesiculæ seminales inferunt talem gonorrhœam. Sic post purgantia sumpta sæpius stimulantur partes genitales & sequitur seminis excretio. Sic cantharidum usus acrimonia sua vellicando vesiculas seminales ad gonorrhœam talem disponit. In specie observanda est materia excreta, uti dictum.

Tertia causa est nimia vesicularum laxitas & flacciditas, cum orificio earum in urethra minus clauso, sed facile apertibili, tunc enim semen, dum non rite continetur, facile effluit. Malum hoc ferè semper causam agnoscit antecedentem, manu stuprationem. Semen autem effluit fere sine sensu, saltem in anteriore penis parte sentiunt. Semen nunc crassum nunc tenue & non nihil serosum. Prius si effluit, signum est testium vim adhuc esse laudabilem; si vero effluit tenue, signum est per istam stuprationem vim testium generativam esse enervatam, unde seminis loco saltem liquor serosus effluit. Vix sponte à causa interna dicta laxitas

laxitas induci  
quod malum

Quoad  
dem egros tal  
rata difficile c  
ter dum à natu

In cur  
gaur, vel lax  
remediis quib

Rem  
qua fit genit  
ergo dicta  
suggerentib  
cum sanguin  
minuunt. Q  
reliquis sp  
horum temper  
superflua sem

Mixta quolib  
borantibus.  
cannabis, pap  
thæas; usup

edulcora par  
bus, cautè ut

Coque in C. q.  
tinet huc efflu  
scopum, quand



laxitas induci potest, & frequentior est hæc gonorrhœa & post hanc *lues* & ea, quod malum per se pater.

Quoad *prognosin*: *Grave est malum*, siquidem si diutius duret, tandem agros tales solet interficere, vel eosdem in operationibus hebetat. *Inveterata* difficile curatur, *nec inveterata statim suppressenda*, ne suppressa materia interdum à naturali statu deficiens circa testes varia inferat symptomata.

In *cura* observandum, ut *seminis copia imminuatur* vel *acrimonia corrigatur*, vel *laxitas restituatur*. Cum omnibus his *habenda est ratio testium*, ne *remediis* quibusdam præposterè adhibitis destruat vis generativa.

*Remedia* ergò quæ *primo scopo* satisfaciunt sunt talia, quæ *materiam* ex qua fit *genitura* *parciorem faciunt* & *fermentum testium obtundunt*: Instituitur ergò *dieta* parciore ex *alimentis paulo acidioribus*, minus chylosum succum suggerentibus, una cum *vigiliis* & *exercitiis corporis* &c. Quæ *partim chyli* cum sanguine assimilationem faciunt, *partim* per transpirationem eundem imminuunt. Quæ *fermentum testium enervant* sunt *acida*, *vitriolata* & *nitrata*, præ reliquis *spir. nutri* & *nitrum crudum*, dos.  $\mathfrak{z}$ ij vel ter assumta sunt egregia; loco horum *temperata* sunt *succi citri* & *limonum*, qui sunt optimi in gonorrhœa à superflua seminis generatione. Vel

$\mathfrak{R}$ .  $\nabla$ . rosar.  $\mathfrak{z}$ ij.  
succi citri vel limonum  $\mathfrak{z}$ j.  
album ovi crudi n. j.

Mixta quolibet die solent usurpari, una vice ab ægris gonorrhœa seminis laborantibus. *Solutiones coralliorum cum succo citri* laudantur. *Semina agni casti, cannabis, papaveris*, quacunque ratione usurpata, solent sistere hæc gonorrhœas; usurpatur etiam ex his *emulsio* v. g.

$\mathfrak{R}$ . Sem. agni casti  $\mathfrak{z}$ ij.  
papaveris albi  $\mathfrak{z}$ j. c. f. q.  
 $\nabla$ . Nymphææ f. emulsio adde  
magister. corall. cum succo citri  $\mathfrak{z}$ ss.

edulcora parum; potens est *semen cannabinum* sed quia hostile est spir. animalibus, cautè usurpetur. *Nymphæa alb. galeopsis millefol. alb.* sunt optima; hinc

$\mathfrak{R}$ . Herb. galeopsis flor. alb. m. ij.  
millefol. fol. alb. m. j.

seminis agni casti  $\mathfrak{z}$ vj. M. & contusa

Coque in f. q.  $\nabla$ . *ruta* vel *mentha* vel *ferrariorum*, propinetur pro lubitu. Pertinet huc *essentia castorei*, quam vide in *Mysicht* & *Reverto*. Quoad *secundum scopum*, quando gonorrhœa frequens est à causa interna conveniunt, quæ *acrimonia*

*niare*



niam istam acidam temperant & corrigunt & simul vi styptica prædita sunt. Conveniunt ergo solutio corall. & Tinct. corallior. Hinc Olla, crocus Ovis adstringens, it. succinata, & quævis ex succino preparata; trochisci de carabe, item ol. destill. succini aliis additum. Faciunt huc ossa sepia preparat. crystall. mont. præp. ꝯ. diaph. mandibul. lucii piscis, saccharum Hni, vid. D. D. Michael, qui usurpavit pulverem ossis sepia cum ꝯ. diaphoretico mixtum. Alii usurpant pilulas ex terebinthin. Cypr. cum croco ꝯ. mixtas; facit huc pulvis Hartmann. qui vid. in Praxi Chymiæ. Nec inelegans est conditum Lindani:

℞. Conserva rosarum rubr.

menth. crispæ aa. ʒjß.

ossis sepia præp. ʒij.

borracis instar O. calcinat. ʒj.

N. M. ʒß.

c. syrupi de rosis ficcis q. f. M. F. Electuarium.

Borrax si calcinata, cruda enim intensissimè ꝯ rem stimulat, sed calcinata, quatenus relinquit cap. mort. stypticum, in gonorrhoea est optima. Facit huc succus millefolii ad ʒiij. cum lacte dulci vel succo lactuca, mixt. cum camphora & propinetur, temperando sic fervorem materiæ seminalis.

Tandem si oriatur gonorrhoea vera ex vesiculis seminalibus flaccidis, conveniunt adstringentia v. g. Tinct. sulphur. vitriol. pulv. de trochiscis de carabe, Tinct. croci ꝯ. adstringentis, terr. sigillata, bolus Armena cum aceto, saccharum Hni & hinc tormentilla ejusque extractum, v. g.

℞. Extract. tormentill. ʒj.

sacchari Hni ʒß.

camphoræ ʒij. M. f. pilula.

℞. Extract. tormentill. ʒij.

sperniol. Croll. compos. ʒij.

pulv. semin. agni casti, plantaginis.

rad. consolid. maj. aa. ʒß.

terebinth. Venet.

camphor. aa. gr. xij. M. f. pilula.

Sic & thermarum usus convenit. Si semen sit vsum, tenuius & serosius, convenit lac cum oryza decoctum, quod serum temperat & lacteum reddit; conveniunt etiam ova cum aromatibus. Si sub cursu vel sub principio morbi purgare velimus, usurpemus cum purgantibus terebinthinam. Jam sequitur

## GONORRHOEA NOTHA BENIGNA.

Hæc est, quando loco materiæ seminalis aliud liquamen effluit: Hanc faciunt dupli-

cem



cem, vel malignam nempe vel benignam: Illa etiam dicitur virulenta: *Benigna* est, quando continuo citra causam manifestam & prægressum actum & reum effluit ex peneliquamen aquosum, tenue, citra ullum sensum; fluxus talis aquosus diutius subinde continuatur, sine intermissione & citra insignem noxam, & hinc fere respondet *fluori albo mulierum* unde à quibusdam vocatur *gonorrhœa catarrhalis*, de quò vid. Laur. in Conf. 10. p. 60. it. Lang. in Epist. 22. Schneid. lib. de Catarrh. 3. pag. 113. & 390. Sicut *fluorem illum mulierum* hac quoque ex ratione *coryzam uteri* vocat Valent. in Epist. de Nova Matr. & Morbone mulieb. Anat: Id quod Dn. Doleo quoque non displicet in *Encyclopæd. Med. Pract. ubi de fluore albo.*

*Subiectum* huius gonorrhœæ sunt *prostate glandulosa*, de quibus vid. Graffius; dum igitur naturaliter subiecta hæc emulgent lympham sui generis, sive humorem limpidum aquosum tenuem, hinc talis humor frequenter ibidem emulgetur ex M. S. & sic continuo citra & ris exercitium effluit, ut fiat purgatio totius M. S. Nempe quod in faucibus *tussis* est & in oculis *illachrymatio*, hoc talis gonorrhœæ in viris.

*Causa* est latex & serosus copiosus & serosus in M. S. ex deficiente tam chylo quam *hematosi* congestus, quæ substantia serosa, per dictas *prostatas glandulas* uberius elicitur, inde quoque excernitur & separatur & si illæ *prostatæ* vel *flacci-diores* vel *molliores* vel alio modo læsæ existunt, fit laticis excretio.

*Causæ remotæ* sunt, quæcunque occasionem suggerunt, ut copiosus latex generetur in M. S. In specie præcedere solet *stomachi labes*, non rite digerentis alimenta, unde cremor aquosior & falsior factus non potest suggerere sanguinem laudabilem, quin potius talia subiecta ad *cachexiam* inclinant.

*Prognosis*: *Malum est maximè periculosum* & prodromus est vel comes *cachexiæ*.

*Cura* ad gonorrhœam minus dirigenda est, est enim saltem symptoma, sed radix morbi & primus fons est corrigendus, nempe cruditas M. S; hinc *serum superfluum* per sudorem & urinam evacuandum & infusione *thermarum* *prostatæ* laxatæ in statum naturalem redigendæ sunt.

*Remedia* quæ hic conveniunt in *cachexia* & affectibus *catarrhalibus* dicta sunt: Ergo affectib<sup>9</sup> his ratione *cachexiæ* & digestionis primæ *amaricantia aromatica* conveniunt: Ratione seri superflui *juniperina*, *sassafrata*, *succinata*, *absinth.* & *mentha* conveniunt, quibus præmittenda sunt *acida* & *Alia*. Quod si vero



## GONORRHOEA VIRULENTA

feu *gonorrhœa notha maligna* adsit, quæ coitu impuro cum femina lue  
 & rea inquinata contrahitur & quidem tali, ubi malum illud ulcera in vagina uteri  
 excitavit. Tales enim fœminæ aptæ sunt, ut per coitum virulentam gonorrhœam  
 mari possint communicare. In his autem effluit primò semen tenuius, postea  
 redditur pedetentim acrius, hinc supervenit dolor acerbus primariò circa penis  
 caput, ubi sunt prostatae glandulosæ, & quidem talis dolor, ut nunquam urina sine  
 acerbò dolore mitti possit. Liquamen quod effluit graves dolores excitat per uni-  
 versam urethram, liquor effluens degenerat successive in pallorem citrinum, tan-  
 dem cœrulescentem, supervenit tunc tumor præputii &c. Nam liquor hinc inde  
 reliquias ponit intra præputium & purulentum reddit tandem tumorem infert, ut  
 difficile possit detrahi de glande, unde in conjunctione ulcuscula fiunt. Materia  
 effluens in tantum acrefcit, ut urethram interdum exulceret & excoriet; in isto  
 loco concrefcit verruncula, quæ vocatur *caruncula penis*, quæ tandem  
 aucta urethram obstruendo urinæ excretionem impedit.

*Causa hujus gonorrhœæ* est fermentum Gallicum per coitum cum  
 infectâ, quæ ulcera in vagina uteri habet, haustum. *Subjectum* sunt pro-  
 stata glandula, raro enim ulterius repit, ut etiam ipsos testes arripiat, vid. Barthol.  
 Cent. 3. histor. 36. Siquidem observantur in talibus agris prostata glandulosa  
 ulcerata & quasi excoriata; nam dum in coitu incalescunt partes genitales, fit ut  
 ulcera vagina uterina exhalent miasmata acra, quæ se insinuant in cavum ure-  
 thræ, & penetrant in prostatas glandulosas, deinde vi fermentativa inquinant  
 lympham dictarum prostatarum, quæ lymphæ inquinata acrefcit, acescit, & à  
 naturali statu degenerat in virulentiam. Hinc à tali specifico acore & reo liquor  
 corruptus pedetentim effluens urethram & præputium inquinat.

*Prognosis*: Malum hoc in principio leve est; sed in progressu excoriat  
 glandulas & quandoque absumit; interdum ulterius serpit per vasa præparantia  
 & testes inquinat, hinc cum sanguine universum corpus inquinat: Frequentius su-  
 perveniunt bubones glandularum in inguinibus, quod bonum est: Nisi enim hoc  
 fiat, certum est, universum corpus correptum esse, quod etiam fit si sponte ite-  
 rum dispareant.

*Cura* imprimis & reum acidum peccans corrigit, hinc balsamica, dicta lo-  
 ca abstergentia & consolidantia, & reliquias ex corpore & M. S. removementia con-  
 veniunt;



veniunt. Ante omnia ergo purificetur corpus, sive instituat<sup>r</sup> purgatio *mercurialis*: Nempe præscribantur pilule factæ ex  $\varnothing$ rio dulcis cum extra-  
cto hellebori nigri vel panchym. Crollii.

℞. Extract. panchymag. Croll.

$\varnothing$ . dulcis à gr. xv.

extract. troch. alhandal. gr. ij. c. l. q.

terebinth. fiant pilule.

Loco  $\varnothing$ . dulc. laudatur præcipit. viridis cum calc. viv. paratus vid. Schröderus. At usus hujus præcipit. viridis primitus quidem videtur augere malum, sed bonum est signum, si enim continuatur, tandem cessat; vel fiant pilule ex terebinthina &  $\varnothing$ . dulci, quæ non tantum laxant, sed & gonorrhœam respiciunt.

Evacuato corpore cum  $\varnothing$ . dulci seu semel seu repetitis vicibus, usurpentur balsamica, appropriata, dicta loca abstergentia, inter quæ eminet terebinthina, in specie balsamus sulph. terebinthinatus, post juniperinus, usurpetur his in die dosi gutt. 8. ad 10. continuetur aliquandiu. Juxta balsam. sulph. nobilis balsamus de copaiba longe excellentior balsamo Peruviano. Hic præter usum externum Chirurgicum, specificum est remedium in gonorrhœa virulenta, uti etiam in stranguria dos. gutt. 30. in vehiculo calido assumtus, & fuit experimentum Lindani. Juxta hæc convenit extract. tormentilla cum saccharo hui & ol. destill. terebinthinae in formam pilular. redactum. Gummi ligni Guajaci est specificum optimum, ex quo cum Tinct. card. vel S. V. Tartarizato elicitor extractum, quod est egregium in  $\nabla$ . plantaginis assumtum. Essent. lignorum & extractum lignorum quoque conveniunt. Hisce addatur infusum cantharidum in S. V. parandi modum vid. in Barthol. lib. 4. Epist. p. 343. Euporiston commune est si ℞.  $\varnothing$ . virum bulliat in  $\nabla$ . simplici per aliquot horas, hinc  $\nabla$ . ista assumatur aliquamdiu mane & vespere, & est egregium remedium.

Præter dicta ulcera sunt quoque quædam in prostaticis glandulis vel urethra: Conveniunt ibidem injectiones per siphonem in penem, quæ parantur ex  $\nabla$ . calc. viv. aloë, melle,  $\varnothing$ . dulci & similibus, sicut in usu mihi est seq.

℞.  $\nabla$ . calc. viv.  $\zeta$ ijv.

aloes

myrrh. aa.  $\zeta$ ß.

mellis  $\zeta$ vj. M. F. injectio in penem cum siphone; potest etiam

addi  $\varnothing$ . dulcis loco aloes, vel decoctum  $\varnothing$ . dulcis edulcoretur cum melle, quod pro tali injectione in usu esse solet vid. Scultet. in armamentar. Chirurg. observ. 74.

hhh 2

Ulceræ



*Ulcera inter præputium & glandem* verò curantur, sequenti *linimento*:

℞. Unguent. diapomphol. ʒβ.

aloës

℥. dulc. aa. gr. xv.

c. f. q. mellis ros. F. *Linimentum*.

Sequitur jam *secundum* in excretionem vitium, nempe

## NIMIS CITA SEMINIS EJACULATIONIO.

*Causa* ejus est duplex vel 1. *vesiculae seminales sunt nimis laxae* & earum *orificium patulum* aut nimis hians, ut levi partium attritu semen turgescens per dicta orificia erumpat. Vel 2. *nimia spirituositas & turgescencia seminis*, dum uberiori impetu spiritus animales turgescere illud & erumpere faciunt.

*Vitium prius curatur* commode blande adstringentibus, quæ laudata in gonorrhœa ex nimia vesicularum seminalium laxitate.

*Posterius curatur* per opiata, quæ hujusmodi actum minus reddunt continuatum, figendo spirituum animalium impetum & refranando ita seminis ejaculationem. Pertinet huc *arcanum ex ambra & opio* quod in *pilul.* redactum dicitur stimulare & rem & actum & reum efficere diuturnum.

Præter hæc verò *tertio* consideranda est

## NIMIS TARDA SEMINIS EXCRETIO,

quando *tardius iusto excernitur semen in coitu*, idque etiam in specie à defectu spirituum animalium, indeque deficiente turgescencia ipsius seminis. Accedit cum hac deficiente turgescencia imprimis vesicularum seminalium & musculorum vicinorum aliquis languor, dum nonnihil sunt inepti ad promovendam seminis turgescens ejaculationem. Dum ergo spir. deficiunt, nec semen ritè turgescit, nec partes ritè constringuntur, nec ritè potest eici semen. Pertinet huc *vitium istud*, dum in coitu erecto scil. membro nihil potest emitti, cum tamen flaccido pene etiam in somno semen exiliat, vid. Vesling. & Zacut. Lusitanus.

Curiosum est Veslingii, qui refert virum erecto pene in coitu genituram non posse effundere, postea flaccescente membro ad levissimum contactum semen effluxisse: Ratio est in defectu spirituum animalium, qui non sufficienter impræ-

impregnant  
pullus frui  
muntur ofcu  
levi impetu  
commendan  
promptius re

T Ande  
citer

est in conv

Impoten  
doctrinam  
ter penis ex  
arterioso, q  
gescenciam  
fit benefici  
utrumque  
venam, p  
impeditur  
rollit. T  
nam in d  
diunt.

Ca  
tium musc  
seu malefic



imprægnant genituram, & hinc partium deferentium nixus contractivus & expulsi-  
vus frustratus. In specie dum tunc à musculis penem erigentibus compri-  
muntur oscula vesicularum seminalium, inde non sufficiunt expansioni, unde  
levi impetu semen tantillum turgescens flaccido membro erumpit; propterea  
commendant aromatica, quæ spiritus animales augent & semen ad excretionem  
promptius reddunt. Hinc Lindanius tales curat per castoreum.

## CAPUT XVI

DE

## PENIS ERECTIONE LÆSA

ET

## IMPOTENTIA VIRILI.

**T**Andem *penis erectio* ad coitum naturalem necessaria, *læditur tripli-*  
*citer* 1. quando *deficit*, 2. quando *excedit*, 3. quando *depravata*  
est in convenienti modo, nec debita figura tenditur. *Primum* vocatur

*Impotentia Virilis*, utut & deficiens seminis excretio ita dicatur. Ad  
doctrinam hujus rei explicandam præsupponendum est, distinguendum esse in-  
ter penis *erectionem* & ejus *turgescentiam*. *Turgescencia* dependet à sanguine  
arterioso, qui influens in corpora nervea eadem replendo distensionem, & tur-  
gescentiam penis infert; ut verò postmodum reddatur firmior, & *erectio* fiat,  
fit beneficio 4. musculorum, circa radicem penis implantatorum, quorum  
utrumque par dum contrahitur, & muscoli crassiores fiunt, tunc comprimunt  
venam, per quam sanguis arteriosus debet refluere. Compræsa ipsâ venâ,  
impeditur sanguinis arteriosi recursus ad venam, & sic penis firmius caput at-  
tollit. *Totum ergò negotium dependet à musculis*, qui contractione suâ ve-  
nam in dorso penis contrahunt, stringunt & sanguinis regressum impe-  
diunt.

*Causa* est triplex: 1. *Spirituum animalium defectus*, non contrahen-  
tium musculos. 2. *Deficiens semen*, non stimulans ad ꝓ rem. 3. *Fascinum*  
seu maleficium,

hhh 3

Prima



*Prima causa*, ut dixi, est defectus spirituum animalium non contrahenium musculos, quibus non contractis venula laxata est, ut penis flaccescat; Si deficiunt spiritus animales, causa & vitium est vel in parte, vel in spirituum animalium motu & stimulo perturbato. Prius fit quando musculi vel nervi sunt affecti, & aut paralyti laborant, aut eorum fibræ sunt resolutæ. Hinc è *causis remotioribus* interdum equitatio nimia comprimendo & contundendo musculos, eosdem erectioni penis ineptos reddit; Casus super os sacrum, percussio circa partes vicinas, ubi nervi horum musculorum originem ducunt, &c. disponunt ad deficientem penis erectionem. Sic quoque læsio capitis, ejusque vulnera penis erectionem impediunt, nervorum vitia inferendo vid. Hildan. Centur. 6. observat. 59. Posterius fit, quando in motu suo perturbati sunt spiritus animales, & plus minus languent, partim in universali eorum defectu, debilitate & viribus exhaustis, ut in senibus & agris, unde quando percipiunt ægri membrum erigere cristam bonum signum est: Partim verò deficit in specie erectio in perturbatione mentis, ut in pudibundis, terrefactis, pavidis & similibus, ubi penis flaccescit, propter spirituum animalium motum perturbatum. Hinc interdum noviter nuptis hoc accidit, in quibus ex nimio pudore deficit erectio debita penis. Huc faciunt qui ad Melancholiam hypochondriacam inclinant, qui propria imaginatione decepti se impotentes putant, cum postmodum curatio morbo hoc vitium cesserit. Vid. Salmuth. Cent. 2. obs. 78.

*Causa secunda* erat deficiens stimulus ex defectu vel vitio feminis, quando semen vel deficit, vel quando non turgescit, vel quando alio modo vitiatum est; si enim semen rite constitutum est, ad quæ rem stimulat seu noctu, sive interdiu id fiat; ita deficiente hoc, flaccida sunt membra & pendula.

*Tertia causa* est maleficium seu fascinum, quando in Copula Matrimoniali Sacerdotali per maleficia, ferram clausam, cultrum parieti infixum & similia impediunt, ut nequeat fieri celebratio coitus, quia deficit erectio. Res mira est: Ut ut enim erectum sit membrum, quando tamen volunt appropinquare conjugium, iterum flaccescit, ut ut cum aliis rem optimè gerant. Multi putant esse imaginationis vitium, & speciem melancholice hypochondriacæ; sed experientia testatur contrarium. Non tamen præcisè ad Diabolum referendum est; forsan imaginatio ligantis multum in recessu habet, vid. Helmont. de curis magn.

*Prognosis*: Malum per se nil habet in recessu, sed indirectè varia mala ex tristitia & aliis animipathematibus infert.

*Cura*

Cura  
volatilibus  
2. Ut arom  
subit fasci  
prioribus sc  
externa, &  
tauri, in q  
cujus usus  
tur. Exter  
altis paratu  
& penem.  
oleo formi  
Ol. ovorum  
miscere in f  
ad hoc rige  
dem penis  
cum progne  
nunt; quib  
Si aut  
mictus nem  
Helmonti  
lavent pud  
unt suffitus  
to multum  
deri potest  
sura campan  
Excretio uri  
proca, inter  
piunt rasur  
ria, etiam h  
observetur  
fit variare r  
varia reme

Secundus



*Cura varia est*; si enim ex primis oriatur causis *observandum est*, ut 1. *volatilibus spirituosius spirituum animalium impetus & influxus promoveatur*. 2. Ut *aromatibus volatilibus acrioribus seminis impetus stimuletur*. 3. Si quid subfit fascini per *experimenta à posteriori cognita removeatur*. Pro duobus ergo prioribus scopis conveniunt omnia, quæ laudata sunt in defectu seminis, interna & externa, & omnia ea huc possunt applicari. Sic *orum sorbile*, in quo *veretrum tauri*, in ♀. actu interfecti, *exsiccatum & pulverisatum cum cinamomo*. convenit, cujus *usus internus* qualiscunque, ante coitum, validam erectionem facere dicitur. Externè convenit *balsamus apoplecticus* aut similis cum *Z. bethe*, *Moscho* aut aliis paratus & glandi illitus; vel illinatur perinaeo aut etiam spatio inter scrotum & penem, ubi muscoli siti sunt. Facit huc *balsamum* ♀. *ris Mys.* in specie cum *oleo formicarum* mixtum & illitum; vel *R. Succipastinaca* cum *ol. sinapi aa.* ℥ij. *Ol. ovorum formicarum magn.* ℥j. M. & expone ☉ per diem & noctem permisce in formam *linimenti*, quo glans ante coitum est illinendus; si post coitum adhuc rigeat, abluatur ∇. calida. Alii recipiunt *fell apri*, quò radicem vel glandem penis illinunt; alii *pulverem hellebori nigri*, vel *radicem pyrethri* miscent cum *pinguedine coturnicis* & istud in forma *linimenti* radici penis vel glandi illinunt; quibus subjungendum *balneum nervinum*, *inseffus*, *fotus nervini* &c.

Si autem à fascino est, quaritur quomodo curari queat? In usu est *betula*, *micus* nempe per *betulam recentem*; *potus cerevisia betulina* experimentum est *Helmontii* vel *succus betulinus* ex ramo ejus sauciato fluens. Aliis in usu est, ut lavent pudenda utriusq; sexus cum *decoct. herb.* ac *seminum aquileg.* post instituant *suffitus ex coralliis*, *dente hominis mortui* & *sem. anthirini*; Huic experimento multum tribuit *Hartmann*. *Corallia* multum laudantur, sicut etiam de his videri potest *Gansius Tr. de Coralliis*. Ulterius singulare specificum laudatur *rasura campana* eo in loco, ubi pistillum eam ferit, assumpta cum paucis *priapi tauri*. *Excretio urinae per annulum sponsalium* ante & post copulationem, eaque reciproca, inter euporista in hoc affectu commendatur, quo irritato alii intus recipiunt *rasuram annuli sponsalium*. Sed quoad hæc, quia adhuc hæremus in *Theoria*, etiam hæremus in *Praxi*, dubitantes an sint licita, an verò minus. Interim observetur, quod prout variant media, quibus instituitur *ligatio* ita etiam necesse sit variare remedia; unde dum dubii sumus, quomodo facta sit *ligatura*, etiam varia remedia tentanda sunt. Huic morbo contrariatur

## NIMIA SALACITAS.

*Secundum nimirum vitium in erectione penis, & in excessu*, quando scil.

aut



*sapius aut diutius*, aut fere continuo erectus est penis, & consequenter erectio & rigiditas est nimia. *Affectus est duplex*, qui occurrit in nimia erectione, secundum duplicem modum quo fit, ita tamen ut *pars affecta* semper sint musculi circa radicem penis, qui contractione suâ comprimendo venam, impediunt sanguinis refluxum & penem erigunt; quod tamen cum *duplici modo* fiat, etiam est *duplex affectus*. I. Enim quando ex ♀ eo stimulo nimis in ♀ rem inbiant, hinc sapius *membritionem* & *pruriginem* ♀ ream patiuntur, dicitur SALACITAS, in qua per integram noctem, *tensionem penis insignem* percipiunt, quæ interdum in tantum excedit, ut superveniat quandoque *delirium* ex nimio feminis orgasmo, quod vix nisi seminis excretionem sedari potest. Hic affectus in maribus est fere idem qui in mulieribus *furor uterinus* dici solet.

*Causa* hujus nimie salacitatis est *seminis* naturaliter constituti, aut non-nihil acriusculi nimius fervor & *turgescencia*, & inde natus stimulus ad ♀ rem, quem sequitur determinatus spirituum animalium motus & penis erectio. *Causæ remotæ sunt variæ*, omnia nempe quæ genituram augent, spirituum animalium impetum excitant, aut acrimonia loca genitalia stimulant. Hinc *vita sedentaria*, *dieta lauta* cum *aromatibus condita*, ad hoc malum disponunt. *Salacitas* hæc si ulterius procedat, ut coitu vix satiari queat, vocari solet SATYRIASIS qui est *summus salacitatis gradus*. Hic est *primus gradus nimie membritionis*. *Secundus gradus* est, dum penis ita rigidus est in omnem dimensionem, ut exinde graviter doleat, & dolorem tensivum sentiat, unde in talibus cum doloribus tensivi membri *nullum est in ♀ rem desiderium*, unde in coitu nullum sperma emittunt. Coitu non levantur, sed potius malum augetur: Morbus hic PRIAPISMUS vocatur.

*Causa proxima* est *convulsio musculorum penis*, qui convulsione continuâ & spasmodica affectione affecti, venam penis penitus concludunt, & sanguinem ibidem retineri & penem intendi faciunt. Quin imò non improbabile est nunc cum spasmo horum musculorum, ipsa corpora nervosa penes tendi & convulsi quid pati, unde post inflationem membri dolor *tensivus* conjunctus esse solet. Dicta ex convulsione in epilepticis quibusdam iisque insciis & invitis, in paroxysmo *membrum tenditur*. Hinc videtur oriri, quod interdum in *suspensis* membrum fortiter tensum observetur.

*Causa remota priapismi* est irritatio quæcunque continua *musculorum penis* aut *corporum nervosorum*, quæ irritatio in causa est ut uberius influant spiritus animales, unde musculi contracti tandem *priapismum* inferunt, non secus

ac ex

ac ex convul  
causa intern  
quæ incaut  
sumptione, sec  
pismum infer  
muculos.  
pismum dispo  
nuptis secun  
lantia ulurpa  
dubio procu  
etiam post n

Pro  
nec pericul  
Priapismus  
mores, nunc

Pro Ca  
animalium f  
propriatis tem  
genus exercit  
dus, ut & for  
nimia copia  
nitrat; hin  
frænant. D  
quam summ  
etiam in quib  
& spirituum  
de camphora  
minuere sol  
nitus fuerit  
homo, creb  
cui, melon  
cum quibu  
sunt in usu  
millefol. flor  
est; nempe  
impetum ♀  
Pars



ac ex convulsione membri dicti fit contractio & rigiditas. Irritatio hac fit à causâ internâ raro, frequenter ab externa, speciatim à perverso usu cantharidum, quæ incautè usurpatæ hoc malum inferunt, siquidem non tantum interna assumptione, sed etiam externa applicatione præter modicum cruentum, tandem priapismum inferre solent, acrimoniâ suâ vellicando collum vesicæ & ibidem sitos musculos. Alia etiam Quærea acriora, magisque aromatica, interdum ad priapismum disponere solent. Vid. Salmuth Cent. 3. observ. 29. qui de sene refert, qui nuptiis secundis juvenulam duxit, cui ut satisfaceret, fortiora per Quærem stimulantia usurpavit, sed tertia nuptiarum die mortuus repertus est, membro rigido; dubio procul convulsivus mortuus, unde musculorum convulsorum fibræ etiam post mortem in tono mechanico rigidi constiterunt; rarum est malum.

**Prognosis:** Salacitas nimia aut satyriasis malum est non adeo grave, nec periculofum, utut molestum, tamen ad tabem quandoque dorsalem disponit. Priapismus vero habet hoc periculi, ut ad convulsiones terminetur, & nunc tumores, nunc inflammationes, nunc alia mala inferat.

Pro cura in salacitate & satyriasi semen genitale imminuendum, spirituum animalium fervor ac impetus sistendus, & si aliqualis adsit genitura acrimonia, appropriatis temperanda. Hinc præter dietam parcam, jejunium, vigilia & vitæ genus exercitiis occupatum conducit. V. S. eaque repetita, motus corporis validus, ut & fortis sudor inde erumpat, conveniunt, & omnia quæ in gonorrhœa & nimia copiâ genituræ fuerunt laudata. Speciatim conveniunt acida, vitriolata, nitrata; hinc opium, camphora, materiam & tentiginem genitalem nonnihil refranant. De opio dubium videri potest, cum in Regionibus Orientalibus tanquam summum Quærem usurpetur: Ad hæc habet summam acrimoniam, quæ etiam in quibusdam sudorem pruriginosum infert; nil tamen impedit, quo minus & spirituum impetum impediat, cum maximè figat spiritus animales; par ratio est de camphora. De vitriolo & ejusdem spiritus res nota est, quod crebrior ejus usus imminuere soleat vim testium genitalem, ut etiam ejus abusu structura testium penitus fuerit immutata. Timæus in cas. habet obs. de nitro p. 173. ubi salacissimus homo, crebriori nitri usu in ∇. nymphæe fuit sanatus. Horum loco succus mali citri, melonum; item acer. rutaceum sæpius usurpatum salacitati frænum injicit; cum quibus opium & camphora maritanda sunt. Agnus castus & vitex maximè sunt in usu; juxta semen viticis est semen cannabinum, lactuca, flor. Nymph. alb. millefol. flor. alb. it. cicuta, quæ apud nos insons deprehenditur; de salice res nota est; nempe sunt ramuli tenelli salicis ex quibus incisis liquor albus emanat, qui impetum Quæ. solet extinguere.



Sic, ut *formulas* quasdam annectamus, egregia hîc est *emulsio Nymphæ scibi cannabina*:

℞. Sem. cannab. ℥jss.

q. frigid. maj. aa. ℥j.

c. f. q. ▽. flor. Nymphææ

rosar. aa. q. f. F. Emulsio, Hujus

℞. ℥xiiij.

Syrup. è suc. viol. ℥ij.

▽. cinamom. bugl. ℥j. M.

Hæc in pollutione nocturnâ, satyriâ, priapismo & omnibus aliis, à nimia seminis quantitate vel acrimonia provenientius affectibus est nobilissima.

Norandum quod ▽. cinam. buglossata omittatur commodius, nisi ob nimiam feminis projectionem insimul vires defecerint; aliâs enim, cum spirituosâ sit & aromatica, malum non nihil exasperare posset. Aliâs & ita præscribere soleo.

℞. Sem. cannab.

melon. aa. ℥ij.

q. frig. maj. aa. ℥j.

▽. lactuc.

acetos.

f. Nymph. aa. ℥iij.

F. Emulsio, edulc. c. f. q. syr. pap. alb.

Sic & *mixture* præscribi possunt;

℞. ▽. fol. vitis.

salicis aa. ℥jss.

spir. nitri dulc. vel

vitrioli ℥ss.

edulc. c. f. q. manus Christi simpl.

Vel

℞. ▽. vitriol. ℥ij.

Tinct. flor. bellid.

ros. aa. ℥ss.

M. D. S. Anhaltende Tinctur 7. bis 9. Tropffen zunehmen.

Vel in forma pulveris:

℞. Pulv. agn. casti

nitri. depurati aa. ℥ij.

camphoræ ℥ss.

laud. opiat. gr. vj.

M. D. S. Pulver zur Zucht und Erbarkeit 3. gute Messer. speien in folgendem Wasser zu nehmen.



℞. ▽. acetos.  
 flor. Nymph. aa. ℥ij.  
 liq. salicis ℥jss.  
 syr. de Nymph. q. s. M.  
 S. Wasser zum Pulver.

Cum his *externæ* ad nimiam salacitatem refranandam in usu sunt *fo-menta* genitalium, scroti & pectinis cum ▽. *Nymphae*, in qua subactum sit opium cum *epithem.* ex succo *semperviv.* & *lactuc.* quibus *nitrum* additum sit; vel fiant *Epithemata* ex aceto destill. cum succo *plantaginis*, *solani*, *sempervivi* & *hyoscyami*, qui succi cum *acet.* modico subacti in forma *Epithematis* applicandi sunt. *Sua-* dent quidam *laminam* *Hui* lumbis applicare, sed malè, quia quandoq; sic infe- cuta est *gravis* *urinæ* *suppressio.* *Iuxta* *satyriasin* *curandus* *est* *priapi-* *smus*, adeoque *convulsio* *musculorum* *curanda.* Conveniunt ergo *vomi-* *toria* ante omnia. *Purgantia* verò intermittantur. *Vomitoria* laudan- tur à *Foresto.* Post *vomitoria* conveniunt *acida*, *remedia* *ex* *vitice*, hinc *opium* & *camphora.* Item *decoctum* *lentium* cum *semine* *agnicasti* subactum solet usur- pari contra *priapismum*; *externæ* conveniunt *cataplasmata* *camphorata.* Vel *illinatur* *ol. amygdalar. dulcium*, in quo soluta sit *camphora*, *radici* *penis*; vel *applica* *camphoram* in *acet. destill.* vel ▽. *nymph.* solutam.

*Tertium vitium* in *erectione* tandem erat

## DEPRAVATA PENIS ERECTIO:

Hoc est, quando quidem erigitur, non tamen ritè & in debita figura, quando penis *curvus* est & vitiata ejus figura emergit. Quando ergo penis erectus con- tortus apparet, læditur ejusdem actio. De hac ex *causa externa* nil potest dici. Contingit tamen quandoque vel *frani* *vitio* vel *praputii.* *Frænulum* quod attinet, si nimis breve est & tenditur membrum, glans retrahitur, & membrum incurvatur: Sic non tantum *generatio* *impeditur*, sed etiam *dolor* *oritur.* Hac ergo *curetur* *Chirurgia*, ubi frænulum simplici incisione secetur. *Observan-* *dum* tamen ut aliquid potius detrahatur de membrana præputii quàm de glan- de; *Præputii* *vero* *ratione* sit, si tanta ejus post glandem est retractio, ut ne- queat denuò retrahi. Ex *violentiori* *id* *coitu* fere oritur.



*Cura* hujus vitii sit per *emollientia*, & cum ut plurimum simul adsit **TUMOR PRÆPUTII**, per *discutientia*. Convenit v. g. *forus ex lacte*, in quô fl. sambuci ebulliant. Vel *cataplasma ex flor. chamom. parietar. ros. rubr. e. lacte coctis & applicatis*, v. g.

℞. Herb malv.

parietar.

alth. aa. Mj.

Rad. alth.

lil. alb. aa. ʒj.

Flor. ros. rubr.

chamom. aa. p. ij.

coq. in lacte ad consist. pultis & applic.

*Quodsi insigniter simul doleat*, addi posset *croci momentum*, & multum præstat commune Chirurgorum cataplasma, ex *pane triticeo cum lacte*, ein Westbrey/ sit exemplum:

℞. Medull. pan. similag. in lacte infus. ℥jss.

vit. ovor. n. iij.

ol. ros. ʒij.


croci ʒj. M. F. cataplasma.

*Quodsi* verò anguis sub herba latitet, & *gonorrhœa conjunctum* sit hoc vitium, quod tantum non semper evenire solet, & huic quoque per *interna* prospiciendum erit, *purgantia* nimirum & *balsamica terebinthinata*, quæ *supra*, ubi de *gonorrhœa*, videantur.

## FINIS PARTIS II.







## CAPUT I.

MENSTRUORUM  
VITIA.

Notum est, quod in *viris* simul & *fœminis* generetur *semen*, ii patiuntur singularem alterationem, ita mulieres, dum ad generationem fiunt apte, in toto genere alterationem percipiunt; Accedit sanguinis excretio per *uterum*, hinc *mammarum* turgentia, & *pubis* efflorescentia, vox fit gravis, & simul sanguis imprimis suam meretur considerationem, qui *fluxus menstruus* vocari solet à *periodo*. Et quidem propria est hæc purgatio in genere humano, nullum aliud animal eandem patitur, prout quidam dicunt, in *simiis* simile observari. Revera etiam sunt exempla *virorum*, qui in omni menstruo spatio per *penem* sanguinis certam quantitatem emiserunt. de quo *Zacut. Lusitan.* loco cuius *viris* frequentior adest *hemorrhoidum fluxus* cum mense fluens. Repetit hic *fluxus* omni menstruo spatio, elapsis exacte quatuor septimanis, ita tamen ut unum vel alterum diem nunc anticipet, nunc postponat, hinc priores 12. vicibus per annum purgantur, posteriores. 11. Rarum est, quasdam mulieres cum mensibus fluentibus intermedio temporis spatio etiam *fluxum Hemorrhoidum* pati.

*Incipit* hic fluxus tempore *pubertatis*, idque frequenter circa annum 14. *etatis*, denuo cessat circa an. 49. Prostant tamen exempla, quæ citius aut tardius passa fuerint: Propria in hoc passu *Idiosyncrasia* probe consideranda est, nunc *juniores*, *alacriores*, *robustiores*, *vegetiores* dixi *laetantes*, *salaciores* citius patiuntur hunc fluxum, qui vero se habent contrario modo, iisdem tardius erumpunt.

Pars III.

A

Flu-



*Fluunt* quidem *continuo*, nisi quod ordinario soleant supprimi, *gestationis tempore*, in quibusdam *tempore lactationis*, unde rara est *Plateri observat. de muliere*, cui ordinario fluebant menses ante matrimonium, post initium verò matrimonii cessabant, sine gravi molestia. Item de *muliere*, quæ quoties lactabat puerum, fluebant menses, quoties puellam, supprimebantur.

De modo, quo *fiant*, res nota est ex *Physiologia*, quod nempe adsit certa quædam *sanguinis turgescencia* & *aucta fermentatio*, ratione cuius per *anastomosin invasis uterinis* exitum invenit. Quod verò circa vasa uterina speciatim aperiatur, fit, quia in dictis locis est certa quædam *vellicatio*, unde ibi sanguis exitum quærit; Patet hoc quia mulieres nunquam sunt *salaciores*, quam instante mensium fluxu & cessante. Adest *lassitudo artuum*, *dolores pulsatorii circa lumbos*, *febris menstrua*. *Gaudia*, *iracundia*, fluxumq; movent, *terror*, *tristitia*, cessare faciunt.

*Redditur ergo præter naturaliter*, tripliciter: 1. *Vel quando imminuitur*, adeo ut vel *penitus deficiat*, vel non *indebita quantitate fluat*, 2. *quando augetur*. 3. *quando depravatur ita*, ut fiat vel *stipatus variis symptomatibus*, vel per *alia loca*, vel *inordinato tempore*: Vel *sanguis adjunctas habet p. n. alterationes*, ut quandoque *excernitur fetidus, ater*.

## CAPUT II.

## MENSIIUM EMANSIO.

Quod attinet *primum vitium*, sive plane *deficiat*, sive non in debita quantitate sanguis fluat, vocatur *mensium suppressio*, melius *emansio*. *Suppressio* enim dicitur de humore actu fluente.

*Emansio* ergo hæc est vel *naturalis*, vel *p. n.* *Naturalis* fit varie: 1. *Ratione ætatis*, quando post 49. annum cessat. 2. *Ratione status mulieris*, dum est gravida, ut ut quibusdam habitioribus primis gestationis mensibus ad medium tempus fluant, *lactescentes* verò sentiunt semper eorundem defectum. 3. *Illis, qui à graviori malo reconvalescunt*, etiam fluxus cessare solet, deficiente sanguine partim in *quanto*, partim in *quali*, naturaliter etiam deficit. 4. In iis quibus præcessit alia quædam *evacuatio*, quæcunque sit, sive sanguinis immediate, sive mediate sub forma alia v. g. quidam patiuntur *ulcera manantia*, vel *graviora vulnera*, per quæ ubertim sanguis effluit, in his & similibus nihil est

tentan-



rentandum pro cura Medica, nisi ut *lauta diata* sanguinis copia reconcilietur: Observandum tamen, quod mulieres quę habent *ulcera*, tunc temporis, quando sanguis deberet effluere, *acerbam* patiantur *alterationem* in loco vulnerato, ut vulnus soleat deteriorari, fœtidam saniem plorare, citius *phlogosi* corripi &c. Sic cessante tempore isto etiam cessant.

*Causa p. n. mensium emanationis* investiganda sunt vel in *ipso utero & vasis*, per quā debet effluere sanguis, vel in *sanguine excernendo*.

*Loca quod attinet*, sunt, quando vasa in utero speciatim in *vagina uterina* obstructa, & à *mucilagine pituitosa*, infarcta sunt: Item, quando *orificium externum* non hiat, vel propter *carunculas* membranę nimis densę unitas, vel quando vaginę uteri, alijs lęsę, coalescunt parietes, unde *fluxus* impeditur.

*Vitio sanguinis & M. S.* Causa est *cruditas* & hinc *superveniens crassities* ejus ac *visciditas*, ratione cujus *cruditatis* sanguini ineptus est ad fermentationem. Hujusmodi cruditas ut plurimum ducit originem ab *acido M. S. coagulante*, aut ejus *fermentationem* impediente.

Malum est eò pejus, si *acidum peccans* est radicum in materia viscida, nam tale *acidum* fere semper est *unicus fons*, ex quo oritur defectus Mensium.

*A Causa interna*, origo hujus acidi est ex *stomacho*, oritur nempe ex *chylo* non ritę *digesto*, unde nil magis disponit mulieres ad defectum mensium, quam *cruditas acida stomachi*, ratione cujus turgescencia sanguinis fermentativa impeditur, & consequenter mensium fluxus cessat.

*Causę remotę externę* sunt, *sex res non naturales*, imprimis *frigus æris* improvise susceptum, hoc enim disponit sanguinem ad coagulationem & grumescenciam, idque in *specie solet nocere*, quando vel *instat* excretio menstrua, vel quando *excerni* solet. Quando instat, nocet subinde *stomachi*, vel *pedum refrigeratio*, quę solet cessare facere Menfes. Sic si mulieres sub fluxu mensium lotionibus in  $\nabla$  frigida indulgent, solet mensium fluxus cessare, & vel *imminens*, vel *fluens* supprimi.

Pręter *frigus* multum conferunt ingesta, in *specie acida*, quę maximę nocent. Pertinent huc *ingesta viscida*, sanguinis *fermentationem* impediencia, obtundendo  $\odot$  *fermentativum*, hinc *lac* & omnia *lacticia* solent prohiberi mulieribus. *Casus* & similia viscida Mensium fluxum impediunt; facit huc *panis recens* ex clibano extractus, qui maximę nocet mulieribus, quia promovet cruditatem stomachi acidam. Hinc *Barbette* mensium suppressionem à causis externis in stomacho radicem habere asserit. Sic si post suppressionem mensium supervenit *Pica*, ratione cujus mulieres varia edunt,



si fiat immodicè, suppressio mensium magis confirmatur. *Alii affectus quicunque, qui sanguinem exagitant, promovent fluxum, tristitia verò & metus, pavor, terror subitaneus, menses vel imminuunt, vel fluentes subinde suppressunt.*

*Mulieres*, quibus p. n. menses emanent, distinguendæ à mulieribus quibus naturaliter emanent. *Quibus emanent p. n.* præter observationes primas, ad unam omnes conqueruntur de *difficili anhelitu*, quando nempe quodammodo moventur, mox *suffocatio* imminet. Ulterius patiuntur *lassitudinem* in omnibus artubus, hinc inde, in specie circa *lumbos*, *dolores tensoos*, graves percipiunt. Pedetentim color corporis *floridus* perit, fiunt apparenter *cachectica*, *oculi* tument, supervenit *pica*, & tandem *perfecta cachectica* evadunt, sed res per se patet.

Magis attendendum ad *differentiam causarum*, an *emanatio* mensium vitio uteri, an *obstructorum vasorum*, vel ratione *turgescientia sanguinis*. Si fiat ratione vasorum infarctorum uteri, solent percipere *pathemata*, quæ ostendunt adhuc sanguinis imperum & motum excretorium, nempe in his stasis temporibus, quibus aliàs fluere debent *menses*, *frequentes* sunt dolores lumborum circa vasa lumborum, & quæ ex ramis iliacis oriuntur. Conqueruntur ulterius de sensu cujusdem tensionis circa *regionem pubis*, item percipiunt *pulsationes* circa regionem pubis, item percipiunt pulsationes hincinde in variis corporis locis, nunc circa *hypochondria*, nunc in *artubus*, adsunt *murmura*, *borborygmi*, *dolores lancinantes* in lumbis, qui ostendunt sanguinis tunc urgentem fermentationem & turgescentiam menstruam, & propter impedimenta in vasis non potest emitti, unde quandoque in talibus, sanguis per loca alia effluere solet: Hæc ostendunt deficere menses propter vasa obstructa. *Menses* verò emanere vitio sanguinis, non debite turgescentis, evidens testimonium est, quando mulieres nullam patiuntur *alterationem* iis temporibus. Verum cum interdum incertæ sint mulieres an sint *gravida*, an. p. n. *menses* deficient, subinde solent interrogare Medicos de hac re.

*Prognosis* p. n. *sanguinis emanationem* solet insequi *cachexia*, non quod effectus deficientium mensium, sed quod *cachexia* incipiens redditur confirmata. *Morbi* quibus supervenit mensium emanatio, redduntur deteriores, in specie *chronici*, non solent rectè curari, nisi simul promoveatur mensium fluxus.

*Cura.* Ante omnia 1. *Ventriculi chylosis* est corrigenda. 2. *sanguinis cruditas volatilibus aromaticis* emendanda. 3. *humores viscosi, vasa uterina obstruentes, iisdem* incidendi. Hisce simul conjunctis *appropriatis* fermentum mensium stimulandum, idque nunc in - nunc externis.



Pro scopo primo obtinendo, conveniunt vomitoria, hinc aromatica volatilia, (2) conveniunt volatilia oleosa. Ratione (3) conveniunt imprimis gummata, & dulcis. Ratione (4) conveniunt appropriata, & quæ per experientiam sunt cognita, quæ Menses stimulant, quæ tamen ut plurimum vi acidum destructiva sanguinis dissolutionem solent pellere. Pro his scopis observandum est ulterius, quod ista appropriata nunquam in confirmato malo usurpanda sunt, nisi præmissis evacuationibus & acidum absorbentibus, & quidem ubi calculo facto deberent fluere Menses, aliàs enim quocunque tempore usurpata, sunt frustranea; Si verò mulier non potest invenire tempus, moment Medici practici, ut circa lunam crescentem, præmissis præmittendis usurpentur, quo tempore sanguis facilius turgescit.

Præmissis ergo debitis digestivis, propinentur vomitoria. Uno nomine, cura talis affectus eadem est cum cura cachexia, cui subjungantur tandem appropriata menses pellentia. Præmissis ergo digestivis, vomitoria, quin etiam purgantia usurpari possunt, & cum gummatibus parata, verbi gratia, sint pilulæ usuales ex purgantibus & alterantibus.

℞. Extract. panchymag. Croll. ℥j  
Gummi ammon. in acet. solut. 3℔.

Extract. Croci.  
castorei aa. gr. v.  
trochiscor. alhandal. gr. iv.  
c. l. q. Ol. succini M.  
F. Pilulæ,

de quibus aliquot capiat ægra omnibus 4. s. l. 6. diebus. Tempore intermedio usurpentur alterantia aromatica. v. g.

℞. Rad. angelic. levistici. ana. ℥j.  
Galangæ. 3℔.  
Fol. Rosmarini.  
Matricariæ.  
Sabinæ ana. M. j.  
Baccarum juniperi recent. 3℔.  
Cinnamomi 3iij.

Croci 3j. & Tart. 3℔ infunditur in vino. Pro scopo alterativo, adde hellebori nigri crudi, singulariter in mensium affectibus, una cum senna; præter dicta, pro scopo alterandi, conveniunt quæcunque aromatica amaricantia in morbis cachecticis & chronicis usurpata; hisce subjungantur Stialia, quæ multum habent in recessu in mensium suppressione, & quidem inveteratam emanationem citra Stialia curare impossibile est. Ope-



rantur, quatenus absorbent acida, convenit ergo limatura  $\sigma$ . cruda  $\zeta$ ij. Cinnamon.  $\zeta$ j. infundi in vino quo placet possunt, Agra bibat haultum mane & vespere ante pastum. Conveniunt Tinctura Otis Zwelfer.  $\sigma$ .  $\sigma$ . composit. liquor.  $\sigma$ . Ois. Post hæc universalia, accedendum ad specifica interna, qualia sunt rosmarinus, bacca juniperi, herb. sabina. & ejus Oleum destillatum est potentiss. Angelic. artemis. meliss. gentiana, Crocus qui optimus, unde quæ patiuntur difficultatem mensium actu fluentium, solent velci iusculis, ex croco, cinamomo. Myrrha & omnia ex & cum myrrha parata hic conveniunt. Unde trochisci de Myrrha. Elix. propr. sine acido Menses promovent. Colocynth. præter evacuativam viscidorum vim, speciatim amaritudine sua Menses promovet. Unde si tollitur laxativa vis, potest parari simplex alterativum Menses pellens. Castoreum & ex eo parata essentia Castorei cum Volatili sunt egregia. Sic Barbette Volatile dissolvit in S. V. quodam, affundit Myrrha, Castoreo, & similibus, sic fit essentia optima, splenis bovis essentia & decoctum ejusdem Quercetani egregie conducit in Mensium emanatione. Borrax potentissimè stimulat, & aliis irritis saltem borrax cum Croco vel pulvere Cinamomi, nunc solitaria, nunc in decocto pulegij menses promovent, verbi gratia.

R. Borraxis  $\zeta$ j.

Cinamomi  $\mathfrak{ss}$ .

M. D. in decocto pulegij vel rosmarini. Oia tandem volatilia, primariò fixa, hinc volatilia egregiè menses promovent. Usurpentur eo tempore, quo Menses fluere debent; in specie, si post hæc imperetur corporis motus, vel ut æger maneat, in lecto, ut corpus mad. fiat, sic enim promovetur sanguinis circulus, & felicius excitatur mensium recursus.

Super est, ut consideremus, quando, & uti conveniat V. S. scilicet quando subsistunt Menses, & diutius à fluxu cessarint, sanguis coacervatur, & coacervatus tardius circulatur, & sic mille mala infert, si ergo ex mensibus suppressis adsit plethora & dolor gravativus artuum, difficilis respiratio, necessarium est instituere evacuationem per V. S. Quæritur de loco, an in brachio, an in crure? Duplex considerandum tempus in fluxu mensium deficiente, np. vel quando menstrua instant, l quando menses fluunt, vel fluentes cessant, vena secanda est ad præcavenda menstrua suppressa, verbi gratia, ægræ cuidam sub mensium difficultate menses instant, cui pro facilitando mensium fluxu secatur vena in brachio: nam si secetur in pede, periculum est, ne sanguis, concitatiore fluxu ad inferiora tractus, stagnet circa vasa uteri; Menses supprimantur: Si verd ex improvviso & refrigerio, verbi gratia, terrore &c. tunc pro iisdem revocandis, vena secanda est

est in pede  
brachio,  
inspecie dur  
monenda su  
ex simplici  
diluvia suffi  
gradientia  
huc therma  
curare.  
mam præf  
solutione  
per infun  
antiqua &  
tus tumus  
lummodo  
guinis exc  
est, per me  
cipit utero  
trochisci a

injee carbo  
theribint  
suffitus ute  
liacæ &  
cocto Colo  
narum sole  
plausum  
& crassum  
possit deli  
\*co, irro  
lantes in  
Mensium  
tremorum  
mam. in  
sudorem  
artemisia



est in pede sive crure. Quemadmodum *Ischuria* tollitur V. S. in brachio, ita in suppressione, sanguinis menstrui, tollitur V. S. in brachio, in specie dum instat fluxus. *Hiscē ita observatis*, quoad remedia quædam monenda sunt, inter quæ conveniunt *balnea*, *inseffus*, *semicupia*, vel ex simplici  $\nabla$  tepida, l. *decoctiones* plantarum aromaticarum, loco horum pediluvia sufficiunt crebrius instituta, quibus aliquandiu infideat ægra. *In-  
gredientia* balneorum & pediluviorum ex aromaticis nota sunt, pertinent huc *therma*, quarum *inseffus* diuturnos mensium defectus solet levare & curare. Speciatim conferunt etiam *suffitus* ex *appropriatis* instituti, palmam præfert *suffitus scoriarum reguli*  $\mathfrak{z}\text{ij}$ , quæ dissolvantur in S. V. de hac solutione aliquot cochlearia affunde lateri candefacto, & ita exhalans fumus per infundibulum excipitur utero, loco hujus sufficit, si *Urina*, imprimis *antiqua* & non nihil *foetens*, infundatur *scoriis* *utrisque* candefactis, hinc excitatus fumus egregius est ad promovendum mensium fluxum, non enim solummodo penetrat in vasa, sed vellicat etiam uterum, ut promoveatur sanguinis excretio. Convenit etiam *suffitus Colocynthis*, qui egregius est, per medium dissectæque in  $\nabla$ . simplici decoct. excitatur fumus, quem excipit utero, huic decocto subinde *silices candefacti* injiciuntur. In usu sunt *trochisci* appropriati pro fumo, verbi gratia *ZZ*, *sabina*, *Colocynth.* *Myrrh.*

R. Sabinæ Mss.

Myrrh.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Asphalt. trochisc. alhandal. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

M. f. pulvis.

inijce carbonibus, excitetur fumus. vel ex pulvere cum *balsamo Sulphuris therebinth*: & aceto fiant trochisci, qui injiciantur carbonibus, & ita excitetur suffitus utero excipiendus. Conveniunt quoque *litus externi*, circa regionem *iliacam* & *pubis* illinendi, qui fiunt ex *Oleo cheiri*, qui acuantur cum decocto *Colocynthis*, *Oleo distill. sabine*, *spic.* &c. Horum usus ratione Personarum solet esse varius, & quia virginibus non æque conveniunt, propterea applausum meretur *instrumentum Glauberi*, quod est instar *pollicis longum* & *crassum*, in superiori parte est *capitulum* foraminibus pertusum, quod possit desumi, in illud injicitur *Volatile \*ci.*, vel mixtura ex Calce viva cum *\*co*, irroretur Spiritu Vini, & in uterum immittatur, sic particule exhalantes intra uterum Menses provocant. *Casus*, propter quos contigit Mensium suppressio, frequenter sunt duo. (1). Ex nimia refrigeratione *extremorum*. In tali casu convenit in specie *sperma ceti* cum *Castoreo*, vid. *Ti-  
mam.* in consil. pag. 91. Assumant in vehiculo calido, & ægra ad blandum sudorem se componat: Vel commodè potest usurpari *quoddam fixum*, *artemisia* aut *sabina* &c. loco cujus etiam conveniunt *Sia volatilia*, quo-  
rum



rum usu & blando subsequente sudore sanguis ad fluorem iterum disponitur, in specie addantur remedia ex croco & cinamomo. In tali casu supervenit interdum gravissimus uteri dolor, ex sanguine coagulato ibidem hærente, ubi inter alia convenit decoctum chamæmeli, quod internè usurpatum cum aliis optimum est, externè imponitur regioni pubis in forma Cataplasmat, quod calidè fieri potest. Cum his interdum necesse est ut ingraviori malo secetur vena in pede. Secundus casus est gravior animi terror subitaneus, ubi Forestus usurpavit decoctum chamæmeli ad ℥ij & add. oxy-mell. simplicis ℥ij; Oia volatilia in hoc laudem merentur, quando post eorum ulum ægra ad sudorem disponitur. Hæc remedia interdum conveniunt itidem in paucitate mensium, qn. parcius fluunt, cujus signum est, quod mulieres tales patiantur sub fluxu anxietates. Si non consueta quantitate fluunt Menses, si conquerantur de palpitacione cordis, difficili anhelitu, de dolore pulsatorio circa lumbos, tunc curanda venit & conveniunt omnia ea, quæ aliàs appropriata sunt ad mensium fluxum promovendum, & quidem si magis urgeat malum conjungenda. V. S. in pede &c. convenit. e. g.

℞. Tinct. Poli Otis Zwelferi ℥ij.

Essent. Croci. castorei an ℥j.

M. D. ad 40. vel 50. Tropfen.

aliquoties in die in vehiculo calido, mulier non nihil corpus exerceat blando motu.

℞. ʒi. ʒci.

liquoris C. C. succinat.

aa. ℥j.

M. D. gutt. 30. l. 40.

Essentia splenis bovis composita etiam optima est.

℞. Borræ. ʒß.

Myrrh. gr. xv.

Cinnamom. ʒß.

M. in. 3. pulveres.

quandoquidem etiam loco V. S. in tali casu cucurbitula sine scarificatione possunt applicari cruribus vel femori in regione superiori interna, Zacut. Lusitan. applicavit hirudines orificio uteri externo.



## CAPUT III.

De

## NIMIO MENSTRUORUM FLUXU.

SECUNDUM *Mensium vitium* est *excessus*, quando *copiosius* solent fluere, ad quod vitium pertinet 1. quando *frequentius* fluunt, 2. quando non expectant *tempus menstruum*, sed omnibus 2. vel 3. *septimanis* redeunt.

*Hic* tamen venit curandus, quando debilitat mulieres: Quædam enim sunt *habiliores*, quædam *scorbutica*, quæ sine *lesione* hos fluxus diuturnos perferunt; tales enim relinquendæ sunt. Econtrà quibus fluunt Menes, ita ut debilitentur exinde, propter copiam in tali subjecto insuetam, venit curandus. *Cause hæ* quærendæ sunt vel in *utero*, vel primario in *sanguine*.

Quoad *vitia sanguinis*, hæc per se patent, modo revocentur in mentem, quæ de *hemorrhagia* in genere dicta sunt, nempe *triplex vitium* sanguinis est, ad *nimum fluxum mensium* disponens. 1. Est *nimia sanguinis turgescencia*, ratione cujus *tenuior fluxiliorque* evadit, adeoque promptius per vasa uterina effluit, hoc vulgo dicitur de sanguine bilioso. Ad hæc disponunt *aër fervidus, exercitium nimium, gaudia, ira, potus generosi, salacitas nimia*, cujus effectu nonnunquam patiuntur intensum mensium fluxum, & sanguinem impetuosius effervescentem & erumpentem. 2da, eaque frequentior est *nimia sanguinis fluxilitas serosa*, aut *nimia ejusdem aquositas*, ratione cujus sanguis copiosius solet pervasa *vagina uterina* erumpere.

*Fundamentum* fere est in *stomacho*: Si enim hic alimenta nimis colligescere cogit, & in *chylum* nimis *serosum* transmutat, sanguis etiam *serosus* redditur; sic etiam *Barbette* dicit, quod *fundamentum* nimij fluxus mensium sit in *stomacho* & *renibus*. In *stomacho*, non ritè *chylum* elaborante; in *renibus*, non ritè *serum* evacuantibus, *serum* itaque, in specie *scorbuticis* insigne, coacervatum, frequenter *mensēs* solet inferre, & inde in specie in *scorbuticis*, quæ omnes copiosè purgantur per menstrua. 3. quando vehiculum *serosum acrius* est & *acido salsum*: sic enim facilius eroduntur *vasa uterina*, & sanguis penetrantior existit, ut consequenter *copiosus mensium fluxus* soleat excitari. Disponunt ad hoc *edulia acria* copiosè assumpta, ut nihil dicam de *acrimonia succorum* in primis viis.

Pars. III.

B

Ex



Ex parte uteri causa est, quando nimis aperiuntur vasa uterina, five nimis hiant, quod fit variis occasionibus. Inter externa est conatus corporis quilibet, qui facit ut ista vasa vel rumpantur, vel cum impetu aperiuntur v. g. sublatio oneris gravioris, quod fit cum nisu; & in inspiratione. Pertinet huc sternutatio nimis violenta, mensium fluxu laborantibus & actu fluentibus accidens, quando enim fluunt Menses, & talis motus fit, nimis vasa aperiuntur. Pertinet huc nimia dilatatio vagina uterina & vasorum uterinorum, quæ fit frequenter in abortu, interdum in partu laborioso. Ipse sanguis acrior vasa erodens, aut excorians etiam uterinam superficiem vaginæ uterinæ in causa est, ut post modum non queant connivere ipsa vasa, sed maneant aperta, ut nihil dicatur de acribus extrinsecus admodum, qualia sunt pessi acriores, admoti pro stimulo mensium in specie ex helleboro, talia enim interdum excoriant uterum superficialiter, ut vasa nimis aperta non possint denuo connivere, sed superveniant menses & sanguinis fluxus nimis; cuius causa ut distinguatur, considerandus est sanguis, qui excernitur. Nam si oritur hic fluxus ex nimia apertione vasorum vel turgescencia, vel impetu fermentativo M. S. sanguis solet esse floridus, naturaliter constitutus, qui non statim in grumos abit, uno nomine, signa adfunt sanguinis boni. Ubi vasa sunt nimis hiantia, sanguis quidem naturaliter excernitur, sed brevi grumescit. Si est aquosior, effluit confertim tenuis, qui tarde abit in grumos. Si similis est lotura carnis; vel etiam, si sanguis linteo exceptus ita appareat, ut linteum habeat circulum pallidum, monstrat nimiam sanguinis serositatem. Si adfit conatus quidam ejiciendi, simul si percipiatur sensus pruriginis & erosione, ostendunt sanguinem acriorem simul peccare.

**Prognosis.** Fluxus mensium nimius, eadem infert mala, quæ in genere nimia sanguinis excretio.

**Cura.** In hac sequentes indicationes observandæ. 1. ut sanguinis fervor & turgescencia blande acidis coerceatur. 2. ut ejus fluiditas & conjuncta acrimonia serosa corrigatur & temperetur. 3. Ut via in vagina uterina laxa consolidentur aut firmentur.

Pro scopis his observandum, vel interdum necesse esse, ut Medicus fluxum non nimis cito comprimat: Nam plethorica habitiores, quando sine debilitate fluxum hunc perferunt, relinquenda sunt, vide miscell. Acad. Nat. curios. an. 2. pag. 47. Ubi ex fluxu sanguinis, nimis præpostere oppresso, gravia mala observata sunt. Si verò debilitas superveniat, tunc demum curandus. In cura ergo V. S. nihil obtinet, aut si instituenda est, instituatur caute, saltem in brachio, quantitate pauca. Purgantia per se ni-

hil



hil conferunt, nam quo fortiora sunt, eo magis menses stimulant: Si purgandum est, saltem *rhbarb.* convenit, propinandum ad  $\mathfrak{zj}$  cum *conserva rosarum* mixtum vel cum *syrupo cydoniorum aromatizat.* s. *simplic.* Si quid molientum est in statu sanguinis *seroso*, conveniunt *sudorifera*, & hinc *diuretica*: nam utut sub fluxu sudoris intendatur excretio uterina, tamen dum *serum* fuit *evacuatum*, & sanguis *spissior factus*, fluxus postmodum cessat. Idem est cum *diureticis*. In specie hinc conveniunt omnia quæ superius fuerunt usurpata in *hemorrhagia* in genere, palmam tamen præferunt *Stialia*: Excellit hic liquor *Stis solaris*, nam utut menses stimulet, tamen & lochia ea tunc nimium fluentia sistit; scilicet per se semper adstringunt *Stialia*, & tunc *Stro* acido, vi adstringendi optimè conveniunt. Juxta hæc *Tinctura Sulphuris vitrioli* aut *Tinctura adstring.* est optima. *Lapis hematit.* in *succo granatorum* vel *cydoniorum* menses sistit. Juxta dicta egregius est *succus plantaginis* tam interne quàm externe injectus, nempe in vaginam uterinam, vide *Forestum*. Juxta hæc egregius est *pulvis scranij humani* ad  $\mathfrak{zj}$  usurpat. Hinc *viscus quercinus* ad  $\mathfrak{zj}$  ovo sorbili mixtus, si non prima vice, certe secunda vel tertia vice nimium uteri fluxum compescit. Addatur *succus stercoris asinini*, mirabile remedium, si  $\mathfrak{z}$ . hujus *succi*, vel *stercoris suilli* & *syrupi myrtillorum* aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . dilue cum  $\nabla$  *plantaginis* & bibat: Idem laudatur *caninum stercus*, quod optimum est, vel per se vel cum aliis.

Cum his nunquam omittenda sunt *opiata*, quæ inter excellit *diascordium Fracastorii*, cum vehiculo *acido* assumptum; nam si oritur fluxus ex *nimia turgescencia*, eundem simpliciter sistit  $\sim$  vitrioli in  $\nabla$  *plantaginis*. Præter *acida Stialia* aliâq; conveniunt in specie talia, quæ adhuc *serositate* absumunt, *acrimoniam* temperant, & partes laxatas vi *stiptica* firmant, qualia sunt *succinum*, *ossa*, *cornua animalium calcinata*, *mumia*, *Corall.* &c. nunc solitaria, nunc cum *opiatis* propinanda. Eminent *trochisci de Carabe* à  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . Convenit etiam pulvis *Lindani*, cujus compositio talis.

- $\mathfrak{z}$ . Corall. rubr. succini flavi.  
 boli armen. Sangu. Dracon. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .  
 Semin. plantag. borrac. calcin. aa  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
 laudan. opiat. gr. iv.  
 Extract. croci.  $\mathfrak{g}\mathfrak{j}$ . M.

Hunc sub forma pulveris vel c. s. q. *syrupi de rosis siccis* dos.  $\mathfrak{zj}$ . propinat ægris, cujus continuato usu innumeras mulieres, mensium nimio fluxu laborantes, restituisse dicit. Sic ad imitationem huus dedi mulieri *plethorica* sed sanguine *serosiore* prædita & *scorbutica*, cui ob abortum quodam temporis spatio supervenit insignis uteri *hemorrhagia*.



- ℞. Conserv. rosar. antiquæ. ℥vj.  
 Corall. rubr. sangu. Dracon.  
 Oss. human. calcinat. aa. ℥j.  
 trochisc. de Carabe.  
 Onis. crudi, semin. plantag. aa. ℥ij.  
 laudani opiat. gran. iij. l. iv.  
 c. f. q. syrup. Corall. fiat Electuarium.

Quod sub prima mixtione propter O. aliquantulum semper fermentat, sed mox desinit. Juxta hæc *interna*, conveniunt etiam quædam *externa* fluxum mensium nimium compescencia, & collo appensa, & circa uterum applicata. *Externe* regioni pubis applicetur *spongia aceto rosac.* ebria, vel ✱ simile applicetur regioni pubis, seu orificio uteri externo. Etiam *injectiones* in Urethram ex *succo stercoris asinini*, vel injectiones ex *succo plantaginis* vel solo, vel dicto *stercore* imprægnato, sunt egegia. Præterea *suffitus* ex *Thure*, *mastiche*, vel ex *vapore* ✱ supra *scorias* *artis ignitas* injecti susceptus in usu sunt ad compescendum nimium mensium fluxum. Accedit *cataplasma* ex *hyosciamo* ✱to imprægnato, lumbis aut ossi sacro applicatum. Si simul adsit dolor ardens aut rodens in *vagina uterina*, commodè fiunt *injectiones* ex *decocto simplicium adstringentium*, quibus *hyosciamus* & *papaver* additur. Ad *fluorem sistendum* faciunt *lintea sanguine imbuta* sub cineribus calidis posita; Est experimentum *Panaroli*, neque fefellit me hoc. *Euporiston Helv.* est indusium per octiduum à viro gestatum, à muliere tali fluxu laborante indutum.

## CAPUT IV.

## MENSTRUORUM NON DEBITO LOCO EFFLUXUS.

Ultimum vitium depravatorum mensium est, quando non debito loco effluunt, nunc nempe per *mammæ*, per *os*, nunc per *anum*, intra *ungues*, ex *oculorum canthis* &c.

*Causa* est quærenda simpliciter in *causis internis*. sanguini, exitum querenti, *viam intercludentibus*, unde sanguis tali *orgasmo* hinc inde citatus tandem aliis locis exitum quarit, & eundem invenit.

Revocandus ergo sanguinis fluxus ad uterum, ut ibidem possit effluere. *Interne* in par-

in paroxysmo  
 & tandem  
 paroxysmo  
 inferiora tra  
 saphena secti  
 la in region  
 sunt clysm  
 stituuntur i  
 locynthid. c  
 Omnia en  
 huc possu  
 priatis cul

F L

F Requ  
rump

exinde voc

pe fluxus m

quepituitos

nunc copio

mitis, E

excoriation

progressu

grefcat,

omnis at

fuit, qu

hoc fluore

ira gravia

gerunt gen

eos, qui

affligat m

pateat non



in paroxysmo pauca sunt in usu, quia ad Uterum specificè non diriguntur, & tandem sanguinem plus excitant volatilia, vasa obstruenda referantia. In paroxysmo etiam externe usurpentur, quæ sanguinem impetuosius vel ad inferiora trahant, vel quæ uteri vasa his rarefaciant. Inter priora eminet saphena sectio in pede, imminente fluxu instituta; simul affigantur cucurbitula in regione interna. Pediluvia etiam possunt institui. In posteriori sunt chysmata, gravidis propter metum abortus suspecta. Cum his instituuntur injectiones uterinae ex decocto pulegij, chamomilla, sabina cum Colocynthid. quæ intra vaginam penetrant, & aperiunt facilius vasa uterina: Omnia enim quæ in menses suppressione pro usu externo fuerunt allegata, huc possunt applicari. Utero applicentur fomenta ex aromatibus appropriatis cum oleis aromat.

## CAPUT V.

## FLUOR ALBUS MULIERUM.

**F**requens malum est, ut mulieribus pro sanguine ex utero adhuc erumpat humor serosus, plus minus pituitosus, unde affectus exinde vocatur fluor albus. Consideranda ergo historia hujus fluxus, nempe fluxus uterinus est iste, quando per genitalia muliebria illuvies varia, eaque pituitosa, nunc vicia, plus minus acris solet effluere, idque nunc parcius, nunc copiosius. Ut plurimum hic fluor initio morbi solet esse mitis, pedetentim magis magisque arescit, ut etiam subinde excoriationem genitalium inferat. Albus est ut plurimum, nam

progressu temporis etiam varius color confluit, ut flavescat interdum, nigrescat, in maligno statu virescat, inodorus est, raro fetidus. Occupat omnis ætatis feminas, tam virgines, quam maritatas. Jt. Observatum fuit, quod præter vetulas, etiam quandoque puella nondum viro mature hoc fluore correpti fuerint. Item mulieres, quas affligit non solum extra graviditatis tempus, sed etiam dum gravis fuerint. Sic mulieres, dum gerunt gemellas, fluore hoc continuo corripiuntur, quod observandum contra eos, qui dicunt ex utero effluere in gravidis impossibile. Item, quod affligat mulieres menstruosas, & quibus menses deficiunt, observandum, ut pateat non esse idem cum sanguine menstruo, nam imprimis vetula magis



rarò puella eodem corripitur. *Typum* seu *periodum* observat nullum, cum incipit, menses comitari solet, & vel iisdem conjungitur; vel iisdem cessantibus aliquandiu perstat. *Continuari* verò solet sine *typo* aut *intermissione*, continuo effluendo, nunc *parcius*, nunc *copiosius*, ut ut etiam tunc circa menstruum tempus uberius effluere soleat. Præsupponitur hic, mulieres in coitu materiam quandam cum voluptate effundere, quod si ergo *lympha*, quam effundunt, non sit semen muliebre, quod propriè loquendo non habent, sed loco hujus prostant *ova*, sequitur materiam hujus non esse *seminalem*, sed ejus utrum esse, ut stimulet mulieres ad coitum; Queritur saltem, unde erumpat hæc materia? Primus glaciem fregit Graaf. in *Anat. partium genitalium mulier.* cap. 6. dicens: quod *meatus Urinae* in mulieribus ubique sit circumdatus *substantia membranacea glandulosa*, analoga prostaticis glandulis virorum, ex quibus, circa meatus Urinarium sitis, observatae sunt *lacunae* sive apertiones, quæ hiant in orificium Uteri extremum; Has *lacunas* etiam observavit Rhod. observatione 13. c. 6. It. dicit Barthol. ex his effluere *liquorem limpidum*, tam in, quam extra coitum.

*Fluor ergo albus mulierum*, nihil aliud est, quam *Gonorrhæa muliebris*, nempe analoga *gonorrhæa virorum*, ita ut hæc *gonorrhæa mulierum* nunc sit *vera*, quando *liquor seminalis* ex prostaticis glandulis effluit, nunc *notha*, quando *alius ichor* s. *liquamen serosum* variis quandoque coloribus effluit.

Observanda autem est *differentia* in hoc *fluore*, nempe alius est *levior*, in quo *lympha seminalis* pauca, non adeo frequenter *glutinosa*, *mitis*, sine sensu ardoris aut rosonis, & sine gravi corporis vitio aut tæbe; estque saltem *gonorrhæa*, in qua dictæ prostaticae leviter sunt affectæ: Et contra observatur alius *fluxus*, *copiosus*, *continuus*, ubi varia *serosa*, *tincta*, *acria* externi solent, concurrente totius corporis *cachexia*, *tumore pedum*, *torpore actionum*, *flacciditate membrorum* & simil: qui *fluor* est *gonorrhæa notha*, & oritur vitio M. S. *cachectico*, s. vitio *chylicationis*. Præ cæteris hos *fluores* distinguit Heurn. dum *priorem* vocat profluvium *Uterinum*, *posteriolem* profluvium *muliebre*, id quod ex tota muliere effluit.

*Causa Prioris floris* saltem est *copia* & *turgescencia liquoris* istius *seminalis*, conjuncta cum aliquali glandularum istarum prostaticarum *laxitate* s. *flacciditate*, unde facile dilabi permittunt dictam materiam &c. Ad hoc disponunt coitus per aliquod tempus *intermissio*, *vita sedentaria*, *laudabilis victus*. Facit huc, quod virginibus *salacibus*, & quæ propter humiditatem vasa *spermatica* habent *laxa*, & semen *aqueosius* emittunt, hi *fluores* solent esse familiares. *Posteriolem Causam* investiganda est partim in *prostaticis glandulis*, partim in M.

tim in M. S. n.  
mia acrimonia  
tantum relaxa  
tino effluat  
si se: glandul  
per emunctio  
ctica reddit  
Confirmat  
prostatas ex  
rate & eros  
quàm vitio  
boratur,  
ostendit sta  
appetitus &  
pter laxitat  
theoria ob  
ubertas liqu  
continuo er  
inde per na  
ulcera, &  
S. cacochoy  
mul tander  
de partibus  
sum, ex quo  
principia ven  
sam & cont  
talla viri in  
stitutionis &  
mis dubiis  
Flu  
norhæam  
gis tempor  
moderata  
in lumbis &  
liquamina  
Prior aliqu  
solet conj  
debilitatem  
rum.



tim in M. S. n. p. in hac gonorrhœa *notha* frequenter peccat materiæ effluentis *ni-*  
*mia acrimonia*, eaque primitus *Osæ*, postmodum *acido Osæ*, ratione cujus non  
tantum *relaxantur*, sed & *eroduntur* dictæ prostata glandulosæ, ut *con-*  
*tinuo* effluat tale *liquamen*. Scilicet *vitium* nunc est in M. S. nunc in *glandulis*,  
si sc: glandulæ prostata nimis flaccidæ, molles & laxiores fuerint, ut tanquam  
per emunctorium quoddam universale M. Sæ ex cruditatibus stomachi cache-  
cticæ redditæ mucus talis chylosus & liquor crudus evacuetur & transcoleatur.  
Confirmat hoc *Grassius*, qui dicit in mulieribus talibus glandulas  
prostatas *exulceratas repertas* fuisse; Præter has in glandularum flaccidi-  
tate & erosione causas, accedit *materia acris, salsa, serosa*, tam proprio *vitio*,  
quàm *vitio fermenti* dictarum prostaticarum, à quo ubi tale liquamen ela-  
boratur, ibi conficiunt & excernunt. Quod concurrat M. S. vitium,  
ostendit status corporis *plethoricus, cachecticus, tumores pedum œdematosi,*  
*appetitus & ris extinctus* &c. Quod verò per *prostatas* excernatur, fit pro-  
pter *laxitatem* earum, *flacciditatem, erosionem* & similia. Nihil est quod huic  
theoriæ obstat possit, saltem restat hoc dubium, unde nempe tanta sit  
*ubertas liquaminis* hujus, cum per dictas prostatas non possit tanta copia  
continuo emitti? Sed quando modo consideremus, quantum materiæ sub-  
inde per *nares* effluat, quantum effluat ex *oculis*, quantum *saniei* plorent  
*ulcera*, & facile possumus concipere, quod per has prostatas vitiosas ex M.  
S. cacoehymia copiosius tale liquamen effluere possit, *malo inveterato*. Si-  
mul tandem notandum quod ulteriori scrutinio habet *Horn.* in *prodrom.*  
*de partibus genitalibus in muliere, orificium* nempe *uterinum* esse *glandulo-*  
*sum*, ex quo succus seminalis soleat emitti. vid. von de *Becke.* in *Meditar. circa*  
*principia rerum naturalium.* pag. 193. Ubi refert *vaginam uteri* esse *poro-*  
*sam* & continuo quandam *lympham* solere transudare, & humectare geni-  
talia viri in congressu. Interim *Sylvius* asserit, totum *uterum* esse con-  
stitutionis & *naturæ membranaceo glandulosa*, quod effatum quam pluri-  
mis dubiis satisfacit.

*Fluor albus* per se patet, saltem observet Medicus, ut distinguat *go-*  
*norrhœam veram à notha*. Nempe, si saltem interdum, nunc *statis* nunc *va-*  
*gis temporibus* evacuatür liquor *crassiusculus, glutinosus, serosus*, & in  
moderata quantitate, est *vera*; si verò in *habitu cachectico*, cum dolore  
in *lumbis* & circa *os sacrum*, cum juncta *febri lenta*, evacuantur copiosa *acria*  
*liquamina* viridescencia fœtida, tenuia &c. Ostendunt *fluorem, album nothum*.  
Prior aliquandiu durat sine insigni mulierum detrimento: Posterior verò  
solet conjunctum habere *prostratum appetitum, tumores pedum, ructus,*  
*debilitatem*, quandoque etiam *febrem*, ex genere *februm lymphatica-*  
*rum.*

*Prognos.*



**Prognos.** Gonorrhœa vera nihil habet in recessu, *notha* verò mulieres ad *tabem*, *atrophiam*, *hydropem* &c. producit. Subinde exulcerantur partes Uteri externe, & gangranam percipiunt: durans mulieres steriles reddit: quo magis est inveterata, eo difficilius curatur: in senibus mulieribus decrepitis usque ad mortem adesse solet.

**Cura.** Ubi observandum, si singulis Mensibus biduo vel triduo durat & postmodum cessat, hinc suo tempore redit, non est cohibenda, si verò perpetuò durat, mature sistenda est.

In Gonorrhœa ergo vera eodem modo procedendum est atque in gonorrhœa virorum, absumendo materiam seminalem & adstringendo partes laxiores; optimum remedium est copula cum viro: si vero non est consultum, propinetur succus citri ad ℥ij & continetur. Mala citri aut limonum, tum succus exstillans ex surculis salicem verno tempore aliquandiu usurpata: Trochisci de Carabe, de terra sigillata, pulvis mandibularum lucii piscis & similia conveniunt: It. Balnea blanda adstringentia, quæ fluidiores prostates coerceant.

Primum ergo in gonorrhœa notha est, ut stomachi chylificationi prospiciatur aut eadem restauretur. (2) Ut sanguinis cruditas cachectica corrigatur. (3) Ipsi fluori & partibus à fluore lætis appropriatis, hinc nervinis & adstringentibus succurratur.

Quoad primum præmittantur vomitoria præmissis digestivis, hinc usurpentur appropriata stomachica, imprimis aromatica. Quoad secundum, conveniunt Sia volatilia oleosa & aromatica, quæ secundum Sylvium præservant à fluore albo, unde etiam eundem jam præsentem corrigunt, sanguinis vitium, radicem fluoris albi eradicando & corrigendo. Purgantia in fluore jam parum vel nihil juvant, quin potius malum exasperant. Vomitoria verò sunt optima, loco verò purgantium speciatim conveniunt sudorifera & hinc diuretica cum appropriat. V. S. nullum hic habet locum. Ratione sudoriferorum in usu sunt ligna, sassafras. Decoctum lignorum, essentia, Tinctura lignorum sassafras. Pro scopo diuretico conveniunt terebinth. & terebinthinata, terebinthina in vitell. ovi soluta, balsamus Sulph. terebinth. It. quod commendat Fonsæca.

℞. Terebinth. cum ∇. rosar. lot. ℥℥.

Pulveris Coralliorum

boli armen an. ℥℥

M. sumatur bis in septimana.

vel ad imitationem Riverij, pilul. ex terebinth. cum rhabbarbaro; Hæc una



Vel ad imitationem Riverii pilul. ex terebinth. cum rhabarbano. Hæc una cum appropriatis usurpanda sunt: præter quæ appropriata sunt rosmarinus: affirmat Lindanus sc. solò decoctò rosmarini conxinuato crebrò fluorem mulierum se curasse: Laudatur etiam mentha, melissa, juxta hæc speciatim convenit viscus quercinus, tam in substantia, quàm in decocto: vid. Panazol. Pentec. 2. observat. 48. Sclaraa, tum propriè dicta galiopsis flore albo sunt optima. Adde millefolium album, radic. filicis, melilotum flore albo & simil. Ista ex vegetabilibus primatum obtinent. It. hæc conveniunt: mandibula lucii piscis, ebur, succinum & omnia succinata, crysalli præparati, putamina ovorum calcinat: ostiocola, ossa sepie, pumex, & diaphoretic. priapus cervi. Horum omnium vis eò collimat, ut destruat acidum aut salsum, quæ in gonorrhæa primariò peccare solent, putamina ovorum calcinata, ex quibus exclusi sunt pulli, dos. ʒß. maximè laudantur: it. pumex l. creta pulverisata l. calcinata, lapis ostiocol. est specificum Timai, quod usurpat ad curandum fluorem album mulierum.

℞. Magister. ostiocol. ʒß.

Carneoli præparati ʒiij. corallor. albor. ʒij. smaragdi ʒj. Ms. f. Pulv. dosi ʒj. in ∇. vel conserva rosmarini: vel usurpetur pulvis magis compositus, qui videatur infr. os quoque sepie est optim. priapus cervi ad ʒß. quandoque ad ʒj. præmissi. præmittendis est egregius, ex his varia possunt fieri composita: sic pulvis expertus Timai:

℞. C. c. usti ʒij.

limatur. Eboris præparat. ʒiß.

Corallior. rubror. præparator.

succini præparati

boliarum.

Mastich aa ʒj.

Semin. anis.

Cinamomi, caryophyll. aa ʒij.

Xylo aloës ʒj.

ambr. Mosch. aa gr. IV.

c. f. q. sacchari fiat pulv. dos. ʒß. ad ʒj.

Externa quædam juxta hæc in usu sunt: Excellunt therma, primariò naturales, hinc artificiales ex ꝑ. Calce viva, adjunct. vegetabil. nunc nervinis, nunc adstringentibus paratæ: fiant infusus, l. fomenta, vel injectiones Vterina, in specie sessio in decocto radic. Ebuli laudari solet. Inter fomenta excellit decoctum lignor. pro lubricu abluendorum pudendorum & facienda injectione.

℞. Ligni sancti.

Corticum granator. aa ʒj.

thuris ʒß.



Masticis Zij.

balaustior, flor. rosar. rubr. aa mß.

infunde ii. lb.  $\nabla$ . f. & macerentur per 24. horas, deinceps bull. lento  $\Delta$ . ad consumptionem medietat. add. vini austeri lb. ij. Colatura v. fervetur usui. *Euporiston* m. est, si *xl. Sclarea*, eaque contusa subigatur cum butyro, & ita quodammodo putrefieri permittatur, tum coque aliquandiu: Colatura servetur pro usu; tempore usus sub forma unguenti illinatur ventri ad regionem pubis usque; immittatur etiam aliquid de decocto ligni cum mentha in uterum. Hoc unguentum etiam dolores gravativos post partum sistit; suffitus ex thure mastiche, ladan. Gummi Juniperi, NM. succini & simil. frequens est in usu; suffitus ex salvia etiam commendari solet. Adstringentibus simul abstergentia combinanda sunt cum Essent. succini, Essent. traumatica &c.

## FLUOR GALLICUS MULIERUM.

Est fluo muliebri Gallicus, oriundus ex reiterato coitu cum maribus lue *Qrea* in-  
guinatis, & exulceratione tam prostaticarum glandularum, quam vaginæ uterinæ, si  
quid. *Panazol. obs. 14. part. 1.* tradit quod intali muliere testium substantia exul-  
cerata re ipsa fuerit: talia enim ulcera plorant saniem, cum insigni dolore & mo-  
lestia; & curantur eodem modo ac gonorrhæa maligna virorum, Terebinth. remediis  
ex lignis & simil. Inveterata verò curari nequit, nisi per modum curandi Luem  
*Qream*, tam per sudorifera, quam per salivationem cum melle, aloë, *Q. dulci*, it.  
linimentum *Qriale*, quod turundis illitum intrudunt in vaginam uterinam, ut  
mortificetur ulcus jam factum.

## DEFECTUS APPETITUS VENEREI.

Præsupponendum est, in quo consistat appetitus *Qreus* & ista titillatio s. *pru-*  
*ritus*: Nempe clitoris pars peni virili analogæ est, & pars primaria, in qua residet  
appetitus *Qreus*, & ibi titillatio *Qrea* deficit. Rectè etiam *sedem libidinis clitori-*  
*dem* vocat *Columb. in anatom. 1.* Clitorisensus & instar penis erectus fuit. In  
actu *Qreo* delectatur adeo, ut affluxu *Q*tuum animalium & sanguinis liquor  
animalis seminalis ex prostaticis glandularum erumpat cum summa voluptate,  
quo effuso cessat titillatio *Qrea*. *Causa* quæ stimulat, est imprimis *turgescencia*  
*liquoris seminalis* præcisè circa prostaticas glandul. nam muliebria sunt insen-  
sibilia; *sensus* E. appetitus hæret in clitoride, ratione cujus etiam possunt irritari  
coitus *Qrei*. *Leditur* ergò appetitus *Qreus* l. quando imminuitur, vel deficit,  
quod rarum est, vel quando excedit, quod frequentius observatur. *Deficientis*  
rara sunt exempla; ad sunt tamen: nempe, ubi quædam mulieres *Qrem* non de-  
siderant, nec ex congressu voluptatem percipiunt. Voluptas non est necessa-  
ria, quia etiam sine voluptate possunt concipere. *Causæ deficientis* sunt variae,  
& ferè omnes eò collimant, uti vel in defectum, vel paucitatem liquoris seminalis  
relabantur: hinc *scorbutica* quædam confirmata, minus ad *Qrem* solent esse  
procli-



proclives; quia iste liquor seminalis minus rufus generatur. Hinc in gonorrhœa  
 mota nullus adest appetitus. Faciunt huc vitia conformationis, in specie in iis,  
 qui nunquam habuerunt appetitum Qreum. Facit huc castratio, quæ à Platero  
 tanquam possibilis, à Sennerto ceu facta recensetur, dum ovaria s. testes ex-  
 imunt, faciendo incisuram in regione inguinum superiori. Sed nihil est; possunt  
 enim absque his esse salaces, quemadmodum Eunuchi, propter liquorem, qui  
 in prostaticis glandulis observatur.

CURA. In hac observetur, ut, nisi subsit vitium conformationis, acerbis  
 aromaticis turgescencia & vellicatio liquoris seminalis concilietur; hinc laeta  
 diæta uberiori copiâ suppeditetur. Simorbus quidam sit, à quo dependeat, hic  
 primariò curetur. Internè omnia conveniunt, quæ fuerunt recensita in affecti-  
 bus virorū, nempe, quæ conveniunt in seminis generatione laesa & penis erectione laesa.  
 Externè conveniunt remedia ex formicis, nempe in seffus aut balneum, it. inun-  
 ctio pudendi cum oleo formicarum; Balsamus apoplecticus cum Zibertho & Mosch.  
 regioni clitoridis illitus convenit.

## APPETITUS VENEREUS AUCTUS,

aliàs SATYRIASIS s. SALACITAS dicitur.

Nam & in mulieribus ad Qrem proclivibus clitoris tensus ac turgidus  
 plus minus esse solet. Sic affectæ mulieres continuò in Qrem hiant. Extremus  
 salacitatis hujus gradus vocatur furor Uterinus, dum malum eò usque as-  
 surgit, ut tandem delirium inferat, quod delirium oritur ex nimio Qris desiderio  
 in talibus. Nempe, furor Uterinus est affectus complicatus ex nimio desiderio  
 & delirio. Communis est tam virginibus quàm maritatis: vociferantur, inquietæ  
 sunt, non possunt intra domos contineri, iracundæ sunt, & ebrios interdum aggre-  
 diuntur maritos, eos ad Venerem incitant. Inconditè loquuntur, multa & varia  
 de rebus Qreis admiscunt, genitalia contrectant, interdum eadem denudant, &  
 similia. Tales mulieres congressus validus & nervosus optimè restituere solet.  
 Schenck. pag. 145. ubi de mania. In hoc enim furore duo adfunt consideranda:

(1.) Adjunctum insigne delirium, quod mirior videtur mania species. (2.) Li-  
 quoris seminalis fermentatio & turgescencia. Utrumque æstrum venereum bru-  
 torum certis temporibus accidens, declarat. Nam reverà hic furor Uterinus  
 brutalis quidam impetus est in fœminis, quæ simpl. ex p. n. Q. stimulo in fu-  
 rorem aguntur. Jam verò sicut furor brutorum oritur ex turgescencia & efferve-  
 scencia genitura eorum, quod ostendunt, quia catellis in Qrem hiantibus effluit  
 liquor albidus, mucilaginosus per genitalia, quod alio tempore non fit; à qua  
 turgescencia sanguis & lymphæ à partibus genitalibus reflui etiam turgescenti-  
 am concipiunt & inquinantur, unde spiritus animales agiliores fiunt, & acce-  
 dente pruritu genitalium, talis impetus oritur; pari ratione etiam in mulieribus  
 materia seminalis turgida facta, ista nempe, quæ in prostaticis circa urethram



colligitur, quæ turgescencia easdem ad *venerem* stimulat. Unde in talibus clitoris phlogosi, & quodam rubore tendi & tumere observatur: vid. Barthol. Cent. 3. Epist. pag. 407. Quibus si accedunt pollutiones nocturna, cessantes aut deficientes congressus, exindè tam insignis Veneris appetitus excitari solet. Jam verò huius pruritus Quæ ratione in genitalibus excitatur talis spirituum animalium in cerebro motus; Ratione cujus tales mulieres continuò concipiunt actum Venerem, quo motu inordinato spirituum animalium continuato supervenit delirium. Effectum hunc declarant pollutiones nocturna virorum, in quibus, turgescence semine in genitalibus, excitatur spirituum animalium talis motus, cujus occasione anima concipit actum Venerem, unde seminis excretio fit in somnio. Jam verò deliria sunt vigilantium somnia, & somnia dormientium deliria. Unde sicut tale delirium se habet in somnio in viris, ita in vigilando in feminis furore Vterino afflictis. Jam verò non est dubium, turgescence illo & fermentante liquore feminali, consequenter etiam sanguinem & integram M. S. alterari & fermentationem exindè intendi: unde spirituum impetus magis celer & agilis redditur, ut & ipsi spiritus animales volatiliores reddantur, unde tales mulieres sunt audaces, minusque timidæ.

CAUSÆ remotæ disponentes ad hoc malum omnes eò collimant, ut materia seminalis ubertatem & turgescenciam excitent, ut vita sedentaria, curis vacua, abstinentia à Venere, habitus succi plenus, potus generosi, aromatibus conditi. Sic Sennerius observat. ex vino Hippocratico. in quo borra fuit soluta, quædam in hunc affectum inciderunt. Aliis idem contigit ex congressu cum viris, qui ad voluptatem augendam membrum virile Moscho & oleis calidioribus inunxerant. Facit huc excretio Quæ intermissa; hinc Moniales subindè hoc malo corripiuntur, vid. Bartholin. Cent. 3. ep. 39. ubi recensetur historia de Moniali huic furori uterino obnoxia cum copiosissimis pollutionibus.

CURA. Nihil melius est, quàm nervosus congressus validus crebrius repetitus. Verum quando hic non convenit, l. non commodè celebrari potest, hi tres scopi observandi sunt: 1. Materia peccans in primis viis evacuanda. 2. Seminis turgescencia inhibenda; quod faciunt ea, quæ per experientiam cognita sunt, quæ serum imminuunt, & turgescenciam seminis vel liquoris seminalis sistere & compescere apta nata sunt. 3. Spiritus animales corrigendi, eorumque impetuosus motus sistendus ac coercendus. Priori scopo satisfaciunt imprimis vomitoria in paulò majori dosi, quæ ægros debilitando & partim materiale semen revellendo conducunt. Pro secundo scopo ad M. S. turgescenciam convenit V. S. repetita; hinc usurpentur acida sæpius laudata, in specie succus citri, limonum, granatorum, & similia, speciatim ☉, & omnia ☉rata, quibus addantur sudorifera, it. serum caprillum copiose haustum convenit. Præter hæc omnia superius dicta conveniunt: Remedia item ex cannab. papav. alb. vitis, & similibus solent laudari.

℞. Sem. Cannab. ℥ij.  
lactuca

pertu-



portulacæ aa Zij.

c. s. q. ▽. portulac. l. nymphaea fiat Emulso,

edulcoretur syrupo de nymphaea pro aliquot dosibus. Sic ex semine viticis possunt fieri *Emulsiones*: præter hæc tamen in specie convenit *salix*, si quidem decoctum *salicis* in specie noviter progerminantis jejuno ventriculo aliquoties potum impetum *Creum* coëcet, imò tandem steriles reddere dicitur, vel tempore verno ratum *Creum* coëcet, imò tandem steriles reddere dicitur, vel tempore verno ratum muli *salicis* extirpandi sunt, & ▽ *exstillans* bibenda, quæ optima est. Vele hoc liquore cum farina fiat massa, quæ propinetur mulieris furore *Uterino* laboranti. Pro tertio scopo optima sunt *copiata* & hinc *camphorata*. *Camphoram* quod attinet, hujus crebrior usus etiam convenit, s. in substantia, sive *camphora* eaque incensa extingatur crebrius in potu ordinario ægræ. Externè conveniunt *fomenta* & *cataplasmata* regioni *Uteri* externæ applicata, fiunt ex succo viticis, *salicis*, *hyoscyami*, *semperviv. major.* *Acerum destil. camphora*, *Saccharum Saturni* & similia frigide applicata cum ruta: *solanum*, *papaver* in forma *cataplasmi*. quodque modò dictis locis applicari possunt.

## FEBRES ALBÆ VIRGINUM.

Progrediendum nunc est ad totius corporis affectus, qui mulieribus ratione *Uteri* vulgò contingere dicuntur. Nempe, cum videamus quotidie, quod aliquantum seminalis liquoris etiam in naturaliter constitutis, his, quibus abundat, totum corpus alteret; Hi affectus considerandi sunt ex *Utero*, à quo tales non sunt, sed contingunt vitio liquoris seminalis suppressi vel alterati, vel *Mensium* suppressione. *Uterum* quod attinet, hic variis affligitur passionibus, iisque saltem communibus cum aliis corporis partibus. v. g. nunc inflammatione, nunc tumore aquoso, *Cancro*, *scirrho*; quæ tamen pathemata non uterum solum, sed & alias corporis partes affligunt. De cætero cum reliquis corporis partibus nullum h. commercium uterus, nisi per plexus nervosos, unde quæ ex *Utero* fiunt pathemata, per consensum sunt per nervos, & sunt *spasmi*, aut *pathemata convulsiva*, ut v. g. quando parturiunt. Quando ergò *Uterus* acculatur, minus commode fieri solet, sed sunt saltem *accusationes Uteri*. Missò ergò *Utero*, pathemata ista, quæ vulgò tribuuntur *Utero*, dictum est originem ducere ex liquoris seminalis plus minus turgescentia & menstruum suppressione. Quod attinet liquorem seminalem, in prostaticis glandulosis & forsan etiam in vagina *Uteri* elaboratum, hic ibidem retentus & turgescens dat *satyriasmum*; retentus enim & suppressus plus minus alteratur, alteratus depravatur, unde insignis in universo corpore oritur alteratio. Saltem considerentur alterationes, quæ mulieribus tempore *pubertatis* accidunt, simillimæ iis, quæ viris obveniunt ex causa eadem, multò magis ergò ex inquinata *M. S.* venerit symptoma, quæ inquinata est ab hoc liquore seminali. Primò considerandus venit *pallidus virginum color*, s. febris virginum alba, it. *Uterina alba*. Hæc chlorosis malè con-



funditur cum *cachexia mulierum*, quæ *Mensium suppressionem* secum trahit, & quæ *communis sexui muliebri* it. *communis tam maritatis, quam non maritatis*. *Chlorosis* verò propria est mulieribus *nondum maritatis*, i. *maritatis licet*, quibus tamen non *satisfit* maritis. *Chlorosis* ergo est affectus proprius virginibus & *viduis*, aut mulieribus, quibus mariti non *satisfaciunt*. Tales *pallent*; *sublivido* nonnihil *colore tinctæ* sunt, sub oculis *coronam* quandam quasi *subrubescen-*tem habent, *anxia* sunt sine manifesta causa, *tristes*: *mensēs* non semper sunt *sup-*pressi, sed ferè *ordinarii* circa *statis periodos* fluunt, utur, malo ulterius *pro-*cedente, *supprimi* soleant. In *Chlorosi febris* *lenta* & *inordinata*, *obscura* ta-  
men & *ægris vix sensibilis*; *pulsus* est *inaqualis* & *varius*. Tales vulgò putantur *laborare mensium suppressione*, quod non semper verum est, sed *mensium suppres-*sio *supervenit* tanquam *effectus*, & *posito*, quod *adlit*, *quæritur*, cur *restituan-*tur tales per *coitum*; quod non fit in *suppressione mensium* laborantibus? Certè *congressus*, quæ talis ad *cachexiam sanguinis* aut *mensium suppressio-*nem parum valet: Hinc *Lindanus* dicit, tales *fœminæ*, quæ *pallent*, non sem-  
per hoc patiuntur ex *mensium suppressione*, sed volunt *cohabitare viro*. Nem-  
pe *vitium* *oritur* ex *liquore seminali suppresso*, *alterato* & tandem plus minus *cor-*rupto, mediante quo, tanquam *fermento M. S. communicato*, *alterantur* & *se-*cernuntur ab hoc *succi inquinati*; unde talis *color*, *febris* *lenta* & *simil.* *superve-*nit tandem *mensium suppressio*: Nam, uti *semen* sub *pubertatis annis* *vigorem* *corpori* *communicat*, ita *p. n.* *corruptum corporis habitum* *peffundat*, donec per *coitum* *excreto isto liquore corrupto*, & *spiritu genitali maris* *novo fer-*mento *partibus genitalibus inspirato* *de novo effervescat*; & sic *reddatur cor-*poris *color floridus*. Hinc *virgines pallentes* sæpe dant *mulieres pulchras*: Et certè *Panarol. Pentec. 3. obs. 14.* quod si talis *febris alba* *oriatur à mediis hisce*, per *conjugium* *medicandam* *suadet*. Ex *liquore* ergo *seminali* & *coacervato* & *alterato* *oritur* hoc malum, præter quæ etiam alia mala ex *inquinatis succis corporis nostri* *supveniunt*: Hinc *corrupta M. S. & lymphæ hystericos cruciatus* cum *tera-*no *convulsivo* *infert*. vid. *Panarol. Pentec. 4. obs. 1.* qui observavit mulierem *tetano convulsivo* *corporis universi correptam*, cum *passione hysterica*, quæ fuit *restituta* *superveniente uberiori seminis* per aliquot dies *profluvio*. Conf. *Lemmium in herb. l. c.* qui habet *discursum non inelegantem*, quod ex hac causa etiam *mulieres*, qui-  
bus *mensēs* adhuc fluunt, varia *pathemata* soleant *affligere*. Hinc *Deodat. in* suo *valetudin. pag. 171.* observavit *juvenculam mulierem*, quæ post *obitum ma-*riti, ex *retentis excrementis* in *coitu*, omni mane *vomitibus horrendos* per *integrum* *annum* *passa* est, cum *tetano totius corporis*. *Hildanus* hac ex causa in *Moniali-*bus *graves vomitus* *oriri* *asserit*. Boyle in *Physica experimental.* exemplum habet de *virgine sensu tactus* in *universo corpore orbata*, quæ per *coitum repetitum* fuit *cu-*rata. Hinc *subinde* *graviore convulsiones & epileptica symptomata* *superven-*unt *virginibus nubilibus & viduis* *salacibus*, propter *liquorem seminalem retentum*,  
qui

qui corrupte  
pathemata n  
nes nocturnas  
dus, qui oriu  
quidem exp  
seminali (sup  
tibus mensi  
conjectura  
postea, tris  
adlit diata  
augentia.  
spectum e

PRC  
CUN

re. Veru  
nulla hor  
ca, sed mal  
corrigatur  
tis remedi  
que tricul  
tivè, non a  
ergo inter  
tuum anim  
sta adjung  
dilig, quæ  
collunt. H  
minalis eff  
o. dulcis  
sacharum  
eliciuntur  
riò, quan  
saporem  
acida mo  
o. & on  
gescentia  
dandis di  
undantia

Alre  
inter affe



qui corruptos nervos afficiendo *symptomata spasmodica* inferre solet: sed hæc pathemata non sunt adeò frequentia, quia vel per *matrimonium* vel per *pollutiones nocturnas* curari possunt. Difficile autem est negotium cognoscere hos affectus, qui oriuntur ex vitio liquoris seminalis retenti, corrupti & alterati. Febris alba quidem ex pathematibus facile cognoscitur, verb. gratia in specie oritur ex liquore seminali (suppresso, innuitur) cum citra errorem diata malum inchoavit, & fluentibus mensibus mulieres nobiles salaces hoc malo corripiuntur. Confirmatur, conjectura, si virgo aut mulier nubilis fuerit, & aliàs fuerit perulans, facta verò postea, tristis, anxiosa, & in alium statum mutata. Accedit, si mulier sit vidua, si adsit diata lauta, vita sedentaria, potus generosus & similia liquorem seminalem augmentia. His & similibus confirmatur Medicus, ut habeat ad hæc mala respectum ex liquore seminali derivanda.

PROGNOS. Variat, prout variant symptomata.

CURA. Nil facilius aut magis in promptu est, quam congressu valido curare. Verum si non liceat, ad remedia alia accedendum: Interim tamen pauca vel nulla horum apud Autores fit mentio, aut si fit mentio, sunt anti cachectica, sed malè; Eò ergò omnibus viribus collimandum, ut liquoris seminalis vitium corrigatur; M. S. dyscrasia emendetur; hinc variis inde natis sympt. appropriatis remediis postmodum succurramus. Symptomata quæcunque obvia eorumque truculentia sistenda est opiatis, quæ tamen in talibus malum saltem palliative, non autem radicitus curant: Saltem nempe symptomata mitigant. Eminet ergò inter remedia semen alterantia & corrigentia, hinc M. S. dyscrasiam, & spirituum animalium vitia emendantia camphora. His opiata specificis permixta adjungantur, succinum & succinata, speciatim quidem  $\phi$ . volatile succini acidulæ, quæ sunt singularia, quando etiam hysterica pathemata & convulsivos affectus tollunt. His addantur Myrrhata, cujus balsamica vis corruptionem liquoris seminalis efficaciter emendat, in specie essent. Myrrh. &  $\phi$ .  $\phi$ . dulcis aut spiritus  $\phi$ . dulcis Convenit etiam castor: & omnia castorina. Tandem habemus saccharum hni crystallisat. mineram hni parat. c.  $\phi$ .  $\phi$ . acuat. c.  $\phi$ .  $\phi$ . quo menstruo eliciuntur ex minera hni pura crystalli, egregii in huiusmodi affectibus primario, quando occasione talium vitiorum delirium imminet, siquidem & vitiosum saporem humorum corrigunt, & M. S. effervescentiam sistunt. His addantur acida moderata, nempe citrus & citrata, cydoniata, granata: omnibus addatur  $\phi$ . & omnia  $\phi$ . ata, utpote quæ mala ex corruptione liquoris seminalis & ejus turgescencia solent sistere. Forsan & terebinthinata partibus & menstruis locis mundandis dicata, hic suam merentur laudem. Tandem V. S. it. remedia seminis abundantia dicata & similia hic locum obtinent.

### CACHEXIA MULIERUM.

Altera horum morborum Classis est, quæ oritur ex mensium suppressione. Hos inter affectus, qui sequuntur mensium suppressionem, primario refertur

Cachexia



*Cachexia muliebris*, eadem cum *cachexia* in genere, de qua dictum. Saltem in mulieribus jungitur *mensium suppressio*, quæ quidē habetur illius causa, d. propriò loquendo saltem est effectus *Cachexie*. Nam habitus sanguinis *cachecticus* aut *cachochymicus* à naturali aut spirituosà crasi degener factus, ineptus est, ut subeat fermentationem menstruam, & sic secum trahit excretionem *menstruorum lasam*. Saltem ergo *curetur cachexia* more communi, per vomitoria, *Stialia*, & hinc *aromatica*, quibus postmodū *mensēs stimulantia* sunt addenda. Cæterum præter hoc, quod *Mensium suppressio* mala *cachectica* soleat exacerbare, etiam si ex quacunque causa supprimantur, sic enim non tantum *inflammationes partium erysi pelaceæ* ex acido sanguinem coagulante, ut *pleuritides*, *angina*: Verum interdum & *Epilepsia* inducuntur, & in specie *omnis periodus menstrua* miram solet inducere *tragœdiam*; superveniunt *pica* disponentes mulieres ad periculum *passionis hystericae*: superveniunt *Epilepsia* & *motus convulsi*; fiunt *melancholia*, quæ *melancholia* dicitur esse ex *Utero*, cum tamen saltem sit *melancholia hypochondriaca*. Interdum etiam *scirrhi* & *tumores viscerum*, speciatim *lienis* supervenire solent, unde postmodum ex *splene* tam varia mala adducuntur; Cum *splen affectus* sit consequens *mensium suppressionis*. Ulterius *cephalgia* insana & *conrumaces* talibus mulieribus sunt frequentes; *palpitationes* & *sensus palpitationis* in variis corporis partibus, primario in lumbis & regione superiori percipiunt. Tandem *depravatur* etiam successivè magis magisque *ventriculi fermentum*, hebetatà bile superveniunt *leuco-phlegmatia*, *hydrops* & simil. ut plurim. *chronici affectus* difficilè curabiles. In his notandum est, quod semper soleant exasperari *periodò menstrua*, ut tandem, quando *periodus menstrua* obliterata est, continuò aut saltem erratico modo *symptomata talia* soleant affligere. Omnia superveniunt speciatim ex *vitio mensium suppressorum*, idque imprimis, si ex improvise supprimantur; & quidem ex duplici ratione: (1.) Ex sanguinis excernendi retenti *quantitate*: (2.) Ex sanguinis retenti *vitiosa qualitate*. Quod attinet *quantitatem* sanguinis excernendi, dum nimius est sanguis, minus aptus est & æquali per vasa circulationi, & debitæ in præcordiis fermentationi, unde à debita fermentatione & effervescencia cohibitus minus spirituosus, d. vapidus, iners, & glutinosus evadit, unde *angustia præcordiorum*, *palpitationes*, *cephalgia*, *pulsationes inflammatorie*, *difficultas respirationis* & similia oriuntur. Quoad secundū, præmonendum, quod licet sanguis sub nomine *menstruorum* excernendus, sit & naturæ & qualitate ejusdē cum sanguine, qui post excretionem in corpore restitat, tamen eo ipso, quo tanquam secernendus per fermentationem menstruam à reliqua M. S. separatur, certam alterationem induit, & proprietatem acrem erosioni aptam, sive TRam aluminosam acquirit; unde sanguis tali *characterē* insignitus & *vitioso acore* inquinatus reliquæ M. S. mixtus eandem alterare & à naturali statu deturbare solet. Unde etiam alteratis succis reliquis,

*digestio*

*digestio prava*,  
Nam in foemina  
sum acidum  
etiam in nervi  
struentia insti  
nem, patet ex

CUR.

corrigen  
gendum est  
strui, ut red  
Remedia ut  
curantur m  
mensēs inci  
porem abso  
volatilitate  
rica volatili  
fluxum pro  
ria & mens  
promatum a  
lepsi al. mor  
optima: si  
algia urge

Inter

tinet pathe  
primario sy  
summa diffi  
focari pur  
sine respu  
Helmontio  
refert; a  
ventre in  
dum mot  
ab inferi  
nunc hyp  
flatione re  
horum lo  
quandoc  
lationibus

Par



digestio prava, melancholia, tensiones hypochondriorum, pica &c. originem ducunt. Nam in fœminis mensium suppressione laborantibus peccare sole imprimis vitiosum acidum austerum, idque ludre tragœdiam, in specie in abdomine, postmodum etiam in nervoso genere & aliis locis, confirmat Methodus medendi per acidum destruentia instituenda. Cognitio affectus, quod sequatur mensium suppressionem, patet ex relatione ægræ.

**CURA.** In Cura horum affectuum duo scopi attendendi, nempe (1.) corrigenda est sanguinis & reliquorum succorum vitiosa crasis; speciatim corrigendum est acidum austerum. (2.) Stimulandum est fermentum sanguinis menstrui, ut redeant menses in debitum fluxum, & quidem præmissis præmittendis: Remedia utrique scopo satisfaciencia conjunctim usurpanda veniunt; nam frustra curantur menses, nisi sanguinis dyscrasia sit curata, & hæc non potest curari, nisi menses incipiant. Præmo igitur scopo conveniunt martialia ac similia vitiosum saporem absorbentia & corrigena, hinc aromatica, naturalem fermentationem ac volatilitatem sanguini restituentia. Posteriori scopo satisfaciencia sunt aromatica volatilia, & ita plus minus oleosa & aromatica, quæ talia sunt, ut mensium fluxum promoveant, s. menagoga, uno nomine; methodo eadem, quæ cachexia & mensium suppressio curantur, etiam hi affectus curari debent. Pro symptomatum autem varietate etiam specifica ordinanda sunt, v. g. si supervenit Epilepsia, motus convulsivi, præter Cinnabarina, remedia ex Castoreo & succino sunt optima: sic in palpitatione Cordis remedia ex Corallis sunt admiscenda; Si cephalalgia urgeat, & ita volatil. & antiscorbutica, ut liquor C. C. succinatus &c.

### SUFFOCATIO UTERI.

Inter affectus mulierum, qui Vteri vitio supervenire dicuntur, primatum obtinet pathema, quod Suffocationem Uterinam vocant. Ita dicitur à primario symptomate, nempe ab angustia præcordiorum, & adjuncta respirationis summa difficultate, ita, ut taliter constitutæ mulieres singulo momento se suffocari purent, imò interdum ad aliquot horas mortuorum instar jacere solent, sine respiratione & pulsu. Vocatur etiam strangulatio Vteri, adscensus Vteri, ab Helmontio Asthma muliebre, à Paracelso Caducum Vteri, qui ad Epilepsia speciem refert; à modernis suffocatio hypochondriaca. Tales mulieres in abdomine & ventre infimo percipiunt subinde rugitus & borborygmos, hinc supervenit interdum motus cujusdam globi, hinc inde impetuosè in abdomine moti & agitati, & ab inferiori loco ad superiora pedetentim adscendentis: adsunt fere semper nunc hypochondriorum tensio, nunc distensiones, quandoque conqueruntur de inflatione regionis hypogastrii, tensione & dolore tensivo, distensione, simulque inflatione horum locorum à flatibus, qui admodum copiosi adsunt; Nam copiosi flatibus quandoque per os, quandoque per anum expirant: Oscitant crebrò, pandiculationibus sese extendunt, idque imprimis paroxysmo inchoante: dolores crebri



in abdomine tales cruciant, iique lancinantes & contorquentes, subindè etiam distendentes: dolores ut plurimum sunt vagi, rarius fixi. Appetitus imprimis in paroxysmo semper est prostratus; (Rarum est, quòd observata sit intensa fames post paroxysmum) & quaecunque assumum, vitioso sapore inquinata apparent. Alvus ut plurimum est constipata, & mulieres tales ordinariò alvi durioris esse solent; hæc verò si aperiatur, l. spontè, vel mediante clystere, levamen solent percipere, speciatim, si flatu simul copiosi erumpant. Interdum sonitus & quasi voces quadam ex imo abdomine audiri videntur, ut etiam à Dæmone credantur obfessæ. Subindè vomitus adsunt; in paroxysmo sæpe insignis est vomendi conatus, accedente insigni præcordiorum anxietate, ut dicant: Es sey ihnen das Herz / als wenn es in einer Presse lege; it. Es wolte ihnen das Herz abdrücken: quibus accedit cordis palpitatio, cum pulsu raro, parvo, debili, subindè intermittente & ad sensum abolito; quibus præsentibus non procul abest syncope: respiratio est difficilis, inequalis, interrupta, ut suffocatio imminet, & in malo graviore respiratio ad sensum est abolita: Quædam verò conqueruntur se percipere in collo angustias, quasi laqueo constringantur: Vertigo & scotomia in principio paroxysmi ordinariò se ostendunt, & mulieres tales, si easdem incipiat corripere vertigo, certæ sunt de imminente paroxysmo: Quandoque perfecta adest scotomia, tandem tenebræ circa oculos sese præsentant, & tandem corruunt: Interdum in copiosum risum solvuntur, ut hoc iis invitis accidat. Subindè delirium adest, & in paroxysmo varia non rarò ridicula loquuntur: subindè miras gestulationes brachiorum aut pedum exercent. In graviore malo graves epilepsia insultus accidunt, & tam atroces, ut stuporem incipiant, quale robur habent in membris ab Epilepsia correpti: sensus & motus ferè abolentur; Nam rarum est, quòd talia convulsiva adsint symptomata superstitè sensu: post paroxysmum omnia sciunt. In paroxysmo ferè sunt aphonæ, etiam sensibus illibatis. Cæterum rarum est, quòd perfecta convulsiones epileptica superveniant, saltem circa abdomen & thoracem huiusmodi symptomata affligunt. In paroxysmo & quidem in principio & incremento ad tactum frigescent, in statu calefcent; tandem superveniente sudore paroxysmus ad declinationem tendit, at non sunt securæ, nisi largius superveniat. Quod attinet subiecta, hæc pathemata infestant promiscuè mulieres pariter & virgines & maritatas, juniores ac vetulas, imò interdum ante Mensum fluxum, sicuti non rarum, vetulas, cessantibus Mensibus hæcce pathemata pati. Symptomata non sunt eadem in omnibus, d. in quibusdam plura aut graviora, in aliis pauciora aut mitiora, in specie dolor abdominis cum præcordiorum angustia & difficili respiracione solent tales mulieres affligere. Causas inter remotas vel ad passionem hystericam quæ disponunt, & in dispositis paroxysmum excitant, sunt (1.) passionēs animi graviore, in specie ira, in quibusdam etiam

etiam terror:  
cia paroxysm  
nuncio pallor  
maximè passio  
rientes, qui in  
curando parox  
dum Rosar. o  
re; sic geni  
tia, Castor. a  
mala: sed  
quæ in passio  
verò non ita  
mationes  
omnibus p  
ones epilepti  
quo alio n  
crasæ; hinc  
dam levanti  
odor contrari  
malum circa  
do reddunt  
optimè per  
sine præsen  
mis si sint n  
sunt. (4.) D  
syrupi, mellit  
comedens  
cie accede  
Notum est  
cunt, quòd  
coacervati  
(Sub  
moveatur  
sursum quæ  
commotæ  
variè moti  
vellunt pri  
bis, per lig  
moveri, ut



etiam *terror*: certè nil frequentius est, quàm quòd mulieres ex graviore *audacia* paroxysmum hystericum incurrant; Sicut *Primerosius* ab *ira*, *mærore*, *malo* *nuncio* passionem hystericam excitatam fuisse observavit: in specie *ira* & *servor*, maximè *passionem hystericam* movere solent. (2.) *Odores fortes* fortiter nares ferientes, qui in hoc affectu stupendorum sunt effectuum, tam in *excitando* quàm *curando* paroxysmo. Utque *suaveolentia*, *Moschus*, *ambra*, *Zibethum*, & interdum *Rosar.* odor solent hæc pathemata, si nempe naribus admoveantur, excitare; sic genitalibus admota solent compescere eadem: graviter verò *satentia*, *Castor. asæfærida*, *cornu raspat.* & *accens. camphora* naribus admota sistunt hæc mala: sed hoc non est universale; prostant enim observationes mulierum, quæ in *passione hysterica* optimè potuerunt perferre *suaveolentia*, *graveolentia* verò non item. Sic mulieres inveniuntur, quæ ab odore *castorei* sentiunt commotiones hystericas, vid. *Horsl.* 1. *Obs.* pag. 582. ubi dicit, quòd *graveolentia* non omnibus prodest suffocatis, iis nempe nocet, quibus unà *insultus* aut *convulsiones epilepticae* adsunt, aut quibus *caput est debile*, *Hochstett.* pag. 477. Certè si in quo alio negotio, in specie in mulieribus magna est habenda ratio *idiosyncrasia*; hinc enim quod huic prodest, alteri nocet, & vice versa. Hinc quædam levantur *pice incensa*, & *incenso*, *Castoreo*, *balsamo apoplectico*, &c. nam, si *odor contrarius*, paroxysmos incurrunt, & quando incipit *paroxysmus*, sentiunt malum *circa regionem stomachi*. (3.) *Mutatio status muliebris*, speciatim quando redduntur *gravidæ* & supprimuntur *Menses*: Hinc enim videas *virgines*, quæ optimè perferunt *suaveolentia*; si fiant *uxores* & *gravidæ*, non possunt ferre eadem sine præsentaneo periculo *passionis hystericae*; Et in specie si fiant *gravidæ*, in primis si sint non nihil *cachymicae*: Cessante puerperio eadem iterum perferre possunt. (4.) *Dulcia*, quæ ordinariò paroxysmum solent revocare, ut *sacharata*, *syrupi*, *mellita*, & similia, non ergò præscribantur *dulcia*. Sic vetula quædam comedens saltem *passulas*, incurrit *passionem hystericam*. Hisce præmissis in specie accedendum est ad *causam proximam* & *subjectum patiens*. Notum est, quòd in huiusmodi pathematibus accusetur *uterus*: nempe dicunt, quòd *Uterus* vel *sanguine menstruo*, vel *semine*, vel *simili materia* retentâ & coacervatâ turgidus esse soleat.

(*Subjectum* horum affectuum) ita quidem, ut, si ex quacunque causa moveatur *camarina uteri*, propter *status* & *miasmata mala* ex *Utero* exspirantia sursumque delata, omnia ista symptomata oriantur; quin imò *Camarinâ Uteri* commotâ sursum feratur ipse *uterus*, unde *sensus globi alicujus in abdomine* variè moti versus *diaphragma* & *Cor*, unde *anxietas*. Hanc verò theoriam revellunt primò *Uteri situs*, ejusque *firma* cum *intestinali recto*, it: cum *osse pubis*, per *ligamenta colligatio* atque *connexio*, ut impossibile sit *Uterum* suo loco moveri, ut hinc etiam *Uteri procidentia* sit falsa. (2.) *Anarome ipsa*, quàm sæpi-



simè in ægris passionibus hystericeis mortuis Uterus insons & loco naturali fuerit repertus. Sic Willisius de morbis convulsivis cap. 6. pag. 92. habet exemplum mulieris hysterice passionibus gravissimè laborantis, cujus corpus cum post mortem aperuisset, Uterum invenit insontem, verum juxta Mesenterii plexus nerveos in molem attolli & elevari solitos, visceris illius membranas ab invicem divulsas & solutas vidit. (3.) *Experientia* virorum, qui affectu passioni hysterica simili subindè corripuntur. Nam nil rarum est, quod mares malo hypochondriaco graviter laborantes patiantur symptomata similia istis quæ tales mulieres patiuntur, non tantum morum globi, sed etiam suffocationes imminentes & similes. it. sunt viri, qui odores suaveolentes non possunt ferre. Ita Willisius in *pathologia cerebri* habet virum passione hysterica correptum, vid. & Barthol. Cent. 1. *hystor.* 45. cujus auriga si fuisset mulier, is statuisset, esse passionem hystericam. Hochstetterus dec. 5. cur. 21. habet contracturam gulæ spasmodicam cum variis abdominis affectibus hystericeis. In praxi enim frequenter occurrunt viri, qui habent similia symptomata, ac mulieres hysterice, & etiam simili modo curantur, ut per *castoreum* & *volatilia*. Sic habui aliquando Studiosum, qui graviter laborabat malo hypochondriaco, hic factus ægrotus omni mane circa mediam noctem evigilabat, & vigil factus percipiebat gravia murmura in abdomine, simulque copiosi flatus abdomen distendebant. Sequebatur insignis respirandi difficultas, ut semper suffocari videretur, cum cordis anxietate & palitatione. Referebat: *Es sey ihme/ als wenn er zusammen gepresset were.* Hinc superveniebat sensuum internorum imprimis quædam perturbatio, donec sub una vel altera hora, superveniente sudore, paroxysmus evanescebat. Si hæc symptomata corripuissent mulierem, omnes dixissent: *Es sey die Mutter-Beschwerung.* Curabatur, præmissis vomitorio & Trialibus, per *Θ ia volatilia* & *prea*, & hinc *carminativa aromatica*. Sic quoque aliquando juvenis nobilis curabatur à me, qui patiebatur genuinam passionem hystericam, dicebat se esse proclivem ad Colicam, it. ad Epilepsiam, ita quidem, ut subindè graves patiatur insultus abdominis; contrahitur, quoties dulcia quædam comedit; epilepsiam corripitur, quoties irâ aut terrore afficitur; subindè utrumque coincidit. Quando edit dulcia, dicit: *Es sey als wenn es Ihm grünte und lãhme ad mählig von unten herauff.* Tunc circulum circumdat circa pectus, ut si sensationes Colicæ superveniant, ne superiora versus ascendant. Affectus hic si esset in muliere, esset passio hysterica; Sed est juvenis hypochondriacus. Hinc *Galina*, hinc etiam *spiritus Θ \*ci*, & emplastrum de Galbano impositum solet eum curare. Veterum ergò rejectâ sententiâ modernorum duplex est hypothesis, [1.] Sylvii, qui dicit & derivat ex acido austero peccante, speciatim pancreatis vitiosè in intestinis effervescente; undè flatus & dolor abdominis, quò ad M. S. delatò supervenit coagulatio & dolor præcordiorum; Curatque per *Θ ia volatilia oleosa*. [2.] Est Willisii, qui passionem hystericam ad morbos convulsivos & affectus spasmodicos refert: Hinc Scorbutici & hypochon-

hypochondriac  
drome vocat  
chondriaco gr  
pag. 105. se q  
fonte invenit  
sa: deducte  
tra cerebrum  
moribus viti  
in canales n  
tur acceder  
affurgunt &  
tissimum e  
binemus;  
ejusdem pe  
monstrat  
in primis o  
eadem sym  
vendo tam  
resuscitare  
in talibus q  
anxietates,  
hysterico V.  
fuit. [3.] I  
bus peccat  
facile ferme  
solent: un  
& similia.  
paroxysmu  
currunt: h  
cam comm  
rem stomac  
dum etiam  
cis & lary  
aut statu p  
moti & su  
ter. majore  
& sursum  
raro risus, i  
ru convuls  
dolorem ci



*hypochondriaci*, non mirum est, quòd talia symptomata patiantur, quorum Syndrome vocatur *passio hysterica*; ita ut dicat *Sylvius*, malum hoc esse malò *hypochondriaco* gravius affligens: dicit enim *Willisius de morbis convulsivis cap. 10. pag. 165.* se quasdam nutrices passione *hysterica* mortuas aperuisse, & utero infante inveniisse in occipite principia nervorum sero ac imadida ac ferè immersa: deducit ergò passionem *hystericam* à *abus animalibus* principia nervorum intra cerebrum occupantibus malè affectis, quatenus in confusionem acti vel humoribus vitiosis perfusi copulam explosivam sibi adsciscunt, quam unà secum in canales nerveos deducunt. *Hochstetter. cas. 3.* dicit: ad *spasmus* mihi videtur accedere *Vteri error*, qui si reliquis cognatis nervosis partibus communicetur, affurgunt & illæ in hostem, maxime, si vapor vellicans ad cor accedit. Tutissimum est mediâ incedere viâ: utramque ergò hypothesin certo modo combinemus; & quidem verum esse, quòd in passione *hysterica* & symptomatibus ejusdem peccet primariò *acidum*, vitiosum & à naturali statu degener factum, monstratur [1.] Quòd *scorbutica*, & *hypochondriaca* mulieres passioni *hystericæ* inprimis obnoxia sint, & quòd mares malo *hypochondriaco*, graviori correpti eadem symptomata sustineant; Hinc tales mulieres purgatio etiam levis, movendo tamen *camarinam*, insigniter lædere solet, & paroxysmum *hystericum* resuscitare: Cautè ergò purgandæ mulieres *scorbuticæ*: [2.] Quòd sanguis in talibus quodam modò coagulatus esse soleat, à cujus in præcordiis stagnatione *anxietates*, *ῥογχία* & *syncope* originem ducunt, vid. *Willis. l. 1. p. 28.* qui viro *hysterico V.S.* administravit, unde sanguis minùs fluidus sed grumusus extractus fuit. [3.] Rejècta per vomitum arte sive sponte sunt *aruginosa*, *porracea*, in quibus peccat primariò *acidum* præcipitans bilem in istum virorem. [4.] Dulcia facile fermentescuntia & acescentia passionem *hystericam* insigniter exacerbare solent: unde talia dulcia omnibus *hypochondriacis* sunt molesta, generant flatum & similia. [5.] Quia remedia, quæ *acidum* destruunt, nempe *Trialia* extra paroxysmum præservativè, & *ia.v. volatil.* in paroxysmo curativè, præ cæteris succurrunt: hinc *Barberr. in praxi* medicamenta *antiscorbutica* ad passionem *hystericam* commendat. *Lang. in Fabr.* dicit: omnia *anticolica*, quæ *stranguriam* & *ardorem stomachi* compescunt, convenire *hystericis*. Quod autem præter hoc *acidum* etiam adsint *spasmi* & *motus convulsivi* tam partium abdominis quàm thoracis & laryngis, patet, præter 1. convulsiones epilepticas, quæ frequenter in fine aut statu paroxysmi solent erumpere, 2. ex sensu isto globi in abdomine commoti & sursum versus cum impetu retracti, qui videtur plexus nervus *Mesenter. majore* esse, qui convulsus cum partibus annexis in globum contorquetur, & sursum versus retrahitur. Hinc tertio fit, quòd *hystericis* superveniat non raro risus, iisque invitis, qui est *Sardonius*, natus ex convulsione *diaphragmatis* & motu convulsivo, sicut & *diaphragma* tonicè convulsus difficilem respirationem & dolorem circa regionem cinguli repræsentare solet. Jam verò convulsus *diaphragma*



phragma & reliquos musculos thoracem moventes, simili spasmō corripit; quia omnes muscoli thoracem moventes habent consensum cum nervis intercostalibus, ex quibus habent suos furculos. 4. Spasmos etiam testantur dolores abdominis lancinantes & contorquentes varii & hinc inde oberrantes, qui tales spasmodicos & convulsivos motus, quales interdum scorbuticis solent esse frequentes, excitant; hinc mulieres talia pathemata hysterica incurrunt, simili ratione, atque mares nephritici patiuntur Colicam & dolores abdominis per consensum spasmō laborantis: sic si mulieres corripiantur nephritide, Colicā, vocantur pathemata hysterica, quatenus nervi renales ex iisdem plexibus ac nervis intestinorum & stomachi oriuntur. Talis dolor abdominis lacerans & torquens frequens est in infantibus, unde tales mulieres dicunt, esse epilepsiam internam; & quidem recte: Hinc nempe post tormina superveniunt motus convulsivi artuum, dicunt: Die Schwerenoth bricht auß. Dum autem ita convelluntur intestina, flatus in iis geniti & conclusi variè oberrando istos sonitus, murmura & borborygmōs, quales in passione hysterica sentiunt, solent inferre: Acidum ergo peccans, & inde nati spasmi combinandi sunt. Quod ergo attinet modum fiendi, complicatissimus est affectus: oritur nempe ex vitio in intestinis, ab acido, forsan pancreatico p. n. constituto, cum bile effervescente, ex qua effervescencia copiosi flatus oriuntur & insequenter isti sonitus & borborygmi abdominis. Ab hoc acido ulterius procedente, sanguinis etiam coagulationes & stagnationes circa præcordia oriuntur; His conjungitur perturbatus & depravatus ætuum animalium motus, & primariò in nervis intercostalibus & pari vago, in quibus inordinatus ac explosivus iste motus spirituum animalium percipitur, sub cuius inchoamento in cerebro deliria & scotomia oriuntur; sub progressu spasmi abdominis & thoracis, ut etiam, cordis musculo quodam modo convulso, palpitatio huius atque compressio oriatur: Interdum præcedunt pathemata abdominis, interdum nervorum. Illa, dum paroxysmus originem ducit occasione effervescencie vitiosa, ab acido in intestinis; unde ex irritatis ab isto acido partibus nervosis, spasmi interni, & membrorum externorum convulsiones oriuntur: Et quando oritur ex ira, esu dulcium, nephritide, &c. interdum præcedit spirituum animalium impetus & motus explosivus & per nervos agitatio inordinata; hinc scotomia, varii colores, ante oculos apparentes & similia, inchoante paroxysmo fiunt, in primis quando odores, errores, aut ira primariò excitant paroxysmum; odores enim fortiter afficiendo commovent sensuum organa & procellunt, eosque ad motus inordinatos cogunt, quâ occasione pancreas & porus biliaris conquassata effundunt suos succos. Observa autem, quod, prout plures aut pauciores furculi nervorum aut plexus afficiuntur, etiam variare symptomata; & quidem, quando nervi plexus lienis aut stomachi afficiuntur, in specie dictorum locorum urgent pathemata, & tunc malum lienis vitio oriri dicitur, ut sit unum pathema. Cæterum hæc pathemata vide latius deducta à Willisio C. X. l. c. Sicut itea, quæ effervescencia



effervescentiam p. n. & succos in primis viis concernunt, apud Sylvium in Prax. & in  
dissertatione de suffocatione hypochondriaca. Ex his patet, quod suffocatio Vteri sit  
species mali hypochondriaci gravioris, sive admodum exacerbati, oriundi in specie  
ex acido vitioso, sive errore stomachi, sive errore pancreatis genito, & in intestina  
effuso. Ab hoc primario oriuntur dicta pathemata, quatenus nervi afficiun-  
tur: Affligunt autem potissimum mulieres, quia earum systema nervosum est deli-  
catum, magis sensibile, & quod facilius commovetur ac in spasum convulsivum  
cogitur, unde & animales promptiores redduntur in varias motus exorbitan-  
tias & ataxias erumpere. Vel, est species colica convulsiva, nam in hac, dum  
intestinorum spasmi sunt vehementiores, etiam angustia, difficilis respiratio & si-  
milis urgent. Odores quod attinet, effluvia ista volatilia subtilia promptè affi-  
ciunt animales, eosque ad varium, subindè enormem motum disponunt;  
unde etiam literati, quorum spiritus magis sunt volatiles, raro possunt ferre  
odores fortes, quin patiantur aut cephalalgiam aut angustiam quandam circa  
præcordia: Unde mulieres etiam ab odoriferis istis tam facile alterantur, & in  
iisdem passio hysterica resuscitatur. Observa tamen, quod odorifera non affici-  
ant saltem spiritus animales in naribus, sed etiam circa genitalia, quia hæc ce ge-  
nitalibus admota subindè conferunt: Nam coitus in fœmina longè voluptu-  
osior redditur, si mas inungat instrumentum zibetho, vel simili medicamento  
odorifero volatili. Nihilominus præter hæc odorifera immediatè afficiunt na-  
res & animales etiam odores isti cum aëre attracti; alterant enim plus minus  
M.S. adeoque symptomata, quæ ex M.S. motu & ejusdem impedito trajectu  
per pulmones oriuntur, solent exindè exacerbari. Hinc ex odore Castorei pen-  
nis perdicum accensis levamen percipiunt, & ampliatur quasi thorax, quia ex  
odore tali volatile respiratione attractum corrigit acidum tunc M.S. vitiosè  
inquinans: Unum adhuc monendum, ut ut peccet primario acidum, tamen fomes  
& focus mali remotus, cujus occasione excitantur hæc symptomata, subindè va-  
riat; nam non semper eximendæ sunt partes genitales in mulieribus, quia inter-  
dum habent rationem fomitis morbi, non, quasi Vterus aut testes soli accusandi sint,  
aut quod hujus perversus motus talia symptomata inferat, sed quatenus mensi-  
um suppressio & indè coacervatum fermentum vitiosum, occasionem præbet pas-  
sioni hysterica; vel quatenus liquor seminalis retentus & corruptus, uti varia infert  
symptomata, ita pervertendo spiritus animales & inquinando reliquos succos  
rationem fomitis morborum obtinet, ratione cujus talia symptomata superveniunt.  
Quod ex hoc liquore superveniant talia symptomata, patet ex c. 4. cur. 95. Gabel-  
koveri, qui dicit, ex fricatione vulvæ cum oleo spicæ magnam partem liquoris  
crassiusculi effluxisse, & sic curatam esse mulierem. Forestus refert ex vellicati-  
one pudendi quandam esse curatam. Potest hoc denique confirmari ex eo, quod  
virgines sanæ, dum fiunt gravidæ, fiunt hystericae, partim ratione mensium sup-  
pressorum, partim ob alterationem, quam obtinent à genitali maris, qui to-  
tam



tam mulierem alterat. Ex his facile cognoscitur, quomodo ab aliis differat. *Hysterica passio*: nam ab *apoplexia* differt, quod *antecedentia* fuerint alia, & in *apoplexia*, nisi confirmata fiat, non semper *pulsus* & *respiratio* abolentur, d. satis vegeta sunt: ab *Epilepsia* non differt, nisi *parte affecta*, quod nempe *Epilepsia* dicitur, quando afficit *partes externas*, *passio hysterica*, quando *internas*: à *Colica*, *malo hypochondriaco*, *scorbuto* non differt *realiter*, d. saltem *variatione symptomatum*.

**PROGNOS.** Malum hoc *rare* est *lethale*, utut subindè redeat, & graviores paroxysmos mulieribus inferat: Interdum tamen, in specie, si non *maturè* occurratur, potest mulierem necare: longè *periculosus* est *prægnantibus*, & *puerperis*, quàm aliis mulieribus. Mulieres interdum videntur mortuæ; quod tamen non est optimum. *Θεινέειν* sunt *sternutatoria fortiora*, quæ naribus inflata, si sternutationem excitent, bonum signum; si non, & repetitâ etiam vice citra effectum inspirentur, malum est signum.

**CURA.** Duplex *tempus* in passione hysterica; distinguendum nempe *tempus paroxysmi* & *extra eundem*. In *paroxysmo* attendendum est [1.] ut *acidum vitiosum* in intestinis corrigatur, alteretur, & *flaruum* proventus prohibeatur. [2.] *Convulsiones* & *spasmi* sistendi, *ætuus motus* sopiendus & placandus. Ultri-  
que scopo, speciatim priori satisfaciunt *Θια volatilia oleosa*; posteriori opiata, & in quibusdam *camphora*, nam omnes non ferunt *camphoram*. Externè quæ usurpantur, sunt (1.) *odorifera naribus* & *genitalibus* admota, eaque nunc sub forma *spirituum*, nunc sub forma *suffitus*, nunc *oleorum*: pertinent huc *sternutatoria* in graviore paroxysmo usitata. (2.) Inter *externa* sunt, quæ *umbilico* inunguntur, aut *abdomini* applicantur. (3.) *Clysmata* appropriata injicienda. Quoad *primum*, mulieribus hystericeis mox *odores fortes* & *graveolentes*, pro ratione ægræ, admovendæ sunt *naribus*, ut *Castoreum* aut *asa fetida*, It. fiant *suffitus* ex *plumis accensis* *avium*, speciatim *perdicum*. Rarum est, quod quædam postulent *accensum*, quod tamen nemini suaderem; quia ex hoc supervenit *difficultas anhelæ*. Verùm habeatur ratio *idiosyncrasia*: quibusdam magis placent *suaveolentia*, vid. *Nochsett*. Interim observ. quod mulieres, quas lædunt *suaveolentia* naribus admota, non lædant interius assumpta, ut *Moschus*, *Zibethum*; modò mulieres non percipiant odorem. Alii hoc uruntur experimento:

℞. Mosch. opt. gr. IV.

Cinamom.

Caryophyllor.

NM. aa ʒj.

propinant in *vino odorifero*, vel loco hujus *pilula ex Moscho* tanquam optimæ commendantur. *Riverius* commendat illud *Solenandri*:

℞. Moschi, sanguin. Dracon.

aa ʒj. sumat. in ▽. menth. ʒiij.

Johannes

Johannes Angl.  
liff. de morb. c.  
enemata ac  
ad fortiora p  
quin & ster  
xylini haufus  
iam remedi  
admotus on  
naribus, ure  
toridis balsa  
ut vellicent  
infundibul

de quo inco

qui ægræ in  
abdominis  
ungenda su

calesfactus.  
de stillac. ff  
acriora, ex  
tum est, ut  
bano, v. g.

Paris



Iohannes Anglicus commendat semen pastinacæ vel aquilegia in vino : vid. Wil-  
 lif. de morb. convulsis p. 20. & pag. 84. qui simul in casu fortiori commendat  
 enemata acriora, verb. g. rad. bryonia, & carminat. frictiones crurum & pedum, & si  
 ad fortiora procedendum est, cucurbitul. abdomini aut inguinibus applicandæ;  
 quin & sternutatio crebro provocetur : nonnullis convenit in medio paro-  
 xysmi haustus ex  $\nabla$ . frigida: commendatur in specie Castoreum. Optimum et-  
 iam remedium salia volatilia naribus admota, & sal. armoniaci fortis naribus  
 admotus omnibus præferendus est remediis. Dum hæc fetida admoventur  
 naribus, utero admoveantur suaveolentia, nempe illinantur vulvæ, in loco Cli-  
 toridis balsam. apoplectic. zibeth. mosch. d. fit raro; hinc loco huius melius est,  
 ut vellicentur pili pubis, ubi facile ad se redeunt, facit huc suffitus Paracelsi, si per  
 infundibulum Utero excipiat, nempe

R. verruc. equorum.  $\mathfrak{zj}$ .

asaæ foetid.  $\mathfrak{zj}$ .

ungul. caprin.  $\mathfrak{zij}$ .

M. f. pulv.

de quo incend.  $\mathfrak{ij}$ . ad.  $\mathfrak{zj}$ . si hæc nolint sufficere, usurpentur sternutatoria, verb. g.

R. Castorei.  $\mathfrak{ij}$ .

piperis. long. gr. x.

hellebori: albi.  $\mathfrak{ss}$ .

pyrethri. gr. v.

M. f. pulv.

qui ægræ inspiretur in nares repetitis vicibus. Juxta hæc conveniunt unguenta  
 abdominis nunc oleosa, nunc Emplastra. Inter ea, quæ regioni umbilicali in-  
 ungenda sunt, eminet Galbanetum Paracelsi, l. in defectu huius:

R. Axung. Castor.  $\mathfrak{ziii}$ .

Olei destillat. chamomill.

Cumini.

Carvi aa  $\mathfrak{ij}$ .

spicæ.  $\mathfrak{zss}$ .

M. illinatur tepidè umbilico, imponatur desuper lacer  
 calefactus. Mihi in usu est oleum destillat. succini mixtum cum dimidio olei  
 destillat. spicæ, illin. regioni umbilicali, & scrobiculo Cordis, vel, quando sunt  
 acriora, excipiantur cum oleo castorei, irino, vel corpore pro balsamo; Consul-  
 tum est, ut his linimentis desuper imponatur emplastrum, idque in specie ex Gal-  
 bano, v. g.

R. Galbani in  $\mathfrak{t}$  to l. vino soluti  
 & ad pulvis consistentiam in-  
 spissati  $\mathfrak{ziii}$



Extracti castorei

crociaa. ℥iij.

Olei destillat. succini

spicae aa ℥i℥.

M. f. *Emplastrum*, de hoc inducatur s. q. super

alutam, & applicetur umbilico, vel obducatur syndone rubra, & applicetur, imponendo de super laterem calefactum, cum his subindè egregium præstant *clysmata*, quæ evacuando intestina & promovendo flatuum expulsiōem egregiè conferunt, saltem ex speciebus carminativis aromaticis, quibus interdum *salia volatilia* addi possunt, v. g.

R. rad. angelic. ℥vi.

fœniculi ℥℥.

herb. matricar.

levistici

flor. chamomill. aa. m℥.

baccar. lauri ℥vj.

℥. qri ℥i℥. coque in s. q.  $\nabla$ . f. colatur:

℞. ℥ix. adde elect. de bacc. lauri ℥ij.

Castorei ℥℥. ad ℥j.

Olei destillati cumini, carvi, succini aa. ℥℥. M. pro *clysmate*,

unâ, vel si flatus obstant, binâ vice injiciendo, loco oleorum horum etiam *salia volatilia* v. g. C. C. ad. ℥j. & ℥℥. commodè addi possunt, cum egregia euphoria, speciatim ubi urgent *parthemata spasmodica*. Cum his usurpentur simul *Cinatura* circa regionem hypochondriacam, quò enim sunt laxiores mulieres, etiam magis solent urgere *respirationis symptomata*. Habent hic quandoque delectum: Alii commendant *cingulum ex corio humano*, alii *ex corio cervino*. *Interna* quod attinet, dictum, optima esse *salia volatilia oleosa & viscosa*, & in specie, quia promptè *sudorem* movent, per *sudorem* solent finire hi paroxysmi: quibus adduntur subindè *opiatâ*, ad impetum *spasmi* coercendum. In usu ergò vulgari sunt *Zedoaria*, *levistic*, *angelic*, *gentian*, *menth*, *puleg*, *matricar*, *flor. chamom*, *Roman*, *Cortic*, *aurant*, *sem. dauci*, *bacca juniperi*, *castoreum*, *asa fatid*, *Crocus*, *rosmarin*, & similia, quæ omnia eò collimant, ut *sale volatili* plus minus oleoso acidum destruant. add. *opium*, *laudan*, *opiatum*, *theriacam*, *mithridat*, & similia. Sed modernis eminent ipsa *salia volatil*, quæ immediatè agunt. Unde *mixture* ex *sal. volatili succin*, cum *Castoreo* & *opio* paroxysmum hystericum sedat optimè, v. g. Nos in graviore malo in usu habemus hanc terribilissimi quidem saporis, sed præsentanei tamen effectus *portionem*:

℞.  $\nabla$ . menth. flor. sambuci. matricariæ. an. ℥j.

Essent. castorei ℥i℥.

Sal. volatil. Succini gr. XII.

CC. gr. VI.

laudani



laudani hysterici gr. X.

Syrup. Cortic. Qant. ℥iij. M.

potest fieri etiam talis, v. g.

℞. ∇. menth. matricar. aa. ℥i β.

Essent. castorei ℥iij.

℞. Θ\*ci ℥j.

laudani. opiat. gr. iij.

Syrup. artemis. ℥vj.

M.

Usurpetur crebrius cochleatim, aut rarius pro varietate circumstantiarum:

℞. ∇. flor. sambuc. matricar. menth. aa. ℥j.

Essent. castorei. ℥i β.

liquor. C. C. ad. ℥j.

laudan. op. gr. ij.

Syrup. flor. Calend. ℥β.

M. capiatur cochleatim.

Ad hæc interna possunt revocari omnia reliqua, quæ ab autoribus ab experientia commendantur, nempe quæcunque *salia volat.* uti in simpl. ℞. Θ\*ci ritè præparatus optimus, speciatim tamen *succinum* & quæcunque *succinata*, in primis *oleum destilat. succini* excellunt. *Oleum* verò hoc habet mali, quod nimios *ructus* soleat ciere; *Ol. de Castoreo* dictum, quod optimum, convenit it. *essentia Castorei cum sale volat.* parat. nec non ℞. Θ\*ci cum *Calce viva* paratus. Facit huc *Tinctura anodyna D. Langii*, ex *Castor. asaferid.* beneficio *salis* tri. Facit huc *Tinctura granorum actes.*, (quæ dos. j. l. ij. cochlear. in paroxysmo propinata, expectando sudorem, est optima; adde *Elixir Vterinum Crollii*, dos. ℥j. ad ℥β. in paroxysmo. propin. & sudorem expectando. Pertinet huc *fuligo furni*, à mulieribus à ℥β. ad ℥j. usurpata: flores *iris* in eadem dosi, imperando sudorem, propinantur. Tandem *trochisci demyrriha* ad ℥β. l. ℥ij. etiam sunt egregii in paroxysmo. Hisce ultimum & nulli cedens remedium annumerandum est, nempe *stercus equinum*; ejus *succus expressus* calidè propinatus optimus est. Hæc & similia usurpantur in paroxysmo, nunc semel nunc repetitis vicibus, ut tamen semper excitetur *sudor*: his nil proficientibus, ita ut ægræ tandem mortuorum instar jaceant, ne omnia auxilio destitutæ jaceant, in extremo casu extrema tentanda sunt, qualia hæc sunt vomitoria.

## VIRI ADMISSIO LÆSA.

Fœmina nempe, cum mensium fluxu ad generationem quasi se habiliter, & cum puritu *Græo* titillant genitalia, hinc ei à viro satisfit per debitum *congressum*; qui *laditur variis modis*; ex variis nempe vitiiis *orifici Vteri externi & vaginæ*, quando sunt *nimis aperta*, vel quando *stricta nimis & angusta*: quibus

E 2

accedit



accedit affectus ille, qui vocatur *procidentia Uteri*. Quoad *nimiam angustiam*, hæc subindè *reperito negotio* solet curari; sin minus id fiat, per *speculum matricis* dilatanda venit. Si verò membra sint occlusa, *Methodo Chirurgicâ* curantur: At si *vagina Vterina* forsan *coalescat* post *excoriationem* aut *exulcerationem*, malum difficile est, & citra *sectionem* non potest curari; quæ tamen etiam maximè dubia est. Si verò nimis *patula* sit *vagina*, beneficio *balneorum*, *injectionum* aut *infusionum adstringentium* curatur.

### PROCIDENTIA UTERI.

Ita dicitur, quia communiter Uterum extra situm naturalem foras progredi putant, ita ut observetur per pudenda prodire corpus quoddam carneo colore, in medio perforatum nunc magis nunc minus. Hanc molem dicunt esse uterum; Si verò consideremus firmam istam Uteri connexionem circa os sacrum, cum intestino recto & partibus vicinis, ita ut planè immobilis sit uterus, patet hanc *hypothesein* esse *falsam*, quod scilicet fiat à *causa interna*; sed necesse est, accedat insignis *violentia externa*, & sit potius *Vterus extractus*, quàm *prolapsus*: quæ *protractio* fit interdum *in partu difficili*, in specie à *coalescentia secundinarum cum Vtero*, propter quam mulieres ab obstetricibus malè sæpe tractantur, vid. *Barthol. Cent. 2. histor. 91*. Quod tamen citra vitæ ingens periculum nequit fieri, ut hinc tales mulieres, propter *vasorum ruptionem* & *lacerationem partium*, ut & *inflammationem gangrenascentem* vix salvari possint, sed semper necesse sit intereant: ex quo patet, quid habendum sit de iis, qui dicunt *uterum prolapsum fuisse effectum*, remanente vita. Ergò affectus hic minimè *Vtero* sic dicto convenit, d. *vaginam uterinam* afficit, propterea rectè dicitur à Medicis *prolapsus sinus pudoris*, & fit duobus modis: (1.) Quando *vagina Vteri* tota nimis *laxata* aut *extensa* foras propendit, quod fit interdum à *partu difficili*, postquam non rarò digitos aliquot latos *globose* propendit, & in medio sui foramen relinquit, quod falso pro Uteri orificio interno habetur: Sic ab alia quacunque causa si *relaxata* aut *extensa* fuerit dicta *vagina Vterina*, facilè propendere foras potest. (2.) Quando *ruga vagina Vterina* in quadam saltem parte *laxata* aut *exesa* aut *erosa* non nihil sunt, tunc enim à *sanguine aliisque humoribus* in parte relaxata coacervatis successivè extra vulvæ labia propendit, ut repræsentet corpus *amplum, rotundum, angusto collo annexum*, quod collum interius intra sinum pudoris se abscondit: hoc corpus quandoque *capitis infantis* quantitatem acquisivit, imò interdum usque ad *genua* propendit, imò alteratum ab aëre interno vel humoribus *pravum odorem* expirat, & pondere *dolorem* infert, *congressumque* impedit.

CAUSÆ, ut plurimum sunt *interna*, subindè post *Vteri hamorrhagias* nimi-



at, post Uteri fluxum album, diuturnum insequitur, dum laxatis rugis & fibris vaginae uterinae ex altera parte tumor & laxitas supervenit, donec succi coacervati corrupti acorem vitiosum concipiendo dictas partes in ulcera vertant. Hoc corpus abscindi posse à veteribus traditum fuit; imò cum subindè aliqua æqualitas tactui se representet, factum esse testantur. Verùm hoc refellit modernorum experientia chirurgica: *Joh. von Wefern* in observ. cap. 55. habet mulierem, quæ cum aliis affectibus variis complicatis insigni procidentia Uteri laborare putabatur. Mulieres tandè jubent, ut abscindatur Uterus propendens, quod faciunt Chirurghi, & injectâ ligaturâ totam istam substantiam propendentem abscindunt, relicto filo intus intruso: paucis interjectis diebus mulier interit. Aperitur cadaver, & Uterus percipitur in suo situ naturali, filum verò alligatum firmiter cuidam loco in vagina Uterina, ubi relaxatæ quædam rugæ collum istius tumoris constituunt. Interdum etiam *excrecentiæ*, nunc *rugosæ*, nunc *car-nosæ*, extra vaginam uterinam enatæ, prolapsum talem mentitæ sunt, quarum *abscissione curatæ* fuerunt, vid. *Kerkring* in *specileg: anatom. obs.* 53. qui refert exempla *sarcomatum* nunc in orificio Uteri interno natorum, nunc propendentium ex vagina Uteri, quæ pro *utero prolapsio* habita sunt. Sic in *Miscellaneis curios.* ann. 2. pag. 199. prostant *Exempla excrecentiæ fungosæ vaginæ, Uteri prolapsum mentientis*.

**PROGNOS.** Malum *per se* non est periculosum, sed tamen periculum est, ne subindè abeat in *gravia ulcera*; it. ne ab *aëre externo* alteretur, inflammetur, & *gangranam* concipiat. *Prolapsus sinus pudoris* quò recentior est, eò *facilius* curatur; quò magis est *inveteratus*, eò *difficilius* est, & saltem *palliativè* curari potest. Si fit à *causa interna*, per *successivam relaxationem*, *facilius* curari potest, eò, qui fit per *violentiâ externam*: qui fit per *impetum obstetricis*, *incurabilis* est.

**CURA.** In hac sequentes attendendi sunt scopi: (1.) Partem laxatam in *statum naturalem* reponere: (2.) Adstringentibus commodè in debito situ firmare l. verè l. *palliativè*; Si verò *alterata* aut *corrupta* fuerit, eandem *abscissione* tollere convenit. *Repositio* debet fieri *circo*, partim, ne alteretur ab *aëre*, l. *urina*, partim, quia sic *facilius* curari potest. Pro scopo ergò *repositionis* & *firmationis* conveniunt omnia, quæ in *ano prolapsio* aut *intestinis prolapsis* commodè usurpari possunt. Quoad *repositionem* ergò *Uteri prolapsi* prius *fomentum* ex dictis *aromaticis* blandè *discutientibus*, v. g. ex *roremarino*, *salvia*, *absynthio* in vino, a.  $\nabla$ . *ferrarior.* paratum convenit: Tali aliquamdiu *fomenterur sinus pudoris prolapsus*, ut partim *tumor* partim *alteratio* corrigatur: hoc facto accipiat *lintheum dicto liquori intinctum*, circumvolvatur digito, & interius versus *reponatur* denuò *sinus pudoris prolapsus*, ægrâ supinè jacente, clunibus superioribus capite: postmodum *quies* injungenda est; pro hoc scopo quidam commendant *suffitum pellis anguillæ salitæ*, in fumo *exsiccatæ* & *pulverisatæ*. Convenit etiam pro hoc scopo, ut regio ossis sacri & circa os coxendicis illinatur *pinguedine ursina*, aut *erinacei*: Jubent quidam,



quidam, ut mulier *terreatur*, quia sic ferè sponte retrahitur sinus, nempe ut chirurgus l. Medicus ferro *candente* simulet, ac si velit Uterum tangere. *Zacut. Lusit.* jubet *mures vivos* filo alligatos per mulierem discurrere: Quidam *cucurbitulas majores cum flamma* inguini, umbilico & sub mammis apponunt. *Uterus repositus firmandus* est l. verè l. palliativè; verè *remediis* tam in- quam externis: interne conveniunt *vulneraria simplicia* & ex iis parata *decocta*; quæ fiunt ex *herniaria, pilosella, bſeronica, cormentill.* & simil. quibus addita sint *semina 4. calida maj.* ut præcaveatur *flatuum* nimius proventus, à quibus cum stimuletur alvus, & turgeant intestina, periculum est, ne quodammodò denuò protrudatur sinus repositus. Adde, ut *alvus* semper sit *fluida*, ne fortiori conatu de- jiciendi denuò protrudatur substantia modò reposita: juxta hæc, quæ *verè fir- mant* externe, sunt *fomenta adstringentia*, nunc sub forma *injectionum*, nunc *fomentorum* vulvæ extrinsecus applicandorum; nunc *peſi ex lana carminativa*, hujusmodi *decoctis adstringentibus* intincti applicantur. v.g. fiunt talia *fomenta* dictis modis ex *ordinariis adstringentibus*, ut *gallis, fol. quercin. Cortic. granator. herb. alchimilla,* & similibus, quæ decoque in  $\nabla$ . *ferrariorum*, quibus etiam pot- est addi parùm *aluminis*, eo nempe in casu, quando *partes* non sunt *excoriata*, & quando sunt *indolentes*; aliàs talia *acria* intermittenda sunt: Si in substantia *peſſorum* & *globulorum* applicentur, cauti simus, ne *peſſi* tales nimis magni sint, & irritent *vaginam uterinam*; metus enim est, ne excitetur *fluxus albus*, qui tunc solet malum subinde exasperare. Non incongruum etiam est, ut insti- tuatur *suffitus ex stercore vaccino & equino*, qui egregiè convenit: Loco hujus ex *acero, succino, thure, mastiche, gummi juniperi* & simil. forsan magis proficui. Quibus placet, possunt applicare *emplastrum* regioni umbilicali aut ossis sacri ex *opopanace, galbano, Tacamahac,* & similibus: His si nequeat denuò firmari Uterus, *palliativè* firmetur, quod sit per *globum cereum*, nunc rotundum, nunc oblongum, pyriformem, *vaginæ uterinæ inclusum*, qui cum sit lævis, intru- datur sinui pudoris & gestetur. Consultum autem est, ut habeat propendens *filum alligatum*, ut possit extrahi, quando liberit. Sic diu supervivunt sine molestia, quin imò concipiunt & pariunt: Extra tempus autem congressus semper debent gestare. Horum præparationem vid. apud *Rhumel.* descriptam, & præprimis in *Hildan. Cent. 4. obs. 61.* sinus pudoris prolapsus si sit *alteratus* ab aëre, & l. *corruptus l. ulceratus*, in tali casu optimum est, ut *radicibus abscinda- tur*; quod sit sine periculo, *injecta* prius *ligatur à*.

## CONCEPTIO LÆSA.

Notum est, quòd, dum *femina* admittunt virum, ab eo imprægnentur: ubi in specie *simus solliciti de signis conceptionis*, cum multum interfit, ut co- gnoscamus, an mulier conceperit, nec ne? *Signa pathognomonica*, mulierem concepisse, non dantur propriè, cum notum sit, ipsas falli mulieres in hoc casu.

Equidem



Equidem in quibusdam mulieribus ex peculiari idiosyncrasia evenit, ut certa quædam ipsæ habeant signa; d. quia sunt particularia, non de omnibus idem testantur: e. g. quædam mox quando concipiunt, manè horridè vomunt: aliæ libidine pruriunt, d. facta conceptione ardor videtur extinctus, v. Panazol. *Pentec. 3. obs. 9.* quò facit in *Pentec. 5. obs. 46.* de muliere, quæ quoties fuit gravida, venam circagenu insigniter tumidam habuit. Signa probabilia, ex quibus ferè semper suspicamur mulierem esse gravidam, sunt sequentia:

1. *Uteri orificii interni clausura:* in mulieribus enim non gravidis, dum percipiunt cæstro libidinis aut fricantur genitalia, orificium Uteri internum solet hiscere, instar pisi, quando verò ritè conceperunt, exactè clauditur, ut ne quidam vestigium clausuræ remaneat.

2. *Menstruorum emansio s. retentio*, idque ferè fit ordinariò simul atque mulieres concipiunt; Interim tamen id non universale est; dantur enim exempla contraria: Sic sunt quædam, quæ sub primis gestationis mensibus adhuc ordinariùm mensium habent fluxum, ut, quæ sanguine serosiore & turgidiorè sunt præditæ. E contra virgines reperiuntur quædam, quæ nunquam passæ sunt mensium fluxum, quæ in hoc passu alterationem non sentiunt, vid. Schenck. & *Miscell. A.N.C. ann. 3. pag. 555.* de muliere, quæ nunquam passa est menstrua, nisi gravida.

3. Quando mulieres aliquot dies post congressum sentiunt horripilationes, quæ sine causa manifesta si obveniant, præmissò coitu, suspicionem faciunt, concepisse mulierem: varia etiam symptomata circa stomachum ac digestionem solent se exferere.

4. *Appetitus est dejectus; vomunt omni manè;* adjunguntur *pica & varii appetitus.* Hæc tamen symptomata insequuntur etiam sine ingravidatione simpliciter mensium p. n. emansionem.

5. *Mulieres, imprimis quæ aliquando sunt cacochymicæ*, l. quæ inclinant ad *Scorbutum*, facta conceptione *obnoxia* fiunt passionibus hysteris; patiuntur *tormina abdominis* & simil. è contra in partu nihil de affectibus hisce patiuntur: Et hoc in specie fit circa primos menses; circa medium verò gestationis tempus evanescit.

6. Si *venter attollitur sensim*, i. e. ab imo ad summum protuberat: tumor ventris est circa regionem umbilicalem, & sursum tendit; partes interiores manent in naturali situ, & tumor talis primariò circa lineam albam conspicitur, & partes laterales ferè plana sunt. observandum tamen, quòd pro situ ordinario fœtus & Uteri etiam tumor nunc plùs nunc minùs protuberet. Observandus etiam hic est situs, ubi anteriora nempe & superiora versùs feruntur partes laterales gravidarum; ut distinguantur gravida ab hydropè abdominis, nempe: 1. Quando mulieres circa medium gestationis tempus, quarti aut in principio quinti mensis percipiunt motum fœtus, qui est in principio saltem subsultorius; intercedente tempore magis fit manifestus. Notetur tamen, quòd in quibusdam motus fœtus percipiuntur citius,



*citius*, in aliis *tardius*: Sic quædam *brevi ante partum* primitus *fœtus motum* percipiunt; aliæ *tertio mense*, cuius ratione quædam sunt *seriores*, quædam *¶iores*, in quibus copiosus chylus nutritivus transcolatur per Uterum: In his, propter *¶am* uberiores abundantem, *minus* solet percipi *motus fœtus*, quia innatat in hisce liquoribus; quod etiam fit *in pinguibus*, in quibus *tardius* solet percipi: Ratione item l. ipsius *matris*, l. *fœtus imbecillitatis*, quod observ. Barthol. Cent. 1. *histor. 96.* quod febris gravidarum easdem ita soleat debilitare, ut *minus* soleant percipere *motum fœtus*, d. à 30. septimana demum accedit. 2. Quod mulieres sæpè primò mense *gravitatem capitis*, dolores *dentium* & similia patiantur: additur in mulieribus propria unius cuiuscunque *idiosyncrasia*, & hoc est, quod præxin mulierum adeò reddit difficilem. 3. Mulieres quæ semel conceperunt, alio tempore vix falli possunt; nam plerumque *certa* quædam habent *signa*. *Conceptio* ergò *leditur* tribus modis: 1. Quando est *imminuta*, ut sit l. *nulla*, l. *ra- ra*. 2. Quando est *aucta*, ut sit *copiosa fœtuum conceptio*, & *exclusio*. 3. Quando est *depravata*, ut sit *falsa*, ut mulieres existiment se esse gravidas; quod etiam, quando *Vterus* est *inflatus* aut *hydrope* correptus, forma gestationis mulieribus imponit.

## INFLATIO UTERI.

Inter *falsos conceptus* est: (1.) *Vteri inflatio*, s. insignis ejus *intumescencia*, à *flatibus* in ejus cavo collectis. Dubitant autem *Practici* quidam, an possint contineri *status* in Uteri cavo: Verum est, quia quædam post remedia copiosos *status* ex Utero emisunt. *Vterus* ergò *inflatus* *intumescit*, & *tumor* in abdomine instar gravidationis sensim sensimque augetur; imò *menses* *supprimuntur*, & *parcius* fluere incipiunt: quandoque *lac* in mammis generatur; fit enim, ut mulieribus habitioribus medio gestationis tempore *lac* in mammis generetur. Interim tamen nihilominus *ultra solitum partus tempus*, ad annum integrum se in utero gestasse videntur, & postmodum l. *medicamentis*, l. *supervenientibus partus doloribus*, excluderunt quasdam *flatulentias* ex utero, unde venter iterum derumuit: Hinc dictus affectus à quibusdam vocatur *Mola ventosa*, s. *flatulenta*; Et si *status* *confertim* erumpunt, certum est, quod *falsa* fuerit *conceptio*: Si v. *sensim* & *sensim*, mulier nescit, quid secum factum sit. Inter *causas* primariò ferè, & frequentissimè *susceptio aëris externi frigidi* in Uterum, & in specie *post partum*, quando largius purgantur *per menses*. Nihil frequentius est, quàm quod ex puerperio adhuc habeant ventrem, quasi essent gravidæ, quæ *mox ab abortu* l. *partu* incautius *aëri frigido* se exponunt, tunc enim Uterus insigniter tumidus & à *flatibus* turgidus fieri solet. Fit interd. una cum *lochiorum suppressione*, interdum etiam *post lochiorum fluxum*, in secunda post partum septimana; Simul *aërem frigidum* sinu pudoris hauriat, quod observ. Salmuth. Cent. 2. obs. 57. præterea *in mensium fluxu uberiori* jam cessante non nihil

nihil mulieres  
externa raro  
deturque fieri  
vix solet obse  
Vteri consider  
guitur in eo, q  
nunc magis e  
reat; secusa  
2. Si præcel  
disponunt:  
tum infantis  
mini, utinc  
dominis diste  
nititur. V  
abdomen c  
PROC  
suppressionem  
CURA  
currant simu  
xantibus stor  
Timao, in cas  
minativa præ  
doar. & gent  
oleum destill  
abdomini in  
oleo destillat  
nempe R. N  
candentibus  
cæteris conv  
minativis ha  
damom. qui  
Hicno  
tanda, q  
aquosa: il  
tes in Uteri  
de viscibus  
bus distinct  
catur Vterus  
l. 4. observ.  
Pars I



nihil mulieres aëri frigido se exponentes inflationem Vteri incurrunt. A causa externa rarò observatur uteri inflatio; & ferè sequitur conceptionem falsam, videturque fieri occasione genitura maris sine conceptione in utero contentæ: Sed vix solet observari, nisi simul adsit principium hydropis Vteri. In hac inflatione Vteri considerandum est, ut distinguatur à conceptione vera: Et quidem distinguitur in eo, quòd. 1. inflatio Vteri pro ratione flatuum, nunc magis dilatatorum, nunc magis condensatorum vi eorum elasticà nunc major, nunc minor appareat; secus ac fit in vera in gravidatione, ubi tumor equalis est, successivè accrescens. 2. Si præcesserint signa alia, in specie causa antecedentes, quæ ad conceptionem disponunt: quando etiam observat mulier mediæ gestationis tempore motum infantis, d. hoc faciat cautè; nam etiam flatus, si imponatur manus abdomini, ut incalcescat, possunt mentiri motum fœtus. 3. Inflatio Vteri magnam abdominis distensionem, lexe verò pondus infert, & manu percussa instar tympani resonititur. Verùm in conceptione moles est minor, pondus verò majus: Uterus & abdomen compressa primò cedunt, d. successivè atrolluntur iterum.

PROGNOS: Per se nil habet in recessu, d. quando adjunctam habet l. suppressionem lochiorum, l. suppressionem mensium, per accidens solet nocere.

CURA. Flatus ejiciendi sunt & discutiendi. Cùm verò frequenter concurrant simul signa digestionis prima læsa, propterea debitis alterantibus & laxantibus stomachum & primas vias, prospiciendum. Modus hujus curæ vid. in Timæo, in cas. pag. 203. In specie quæ conveniunt ex purgantibus, sunt nota. Carminativa præter generalia sunt in specie castoreum & omnia castorina; rad. Zedoar. & gentian. it. marricar. & flor. chamomill. quorum decoctum aut chamomill. oleum destill. sapphirin. est egregium. Externe conveniunt imprimis fomenta abdomini insinuata, emplastr. nempe ex galbano & tacamahac. malaxat. cum oleo destillat. chamomill. l. cum oleo fœniculi, cumini & cera l. suffitus ex NM. nempe R. NM. integram & divid. in 4. l. 8. partes, unam impone carbonibus candentibus, & fumum per cannulam utero excipe. Ratione stomachi præ cæteris conveniunt remedia sassafrata, decoctum nempe ligni sassafras, cum carminativis haustum, & ab omni pastu assumtum Tragema, v. g. ex Zedoar. & Cardamom. quibus add. elæosach. caryoph. elæosach. macis &c.

#### HYDROPS UTERI.

Hic non est adeò rarus, verùm ante omnia confusio Practicorum est vitanda, quia hydropem uteri propriè sic dictum distinguunt à mola uteri aquosa: ille rarior est, hæc frequentior; In illo limpida & flavescens in Uteri cavo contentæ coerceri solent; In hac liquor nonnihil subinde viscidus & visus membranis inclusus, & quidem nunc unâ, nunc pluribus distinctis, coacervatus varias vesiculas repræsentare solet. Hinc vocatur Vterus vesicalis. Talia exempla prostant in Tulp. l. 3. obs. 1. 39. & Schenck. l. 4. observ. Et est facta quadam conceptio, ovique uterini infœcunda generatio,



d. in quo fuit laesa debita conformatio, adfluente adhuc succo nutritivo, qui in membranis coercitus talem constituit. *Causae antecedentes proximae* sunt in duplici differentia, nempe conjunctus (1.) interdum est *hydrops Vteri* cum vera conceptione, adeoque cum foetu vero, videatur Hildanus, Centur. 2. obs. 56. ubi mulieri gravida primitus parturienti 18. lb.  $\nabla$ æ effluerunt, ultra quas ulterius 9. lb.  $\nabla$ æ foetus comitatus sunt: tandem foetus vegetus successit. Salmut. h. c. 2. obs. 59. observavit mulierem gravidam, cui plus 4. lb.  $\nabla$ æ effluxit, qui fluxus aliquamdiu continuavit, donec sex mensibus post fluxum foetus sanum enixa est. Talis *hydrops* cum gravidatione juncti causa est abundantia liquoris chylosi nutritivi, ad nutrimentum foetus destinati, qui non totus in alimentum foetus cedens talem molam constituit. Forſan etiam vitium est in vasis lymphaticis; quibus obstructis *lymphæ* uberius congesta molam hanc constituit. Pro usu ergo practico observetur, fieri interdum, ut mulieribus quibusdam aliquot septimanis ante partum  $\nabla$ . fluat, & tamen sine nocumento matris & foetus; ubi metuunt, ne fiat abortus: in habitioribus tamen fit, ut aquæ in chorio inclusæ effluant, reliquis in corpore restantibus, quod fit sine nocumento: Si verò ex amnio, abortum infert. (2.) *Hydrops Vteri* interd. oritur ex lochiis suppressis, iisque l. planè non, l. parçè fluentibus; ut sanguis quidem primariò effluerit, d. quando postmodum debent effluere menses,  $\nabla$ . limpidæ, in specie in non lactantibus, dum coercetur, successivè congesta uterum in tumorem attollit, & *hydropem* constituit; quin imò materia coercita fermentanda flatus producit, & cum *hydropem* uteri inflationem infert. In talibus *hydropem* talem patientibus ordinariò fluunt postmodum menses, imò observatum fuit, quòd tales denuò pepererint, à partu copiosa lochia habuerint cum ventre & utero detumescente. Fit quoque interdum, ut ex suppressione lochiorum sanguis coacervatus in aliam partem per metastasin congeratur, & ibi liquefiat in materiam serosam. Erat mulier, quæ à partu secundo patiebatur omnimodam lochiorum suppressionem; brevi post intumescere abdomen, in summitate ejus ut perciperetur fluctuatio  $\nabla$ æ: menses fluebant, denuò concipiebat. Terrio partu lochia rursus supprimebantur; tumor abdominis insigniter accrescebat, ut abdomen in fascia gestare necesse haberet: umbilicus versus genitalia propendebat; candelæ admotæ translucebat; Erat *hydrops Omenti*, in quo omnia lochia per metastasin erant collecta & liquefacta in materiam serosam. Suadebant paracentesim; post moriebatur. Facit huc curiosa observatio Ioh. von Meckern, qui observavit in muliere *hydropem* insignem saltem collectum in duplicatura peritonæi inferiori. Rarius fit *hydrops uteri* ex collectione  $\nabla$ æ in utero, idque sponte & subindè à causa interna, quod tamen ut plurimum sequitur occasionem mensum suppressorum, aut impeditur *lymphæ* ex utero egress. & simil. Facit huc observ. Tulpi l. 4. obs. c. 34. de *hydropem cornuum uterorum*: forſan

(forſan intelligi  
necesse est, ut  
uteres sit  
[1.] Tumor aqu  
ceptione anter  
& uterus tam  
ultra decem  
firmatur, l  
gestationis ter  
tiatur sympto  
esse *hydropem*

#### PROOC CURA

ret Medicu  
saltem blan  
quia stimul  
gantibus val  
remediis for  
hinc Elateri  
exlerunt, au  
lando utero  
rum validè

Pergen  
nunc quasi a  
semel conce  
in quo con  
nempe misc  
tota, s. salte  
afflatu fec  
impregnata  
albuginea  
sed hoc ma  
fecundan  
inventu an  
id, quod o  
contineant  
tenta, quæ  
nitali maris



(forſan intelligit hydropem collectum in alis veſpertilionum.) Ante omnia neceſſe eſt, ut cognoſcat Medicus *diſtinctionem hydropis Uteri à verâ conceptione*; ut res ſit ardua: nempe, ex eo ferè ſuſpicio eſt, eſſe *hydropem uteri*, quando [1.] *Tumor aqualiter* diſtenditur, & aqualiter occupat abdomen; cum in *conceptione* anteriora verſus promineat. [2.] Si alia ſigna mulieris gravidæ abſint, & uterus tamen intumeſcat, ſuſpicio eſt, de *hydropē uteri*. [3.] Si geſtet mulier ultra decem meſes, tunc ſuſpicio adeſt, non eſſe veram conceptionem: Confirmatur, ſi nullus motus fœtus unquam perceptus fuerit; Si mulier ſub primo geſtationis tempore commodè ſe habeat, ſine ſymptomatibus diſtentionis; l. ſi patiatur ſymptomata, & hæc poſt medium geſtationis tempus non ceſſent, ſignum eſt eſſe *hydropem uteri*.

PROGNOS. Eſt, quod poſt fluxum  $\nabla$  tandem intereant.

CURA. Ubi concluditur per conjecturam, a deſſe  $\nabla$  am in utero, conſideret Medicus, an ſit *sine fœtu*, an *cum fœtu*. Si hoc ſit, relinquatur mulier, aut ſaltem blandis *hydragogis* ſerum nonnihil evacuetur; *diuretica* non ſunt tuta; quia ſtimulant meſes, & metus eſt abortus. Si verò *sine fœtu*, maturè *purgantibus validis* ſtimuletur uterus, & partes vicinæ, &  $\nabla$ . evacuetur: in ſpecie remediis fortioribus fœtum pellentibus urgeatur Uterus, ad excludendas  $\nabla$ s; hinc *Elaterium* cum  $\mathfrak{g}$ . *dulci* poteſt propinari: *vomitória* propter niſum quem exſerunt, aut etiam *clyſteres fortiores* vaginæ uterinæ injiciendi ſunt, pro ſtimulando utero, ad reddendas  $\nabla$ s. Internè eadem quæ fortius purgant, l. uterum validè ſtimulant, uſurpanda.

### CONCEPTIO LÆSA.

Pergendum ad *leſionem ipſius conceptionis*, ita ut nunc *deficiat in ſterilitate*; nunc quaſi *augeatur*, partim in *partu multiplici*, partim in *ſuperfœtatione*, quando ſemel concepto fœtu repetito novus fœtus concipitur. Præmittendum autem, in quo conſiſtat vera conceptio: Primus qui veterum ſententiam, ſeminis nempe miſcelam concuſſit, eſt *Harveus*, dum obſervavit quod *ovi paris* ova ſint tota, ſ. ſaltem eorum vitella, quæ per ſpiritum genitalem maris afflentur, & tali afflatu fœcundentur: in *viviparis* verò uterus ſimili contagio ruoſo à mare imprægnatur; quo facto fœmina dicitur concipere, unde ſucceſſivè materia albuginea in uterum deſtillans, ſucceſſivè fœcundatur per  $\nabla$  genitalem maris: ſed hoc maximè videretur obſcurum, qua ratione *ſimplex* talis  $\nabla$ . uterum ſaltem fœcundans ſit *cauſa conceptionis*: Hiſce ergo dubiis occurrunt modernorum inventa anatomica, ſcil. *Srenonis*, *Græff.* *Malpigh.* & ſimilium, qui ſtatuunt, quod id, quod ovarium eſt in *oviparis*, ſint teſtes in *viviparis* & mulieribus, quæ in ſe contineant ova perfecta, humore limpidiſſimo ſcatentia & pelliculis propriis contenta, quæ aquæ immiſſa inſtar albuminis condensentur: quæ ovula à  $\nabla$ . genitali maris, per quoddam contagium fœcundante penetrentur & in motum



concitentur; ut hic . nil conferat, nisi ut dictum ovulum excitet in motum: In quo motu consistit formationis negotium, determinante hoc plus minus in ipso genitali. Jam verò dictum, ovulum, s. in tuba uterina existens, s. in utero immissum fecundetur, perinde esse. Si prius fit, oritur *concepcio tubaria*; Si posterius ritè ac legitime, *natura consona est concepcio*. Ovulum ita fecundatum tandem successivè effunditur, & pedetentim per uteri membranofam substantiam ex arteriis in ejus cavum destillat, concrefcitque tandem in ovum uterinum Harveanum. Par ratio est, atque oviparis propriè dictis, ubi ovulum in utero delapsum circumvestitur albumine: ova hæc fecundata dum retinentur in utero ad perfectam fœtus formationem, ut tandem ritè formata excludantur, dicuntur esse vivipara; Si verò ante perfectam formationem, dicuntur ovipara: non autem est *essentialis differentia*; prostant enim observationes gallinarum, quæ pullos intra se in Utero exclusos numero 6. vivos pepererunt. Ex hoc doctrina spinosa controversiæ de *partu multiplici & superfætatione* optimè potest explicari, nempe: gemellos & trimellos explicant ova, quæ constant duplici aut triplici vitello, quod observavit *Harveus*: an sit universale, nondum determinatum. Huc observatio *Schwammerdami*, quam allegat *Schræderus* in præfatione de *generatione animalium*, de muliere, quæ mense sexto ex abortu gemellorum interiit, observatis vestigiis s. foraminibus duorum ovorum, juxta se invicem conditis, ut ab invicem separari non potuerint. Ubi etiam observata sunt ova non separatim existentia, sed quod ova ita invicem connexa fuerint. Probabile ergo est, oriri gemellos ex *binis ovis* inter se connexis. Ex his etiam patet natura *superfætationis*, quæ fit, quando una vice fecundatur ovulum, & post aliquot septimanas l. menses de novo fecundatur uterus, qui suo tempore alium fœtum suggerit vitalem. Mas ergo saltem confert *genitalem* in crassa substantia, quæ semen dicitur; substantiâ feminis penitus extra uterum delabente.

## LOCHIA.

Cæterum subindè sunt mulieres, quibus licèt post fœtum sequatur secundina, nihilominus tamen post 8. 10. l. 14. dies à partu, superveniunt horrores, cum *gravi æstu*, c. doloribus *dorsi & region. hypogastrij*, uno nomine, cum doloribus *partus* redeuntibus. Hoc si fiat, certum signum est, l. esse *sanguinem grumosum* in utero, ex defectu *lochiorum* non ritè evacuatorum; l. tales mulieres emittunt, impetu facto, *copiosas aquas limpidas*, quod vocant non incongruè *das Mutter*. Rult: observatur etiam subindè aliquid *mole* simile, *aquosum* in membrana contentum, quod post partum remanet, & stimulando novos dolores infert, non cessantes, nisi sit rejectum. Quando ita in partu separatur *secundina*, in toto hoc labore *copiosus sanguis* evacuat per Uterum, ita ut subindè plus, subindè minus evacuetur, pro circumstantiarum varietate. Effluit *sanguis* continuò, in

in quibusdam  
fluit liquor a  
superveniunt  
dies, in quibus  
liqua materia  
lant, l. parci  
chia; Et qu  
loca crebri  
lires quæ la  
sed materia  
tur in mate  
autem fuit  
uterum m  
uterum fu  
non semper  
sanguinea  
3. p. 186.  
tur muliere  
refert histo  
dies (4. l. 5).  
quæ prodi  
vit, & ob  
cit. 58.

Lochia.

æstat. 2. C  
Propter gra  
lia, quibus  
petus, & c  
riente, qu  
dem fami  
hinc mam  
sum, l. ad  
nentia ad  
ordinari  
superveni  
est difficul  
inferiora  
PR



in quibusdam diutius, in quibusdam brevius, ordinariè ad 3. 4. dies : post effluit liquor aquosus sanguine saltem tinctus, quod fit usque ad dies 6. 7. hinc superveniunt excreta mucilaginosa, viscida, glutinosa, quod fit ad 10. aut 14. dies, in quibusdam ad 3. septimanas. Jam verò variat copia & sanguinis & reliqua materia, duplici ex causa: Nam qui 1. in partu copiosum sanguinem stillant, l. parciorem habent mensium fluxum, etiam parcius solent purgari, per lochia; Et quibus, durante gestationis tempore l. per uterum, l. per nares, l. alia loca crebrior fuit facta sanguinis excretio, iis parum sanguinis evacuatur. 2. Mulieres quæ lactant & lactare volunt, in talibus post sanguinis excretionem parum, sed materia serosa aut lactea glutinosa solet evacuari; quia multum absumitur in materiam lactis: quæ verò lactare nolunt, iis uterus evacuatur. Observatum autem fuit, quod, quando incipiunt mammae turgescere & lacte scatere, parum per uterum materia serosa fluxerit: quando verò lac fuit suppressum, copiosa materia per uterum fuit evacuata: ita se res habet naturaliter; sed observandum, quod non semper lochia huiusmodi colorem naturalem obtineant, sed interdum non sanguinea sint, sed flavum saltem habeant colorem, videantur *Miscellan. N. C. ann. 3. p. 186.* ~~vero~~ in Guillelm. f. qui refert, se aliquoties observasse, quod reperiantur mulieres, quæ simpliciter aquosa saltem evacuarint instar veri sanguinis. Sic refert histor. de muliere, quæ 8. dies ante partum sine ullo dolore per aliquot dies (4. l. 5.)  $\text{Zij}$ .  $\nabla$  clarissima evacuaverit, quæ non fuit intra matricem, sed quæ prodiit per vasa quædam colli uterini: post 8. dies peperit, parum evacuavit, & observavit, quod non potuerit commodè incedere. vid. *Harv. exercit. 58.*

*Harv.*

**LOCHIA RETENTA.**

*Lochiorum fluxus* vitatur duplici modo: 1. Quando imminuitur aut cessat. 2. Quando augetur. Prius quod attinet, fit in specie ex duplici causa: (1.) Propter gravia animi pathemata, terrorem, pavorem, tristitiam, metum & similia, quibus solet supprimi sanguinis rapidior motus, & motuum animalium impetus, & consequenter lochia, obs. D. S. R. in muliere fœtum emortuum pariente, quæ ob dolorem & tristitiam nil lochiorum evacuavit. (2.) Causa & quidem familiaris est, quando accedit refrigeratio partium externarum, speciatim uteri, hinc mammarum & pedum; nempe frigus aeris improvise intra uterum immisum, l. admota linteamina frigida tam sicca quam humida, subito sanguinem disponentia ad sui coagulationem & in utero stagnationem. Lochia si fuerint suppressa, ordinariè intumescit abdomen, induratur, graves dolores percipiuntur; puerperis superveniunt rigores & febres periculose, unâ cum anxietatibus præcordiorum; adest difficultas anhelitus, pulsatio temporum, cephalalgia & simil. à sanguinis motu per inferiora impedito.

**PROGNOS.** Res est periculosa, si lochia supprimantur in mulieribus,



idque eò periculosius, si tam pertinaciter supprimantur, ut neque arte possint per uterum evacuari, neque materia per alia loca exitum quærat, vid. Barthol. cent. 3. hist. 19. Miscell. N. C. ann. 2. p. 282.

CURA. Quantum possibile est, præcaveatur suppressio lochiorum fluxus: obtinebitur hoc partim per remedia chirurgica, partim per pharmaciam; Inter remedia chirurgica eminet V. S. In pharmaciam appropriata, menses & fetum pellentia, cum blandis sudoriferis temperata, ut in rapidiorem motum actus sanguis faciliè percurrat uterum. Conveniens autem est, ut secetur vena: quando non sufficienter fluunt, secetur vena in pede, & ibidem pro circumstantiarum varietate, plus l. minus, evacuetur de sanguine. In Gallia & Italia loco hujus adplicant hirudines labiis vulvæ, vid. Deodar. in Valetud. p. 91. si fluant lochia, sed non sufficienter, loco V. S. cucurbitula l. c. l. f. scarificatione suris l. interiori femoris parti adplicari possunt. Quoad remedia pharmaceut. mulieres usurpant Cicer. rubr. decoctum cum rad. petrosel. addito interdum paulo croci, quod propinanti in calido jusculo puerperis, & quidem non incongruè, sed tamen non semper juvat. Conveniunt menses & secundinas pellentia, excellit Myrrha, tam in substantia usurpata, quam Essentia Myrrha cū ꝑ. tinctura s. spiritu vini ꝑrisato. Facit huc Mixtura Timæi experta in partu difficili, secundinis & lochiis retentis. Ea constat ex Myrrha, castoreo, succino & Croco, dilutis in convenienti vehiculo, vid. in casib. pulv. Zedoar. convenit etiam, in specie, si sit conjuncta lochiorum retentio cum dolore post partum. Pellentibus his possunt adnumerari Elixir. Propriet. sine acido paratum, & ꝑ. ci. Si suspicio adest sanguinis grumosi, sperma Ceti cum paucis castoreo est egregium; l. mixtura, quam ingrediuntur oculi 69. ex ꝑ. pro pinati mulieribus: Quæ & sanguinem grumosum resolvunt, & lochiorum fluxum egregiè promovent. Quæ possunt ferre,

ꝑ. flor. chamom. nostr. mss.

Cortic. Cant. sic. ꝑj. coque in s. q. cerevisiæ. Hoc decoctum sumptum est euporiston egregium; potest addi de Myrrha & simil. q. pl. Ego aliquando juvenculam sanam, post partum felicem parum de lochiis expurgantem, cui X. die post varia colluvies effluxit, curavi per Essent. Myrrha c. spir. vini ꝑrisat. parat. d. frustra.

Hinc ꝑ. borrac. Venet. ꝑij.

Myrrh. elect. gr. xiv.

Croci gr. vi. M. pro 2. dosibus.

Sic fuit maxima copia lochiorum & colluviei expurgata s. evacuata, ut necesse fuerit sanguinem denuò suppressere. Ubi non nimis urget malum,

ꝑ. ꝑ. diaphor. ꝑj.

rad. zedoar. ꝑss.

Myrrh. elect. gr. viij.

Cinamom.



Cinamom.

Crocii aa. gr. vj. M. detur in dupl.

Exhibetur in vehiculo cerevisiæ calidæ. Externè illinatur abdomen oleo Cheiri, cui additum sit oleum destillat. succini, juniperi, spica; His calidè inungatur largiter abdomen à regione umbilicali ad regionem pubis. Hoc facto imponatur sacculus calidus, ex absinth. Matricar. Menth. puleg. rad. angel. semin. 4. Carminativ. maj. & simil. Horum duo probè calefacti abdomini, prius isto oleo inuncto imponantur, in specie, si à frigore externo oriatur lochiorum suppressio: Cum his sub muratione stragulorum consultum est, ut in fella perforata fiat suffitus ex bdellio, Myrrh. succino & simil. speciatim ex Colocyth. hujus enim usus egregius, vid. in Casib. Timai pag. 226. juxta hæc conveniunt Clysteres acriores uterum stimulant, injecti, imprimis ubi mulieres laborant suppressione alvi.

### LOCHIORUM FLUXUS NIMIUS.

Contrarium vitium est *uberior lochiorum fluxus*, s. in partu, s. post partum.

*Causa* (1.) est sanguis uberior aut etiam nimis turgescens. (2.) Sanguis fluxilior, serosior,  $\nabla$  sior. (3.) Lesio uteri, imprimis ex placenta avulsa. (4.) Irritatio uteri, l. à sanguine grumoso, l. à frustulis placente l. à mola in utero relicta. Prius quod attinet, in juvenculis plethoricis calidioribus naturaliter uberior effluit sanguis, impr. quæ patiuntur mensium ordinarium fluxum nimium: verum in specie in puerperis, dum insigniter incalescit corpus & sanguis fermentescit; habent pulsum celerem, frequentem, magnum, ubi uberiora effluerunt lochia. Pertinet huc abusus tuosorum nempe vini,  $\nabla$  vite &c. ac fatum pellentium remediorum, à quibus insigniter commovetur M. S. rarefcit, fermentescit, turgescit, & uberiores fluxum per uterum causat. Secundum quod attinet, est, quando sanguis suâ naturâ est serosior,  $\nabla$  sior, ac paulò acrior, quod fit in scorbuto & simil. Tertium est lesio uteri, imprimis per avulsam cum impetu placentam, ut ita vasa uterina lædantur; ubi ex laceratione quasi uteri solet uberior sanguinis fluxus supervenire. Hinc post abortum imprimis solet imminere periculum hæmorrhagiæ nimie; propter avulsam placentam. Quartum est irritatio uteri, à rebus molestis in utero hærentibus. Hæ sunt nunc sanguinis grumi, in utero coerciti, & frustula secundinæ retenta l. mola &c. in utero subsistentia, quæ continuo irritando uterum graviores hæmorrhagias inferunt, ut impossibile sit has sistere, l. easdem sine recidivæ metu compescere, nisi dicta in utero existentia fuerint remota.

PROGNOS. Quemadmodum omnes hæmorrhagiæ sunt periculose; ita mulieribus, quibus copiose fluunt lochia, periculum non leve imminet; quia in partu vires debilitatæ, & M. S. nimis agitata & exhausta easdem plus solet labefactare:



befactare: quin imò periculum est, ne mulieri exindè convulsiones, deliria, & tandem ipsa mors superveniat. Distinctionem faciunt mulieres inter sanguinem, ut dicant uniterm *Hetg. Gebilthe* / &c. quæ distinctio est de nihilo: per *Hetg. Gebilthe* intelligunt sanguinem arteriosum, nam qui effluit post partum, is est ex venis, quod patet ex colore obscuro. Si ergo sanguis intense floridus emanat, reverà indicium est, quòd immediate ex arteriis evacuetur. Iste sanguinis effluxus nimius qui sequitur violentam secundina separationem l. abortum, solet esse periculosior & gravior, quàm qui sequitur partum naturaliter constitutum.

CURA. Habeatur ratio causarum remotarum, quibus sufflaminatis faciliè constabit negotium. Hinc ratione sanguinis l. uberius l. turgescens, impetu facto per uterum emergentis, convenit V.S. in brachio, vid. *Sylvius*. Hinc conveniunt blanda acida sanguinis impetum cohibentia, & eundem mediocriter ad coagulationem disponentia; dum sanguis est serosior & aquosior, mediantibus sudoriferis serum derivetur per loca aliena, ut postea sanguis inspissatus mitis effluat per uterum. Ratione causa tertia conveniunt vulneraria blanda, quæ inter eminent *charesolium*, cuius decoctum inter vulneraria est egregium: quibus addatur *plantago*, *cydoniata* quæcunque &c. In quarto loco, irritato nempe utero, conveniens est, ut ejiciantur hæc ipsa, quo facto cessat nimia uteri hemorrhagia. Cùm verò omnia pellentia simul soleant promoverè lochiorum fluxum, cauti sumus in utendis his ipsis, quin potius temperatura instituat c. aromaticis, v. g. *Sylvius* cap. de lochiorum fluxu laeso habet mixturam ex rad. bistort. herb. majoran. pulegi &c. quâ dicit feliciter se usum esse in hoc casu; (rad. bistort. sumit ℥ij.) In genere tamen in quibuscunque fluxibus conveniunt impr. *Alia* & hinc *Terrea* pluribus scopis satisfaciencia. Eminent lap. hematit. Corall. bolus armen. f. Terra sigillat. & simil. Hæc primatum ducunt in hemorrhagia nimia post partum. Sic fuit mulier quedam, quæ altero die post partum irascitur, ex ira confusis succis & uribus supprimuntur lochia, (erat mulier inclinans ad cachexiam,) quinto & sexto die à suppressione superveniebant graves dolores abdominis, hinc enormis lochiorum fluxus. Causa erant sanguinis grumi, qui in utero coerciti postmodum dolores istos, hinc nimiam hemorrhagiam inferebant: variis tentatis adhibita fuit Mixtura, quæ feliciter operata est:

℞. ∇. tenell. C. C. ℥ij. succ. cydon. recent. ℥j.

corall. rubr. preparat. ℥ss.

laudan. opiat. gr. iß. syrup. cydon. ℥vj. M.

Usurpabatur repetitis vicibus cochleatim, & brevi post lochia suppressa sunt, & sic successivè curata fuit. Liquor ♂. ♂. oris aut Tinctura ♀. vitrioli ritè preparat. in graviore morbo sunt egregia: liquor ♂. ♂. à gr. viii. ad x. Tinctura ♀. vitrioli ad xxx. Conveniunt etiam trochisci de carabe, it. de Terra sigillat. vel per se & in vino austero acidulo l. cum cochleari ♂. In specie conducunt, ubi l.

Lesio

lesio inducta e  
sor. Juxta hæ  
recentium exp  
succus aut syru  
graviore mal  
symphyt. Onis  
ubi alia sunt  
tia, l. sanguin  
ranar. ejusqu  
regioni pub  
ne ori subig  
petatur.  
plantag. por  
mis ubi ful  
mamms qu  
orgasmo,  
frigide app  
sub mammi

Obf. n  
pervenire;  
na uteri, hu  
in ipso abdon  
affligunt ut  
xas. Prior  
irritatus infe  
nitur, & re  
lores simile  
ces.

Caus

nempe l. i.  
tem mola  
fuisse. S  
nimio pul  
bat: Hin  
bant, ut et  
lochiorum f  
perrus dolor  
tum sunt i  
Pars



*lesio* inducta est utero, ex avulsa secundina; l. ubi subest sanguis serosior & aquosior. Juxta hæc egregia sunt *Corallia rubra*, mixta cum succo granatorum acidorum recentium express. Mixture hæc subindè puerperis propinetur. Possunt addi succus aut syrupus portulac. imprim. in acrimonia sanguinis aut utero læso. In graviore malo instar ultimi refugii sit O. cum conserv. rosarum rubrarum, l. rad. symphyt. Onis dos. ℥ss. ad ℥j. in dicta conserva sub forma boli est egregia; sed ubi alia sunt irrita, hisce internis externa blanda l. sanguinem effluentem sistentia, l. sanguinem in utero adstringentia adjungenda sunt: Convenit E. spermaranar. ejusque ∇. c. et ro sarum imprægnata, & spongia eadem imprægnata & regioni pubis applicata; l. fiat cataplasma ex fuligine quod c. et ro sar. & albumine ori subigatur, & regioni lumbari prope os sacrum applicetur, & subindè repetatur. In usu etiam est, ut injectiones adstringentes ex succo aut decocto plantag. portulacæ & simil. in ∇. ferrar. decoct. injiciantur in Uterum, imprimis ubi suspicio adest læsi aut excoriati Vteri. Denique etiam applicentur mammis quædam, si fluunt nimium Lochia, in sanguinis turgescencia & nimio orgasmo, nempe Epithemata ex succo semperviv. o. & ∇. spermat. ranarum frigidè applicata & sæpè reiterata; l. adplicetur cucurbitula c. magna flamma sub mammis, ut sursum concitetur motus sanguinis.

## DOLORES POST PARTUM.

Obf. non confundendos esse dolores varios, qui possunt mulieribus supervenire; propterea, qui forsitan superveniunt orificio uteri externo læso, l. vagina uteri, huc non pertinent propriè, sed iidem dolores, qui affligunt puerperas in ipso abdomine: adeoque dividuntur in veros & nothos. Veri sunt, qui propriè affligunt uterum; nothi, qui affligunt intestina, Mesenterium partesque connexas. Priores quod attinet, oriuntur ex utero l. irritato l. insigniter læso: Vterus irritatus infert dolores, quatenus continuo spasmus convellitur, & se contrahere nititur, & rem irritantem excutere: propterea etiam sunt vagi; dicunt esse dolores similes iis, quos percipiunt in partu, inò interdum sunt maximè atroces.

Causa ergo irritationis uteri & eundem in spasmus concitationis est duplex, nempe l. i. frigus extrinsecus admissum, l. 2. grumus sanguinis, aut secundina, aut ~~tem~~ mola aut simile quid post partum in utero relictum, quod excernendum fuisset. Sic obf. D. S. p. 2. Mulierem, quæ vesperi ante partum vescebat nimio pulmento, cum copiosis flatibus, unde ter aut quater alvum exonerabat: Hinc frigus contrahebat; post pariebat & graves dolores eam vexabant, ut etiam diceret, esse dolores veros. Vel ex hac causa l. alia impeditus lochiorum fluxus aut sanguis grumosis factus graves dolores inferunt, reverà partus dolores, quia sunt iidem. Quod attinet secundum modum, dolores post partum fiunt interdum ex læsione uteri propter violentam avulsionem placenta, & di-



cunt: Sie dürfen den Leib nicht anrühren; quod signum est *lasi uteri*, l. à *placenta impetuose avulsa*, l. *ab excretis variis*, in specie *acrioribus*, post *placentam avulsam* uberius excretis. Qui anosi conjunguntur *dolores*, sunt *graviores*: Hi tamen *dolores* sunt *rariores*; *frequentiores* ratione *frigoris suscepti*, l. *sanguinis grumosi*. His simul adde *status*, qui dant *dolores distendentes*. *Dolores* *notos* quod attinet, sunt *similes* iis *doloribus*, quos patiuntur *mulieres in difficultate mēstruorum*; circa *umbilicum tensiones* percipiunt; *dolores* ad *cor* properant; uno nomine: Sunt *tormenta Colica & Iliaca*, oriunda à dictorum locorum *spasmodis*; qui oriuntur ex *excretis & retentis* ante partum; l. ex *succorum effusione* in intestina, qui ubi *effervescent*, tormina inferunt. Hi facile possunt *discerni*, partim à loco, in *doloribus* enim *veris* loca inferiora affliguntur, partim à dolore; Si enim est *ex utero irritatio*, dicunt: Es sey ihnen / als sollten Sie noch einmal gebären. Si *ex utero laso*, dicunt: Es thue ihnen so schrecklich wehe im Schooße. Si *status* distendunt *uterum*, tunc in specie *lochia* simul *suppressa* sunt. Quidam putant, *dolores* post partum esse *salubres*, quia *promovent lochiorum fluxum*; sed falsò, quia interdum etiam *supprimunt*. Si enim fit *irritatio* s. *exulceratio*, si forte *orificium* se stringat, *lochia* *supprimuntur*, & sic *dolores* fiunt *graviores*.

PROGNOS. Redduntur *mulieres inquietæ*; ad *convulsiones & deliria* disponuntur, imò ex istis *doloribus* universo corpore commoto, occasio suggeritur, ut *febrem* contrahat *mulier periculosa*; *vires* nimis *dejiciuntur*, unde *symptomatis* aliis *ferendis* post *impares* sunt.

CURA. Variat pro *varietate causarum*. Si est *ex frigore suscepto*, conveniunt *fomenta & litas*: Si *ex retentione sanguinis grumosi*, nil melius est *cherefolio*, cujus *decoctum* & *aqua* frequenter assumpta, & *sanguinis grumos* dissolvit, & multis scopis satisfacit: Si verò *ab excoriatione & lésione uteri*, conveniunt quæ *vialiquali vulneraria* conspicua, ut *Corallia*, *blanda Olia*, & *hematites &c.* In genere ad *dolores post partum ex conatu ejiciendi oriundos*, nil melius est *pulvere & secundine humane*. Juxta hæc nobile est *simplex chamomilla*, flor. impr. *chamom.* Román. & hinc etiam *vulgar.* ▽. it. ejusdem & *decoctum* nunc *solitarie*, nunc cum aliis, nec non *Essent. chamom.* cum *oleo destillat. Sapphir.* nobilia sunt. Potest in *decocto chamomill.* assumi *Elixir. propriet.* l. *Essent. Myrrha* dum non rectè fluunt *lochia*. Si *sanguinis grumi* sint in *utero*, prodest *haustum* in *decocto chamom.* *sperma Ceti*. *Mulier* quædam *gravibus doloribus post partum* correpta curabatur *decocto chamomill.* cum *Elixir propriet.* Eminent etiam *cherefolium* l. *solitariè*, l. cum aliis & *parum croci ac macis* usurpatum, hæc enim pluribus scopis satisfaciunt. Juxta hæc est *Zedoaria* ejusque *pulvis* ad ʒß. in *haustu vini calido* assumtus; vel ʒ. *panis butyro illitus & pulv. Zedoar.* largiter adspersus, qui comedatur. Quibus adde *Castoreum*, sem. 4. *Carminat. maj.* & tandem in *gravi malo* parum de *opio*, ubi *lochia* non sunt *suppressa*. Juxta hæc in dolor.



dolor. post partum conveniunt *fomenta* abdomini applicata, ex arte mis. *matricar. puleg. chamomill.* in vino l.  $\nabla$ . decoctis, applica abdomini, l. intincta lintea l. facculi his imprægnati abdomini adplicentur: l. fiat *linimentum* ex *axungia Castorei*, add. *oleum destillat. spica, succini, cumini, angelic.* Si potest mulier ferre odorata, *zibethum* illinatur calidè abdomini, & reiteretur; l. applicetur *emplastrum matric. de Galbano*, malaxetur c. *oleo destillat. chamom.* & insternatur abdomini, l. fiat *Catapl.* tale:

℞. Cepar. IV. coque in f. q.  $\nabla$ . commun. adde  
 flor. chamom. mj.  
 semin. lini contus. Cumin. contus. aa. mj.  
 farin. hord. q. s. c.  $\nabla$ . dict. subige in consistentiam *cataplasmat.*

& calidè insterne abdomini. Si ex inflammatione uteri dolores ortum trahant, optimus est *suffitus* ex NM. Si sunt *nothi*, curantur *clysmatibus carminativis* injectis, uti etiam *zedoaria*.

## TUMOR PUDENDORUM.

*Symptoma* non est rarum, quod in partu l. primo l. difficili affligit puerperas, nempe *tumor pudendorum & inguinum* cum aliqua inflammatione. In tali casu nil melius est *fortu* ex flor. *sambuc. & chamom.* in  $\nabla$ . l. vino coctis: l. ℞. *beccabung.* & contund. c. *floribus chamom.* & instar *cataplasmi*. calidè imponatur pudendis. It. herb. *melilot. c. sem. fœni-græci* in forma fortis est egregia. Fit interdum, ut in partu contendantur, excoerentur ac ledantur pudenda, idque imprimis in partu violento: ubi convenit, si *ol. hyperic. & rosar.* misceantur cum *ovis integris* probè contus. & sub forma *linimenti mollioris* applicentur. Si pudendum contrahit *fissuras*, convenit *Emplastrum* sequens:

℞. balsam. Peruvian. ℥iij.  
 axung. porcin. ℥iij.  
 olei vitellor. ovor. ℥iij.  
 Terebinth. Venet. ℥j. M. redigantur in formam *balsami*, & cum *plumaceolis* imponantur dictis *fissuris*.

## RUPTURA VULVÆ.

Interdum in *primiparis*, l. *angustis* l. in partu difficili l. ubi fœtus est *grandior*, pudendum *rumpitur*, ut vulva & anus fiant unum foramen. Malum grave, quod non ritè tractatum in *gangrenam* degenerat. Contra hanc *rupturam* optima est medendi ratio, ut utrinque labiis vulvæ imponatur *gluten*, quod vid. in *Timei Cas. l. 4. p. 231.* & postmodum anfulis adplicatis & invicem connexis ad se ducantur labia vulvæ ruptæ. Hoc facto intra rimam inspergatur *pulv. rad. Consolid. maj.* qui excipiat *albumine ovi*, & illinatur blandè in locum pudendi, labiis



labiis denuò ad se adductis, l. cum plumeolis immittatur *bals. Peruv.* qui si fuerit acrior, deliniatur cum *albumine ovi* & imponatur cum *bals. q. terebinth.* Curiosus casus est, quem habet *Guilleman.* in l. 3. capit. 7. nempe refert de quadam muliere *rupturam vulvæ* patiente, quæ neglecta cicatricem induxit, ut unum foramen remanserit: Mulier denuò concipit, & altero demum partu fuit curata: nempe eodem modo, quo solent curari *labia leporina*, sc. *abscindendo* (1.) pellem cicatrifatam, post per filum acu transfixum insistit, ut firmitus conjungantur labia; hinc imposuit *balsam. helenii composit.* mediante quo curabatur. *Balsamus* hic est:

℞. Gumm. helenii ℥ij.

Terebinth. Venet. ℥iij.

Ol. hyperic. ℥iiss.

Sanguin. Dracon. Myrrh. aa. ℥j.

liquefiant omnia simul & fiat l. a. *balsamum.*

### LIPOTHYMIA PUERPERARUM.

Imminent quandoque *puerperis* graviores *passiones hysterica* duplici modò: Interdum mox in partu *lipothymia* imminet, ac tum dormire volunt, l. *passiones hysterica* superveniunt; postmodum in cursu puerperii l. solitariae l. conjunctæ aliis morbis. *Præ* si fiat, optimum est, ut utamur saltem  $\Theta$ . quodam *volatil.* v.g. solus  $\omega$ .  $\Theta$   $\times$  *ci c. liquore C. C. succinat.* in vehiculo calido dissipat imminentes *lipothymias*, repetit. aliquoties, donec mulier evadat immunis. Verum si *posterior* sit, nempe *passiones hysterica* complicatæ cum aliis affectionibus, est difficile, partim, quia non potest cognosci, & quia in *cura* respectus habendus est primiparæ: Nempe si aliquot dies à partu superveniunt *suffocationes uteri*, solent saltem conqueri de insigni *anxietate*. Hoc symptoma solet esse frequens mulieribus, quando imminet *puerperium*. Interim tamen in *passione hysterica anxietates præcordiorum* affligunt circa regionem stomachi & præcordiorum; quibus verò imminet *puerperia*, conqueruntur de *difficili anhelitu*; quòd *pectus repletum* sit &c. quòd sit ex alieno sanguinis statu, propter *vitiatam fermentationem*, circa præcordia. Ubi ergo suspicamur, esse complicatam *passionem hysterica* cum imminente morbo acuto, sumus cauti in remed. *volatil.* exhibitione, quia non semper eadem ferunt *morbi acuti*: saltem ergo *temperata* ex Myrrh. Castor.  $\ominus$  *ib. fixis*, ut Card. Ben. & simil. convenient, ut partim *passioni hysterica*, partim *morbo acuto* succurramus.

### DIARRHOEA PUERPERARUM.

In hac duæ circumstantiæ sunt considerandæ: (1.) an ritè fluant l. fluxerint *lochia*; (2.) an adjunctus sit *morbus acutus, malignus*? In utroque statu acutus sit Medicus: Si superveniat *diarrhœa*, *lochiis rectè fluentibus*, sistenda venit,



in specie blandis sudoriferis, & stypticis compescenda: Si verò l. non manant, l. planè non, l. non sufficienter fluxerunt, relinquenda. Testantur enim observationes, quòd loco lochiorum interdum superveniat diarrhoea, quæ loco lochiorum fuit salutaris: Exemplum præstabit Barthol. cent. 3. hist. 9. cum ergò interdum lochia per diarrhoeam soleant evacuari, propterea ubi lochia l. non, l. non sufficienter fluunt, non statim supprimenda est; Si verò est conjuncta cum morbo acuto, efflorescentiis cutaneis, &c. est periculosa: propterea venit curanda per sudorifera fixa; per hæc enim ejiciuntur recrementa, causa diarrhoeæ. Conveniunt ergò C. C. ustum, Terra sigill. Magist. Corall. cum succo citri, quibus addendum est non nihil de laudano opiato, sic enim prohibetur causa motus, & causa ipsa evacuatur: styptica verò fluxum sistunt, & diarrhoeam compescunt.

### INCONTINENTIA URINÆ PUERPERARUM.

Sævissimum symptoma est, si partes lædantur in partu, ita ut lædatur sphincter vesicæ, ut non possit cohibere urinam; exindè enim excoriantur & ulcerantur pudenda & femur. Malum est difficile curatu. Recens curari potest per injectiones vulnerarias, linimenta & similia: verum notetur, quod observavit Heur. ab Heer obs. 14. & Boyle in philos. experimental. p. 116. quòd calcinati bufones vivi (calcinantur in olla recenti & nova) appensi, ut immineant regioni stomachi, malum hoc sistant & compescant: Certum enim est, quòd inveteratum malum fere incurabile sit, nisi forsàn thermæ aliquid conferant. Sphincter enim læsus sic cicatricem contrahit, ut vix curari possit malum, quod facile contrahunt quando obstetrices signaræ l. incautæ unguibus dilacerant sphincterem vesicæ.

### DE SUPPRESSIONE URINÆ PUERPERARUM.

Oritur à sanguinis grumis l. in vagina l. in aliis locis hærentibus, & urinæ fluxum impredientibus: præter interna l. sanguinem grumosum dissolventia usurpentur clysmata acriora, externè oleum scorpionum &c. Conqueruntur etiam puerperæ de vagis acutis doloribus post partum, ubi sufficit unguentum ex spermate Ceti c. oleo Nuc. express. cera & paucis croco mixt. in consistent. Ungu. l. Emplastr. calidè abdomini applicandi.

### FEBRIS LACTEA.

Quod attinet febres puerperarum, & morbos acutos, l. communes sunt omnibus puerperis, l. propriæ: communis est febris lactea, quando mulie-



mulieribus lac transfertur ad mammas, & ibi uberius congeritur, supervenit æstus, donec per blandum sudorem terminetur.

Sæpiissime à die tertio l. quarto supervenit, & die nono sudore finitur. Observa tamen, quòd hæc febris lactea pro subiecti varietate & circumstantiarum variare soleat; Ut febris lactea demum septimo die superveniat. Obs. & Dn. Pr. supervenisse die nono: nihilominus tamen hæc febris raro sub curam Medici venit. Attam. optimum est, ut sudor blandè promoveatur, & lochia stimulentur v. gr.

R. ꝑ. diaphor. ꝑij. l. ʒj.

Myrrh. ꝑss. M. F. pro 2. dof. pulv. & propin. ægræ:

Beneficium enim *sudoris & lochiorum fluxus* solent compescere *febrem lacteam*. Si verò hæc febre ingruente desint, simul angustia præcordiorum & difficilis respiratio oboritur, quia tunc uberius lac turgescit in sanguine: utilis est emulsio c. ꝑ. diaph. v. g. ex sem. C. B. napi cum Myrrha, sic enim facile evanescit. Plura quæ ad eam pertinent, sunt explicata à *Williso de febribus*, qui in hoc puncto optimus est.

#### MORBI ACUTI PUERP.

Quod attinet *febres acutas* puerperarum, ut pl. sunt *malignæ*, unde pluribus cum reliquis febribus malignis conveniunt, imprimis quoad excretionem cutaneas. In omnibus tamen febribus acutis puerperarum respiciendum est ad duo. (1.) Ad lochiorum fluxum, qualis & quantus fuerit. (2.) Ad primas vias & succorum ibidem scaturiginem, horumque ibi factam commistionem & ejectionem ex pancreate, chole docho, & glandulis Mesenterii in & post labores partus. Cum enim ex mensibus suppressis hi succi alterentur, indeque varia pathemata circa primas vias oriri soleant, ob id circa partum esse hos succos commotos observandum est, qualia symptomata post partum inferant, an passionem hystericam, an alia pathemata; ad hæc duo imprimis respiciendum est, in morbis malignis puerperarum; Febres ergò hæc superveniunt puerperis ex c. aut dum rectè fluunt lochia, aut dum p. n. sunt suppressa, aut dum naturaliter non amplius fluunt seu rite fluxerunt. Si *supprimuntur*, immediatè febrilia symptomata superveniunt, unde primum erit, ut revocetur lochiorum fluxus per v. s. in toto administratam, & remedia interna, lochia *promoveant*, corpusque ad diaphoresin *disponentia*. Si verò non amplius fluunt, rectè autem fluxerint, hæc febres malignæ non secus ac aliæ cum excretionibus cutaneis curandæ sunt, & quidè cum sint ferè semper malignæ, impr. quæ superveniunt ritè factæ purgationi per uterum, ita ut in talibus malignis in sudoris legitima provocatione primum curationis punctum consistat; tunc *cautus sit Medicus*, ne nimis sudorem promovendo, lochiorum fluxum sistat; dum enim superveniunt tales febres, convenire solent lochia. *Sicuti etiam caveat, ne dum lochia fluunt ordinariò,*

hoc



hoc ipso malignitati derur accessus ad interiora, quia quæcunque sanguinis evacuationes in febribus malignis sunt periculosæ unde cum dictæ febres impr. & frequentissime per excretiones cutaneas s. petechiales s. pustulares s. miliares salubri naturæ conatu mitigari observentur, observet Medicus, ne lochiorum fluxu hunc naturæ conatum impediatur, propterea inter remedia primatum obtinent, quæ & blandâ diaphoresi fermentum malignum remonent, & conatum excretorium naturæ promovent, simul tamen stimulo æqualem lochiorum fluxum conservant, ne diaphoresi supprimantur. Si tamen fluant nimio, addantur talia, quæ blandâ vi adstrictoriâ lochiorum fluxum nimium sistant. Cum his ergo stimulantia addenda sunt, ubi lochia sunt suppressa, ubi excellit Myrrha: ubi autem fluunt, adstringentia ut Terra sigillat. & C. C. ustum: si verò in tali febre penitus supprimantur lochia, necesse est, ut fortius & copiosius ludor moveatur. Remedia ergo ex C. C. item fixa ex Gnio, hinc Myrrhata, ac succinata, primatum obtinent, c. c. f.  $\Delta$ . præparat. l. c. c. Ore, his adde præter G. m. alia diaph. Nota impr. Cinnabarim Gnii rite præparat. quæ in puerperarum morbis malignis maxime proficua: de  $\Theta$ . volat. succini, &  $\Theta$ . volat. c. c. autem mixtis & additis fixioribus in pauca quantitate, res nota est.

*Purgationes* quæcunque cautissime instituendæ, quin potius omnino vitandæ; Cum etiam clysterum applicatio in hisce febribus cum excretionibus cutaneis conjunctis observata fuerit periculosa: unde Medicus mox in principio puerperii secundo, tertio die, ubi suspicio est imminere morbum malignum, primas vias eluat, v. g. pilul. pestil. Ruffi.

Et V. S. ubi rectè fluunt l. fluxerunt lochia, est nociva, lochiis v. mox in principio suppressis, si superveniat febris maligna, consideret Medicus habitum ægræ; In plethoricis, sanguineis juveniculis subinde necesse est, ut promoveantur lochia V. S. in talo, & impetus sanguinis inferiora versus concitetur; applicentur utero emollientia, ac stimulantia externè. Si graviter affligat malum & corpus sit succolentum, subinde præmittatur V. S. in brachio, cui subjungatur liberior sanguinis emissio in talo; ubi saltem in partu aut à partu lochia fluxerint, à V. S. ne superfedere debet Medicus. Si vero lochia suppressa inferant febres, benignas, arduas, comitatas cum pleuritide & angustis, præmissa V. S. in pede mox usurpentur, quæ sanguinis grumos promptè dissolvunt, & effuso sudore sanguinem stagnantem in debitum circuitum revocare possunt, subindè lochia stimulantia, ut Myrrh. Castor. sperma Ceti subjienda sunt. Ad sitim tollendam in febribus acutis acida nimia non bene conveniunt, quia periculum hic est, ne refluxum lochiorum sistant, simulque acida utero membranoso & læso sint hostilia, potius ergo temperata sub. acida, in casu majoris æstus.  $\Phi$ . dulc. infusa blanda acida sunt convenientissima v. g. in febribus malign. puerperarum.

g. c. c. f.  $\Delta$ . 38. Cinnabar

Gnii



℞nii diaph. Cinnabar. ℞nii rit. par. an. gr. XIV.

Myrrh. elect. gr. XII. M. S. pro 2. dof.

propina in quocunque vehiculo aut ubi suspicio adest angustiae praecordiorum, in hystericeis, ut ∇. hirundinum. c. Castor. sic etiam siti nimia.

℞. flor. viol. cyani, aquileg. aa. m℞. infund. in f. q. ∇. car-  
duiben. aciduletur c. paucis. qris, stent in loco tepido ad extractionem tin-  
cturæ, tunc ℞. colat. add. syrupum berberum, de scord. artemis. q. f. ad suavem  
& nonnihil dulcem saporem, qui nec nimis acidus nec nimis dulcis sit.

### PURPURA PUERPERAR.

Speciatim ex omnibus ferè apud nos pessimæ notæ est febris purpura mu-  
lierum. Hæc est maligna, quæ tamen radicem quodammodo ac fomitem ac-  
quirit ex scorbuto, quia unâ cum reliquis remediis etiam remedia antiscorbuti-  
ca permixta usurpata promovent insigniter purpuræ eruptionem; sc. ad instar  
Variolarum, *duplicita tempora* observanda sunt in purpura, (1.) tempus ebulli-  
tionis (2.) tempus excretionis. In tempore ebullitionis conveniunt remedia effe-  
rescentes humores compescentia & blanda diaphoretica, quibus l. Myrrha, l. parum  
de sale volat. addendum, postmodum, ubi imminet tempus excretionis, simpliciter  
expulsiva conveniunt, v. g. in principio morbi conveniunt C. C. ☉ re, bezoard. Mi-  
neral. quæcunque cinnabarin. ℞nium, ☉. volat. C. C. ex succino admixta & in par-  
vadosi exhibita, cum istis partibus conveniunt etiam ☉ ia fixa vegetab. ut car-  
duiben. v. g.

℞. C. C. ☉ris ℞j.

bezoard. miner. Cinnabar. ℞nii aa. ℞℞.

☉. volat. C. C. & succin. aa. gr. ij. l. iij.

M. f. pulv. pro 2. dof. per est egregius.

In progressu purpuræ egregia est Tinct. Corall. antiscorbutica, optimè expellit, gr.  
XXX. l. XL. loco hujus prodest seq. mixtura.

℞. ∇. scord. scorzon. an. ℞℞.

☉. Cochlear. ℞j. ad ℞℞.

Magist. Corall. c. succ. Citri.

☉. diaph. aa. ℞℞.

syrup. de scord. l. d. Calend. ℞vj. M.

cape subinde cochleatim.

Ubi incipit apparere, conveniunt emulsiones ex sem. C. B. napi, aquileg. Citri & si-  
mil. l. Myrrha pro ratione lochiorum, nam hæc Emulsiones potenter expellunt.

Observa, ut etiam puerpera calidissime tractetur, quia tantillus halitus frigi-  
dus facit retrocedere omnem purpuram. Unde subito difficultas respirationis,  
anxietates praecordiorum, jectigationes, diarrhæa, & similia superveniunt, speciatim  
in

in purpura al  
continuentur

Præsupp  
non fieri per  
præsupponit  
per quandam  
chylosum cu  
f. fermenti g  
priâ acidul  
teria lactis.  
pitatur gru  
tum proba  
qui defera  
tempore p  
ficuti 3. l. 4  
præbendun  
& ejus gener  
dat, 3. qua  
in defectu  
teria in his  
entibus; I  
purgari per  
nimis sudan  
violæ qua  
nimis ad tri  
angusta.  
do ad motu  
ra impedit  
magis fec  
sunt, subtr  
violosum l  
PRO  
chia, sed f  
CUR  
ternis app  
& externis  
ter interna  
ebull. in M  
Pars



in purpura alba. Si incipit prurire purpura, & sub forma squamarum decedit, continentur remedia antiscorbutica: sic etiam curantur reliquæ purpuræ.

## LACTIS DEFECTUS.

Præsupponitur hic, materiam lactis esse chylum, & motum materiæ ad mammas non fieri per vias singulares, sed mediante sanguine arterioso per arterias, sicuti præsupponitur modum generandi lactis fieri partim per transcolationem, partim per quandam in glandulis mammarum præcipationem: Quando nempe ferum chylosum cum sanguine eò distributum ibidem beneficio certæ quasi tincturæ s. fermenti glandularum mammarum secernitur, & à lymphæ glandularum propriâ acidula ex fero præcipitatur, & quodammodo disponitur chylus pro materia lactis. Probat, quia ex fero, beneficio ejusdem tincturæ acidæ præcipitatur grumus lacteus, unde blandum acidum in dictis glandulis unâ elaboratum probabile est præcipitare ex fero dictum chylum, & eum condensare in lac, qui deferatur tandem ad papillas. Notum ergo est, quod mulieres brevi à partu tempore percipiant motum materiæ ad mammas ita, ut primum lac sit visius, sicuti 3. l. 4to die cum febre lactea propriè dictum lac generari solet. Lac istud præbendum est infanti, quod est alimentum medicamentosum. In specie circa lac & ejus generationem tria vitia consideranda sunt: 1. quando deficit 2. quando abundat, 3. quando depravatur in mammis & corrumpitur. Quoad primum, deficit in defectu materiæ ex qua, l. vitio mammarum, in specie glandularum. Deficit materia in his, quæ sunt nimis macilentæ, hinc deficit lac defectu materiæ in febrientibus; It. parçè vel planè nihil alimenti assumentibus. It. quæ solent uberius purgari per lochia; quibus uberius mammarum materia candida serosa: quæ nimis sudant, & minus bibunt &c. Mammarum vitium est, quando glandulæ sunt vitiosæ; quarum primum vitium est, quando sunt scirrhosæ & indurata, l. quando nimis adstrictæ, minus porosæ, & poris arctis constantes, unde viæ sunt nimis angustæ. Fit hoc arte, quando virgines tensius pectus constringunt, aut quando ad motus externos mammarum augmentum, & glandularum debita structura impeditur in pubertatis annis; accedit infans minus aptus suctui, nam quo magis fortis fugit, eò major copia lactis accersitur; si ipsæ marmæ in culpa sunt, subtile istud acidum, quod chylum in mammis præcipitando coagulat, si vitiosum sit, causa est supervenientis lactis defectus.

PROGNOS. Nullum incommodum matri inferitur, modò rite fluant lochia, sed saltem infanti, quia non potest rite nutrir.

CURA. In hoc defectu lactis ante omnia observandum est, ut primò internis appropriatis lactis proventus acceleretur, exhibendo victum *εὐχυνος*, & externis emollientibus mammas irritantibus lactis fluxus promoveatur. Inter interna ergo eminent flor. sambuci in lacte cocti, nempe R. flor. Sambuci mj. ebull. in Mens. lactis vaccini, colaturam bibat calidè nutritrix, & sic ubertim lac



supervenire solet; post morbos acutos lactis fluxum promovet, sed cautè fiat. It. hinc eminent *fœniculum* & hinc *anifum*, eorumque decocta: unde decoctum sem. fœnicul. & summitatum ejus experimentum est *Am. Lusitan.* Hæc enim & ex his olea destillata proficua sunt, quia lac generant, & simul etiam lac medicamentosum reddunt: *Kerkyng.* observavit, quod nutrix lactescens fœtum, assumserit oleum destillat. anisi, unde fœtus emisit crepitus ventris anisi odorem referentes. It. hinc in usu sunt *crystall. lac* D. quæ egregie conducunt; *species diacrystalli Mynsichti*, l. fiat pulv.

R. Lac D. ℞j.

crystall. preparat. ℞j.

ol. destillat. anis. fœnicul. anagt. 17. M. f. pulv. pro 2. l. 3. dof.

Capiat in brodio gallin. l. in brodio decoctionis fœniculi.

Externè usurpentur partim emollientia mammas, partim irritantia & lac promoventia, unde in usu sunt fomenta ex dictis emollientibus, quo facto fricentur mammae moderatè cum pannis asperis, ut probè incalescant, ut ita mediante sanguine uberius affluente promoveatur uberior lactis proventus.

### LACTIS REDUNDANTIA.

Fir hoc l. absolutè l. respectivè; *Absolutè*, quando mulieres ~~con~~ lactantes plus lactis conferunt, quàm fœtus exfugere potest. *Respectivè*, quando lactare nolunt, & ita lac in mamis colligitur. *Causæ remotæ* investigandæ sunt in uberiori alimento assumpto, hinc in laudabili digestionem stomachi, hinc mammarum laxitate & mollietie glandularum copiosarum & melioris consistentiæ, & in specie volatili acido præcipitante lac ex M. S. Saltem hic *seqq. observanda sunt.* (1.) Fit interdum, ut dum lac uberius ad mammas affluit, mulieres patiantur dolores sub axillis, quod obs. Dn. Autor in juvene succi plena. (2.) Notandum est, mulieres interdum, quatenus l. lac promptè l. uberius affluit ad mammas, l. quod jam copiosum in mamis est, percipere dolorem gravativum in dorso, obs. Dn. Autor: hinc non solum in mulieribus lactantibus, sed etiam habilibioribus, quibus in medio gestationis tempore lac in mamis apparuit, qui tamen dolores evanuerunt, ubi lacti patuit exitus per mammas.

PROGNOS. Malum non est per se in mamis, sed benignum naturæ beneficium; Si tamen uberius congeratur quàm l. fœtus exfugit, l. quàm lactare non vult, metus est, ne lac corrumpatur, coaguletur, & hinc scirrhos, scrophulas & abscessus mammarum inferat, minus tamen adest periculum quando uberius fluunt lochia.

CURA. Duo scopi observandi sunt: (1.) nimius lactis proventus tam in quàm externis præcavendus. (2.) Genitum lac l. medicamentis sudoriferis l. per papillas removendum, quod posterius, uti dictum, obtinemus per sudorifera, mediantibus quibus etiam promovetur lochiorum excretio. Pro his scopis obtinendis



nendis externa parcius usurpari solent, in genere ea, quæ ad abundantiam feminis extinguendam in gonorrhœa in usum sunt. Convenit ergo vitex ejusque semen, Coriandrum, Myrrha & Myrrhara: de Mentha res dubia est: Quidam dicunt, lac inhibere, quidam generare. Externa potius conveniunt ad lactis copiam inhibendam. Conveniunt ergo decoctum Cumini in aceto l. Cuminum in pulverem contusum cum aceto in forma Cataplasmat. calidi. Isti foris, si addatur parum Onis, erunt efficaces, convenit verò in specie hoc:

℞. rad. apii ℥ij.

sem. Cumini,

Coriand. aa. ℥ss. ad 1.

Coque in Vetro vino, adde parum ℞ti. Decoctum c. linteis multiplicibus calidè applicetur mammis: Eminent Cicuta & mentha, l. recenter contusa, mammis imposita, l. ex his paratum decoctum mammis impositum. Mulieres nostræ accipiunt alfinam, eamque contusam & conquassatam mammis imponunt: ℞. nempe fol. brassic. capitat. & huic imponunt alfinam contusam, & calidè admovent mammis crebrius repetendo. De cætero experimentum est sympatheticum, si mulieres lac emulgent in carbones candentes l. in ferrum candefactum, sic enim aliquoties omne lac evanuit. Traditio est, si mus lac gustavie, mammas steriles reddi, quoniam non semper succedit. Si lac genitum sit, ut removeatur ex mammis, optimus est blandus sudor continuatus; pro excretionem per papillas optimum etiam est, ut imponatur Emplastr. de spermate ceti Myns. ut integras mammas regat. Ut præcaveatur lac à sui coagulatione, supra dictum Emplastrum imponatur, & sacculi ex coryza l. milio l. hordeo contuso: fiant nempe sacculi pollicis crassitie, ijque interpassati probè calefacti imponantur dicto Emplastro crebrius repetendo, toties nempe quoties calor remittit; sic lac fluidum manet, & sponte per papillas emanat.

### COAGULATIO LACTIS.

Variis modis corrumpi aut vitari potest lac, præprimis tamen familiarissimum & nocentissimum vitium est, quando in mammis coagulatur & in grumos ac caseosationem secedit. Jam verò coagulatio fit (1.) occasione acidi assumti, l. in lacte geniti: Acida assumpta, in specie austera, si copiosius ingerantur l. applicentur externè, lac coagulare valent, præ cæteris tamen à causa externa originem ducit, nempe coagulatur lac nunc subito in animi affectibus, nunc pedetentim, si diutius coercetur in mammis. In animi pathematis mulieres ex terrore subitaneo mox percipiunt lactis grumos in mammis; Si iracundiâ sint affectæ, lactis coagulationem & Erysipelas contrahunt. Pedetentim coagulatur, quando lac diutius in mammis coercetur; sic enim retentum tepore loci alteratur, alteratum acorem contrahit & seipsum coagulat; promptè etiam coagulatur, quia occultum gerit & dum in se ipso, & præterea in glandulis mammarum à lymphâ & da imprægnatur. His si accedit & ruum detectus,



ex motu eorum in animi pathematibus perturbato, facillimè ¶ dum fit manifestum, & cogit lac in grumos. Sed aliud est durities mammarum à lacte nimio mammas distendente: aliud lac coagulatum, in mammis. Ordinariò in puerperio, quando tertio l. quarto die lac deferitur ad mammas, mammae durissimæ apparent, sed tunc sunt æqualiter duræ; verum quando lac coagulatum est in mammis, mammae inæqualiter tument: nempe percipitur in quodam loco tumor durus factus, renitens, qui nunc est simplex, nunc duplex, nunc triplex: Basis est super glandula lacte circumfessa. Tumor hic in principio est sine dolore, utut successive dolorosus evadat, nempe ex lactis coagulatione. Tres sunt modi evacuandi, aut successive emollitum disparet, aut superveniente inflammatione, beneficio abscessus evacuatúr, l. tertio tandem promptè induratur & in scirrhum abit: familiare est, ut superveniat huic tumori inflammatio mammarum, in loco grumi coagulati.

CURA. Ubi adest suspicio l. præsentia lactis in mammis coagulati, opera danda, ut lac nondum concretum maturè removeatur, lac dissolvatur, & resolutum emulgeatur. Unde subito, quando puerperæ percipiunt sibi nasci tumorem in mammis, emulgent, ne lac coaguletur, l. si non possunt lac emulgere, lac exfugere permittunt. Hoc facto propina interne sudorifera, speciatim *salia volatilia*, quæ per sudorem & vi salinà grumos lactis coagulatos dissolvunt: principatúr ¶. ☉. \*ci probè rectificatus dos. ʒj. imponendo sudorem largum, gerit. Et si recte sudant, mox sensibile levamen in mammis percipiunt, tam in lactis coagulatione, quàm m. si supervenit inflammatio. Ubi sudaverunt, mox in principio, ad dissolvendos lactis grumos, *Emplastr.* seq. imponi potest:

℞. Empl. de Galban. Crocat. Mynsicht.

Gumm. ammoniac. in ✕ solut. aa. liquefacta induc super linteam crassum (*Barchen*) ut integram mammam obtēgat, transcendendo foramen pro papilla; post applicetur calidè mammae, & imponentur sacculi fervidi jam dicti, & mulier disponatur ad sudorem, sic lac successive evanescit; sed necesse est, ut fiat in principio, si enim per biduum aut triduum lac coagulatum in mammis hæserit, frustra est ut dissolvantur grumi, & insensibiliter dispareant. It. hinc in usu est, ut ad lactis grumos dissolvendos *ruta & mentha*, contusæ & calidè mammis imponentur: Quidam commendant decoctum *chelidonii majoris* in forma foveæ impositum: Verum hæc saltem juvant in principio. Hinc l. supervenit inflammatio mammarum l. gangræna l. induratur in scirrhum.

#### INFLAMMATIO MAMMARUM.

Observandum est in genere monitum *Amat. Lusitan. m. c. 1. 49.* quod mamma affecta rarò ad sanitatem perducatur, nisi altera sana exhaustiatur, quia dum lac fluit ad unam mammam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur.

tur. Observ. m.  
ex altera etiam  
cognoscitur;  
si percipiatur  
suppuratione  
tumorem infla-  
tur suppurati-  
onem acorem  
est curatio p-  
tumida bis l-  
lius est, si ac-  
imponatur  
dium dolo-  
imponatur  
rat abscessu  
apparet, di-  
rum est, co-  
pro promov-  
tum lacte, &  
verò suspici-  
& cessare f-  
pari potest

Omnia co-  
dum mun-  
dum dege-  
oleum mon-  
still. in ab-  
fectu huj-  
destill. &  
tem facien-  
etiam ab E-  
ma. spon-  
Erysipelat-  
bet, calet,



tur. Observ. m. quod in muliere lacte abundante, si fœtus mammam unam fugit, ex alterâ etiam lac ploret l. stillet. Quando ergo supervenit inflammatiō, facillè cognoscitur; fit rubicunda, & in medio sui sensus pulsationis percipitur. Hæc si percipiantur, certum signum est, properare tumorem ad inflammationem, & suppurationem. Hic frustra est omnis conatus discutiendi grumos lactis & tumorem inflammativum. Jam verò ut maturetur inflammatiō & promoveatur suppuratio, internè propinetur *pulv. ex ocul. 69. sale carduiben. & Myrrh.* (quæ nimium a corem in primis viis absorbent & destruunt.) Si mulier *suder*, interdum est curatio prospera. Externè optimum est pro maturando abscessu, ut māmā tumida bis l. ter quotidie illinatur *ci c. Calc. viva, & Spir. vini parato*, melius est, si addatur *crocus & Caryophyll. &c.* Hic calidè mammis illinatur & imponatur supra laudatum Emplastrum, sic suppuratur abscessus, ut ne dimidium doloris percipiant, quàm alias sentirent; l. illinatur mamma isto *u*, & imponatur desuper Emplastr. diachylon c. gummat. Sic pedetentim suppurat abscessus, nam successivè in quodam loco levius emergit *tuberculum*, quod si apparet, digito contingendum est, an sub eo omnia sint molliora: nam si durum est, continuentur remedia, sin verò molle, aperiendum est cultello. Aliàs pro promovenda suppuratione in usu est, ut imponatur Emplastr. *ex mica panis cum lacte, & medulla panis cum succo apii* imprægnata, sed faciunt dolores: Sin verò suspicio supervenientis inflammationis absit, interdum dissolvitur coagulum & cessare facit inflammationem; Loco horum etiam tale Emplastr. usurpari potest.

*℞. rad. Ireos.*

*cepar. ad ignem assat. aa. ℥iij.*

*ferment. ℥ij.*

*vitell. ovi numero iij.*

*axung. porcin. recent. sin. ̄ e.*

*Ol. rosar. farinæ fabarum, sem. lini aa. ℥j.*

Omnia contusa redigantur in formam cataplasmatiss, factus abscessus postmodum mundificetur, partim ut grumi foras eliciantur, partim ne in ulcus fœtidum degenerent: pro his comendatur *externè Emplastr. diachylon. composit.* It. *oleum momord.* per infus. (infund. *poma momord. rubicunda*) blandâ manu infill. in abscessum, quod oleū est admirabile in abscessibus & ulceribus; in defectu hujus sumitur *balsamus q. c. ol. papav. l. amygd. dulc. l. nobilitatus c. oleo destill. & l. solus, l. si acrior fuerit, mixtus cum vitello ovi applic.* *Distinctio autem facienda* est ab inflammatione māmārum, quæ ab alia causâ supervenit, & etiam ab Erysipelate. Puerperæ terrefactæ subinde incurrunt Erysipelas mammæ l. sponte horrore correptæ, postea gravem æstum incurrunt, ubi mamma Erysipelate tangitur. Erysipelas mammæ hæc post se exhibet, mamma rubet, calet, coccineo colore tincta est, & dolores lancinantes & pungentes in



eius superficie percipiuntur. Lac emulgeatur, internè verò, dum calor durat, propinentur remedia diaphoretica fixa, in specie alcalia v.g. ꝑ. diaph. c. ꝑ. c. B. vel

ꝑ. C. C. S. Δ. ꝑj.

Θ. card. B. ꝑß. M. D. expellatur sudor,

Sub quo mamma linteis calidis probè integatur, ut sudor erumpat; Hoc facto, si levius fuerit Erysipelas, fiant sacculi ex fl. sambuci, qui interpassati irrorentur largiter spiritu vini probè rectificato, & suffumigetur pulvere succini & thuris & calide applic. aliquoties repetendo. Si verò gravius fuerit malum optimum est, ut ꝑ. Theriaca & misceatur cum paucis Θ. absinth. nempe

ꝑ. Theriac. ꝑß.

Θ. absinth. ꝑß.

quæ mixt. in forma emplastr. calidè mammis applic. Loco horum est egregium seq. ꝑ. rob. sambuci, quod inducatur linteum, & calidissimè imponatur marmæ, omnique hora repetatur: Superstitio est, quod horrentalia humida in usu: Pulv. ad erysipelas Myns. imprægnatus vini tartarifato, si calidè mammis adspargatur, & imponatur l. linteum l. sacculus ex floribus sambuci & chamom. mulierque blandè fudet, aut madeat, confert. Si verò ex aliis causis in l. extra puerperium superveniat inflammatio marmæ, scopus est primus dissolvendi inflammationem quantocyus: Si hoc fieri non potest, perducatur ad suppurationem. Ad discutiendum accipiat papyrus cærulea propè calorem, qui est ex lebetæ, melle virgineo probè illita, & calidè imponatur. Si verò fuerit inflammatio gravior, fiat Cataplasma ex farinis, v.g. ex farina fabarum, lupinorum & lenr. coctis c. ▽. & ✕. & c. album. ovi paucis infus. in forma Cataplasmi. imponatur mammis, vid. River. cent. 4. obs. 74. Amat. Lusit. c. 2. c. 24. Alter scopus est, ut grumi resolvantur, ne abeant in scirrhum; scirrhi hi mammarum sunt varii; scirrhus enim mammarum oritur l. à causa manifesta, ut sit indolens l. pedetentim ab interna causa, qui subinde sunt non nihil dolentes, non quod continuò, sed interdum: Scirrhi hi postmodum inclinant ad Cancrū, unde relinquendi sunt, ne exasperentur & crabrones irriterentur: Reliqui verò scirrhi curandi sunt, nempe emollientibus & resolventibus. Ad emolliendum optima sunt remedia ex gummatib. speciatim ex ammoniac. in ✕to soluto vel Galbano, sufficienter prius mamma aceto super lateres calefact. effuso fotā, tunc applicatur cataplasma. Si non suffecerit, usurpa Emplastrum Coleri.

ꝑ. dia chylon. magn.

de Meliloto.

Ceronei aa. ꝑj.

Gumm. ✕cum in ✕. sol. ꝑvj. M. in forma cataplasmatidis impone mammis, donec emolliatur s. evanescat. Tandem Emplast. de ranis Vignon.



gon. c. Grio ad hos tumores scirrhus. non cancrasos optimum est: potest sumi Gri vivi dupla dosis.

## F O E T U S.

Consultum est, ut fœtus ablutus assumat l. pauxillum olei amygdal. dul. solum, l. cum saccharo penidio: l. Syrup. de Cichoreo & Rhabarb. ut mediantibus his probè educatur stomachus & stimuletur fœtus ad vomitum, & secessus, ut mucus stomachi ejiciatur, & meconium emittatur, quia recrementa alias lac ingestum inquinant. Ante XXX. horas non sunt lactandi infantes, sed quò longius post partum esuriunt, eò melius est: Si tamen admovendi sunt, admoveantur mammis matris, ut sugant lac recens, serosum, l. colostrum, nam & hoc blandum est infantum laxativum, ac abstergens sordes primarum viarum, donec tertio l. quarto die superveniente lacte perfecto, etiam hujus nutrimento magis largo sustententur. Qui nutritivum lac per colorem, saporem & odorem &c. examinant, ridiculi sunt, secundum Helm. quia in omnibus variant circumstantiæ digestionis primæ & lactis ipsius: potest nutritrix lue & inquinata lac apparenter optimum habere, & alia sana non; potius ergò consideretur sanitas nutritricis: lactet nutritrix utraq; mammâ, quia aliàs infantes lusciosi fiunt, si saltem unam mammam inspiciant: Sic etiam fœtus non habeat ad latera fenestras aut candelas lucentes. Lactet fœtum mater annuo spacio: Ablactandus postmodum venit impr. sub increment. Dæ tempore vicario inter magnos anni cardines. Jam verò tam sub tempore lactationis, quàm postea infantes variis corripiuntur morbis, qui cum exactè considerantur, ad duos ferè principales causarum fontes referri possunt: Remotè nempe est primus fons retentio excrementorum; (2.) perversa ingestio nutrimentorum: ubi eminet fœcum primarum viarum, & meconii in specie suppressio; & hinc insensibilis transpirationis occlusio; Hic vero imprimis se offerunt vitia lactis & errata pultis. Hæc 4. suggerunt optima generalia affectuum infantum.

RETENTIO EXCREMENTORUM IN  
F O E T U.

Fœces primarum viarum quod attinet, præter ventriculorum variegata recrementa interdum etiam intestina tenuia occupant; in crassioribus verò dura, picea, ex nigro viridescencia, meconium appellata, hospitantur, & omnia hæc à nutritione per os genita sunt. Hæc ipsa verò maturè expurganda sunt, ne diutius retenta aut pertinacem alvi adstrictionem inferant, aut lactis distributionem impediant, aut sub distributione per intestinorum gyros idem corrumpant, & ad cadaverisationem disponant, aut intestinis adherendo & aciditate sua rodendo termina crudelia inferant. Constans omnium Practicorum est sententia, omnium

tormi-



torminum & Epilepsia originem esse ex excrementis retentis; quemadmodum etiam Icterus ipse tertio l. quarto die post partum infantibus superveniens ab illis derivatur: Hinc ipsa natura mox à partu est occupata, ut partim vomitu partim secesu infantes expurget. Præ cæteris Meconium malè audire solet, nam acidum p.n. est, quod in ejus recessu peccat. Cum autem oriatur ex nutrimento fœtus lacteo in utero, nihil aliud esse videtur quàm crudus caseus, à substantia nutritiva separatus & præcipitatus; qui acorem semel in stomacho conceptum plus minus retinere solet, & occurrente in intestinis bile, obscurum ex nigro viridescentem colorem contrahit, & in intestinorum cellulis sub mora coagulatur firmitus, & eò etiam nocentius evadit. Quod attinet (2.) insensibilis transpirationis morbosam in infantibus occlusionem, notum est, hujus in omni ætate summam esse necessitatem; præ cæteris infantes cum copioso sustententur nutrimento, necesse est, ut copiosè etiam transpirent, partim, ut nutrimenti tam universalis in M. S. quàm particularis hinc inde distributi puritas ab omni fœculentia facta tecta servetur, partim etiam, si quid fœculenti partibus commixtum sit, mediante insensibili transpiratione eliminetur. Jam autem notum est, infantum corpora ordinariò crustâ quasi aut mucilagine viscida obducta esse, quod longo oritur à liquore nutritivo, in quo natant, à quo mucro extrinsecus adhærente insensibilis halitus impediri solet. Retenta igitur talia transpirabilia, sub poris cutis ubiq; reposita aut hærentia variam corruptionem subeunt, & cum sint naturæ salinæ, adeoque sapore & so prædita; exinde faciliè sub cute hærendo sua corruptione intensam acrimoniam contrahunt, nunc acido-sallam, nunc urinosam sallam, ut plurimum verò acido-sallam, unde digestiones privatæ turbantur, & cutanei affectus efflorescunt, alterato & corrupto nutrimento dictarum partium proximo, simulque destructo fermento dictarum partium digestivo: qui affectus eò promptius eveniunt, quò magis excrementa transpirabilia ex mucilagine minus temperata, seu plus minus aciori l. alio modo vitiata originem ducunt, sive id fiat vitio digestionis primæ in infantibus, s. vitio nutritis perversè lac nutritivum præbentis. Si verò dicta transpirabilia retenta fuerint magis temperata & non nihil pingua, ut minus ad acrimoniam salso-acidam degenerare queant, fit tamen, ut cohibeantur partim sua sponte, partim tepore humido ad putredinem ruant, &, superveniente alcali, larga seges animalculotum variorum pederentim emergere soleat.

### VITIA LACTIS.

*Lactis vitia* sunt varia: (1.) quando est alienum; unicuique enim mulieri suum proprium est lac, ac idiosyncrasia, eaque oriunda ex speciali fermenti stomachalis differentia: nam hoc in omni individuo insignem patitur latitudinem, unde hoc fermentum, prout fuerit constitutum tam naturaliter quàm p.n. eatenus



catenus oritur distincta appetitus & digestionis primæ ratio, unde supervenit distinctum lac, pro diversitate mulieris, in qua generatur: diversum ergo lac mammarum nutricis à lacte matris necessario in stomacho infantuli tali lacti non adsueta alterationem insignem infert, ac plus minus ad corruptionem pergit, aut digestionem primam necessario turbat, quin imò lac istud alienum distributum etiam M. S. heterogeneitate sua turbat, hujus crasin & fermentum vitale, exindeque mores necessario immutat, speciatim, cum matres subindè vivant opiparè, & ita, cæteris paribus, lac nutritivum generent; nutrices verò sint paupercule, & quibuscunque edulis subindè latranti satisfaciant stomacho, unde cacochylia pariter & cacochymia his superveniunt; & sic lac maxime est diversum, & contrarium lacti matris, ex quo coaluit fœtus: Unde ob prædictum lac tam *vitia materialia* quàm *moralia* generantur in infantibus. (2.) Si fuerit *morbosum*; nam nisi nutriatur infans à nutrice vegeta, & sanâ gaudente corporis œconomia, varia morborum semina transplantantur in fœtum: Sic *lithiasin* à nutrice calculosa derivatam in puerum notat *Helmontius de nutritione infantum ad vit. long.* Sic *lues* *Œea*, *Catarrhi*, *scorbutus* per lac comunicata sunt fœtibus, ita ut quæcunque contagia morbosa ex nutrice l. matre deriventur in infantem, si non sint sanæ. (3.) Si est *nimis nutritivum*, sc. ut ut sanissima sit mater l. nutrix, tamen tenello infanti ipsum lac probè coctum, crassum & spissum, adeoque nimis butyrosus & nutritivum primò statim haustu vix convenire videtur, quia in utero materno nutrimento admodum tenui & limido fuit sustentatus; unde mox à partu si tale lac hauriat, ab eodem gravatur ejusdem stomachus, & exindè varia recrementa coacervantur. Ob id nempe natura etiam tribus primis diebus prius in mammas derivat colostrum, quod præmittitur lacti perfectò pinguiori & spissiori, tertio aut quarto die demum supervenienti: Colostrum enim præmittitur, ut ceu serosum & tenue minus negotii facessat stomacho, sed serositatem suâ salinâ abstergat stomachi & intestinorum sordes, & simul diuretica virtute urinarias vias eluat & vias quasi patulas reddat, donec successive, lacte magis magisque alimentoso reddito, stomachus eidem adsuescat. Rectè ergò dicunt practici, colostrum non esse rejiciendum, sed esse fœtui alimentum medicamentosum purificationi primarum viarum inserviens, vid. *Spigel. de format. fœtu & Vesling. in Epist.* Matres ergò pessimè infantes statim nutricibus obesitas & pinguibus exponunt, quia oneratur stomachus tenellus, & cruditati acidæ promptissima occasio à lacte coagulato subministratur: Propter ergò matres l. nutrices suis infantibus colostrum, ut hoc ipso præparentur ad ipsum lac uberius nutritivum. (4.) Est, si fuerit *superflue ingestum*, nempe familiarissimum hoc est vitium, ut *superflue, inordinate & per vim* emulgeatur lac in os & stomachum infantis, ut subindè mater aut nutrix pueros nimis alendo necent, aut lactando macent, vid. *Kerckring. spicil. anat. obs. 40.* Familiare enim est, ut infantes ad quemcunque ejulatum uberius admoveant mammis, &



una die decies imò vigesies nutrant, ut ita priori lacti adhuc crudo, sub acido & nondum concocto novum lac ingeratur, quod necessario grumescit, caseosum fit, & in mucilaginem acidam, viscidam & tenacem abit; unde ab hac inordinata ingestione & corruptione pylorus indignatur, ut l. vomitu rejiciat, l. eadem ita corrupta, se pertinaciter stringendo, transmittere nolit; Secundum Kerckring. enim pylorus in infantibus se firmiter claudit, unde ea in stomacho retenta in corruptionem putredinalem delabuntur, & in liquamen putridum, nidorosum, viridescens degenerant: praestat ergo peccare defectu, quam excessu, & verissimum est, quod dicitur de adultis: omnis repletio, in specie panis, & in infantibus lactis nocet. (5.) *Silae* per *malam dietam* matris aut nutricis fuerit *depravatum*. *Dietæ* verò peccata sunt tria: [1.] *variorum alimentorum ingluviæ*, [2.] *affectuum neglectæ refractio*, & [3.] *excernendorum & retinendorum neglectus*. Quod pertinet ad primum, equidem sanis omnia sana, modò per internam appetentiam assumantur, & sobriè ingerantur: nihilominus tamen lactantes præ cæteris in specie respicere debent fœtus tenellos, quibus errata etiam nutrici innocua subindè solent esse nocentissima; siquidem assumptorum plures proprietates in chylo persistant, quæ utut plus minùs infractæ aut alteratæ sint, & nutrici non noceant, suam tamen in lacte præsentiam exerunt, & fœtui nocivæ sunt; Res nota est de *purgantibus*, quæ à nutrice assumpta subindè fortiter infantem laxant: Si notum quoque est de *anisò*, quod propinatum nutrici sui vestigia in lacte, mammarum odore repræsentet. Imprimis autem urgentur *acida*, in quibus ordinariò peccatur; nempe quæcunq; *acida*, ut *vinum* & simil. mox sui vestigia in lacte, utut sensibus abscondita relinquunt, quæ in infantibus ordinariò cient tormina: hinc cautiore matres, dum fœtum in utero gestant, *acida* nimia horrent; ne infantes præmaturè in utero torqueant, & iisdem *fomitibus epilepticam* ingenerent: Sic observavit *celeber. Sylvius*, quòd tales mulieres ordinariò generent fœtus epilepticos, dum verò ab acidis abstinuerunt, alio tempore fœtus saniores produxerint. Hinc etiam *vinum* non semper prodest nutrici, aut gravidæ; *Casus* etiam meritò interdicitur nutrici, quia ab hujus præmatura coagulatione ad grumescentiam lac in mammis disponitur. *Cerevisia* non ritè fermentata aut à fecibus depurata, utut nutrici fortè innoxie propinetur, lac tamen corruptum ab ea pueris *diarrhæas torminosas* excitare solet, quod m. de *fructibus horæis succulentis, uris, musto, prunis* & simil. faciliè fermentescibilibus, verum est; quorum esu infantes solent disponi ad *diarrhæam torminosam*: Sicut contra refert *Timæus in casib.* ex esu *castaneæ ar.* nutricis, alvum infantis pertinaciter obstruendam fuisse; Sicuti & *lumbri* à *lacticinior.* uberiori haustu faciliè generantur: propterea cautæ sint nutrices in assumptione alimentorum. *Alterum dietæ vitium est affectuum exorbitantia*, quibus nutrices imprimis obnoxie sunt: speciatim hæc eminet

terror



*terror & iracundia*; uterque enim affectus inspissat lac, & istud ad coagulationem & corruptionem disponit: unde lac ita alteratur, ut infans exindè corripitur epilepsiâ. Sic *terror* aut *iracundia*, mediante *lactis coagulo*, *erysipelas mammarum* sæpius inferunt; hinc Mater infanti præsens lacte tali nocumentum infert; nihil *magis* autem infantes ad *epilepsiam* disponit, quàm *terror & iracundia* nutricis: Sic quædam mulier voluit nutrire proprium fœtum, sed simul lactare catellum, ut lac uberius emulgeretur: aliquo die patella porcellanea ex alto hypocauſto decidit & frangitur, unde terrefcit, & mox catellum mammis, ut lac terrore alteratum exugat, applicat, quo facto intra dimidiam horam gravi Epilepsiâ catellus corripitur; propinat eidem *Theriacam*, unde oborto somno fuit curatus.

Denique tertio est consideranda ratio *excernendorum ac retinendorum*. *Excreta* quod attinet, primarium obtinent *menstrua muliebria*: nam sicut gravidis, ita etiam lactantibus naturaliter supprimuntur *menſes*. Habitoribus tamen *l. plethoricis* subindè primo gestationis *menſe* fluunt, etiam adhuc sub lactatione. Jam verò obſ. quoties nutrici fluunt *menſes*, quòd tunc fœtus minùs commodè se habeat, languidus sit toto menstruationis tempore, quo cessante cessat etiam dictus languor fœtus; nempe certa fit fermentatio *M. Sex* sub menstruatione, sub qua commovetur *camarina cacoehymia*, unde tunc *menſes* partim curant, partim præſervant multos morbos chronicos. Si ergò commoveretur *camarina* sub lactatione, exindè lac alteratum lædit fœtum, & eundem ægotum reddit: multò magis alteratur & vitatur lac nutricis, si per fœcundum coitum fortè imprægnetur; Sic enim lac horridam acquirit impressionem fœtui nocivam, vid. *Graff. & Kerckring.* unde lac ita alteratum *l. corruptum* à progressu mox in stomacho infantis degenerat & grumescit, & fit admodum moleſtum & hostile ipsi fœtui, ut ex hoc fonte rectè derivent *aversionem casei*, quando mulieres præbent mammam fœtui quando factæ sunt gravidæ; quia læſio tenelli stomachi per totam vitam abhorret lactis coagulum, caseum nempe, vid. *Schoock de Aversat. Casei, & Digby de Natura Corpor. c. 38.*

## ERRATA PULTIS.

Sunt hæc potissimum (1.) *preparatio*, (2.) *propinatio*. Quoad primum, solent eandem parare ex farina crudal. c.  $\nabla$ . l. c. lacte subacta & cocta; exindè nempe fit pulmentum viscidum, crassum & glutinosum: Jam verò notum est, quòd farina quæcunque cum  $\nabla$ . subacta, & in loco tepido asservata incipiat insigniter aclescere, fermentare atque spumose turgescere: quid jam fiet in stomacho infantis, quem talis puls ingreditur & postmodum lac matris butyrosus superfunditur? Ex hoc nempe emergit massa acida & viscida, cui super ingestum lac mox coagulatur & in grumos abit. Considera saltem, quòd panis non sit fermentatus aultis sit noxius; quid ergò fiet, si edamus panem ex



farina cruda c. ▽. subacta? Si ergo hoc fit in nobis, quidni talibus infantibus puls erit admodum nociva? cui lac superingestum coagulatur & grunescit, sicque grumus tenax, viscidus & ponderosus stomacho imminet. Quoad secundum, consuetæ sunt mulieres, ut pultem prius ingerant in proprium os, & cum saliva subactam postea in os infantis intrudant: Consideremus ergo salivam & ejusmodi fermentativam vim, quam promptè e. ea morbi contagiosi soleant propagari in distans. Si ergo saliva talis nutricis l. tantillo cacochymia l. scorbuti est inquinata, eò etiam inquinat infantem, cum tamen per se puls sit satis nocens. Si ergo consideremus omnia hæc vitia & nocendi rationem, perspicuum evadit, succum vitiosè acidum, nunc viscidum, nunc ▽ eo serosum esse causam proximam & radicem omnium ferè affectuum infantilium: nempe omnia vitia lactis in stomacho concurrunt, inque eo magis alienantur & in coagulum acidum abeunt. Confert huc suum symbolum puls farinaceus in loco tepido sponte acescens. Confirmat hoc medendi ratio, quæ ordinariò & optimè instituitur per alia tam fixa quam volatilia, in specie per salia volatilia infantibus optima remedia, quæ acidum destruunt, & serosum evacuant. Hæc tamen nomina intelligenda sunt, ac si hæc quasi solitaria sit causa proxima horum affectuum, sed quòd etiam subindè, rarius tamen, alia errata in corpore tenello observentur; nempe excipiendi sunt morbi hereditarii, utut occasione tali subindè maturius expergiscantur. Præterea lac in sui corruptione mille larvas induit; nunc enim in stomacho, nunc in intestinis à bile & succo pancreatico diversimode alteratur, utut frequentissimum & familiarissimum sit nocumentum, si in coagulum acidum abeat; verum hoc quibusdam paradoxum videtur, in infantibus tenellis chylo & lacte abundantibus peccare posse acidum excessivum: Sed modò consideremus assumta, tam matris quam nutricis, & postmodum ipsam naturam lactis, rum facile parebit, quòd subindè acidum etiam satis excessivum in foetu tenello possit congeri: Frequens est, ut mater & nutrix ingerant acidum; sed posito, non velsi talibus, certum tamen est, matrem & nutricem uti pane & cerevisia: Jam verò in pane semper adest . acidus volatilis, saluberrimus quidem in se, sed adeò potens, ut etiam dura corpora, corallia, vitrum &c. rem, fm. &c. rodere & dissolvere queat: Jam verò panis etiam materiam lacti suggerit, unde ipse acor, quamvis alteretur in stomacho & intestinis, ab alcali bilis, tamen adhuc in lacte occultatus hæret, qui per se quidem est innocuus, datâ tamen occasione se exerit, & dicta mala infantibus infert. Cerevisia quoque facillimè acescunt, ut etiam lupulo ea non semper possit conservari: Si ergo cerevisia novella l. nondum depurata ingeratur, facilè in nutrice suo acore lac inquinat, ut consequenter in foetu quoque evigilando lac dictum acorem possit inferre. De fructibus horæis & simil. res nota est.



## MORBI INFANTUM.

Præ cæteris frequens est infantibus, ut patiantur *tormina*, quæ ipsi ferè sunt inevitabilia, & ab *acido* oriuntur, quod ex stomacho, lacte coagulato & assumptis acidis nutriticis delapsum membranas intestinorum infantis lædit, rodit, lancinat, qui dolores sunt subindè prodromi *Epilepsie*, & sunt eò crudeliores, quò acidum viscidius & glutinosius se affixerit parietibus intestinorum. Hos dolores indicant, præter *ejulatum*, *excrementa viridia*, oriunda ab *acido excessivo*, nam subindè acidum odorem spirant, quod *acidum* cum *bile* permixtum viriditatem istam inducit. Comprobat hoc experientia quotidiana, dum *acida*, imprimis *acria* bilem solent in viridem colorem transmutare; unde simile *acidum* in intestinis concurrens cum *bile* istum virorem inducere potest. Hinc subindè *excrementa*, licet non *viridia*, sunt tamen *grumosa*, qui *grumi* sunt *lac à p. n. acido condensatum & coagulatum*. Hæc etiam nunc sunt *viridia*, nunc *flava*, quæ discoloratio oritur à *bile* per *acidum* mutata & corrupta; in intestinis mox *virorem* contrahunt, l. si aliquamdiu asservata sunt, postmodum extra corpus talem colorem acquirunt: in causa est, partim quòd *acidum* in corpore in bilem non sufficienter egerit, propter impedimentum à lacte, continuo l. per intervalla affluente & *acidum* temperante; partim, quia nonnisi finitâ effervescencia & facta præcipitatione mutationem in talibus observare licet: unde post factam præcipitationem, dum aër exterius accedit, tandem color tertius emergit. Juxta hæc *tormina* observetur, quòd si *copiosior tenaciorque grumus* ex lacte & pulte stomacho incumbat, cui per pylorum transitus denegetur, *appetitus* hinc dejiciatur, & si gravius malum sit in stomacho, *horror mammae* oriatur, cum absoluta *apepsia*: Quòd si gravius adhuc oneretur stomachus, obstruendo pylorum l. irritando, supervenit *convulsiva contractio*, quam *vomitibus violentis* sequuntur, in quibus cum lacte assumpto copiosa viscida rejiciuntur; qui vomitus infantes quidem debilitant, salubres tamen sunt, quatenus excrementa ita rejiciuntur, & longè facilius vomitus contingunt infantibus, quàm adultis. Si verò hujusmodi acida viscida citra vomitum diutius in ventriculo hæreant, facillimè ex acore fermentali instar pastæ *acescunt*, *flatus* producant, & *difficilem respirationem, contractionem pectoris* (De B. Gespanu) inferunt; quia ex horum flatuum imperu superveniunt *anxietates præcordiorum*, *inquietudines*, *somnus* impeditur, *vigiliae* adsunt, quæ omnia ex *acido fermentativo* in *flatus* resolutio originem ducunt. Eadem ratio est *inflationis hypochondriorum*, siquidem loco saltem



differunt, ab effectu priori; nempe *pasta acida, viscida*, ex vitioso *acido fermentativo*, occurrente *bile* conflata Gas tale eructat: nempe farinacea pulvis cruda subito in stomacho accendit; unde cum lacte coagulato *turgescens* fermentativa, *flatus, inflationes hypochondriorum, difficilis respiratio, inquietudines & vigilia* originem ducere solent. Cogitemus saltem *Malum hypochondriacum* adultorum & *flatus*, qui ex *acido viscido*, vitio *digestionis prima* oriuntur: par ratio est in infantibus. Sin verò *tenacior* aut *acidior mucus* in superiori ventriculi orificio firmitus adhærescit, per consensum diaphragma irritatur; unde huius sub inspiratione *convulsiva contractio*, indeque *singultus*, subinde in infantibus pertinax & contumax, qui in talibus ordinariò ex *viscido acido* circa stomachi orificium superius stabulante originem ducit. Si verò dictum *acidum p.n.* in ventriculi cavo magis fluctuet, talia acida aut acris salia, si successivè irritant orificium superius; insensâ sui præsentia & halitibus acrioribus, excitant sub inspiratione, per consensum diaphragmatis & musculorum thoracis, *tussis* sæpius repetentes. Reverà enim *tussis infantum* ex stomacho originem ducit, quæ subinde tantâ violentiâ repetit, ut non, nisi superveniente vomitu cesset. Rarissima autem est infantum *tussis sicca*, nisi interdum *inclementia aeris* ad hanc disponat: aliàs omnis *tussis* infantum est *humida*. Par ratio est circa *tussim*, quæ sub *dentitione laboriosa* turbat infantes; nam dentitionem difficilem insequitur copiosa saliva subinde *Osio-acris* defluxus in stomachum; unde *defectuosa* reddita *Digestio prima*, & *coacervata cruditates* talem *tussim* inferunt. Idem est de *Asthmate* infantum, quod ut plurimum etiam ex stomacho oritur, propter cruditates: hinc provocato vomitu liberantur. Porro si similis *mucus, blandior* tamen & *dulcior*, ex alimentorum l. nò digestorū, l. ritè licet digestorum reliquiis tamen in intestinis diutius hæserit, mediante *calore levi*, & consequenter *inchoata putrefactione*, occulta *lumbricorum* semina excitantur: nempe *semina* vegetabilium imprimis *Cerealium*, speciatim *secalina & triticea*, l. immediatè in pulve infantum, l. mediatè in lacte nutriticis, ex pane ingesto nata, & seminali insectorum variorum contagio imprægnata, datâ occasione & quasi evigilando in infantibus dictos lumbricos excludunt. Accedit *tepor loci* blandus, simulque in infantibus *vis digestiva* ventriculi *debilitata*, quando non subiguntur exactè, omnia dictorum animalculorum seminalia principia in infantibus, sed vivos fœtus emittunt. Accedit porro temperata *bilis* acrimonia, aliàs succos à putredine defendens, quæ cum deficiat in infantibus, ubi vis digestiva stomachi est mitior, & bilis temperata, tandem *mucus lacteus subdulcis* in intestinis putrefactus lumbricos excludit. Hinc etiam *tinearum* in adultis causam refert Hartman. in *obstructionem folliculi fellis*. Ulterius etiam subinde *mucus crudus plus minus acidus viscidus*, vitio *assumtorū* aut *digestionis prima* natus, loco nutritivi succi in infantibus distribuendus venit; hinc necessario ab eodè intestina aut incrustantur, aut oscula & ductus

lacteorum



lacteorum ab eo obstruuntur, aut glandulae Mesenterii infarciuntur; unde *rumpor abdominis*, simulque denegatus *nutrimenti transitus*: hinc etiam infantis corpus *atrophia* contabescit, accedente ut plurimū alvo laxiori, vide *Sylvium in praxi l. 1. c. 14. Barbette in praxi l. 3. c. 2. observ. 3. It. Anatom. Pract. l. 1. c. 14. Hoferi Herculem Med. l. 7. p. 349.* Si verò succus talis nutritivus minū viscidus, crudus tamen & vitioso acore inquinatus, vel *acri-salfo sapore* infectus distribuatur tandem ad M. S. pro hujus augmento & corporis nutrimento, necessariò ex tali alimento inepto vitatur massa sanguinea crasis & sanguificatio, indeque oritur *præter natural. effervescencia*, unde *febres variæ*, imprimis tamen *lentæ* sub vesperam præcipuè exacerbantes supervenire solent. Hinc etiam co-  
 sequenter vitatur *lymphæ*, & redditur *nimis acida, acris* & subinde *viscida*, unde & circa glandulas *tumores* & varii *affectus catarrhales* superveniunt. Quòd si cum tali sanguinis & lymphæ labe nutrimentum pro augmento partium confectum partes subintret, nullo modo iis perfectè assimilari potest, sed volatili acore, antea occultato, acidum manifestante, hinc inde congruescit & in *pustulas* extollitur, in quibus acor denuò successivè manifestatus cum vicinis partium succis effervesceat; hinc *rubor, ardor*, &c. donec mutuà temperaturā in *pus, sanies* vel simile liquamen abeat, & per pruritus in *pustulas* vel aliud exeat, relictò *fermento acido-viscido*, quod etiam aliud nutrimentum inquinat, & consequenter dicta mala magis magisque propagat; hinc etiam adjacentes partes è dictis pustulis pruritu & ardore inquinantur, unde *favi, tinea, crusta lactea*, uti etiam *furunculi* infantum primis enascuntur. Hæc urgent uberiorem explicationem: Nam dictæ defædationes corporis, capitis & faciei revera ex *lymphæ nimis acida*, & plus minus *viscida* originem ducunt; *lacte* vel matris in utero, vel nutricis extra uterum *vitioso Cause remotæ* vices gerente: Semper etiam ferè his affectibus externis *glandularum* in collo & capite, item *parotidum tumores* conjuncti esse solent; quos vocant *Haupf. Drüsen*; ita, ut vel præcedant, aut simul affligant, vel hos affectus insequantur. Ordinariò autem rarissimè observatur, quòd insequantur; & si fit, vel metus recidivæ, vel mutatio affectuum in peiores insinuat: Istud frequens nempe est, ut hos affectus comitentur, ut hinc etiam mulieres, ex conditione affectuum horum, vel magnitudinem vel diuturnitatem soleant harrolari. Observavi etiam in infante 5. mens. tumores tales glandularum prope aures, ad ovi parvi gallinacei magnitudinem cum *crusta lactea*, quæ evanescente dicti tumores etiam evanuerunt, *lacticia* autem illa denuò efflorescebant. Jam verò glandularum functiones versantur circa lymphæ distributionē; unde *lymphæ primariū* subest *vitium*, ita ut ab ejus consistentia intumescent & obstruantur glandule; ab *acido* verò largius effuso, pruritus intensus in dictis locis, cum pustulis rubris, pedetentim albicantib. & in pus abeuntib. superveniat, quæ omnia, ut *sanies, crusta, squamæ* ab acri salfo plus minus acido manifestè fiūt: imò interdū ab hujusmodi crusta altius penetrante ipsū *craniū* eroditur & *cariosum* redditur, nempe



nempe ab *acido*. Hinc & capitis partes exteriores magis infestantur his affectibus propter copiosas capitis & colli glandulas: *Differentia* autem observatur inter istas capitis defædationes, quarum materia, prout est *acrior*, aut *acidior* & *renuor*, solet inferre *ulcuscula manantia* & *copiosam saniem* fundentia; sed quatenus est *minus acris* & *viscida* tamen, tunc *crusta crassiores* induci solent. Et sanè non levis est cognatio horum *lactuminum* cum adultorum *scabie*; nam & subindè contagiosa sunt, & mediantibus lintheaminibus in alios etiam infantes propagantur: unde iisdem ferè remediis, *nicotiana* scil. *gre*, *grio*, &c. quibus adultorum pertinax & ferina scabies curatur, etiam curari possunt. Hæc occasionem suggerunt meditando & inquirendi in originem *morbilorum* & *variolarum*, quæ cum dicta *crusta lactea* &c. quò ad faciem externam conveniunt: nempe, si certò statuendum est, quod aliquod in nobis implantatum sit *variolarum* principium, ratione cuius nemo possit effugere eas, videtur probabile, quòd ex *corrupto lacte nutritis* & *vitioso viscido acore*, tam in, quàm extra uterum infantes inquinante originem habeant, qui *acor* aliquamdiu occultatus, tandem occasione data, in specie excitatà M.S. per *fermentum* simile extrinsecus haustum, successive quasi coagulando tandem perniciosas febriles *effervescentias* excitat, donec per vasa capillaria hinc indè sub cute defixa, beneficio glandularum subcutanearum miliarium excernatur, & ibidem sub cuticula hærendo, successive in *pustulas* tales coacervetur, quarum *succus* *oso acidus* effervescendo ulterius mitescit, & in pus abit, quod in crustam squamosam condensatam definit: Hinc post *variolas* interdum *ulcera periculosa* remanent, & subindè *tinea capitis* variolas insequitur; Hinc liberi à parentibus lue *Qrea* infectis nati, si postmodum corripiantur variolis, longè peius habent; Hinc etiam *Qrius dulcis* in scabie & lue *Qrea acidum viscidum* delet, & maturè administratus variolas quoque curat, & earum maturam expulsionem promovet. Unde *convulsivi motus* & *epileptici insultus* variolas sæpè antecedunt, vellicante systema nervosum acido viscido. Unicus hîc est scrupulus, cur tam tardè in quibusdam erumpant; ita, ut inter dum ad annos 6. 10. & ferè ad ætatem adultam harum fermentum in corpore lateat: Verùm si consideremus, quòd idem eveniat in affectibus hereditariis, in canis rabidi salivali fermento, & febre petechiali, subindè ad plures hebdomadas latente, item, quòd vel feminium lue *Qrea* haustum diu sæpè in corpore lateat, non adeò ineptum videbitur, etiam dicta *fermenta variolarum* tam diu in corpore latere posse, antiqua occasione miasmatis similis externè hausti variolas inferente. Præter dicta subindè quoque est periculosum infantum symptoma, *parvor in somno*, oriundus ex explosivo imperu spirituum animalium in nervos; qui impetus irritans inopinatò totius infantis corpusculum, ex fibrillarum nervearum momentaneo nisu contractivo infert

fert



fert ejusmodi concussionem, ut hi pavores vulgò habeantur prodromi *Epilepsiae*, qui *insultus Epileptici* aliàs admodum solent esse familiares infantibus; nati ex perverso *spirituum animalium motu & explosione* in nervos: Frequenter autem paris vagi & intercostalis nervi ramificationibus annexæ partes præ cæteris *convulsionibus Epilepticis* tentari solent, iisque subinde gravia tormina in abdomine superveniunt, quia dictæ partes internæ prius affliguntur: Post repetita autem talia pathemata superveniunt etiam in partibus externis, quia continuus *Spirituum animalium* in hos nervos est influxus, pro motu cordis, diaphragmatis, ventriculi & intestinorum motu peristaltico perficiendo: Unde consueto quasi tramite longè promptius irruunt in hos nervos, quàm nervos partium externarum. Idem *Spirituum animalium* exercitus reliquum postea *systema nervosum* per consensum sæpè afficit, unde *universalis Epilepsia*. Hæ passiones insequuntur *nervorum & fibrarum* quocunq; in loco *irritationem*, quæ tamen effectivè oritur ab *acido* per se nervis inimico, multo magis nervis tenellorum, quorum textura mollior, tenerior & subtilior existit. Hinc quò propinquiores sunt partes fonti *acido*, eò facilius dictæ partes convelluntur; unde ferè semper *infantum Epilepsia* fit per consensum *abdominis*, ut idem sit *acidum* in stomacho, quod in intestinis aut glandulis *Mesenterii* hospitatur, ut exinde *Epilepsia* l. interna l. externa excitetur. Denique quod peccet primariò *acidum* in *Epilepsia infantum*, confirmatur, quod gravia sæpe tormina infantes cum excretis æruginosis simul affligant, & si diutius continentur, tandem in infantibus *Epilepsiam* inferant, item quod *Hippocrates* asserit, lib. de Morbo sacro; Infantes, si ulcera in capite, vel circa aures, vel reliquo corpore ipsis excitentur, liberari ab *epilepsia*, quæ nascitur ab *acido*: Ad hæc *Epilepsiam* sistit liquor C.C. *succinatus*, qui est de natura salium volat. acrius, quæ *acidum* destruunt, & viscidum incidunt. Restant *Febres*, eæq; *acutæ* potissimum: nempe *februm lentarum* jam supra mentio facta est, præter quas tamen aliæ variæ plus minus *acutæ & continuò ardentes* non rarò sunt inter tenellos, quarum ratio ex corruptione *lactis* interna, aut obstructione pororum cutis externa optimè explicatur: Nam præter *cruditatem acidam* lactis & *pultis* variæ sunt lactis corruptiones, seu in stomacho, sub digestionem primam, seu intestinis, sub fœcum separationem; in specie *cruditas nidorosa*, dum flava aut fetida ab infantibus ejiciuntur. Excreta talia flava non sunt beneficio bilis tingentis: Talis enim copia bilis non est, sed ista excreta nidorosa & flava sunt frequentissimè ex lactis vitiata digestionem, & ejus multiplici corruptione, ut hujus digestionis primæ errata ex alimentis & hinc affectibus nutricis oriunda, cum non corrigi possint in secunda, sanguinis crasim alterent, & febribus occasionem præbeant, quod fit eò citius, quantò minus transpirant infantes per cutem, vel ob defectum caloris ambientis, vel crebriorem linteorum non sufficien-



ficienter calefactorum mutationem; Ad hæc pertinet neglectus balneorum, admodum nocivus in infantibus, & eosdem ad febres disponens.

**CURA.** Ut occurramus in specie universalibus causarum fontibus, & (1.) pro meconii expurgatione nihil æquè conveniat *colostrum*, quod ceu alimentum medicamentolum infantes blandè purgat. Hoc si fieri nequit, studiose incumbendum est, ut *pharmacis* evacuentur primæ viæ, tam per vomitum, quàm per secessum: propinetur ergo oleum amygdalarum dulcium cum pauco saccharo, horum enim ope lubricantur & abstergantur primæ viæ, sordesque eliminantur. Huic tamen oleo soli vix fidendum est, cum facile rancescat & non leve incommodum inducat, vel etiam vix possit omnia abstergere in primis viis. Hinc quidam propinant tantillum mellis rosati solutivi: Conveniens etiam & expertum est, ut propinetur infantibus pulpa passularum minorum cum ana syrupi de cichorio c. rhabarbaro, addendo pulv. corall. rubr. & ocul. 69. ita ut hic pulvis ad ℥j. vel 3℥. ad illor. 3℥. additus cum parvo cochleari infantirecens nato infundatur: sic rejiciuntur recrementa per alvum, & in specie vitiosa meconii & succorum aliorum acescentia præcavetur & tollitur, deinde syrupus de spina cervi, est etiam optimum & convenientissimum abstergens omnium sordium, imprimis locò sacchari præp. cum melle per se depurato, est sanè laxativum optimum, imprimis si pulv. ocul. 69. sit permixtus. Post meconium separatim observandum est (2.) ut insensibilis transpiratio promoveatur: ubi auspiciatò solent mulieres infantes immergere balneo ∇. dulcis tepido, ut abluantur sordes viscidæ, (lanuginis enim instar tegunt cutim.) & aperiantur pori; Non ineptum est, ut simul saponis adjumento promoveatur sordium ablatio, quia satis sunt viscidæ, & difficillimè possunt removeri; sicut etiam, si iterato ∇æ parum lixivii communis additum fuerit, ut eò melius detergeantur sordes: quin etiam, hujus alcali beneficio, præserventur affectus cutanei, sicuti hos affectus jam inductos dicta alcalina fixa tollunt. In communi ℞. farinam pisorum & hujus medio detergunt infantes toties, quoties balneantur: nempe, iteranda est subindè balneatio, quoties sanitas infantis & vires permittunt; idque primis in specie septimanis, in quibus sedulo balneandum est, aliàs enim suggeritur occasio vel febribus, vel affectibus cutaneis; unde non rarum est, quod flavi, crocei, adeoque ictérico colore tincti quandoque in lucem prodeant infantes, aut tertio vel quarto die post partum dictus color superveniat; quibus optima est balneatio, pro quo tamen convenit etiam, si granum unum croci in lacte nutritis exhibeatur fortui. Quod (3.) lactis & lactationis vitia aut errata attinet, eader exiis, quæ dicta sunt, corrigantur; nempe, semper habeatur respectus, ut omnis vitiosa acescentia & coagulatio, quantum possibile, præcaveatur: propterea commendandus hic usus anisi & fœniculi, nam præter ubertatem lactis illud etiam aromaticum & corruptioni minus obnoxium ita redditur. Caveant simul, ne aquæ frigidæ manus immergant, vel ne crebrius pedibus

dibus nudis i  
natur, & inf  
commota fue  
mulgeat, post  
revivæ calida

Post lac supe  
loco farinæ  
vel ∇. adje  
anisi pulve  
variaque m  
tiusque dig  
tur flatus,  
tergi. Se  
tem, quan  
observentur  
tur interd  
cura conven  
pro ratione  
cuare valen  
ra, inter qu  
corrigit,  
trando pote  
Unde spiritus  
factus oleo  
mum etiam  
fantibus co  
tur salia vo  
mentha vel  
& licet, du  
at, mox en  
fueris, min  
subiecta al  
anisi ejus  
vacuante c  
Prætic. ju  
convulsion  
& acorem  
Paracelsus in



dibus nudis in loco frigido ambulent; sic enim statim lac in manibus alteratur, & infantes tormina solent pati. Si inopinato terrore percussa, vel irā commota fuerit mulier vel nutrix, ne lac alteretur, [1.] omne lac ex mammis emulgeat, postea assumat spermatis ceti ℥℥. cum gñi diaphor. gr. xv. in haustu cerevisiæ calidæ, & ad sudorem se componat. Vel

℞ C. C. sine igne ℥℥.

⊖. card. bened. gr. xv.

M. pro duabus dosibus, & blandè sudorem expectet.

Post lac superest puls, & ejus vitia. Hujus cura præservativa consistit in eo, ut loco farinæ sumatur panis similagineus exsiccatus, qui probè tritus, cum lacte vel ∇. adjecto vitello ovi in pultis consistentiam coquatur, tantillum seminis anisi pulverisati superaddendo. Talis hætenus optimè contulit & nutrit, variaque mala præcavet, nempe fermentatus panis facilè resolubilis, promtiusque digestibilis, melior est quàm farina arida, pauciores enim sic elewantur flatus, & mucus erit longè minus viscidus, qui etiam facilius potest abstergi. Sed etiam non nimia quantitate propinetur puls, verum tantum saltem, quantum citra coactionem absomit infans. Utut autem hæc omnia observentur, tamen propter multiplices circumstantiarum varietates colligitur interdum succus acidus, viscidus, pituitosus, serosus, &c. in genere pro horum cura conveniunt, laticem quæ acidum destruunt, viscidum incidunt, & utrumque, pro ratione occasionis tam, per urinam, quàm insensibilem transpirationem evacuare valent. Adeoque mox à nativitate propinanda sunt remedia temperata, inter quæ optima sunt salia volatilia, in specie oleosa, quæ optimè acidum corrigunt, & in falsum alcalinum blandum transmutant, quin etiam penetrando potentissimè attenuant & resolvunt quascunque obvias cruditates: Unde spiritus salis ❄ci vel simplex, vel cum aromatibus destillatus, sicque factus oleosus, item spiritus ❄ci anisatus & caryophyllatus convenit: Et optimum etiam est liquor C. C. succinatus, multis in casibus adultis pariter ac infantibus conducens. Nec necesse est, ut generosa nimis pro infantibus putentur salia volatilia, nam circumspectus usus in lacte nutricis, vel in ∇. aut syrupo mentha vel fœniculi ad guttulas saltem optimè potest recommendari infantibus, & licèt, dum propinantur infantibus, mirè mutantur, neminem tamen terreat, mox enim ad se redeunt, & aliquot dosibus repetitis, iisdem, quatenus consuetis, minus solent angi. Præter hæc acriora & aromatica conveniunt etiam subiecta alia aromatica oleosa, volatilia, sale non destituta; inter hæc eminet anisum ejusque semen, quod pulverisatum dos. ℥i. ad ℥℥. pro blando evacuante convenit infantibus, sicuti commendatur ab Heurnio in method. Practic. juxta hæc castoreum mirè temperat acidum austerum, & quascunque convulsiones & tormina lenit. Myrrha quoque omnem corruptionem & acorem tollit, & corruptionem putredinalem inhibet, unde Paracelsus in consilio antipestil. myrrham infantibus, ceu pestis præservatorium



commendat. Propterea *Tinctura salutis* seu *essentia myrrha cum spir. vini* *Trisato* vel *Tinctura tri* parata est egregia, loco cuius etiam *spiritus cicum* vino paratus pro menstruo, pro elicienda *essentia Myrrha* adhiberi potest. Facit huc *Elixir proprietatis sine acido*, per alcalia nempe parat. & hinc dissolutum cum spir. vini, quod est egregium in morbis infantum. Ulterius accedit hisce suo modo *theriaca* & *mithridatum*, ad gr. j. vel saltem gr. ij. pro dosi propinat. pro ratione ætatis; quorum non est, ut caliditatem vel narcosin metuemus, propter nimiam dosin. Hisce acida corrigentibus ad jungenda erunt concreta terrea, & paulò fixiora, acidum in se absorbentia, ut *ocul. 69. margarit. corall. rubr. C. C. sine igne*, utrumque *Ebur*, *lapis bezoar*, omnes animalium partes offere, in specie duriores animalium dentes, quò pertinet *unicoruu. dens hippopotami* *prap.* ex quibus decantatus *pulvis marchionis* ferè est compositus, qui ad tormina & epilepticos *insultus* infantum est usitatissimus; loco cuius etiam feliciter usurpari solet sequens:

℞. ocul. 69. *prap.* 3℞.  
C. C. sine igne  
corall. rubr. aa. ʒj.  
S. card. bened. gr. xij.  
thuris gr. x.  
ol. destill. anis. gr. vj.

M. fiat *pulvis*, de quo q. s. in lacte matris vel nutricis, vel in pulvere, vel alio vehiculo infanti propinetur, ut ut loco S. *cardui benedicti* grana quædam S. *volatilis C. C.* vel *salis volatilis cranii humani* permisceri possint. Temperatus sic & resolutus succus acidus viscidus foràs eliminetur; ubi optatam ferunt opem *clysmata*, imprimis cum *sale tartari* aut simili acuata: optimè parantur ex *decocto florum chamomill.* v. gr.

℞. decoct. florum chamomill. ʒj. vel 3i℞. l. ʒij. pro ratione ætatis. mell. rutac. 3℞.

Salis tartari ʒj.  
adde ol. dest. anis. gr. iij. l. iv.

aut loco talis injiciatur *enema ex lacte*, sed cum terebinthina mediante vitello ovi dissoluta, idque in specie in affectibus dolorosis; Si necesse sit, ex lacte farinaque in pulvere comestum mucum per superiora eliminare, conveniunt *laxativa per os assumpta*, ut *syrupus de spina cervina*, vel solus, vel cum *syrupo de sumaria* mixtus subindè exhibeatur. Singulare quasi obtinet *muscerda*, cujus pillulæ numero ij. l. iij. pulverisatæ & cum lacte vel pulvere exhibere ad imitationem *Rulandi* optimè solent purgare infantes, vel tales pillulæ 6. l. 8. dissolv. in lacte, exprime per linteam & exhibe. *Pulv. Ialappæ* etiam *pulv. C. C. prap.* triplo mixtus propinat. dosi gr. ij. l. iij. ad gr. v. infantibus tenellis, pro ratione ætatis & virium, per os eos feliciter purgat. Sunt qui *scammonium* etiam infantibus in forma emul-



emulsionis propinant, sed acrius est, & infantibus perniciosius simplex. Quidam usurpant *mannam calabrinam* in pulve, pro laxandis infantibus, sed est fermentativa & flatuum torminumque in infantibus autor. Quidam etiam mediante nutrice purgare volunt infantes, sed consilium est inconstans, seu incertum, prout scilicet plus vel minus alterari potest remedium purgans in stomacho nutriticis, item, prout citius vel tardius purgabitur infans, propterea, quia res est dubia, simplici remedio tutius laxantur infantes. Quod si vomitus necessarius sit, sufficit *pulvis rad. ireos Florentin* ad grana aliquot propinatus: Tutissimum etiam est, ut gut. 6. vel 8. de *syrupo emetico Angel* Salæ dissolvantur in *mentha 3ß.* vel de quo cochleare parvum unum, vel duo vel tria propinentur tamdiu, donec vomitus speratus superveniat; ita sine ullo periculo possunt purgari infantes: *Faucium irritatio cum penna* oleo intincta molestissimum est remedium; interdum enim frustra infantes ad vomitum stimulat. Hisce in genere prælibatis, in specie quod attinet INFANTUM AFFECTUS, & quidem TORMINA cum FLATIBUS aut EXCRETIS VIRIDIUSCULIS, in tali casu non crebro nimis præbenda est mamma, sed interdum cum lacte *pulv. corall. alb.* aut *oculor. cancri*, aut *pulv. Marchionis*, aut *pulvis supra dictus* propinetur, potest augmentari dosis *ol. dest. anisi*, vel istis acidum torminosum absorbentibus addatur parum *castorei*, vel *theriacæ*, vel *mithridat.* unius pisi vel minoris vel majoris quantitas sub vesperam blandam quietem inducit; nisi talibus sistatur malum, supra dicti *spiritus*, vel *salia volatilis*. sacra erunt anchora. Aurum quoque *fulminans* magnæ hoc in casu observatur efficacæ, ut non immerito à quibusdam insigniter extollatur ad TORMINA INFANTUM & eorum OBSTRUCTIONES, etiam imminuentem exinde vel præsentem EPILEPSIAM, datur infanti aliquot dierum gr. i. vel si jam fuerit aliquot septimanarum, gr. ij. liij. pro varietate circumstantiarum. Propinetur in lacte vel *fl. tilie* aut *cerasorum nigrorum*, sanè tormina sistit, miras dejectiones alvi inducit, & epilepticos insultus sopit: Observetur autem varietas in auri fulminantis operatione: Interdum fortius, interdum debilius, interdum citius, interdum tardius operatur, quatenus à grumo lactis obviscatur vel irritatur. Quoniam verò solent exasperari affectus isti, si alvus non est aperta, hinc proficiunt *clysmatum* reiterationis usus est, attendendo, an magis acrimonia acida, an viscida causa peccantis urgeat, ut delectus instituat in clysmatibus injiciendis: Si *tenuia*, *liquida*, laticis instar, plus minus *flavedine tincta*, utut acerrima rejiciantur per alvum, ut etiam excoerietur podex, sufficiunt *clysmata lactea*, vel cum vel sine *terebinthina*: Si verò *viscida* sint, conveniunt *clysmata ex decocto simplici cum sale tartari* vel simili *sale lixiviali*, quæ dissolvunt mucum & abstergunt. Hisce internis suppetias ferunt *inunctiones externæ cum oleo destillato cumini, carvi, feniculi, anisi, chamom. cort. aurant. & simil.* quæ excipiuntur pro corpore vel *oleo chamomill. vulgar.* per infusionem, vel *oleo nucisæ expresso*, ut scrobiculo



cordis & regioni umbilicali illinantur : conveniunt etiam in *torminibus flatulentis*, in *inflatione hypochondriorum* & simil. si *tenacior* fuerit *mucus*, conveniunt *unguenta ex Gummi ammoniaco* vel in vino vel in aceto destillato soluto, & huiusmodi :

℞. Gummi ammoniaci sic soluti ℥ij.

cerebint. ℥j.

sevi hircini.

butyri non saliti aa. s. q. pro consistentia debita :

Extra quoq; *ol. destill. anisi* illine umbilicum & vicinam regionem, & impone linimentum; sic enim viscida dissolvuntur, & ad faciliorem ejectionem disponuntur. Hæc conveniunt etiam in *inflatione hypochondrij* & sim. Si *vomitibus* turbat infantes, sinendus est, donec mucus & latex vitiosus evacuati fuerint, postea cum lacte *pulv. nucis moschatae, corallia & caryophyll.* propina, vel *△. spiritus cinamomi* iis infundatur; *theriaca* etiam internus & externus usus non negligatur. Si ablactati sunt infantes, non immerito *decoctum caryophyll.* ad ℥b. & *mastic.* ℥ij. in vino commendat Ioël in *prax.* Externè ad vomitum nimium compescendum *frustulum panis vino malvatico ebrium*, impositum regioni stomachi, vel parum de *oleo destillato macis* cum *oleo Nucis moschat. expresso*, exceptum commendatur: sed non nimis citò compescendus est vomitus, in specie, si *nausea* vel *stertor* anhelando audiatur; quia, quando infantes laborant *tussi ex stomacho*, præ cæteris *vomiticia* conducunt, hinc, nisi spontè superveniat vomitus, arte provocandus est, quo facto vel sponte remittunt dicta *pathermata*. Sic in *difficili respiratione & asthma*, præmisso vomitu, pro reliquiis acidis removenais convenit *syrupus de nicotiana*, ritè depuratus, vel *syrupus de erysimo* cum *△. hyssopi* vel *mentha* propinatus, *succus* item *raphani recentis* cum *saccharo depurato* temperatus efficacissimus est, vel, qui mitior & temperatior est, quique ex *raphano excavato & saccharo repleto* in frigido per deliquium defluit *succus*, est egregius pro reliquiis absumendis; Si verò non ex stomacho, sed pectore, à *lymphâ acriori* vel *aëre* oriatur *tussis sicca*, in tali optimum est *sperma ceti*, vel in *cerevisia calida*, vel in *julculo calido dissolutum* & propinatum; Sic *spiritus \*cianisatus* infantibus est egregius: Etiam ubi *difficilis dentitio tussim* infantibus excitavit. Præ cæteris tamen liquor C. C. *succinatus* nunquam omittendus est in *affectionibus catarrhalibus*

infan-



infantum præcipuè, & indè *tussi sicca* omnibus præferendus est : In tali etiam tussi mulierum euporiston est *decoctum raparum*, in specie *siccarum cum saccharo*, quod crebrius infantibus propinatum *tussim catarrhalem* sistit. Externè in tali tussi sicca *inunctio plantarum pedum cum pinguedine lucii piscis* est egregia. Si *singultus* ex quacunque causa adsit, & paulò *perrinacior*, vomitus conducit, evellendo acres acidas sordes, stomacho & orificio superiori adherentes. Propinetur postmodum *pulvis Iodis ex C. C. usto & corall. præp. conflatus*; cui interdum consultò *ol. destill. anisi*, aut *cinamomi* aut *caryophyll.* addi potest; Nec omittenda *theriaca*, *anisum*, *castoreum*. *Vermium* proles, qui subindè torquent infantes, optimè curatur per *mercurialia*, internè per os exhibitata, infuso simul *clysmate ex lacte* ad  $\mathfrak{z}$  ij. vel  $\mathfrak{z}$  ij. cum s. q. *sacchari*, pro ratione ætatis infantis, ut dulcedine allekti vermes inferiora versus egrediantur, & à mercurio per os exhibitato fugiant : Convenit ergò  $\nabla$ . *anthelminth. Helmontii*, v. g.  $\nabla$  *asparag. vel graminis*, in qua ebullierit *serpens vivus*, vel si *mercurius vivus* cum *saccharo* teratur tamdiu, donec fiat pulvis gryseus, de quo tantill. quasi ex cochleari lign. propinari potest; Loco cuius etiam *mercurius dulcis* commodè usurpatur. Si quis autem horreat mercurium, pro usu infantum, propinet C. C. *sine igne præp.* aut *myrrham*, vel *spiritum* aut  $\Theta$ . vol. C. C. *liquor. C. C. succinatum*. Externè regioni umbilicali applicetur *unguentum ex aloë hepatic. cum felle tauri* subacta, quo illito vesicam bubulam imponunt, ut umbilico firmiter adhæreat, & etiam halitu suo lumbricos fuget. Si ex denegato nutrimenti transitu, ac debita distributione cessante, *atrophia* infantes corripit, conveniunt omnia, quæ alimenti depravationem, imprimis acorem viscidum corrigunt, inter quæ eminent  $\Theta$  *lia volatilia*, & quæ obstructos meatus referant, ob id lactationis tempore subindè iteranda : Sicuti post ablactationem convenit *liquor terra foliata* q. i, *Tartarus vitriolatus Tachenii*, item *Tinctura vitrioli*  $\Theta$  *ris grisata*; hæc interius oblata sunt optima Externè in mucilagine resolvenda spissiore & meatibus referandis convenit *linimentum ex Gummi ammoniaco* supra laudatum, vel *unguentum martiatum*, *unguentum althea compositum* & *oleum philosophorum*, mixta & abdomini illita : Si verò vitio nutrimenti, quacunque ratione vitiati efflorescant *affectus cutanei*, conveniunt internè *alcalia*, vel *salia*, imprimis *viperina*, nempe *sal volatile viperarū*, *pulv. viperarū*, *liquor cerv. succinatus*, *Tinctura Znni*, ut destruat *acidum primarum viarum* ex scoriis, quod subindè nutrimentū solet inquinare. Externè caveant *serpalia*, hæc enim infantibus. externè sunt nociva, ut potè quos subindè ad *Epilepsiā* disponunt. Vitetur

etiam



etiam lotio cum decocto *Nicotiana* vel unguento ex pulvere *Nicotiana*; Observatum enim, quod ex inunctione talis unguenti vel lotione vomitus, & copiosi secessus, cum lipothymia &c. orti fuerint. Pustulæ ergo potius linimentis vel saturinis vel sulphureis acidum absorbentibus blandè inungantur; quibus si addatur parum *salis tartari*, habebitur effectus magis tutus: unde flores sulphuris excepti unguento de cerussa, vel diapomphol. cum f. q. olei *nicotiana* vulgaris conveniunt. Facit huc unguentum *Panarol.* ex sulphure, axungia porcina & succo limonium, quod subactum in mortario lapideo adplicetur. In specie tamen observanda est DIFFERENTIA ULCERUM, an sint MANANTIA, an CRUSTOSA: Prioribus blandè cum linteis,  $\nabla$ . spermatis ranarum imprægnatis, absterfis inspergantur pulveres acida absorbentes, abstergentes & detergentes, ut ex creta, lacte lune, myrrha & similibus, quibus tantillum *salis tartari* addi potest. Melior est crocus  $\sigma$ tis, ex vitriolo  $\sigma$ tis soluto & c. sale tartari præcipitato tactus, qui per præcipitationem paratus, probè ablutus, exsiccatus atque inspersus mirè absumit acida, & prædicta ulcera ad sanitatem perducit. Si verò ULCUSCULA sint CRUSTOSA, optimum est, ut illinantur cum oleo tartari per deliquium, utpote quod talem crustam blandè emollit & curat, ita ut sponte decidat; Ex quo & oleo amygdal. dulc. express. etiam fit linimentum blandum & tenue, quod dictis pustulis illitum est egregium. Si TINEA CRUSTOSA affligat cum copiosis pediculis, in hoc casu dicto linimento adde parum de oleo destillat. spica, hoc enim illito mox moriuntur: Sufficit loco horum vel simplex tixivium, quo ipso non nimis acri spongiâ intinctâ attingantur crustæ. VARIOLAS & MORBILLOS quod attinet, in his, pro earum expulsionem conveniunt semina cardui bened. nasturtii, aquileg. napi, cum pauca myrrha, quæ cum  $\nabla$  fl. sambuci & scabios. in emulsionis formam redigi possunt ad imitationem Zwelfferi. Uterius antimonium diaphoreticum tam vulgare, quàm ex  $\sigma$ rio cum  $\sigma$ tro, addit. parum myrrha, convenit in dictis affectibus: Castoreum & ejus essentia cum aliis vehiculis appropriatis etiam est egregia, uti & C.C. sine igne: aliàs myrrha nunquam in variolis & morbillis negligenda est, unde & essentia myrrha s. salutis, non secus ac essentia Castorei, tam simplex, quàm è castoreo & asaferida cum Tinct.  $\sigma$ ri compos. præservativè & curativè laudantur: Succus expressus stercoris equini est sumum quoq; medicamentum; præfertur tamen stercus ovillum, in morbillis; in variolis caprillum. Post eruptionem ut promptè maturescant, propina oculos cancr. cum myrrha internè. Externè spongiâ cum lixivio sal. tart. ebriâ blandè tangantur pustulæ, sic mortificatur acidum, & tollitur erosio. Si gravior malignitas in variolis epilepticos insit inferat, Convenit liquor cornu cervi succinatus, item sal. vol. cranii humani, vel in robustioribus sal. artemis. Nutrix interea, si infans est adhuc sub lactatione, quotidie utatur in potu communi gelatinâ C.C. ut lac quasi medicamento sum reddatur. EPILEPTICI INSULTUS si affligant infantes, cum eorum origo sit ex stomacho & acido ibi genito,



nito, sunt in usu pulvis marchionis, rasura cranii humani, rasura unicornu marini, dens hippopotami, lapis bezoar. animalis & similia, quæ, si non suffecerint, sit liquor C.C. infallibilis, si epilepsia non sit lethalis. Quibusdam etiam ad epilepsiam infantum inter secreta repositum est  $\frac{1}{4}$  s. pulv. flavus ex musco clavato terrestri, & verum est, interdum prospere adhibetur; præfertur tamen sulphur sive pulvis flavus tempore verno ex julis coryli collectus. Hisce tamen si non superius, par sanè est medicamentum sulphur  $\frac{3}{4}$  nui, ex scoris reguli ultima vice, certo modo præcipitatum: Infantibus datur ad gr. j. adultis ad gr. iß. ad summum gr. ij. mirabilis est ejus vis in Epilepsia infantum; nempe prima vice vomitum mover, si aliquid invenit, si verò nihil offendit, insensibiliter per sudorem operatur. Si verò propinatum vomitum movebit, insequente blando somno infantes curabit. *Febres* si affligunt infantes, pro varietate febrium varianda venit cura; tamen *intermittentes* quàm rarissimæ sunt. In pueris præmissio vomitu curat spiritus sal. armoniaci &  $\theta$ . absinthii, & similia, vel liquor C.C. succinatus. *Continuæ* verò *lentæ* ex acido viscido, ut & *febres catarrhales* curantur, præmissio clymate, spir.  $\ast$  ci vel simpl. vel anisato. Non curemus, quia tempore vespertino adest, nam quia est ab acido, sistitur à volatilibus. Item Tinct. myrrha supra dicta convenit. *Continuæ* verò & *ardentes*, aut his similes, ut ut rariùs affligant tenellos, nihil ferè peculiare habent, quàm quòd iisdem, vomitu tamen præmissio, vel primis vis expurgatis, convenit  $\frac{3}{4}$ . diaphoreticum, C.C. sine igne,  $\theta$ .  $\frac{3}{4}$  niatum, arcanum duplicatum Mynsicht. & similia; si malignitas adest, emulsiones in variolis laudatæ usurpari possunt, interdum etiam theriaca & mithridatium. Hæc & similia etiam applicari possunt ablactatis; saltem observando, quòd propter voracitatem coacervent succos crudos, qui se habent simili modo ac lac coagulatum, vel ex pulve congestus mucus; unde eadem ablactatis, quæ infantibus lactentibus conveniunt, usurpari possunt.

## CHIRURGIA MEDICA.

CHIRURGIA externis corporis affectibus medetur, ut ab hac speciali medicinæ parte artifex Chirurgus vocatur; sejus descriptio ex Celso nota.

CHIRURGIA autem *quinario numero affectuum* absolvitur, TUMORIBUS, VULNERIBUS, ULCERIBUS, FRACTURIS, & LUXATIONIBUS, quorum priores tres partibus mollibus primariò conveniunt, posteriores vero durioribus. Jam harum partium affectarum exacta notitia necessaria est, & in durioribus scienda est, (1.) earum *conformatio*, *situs* & *connexio*, (2.) earum *usus* (3.) quod his omni-



bus unctuosae & pingui vulgaria, nisi artificiose sint destillata, sunt adversissima; Si ea verò amariuscule, seu sale alcalino acriori prædita sint, amicissima. In mollioribus partibus differentia inter partes sanguineas & spermaticas observanda est, quæ utramque paginam facit, tam ad prognosin, quam ad curam & medicamentorum electionem. Nam primò affectus chirurgici sanguinearum partium sunt longè tutiores, quàm nervosarum, nec tantis symptomatibus sunt subjectæ, neque sunt adeò sensibiles & irritabiles: unde morbis convulsivis minus esse solent obnoxia. (2.) Affectus partium sanguinearum non sunt adeò dolorosi, atque affectus nervorum. (3.) Affectus partium sanguinearum sunt longè faciliores curatu, quàm affectus partium nervosarum. (4.) Si in partibus sanguineis supervenit aliquod fermentum præter naturam corruptivum, quale est in vulneribus & ulceribus, nunquam solet esse tam acre, vitiosum aut malignum, ac in partibus nervosis. (5.) Partes sanguineae ablatae facillimè restaurantur, nervæ verò ablatae nullo modo restitui possunt. (6.) Partes sanguineae medicamentis etiam debilioribus facillè auscultant, & imprimis temperata balsamica, seu  $\Theta$  . vol. oleoso mitiori prædita postulant, ex errore verò applicata acria melius perferunt: Nervosis verò licet temperata balsamica conveniant, tamen eadem debilia subindè contemnunt; actiora vero vel easdem irritantia morbum asperiores reddunt. (7.) Partes dictæ sanguineae quocunque modo curatæ, nec lationem nec deformationem tantam inferre solent, atque nervæ. Jam verò in dictarum partium cura chirurgia triplex observanda (1.) Naturale est observandum, hoc est naturalis humorum motus, tam universalis, sanguinis & lymphæ, quàm particularis succi quidam partis nutritivi (2.) Observandus est acor vitiosus tam in massa sanguinea, quàm in stomacho & primis viis, tum etiam in parte læsa oberrans, cujus fermentum corruptum p. n. est removendum. (3.) Symptomata sunt mulcenda, & inter hæc est primariò dolor; Auxilia ergò his scopis convenientia, ex tribus petuntur fontibus, nempe diæta, pharmacia & chirurgia in specie sic dicta. Manus Chirurgi debet esse activa, pro delendo, pro applicando conducencia. Quæ applicanda, sunt ex pharmacia, ut salia volatilia oleosa, quæ tribus his requisitis non solum satisfaciunt, sed etiam pro aliis scopis conveniunt. Jam ergò pro remedium varietate chirurgia est duplex, vel Medica, vel manualis. Medica consistit in recta cognitione affectuum præternaturalium, per manum chirurgicam tractandum, & legitima inventionem remedium ex pharmacia & diæta convenientium; Manualis verò versatur saltem circa operationes chirurgicas, quæ nos non tangunt.

### LUXATIONES.

Inter quinque ergò affectus generales, qui chirurgiæ subsunt: (1.) Sunt  
LUXATIO-

Luxation

dicantur

propria sit

& affectus t

ex causa,

sit per vim e

ra & vix sen

ris violentis

lentiam infe

plurimum e

co & recep

in se recipi

dum, vel in

formari ca

mar & allig

cavitas olli

capui extru

cantur, os n

acidum vitio

materiam gy

senfimque c

tum istud o

git, unde po

rius fit, prius

thematise x

qui malo Ich

tingit, & no

ferruminan

sunt, & ita o

laxante, &

scorbuticis no

lato resolu

Idem est, qu

vulnera poti

CURA

externam, m

nisi ut com

supervenien



*Luxationes*, faciles & cogniti & curati. Notum autem est, quod *luxari* dicantur ossa, quando circum capita ex situ naturali remouentur, ita ut *luxatio* propria sit ossibus; Molles enim ex sede remotæ non *luxari* dicuntur, sed *transponi*, & affectus tales proprio nomine dicuntur *hernia*; Ista verò remotio fit duplici ex causa, vel propter vim externam, vel causam internam: *Luxatio* quæ fit per vim externam, manifesta est sensibus & notissima ægro; hac verò obscura & vix sensibilis a priori. A vi externa fit, e. gr. in contusionibus, casu, rupturis violentis, membrorum contorsionibus & simil. uno nomine, quicquid violentiam inferre potest ossibus, luxare potest. Si fit propter causam internam, ut plurimum est obscura, fit tamen manifesta, modò consideremus, utos in suo loco & receptaculo debito retineatur. Requirit ergò (1.) spatium debitum, quod in se recipiat os, ut cum osse caput inferatur. Si ergò caput magnum, rotundum, vel in vicinis ossium processibus, vel adnatis cartilaginibus, solet sufficiens formari cavitas & apta pro recipiendo capite. (2.) Requiritur funis, qui firmat & alligat unum alteri, ut ligamenta, tendines & muscoli. Quando enim cavitas ossis, recipiendo capiti alterius ossis dicata, repletur aliâ materiâ, ossis caput extruditur & luxatur. (3.) Quando funiculi ossium aut laxantur aut dissolvuntur, os necessario sua sede excidit: Repletur quidem ossis cavitas, imprimis ob acidum vitiosum & p. n. Synoviam inspissans, incrassans & coagulans, eamque in materiam gypseam & cream quasi condensans. Hinc enim cavo ossis repleto sensim sensimque caput extruditur, & luxatur, vel si non luxetur, interdum coagulatione istud os successivè cum suo receptaculo unit, & quasi ferruminando jungit, unde postmodum immobilitas ossis & membri observatur; Et quidem hoc rarius fit, prius frequentius. Multum prius familiare est affectibus arthriticis, & pathematis ex acidop. n. stomachi in corpore coacervato, oriundis, unde etiam iis, qui malo Ischiadico laborant, tartareo tali coagulato luxatio ossis femoris contingit, & nodi podagrici motum & usum partium tollunt, nunc luxando nunc ferruminando. Ex altera parte ligamenta & simul funiculi laxantur & flaccida fiunt, & ita ossa ex sede sua dilabi patiuntur, ex humiditate serosa salina, fibras laxante, & solvente, easque quasi stupore quodam afficiente. Malum hoc scorbuticis non infrequens est, ubi ex sale vitioso scorbutico in has partes translato resolvuntur relaxanturque partes nerveæ, & convulsiones superveniunt. Idem est, quando rupri tendines similem luxationem inferunt, qui affectus ad vulnera potius pertinent.

CURA. Hæc pro varietate causarum in genere variat. [1.] Si est ob vim externam, membro extenso, os reponendum est, quo facto nil incumbit chirurgo, nisi ut commodâ ligaturâ partem confirmet & collocet, & inflammationem supervenientem & alios affectus arceat. Consistit ergò manus Chirurgi in re-

positione

L 2



positione & firmatione. Ad repositionem requiritur extensio, ad firmitatem ligatura, ut in figura media reponatur membrum luxatum. Extensio requiritur, quia in parte luxata partes vicinæ musculosæ firmitus contrahuntur; musculi enim omnes sunt tensi, & in se contrahuntur, & breviores redduntur, necesse est ergo, ut pars extendatur, extensa reponatur, reposita firmetur, & in debito situ collocetur. Firmatio fit commodis ligaturis & fasciis, mundis linteis, nunc latis, nunc brevioribus, pro varietate circumstantiarum, &c. Ita tamen firmatio sit non nimis stricta, ne compressis vasis tam sanguifluis quam lymphaticis, oriatur inflammatio aut oedema, quapropter repellentia & adstringentia, cum sanguinis & lymphæ motum impediunt, vitanda sunt. Ligatura verò non sit nimis laxa, ne pars restituta denuò elabatur ex loco, & luxetur de novo. Verum cum subinde luxationi in principio superveniat inflammatio, vel ante repositionem luxationis, vel post factam superveniens, necesse est, ut removeatur, per remedia interna, salia volatilia, alcalia, quæ sanguinem fluidum & mobilem reddunt, vel salia fixa aut terrea, diaphoretica; quibus adjungantur externa, nunc quidem in loco opposito V.S. postea admovenda etiam externa, quæ sanguinem resolvunt & moderatè discutunt: Unde fomenta discutientia, in forma tam sicca quam humida, ex vegetabilibus aromaticis, nunc in vino, nunc alio liquori incoctis applicantur, ut inflammatio imminens; vel etiam præfens discutiat, &c, si facta fuerit inflammatio, antequam membrum sit repositum, nihil tentandum est, nisi inflammatio remota fuerit & discussa. Interim in membro luxato, nunc sub luxatione, nunc post repositionem supervenit tumor quandoque oedematosus; dicunt fieri affluxum in membrum. In tali tumore removendo, nihil melius est, quam ut præmittantur interna sudorifera, & loca externa oleo vol. fortiter penetrante illinantur, tam in loco luxato, quam tumido, ut discutatur tumor, & pars firmetur. Conveniunt ergo litus cum ol. de still. tartari & off. humanor. quæ, quando fiunt nimis fortida, rectificentur prius cum C.C. usto, vel simili parte animalium; uti supra Calx viva: Sic fiunt admodum penetrantia & discussiva. Ubi ergo fuerit pars reposita, ut melius firmetur cum ligatura, necesse est, ut partes repositæ abluantur vino tepido, aut vino decoctionis fl. hyperici, chamom. rorismar. stœchad. Arabic. &c. his calidis pars foveatur, & ut restituantur fibræ in debitum tonum, lintea vel sacculi in hoc decocto largiter humectati tepidè circumvolvendi sunt; quandoq; etiam fasciæ tali decocto per spongiam imbutæ humidæ & calidæ sunt servandæ, siquidem & sanguinis stagnationem & inflammationem præcavebunt. Si suspicio sit, huiusmodi luxationes à coagulo gypseo l. tartareo excitari, illinantur partes petroleo; vel balsamum Peruvianum, cum vitello ovi dissolutum, misceatur cum Spiritu juniperi temperato, & sub forma linimenti illinatur parti luxatæ, & locis vicinis imponatur vel fascia sicca calida, vel emplastrum quoddam nervinum, vel, quibus placet, fiat emplastrum ex cera flava & resina albisima, quibus liquefactis immittatur



catur succinum album & gummi Elemi s. q. ut ita coëant in massam homogeneam, quæ postmodum malaxetur cum balsamo Peruviano, & tum abigit in emplastrum plus minus spissum, hoc illine linthea & applicetur membro luxato, ita ut non exactè coëat, sed extremitates emplastri saltem se contingant, quia ordinariò aliqualis tumor & intumescencia supervenit partibus luxatis: Unde si emplastrum tenacius sibi superimponatur, impedit dictum tumorem, quod non semper consultum est. In luxatis ergò partibus fugienda illinitiones; oleum hyperici, cum ol. destill. terebinth. temperatum posset applicari & inungi: Nam olea mucilaginosa oblinunt poros, & insensibilem transpirationem impediunt, imprimis quando luxatio per plures dies, pro robore partis luxatæ, absque religatione conservanda sit, unde ex talibus oleosis nimius pruritus & interdum excoriatio excitari solet, qui pruritus tollitur, dum pars religata fovetur, & abluitur cum decoctis plantarum nervinarum, aromaticarum, in  $\nabla$  coctarum, quibus tantillum lixivii communis additum sit. Item dicta olea ideo non sunt adhibenda, quia, si penetrant, nihil aliud præstant, quàm ut fibras nerveas laxent, & sic luxationem magis relaxant: Item non admoveantur empl. aut cataplasmata ex adstringentibus parata, ut bolo armeno, terr. sigill. thure, mastich. sanguine dracon. cum vitello ovi aut cera aut similibus; hujusmodi enim emplastra adstringentia nihil valent, ut ut enim interdum cerâ inviscantur, tamen nihil aliud faciunt, quàm quòd poros oblinant, vis autem adstrictoria per contactum corporalem intrinsecus penetrare nequit. Et si hoc fit, ut penetrent, & partes nerveas adstringant, firmabitur quidem membrum, sed dum circa locum luxatum fit intumescencia, metus est, ne inflammatio & sanguinis stagnatio exciteatur. Adhæc inconsultum est, velle fibras lasas in tonum naturalem redigere hisce adstringentibus: Genuina enim repositio fibrarum nervearum fit per aromatica volatilia, vel fotuum formâ, vel emplastr. applicanda: v. gr. ex gummi Elemi, succina, balsamo Peruviano &c. Quæ verò luxatio fit propter os, ob gypseum coagulû, extrusam, requirit medicamenta materiam istam attenuantia, quod in incipiente non commodè fieri potest; in facta verò coagulatione & firmata luxatione negotium est difficile, interdum frustraneum. Conveniunt ergò, speciatim imminente coagulatione, internè remedia acida quævis destruuntia, tam fixa quàm volatilia, & acriora solventia. Ex horum censu comperta propterea laudata sunt remedia volatilia ex tartar. &  $\Phi$ . ana per retortam tubulatam destillatis, quæ externè & internè sunt egregia: Item salia volatil. quacunq. facit huc \* cū sal. off. hum. &c. Externè convenit præservativè balsamus Peruvianus cum vitello ovi & spiritu vini subactus & illitus, emplastr. sticticum Crollii cum oleo Philosophorum malaxatum, & applicatum, spirit. lumbricorum terrestr. per putrefact. vel solitariè, vel cum ana spirit. \* cū illitus & impositus est egregius, oleum tartari ferid. est nobile, cum oleo off. human. aliquoties destill. mixtum & illitum. Uno nomine: Ea re-



media, quæ in malo Ischiadico confirmato profunt, etiam hæc locum habent; remedia etiam hæc usurpanda sunt in luxatione & coagulatione Synoviae incipiente & imminente; quam saltem jam dissolvere difficillimum est, nisi forsitan mercurialia aliquid faciant. Si verò funiculi luxati & humectati luxationis causa sint, ut restituantur, præmissis sudoriferis, additis nervinis, eminet sasasfras & omnia sasasfrata, spirit. \*ci oleosus, aromaticus, præ cæteris aurum diaphoreticum Poterii. Hisce crebrius & aliquamdiu expectando sudorem usurpatis & continuatis, conveniunt præterea externæ nervina, aromatica, quibus adjungantur adstringentia, nervina temperata, ut partes læsæ firmantur. Sic primo scopo conveniunt lumbricalia, spirit. lumbricorum, liquor lumbricorum Hildani, item essentia contra arthritidem vagam Timæi internæ & externæ est proficua. Præ cæteris Hildanus Cent. 6. observ. 100. habet modum curandi hujusmodi luxationes, qui optimus est. Convenit quoque emplastrum sticticum Crollii, malaxatum vel cum petroleo, vel cum oleo terra, Modernorum oleo Philosophorum. Item emplastrum ex tacamahaca & caranna, cum oleo destill. succini malaxatum applicatum toti articulo, vel, ubi tendines sunt, articulum firmantes: In specie quod attinet encheiresin, pertinet ad chirurgiam mechanicam: Hæc verò omnibus luxationibus, mutandis mutatis, applicari possunt. Fit etiam interdum, ut à causa externa simul frangatur & luxetur os; malum difficile, circa quod necesse est, ut simul curetur fractura & luxatio. Fiat vel sub puncto extensionis & repositionis; dum enim extenditur membrum, necesse est, ut luxata & fracta pars eadem vice reponatur, & sub ista extensione coadapetur, seu facta ligatura debita etiam instituenda venit. In luxata maxilla, si est à vi externa, repositio est facilis, si utraque luxata sit; si altera verò maxilla luxetur, promptum remedium est, alapa insicta. Porro parvum est os, quod luxatum varia infert mala, nempe os coccygis, quod luxatur tam introrsum quam extrorsum, ut in partu difficili. Hanc utramque luxationem qui vult cognoscere vid. ann. 3. Ephem. pag. 144. Luxatio ossis femoris difficillimè curatur, ut maneat firma, quia os femoris conjungitur cum suo acetabulo per firmum ligamentum, quod si luxatum, difficillimum vel plane frustra neum est repositum. Si fractum, impossibilis est restitutio fibrarum, & claudi fiunt ægri. Inter Authores Chirurgicos optimi sunt Agricola in chirurgia parva; Barbette in chirurgia & anatomia practica, Felix Wurtz in chirurgia, Fabricius ab Aqua pendente, Paræus, Scultetus & Guillemann.

**FRACTURA.** Dicitur idem in ossæ fractura, quod in parte molli vulnus, ut ossa ab insigni vi, tam externa quam interna discontinuata fracta dicantur, ut ut enim causæ omnis fracturæ frequentissimè sunt violentiæ externæ, nihilominus tamen observandum est, quod à causa interna, nempe à nimis convulsionibus artuum manus & pedes fracti & discontinuati fuerint,

Exem-

Exemplum t  
gitur os vel  
per transver  
ciatum, si sit à  
prode sunt d  
que facta fra  
accesserit, ve  
membranosa  
ossis separata  
tactus sensus,  
tum fuerit.  
quatenus m  
finem appare  
fractio subja  
rum partium  
ob dolores  
sanguinis nat  
equalem parti  
fracturam pa  
fundendi sum  
flammatione  
supervenire  
ræ effloresca  
mitari.

Hujus  
ne fracturæ p  
specie in cor  
rum, harum  
& irritando  
rina succoru  
festucarum, l  
tum aut pun  
factas ita se h  
si minores fu  
festant, scilicet  
aut ex saltu  
idque pro co  
vel facilius, v



Exemplum tale refert Med. Norimberg. in Miscellaneis Anno 2. observ. 225. *Frangitur os vel secundum latitudinem, vel saltem finditur, & dicitur fissura, vel per transversum.* Chirurgis prior species vocatur: Ein Schlig Bruch. Speciatim, si sit à vulnere propter os vocatur ein Kieß Bruch. Hæ duæ species probè sunt discernendæ, cum differentis sint naturæ. Per transversum namque facta fractura facillime cognosci possunt, sive enim vel externa vis lædens accesserit, vel solo casu ossa fracta fuerint, necessariò ingentes dolores partium membranarum & fibrosarum superveniunt, qui sunt atrociores, si festuca ossis separata partes cutaneas vel membraneas læserit aut punxerit. Accedit tactus sensus, quo potest percipi fractura in osse, & eò magis, si sede sua motum fuerit. Accedit motus in osse fracto per transversum cessans, vel depravatus, quatenus mutata figura membri circa os fractum est; accedit, quòd sæpissimè apparet brevius aut distortum à simili figurâ. Inprimis eâ fracturâ ossi fracto subjacentium nervosarum, membranarum, fibrosarum, musculosarum partium pori ex tensione à fractura aut laceratione transformati, & ob dolores & crispationem fibrarum angustati, promptè cursum & motum sanguinis naturalis vel lymphæ impedire, remorare & sistere solent, unde præter æqualem partis fractæ intumesceniam, nunc inflammationes, nunc œdemata sunt fractarum partium in principio fracturæ supervenientes. Non autem confundendi sunt hi tumores, qui in principio fracturæ superveniunt cum inflammatione aut erysipellate, quæ interdum quarto, quinto aut septimo die supervenire solent. Ita ut nunc simpliciter aliquod erysipelas in loco fracturæ efflorescat, nunc horror & rigor & insequens æstus erysipelas tale soleat comitari.

Hujus CAUSA est varia, in specie tamen supervenit, quando occasione fracturæ partes nerveæ, tendinosæ & membranosæ læsæ fuerint, idque in specie in corpore cacochymico, ubi occasione partium nervosarum læsarum, harum nutrimentum proximum alteratur, & læsum acorem contrahit & irritando partes nerveas erysipelas infert, quâ occasione commota camarina succorum facilè febrem excitare solet, ubi subinde solet esse suspicio festucarum, hinc inde ex osse fracto præcedentium & partes vicinas lædentium aut pungentium plus minus. Hæc quidem circa fracturas transversim factas ita se habent. Fissura verò longitudines in occulto latent, inprimis si minores fuerint, unde tardè ad modum prægravata symptomata se manifestant, scilicet ex casu vel contusione membri in lapidem perpendiculari, aut ex saltu fortiori, aut similibus fit subinde, ut findatur in quodam loco os, idque pro constitutione ægri vel naturali, vel præternaturali, seu morbosæ, vel facilius, vel difficilius.

Hinc



Hinc *senes* levi occasione & violentia incurrunt fracturas ossium tam transversales quam longitudinales, quia eorum ossa sunt arida & facile scissilia, facileque finduntur, & ii, quibus ex *contagio luis* & ea per nutrimentum ossium corruptum ipsa ossa cariosa facta sunt, facilius eorum fracturam patiuntur. Si ergo finditur os, pedetentim dolor exoritur, profundus tamen & in principio ostocopus, nunc major nunc minor. Ratione fissuræ, patiente munera solita obire volente, levis tumescencia & aliqualis rubedo supervenit, quæ tamen in minoribus fissuris tardius se manifestat; quando ex fissura nutrimentum ossis proximum elapsum, intra periostium & partes vicinas alteratur & corrumpitur, & sensim secundum longitudinem ossis defluit, id circa loca articulis vicina congeritur, & congestum tandem in abscessum transmutatur, dum ipsum os interea in loco fracto corrumpitur & cariem concipit, unde ulcus infra fissuram continuò sustentatur & conservatur. Frequentissimæ hæc fissuræ, tempestivè non ritè cognitæ, dum ista ulcera producuntur, vulgò pro abscessibus ex defluxionibus corporis habentur, cum in loco abscessus facti omnis cura sit irrita, quia subinde satis remotus est à loco ossis læsi, unde interna & externa malum nunquam curabunt, nisi *cultro fissura deregatur*. Necessè ergo est, ut sit chirurgus admodum cordatus & judiciosus in hac cognoscenda, & si fractura secundum longitudinem expiscanda est, perscrutetur causam antecedentem, pertingat totum membrum læsum, an aliqua rimulæ vel inæqualitas vel in profundo asperitas, signum cariei, possit percipi; perquiratur etiam, an in casu vel motu sonus vel strepitus vel similia fuerint audita in membro læso, vid. Felix-wurtz. Fracturæ hæc, prout variant tam ex se, quàm ratione partis fracturæ, & ratione partium in consensum fractarum & ratione symptomatum &c. variant. In genere *fractura ossium secundum longitudinem* sunt difficiliores cognitu, faciliores verò curatu. *Fractura transversales* cognitu faciliores, curatu difficiliores. *Fractura*, in quibus loca ossium fracta sunt minus retusa, ut non habeant multas prominentias acutas, pungentes, ossa fracta transversim non penitus loco suo remota, facilius curantur, quæ vero semotæ, difficilior longè; Si vi fractum & comminutum fuerit os in frustula & fragmenta, periculosum est; omni enim conjunctum solet esse vulnus nunc sensibile nunc occultum, quod sub cute partes membranosas lædit, adeoque abscessus imminet. Porro si fit fractura ossium, ubi ossa duo conjuncta sunt, si alterum saltem fractum, minus periculosum est, si verò utrumque, majus est. Nam in osse uno fracto, reliquum os firmat membrum & non tam valida extensione opus est. Postmodum os sanum etiam fulcri instar se habet, quo alterum non potest loco semoveri. Os fractum in medio sui dat fracturam levio-rem, quàm circa articulum. Nam hujus repositio & firmatio longe sunt difficiliores, item circa articulum sunt plures tendines, multi nervi &c. unde periculum est ne inferantur varia symptomata. Item os fractum, quod regitur multis

musculis



*musculis*, minus periculi habet ratione symptomatum; quam quod frangitur circa loca tendinosa & fibrosa, verbi gratia, si tibia circa furas frangitur, minus periculum est, quam in talo. Si os fractum sit absque vulnere & lésione partium mollium, eò levior est cura, si verò cum vulnere partium mollium & contusione, periculosa est fractura, & periculosas inflammationes, dolores, convulsiones, interdum gangrænam infert. Si est fractura ossium in plura frustula, subinde necessarium est, ut ossa separentur à se invicem, quod fit nunc citius in minoribus, nunc tardius in majoribus: Citius, si ossa penitus fuerint separata, tardius, si ossicula adhuc hæreant cum membranis. Ossa præter reliquas substantias, prout sunt vel majora vel minora, vel magis vel minus porosa, nunc citius nunc tardius solent consolidari, ut plurimum consolidantur à die vigesimo ad vigesimum quintum, alia subinde ad 50. vel 60. in majoribus extenduntur. Præ reliquis ossa femoris fracta rarò consolidantur, integrum quin femur circumspectum est vastissimis musculis, mediantibus quibus fractum os vix ritè reponi vel firmari potest, quin denuò elabatur vel figuram vitiosam contrahat, adeoque instar regulæ erit, si femur fractum sit, in specie in adultis, sine claudicatione non posse restitui.

**CURA.** In hac duo scopi incumbunt Chirurgo, fracta ossa reponere, & reposita firmare: sic enim supervenit naturæ motus, ferruminans ossa fracta; fracta ergo ossa extendantur, extensa coadaptentur in situm naturalem, tunc necesse est, firmantur, quod fit per fascias, vel per ferulas. Firmatum os fractum postmodum in figura debita est situandum, mediâ nempe & quæ est consuetudo agro: Media est, quando membrum est in quiete; sic enim quiescunt omnes musculi. Item consuetudo sic etiam attendatur. Facto hoc, dum repositum & firmatum est os, natura ossa fracta firmata denuò conglutinat, proprium nempe suggerendo nutrimentum, quo in spicula ossis fracti infuso nutriuntur, firmantur & glutinantur ossa, quod fit nunc citius nunc tardius, pro ratione ætatis; in senibus enim tardius fit, propter defectum nutrimenti. Sæpe curiosum est, quòd gravidis rarò & tardè conglutinantur ossa, subinde nunquam, nisi post partum ferruminantur vid. Miscell. curiosa anni primi p. 191. (3.) habitus agri: succulenti, eufarci, sani, citius conglutinantur quam aridi, phthisici &c. quò magis accedit nutrimentum. Modus ferruminandi est is: Liqueor alimentosus chylosus ossium, per meatus & poros eorum, secundum longitudinem fibrarum repit, nutrit & auget: Cum verò in loco fracto rectus pororum situs sit vitiatu & impeditus, exindè legitimus alimenti cursus circa poros stagnat, & per foramina aperta hinc indè uberius transudat, & coacervatur, in duritiem ossibus similem coagulatur, & tandem callum constituit. Adeoque nullum est Chirurgo officium circa fracturas, nisi, ut ossa reponat, & postmodum reposita firmet. Interim tamen, ut faciliter chirurgus opus naturæ, circa conglutinationem ossium, mediante callo, circa hoc sit occupatus porro, ut præcaveat symptomata, & ea admoveat, quæ



*balsamum naturalem ossium fractorum & nutrimentum ejus conferrent, & conglutinationem promoveant. Externè ergò locum fractum consideret, an adfit inflammatio vel non: Si adest, hanc prius curret, antequam tantillum circa fracturam tentet. Curatâ hâc, fractura curetur, atque reposito osse locum affectum illinat Spir. vini calido, vel solitario, vel cum infusione florum hyperici: vel illinatur cum spir. vini, cui tertia pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem admixtus sit, ut se infinet in poros, & partes nerveas lasas restituat. Si insignis simul adsit contusio partû, illinatur mel cum spir. vini probè temperatum, hoc enim loco, nempe in fractura cum contusione plus minus intensè optime confert, & contusionem dictam remove, imminetiaque symptomata lenit. Illinatur etiam locus fractus cum oleo hyperici, & lumbricorum terrestrium, quæ debent esse acuta cum paucò oleo destillato terebinthina, & paucò oleo destillato rosmarini, quæ singulariter ossibus fractis convenire dicuntur; facto hoc applicetur emplastrum quo simplicius eò melius. Sufficit ex cera, resina & terebinthina; nempe videatur Würtz, qui habet simplex emplastrum ex resina alba, & terebinthina, & cera, quibus adde pulverem radicis barba hirci: potest meliorari si addatur extractum radicis aristolochia rotunda cum spiritu vini, item, si istis invicem liquefactis addatur pulvis succini, ut unâ liquecant, vel factum emplastrum malaxetur blandè cum oleo destillato succini, vel tempore usus cum balsamo Peruviano: Tale emplastrum loco illito imponatur, ut extremitates emplastri se contingant, non verò superimponatur, ne superveniat intumescencia. Hoc facto instituitur ligatura non nimis arcta cum ferulis. Queritur, an plures fasciæ circumligandæ sint; an verò saltem sufficiat emplastrum cum ferulis? Respondet, pars fracta, vel est fracta in loco musculis destituto, & magis tendinoso & membranoso, vel non: Si prius, musculi sunt loco multiplicium fasciarum circumvolutarum, & non opus est multis fasciis involvendis. Si posterius, ut firmentur melius ossa, crebriores circumvolvuntur fasciæ, & adaptentur ferulæ. Fugienda ergò sunt in fracturis cataplasmata quacunque ex adstringentibus parata, quia poros obstruunt, insensibilem transpirationem impediunt, & nihil juvant. Ista etiam ex succino, thure, mastiche, terra Lemnia, quia ex illis nullus major fructus, quàm ex cera expectari potest. Præter hæc etiam interna quædam promovent callum & præcavent symptomata, inter quæ eminent vulneraria, quibus semper rosmarinus addendus est. Eminent etiam herba agrimonia, consolidida major, Geranium Robertianum, sabina: quibus adde lapid. ostiifragum; eminet quoque pulvis Fabricii Hildani ex lapide ostiicollæ.*

℞. lapid. ostiicoll. præp. ℥j. Cinamom. el. ℥iij.

sacchari ℥j. M. fiat pulvis, dosis ℥ij.

Vel ostiicollam solve in vino, in decocto vinca pervinca, propinetur repetitis vicibus.



bus. Non incongruum est unguentum Bartholini c. 6. historiar. 25. si post tres vel quatuor dies fasciæ resolvantur, & consideretur locus fractus, ibi, ubi consultum est, abluatur vel aquâ simplici, vel cum vino decoctionis plantarum nervinarum & vulnerariarum vel similium. Si ex fractura nervi contorti, & ligamenta & tendines plus minus translocati sint, optimum est ceratum Foresti, quod post diem septimum fracturæ imponit, ad læsionem tollendam :

R. radic. sigill. Salomonis ꝑiv.

alchymill. ꝑj.

fol. plantagin. mij. instar pultis coqv. cui adde

Ceræ albæ q. s. ut fiat cerotum molle, misce cum olei myrtillorum ꝑij. ol. terebinth. ꝑiβ. unguenti Agripp. dialth. aa. ꝑiβ. bol. armen. ꝑvj. sanguinis dracon. ꝑiij. thuris ꝑj. M. pro cerato post 7. diem casibus applicando. *Fissura recens* facile curatur, si loco tumentis & dolenti applicatur *emplastrum conveniens ad fissuras ex rad. symphyti &c.* & adaptatis vel omissis *serulis* deligatur membrum, & postmodum quieti committitur: Sic nutrimenti ossis corruptio impeditur, facta corrigitur. Si tumor insignis, mollis tamen & tractabilis adsit (quod signum est collecti circa locum affectum sanguinis aut alius liquoris) aperiatur tumor scalpello, & liquori concedatur exitus, servetur ulcusculum per turundam apertum, & instar *apertura cum vulnere* tractetur. Si verò vel ignorantia ipsius ægri, vel diuturnitate temporis cum *fissura abscessus* exortus fuerit, hic, aliquali maturatione factâ, *aperiendus*, & *apertio ad locum fissura* usque continuanda erit, ut commodè curetur, *caries* tollatur &c. vel *pulvis Euphorbii* inspergatur, vel *oleum destillatum caryophyllorum* instilletur, quo factò abscessus commodè *abstergi* potest, vid. Würtz. *Observand. est*, fracta ossa nunc simplicia nunc conjuncto vulnere penetrare usque per cutim, & in tali casu lacerari atque pungi partes molles: ubi post extensionem & repositionem, ubi nil de osse abscessurum metuitur, labia vulneris l. *suturâ* l. *glutine* jungenda sunt, & *balsamo vulnerario* tractanda; *Emplastrum fracturæ* applicandum, & hinc *fasciis & serulis* deligandum, vulnus quotidie semel vel bis religandum. Si verò fracti ossis emineant *prominentie insignes*, ubi jam ab aëre alteratæ sint, & cadaverisatæ, nunc pars ossis eminens l. *abradatur*, l. *tenaciùs adhærens* separetur, quod etiam necesse est fiat, si os, licet non alteratum, dextrè tamen non reponi potest. Hoc factò in *situm convenientem*, more solito, adaptandum est; *vulnus factum per digestivum* impositum diutius apertum servandum; ulcusculum, si est majus, per cutem adducatur, si parvum, relinquatur; apertum tamen servetur, ut particula separentur à toto: si autem coalescit, non possunt extrahi per vulnus; Sin mox in principio sint separatæ, saltim vol *sellâ* extrahantur: Si verò adhuc cohareant, naturæ negotium committendum, quæ nunc talia ossa omnino separam, nunc denuò conglutinat cum reliquo osse: Promovetur etiam ossis



facilior conglutinatio linimento ex melle virgineo cum pulv. lumbricorum illito, quod habet Barbette in Chirurg. si, osse fracto denuò coalito, callus nimis magnus genitus fit, corrigendus & imminuendus est, quod docet Hildan. c.1. observ.91. Si non habeat debitam figuram, opus est interdum, ut corrigatur; quod facile fit, si callus nondum est firmatus: Si verò est firmatus, sine noxa fractura non potest curari. Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum. De *fractura* vide in specie Autores Chirurgicos.

**VULNERA.** *Valnus* est divisio unitatis in parte molli, facta à vi externa. Infestat promiscuè nunc nerveas partes, nunc sanguineas, quarum differentia tamen insigniter observanda est: *Differentiæ* verò vulnerum sunt variæ, pro ratione vulneris, quatenus est simplex l. complicatum, nunc cum inflammatione, contusione & simil. nunc ratione partis affecta sunt, & dicitur vulnus partium nervearum, sanguinearum, thoracis, capitis &c. Quoad vulnera in genere adhibeat Medicus iudicium, quo ad prognosin, an vulnus sit lethale, an non: distinguendum est ergo, an vulnus sit sanabile, l. insanabile, & hoc l. lethale l. non lethale, v.g. vulnus penetrans per pulmones, nisi maiora vasa fuerint læsa, est sanabile, & abit in abscessum: Si verò vasa maiora læsa sunt, est lethale. Jam verò fundamentum legitimæ prognoseos vulnerum consistit in his tribus: [1.] in functione sive usui partis læsæ, plus minus ad vitam necessaria: [2.] in modo læsionis [3.] in curandi ratione possibili & impossibili, & hæc est talis, l. simpliciter, l. secundum quid, in tali l. tali subiecto. Adeoque vulnus istud est lethale, quod gravius lædit partem ad vitam necessariam. Hinc ratione usus partis læsæ, vulnera vasorum interiorum insignium sunt lethalia; ratione [1di.] vulnera cerebri profunda, & substantiam ejus graviter lædientia sunt lethalia; superficialia verò minus: Ratione [3tii.] v.g. substantia diaphragmatis nervea læsa, est lethalis; quia ipsi succurri nequit. Verum quoad secundum requisitum observ. quòd non simpliciter satisfiat, quàm graviter pars læsa sit, sed quem cum alia parte habeat consensum; v.g. si ex vulnere apparenter levi, nervo tamen læso, superveniat convulsio lethalis, tale vulnus lethale est; In genere ergo in vulnere lethali necesse est, ut l. motuum animalium motus l. distributio deleatur; Si enim hoc fit, animal interit. Quoad theoriam vulnerum videatur Sennertus in praxi: quoad praxin verò Welschii judic. vulnerum leth. & Medicin. Critic. Amman. Nunquam potest generaliter prognosin institui, propter varietatem subiectorum & circumstantiarum.

**CURA** vulnerum consistit in unionem & conglabationem partium separatarum. Opus hoc solius naturæ est, quæ beneficio succi nutritivi, appositis & conglabati, tanquam balsamo quodam, sensim sensimque easdem reunit. Cui cum vix reperiatur simile remedium in rerum natura, sequitur esse opus solius



lius naturæ. Chirurgus ergo juvabit istam, removendo externa impedimenta, adducendo labia, & applicando remedia succum nutritivum conservantia, ejusdem corruptionem impediencia, factam v. emendantia; qualia sunt vulneraria & balsamica. Pro his scopis melius attingendis notum est, quod balsamus hic naturalis, dum consideratur ut conservans partem læsam, sit, naturaliter constitutus, *Non volatilis natura*, s. humor viscidus, tenuis, imprægnatus & volatili oleoso, temperato, investitus substantiâ humidâ, nonnihil glutinosa & pinguiusculâ; variet tamen pro constitutione ætatis, vitæ generis, partium ipsarum &c. Sic notum est, pro varietate subjectorum, quod v. g. mulieribus inflicta vulnera semper deteriora tempore menstruationis; It. quod vulnera subjectis l. scorbuticis l. lue & inquinatis inflicta, etiam levia, imprimis in locis nervosis subindè gravia inferant symptomata & in pessima abeant ulcera. Et quidem alteratio & mutatio balsami naturalis partis læsæ dependet à causis internis, l. externis. Ab internis dispositio nutrimenti balsamici corruptibilis, uti facit ut de se ipso vulnus non ritè coëat, ita facillimè impressiones quascunque excipit, nam & leves licèt in malè constitutis nocent. Ab internis oriundas Medicus curet removendo radicem & corrigendo partium noxam, quod fit edè facilius, si præmissis aut purgantibus mediocribus, aut sudoriferis salinis, volatilibus, blandis, ipse utatur remediis balsamum naturalem confortantibus s. sale volat. & oleo præditis, qualia sunt vulneraria, Myrrha, viperina, Zizial. & simil. Externa verò ab injuria l. æris impressione illatos defectus succi nutritivi, chirurgus remediis externis emendare debet. Hujusmodi defectus à Medico & Chirurgo emendandi sunt aliud nihil, quàm balsami naturalis partis vulneratæ & sanguinis in labiis vulnorum hærentis corruptio & putredinalis alteratio, quam infert alteratio & impressio æris externi. Hujus corruptionis comes est acorviciosus & peregrinus, qui labia vulneris inquinat, nutrimentum balsamicum & sanguinem affluentem inficit, corrumpit & in pus mutat, nisi violentior majorque aciditas loco puris Ichorem aut saniem manare cogat. Verùm si recens vulnus, apto balsamo à corruptione defendatur, & sine sanie conglutinabitur. Patet hoc, quia carnes & juncula carnea, quando in culina corrumpi incipiunt, acescunt; Item propter tale acidum in vulnere enatum, vulnus abit in ulcus, ex acore magis rosivo, depascente partes vicinas. Hinc etiam vini usus interdicens est vulneratis, ne pervertat vulnus; quæ tamen aciditas si correctæ fuerit ab alcali lapid. 69. salutare est vulnorum remedium, quod etiam in aliis remediis vulnerariis est obvium, quorum vis balsamica in alcalina natura fundatur; Sicut ulcera ex vulneribus curat Huns, quatenus hujus attactu aceria omnia acida in dulcedinem coasam transmutantur. Acorem hunc à corruptione sanguinis oriri dictum, quæ oritur ab aëre externo ambiente, & aliis causis externis, quare etiam chirurgi halitum à vulneribus vitandum



suadent. *Acor* autem semper est intensior in partibus nervis, mitior in sanguineis : Sanguis etiam effusus extra labia vulneris acescit, & grumofus hæret, & corrumpitur. *Acor* hic omnium ferè symptomatum vulnerum curationem & consolidationem remorantium solet esse Autor ; nam sanguinem & succum nutritivum fermentando calorem & ruborē, stagnando inflammationem & tumorē, rodendo ulcus generat; cum Sale volatil. atramentario fermentatione concurrens pus constituit. Hæc aciditas in vulnere nunc simplex est corruptio, tantum per fermentationem, nunc combinata cum aliis extraneis qualitatibus, aut à causa ledente, aut ab aëre ambiente, aut sanguine, aut humoribus affluentibus oriunda : Ratione causa ledentis, si fuerit l. simplex l. maligna; quod pertinet omnium animalium morsus, qui semper habet certum quoddam virus. Et observandum est, an lædatur pars sectione aut punctione, an simul contusione, ut in sclopetorum vulneribus fieri solet. Ratione aëris ambientis variat acidum in vulneribus, ratione aëris, variantis climatum ratione : Hinc in uno loco facilius curantur vulnera quàm in alio : Hinc Bononiæ facilius curantur vulnera capitis, quàm Romæ vulnera cruris. Item variat, si aër sit temperatus, inquinatus &c. Quod faciunt radii *Dares* vulnus deterius reddentes. Denique ratione succi nutritivi & sanguinis affluentis deterioratur vulnus, si magis l. minus à naturali statu degeneret ; v. g. si sanguis veneno Venereo l. cruditate cachecticâ inquinatus fuerit, si Mensibus suppressis repletus fuerit : Hæ enim circumstantiæ acorem pejorem reddendo variorum symptomatum autores sunt. Hanc ergo balsami nutritivi & quasi glutinosi vulnerum naturalis corruptionem acidam impedire & jam factam tollere, & balsamum naturalem amicum conservare debet Chirurgus per medicamenta balsamica, quæ debent esse salia volatilia oleosa, temperata ; talia enim & acidum corrigunt, & naturalem balsamum conservant, & ulteriorem corruptionem præservando sanationem vulnerum promovent : Talia sunt balsam. Peruvian. oleum hyperic. oleum terebinth. balsam. ꝑ. & simil. pauca sufficiunt : Compositionum enim multitudo ostendit ingredientium ignorantiam. Salia ergo volatil. temperata debent applicari, non excessiva aut acria, non acida acria, non urinosa acria. Ista enim malum augent, cum partibus sint inimica. Hinc & olea externâ expressione solùm facta, non tantum ob unctuositatem sunt inimica vulneribus, sed in specie, quia in se habent acidum satis potens, quod corruptionem balsami naturalis auget, & vulnus pejus reddit. Observand. tamen etiam est, ne applicentur acria volatilia, detergentia aut mundificantia dicta. Hæc enim conveniunt saltem ulceribus, non vulneribus, quia vulnus diu apertum retinent. Talia etiam colliquefaciunt & consumunt funditus nutrimentum partis balsamicum [2.] acrimoniâ suâ fluxum, dolores & alia inferunt. Ulceribus ergo conferunt, ubi potentius acidum

corru-



corruptivum acriâ detergentia postulat. *Temperata* ergò *alkalina oleosa* sunt applicanda vulneribus, iisque tam partium nervosarum, quam sanguinearum : Licet enim partes nervæ balsamica requirant paulò fortia, dum in partibus nervosis semper deprehenditur acor magis intensus, subtilior & penetrantior, quàm in sanguineis ; major enim sordium copia in vulneribus partium nervearum solet observari. Nimis tamen acria sunt vitanda, propter irritationem & dolorem : *Temperata* ergò *acriuscula & amaricantia* conducunt. His ipsis tamen simul interna vulneraria per os administranda sunt, quæ alcali occulto temperato constant, & acida quæcunque aut in stomacho & imprimis viis, aut in ipso vulnere enata mitigant & corrigunt. Observavit enim *Felix Würtz*, quòd si Chirurgi simul exhibeant vulneraria internè, non opus sit tantâ copiâ balsamorum externorum. Talia interna potiones vulnerarias constituentia sunt *planta vulneraria*, ut *heder. terrestr. alchymill. hyperic. cheresol. &c.* quibus *album græcum* meritò annumerandum est: *Oculi cancer.* imò *Cancer* totus est Chirurgorum Patronus, & vulnere egregia medicina. Hæc prædicta ostendunt, non esse imitandam vulgarem Chirurgorum consuetudinem, qui vulneribus etiam recentibus imponunt primò *digestiva*, seu *suppurantia*, tunc genitum pus *mundificantia*, & tertio *sarcotica & glutinantia* : Hæc methodus est frustranea, imprimis in vulneribus recentibus, curam in longum protrahens, ut interdum plaga levis degeneret in ulcus sordidum. Ubi oppressa est hæmorrhagia, & nihil extranei in vulnera transierit, quod eximendum sit, nulla conjuncta sit contusio, l. in quibus necessariò expectanda sit suppuratio, optimè talibus vulneribus recentibus applicantur *balsami vulnerarii*, qui cum paucis aut nullo puris proventu vulnus conglutinant, nisi aliquid de parte ablatum sit ; modò *moderate adstringentia & sordes absorbentia*, vulgò *sarcotica* admota fuerint. Interim tamen necesse est, ut, neglectis *balsamicis*, applicentur *digestiva*, Methodo vulgari, nempe eo in casu, ubi vulnus studio apertum servandum est ad tempus, v.g. in *vulneribus capitis*; &, ubi conjuncta est cum vulneribus contusio, ut in *sclopetorum vulneribus*, aut vulnera degenerare incipiunt in ulcera, aut nimis ab aëre alterata fuerunt, ita ut talibus noxiis corrigendis balsamica sola non sufficiant, aut si quid heterogeneum hæreat in vulneribus, quod eximendum aut suppurandum est : In tali casu necesse est, ut secundum Methodum communem prius *digestiva* applicentur, & hinc



& hinc post *suppurationem mundificantia*, & tandem *sarcotica*. Nam ista *digestiva* illud, quod contusum, aut extravasatum, aut corruptum est, successive transmutant in pus, ut facilius superveniat sanatio.

*Digestiva* hæc constant ex *terebinthina* & *vitello ovi* tanquam basi, quibus tantillum *Myrrhæ* l. *balsam. Peruvian.* & simil. addendum est; aliàs partes nervæ facile putrescerent. Si per *digestiva* pus laudabile effluit, vulnus tanquam benignum tractandum erit. Ex his patet, omnia *balsamica* vulneribus recentibus dicata, ut *mundificantia* & *digestiva* cognatæ esse naturæ inter se, quatenus alcali constant, & acidum destruunt vulnere & ulcerum, si nempe temperata sunt balsamica: Si non sunt temperata, sed aciora, digerentia sunt, & *mundificativa* ulcerum: si verò nimis sunt oleosa temperata, sunt *digestiva* seu *pus promoventia*. Unde unum idemque horum medicamentorum pro ratione subjecti, nunc mundificativi, nunc digestivi, nunc consolidativi nomen habet, v.g. *Terebinthina*. Hisce tamen alia talia subinde addenda erunt, quæ absorbendo acida vitiosa privata vulnere & ulcerum conducunt, ut *terra vitriol. dulcis*, remedi. *Guina*, item quæ ex *ore* adhibentur ad curam vulnere. Naturæ ergo conatui succurrat Chirurgus per modo dicta remedia, necessariò tamen etiam mechanicè succurrat naturæ; nempe conjungat vulnere labia, & non removeat tantum heterogenea ex vulnere, sed etiam conjungat vulnere labia, ut interveniente naturali balsamo propius cohereant, quò facit nunc *fasciatio* carniū labia vulnere ad se adducentium, nunc *suturarum applicatio*: scil. res extraneæ sunt *grumi sanguinis*, &c. qui tamen non penitus removendi sunt, sed crusta sanguinis grumosi circa labia vulnere relinquenda est, hæc enim defendit labia vulnere ab impressione aëris externi, defendit item balsamum nativum, quò minus alteretur; item promovet *suppurationem*. Reliquæ verò res v.g. *frustula vitri*, *festuca*, *ossium frustula*, *sirculi lignorum* & simil. extrahenda sunt l. instrumentis variis, rostro corvino, gruino, ciconiæ, & simil. l. ead. obscurè & profundè situata mediantibus quibusdam attrahentibus foràs elicienda. Talia, præter interna vulneraria, in specie sunt dicta *herb. sabina*, *vinc. pervinc.* laudatur das *Schuster*. *Wich* loco Emplastr. applicat.

℞. fermenti, mellis opt. ana ℥℥ ss.

visc. quern. q. s. M. Redige in formam Emplastr.

*Pinguedo leporina* optima est pro extrahendis rebus alienis ex vulneribus. Item ℞. *unguent. betonica*, & misce cum ana l. duplo *axung. leporina*. applica vulnere. Dictamnus Creticus c. *pinguedine leporina* etiam applicat. l. ex *gummi Arab.* & *pingued. leporin.* & res alienas prodire juvant.

℞. Ocul. d. viv.

pingued. leporin. ana ℥℥.

succin. alb. ℥iij. M.

applica



applica ad extrahendas res alienas. Juxta hæc convenit *lingua vulpis*: Evellitur nempe mense *Ortio*, ex vulpe violenter mortua, exsiccatur & usurpatur suo tempore, in vino scilicet macerata vulneribus applicatur. Composita quibus placent.

℞ Ceræ alb. lb. i. coloph. theriac. ana ℥vj. liquecant super Δ. add. gummi ammon. ℥i. bdellii ℥ii. add. axung. lepor. & aprugnan. q. s. f. Empl.

Juxta hanc extractionem etiam *fasciis* succurrat Chirurgus: *Fasciarum* variae sunt species in vulneribus: In usu est *fascia incarnativa*, quæ fit cum fascia in duplum complicata, applicando medium ejus in membro læso, in parte plagæ opposita circumvolvendo per crucem supra repet; aliquoties, & talis fascia sola sufficit in vulneribus aut non adeo gravibus, l. quæ secundum longitudinem membri l. fibrarum ductum inflicta sunt: In vulneribus verò gravibus, quando partes abscissæ sunt, quæ tamen adhuc pendent; aut quando in articulis graviores inflictae sunt plagæ; aut quando ampla vulnera per transversum fibrarum musculi l. membri sunt inflicta; aut quando frustra integra carnosæ sunt decisa: In talibus fasciatio sola non sufficit: Sed necesse est, ut adducantur labia vulneris, & instituat *sutura*. *Sutura* autem fiunt nunc per *acus* & *fila*, nunc mediante *glutine* utrinque vulnere appposito: Illud convenit etiam subjectis durioribus & fortioribus, in partibus à visu remotis minus sensibilibus, hoc est, usum habet in partibus contrariis. *Modus per gluten* est hic: Applicentur utrinque labiis vulneris lintea suis ansulis seu filamentis instructa, ut horum medio adducantur vulneris labia, & lintecum sit illitum sequenti:

℞ Gummi Tragac. Arab. mastich. thur. Sarcocoll. ana ℥i.

Pulverisata subige probè cum album. ovi, optimè cum spatul. agitando, donec in spumam & liquorem redacta sint; quo medio adducantur labia vulneris: Interim utrinque *sutura* diversimodè instituitur pro ratione partis vulneratæ; interim non applicetur *sutura* quæcunque, nisi necessitas urgeat: (2.) ne nimis arctè adducantur labia vulneris, quia non nihil intumescunt: (3.) ne nimis prope ad se invicem sint, ne balsami ingressus & puris egressus impediatur. (4.) ne in futuris cum acu nervus lædatur; aliàs enim plus lædunt quàm profunt. Jam ut *sutura* insigniter conveniunt in vulneribus gravioribus *casim* inflicta; ita in vulneribus levioribus *punctim* inflicta, usus *turundarum* est egregius, qui tamen nec in *abscessibus*, nec vulneribus *sinuosis*, nec in *fistulosis* suâ laude defraudandus est: nempe applicantur, ut vulnus maneat apertum, & fundo purificato, caro accrescat. Aliàs cum citius in superficie coalescat vulnus, in profundo verò sordes remaneant, necessario aut abscessuum recidiva, aut fistulæ, aut sinus profundi supervenire solent: Ipsæ enim *turundæ* ritè fabricatæ unguentoq; convenienti illite vehiculum sunt, ut ubiq; unguentum aptius distribuatur, & ad vulneris profundum perveniat. *Parantur* autem ex lino contorto & linteo semiconvoluto, & filo alligato in forma pyramidalis, ut basis divisa in 4. lacinias impediatur, ne nimis profundè intrudatur in vulnus, aliàs enim esset dolorosum. Idq; observandum est, si



est, si partes nerveæ aut in vicinia, aut infundo vulneris fuerint; à turundarum enim contactu nimis dolent, & ad convulsiones ægros disponunt. Ne autem nimis fiant crassæ, in apice sint teneræ, in mediò non nihil crassæ; Ad hæc turundæ non nimis frequenter, aut ubi minùs necessarium est, applicentur. Sufficit, per turundam vulnus in quod. loco servare apertum, ut l. sanies, l. simil. possit excerni: Sed si his ipsis, licet optimè servatis, coëat vulnus, tamen inæqualitas, asperitas & durities in loco consolidato remanet, & cicatricem relinquere solet: Nam, dum balsamus nutritivus successivè unit labia, fibræ etiam separatæ vix uniri solent, quia pori & meatus situ in æquali juxta se positi pervertuntur, & faciunt, ut fibræ minùs aptæ serie collocatæ perstant; unde succus nutritivus, istis locis detentus & implicitus, facit, ut cicatrix relinquatur, & eò magis, quò magis adstringentia & exsiccantia applicata fuerint, quæ poros angustando fibrasq; minùs tractabiles reddendo insigni cicatrici occasionem præbent, & eò magis, quò asperior minusq; roridus fuerit balsamus nutritivus. Hinc in adultis majores cicatrices, quàm in junioribus solent relinqui. Remedia porro consideranda sunt: In genere glutinantis applicantur, quæ partes molles naturaliter unitas d. p. n. divisas denuò conjungere valent: Pertinent huc vulneraria & balsamica sarcotisantia & cicatrissantia. Natura equidem simpliciter conglutinatione, interpositione sui balsami, partes aut unit aut imminutas restituit, modò non impediatur naturalis balsamus à corruptione aut alteratione. Balsamum ergò naturalem conservant quæ  $\Theta$ . volatili alcalino constant, nempe vulneraria, quæ adjunctam habent moderatam adstrictionem. Prout ergò naturalis balsamus corruptionem quandam suscepit, etiam eligenda sunt remedia, quorum sal alcali oleosum nunc magis nunc minùs erit acre: nunc addenda sunt temperatis metallica, imprimis Hnina acidum omne absorbentia: dum vero semper c. succo partis nutritivo tenuis quidam & serosus humor in partem læsam transudat, qui aut impedit partium mixtionem aut alimentia assimilationem, aut nimis humectando partem laxam, flaccidam & mollem reddit, & sic carnis excrecentiis variis occasionem suggerit; addenda sunt interdum l. exsiccantia l. adstringentia moderata, quæ laxitatem corrigant & debitam consistentiam carni tribuant, quod observ. est, ubi simul l. caro, l. cutis, l. alia substantia ablata regenerari debet; ubi hæc remedia l. augenda l. minuenda sunt: Nam, si sunt moderata, dicuntur sarcotica, si fortiora, epulotica, quorum in simplici vulnere non tanta eminet necessitas, atque in ulcere partis. Remedia ergo sunt multifaria v. g. Herbae & fol. sanicul. pyrolæ, herniariæ, plantag. hyperic. scabios. centaur. min. Millefol. betonic. nicotian. vinc. pervinc. veronic. rad. aristol. utraque, tormentill. symphyti major. flor. sigilli Salom. fruct. momord. NM. Galla, gummi sarcocoll. sanguis Dracon. Tragac. Tacamahac. olibanum. bdellium, resina pini, Myrrh. pix, terebinth. Mastix: Ex succis hypocist. acacia ver. aloë: Ex animal. mumia, lumbrici terr. cerumen aurium, mell. c. c. ustum, off. sepia, Cancr. & omnia ex 69. desumpta, usnea cranii humani, Telæ araneæ. Ex mineral. lithargyrium, H. calcinat. cerussa, minium, succinum, bolus

Armen.



Armen. terra sigill. creta, lac Da, gypsum, & calx viva lota, crocus & spir. vini, ol. momordic. ol. hyperic. ol. nucist. expr. ol. nicotian. ol. lumbricorum. theriaca, balsamus Peruvianus, balsamus sulph. balsamina, unguentum de betonica, de pompholyg. de nicotiana, de cerussa, ungv. fuscum Würtz. de tutia, de minio, emplastr. dia sulphur. Rulandi, Emplastr. fictic. Crollii, Empl. de betonica, de gratia Dei, &c. usus horum est multiplex: usurpantur n. l. interne, in porionibus vulnerar. l. externe, in injectionibus, tanquam olea, bals. unguent. cum turund. aut filamentis siccis, it. tanquam Emplastr. v. g. sic prescrib. potio vulnerar.

℞. 69. fluviatilium numero XII. rad. symphyti major. ℥i. fol. alchymill. heder. terrestr. summit. hyperic. aa. ℥ij. concis. & contus. coque & bull. in f. q. ∇. & vini, Colatur. ℞. q. pl. decocto adde Syrupp. de capill. ♀. de heder. terrestr. aa. q. f.

Si sitis urgeat, addendum parum de Syruppo de succo citri, &c. detur. S. Wund. Trans in utroque haustu aliquot. gutt. bals. sulph. terebinth. l. in nervorum affectibus, succinati assumi possunt. Informa sicca.

℞. Mumiae patibul. ℥℔. Spermat. Cet. ℥ii. ocul. 69. ℥iii. Rhabarbar. c. lect. ℥i. Cinamom. ℥℔. M. F. pulv. dol. ℥i.

Si ordinanda sit injectio in profunda vulnera, sinuosa, carnosa &c.

℞. herb. veron. pyrol. sanic. consolid. Saracen. fol. nicot. aa. mij. albi graeci ℥iij. coque in simpl. ∇. Colat.

℞. q. f. adde l. spir. vini l. mellis pro lubitu M. S. Wasser zum einsprengen. Oleosa & balsam. vulnerar. utut simplicia, sunt optima, v. g. sufficiat balsam. Peruv. l. Tolutan. it. bals. sulphur. c. ol. hyperic. quibus tamen placent composita:

℞. ol. hyperic. Momordic. aa. ℥ii. balsam. ♀. ℥i℔. Gummi Elemi. q. f. pro consistent. balsam. liquidi. M. blando calore, asserv. usui, instilletur vulneri. Vel ℞. ♀. ℥j. bull. in f. q. ol. hyperici express. ex feminibus v. g. ℥j. ad solut. sulphur. adde Gummi Elemi, Tacamah. terebinth. aa. ℥i℔. Thuris & Myrrh. aa. ℥iij. M. prodigestivo & asserv. pro usu. Vel

℞. Terebinth. Venet. resin. abiet. pellucid. aa. ℥iij. Gummi Elemi, Thuris aa. ℥i℔. Myrrh. Mastich. benzoës, aloës hepat. aa. ℥℔. spir. vini ℥iv. subigantur & destill. l. a. per retortam & f. bals. separand. a phlegm. & magmate, temperando l. c. peruv. bals. l. c. ol. hyperic. expr. nam statim fiunt acria; unde sunt temperanda, magisque conveniunt in vulneribus partium sanguinearum quam nervearum. Si unguentum expetatur:

℞. Summitat. hyperic. flor. Centaur. minor. veronic. sanicul. aa. ℥j. concisa & contusa infunde in f. q. olei olivarum puri & butyri non saliti v. g. aa. ℥iv. digere in MB. per octiduum, tandem ad ∆. in spiss. post exprime, expresso adde terebinthinæ ℥ij. balsami Peruv. ℥iij. Mastich. Myrrh. olibani, flor. sulphur. aa. ℥vi. M. ad consistentiam unguenti. Vulnerarium si postuletur Emplastrum:



℞. rad. aristol. O. consolid. maj. aa. ℥ss. mumia Mastich. aloës Coloph. tut. præparat. litharg. aa. ℥ii. Gumm. Elemn. ℥ij.

Terebinth. q. s. cum pauca cera m. f. Emplastr. Induc. super linteum, prius cum balsamo Peruv. leniter irroratum. Cæterum in selectu remedium internorum & externorum non nihil adhibendum est diligentia, cum interna præstent, & simplicia sint optima: unde externè pauca quædam vulneraria supradicta, it. *℞. & diaphoret. sufficiunt*; interdum tamen *℞. l. liquor c. c. succin.* in partium nervosarum læsione usurpatur.

Interne in æstu aut phlogosi febrili *℞. niat.* imprimis sub largiori usu concedendum est, quibus semper ocul. *69.* esusque *cancror. fluviat.* addendarunt. Qui volunt habere paucas compositiones remedium vulnerar. ad eant *Potër. pharmacop.* Qui autem volunt habere selectum compositionum vulnerariar. adeant *Felic. Wurtz.* Par ratio est & balsamor. & ungent. vulnerar. Simpliciora & selectiora sunt optima. *Bals. e. q. aris, balsam. Peruvlan. & Tolutan.* sunt optima, *l. ol. hyperic. expr. ex semin.* cui proprii flores infusi sunt, est egregium. It. *cerumina aurium c. oleo. England.* expr. cocta & inspissata dant balsamum ad vulnera egregium; imprimis nervorum, nulli æquiparandum; sic *liquor follic. ulmi* solus instillatus in vulneribus, & imprimis oculorum sufficit. Qui verò volunt habere plura *bals. vulner.* vid. *Heinr. ab Heer. obs. X. de herb. Hyperic. Zwelffer. in Pharmac. Regia, Agricol. in Chirurg. parv. p. 245.* Pro prompta & tuta cura *℞. spir. vini* non adeo dephlegmat: & applicetur cum linteis vulnere. It. injiciatur in fistulas per siphonem, *℞. spir. vini & elue vulnus, cui cluto pulv. aloës hepat. cum gossypio ol. hyperic.* imprægnat. impone vulnere, super-ponatur Emplastrum Rulandi. It.

℞. benzoës ℥i. *▽. vitæ* ℥ss. Mastich. ℥j. balsam. nigri ℥ss.

Misc. in formam linimenti; consolidat & cicatrizat quæcunque vulnera recent. simplicia. Pergendum in specie, & quidem, quæ dicta sunt, facillimè applicari possunt vulneribus partium sanguinearum & nervearum: observ. autem, quod harum vulnera præ reliquis sint periculosa, propter periculosa symptomata, in specie Erysipelas, gangranam, convulsiones, lipothym. fluxum sanguin. & simil. In his vitanda sunt studiosissimè quæcunque oleosa, unctuosas, aut pinguis. Vulnera partium nervo-

sarum punctum læsar. sunt periculosissima, ut etiam punctum insectorum adeò sit periculofum, qui ut plur. læditur nervus aut tendo. In tali casu, in nervo punctum læso, quod etiam locum habet in inepta V. S. quando tendo pertunditur, nil melius est, quam immittere, instillare aut illinire *ol. destillat. terebinth.* vid. *Sylv. in prax. p. 242. & 248.* loco ejus etiam *ol. ceræ* adhiberi potest vulneribus.

℞. ol. destil. terebinth. ℥i. spir. vini ℥i. Camphoræ ℥ss. M. instilla vulnere aut ulcusculo, in quo nervus punctum læsus fuit; experimentum est *Parci l. 9. cap. 38.* vel imponatur hoc emplastrum:

℞. Euphorb. optim. ℥i. resin. terebinth. ℥ss. Ceræ parum, M. extend. super linteum,



linteum. & applica per quam calidè. Ulterius aurium cerumina ad nervos punctim læsos sunt summum remedium, commendat. ab Helmont. His addi potest balsamus Peruvianus, ol. destill. lavendul. lauri, Philosoph. It. egregia est mixtura:

℞. unguent. dialth. ℥iv. ol. lauri destillat. ℥iβ. destillat. succin. ℥β. M.  
Inunge locum, ubi nervus est punctim læsus.

Si verò nervus per transversum læsus sit, l. tendo l. ligamentum, inter remedia usitata semper simul dicta balsama vulneraria acuenda sunt cum aliqt. gr. olei destillat. præ cæter. ol. terebinth. salvia, succini, conveniunt. Hinc ad nervos penitus incisos denuò consolidandos laudatur seq. ℞. lumbricor. terrestr. q. s. ex sicca blandè & pulvis, vel pulvisatos lumbricos latos contritos M. cum terebinthina, quò 20. (viginti) horas supra vulnus positò istud sanatur, l. sine Terebinthina pulvis inspergatur venis l. tendinibus dissecctis. Vel ℞. ol. hyperici ℥j. terebinth. ℥j. vermium terrestrium ℥iii. M. fiat linim. applic. nervis, tendinibus, autem simul partibus dissecctis. Nobile est remedium Cnæsseli, aliàs usitatum ad nervos punctim incisos: ℞. Exuvias serpentum, quas sponte deponunt, & cum ocul. 69. pulvisat. insperge. Talia si hic non sufficiant, ad futuras veniendum, in specie in tendinibus; Equidem periculosum videtur consuere tendines, propter convulsiones, nihilominus tamen fieri posse asserit Vesling. in Observ. p. 90. & 91. Et ipse observavi Parisiis, ubi quidam juvenis erat vulneratus transversim per carpum, & discissi omnes tendines, cum verò remedia irrita essent, chirurgus acu latà, tenui tamen tam artificiosè fibras tendinum insertas dictis tendinibus consuit, & appropriatum balsamum illinivit, ut idem sanatus fuerit. Hoc tamen supervenit incommodi, ut toties, quoties mutatio tempestatis instaret, in loco sanato perciperet dolores podagricos. Ultra nervos subeunt considerationem *vulnera cum contusione facta*, omnium pessima: In hisce istud quod contusum est, facilè mortificatur, putrescit & consolidationem vulneris impedit. In hoc casu istud, quod contusum est & mortificatum, separetur & per turundas foràs excernatur. Equidem queritur, an suppuration expectanda sit, & sanguis extrahendus secundum Würtz: quando sanguis tardius in pus mutatus in gangrænam abit? ℞. cum distinctione: Contusio cum vulnere l. est levior, ut spes sit per suppurationem eam posse curari pedetentim: in tali casu sufficiunt digestiva & suppurantia; si v. c. vulnere graviore conjuncta sit contusio, & metus sit, ne gangræna superveniat ante suppurationem abscessus, præter vulneraria mox scarificando aut incidendo contusionis locus aperiendus erit, & sanguinis exitus promovendus: hinc digestivis, quod reliquum est, sub forma puris promovendum; digestivis tamen aliquid de unguento Ægyptiaco addendum est, ut præcaveatur Gangræna. Cum his etiam applic. externa, in specie in principio morbi corruptionem ulterius præcaventia: Eminent ol. Cera, illitum, de super imposito Emplastro de cumino, s. illin. ol. philos. imposito Emplastr. de baccis lauri, vel ℞. rad. consolid. maj. & min. chamomill. melilot. aa. ℥i. croci ʒi. farin. fabar. fænu græc. aa. ℥iβ. coque ex ∇. & in specie primò radicc. add. absinth. pulv.



pulv. cumini ana ꝑß. M. applica externè. Hisce sedatâ maximam partem contusione, præ reliquis remediis convenit illitus. \*ci cum calce viva destill. Pertinent huc SCLOPETORUM VULNERA, quæ propter istam contusionem sunt adeò periculosa; cùm in omni sclopetorum vulnere semper insignis contusio & partium dilaceratio conjuncta sit. *Quæstio est*, an etiam *ardor* adsit: vix probabile est quòd calor cum globo communicetur parti, nisi propius fuerit læsus patiens. In tali casu, ut curentur sclopetorum vulnera, præter *internas potiones vulnerarias* hîc imprimis proficuas convenit. internè, quod egregium est. Externè id quod contusum est, in pus maturandum: Hinc factus *abscessus mundificandus, incarnandus & curandus*, modò priùs *extranea* ex vulnere extracta sint; Globi enim semper extrahi possunt, & in tuto remanere poterunt. Jam ergò pari scopo *suppurationis substantia confusa* optimum est, ut applicentur *digestiva*, quibus semper add. *spir. vini*, item *balsam. Peruvian.* Ut hæc ipsa digestiva nervosis partibus minus noceant, vel insuper *balsam. Parai*, quod describitur à *Sennerto & Barbett.* adhibendum, nempe fit ex *ol. lilior. & violar.* in quo *catelli* ebullierint, addit. *lumbric. terrestr.* cum turundis, quæ semper illin. *spir. vini*, & quidem applicantur turundæ, ut utrinq; puri pateat exitus; interim rarò ante 3. l. 4. diem ad suppurationem perveniunt. Quando ergò vulnus ad suppurationem est perductum, applicantur *mundificantia* pro purulentiis abstergendis & ulceribus detergendis. Eminent imprimis *mundificativum Vigierii*, quod seq.

℞ Terebinth. ꝑv. ol. rosar. ꝑi. mel rosar. ꝑiii. myrrh. aloës, mastich. aristol. rot. ana ꝑß. farin. hord. ꝑvj. M. pro unguent.

Si verò in hoc vulnere ex contusione putrefactio & corruptio sit insigniter, in specie in loco non nimis nervoso, dictis additur comòdè parùm de *Merc. precip.* quoniam putredinem arcet, in locis non nimis nervinis. Si in principio *emphysema* adsit, nil melius est *cremore calcis viva* cum *melle mixt.* ad imitation. *Agricol. in chirurg. parv.* Si de dolore ossium, in sclopetorum vulneribus malè solidatis æger conqueratur, optimum est *ol. tereb.* illitum extrinsecus; sic lenit partem consolidatam, & promovet etiam fissuram ossium, ut coëant, vel si ossiculum est abscessurum, hujus separationem promovet. Inter DIFFERENTIAS VULNERUM est, quâdo vulnus quoddâ dicitur *penetrans*, aliud *non*; quod fit ratione instrumentorû: Siquidem interdum, præter læsionem simplicem, ipsa causa lædens *malignitate venenata* tincta est. *Morsu animalium* inflictâ vulnera patent, semper enim suspicio est, in omni animalium morsu latere venenum, sed si globi aut alia *instrumenta* sint *venenata*, à priori cognosci nequeunt; patet verò ex symptomatibus, *gangræna &c.* quibus, si accedunt *angustia præcordiorum, sudores glutinosi, syncope &c.* magis confirmant. Si ergò *animalia venenata* morsu vel puncturâ læserint, observetur diversitas animalium lædentium, ut læsus locus nunc *scarificatione*, nunc *sine scarificatione* appropriatis curetur. *Scarificandus* est, quando vulnus profundius, ac metus est, ne venenum, quod penitus immissum est, mediante sanguine ad



ad cor deferatur; aut sine scarificatione, ubi minus virulentia communicatum fuerit. Sic in vesparum puncturus sufficit oleum N. M. Et empl. de ranis cum Brio. In viperarum & serpentum morfu optimum est, ut bufo vivus contusus applicetur, l. accipiat aridus vino maceratus, & imponatur, aut ferramentum candens propius admoveatur parti laesa, citra ambustionem tamen. In canum raborum morfibz optimum est Empl. Magnet. Angeli Sala cum pulv. 69. fluviatil. mixtu; vel loco scarificato applicatur cepa, cum aliquot capitibus allii & theriaca: Elicito sic veneno l. sponte l. leni digestivo, si in morfu contusio quaedam facta sit, vulnus sanandum est; cui digestivo semper aliquid ung. Aegyptiaci vel communis, l. ab Hildano correcti addendum erit. Si vero venenatis armis inflatum sit vulnus, ut eliciatur virulentia, opera danda est: Quapropter applicetur Emplex cepis cum theriaca, sterc. caprar. & ol. N. M. l. Empl. Magn. Angel. Sala, Cujus descriptio passim obvia. His subjiciuntur interna sudorifera alexipharmaca, qualia sunt nota, in specie acet. destill. cum theriaca aut diascord. Fracast. tinctura bezoard. antimonialia fixa cum nitro preparat. Extracto veneno ex vulnere vulnus ad sui consolidationem perducendum est. §. Circa vulnera subinde urgent quaedam SYMPTOMATA, quae specialem merentur considerationem. Haec inter 1. est HAEMORRHAGIA VULNERUM, quando vasa majora fuerint laesa, adeoque primum quod urget Chirurgum, est, ut haemorrhagia nimia sedetur. De remediis internis pauca monenda sunt, quia hoc loco non adeo conveniunt: Interim tamen quia observatur quotidie, quod l. iracundia aegri, vel ebrietas, l. incallescencia a vino, &c. agitent M. S. & haemorrhagiam atrociorē reddant, hinc nitro & nitratis succurrendum est haemorrhagiis nimis: Usurpentur nempe ① Fiat. mixtura acidula cum tinct. antiphthif. §. Hui comp. tinct. ② adstringens, aut tinct. sulph. vitriol. &c. potius locum externa habent, inter quae eminet crepitus lupi, in specie, si sic probe exsiccat & compressus fuerit, ut applicatus vulnere ex sanguine eo magis turgescat, & turgescendo orificia vasorum laesa obturet. Si hic solus non suffecerit, immerg. solutioni vitrioli martis, cui add. dimid. O solut. in decocto quodam vegetabili blando & adstringente, quae frigida cum bombace l. stuppis cannabis applicentur vulnere, sic cessat omnis fluxus. Vel, si vulnera fiant profunda, conveniens est, ut immittatur pulvis ex luna lacte, bolo armeno & capit. mort. vitrioli, probe eloto, isti nempe pulveres optimi sunt, in sistenda nimia haemorrhagia; Item terra vitriol. dulcis modò laudata, cum albumine ovi subacta & applicata vulnere, est egregia; nunc sola sufficit, nunc additur parum de terra sigill. quae excipitur cum albumine ovi, & applicatur, fortiter vulnere imprimendo, & vasis apertis. Fuligo furni cum albumine ovi subacta & applicata vulnere sistit haemorrhagiam: pulv. Galeni ex aloë, rhure, album. ovi & simil. notus est. Item usnea cranii humani nobilis est, immissa vulnere: stercus asininum recens aut succus expressus immixtus, aut cum sanguine effluente exsiccat permixtus & vulnere immixtus sistit haemorrhagiam; ut & linteum One & spermate ranarum probe immixtum,



prægnatum, exsiccatum, & iterum imprægnatum atque applicatum vulneri. Denique unum ex fortissimis est, si

℞. Croc. ꝯ. ʒi. terræ vitrioli dulc. ʒss. acet. destill. vini fortiss. ʒj.

Hismadefiant vellintea, l. stuppa madefacta: pulv. terrestr. inspergantur & applicentur. Juxta hæmorrhagiam vulnenum alia quoque symptomata consideranda sunt. Quæ sunt l. generalia l. specialia. Illa sunt, quæ vulneribus quibuscunque solent evenire: Hæc erò quæ saltem superveniunt vulneribus in hac l. ista persona, idq; ex peculiari conditione ægri: Talia sunt v. g. quæ superveniunt viro vulnerato, cui hæmorrhoides suppressæ sunt. In his casibus causis symptomatum prospiciendum est, fluxus tamen aperiendi sunt, non tam internis, quam externis. Interna quidem humoribus motum largiuntur, sed, ut omnis impetus transferatur in locum læsum, & sic exasperantur symptomata. Inter symptomata, ergò sunt (1) INFLAMMATIO; quam præ reliquis sistit ∇. calx viva, l. crudè applicata, vel cum saccharo Hyi aut cerussa, imprægnata; Hæc enim Epithematis instar crebrius adplicata inflammationem solent sistere. It. imprægnetur cum camphora, & erit eò magis efficax: hinc remedia 69rina, ∇. nempe 69rum putrefactorum nonnihil destillata, applicata vulneri & inflammationem sistit, & sanguinis fluxum in vulneribus articulorum & partium nervosarum solet præcavere & sistere: 69. fluviatiles etiam contusi fundunt succum, qui expressus & cum multiplicatis linteis applicatus, est conveniens. Si Erysipelas affligit vulnera, illinatur Erysipelas cum spir. vini in quo dissoluta sit theriaca, & adde parum salis absinth. vel inspergantur pulveres erysipelacei, ex flor. sambuci, Creta farina, cerussa, & similibus, qui loco prius c. spir. vini probè illito inspergantur. Si in vulnenum consolidatione observatur CARO LUXURIANS, (quod fit imprimis ex ignorantia chirurgi), non debitis Epuloticis curandum vulnus; tunc enim fibræ aut stamina nervea laxata partem reddunt spongiosam, unde pars ista recrefcit. Curatur autem adspargendo O. ustum l. crocum met allorum, aut illinat carnem luxuriantem c. unguento Aegyptiaco: præ reliquis conveniunt ∇æ virides, inter quas excellunt ∇. viridis Plater. Hartm. & Barbett. Instar omnium sit lapis infernalis s. pulv. Dna in aqua forti solut. nempe fit ex ∇. purissima ~u ~i solutâ & denuò coagulata: fiant cryalli, & ex his pulvis, qui adpersus huic carnieam exedit statim, unde postmodum applicetur Emplastr. epulotic. s. cicatrizans. Interdum DOLORES GRAVES urgent ægrum vulneratum, qui varii sunt: quidam tertio aut quarto die superveniunt, quando vulnus incepit suppurari. Dolor verò p. n. & intensus quando supervenit partibus nervosis aut circa articulos læsis, it. dolor qui supervenit cum quadam tensione, quæ tensio sunt incipientes spasmi partium nervosarum & tendinosarum: Hos dolores præter interna blanda inprimis sistunt externa, (quæ propria verò sint partibus nerveis), olea nervina conveniunt; qua propter

℞. ol. lumbricor. terrestr. ʒiv. destill. succini. lauri aa. ʒiss. M. f. ol. balsamic. quo illin. pars dolens, l. c. unguent. dialthea imprægn. balsam. Peruvian. & adde aliquot gutt. ol. destill. lavendul. seu spica. Funestum symptoma est



est, & subinde partium atrophiam relinquit, nempe FLUXUS SYNOVIÆ. Contra hunc optimum est *unguent. fusc. Würtz.* quia tamen præparatio est laboriosa, & propterea difficulter potest parari, & loco ejus *vitriol. tories calcinatum, & vitr. dulc.* speciatim ex *vitriol. martis*, & dicto modo cum hoc procedatur atque vult *Autor*; nempe imittantur in *acet. destill.* quoddam vulnerarium, & ita addatur *mel, flares aris*, sicque porro misceantur: I. & *ung. Egyptiac. simplex*, & adde *terrā vitrioli dulc. in acet. destill. dicto permixt.* quantum postulat ingredientium proportio, quod potest esse loco *ung. fusc. Würtz.* & *unguent. Egyptiac. magistralis comp.* ▽. ex 69. *fluv.* etiam est egregia ad sistendam synoviam. *Vel*

& pulv. castor. ʒi. pulv. lap. calam. off. sepiæ, mandibul. lucii piscis aa. ʒii. Spodii, terr. sigill. ana ʒiſs. M. in forma *pulveris*, adſperge vulnere Synoviam ploranti.

Tandem, si superveniat CONVULSIO partibus vulneratis, magnum imminet periculum ægro, ne inter has *epilepsia* superveniens eum interimat. Causa semper est in parte læsa. Præter *interna spasmo resistentia*, & in specie *specificæ Cephalicæ succinata & salia volat.* ex regno animali, externè investiganda est *causa*, & si adest *punctura*, læsio curatur, ut supra dictum; si *incisio nervi*, non tamen perfecta, necesse est, ut per transversum discindatur nervus aut tendo; melius est enim, partem sensu privare, quàm ægrum vitâ. Conveniunt *linimenta* hoc in casu, item *balsam. Peruv.* & *ol. destill.* ordinariò supervenire solet ATROPHIA, de quâ jam actum, vid. *Würtz.* & excellit ejusdem *arcanum aluminis ex alum. plumoso.* FEBRES quoque superveniunt vulneribus, eaq; omnes sunt *symptomaticæ*, quas præcedere solet sensus ardoris in vulneribus. Cura per remedia *acidum* in vulneribus *peccans*, & *sanguinem inficiens absorbentia & corrigentia* expedienda; propterea primatum obtineant *ocul. 69.* in vino l. *acet. destill.* propinati: ʒ. *diaphor. Corall.* & *Magister. Corall.* cum *succ. citri*, \*cum & n. \*ci cum debitis *mixtur. vulnerariis*. Si ardor & sitis nimis urgent, ad o. accedendum est, & fumatur l. o. *trum purum* l. o. ʒ. *niatum*, l. fiat *Iulep.* ex ▽. *font.* cui *syrup. rib. & berber.* additus fuit: add. parum de n. *vitriol. dulc.* continuentur internè l. *cancrina* l. ʒ. *ialia fixa*. Hæc omnibus vulneribus applicari possunt, partium externarum, & mutatis mutandis, internarum. Quædam autem monenda sunt de VULNERIBUS PECTORIS & CAPITIS; In vulneribus PECTUS PENETRANTIBUS l. PULMONES LÆDENTIBUS sanabilibus, observandum est, ut semper habeatur respectus & metus *pleuritidis imminenti & peripneumonia*, unde internis remediis hos affectus curantibus tam præservativè, quàm curativè semper insistendum est. (2) Quod etiâ in his vulneribus subinde necesse sit, ut applicentur *turunda*, ut sanguini & sanici pateat liberior exitus, ne superveniat *Empyema*. Hæ turundæ parandæ sunt, ut habeant extrinsecus *ansulas*, ne possint intrudi, unde etiam applicandæ sunt sub *expiratioe*. (3.) Obs. etiam, quod in hisce partibus vulneratis semper sint feligenda talia remedia, quæ simul habeant vim *diureticam*, aut portionibus vulnerariis *diuretica*



addenda sunt: Observatū enim est, quod optimē subindē sponte, subindē arte, in vulnerib. pectoris tā sanguinis grumi, quā pus & sanies evacuata sint à natura *per copiosū urina fluxum*: propterea hic videat Medicus opus naturā: (4.) quod ea vulnera, quæ inferiores costas penetrant, infra septimā Costam, sint simpliciter *vulnera abdominis*, non *pectoris*, quia non penetrant diaphragma: Unde etiam nullum signum læsi pectoris ex respiratione læsa potest haberi, sed potius *abdominis parthematia* investiganda erunt. Quod attinet *CAPITIS VULNERA*, de his paucis: Qui plura cupit, adeat limatissimum scriptum Petri Paaw. *anatomicus succenturiatus*, qui est *commentar. in Hippocr. de vulner. capit. Myrrh. in obs. Sculter. in armament. in obs.* Vulnera *CAPITI inflicta* sunt l. *casim* l. *contusim*. Vulnera capitis *casim* inflicta lædunt vel saltem partes extimas, supra cranium, vel simul cranium, ut tamen non penetrent universum, l. dividant etiam cranium & meninges, l. m. ipsum cerebrum. In omnibus capitis affectibus *alvus sit aperta*. In specie verò si *vulnera* saltem sint *superficialia*, facillimē curantur l. *hyperic.* l. *bals. peruv.* vulneribus imposito desuper *Empl. de beton.* l. *simplic.* l. *Emplastr. seq.*

2. *Emplastr. de beton.* Gummi. *tacamah.* aa. q. f. malaxetur c. *bals. Peruviano*, l. sola sufficiunt: Loco hujus sit *Empl. de Gummi heder. Alex. Bened. vid. Heiner. ab Heer.* Sin verò *vulnus cranium* lædat, non tamen penitus perforet, necesse est, ut habeatur ratio cranii læsi, & sic inspergatur cranio pulv. ex *rad. Iridis, Aloë, Myrrh. c. spir. vini imprægnat.* l. pulv. tantillum *ol. destill. terebinth.* imprægnat. Hi cranio læso inspergantur, ut impediatur ejus corruptio aut caries, desuper vero imponentur filtra sicca: *Caveamus* etiam in cranio læso à quocunque *unctuoso* aut *viscido* aut pingui; disponit enim cranium ad cariem. Si *vulnera* autem penetrant, & cranii dividunt, & meninges lædunt, necesse est, ut *hemorrhagia interna* maturē sistatur, quod fit *pulvere Galeni*, ex *Aloë, thure & album. ovi conquass.* quibus parum *bol. armeni* addendum. *Hemorrhagiā* sedatā sufficiens est natura; cujus opus ut adjuvemus, immittantur intra cranium linteola, imprægnata tantill. *ol. ex terebinth.* l. *bals. Peruv.* l. *Rob. juniper.* ut quasi odore tenus afficiatur cerebrū ejusq; membrana, & disponantur melius ad consolidationem. Ipsi cranio læso supra dicti pulveres applic. & foveatur linteis siccis. *Vulnera* verò curantur *externè* per *balsam. vulnerar.* In usu est, ut cerebro læso applicetur *oleum rosarum*, sed malè, quia talia membranā lædunt. *Mel.* etiam applicatur, sed *convenit* saltem, ubi cerebrum corrumpitur & membrana incipiunt putrescere, tunc *mel* imprægnandum est, aliquot *gt. ol. destill. terebinth.* aliàs nocet. *Vulnera contusim* facta sunt l. *superficialia* l. *graviora. Superficialia* parum habent in recessu: Illin. loco contuso *ol. hyperic.* impræg. c. *ol. destill. anisi.* Si verò sint *graviora*, ut magnus tumor immineat, considerandum est, an spes sit insensibiliter posse discuti: Si hoc est, fiat; si non, *aperiatur* in principio, quod observandum, ut contuso suppurata quantocyus *aperiatur*, ne pus ex retentione acius factum pericranium & cranium erodat, & cariosum reddere incipiat. Si verò *contusio* fuerit *gravior*, est vel sine vulnere, &

tunc



tunc modo dicto curetur: *Vel* cum vulnere, & tunc est *vel* sine cranii læsione, *l.* cum læsione. *Contusio* gravior cum vulnere, sine cranii læsione curatur more reliquorum vulnerum contusorum, nempe *digestivis & suppurantibus*, pro quo casu præ reliquis commend. *unguentum* seq. *℞.* terebinth. destil. gumm. Elemi aa. *ʒiʒ.* pingued. Castor. *ʒii.* porci antiq. *ʒj.* M.

Si verò *cranium simul fuerit læsum*, hujus læsiones admodum sunt variae: Nam interdum sit, ut cranium ex contusione deprimatur, & nunc cum, nunc sine fractura: *Sine fractura*, in capite infantis, quorum ossa sunt mollia & possunt cedere; *Cum fractura*, in adultis, quorū durius cranium. Porro *gravior contusio capitis*, quæ *cranium lædit*, istud interdum *findit*, *l.* in loco contuso, *l.* in loco opposito. *CONTRA-FISSURA* nunc penetrat utramque laminam, nunc externam, illæsa internâ, nunc internam, externâ, sanâ. Hic observand. est, ut cognoscatur *DEPRESSIO CRANII & FISSURA*. *SIGNA* desumuntur (1.) ex symptomatibus (2.) ex causis lædentibus (3.) ex ipsis sensibus: *Symptomata* sunt multiplicia; in specie *vomitibus bilis*, *vertigo*, *sanguinis per os*, *nares*, *auris* & simil. *effluxus*, *subitanea obmutescencia*, & brevi superveniens *delirium*, *convulsiones*, *Paralysis*. *Symptomata* hæc *superveniunt nunc* mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto l. septimo die, ubi levior. *Origo* horum symptomatum est, quod festuca pungat cerebri membranas, *l.* quod sanies destillet in membranas cerebri, & acrior facta easdem vellicet, *l.* sanguis grumofus intra cranium, ex læsis meningibus collectus, inferat hæc symptomata. 2. Suspicio etiam desumitur à majoribus instrumentis: 3. Visus ipse. Præter apertionem cranii, nempe præter specillum & ocularem inspectionem, *ad fissuras cognoscendas* est experimentum *Catapl. ex farina fabarum* capiti raso applicatum: hoc, ubi non sunt fracturæ, exsiccatur, secundum ductum verò fissuræ non exsiccatur. *Borell. c. 2. obs. 20.* Ubi incisi sunt chirurgi, jubent, ut ægri accipiant funiculum, quem firmiter tenent inter maxillas, si ita æger habeat fissuram in cranio, in loco fisso percipit dolorem, quod etiam fit, si fortiter contineat mandibulas, aut nucleum ceraforum frangat. Quo in casu ut plurimum necesse est, ut *perforetur cranium*, ut sanguini effuso, & saniei pateat exitus, ubi etiam *festuca*, si quæ sint, removeantur & tollantur. Unum adhuc observandum, quod observavit *Glandorp. in specul. Chirurg. obs. 4.* nempe, fieri interdum, ut in graviore capitis contusione & læsione, ex sanguine, collecto intra meninges etiam integras, generetur pus, quod graviora infert symptomata, ubi aperiendum cranii & dura mater scalpello, ut sanies educatur. Ad hæc *obs.* quod nempe vulnera interdū capitis simplicia post 4. l. 7mum diem contrahant *dolores*, hinc *rigorem & febrim*. Hæc si superveniat in graviore capitis læsione & contusione, suspicio fracturæ cranii & fissuræ, adeoque necessum est, ut cranium aperiatur *trepano*. Si non appareant, non statim debent perforari, quia dicta symptomata etiam interdum ex alia causa superveniunt: nisi ergo adsint alia symptomata, quæ cranii fracti l. fissi suspicionem inferant, non statim ad trepanationem accedendum est. Præcipitur etiam,



ut in trepanatione vitetur musculus temporalis; interdum tamen quidam Chirurghi etiam hunc musculum per transversum secant, vid. *River. obs. comm. & Borell. c. 2. observ. 20.*

## ULCERA.

ULCERIS nomine venire solet *solutio unitatis*, quæ fit *ab acredine corrodente & absumente substantiam partis mollis pariter ac dura*; & si fit in molli parte, dicitur *ulcus*, si verò in dura, *caries*. Corrodens hoc in ulceribus est *acre acidum*, quod pervertit alimentum partis proprium, illudque in excrementum acre & saniem transmutat, cujus mitior species est pus; Illudque acidum simul fibras & carnosas partes sensim sensimque absumit, & depascit in abscessibus & vulneribus, quæ faciliè in ulcera degenerant. Hoc per se patet. In his autem alimentum partis corruptum acefcit, & labiis vulneris adhærens sequens alimentum balsamicum simul pervertit & corrumpit, tandem acidum in excrementum capit & ulcus augmentum. *Acidum hoc oritur* (1.) *ab alimento partis proximo corrupto*, cujus corruptionis comes est inseparabilis acor, uti in ambustionibus, & externis admotis, it. ipso ulcere contagioso, (2.) *oritur ab aciditate peregrina, in sanguine l. lymphæ*, quâcunque occasione oborta, quæ aciditas à natura in parte quadam, quacunque ex causa, sæpius defigitur & quasi adimpletur, unde alimentum partis proprium partim pervertitur, partim corroditur, & in ulcus degenerare solet; Manifestum est hoc in ulceribus sponte natis in *scorbuticis, cachecticis l. lue & a laborantibus* & simil. Patet etiam in *abscessibus ab inflammatione suppuratâ* natis, ubi sanguis stagnans ab acido fermentativo transmutatur in pus, ita tamen, ut præponderet acidum, & alimentum partis corruptum acefcit, quod labiis abscessus adhærens, sequentis ulceris propriè sic dicti autor est, (3.) *ex vitio ipsius sanguinis* ipseve permixti excrementi, aut alius cujuscunque humoris p. n. in corpore stagnantis, à quo in parte quadam nutrimentum ineptum parti nutriendæ suggeritur; unde vitiosus acor originem habet. Patet hoc in ulceribus, quæ aliis morbis superveniunt. Acidum hoc quacunque ex causa obortum, alimentum proximum, quod ad partem distribuitur, corrumpit, unde hoc nutrimentum simpliciter acefcit, & fit parti alendæ hostile, & ulcus ejusque fermentum acidum perauget, hujusque activitatem validiorem reddit. Acidum hoc *confirmatur* ulterius ex eo, quod *Emplastra ulceribus admotæ*, nisi interdum proprius medicamenti odor, vel fœtor puris prævaleat, si removeantur, *acidum subtile spirare soleant*. Item ostendit hoc acidum *corrosivus dolor*, quæ corrosivitas in omnibus ulceribus, speciatim partium mollium, non nisi ab acido deducenda venit; quia alcalia caustica non tam corrosionem, quàm partis mortificationem cum nigredine ejusdem inducunt. Hinc etiam in *ulcerum cura primatum ducunt Metalla, caput mort. vitrioli, Gialia, &c. & sim. it. vegetabili vulneraria vi alcalina prædita*. Jam verò prout l. major l. minor est aciditas, aut etiam varii saporis deprehenditur, ita varia etiam est exinde orta alimenti corruptio, & exinde contumax etiam plus minùs ulcus, quod aut *saniosum*, aut *vermiculosum*, aut *cancrosum*, aut *phagedenicum*, aut *dolorosum*, aut



aut purulentum esse solet, pro varietate acidi specifica. Præ cæteris, observandum quod *nervear. partium ulcera* uti plus oriuntur, ita etiam *omnia sunt pejora & difficiliora curatu.* ob acidi in his vulneribus majorem gradationem: Nam alimentum partium nervosarum, cum sit admodum temperatum, nec imprægnatum sale volatili acri, ut sanguis, ob id facile corruptum & alteratum acescit, & ob defectum sufficientis correctionis fit acrius, ipso *u* animali subtiliori in his partibus celerius aut distributo, aut facilius exhalante. Sanguinea verò partes abundant sale volat. acri, unde difficilius iis inducitur acor, & facilius corrigitur, unde *ulcera partium sanguinearum sunt faciliora,* quàm *nervearum.* Unde & *in glandulosis locis,* cum in his aliquid acidi subtilis secerni, & lympham constituere pateat, *contumaciora, magis dolorosa, ac corrosiva oriuntur ulcera,* & quæ facillimè degenerant in *fistulas* ex quacunque causa sint producta. Imò hæc ulcera frequentius *canerosam malignitatem* solent habere conjunctam. Lympha his in locis glandulosis elaborata acido subtili sale videtur imprægnata, ob id facile acidi corrosivi in ulcere accipit impressionem, unde *ulcera & vulnera articulorum redduntur difficiliora,* propter facilem lymphæ aut sanguinis corruptionem & acescentiam. Acor ergò talis aut à vicino ulcere ad os subiectum delatus, aut ex alteratione ipsius ossis ab aëris contactu ortus, aut etiam ex aciditate peregrina ad os c. alimento distributo enatus os ipsum corodit, & cariosum reddit, unde *ulcera cum ossium carie conjuncta sunt simpliciter immedicabilia,* nisi ossium caries corrigatur. De cætero observanda est DIFFERENTIA; nempe vel immediatè & primariò ab aciditate peregrina afficitur os, & hujus occasione demum ulterius partes molles ossi instrata afficiuntur, & postmodum harum contagio ipsum os, quod fit in ulceribus cum ossium carie conjunctis. Porro ex nutrimento corrupto oritur sanies, pus & sordes; si ergò ipsa sanies per interstitia partium latius serpit, & partes molles cum staminibus duris exedit, *ulcera vaginosa, sinuosa* infert, quorum orificia aut etiam canales in locis membranaceis impr. & nerveis indurantur, & in callum quasi ossaceum transmutantur: Unde fistulam & ulcera fistulosa constituunt. *Occallescentia hæc & durities* circa membranas, imprimis in orificiis horum ulcerum sinuorum nata, oritur ex *acido vitioso satis intenso,* dictas partes corrugante & pederentim indurante ac in callum, s. cartilaginem transmutante: Exindè orificia fistularum semper sunt angusta. Prout ergò proximū partis alimentum ab acido ulcerū facile impressionem recipit, exindè plus minus diuturna l. maligna ulcera fiunt; Hinc in *hydropicis, cachecticis, lue venerea* inquinatis, aut iis, quibus aut *hemorrhoides,* aut *meneses* suppressi stagnant, talia ulcera solent esse graviora, propter alimenti partis corrupti facilem impressionem ab acido. Hinc dicitur, ulcera esse conjuncta cum affluxu humorū. Facile verò corruptio hujus fit propter defectū etiam nutrimenti partium *ruo-* sarum & salium volat. quæ cum sint contraria acido fermento, ulcerum vim infringunt. Cum verò his destitutum sit, facile concipit corruptionem ab acido inductam, unde *ulcus fit manans & difficulter curabile.* Porro utut ulcera curen-



tur, acidum tamen istud si non fuerit correctum ritè, sed si ejus tantilla licet proportio, post curam, in ulcerum fundo, l. labiis, l. osse carioso relinquatur, ulcus semper recidivare solet, l. si fiat, ut sub cura ulcerum tantillum ejus contagiolum per sanguinis l. lymphæ motum aliorum deferatur, in alio loco pervertit nutrimentum proximum, & per metastasin ulcus ex uno loco in alium transfert : Sic in *Sculteto* exemplum est ulceris præposterè curati, unde postmodum ulcus in pectore enatum fuit : Sic & *Fabr. Hildan. c. 3. obs. 39. observavit* ulcus inveteratum incurere sinuosum, quo intempestive curato supervenit pleuritis, ubi materia simillima per os fuit rejecta, ac ista, quæ ex ulcere cruris emanaverat. Ordinariò *v. ulceribus adjuncta sunt hæc tria.* (1.) *Cavitas* ab acore exedente, & labia ulceris depascente plus minus inducta. (2.) In partibus carnosius *pus laudabile* ex sanguine. (3.) In partibus nervosis *ichor*, seu *sanies tenuis*, aut saltem pus minus laudabile, hoc est, quod acrius, tenuius, & minus albicans. Nam rarum est, quod sine puris vestigiis reperiantur *labia ulceris sicca*; fit hoc tamen interdum, quando nempe ulcera aëri aperto aliquamdiu fuerunt exposita; l. quando loco suppurantium vel mundificantium intempestive exsiccantia cicatrifiantia fuerunt applicata. Si citra tales causas manifestas ulcus sponte & subito evadat *siccum*, l. *minus humidum*, *malum signum* est; nam l. innuit imminuentem mortem totius: *vel* si ulcere ex succo accedat labiorum aliqualis *livor*, aut *decoloratio*, est signum imminuentis *gangrenæ*: omnia enim ulcera, ut & fonticuli, si immineat mors, solent exsiccare.

**PROGNOSIS** Ex his facile est formanda de quocunque ulcere. Nempe fundamenta prognoseos in ulceribus desumuntur ex tribus circumstantiis (1.) *ab ipsa conditione ulceris*, an sit *simplex*, an *complicatum*, an *sinuosum*, *fistulosum*, *cariosum*, &c. nam hæc conditiones ulcus plus minus reddunt difficile, (2.) *ab ulceris excretis*, pure nempe & sanie: Nam, quò citius ulcus reddit pus, idque magis laudabile l. minus acre, candidum, mediocris consistentiæ, eò melius est ulcus; Contrarium est, si ploret saniem tenuem, ichorem, acorem flavum & foetidum, aut simil. (3.) *ab ipso subjecto ulceris* tam particulari quàm universali. Ratione subjecti particularis, ab ipso loco ab ulcere affecto, an sit carneus, glandulosus: Ratione subjecti universalis, an æger sit sanus l. non; an sit laudabilis constitutionis &c. hæc enim ulceris naturam & curam plus minus gravem ostendunt.

**CURA** Ex hæc tenus dictis facillimè patet, quòd cura ulcerum chirurgica in hujus acidi mortificatione consistat, quâ tollitur alimenti depravatio & partis ulcerosæ erosio: Reliqua ipsa natura agit, carnem generando, & foramen occludendo. Quæ aciditatem corrigere valent, sunt imprimis in regno *vegetabili* & *minerali*. Illa agunt positivè, temperando & delendo acidum, per *salsum volat. alcalinum*, nunc occultum & temperatum oleosum, nunc manifestum & acrius. Hæc verò



verò magis privativè, absorbendo *acidum* istudque suo modo dulcificando. Sic ex *vegetab.* sunt *absinth.* *Menth.* *agrimon.* *Nicot.* *Myrrh.* *Aloë.* *spir. vini* & simil. Ex *miner.* *caput mort. vitrioli.* *saturnus.* & omnia *saturnina*,  $\oplus$ , *pompholyx*,  $\&\&$ ,  $\circ\circ$  *fixum*, & sim. Hæc dum destruunt *acidum*, ejus ulteriorem activitatem inhibendo, in simul excrementorum generationem seu alimenti perversionem sistunt, sicq; *ulcus nitidum*, & *carnem labiorum rubram sanamq;* reddunt, unde *detergentia* & *mundificantia* appellantur. In his tamen *detergentibus* & *mundificantibus* graduum observanda est distinctio, varianda nempe pro ulcerū varietate; In genere eorum quædam sunt magis *temperata*, quædam *acria*. A *temperatis* ceu inferioribus successivè inchoanda est cura ulcerum, ne acidi vigor per acorem contrarium effervescendo fiat malignus & *ulcus putridum*. Potius ergò *lenioribus temperatis* prius utamur antequam ad aciora descendamus, quæ *temperata* aliàs *digestiva* seu *pus generantia* dici solent, & hoc fiat in casu, ubi *ulcus* non nimis progressum est. Si verò *ulcus* jam est *putridum*, aut alio modo *malè affectum*, statim *fortiora detergentia* & *acria* usurpanda sunt. Temperata autem ista præstant hoc, quatenus temperant *acidum*, quo acido plus minus temperato, moderatâ ulceris fermentatione cum alimento partis, nascitur exinde excrementum melius, nempe *pus*, idque etiam meliori consistentiâ & colore manat. Hinc etiam hæc digestio suppuratio dicitur: Dum enim concurrunt hæc duo in ulceribus, alimentum partis mox pervertitur ab acido corruptivo, si excesserit; si verò moderatum sit, à nutrimento partis aliqualem percipit resistantiam, & ita mutuo concursu coeunt in *pus*. Temperata hæc sola absolvere possunt ulcerum curam: *Ulcera* enim *corrosiva*, l. *putrida*, l. *cancrofa*, *virulenta*, validiora & magis appropriata, nunc *mercurialibus*, nunc *ol. volatilibus* permixta remedia requirunt: Observetur tamen *partis affectus conditio*: Nam *partes sanguineæ* requirunt magis *temperata*, *nerveæ* verò paulò *acriuscula*. Frequentius fit, ut præter simplicem ab acido corruptionem partis, concurrant putredo aut corruptio in ipsa parte, ubi *putrilago* simul *cadaverosa* & incipiens *gangræna* solet adesse. In his ergò fortissimis omne *putridum* absumendum, & *putredinis* processus inhibendus; hæc post operationem peractam subito removenda & absumenda sunt, ne partes sanæ etiam absumantur aut afficiantur: Factâ verò acidi abstersione alimentum partis sive ejus *balsamum* sensim labiis ulceris denuò agglutinatur, & partem cavam novâ carne replet, dum *fibræ* & *vascula* longius extensa, in æquali tamen cursu *cicatricem* solent inducere. Verum ne impediatur partis deperditæ restauratio, sed potius, ut promoveatur naturæ motus in generatione carnis, (nam facillè impeditur, quando nempe sub deligatione ab aëre ulceri certa alteratio inducitur, l. quando ab interno vitio nova alimenti enascitur corruptio) post *ulcus mundificatum*, dum caro succrescat, *glutinantia*, scilicet *balsama vulneraria* applicanda, quæ nempe denuò solent consolidare *ulcus recens*, & *mundificatum* carne replere. Hæc nempe

temperata



temperata suâ naturâ parumaper adstringunt, & balsamum naturalem conser-  
vant, omnem acorem delent, imò, dum adstringunt, impediunt, ne caro recens  
laxior aut mollior, aut nimis superflua luxuriat. Eadem remedia glutinantia  
aut consolidantia, sed magis adhuc adstrictoria & humidum magis exsiccantia  
cicatricem firmam generari adjuvant, unde Epulotica sive cicatrifiantia appellantur:  
Nam vulneraria balsamica, sarcotica & epulotica gradualiter saltem differunt;  
unde in corporibus delicatulis & mollioribus cicatrifiantia sunt in corporibus  
duris sarcotica, & vice versa. Externis his simul adjungenda sunt Interna, acidi  
tam inprimis viis, quàm ulceribus correctiva & destructiva; quæ nempe alcali plus  
minùs acri pollent; qualia ex vulnerariis potionum formâ parari solent, quibus  
pro usu interno remedia ex lignis sudorifera conducunt, item Fialia fixa, viperina  
& serpentina, & sim. Remedia ergò ferè sunt seqq. Digestiva quidem sunt ol. rosar.  
butyrum recens non salitum, majale, vitell. ovi, gummi Elemi, mel, terebinth. thus, mastix,  
farin. tritic. hordei, fœn. græc. & sim. Ex his u. g. fit ung. digestivum.

℞ terebinth. ℥i. vitell. ovi num. i. mell. rosar. ℥ss. ol. hyperic. ℥i. M. pro  
linimento l. ung. digestiv.

Vel: ℞ terebinth. ℥i. mellis ℥ss. succi apii ℥ii. farin. hord. fœn. græc. aa. ℥ss.  
myrrh. parum. M. S. ut antea.

Pus ubi genitum est, & quidem laudabile, simul mundificantia & acidum in ul-  
ceribus peccans corrigentia sunt admiscenda & usurpanda, eaque aciora, mi-  
tiora, positivè, privativè operantia, pro conditione ulcerisque varietate: Talia  
sunt, rad. apii, ejusq. succ. aristoloch. utraq. rad. bryonia, plantaginis, tormentille, cu-  
cumer. asinin. gentian. hellebor. nigri, herb. & fol. absinth. apii, origani, chamadr. plan-  
tagin. scrophul. beton. veron. lign. sassaf. bacc. juniperi, farin. fabar. lupinor. cicerum.  
purgantia, externo usu, inprimis scammon. saccharum, mel, aloë, syrupi vulnerarii,  
lixivium, eminet ∇. calc. viva, benedicta. Spir. vini, extracta vulneraria cum spirit.  
vini, animalium urin. fella, mumia, succ. 69. fluxiat. sterco. canis, myrrh. euphorbium,  
item sulphur & omnia sulphurea, Hnus & omnia Hnina, nempe minium, cerussa, li-  
thagyr. H. ustum, crocus ♂. adstringens, & crocus vitrioli martis per Trionem parat.  
terr. vitriol. dulcis, tutia, es ustum, O. crudum & calcinatum, ⊕. ⊙. ⊙. in specie  
fixum, decoctum scoriar. reguli ℥ii, butyr. antimon. mercur. dulc. mercur. precipitat.  
arcan. Crollii ⊕. ex his parata ∇. viridis, ol. nicotian. terebinth. cera, ovorum, ol.  
Fri. balsam. sulphuris, Empl. dia sulphuris Rul. bals. Peruv. ung. Dialth. camp. Diapom-  
phol. Egyptiac. & fuscum Wurtzii, empl. de beton. de gratia Dei, divinum, saturnin.  
Myns. Ufus horum (1.) in forma injectionis in ulcera, cancrosa, sinuosa, fistulosa.  
(2.) unguentorum. (3.) Emplastr. v. g. fit injectio in ulcus sinuosum & sordidum:

℞ fol. nicotian. m. ii. summitat. absinth. herb. veron. ana m. j. rad. aristol.

O. ℥i. baccar. Junip. ℥ss. O. crud. ℥iii. coque in s. q. ∇. ferrarior.  
Colatura fervetur usui, pro injectione in ulcus dos. ad ℥i. plus minùs, pro ratione  
quantitatis liquor, injiciendi, & capacitatis ulceris. Sit ung. mundific. ulceris:

℞ succ.

℞. succ.  
adde porro  
pro consisten  
℞. Un

Inter hæc au  
benigna, ter  
binth. bals.  
presso para  
gium Emp  
viarum sol  
ramen dele  
dicta bals  
respiciend  
putridis vi  
fuscum Wi  
buscunque  
℞. vi

quod opti  
grediatu  
stantiarum.  
℞. M  
Hisce liqu  
danda & ci  
℞. c

Empl. egr  
movendan  
dulcis, si c  
etiam & ni  
Additur h  
destill. pro  
laril. viper  
lignis: Essen  
dicta sudor  
cundum I  
Pars



R. succ. nicotian. plantag. absinth. beton. mell. rosat. colat. ana ℥iv. l. v. coque, subigeprobè lento igne, add. terr. vitriol. dulc. l. loco hujus croc. mart. mercur. ꝑ. aloës, myrrh. flor ꝑ. ana ℥i. M. probè, adde porro terebinth. Venet. q. s. pro consistentia unguenti, balsami Peruv. q. pl. pro consistent. unguent. plus minus spissi. *Unguent. Sarcoticum.*

R. Unguent. diaphor. de tutia ana p. j. Empl. dia. sulph. Ruland. p. ii. Malax. c. f. q. ol. nicot. fiat unguent. l. Empl. applic. c. petiis, si est unguent. l. inducatur linteis, si est emplastr.

Inter hæc autem remedia pauca sufficiunt, & secundum Helmont. ad ulcera benigna, terr. vitrioli dulc. ad maligna vero. ○○. Eminent etiam bals. sulph. terebinth. bals. sulph. l. communis, l. antimonialis cum oleo lini aut nucum jugland. expresso paratus, vide de hoc Polemann. de sulph. philosoph. ubi habet simul egregium Empl. ubi tamen loco vitriol. dulc. possunt substitui l. cap. mort. vitrioli elixiviatum solum, l. addito tantillo virid. aris. convenit etiam balsam. Peruv. habeatur tamen delectus, an pinguis convenient, an non? si possunt ferre, conveniunt dicta balsama; si non, sufficit mel cum succo vulnerario. In rebellibus ulceribus respiciendum est ad mercur. vivum, à quo ꝑ. fuerit abstractus: In ulceribus putridis virid. aris cum aceto destill. est optimum; unde unguent. Aegyptiac. apostol. fuscum Wirtzii, conveniunt. Sic ex vitell. ori & melle fit unguent. utile in quibuscumque vulneribus.

R. vitell. ovor. ad durit. coct. num. iii. mell. ℥i. M. cum haustu vini, fiat unguentum.

quod optime purgat ulcera, & etiam à gangræna præservat. Si ulterius progrediatur malignitas, adde mercur. præcipit. ℥ß. plus minùs, pro ratione circumstantiarum. Emplastr. Polychrest. cicatrizans est.

R. Mastich. ℥i. terebinth. ℥iii. ceræ flav. ℥iv.

Hisce liquefactis adde mast. & redigantur simul in Empl. præstans ad consolidanda & cicatrifanda ulcera. Non cedit huic ad consolidanda ulcera:

R. calcis vivæ bis l. 3. lotæ & parum exsicc. q. pl. M. cum ol. lini q. s. tingatur cum bolo armen. l. bolo rubro ad carneum quasi colorem f.

Empl. egreg. in ulceribus vetustis. Internè etiam quædam adhibentur ad promovendam curam externam. Inter universalia ergo purgantia eminent mercur. dulcis, si crebrius usurpetur cum extr. hellebor. nigr. l. panchymagog. Croll. quin etiam Snialia, tam fixa, quam in specie tinctur. Sniales genuinæ nobiles sunt. Additur his usus frequens ocul. 69. cum Myrrh. & croco. corall. & oc. 69. cum aceto destill. propinata: Tandem viperina, Essent. viperar. imprimis spiritus & ꝑ. volatil. viperarum continuo usu mirè conferunt: Quibus adde simul remed. ex lignis: Essent. lign. tinct. corall. cum alcali lign. imprimis decocta lignor. quæcunque, dicta sudorifera, usurpata multum conferunt. In specie quod attinet ulcera, secundum DIFFERENTIAM merentur considerationem: Ulcera quædam conjuncta



juncta sunt cum ossium carie, quæ caries interdum est manifesta oculo, interdum  
 sit manifesta specillo; si hoc, expiscatur fundus ulceris, & ibidem asperitas perci-  
 pitur, visui etiam patet, si os denudatum fiat pinguis, & successivè nigrum, & post  
 nigredinem etiam hinc inde perforatum. Prius est signum imminenti cariei;  
 sicut nigredo, perforatio & inæqualitas est signum jam perfecta cariei: Si verò  
 non possit conspici, suspicio est de ossium carie latente; sicut ulcera nequeant  
 ad perfectam cicatricem perducì, sed etiam optimè suppurata subitò recidunt:  
 Non enim potest firmiter conglutinari caro cum osse carioso, quia sanies ex osse  
 plorans semper novum ulcus generat, quod, etsi consolidetur, caro tamen, quæ  
 ulceri supervenit, est flaccida, mollis, minùs dolens, & simul sub ipso ulcere sanies  
 quæ effluit, longè copiosior, pinguior & acrior est, quàm in ulcere rectè se habente.  
 Si ergò adsit tale ulcus cariosum, impossibile est, ut consolidetur, quin potiùs conti-  
 nuò recidivet, nisi priùs caries ossis sit ablata. Internè ergò conveniunt universalia  
 cum suis pro hoc scopo externis: Ut autem cariosum ulcus melius possit tractari,  
 l. separari, congruum est, ut labia ulceris non nihil dilatentur l. scalpello, l. immis-  
 turundis intumescensibus: Tales sunt, si volumus acius procedere, ex rad. gétian.  
 si non, ex Medull. samb. compressa, hæc enim imbibit copiosam humiditatem, unde  
 intumescit & orificia ulceris aperta reddit. Pòst etiam consideratur, an caries ul-  
 ceris sit talis, quæ possit remediis cedere; an v. necesse sit adhibere remedia chirur-  
 gica: Imponatur ergò cum petiis spir. vini probè rectificat. l. illinatur os cariosum in  
 loco cariei cum ol. caryoph. destil. ol. ligni Guajac. destil. l. accipiatur pulv. euphorb. &  
 inisurgatur ossi, impone desuper plumac. it. rad. Ireos, l. sola, l. quod melius, adjunct.  
 euphorb. De efficacia euph. vid. Riv. C. 2. obs. 73. It. Hild. C. 2. obs. 92. C. 4. obs. 21. & 96.  
 & C. 5. obs. 22. Et necesse est, ut os cariosum prius limâ rodatur & teratur, l. etiam  
 scalpello, donec incipiant apparere punctula rubicunda, postmodum dicta remedia  
 applicentur. Ad cariem funditùs delendam accip. ferrum candens, & os simplex ca-  
 riosum tangatur, donec suspicio est, vim ferri sufficienter penetrâsse; postmodum  
 spir. vini aut alia applicantur tamdiu, donec os cariosum sponte secesserit ab osse  
 sano, postmodum os consolidetur spir. vini, myrrh. & aloë, & sim. Si verò in extremi-  
 tatibus fistularum reperitur os cariosum, optimo cum consilio injicitur solutio Grii  
 dulc. cum aq. plantag. quod & os cariosum corrigit, & etiam fistulæ ad meliorem  
 mundificationem succurrit. Singulare est, quod ad os cariosum comendat Tulpus  
 l. 1. c. 39. nempe de ol. ziti, (per quod forsan intelligit butyr. Znni,) cum ol. lini mixto,  
 mediante quo graves ossium caries notat se observâsse curatas. Unguentum etiam  
 Egyptiac. pulv. tereb. ad duritiem coctæ cum ung. fusca Würtzii hic profunt. Juxta  
 ossium cariem & inde nata ulcera rebellia, considerationem merentur ulcera fi-  
 stulosa cum callo in orificiis, siquidem si ulcus est profundum & cavum internè, si-  
 nuosum, si verò cum tali ulcere jungatur simul callus internus, oritur fistula. Callus  
 verò hic observatur, quod simpliciter in orificio ulceris ipsius, vel ipsæ cavitates  
 ulceris dicto callo sint obsessæ. Vlcus tale sinuosum, fistulosum nunc interius est unum,

utut



utut plura habeat orificia, *vel extrinsecus* habet orificium unum, utut interius in plures canales sit excavatum. Patet per se, saltem consideremus qualis sit fundus fistulæ, *an* desinat in osse, *an* in partibus nerveis quibusdam, *an* in carne, *an* in vena aut quadam arteria. Hoc potest tentari *vel* per speculum, *vel* stylum, *an* fundus sit mollis, *an* durus, *vel* si sinus fistulosi sint tortuosi, ut specillum sine dolore non possit immitti, *parentur candelæ cereæ* subtiles, ex cera & terebinth. quæ intrudantur, quæ sine dolore sinus & fistulas etiam cavernosas & tortuosas possunt penetrare. Si desinat fistula in partem nerveam, fundus est admodum dolorosus; si in carneam fundus mollis minus dolens est, & materia est similis puri laudabili: Fistulæ verò partium nervosarum plorant pus acre & tenue; si desinat in vas, signum materiæ est obscuri coloris instar facis, propter sanguinem; si ipsum vas erosum sit, subinde sanguis ex fistula profuit, vel rubicundus, vel obscurus; ratione vel venæ, vel arteriæ. §. FISTULÆ sunt difficiles curatu, propter callum, qui nisi auferatur, sunt incurabiles. Ante omnia ergo purificandæ sunt. Si prius orificium callosum fuerit ampliatur, quæ *ampliatio optimè* sit per turundam ex rad. gentian. paratam & immisam; vel dicta turunda adspargatur *pauco alumine usto*; si volumus acriorem habere, sic exeditur callus, & orificium aperitur. Hoc facto, præter remedia interna, ut omnia vulneraria, speciatim ex agrimonia, gentiana, centaury min. sabin. cum ocul. 69. item præter usum milleped. Externe ampliato orificio ad mundificandam fistulam, & exedendum callum, varia in usu sunt remedia plus minus acria. Fiet ergo remotio calli, & fistulæ mundificatio, vel remediis pharmaceuticis vel chirurgicis. Quoad remedia, sunt injectiones ex  $\nabla$ . calc. viva, l. sola, l. cum spirit. vini acuatæ, in qua, si mercur. dulc. solutus sit, erit remedium eò potentius, mercur. dulc. simplex in  $\nabla$ . plantag. solutus, in fistulis est egregius. Item succ. nicotian. cum spirit. vini, & pulv. exuviar. serpentum per syphonem injectus mirabiliter sanat fistulas: vel injiciatur succ. 69. fluviatil. cum succo fol. nicot. qui vel soli, vel addito mercurio dulci injecti in fistulas, egregiè easdem mundificant. Conducunt etiam turundæ factæ ac illitæ cum ung. fusco Felicis Würtzii, item cum ung. Egyptiac. balsam. sulphur. terebinth. vel solus, vel cum camphora mixtus fistulas mundificat, & callum absumit. (Alii commendant hoc:) ℞. mell. despumati ℥ii. coque ad aliquam glutinositatem, hinc dum incipit refrigerari, adde aloës, thuris minutim pulveris. ana ℥i. asæ fœrid. pulv. ℥i℥ diu terantur in mortario, fiat unguentum. His & similibus mundificentur & purificantur fistulæ, & detergantur calli, unde postmodum facillimè consolidantur. Si verò in malo pertinaciori, aut callo graviore non sufficiant, necesse est subinde, ut addantur mercurialia aut antimon. v. g.

℞. Ung. Egyptiaci ℥℥.

mercur. præcip. ℥j.

lixiv. ℥iv.

$\nabla$ . ros. ℥ii.

plantag. ℥iv. Coq; ad consumptionem tertiæ partis, quod reliquum est



fistulis illinitur, & ejus loco calloso, ut exedatur & absumatur callus, verum non semper, propter dolorem, & alias circumstantias possunt applicari, unde necesse est, ut tota fistula incidatur, & aperiat, facta a apertione dictis remediis callus vel exedatur vel etiam pedetentim sectione aufertur; ablato callo, ulcus tanquam simplex blandis mundificantibus & consolidantibus curari potest. §. Porro fit interdum, ut ULCERA sint admodum SORDIDA, PUTRIDA & varia forditiæ prædita, livida, nigricante aut simili abscessu, ac interdum evadunt plus minus CORROSIVA, quæ partes vicinas inquinant. CAUSÆ hujus ulceris putridi sunt variæ, internæ & externæ. Remedia, speciatim unctuosæ aut viscidæ applicata ulcus reddunt interdum sordidum, imprimis si sit ulcus partium nervosarum, in hujusmodi ergo ulceribus optimū est ut mundificentur cum spir. vini, quo dissoluta sit theriaca, ablato ulcere usurpandum ungu. Ægyptiacū, quod mundificat & detergit dicta ulcera, vel abluantur cum decocto calcis vivæ, cui adde mercuriū dulcem & post usurpationem ungv. de saturno Myns. de cera vel solo, vel quibus aliquantulum mercurii additum sit. Ut mercur. præcip. tutius externè possit usurpari, optima est præparatio Lufitani c. 4. cur. 51.

Mercurii viv. aquæ fortis ana M. & aqua fortis abstrahatur per retortam, pulvis præcipitat. remanens misceatur cum spir. vini, digeratur aliquandiu & aliquoties ab eodem abstrahatur, semper novum spir. vini affundendo, donec sponte exiceatur super mercur. loco hujus etiam arcantum corallinum commode potest administrari. Additur hic mercur. præcip. aliis quibusdam ungv. aut balsamis, aut emplastris plus minus, pro ratione circumstantiarum. Forestus habet exemplū ejusdem ulceris desperati, quod fuit curatum mediante stercore caprillo, vino veteri expulso, quod applicatum ulceri, istud curavit. §. Præter dicta hujusmodi ulcera putrida & sordida deprehenduntur etiam ULCERA DYSEPULOTICA, inveterata, alias etiā Chironia & Telephia. Ad hæc CURANDA optimum est, ut præmissis præmittendis, eluantur frequenter pomorum putridorum destillata, quæ vel sola vel cum linteis multiplicatis applicata, hujusmodi ulceribus, etiā plus minus depascuntibus, egrègia est; aut etiam si volumus hanc aquam ulterius redere medicamentoſam, in ea dissolve extractum aristolech. rot. cum spir. vini fact. vel loco hujus extracti dissolvatur mercurius dulc. vel solus vel cum saccharo saturni, in casu, ubi ardoris vel inflammationis adeſt suspicio: Ulcera si sic fuerint absterſa & elota, applicetur postmodum ungv. diapompholyg. vel nudum, vel cum g. mixtum, vel balsam. gris terebinth. & cum petiis istis ulceribus impopatur. Porro ULCERA subinde sunt phagæden. seu EXEDENTIA, quæ propriè loquendo sunt ulcera cancroſa. Quod attinet hujusmodi ulcera, si sint ipſe cancer, vel alia ulcera putrida, & corrosione arsenicali ad 69. naturā accedentia, hæc & similia, quæ occupare imprimis solent, vel loca glandulosa vel glandulis vicina, cautè tractanda sunt, nam si tantillo acri exasperantur, in deterius abire solent, si verò levioribus tractentur, frustra fieri eorum curationes solent. His ergo in casibus usurpantur saturnina, quæ dum acidū aere corrosivū depascens & exulcerans absorbendo solent mitigare hæc ulcera 69sa, v. g. terebinth. cum camphora mixt. ungv. dia saturni Myns. it. empl. quod habet Tulpus l. 1. c. 47. convenit etiam pulvis ex mercurio & saturno ana ibid. de scriptus: aut possunt fieri emplastra appropriata: Videatur Schroder. cap. de empl. ubi habet tale empl. quod multum habet in recessu, & si addatur aliquid mercurii vitæ, erit mirabile. Communi modo etiam ex saturno & succ. vegetabili, nempe solani, agrimonie vel geranii Rupertiiani mixt. in mortario plumbed fit linimentum ad ulcera 69sa satis proficuum. Ante horum tamen applicationem inspergatur pulvis busonum calcinat. vel sterc. felis, simpliciter 69. fluviatil. nutritæ; quo facto applicentur dicta emplastra saturnina. Verum in ulceribus 69sis malignis quæcunque frustranea præter arsenicum, quod est specificum ad ulcera



ulcera 69sa funditus sananda & curanda. Notus hinc *pulvis Benedicti* est, vid. in *Hartman. prax. chym. de 69. it. Epist. Horn. pulvis* hic paratur ex *fuligine furni, arsenico, & rad. ari prap.* loco hujus. convenit etiam ipsum *oleum arsenici fixi per deliquium*; arsenici fixatio cum nitro vid. in Schröder. unde quibuscunque remediis arsenicalia fixa admisceantur, vel in forma sicca vel humida. Si verò ulceri purificato denuò, jam carne replendo & cicatricem inducendo, superveniat uberior carnis luxuries, quod fit, quando applicata sunt emplastra vel nulla, vel nimis oleosa & pingua, quæ fibras reddunt laxas, hic optimus est *pulvis ex Gallarum cortice & granat. & spongia combusta* inspersus, vel *pulv. ex aloë, myrrha, cū paucis alumin. usto.* *erocus met. aliorum* pulverisatus & inspersus sine dolore carnē luxuriantem absumit. De lapide infernali superius dictum, etiam probè clorus nec corrosivus applicatus, prodest; sed in leviori casu sufficit *erocus metallorum*, in graviore lapidis infernalis. §. Inter CAUSAS ulcera inducentes etiam est ignis & inde inducta AMBUSTIO quæ est tritum graduum; quæ differentia probè consideranda, nempe vel solummodo calor & ardor externam epidermidem alterat, unde pedetentim emergunt vesiculæ aquâ acriusculâ plenæ, vel ipsa cutis comburitur, unde statim tales vesiculæ emergunt, & cutis in formas has corrugatur: vel præter cutim etiam caro adurit, unde cutis emortua in crustam degenerat, quæ separata profundam ulcerationem relinquere solet; in primo ergo gradu combustionis applicanda sunt remedia ordinaria empyreuma tollentia, qualia sunt imprimis ex calce viva, lora, l. lixivio ejus, calx viva rec. injie. in aquam ut 4. vel 5. digitos aqua emineat, ubi cessavit effervescencia, decantetur aqua, & affunde ol. ros. tantum, quantum sufficit, ut hæc mixtura congelescat in consistentiam butyri. Hoc linimentum est egregium. Solum *oleum linicum vitello ovi* mixtum, combustionibus recentibus illitum est optimum, *succus etiam allii, succo ceparū cum sapone Veneto & paucis sale illiti* egregie conferunt, vid. *Hildan. 6. 4. obs. 93.* Optimum est linimentum, si cum aceto solvatur minium aut lithargyr. solutioni filtratæ addatur ol. raparum rec. expr. q. s. ut coëant in consistentiam linimenti liquidi, quæ aliquandiu ducantur in mortario plumbeo, donec fiat gypseum, & asserva pro usu.

℞. *fluv. q. v.* contriti vivi in mortario injiciantur *butyro recenti* non salito, & probe despumato, & liquefacto, coque tamdiu ut rubescant, colentur; est experimentum, & sic evadet *unguentum efficax* ad recentes combustiones. Nam & *succus 69. fluv. aril. cum aqua sperm. ranarum* commode applicatur. GRAVIOR VERO COMBUSTIO alia requirit remedia, nempe in secundo gradu, tunc pustulæ maturè aperiendæ sunt, & *ungv. emolliens ex butyro recenti, ster. cor. gallinæ* & quæcunque imponantur, ut cutis corrugata denuò laxetur. ℞. Solutionis filtratæ q. v. adde ol. ovorum q. s. m. Aut ℞. *pulp. pomorū dulcium sub cineribus coct. Zij. farin. hordei, sænugræc. ana ʒss. croci ʒss. M. f. linimentum*, vel eataplasma molle, quod illitum & dolores sistit, & cutem corrugatam planam & mollem reddit.

IN TERTIO GRADU si eschara inducta sit, necesse est, ut apertis omnibus pustulis, primo & secundo die separetur eschara, unde escharæ medicatur *linimentum molliens & laxans ex mucilagin. sem. cydon. ∇. spermatis ranarū extracta*, adde butyrum non salitum, oleum lil. albor. & vitell. ovi, vel fiat tale emolliens ex butyro recenti bene in mortario plumbeo agitat. cum decocto malvæ, quod applicetur cum foliis brassicæ repidis, & sic facile separabitur eschara id quod sit primo vel secundo die. Si non fiat, necesse est ut incidatur eschara, & humoribus acrioribus exitus paretur, ne diutius coacti grave ulcus depascens inducant. Tumor latens postmodum evacuantibus, & ulcus factū con venientibus digestivis, mundificationibus & purificationibus curandū venit. Mundificatiū ulcus postmodū incarnetur, in specie cū emplastro de calce viva, nempe.

℞. *calx viva & in ∇. frigida sexies vel septies eluatur, postmodū ex lac cum ol. rosarum & vitello ovi. unguentum.*



TUMORES. Quod attinet TUMORES IN GENERE; nomine tumoris in genere intelligitur magnitudo parris præter naturalis, aucta in latitudine & profunditate. Ex crescentiæ ergo, ex quibus non tam major fit pars, quàm nova moles ipsi adnascatur, propriè non sunt tumores, ut ut ad hos reductivè pertineant. CAUSA ergo talis est, 1. *vel pars* quædam ex naturali situ in proximam partem propulsa *vel* dislocata, aliâ partem expellens, & est *nunc* mollis, ut in hernia, *nunc dura*, ut in luxatione. 2. Humor quidam replens. 3. Flatus distendens. HUMORES tamen *frequentissimè sunt* CAUSÆ. Humor ergo qui partem replet, *ineadem colligitur* de novo, qui antea non aderat, & quidem *vel* ob humoris motum trans partem impeditur, & inde natam stagnationem: Stagnatione fiunt tumores, si humorum motus per partium meatus & vasa subtilia impeditur, estq; hæc humorum stagnatio & inde natus tumor *vel* simpliciter *vel* secundum quid *morbosa*. Illa est in tumoribus vulgaribus, hæc habet locum in tumoribus criticis hisq; similibus, ubi promiscuè hæret tumor transiens. Hic secretionem quadam facta partes quædã ad hærent, aliis adhuc transmissis. Hinc illa stagnatio propriè dicta, hæc congestio dici potest. Jamin specie ex stagnatione *morbosa simpliciter* fiunt inflammationes, contusiones, erysipelas & similia, & quidem hæ omnes ex sanguine; sicut ex lymphâ stagnante tumores serosi, hydropes particulares, œdemata &c. Pertinet huc lacin mammis concretum, lochia circa uterum contenta. Ex stagnatione (2.) secundum quid *morbosa* fiunt tumores critici & abscessus hisq; similes, excrementis nempe febrilibus ob crassitiem aut coacervationem resistentibus, lymphâ verò tenuiori transeunte. SECUNDO MODO fiunt tumores per generationem novi tumoris, tumorem inferentis, quando alimentum partis proximum coacervatur & colligitur præternaturaliter, idq; l. corruptum *vel* plus minus alteratum. Corruptum, quando nempe fermentum quoddam vitiosum in parte adhuc hæret, quod alimentum degenerare facit in varios vitiosos succos, qui successivè collecti dant tumores, continuo in ulcera denuò degenerantes. Bubo venereus ex contactu scorti similem habet originem, ut & cancer mamarum, quin & lues venerea, ossa corrumpens. Quod attinet alimenti alterationem, ex alimento plus minus alterato in parte coacervato fiunt tumores ipsis partibus similes, ut ossium fractorum callosa ex crescentia, carnis in ulceribus ex crescentia, viscerum aucta magnitudo, Gangliâ & nodi. Ex alimento plus minus alterato fiunt tumores partibus dissimiles, ut polypi, verruce, & quæ ad has pertinent, cornua, fungi, it. tumores peculiari membrana inclusi; Quoad CAUSAS REMOTAS, stagnatio humorum quæcunq; contingit à vitio viarum, aut ob angustiam, aut propter humorem ad transeundum ineptum, propter sui *vel* crassitiem, *vel* particularum ad poros partis ineptam informationem. §. VIÆ PORIQUE SUNT ANGUSTI [1.] propter compressionem ab incumbente, [2.] ob constrictionem à vinculis, (3.) propter obstructionem à materia viscida mucilaginosa efficiente frigido, aut acido cōdensata, (4.) ob fibrarum partium contracturam atq; crispationem indeq; pororum angustiam in dolore à partium nervosarum irritatione. Humorum v. crassities evenit *vel* propter pituitam seu chylum crudiores vel viscidiores non ritè subactum, in prima vel secunda vel tertia digestionem, *vel* propter frigus humores in spissans, aut propter acidum



acidum humores coagulans, aut propter remedium denique externum male adhibi-  
bitum, eos in crassians. *Humoris* deniq; *particula* male figurata per poros transire neque-  
unt, quin hæc per præcipationem ex massa sanguinea separata, tantum densius ag-  
glomerantur, ut circa poros partium restitent & abscessum criticum inferant. Quo-  
ad CAUSAS REMOTAS TUMORUM Ex Novo HUMORE, oriuntur hi tumores, quan-  
do fermentum corruptum, ut plurimum vitiose acidum in parte latet, quod alimentum  
proximum degenerare facit in varios vitiosos succos, qui pædetentim collecti  
dant novos tumores, ut v. gr. in abscessu, carie ossium, ulceribus non ritè mundificatis  
&c. Alimentum verò minus alteratum dat tumores, & quidem ut plurimum per labo-  
res pori partium dilatantur, fibræ lacerantur, membranæ discenduntur, quibus de  
causis alimentum copiosius recipitur, ulterius retinetur & pædetentim colligitur,  
unde tumores oriuntur. Sic ex tendinis cujusdam in manu circa articulum exten-  
sione oritur ganglion, ex compressione fibrarum in pede clavus. Alimentum plus mi-  
nus alteratum dat ex crescentias membranis propriis inclusas, pro alimenti altera-  
tione nunc serum, nunc sebum, nunc mel in cavo continentibus. Pertinent huc polypus,  
verruca & sim. sic polypus facillè supervenit leni fibrarum in naribus exulcerationi  
quibus tandem excrefcit polypus. §. Ut CURENTUR TUMORES, necesse est remo-  
veatur continens ipsorum causa seu contenta materia, ut remotâ materiâ fibræ  
partiû & poris se denuò contrahant, & naturalis parti redeat figura ac consequenter  
functio naturalis. Per exemplum, in stagnatione humorû, pars liberatur (1.) restituen-  
do ipsi motum naturalem (2.) evacuando humores imediatè ex parte, aut resol-  
vendo, aut discutiendo, aut viam novâ aperiendo, secando & urendo. Istud stagna-  
tionibus simpliciter; hoc verò (nempe apertio tumoris) congestis magis convenit  
humoribus. Motus restituitur stagnantibus, si 1. vel viæ angustæ dilatentur, removen-  
do impedimenta externa, vel secundò materia coagulata obstruens solvatur, vel 3.  
dolor tensivus mulceatur, vel 4. ipse humor crassus tollatur. Tollitur hæc stagnatio 1.  
removendo externa incrassantia, 2. temperando frigus inspissans, 3. corrigendo  
acidum coagulans. Humores evacuandi sunt vel insensibiliter discutiendo, quod fit vel  
acidum coagulans temperando, vel tumorem per medicamenta subtiliora attenu-  
antia dissipando, vel apertione novi foraminis evacuando humores, vel cocti per suppu-  
rantia, vel à cruditate relictæ mitigati & alterati, si suppurationis perfectæ sint inca-  
paces. Illud tumoribus sanguineis; hoc verò reliquis tumoribus ex aliis occasionibus  
convenit. SUPPURATIO fit, quâdo in sanguine stagnante & congesto evanescunt &  
dissipantur partes ejus spirituosæ, quod verò remanet, spissescit, grumescit & acorè  
contrahit, unde effervescencia cum partibus salinis volatilibus oleositis in sanguine  
oritur, sub qua non tantum calor in parte sequitur major, sed etiam turgescendo tu-  
moris magnitudo sensim sensimq; in medio accrescit, unde dolor & tensivus &  
pulsatorius supervenit. Idem sanguis in pus corrumpitur, acido adhuc non-  
nihil prædominante, à quo  $\Theta$ . &  $\Phi$ . sanguinis præcipitantur, unde color iste al-  
bicans puris est. In hoc negotio suppurationis considerandum est acidum, nam  
hoc abundante, nulla fit suppuratio, sed vel corrosio, vel scirrhus, deficiente  
non



non opus est suppuratione. *Acidum* ergo cum sale volatili oleoso effervescens dat tumores per suppurationem curandos. Ex his patet *qualia medicamenta sint applicanda*; motum nempe humorum quæ restitunt, quæ dissolvunt, attenuant, & alcali temperato coagulatum tollunt: per diaphoresin discutunt primario, quæ participant de sale oleoso tam fixo quam volatili, nunc magis nunc minus temperato, quo pertinent fixius acidum absorbentia; suppurationē adjuvamus, applicando remedia temperata, humectantia, occulto tamen sale volatili constantia, plus minus tamen proportionem materiæ suppurandæ, imprimis tamen debent esse mucilaginosa, & suaviter laxantia, nam his acrimonia humorum suppurandorum temperatur, ut acido temperato salia effervescant minore dolore, & ardore inter se concurrant, & blandè se in pus salsum uniant & convertant; Ipsi remediis n. laxantur tensæ antea fibræ, unde dolor mitigatur. §. Si verò tumor suppurandus sit crassus, aut viscidus, aut acidus, v. gr. in lacte grumoso in marmis, applicanda sunt paulò acriora sale volatili magis imprægnata. Item APERTIO TUMORIS SUPPURATI, fit vel sponte naturæ, dum super tensa cutis ab acrimonia humoris contenti eroditur, vel ferro, id quod optimum, vel igne, & hoc vel potentiâ vel actuali. Ignis potentiâ parandi modus, nunc ex alcali fixo, acri, nunc ex acido, nempe butyro Œnii, aut magnete tali, aut lapide infernali. Aperto tumore materia contenta evacuanda, postmodum cavum restitans abscessus nomen obtinet, qui ubi per occultos quasi cuniculos hinc inde serpit, sinus nominatur. Talis ergo abscessus simili modo, atq; alia ulcera, mundificandus atq; consolidandus est. Quod attinet tumores per novam humoris generationem introductos, curentur aut insensibiliter materiâ resolvendo, quod rarius contingit, aut per aperturam eandem evacuando, quod frequentius; materia autem emollientibus & suppurantibus alterata & mitigata: Caveatur recidiva tumoris, fermeti peregrini in loco affecto totali destructione. Excrecentias tollunt ferrum & ignis, præcavendo recidivam per totalem deletionem. §. Hisce in cura tumorum comode adduntur interna remedia, nunc quæ laxant primas vias, & massam sanguineam expurgant: Nunc quæ acidum vitiosum tam in primis viis, quam reliquo corpore absorbent; nunc quæ labent massæ sanguineæ peculiare corrigunt, nunc quæ blando sudore pro subjecti natura omnes humores, stagnationes & coagulationes solvunt, & æqualem humoribus motum conciliant, tumoremq; insensibiliter resolvunt. Remedia ergo tumorum sunt in triplici classe, vel resolvunt, attenuant, vel discutunt, vel suppurant. Resolventia sunt ea, quæ stagnationi humorum sunt opposita, utpote quos resolutos in naturalem motum promovere: Huc revocatur quæ crassum attenuant, coagulū solvunt, grumos & viscida incidunt, & concreta fundunt, ortasq; durities tollunt; omnia hæc sub nomine attenuantium & solventium comprehenduntur. Operandi rationes facile patent: Dictum est, quod humores coagulati stagnet, & quod nunc sint sanguis, nunc pituita, nunc uterq; simul: Sanguis nempe crassus & viscidus ob chyli portiones crassas ab acido inspissatur; Hic tertius modo dat tumores obstinatissimos, scirrhum nempe & scrophulas; Ergo Medicamenta solventia sunt emollientia,

ratione



ratione duri; attenuantia ratione crassi & coagulati. Hanc vim obtinent acidum temperando, partes coagulatas penetrando, easque attenuando, & ita humores demum meabiles reddendo; nam quæ à frigore fit coagulatio, admoto externo calore potest resolvi. Remedia ergò sunt (1.) pinguia acidum obtundentia, & fibras laxantia. (2.) paulò aciora sed de sale volatili penetrantiori participantia, quæ & acidum absument, & volatilitate partium in poros penetrant, & humores mobiles reddunt; prout ergò coagulum plus minus est forte, ratione vel acidum inspissantis, vel humoris crassi subsistentis, varianda sunt remedia, inde emollientia & attenuantia in tres gradus possunt subdividi, nempe lenia, mediocria & fortiora; Dicitur, reperiuntur etiam acida, quæ attenuant & resolvunt, sed hæc quatenus sunt acida, hoc non præstant, sed salinam partium volatilitate, unde vix sola usurpantur, sed pro vehiculo aliis adduntur; In specie emollientia leniora sunt sequentia. rad. & herb. malv. alth. mercurial. branc. ursin. viol. lil. alb. sem. fæn. grac. malv. lupin. ex quæ his paratæ mucilagines, caricæ ping. uva pass. adipēs & axung. capon. vaccina, porcina, human. pinguedines recentes magis emolliunt, Veteres attenuant, & illud magis, si sunt pinguedines ex femellis, quàm si ex maribus, medulla animalium recentes, lac, butyr. ol. amygd. d. cum ol. lil. alb. ungv. de alth. singulare est cum unguent. resumptivo.

Secundæ classis: Radic. & herb. apii, helenii, capæ cocta, chæresol. beton. verba sc. samb. & hujus flor. menth. artemis. cicuta, scabios. crocus, chamom. adeps anserin. vulp. urs. cervor. serum hircinum, gumm. tacamah. elem. res. tereb. cera. sperma ceti, ol. chamom. hyper. nuc. anethi, laurin. nicot. ungv. & empl. de cicut. beton. diachyl. simpl. de meliloto.

In tertia classe, rad. & herb. bryon. cucum. cepar. crud. cyclamin. figill. salomon. sabin. absinth. centaur. min. nicot. sem. lini, eruc. cum. cum aceto trita, gumm. ammon. galban. bdell. sagapen. opopon. ladan. resina pinis; sterus & urina animalium, nidus hirund. cum excrementis spir. urina, & ci. spir. vini procatus, & camphor. vapor. aceti acerrimi, ol. lateris. lumbric. petrol. nicot. terebinth. cera, bals. sulph. ungv. marriar. emplastr. diachyl. compos. oxycroceum, de ammon. Vigonis c. mercur. Mercurius & lamina Feni illitus & applicatus. Ex his fiunt varia remedia composita, v. g. Fomentum emolliens.

℞. rad. alth. lil. albor. ana ʒiʒ. herb. malv. melilot. flor. sambuc, ana mj. caricar. pingu. num. iii. coque in f. q. lactis caprilli, cola. S. Erweichender Umschlag. Vel coq. in f. q. ∇. simpl. colatur. ℞. ʒiʒ. add. succ. cepar. rec. ʒiii. M. S.

Cataplasma resolvens: ℞. rad. alth. ʒiii. fol. brassic. malv. ana m. j. cucum. asinin. rec. ʒi. herb. absinth. m. j. flor. chamom. melilot. ana m. ss. sem. lini ʒiʒ. contund. coq. in f. q. ∇. simpl. vel lacte, vel sero lactis pro lubitu, trajice per setaceum, pulpam trajectam ℞. adde stercor. equin. ʒiii. ol. chamom. ʒiʒ. cepar. coctar. ʒii. M. pro cataplasmate.

Empl. duos tumores emolliens. ℞. empl. de melilot. gum. ammon. in aceto sol. & iterum inspiss. ana ʒiʒ. liquefact. malaxentur & inspissentur c. f. q. ol. nicotian. vel philosoph. inducatur super alutam. S. auflösend Pflaster.



(2.) *Remedia* tumorem *insensibiliter discutientia*, alias dicuntur *diaphoretica*, item interno usu *carminativa*, & *aperientia*, ut poros partium, dum sunt occupati tumore quodā, aperiant, humores penetrēt & discutiant, id est, dum pori partium sunt oppilati humore quodam, non possunt liberari, nisi humor dissipetur, & insensibiliter evacuetur. Requiritur ad hoc ut humor sit fluidus, resolubilis & consequenter expers omnis crassitie; Si adsit talis crassities, est corrigenda, quæ ergo talem humorem resolvunt, necesse est, ut habeant partes subtiles, tenuiores, penetrantes, quæ producere valent in parte quendam calorem, quo pori patentes reddantur, & sic humores mobiles transmittant. *Videntur ergo frigida*, quæ poros occludunt, *acida* quæ humores coagulant; *usurpentur autem penetrantia aromatica, sale volatili oleoso prædita*, quæ humorum coagulationem sistunt, partes calefaciunt, nervis amica sunt.

*cōia insalib.*

**INFLAMMATIONES.** Inter tumores in specie primatum tenet **INFLAMMATIONES** seu **PALEGMONES**, sed sunt omnes per motum sanguinis impeditum, indeque ortam stagnationem, unde huiusmodi inflammationes, tumor, calor, dolor pulsatorius & color p.n. necessario insequuntur. Prout autem variat sanguinis crasis & constitutio, eatenus etiam inflammationes, quæ nunc genuinæ, nunc spurix esse solent. CAUSA inflammationum externarum sunt vel læsiones externæ, vel spina quædam interna: Læsiones externæ sunt contusiones, fracturæ & reliquæ. Per spinam verò internam, ejusmodi parti infixam intelligitur similitudo, quia, quamdiu spina extrinsecus digito infixa infert inflammationem, sic in partibus internis aliquod heterogeneum in vel sub digestionem prima enatum, vel digestionem publicam obortum, inflammationes infert. Omnes inflammationes vel insensibiliter discutuntur vel suppurantur, vel malè tractatæ in gangrenam transmigrant.

**CURA** ergo ritè instituenda, *usurpentur externa & interna.* Interna sunt sudorifera moderata de natura alcalium tam fixa, quàm volatilia, quæ sanguinem coagulatum resolvunt, & stagnationem tollunt, ut spir. nitri dulcis: Externæ usurpanda sunt in principio sanguinem stagnantem solventia & fluxilem reddentia, inter quæ excellit decoctum sulphuris cum urino, decantatum à Paracelso, quod crebrius calidè applicatur, convenit etiam succus 69. fluviat. rec. calidè applic. & renovatus, Empl. de sperm. cetæ, bals. sulphur. empl. dia-sulph. Rulandi, forus ex blandis diaphoreticis & aromaticis una cum spir. vini extrinsecus applicatus excellit: præter decoctum calc. vivæ l. solum, vel cum saccharo Hni, loco cujus etiam epithema convenit ad discutendos tumores inflammatorios.

*℞. lixiv. ciner. sarmento r. vitis, vitriol. ℥i. ̄. ℥i. aceti vini opt. ℥i. M.* Confert non solum ad simplices inflammationes erysipelaceas, vel ædematosas nothas, sed etiam imminuentem gangrenam præservat. His si non obsequatur tumor inflammatorius, ut possit discuti, maturetur & suppuretur: usurpanda temperata, si inflammatio est genuina, quibus adde aciora, si est notha seu pituitosa; ubi

nempe



nempe sanguis inflammatus pruriens chylo crudo & viscido fuit permixtus. In his vitentur pinguis oleosa, & imprimis quando ardor & inflammatio suppuranda urget. Conveniunt ergo emollientia in lacte, vel, ubi ardor adest, in sero lactis coct. & applic. vide infra exemplum.

℞. Empl. demelilotho, malaxetur cum ol. lil. alb. M.

℞. Empl. de meliloto ꝑi. diachyl. compos. M. cum unguento altheæ.

Præ reliquis egregium est suppurans lac, in quo coctus sapo Venetus, plus minus, prout magis vel minus genuina est inflammatio, hoc appositum cum linteis multipl. mirè maturat & aperit abscessum; si his suppurata fuerit inflammatio, aperiatur tumor, & nisi spontè fiat, aperiatur scalpello vel cauterio potenciali: Apertus purificetur & consolidetur; purificatur optimè vel cum bals. sulphur. vel bals. Peruv. vel bals. tereb. iste cum vitello ovi mundificatus spontè denuò coalescit. Verissimum est effatum Lindani, quod bals. sulph. & empl. dia-sulphuris hic sufficiant.

SUFFUSIONES SANGUINIS. Hæ oriuntur ex CAUSA EXTERNA, & ferè eandem cum inflammationibus genuinis habent naturam, nempe in suffusionibus stagnat in loco tumenti sanguis, ob poros vel vasa compressa, aut lacerata; hinc sanguis corrumpitur, unde pars livorem contrahit. Sanguis corruptus vel insensibiliter discutitur, vel in pus mutatur, vel putrefactus gangrænam infert. Prius fit in contusione leviori, posterius in graviore, ultimum in gravissima, cum laceratione partium carnosarum & nervosarum.

REMEDIA INTERNA sunt sudorifera, sanguinem congruatum solventia, OBSERVANDO simul, ut, imprimis si sit suspicio partis cujusdam internæ læsæ, propinentur vel blande laxantia, vel blanda diaphoretica. Si verò in locis externis hæreat, sufficiunt sudorifera. Eminent oc. 99. cum aceto, carbon. tilia, in vino, salia vol. in debita dosi sunt egregia. Externè primus scopus est, ut sanguis grumosus resolvatur & discutatur, pro hoc scopo convenit spir. vini probè rectificatus & tartarisatus externè illitus, nunc simplex, nunc camphoratus, nunc crocatus. Convenit vinum, & cum vino factum lixivium, spirit. ❄. cum spir. vini paratus; graviores contusiones promptissime discutit, & in specie in partibus nervis bals. Peruv. in vitello ovi & spir. vini dissolutus, est nobilis fons. E dictis rad. bryon. cum vino, vel in quo decoctæ sint planta aromat. ut rad. Ireos nostr. rosmarin. majoran. menth. & sim. præter dicta egregia sunt rad. symphyt. maj. & sigill. Salomonis, decocta, & sub forma fons, & emplastri applicata.

℞. rad. symphyt. maj. ꝑi. sigill. Salom. herb. melilot. fl. sambuc. chamom. ana mj. croci ꝑi. coque cum vino, decoctum vel sub forma fons vel cataplasma applicetur externè. Facit huc Emplastr. contra livorem faciei Mynsichti, quod in leviori suffusione est egregium. Si dictis remediis nequeat discutiri suffusio, vel si suffusio sit grandior, & ad suppurationem tendat, necesse est ut suppuretur, & abscessus apertus consolidetur eadem ratione ac inflammatio;



Si gravior sit suffusio facta, scarificetur profunda vulneratione, & sanguis extrahatur; postmodum ung. *Egyptiac.* cum digestivo mixtum applicetur; *Egyptiacum* pro ratione imminentis gangrenæ. Si vero subinde cum febrium symptomatibus, quasi cum horrore & subsequente gravi æstu erumpat tumor, non aded insignis quoad eminentiam, intense tamen rubeus, latè diffusus, subindè latius serpens cum graviore ardore & dolore, & quidem talis, qui digitis pressus maculam albam subito tamen rufescentem ostendit, qui vocatur *ERYSIPELAS* vel *ROSA*.

*ROSA* non oritur à bile vel sale volatili oleoso simpliciter, SED à subtili & volatili acido cum sanguinis febriliter effervescente & in parte inter cutanea hærente, ibique sanguinem in extremitatibus vasorum capillarum figente; Hinc scorbutici levè de causa laborant erysipelate, hinc magis circa nervosa & sanguinea loca simul, non circa sanguinea solum oritur erysipelas; Si non rite tractetur, recidivat vel degenerat in ulcera, alias facillimè curatur, modò istud acidum infringatur, quod faciunt interna sudorifera ex rob. sambuci propinata, externè conveniunt, quæ acidum subtile discutiant, vi alcalina prædita, vel absorbent, ut saturnina. Primi generis sunt spir. vini crocatus & camphoratus, hinc spermæ ranarum, & lintea hoc spermate probe imprægnata, quo pertinet pannus linteus crocatus *Mynsiehti*, convenit etiam sel carpio-num illitum, item theriaca cum sale absinthii subacta & in forma unguenti erysipelati imposita, facit & huc decoctum olibani & myrrhe cum camphora & croco, nempe R. myrrhæ, olibani aa. ℥ss. camphor. ʒij. croci ℥ss. coque in Vt vino.

Quæ acidum absorbent sunt ex saturno, ut V. calcis vivæ cum saturno, pulv. ex saccharo saturni, cerussa, minio, thure, croco, camphora, & similia: hinc vel sicca, vel cum papyro gryseo melle illito vel imprægnato spir. vini crocato, applicantur. Nobile etiam est epithema *Zwellferi*: Nec est ut metuamus huiusmodi externa humida; talia nempe, quæ sunt actu frigida, & adstringentia, sunt nocentissima. Item quæ sunt pinguis, emplastica, mucilaginosa, oblitis enim poris erysipelas acius redditur, & sic ab ita in ulcus depascens. Si ergo erysipelas vel spontè, vel malè curatum abeat in tale serpens ulcus, optimus est succus nasturtii, si adspargatur cerussa, lithargyr. lac luna, crocus ʒiij. Euporiston *Foresti* est sequens Unguentum:

R. lithargyr ʒiij. ungv. popul. de cerussa, refrigerant. Galen. aa. ʒiij. ol. rosar. ʒj. M. in mortario plumbeo S.

**TUMORES CRITICI.** Eminent etiam tumores critici in morbis acutis & febribus tam benignis quàm malignis enati, fiunt per digestionem in his morbis acutis, dum partes heterogeneæ massa sanguineæ, ex volatili acri maligno corrupto, cum isto fermento vitioso, beneficio fermentationis præcipitatæ ex massa sanguineæ, in locis externis circa vasa capillaria coacervantur, & dum sanguini vias inter cludunt, inflammationem ibidem constituunt. Hi tumores sunt primario in locis glandulosis, secundo in nervis. Isti speciali nomine circa inguina vocantur *BUBONES*, circa aures *PAROTIDES*, & his similes sunt *FURUNCULI*: applicandum est empl. citrinum ut maturetur & suppuretur furunculus, apertus spontè coalescit; si hoc non fit, tantillo



tillo balsamo peruviano consolidari solet, vel imponatur empl. de meliloto; Si verò sint BUBONES, aut PAROTIDES, & sint benigni, maturationi opera danda, & remediis, quibus alias inflammationes solent suppurari v. gr. cum unguento de alth. & simil. utend. si verò maligni, pro malignitatis ratione cura variat, nempe sunt vel in febrib. malignis, vel in lue Ærea. Quo ad priores, facilè patent, dum loca occupant glandulosa, & eadem est natura in hoc casu ac carbunculorum, nisi sint mitiores. Pro veneno ergo in bubonibus coercendo imponatur buso, justo tempore captus, exsiccat & in aceto maceratus calidè imponatur buboni, vel ex busone paretur cataplasma, vel imponatur empl. magneticum A. Sale. Ablatâ crustâ & aperto bubone facile consolidatur per balsamum çris cum unguento basilico & theriaca. Ut autem dictum emplastrum facilius operetur, subinde necesse est, ut in cute densiori vel bubone profundius latente præmittatur vesicatorium, quod ubi escharam fecerit, sublatâ escharâ necesse est imponi dictû empl. magneticum, sic enim facilius operatur. Quod attinet CARBUNCULOS, pertinent ad huiusmodi tumores malignos: Eadem n. est natura horum atque bubonû malignorû, quia in febre maligna pestilentiali bubones & carbunculi oriuntur. Ex eadē enim sunt CAUSA, nisi quod in bubonibus malignitas sit magis correctâ, nempe salacre volatile & quasi causticum est, quod ex M. Sang. præcipitatum & suppuratum, in externa cute & carne hærens, caustica sua acrimonia mortificationem & livorem, ut & nigredinem infert. Nempe venenum acre & causticum est in carbunculis simile atque cauteria potentia ex lixiviiis, nam acida corrosiva nigredinem non inducunt, acria verò lixivialia nigredinem & livorem, quæ nigredo, livor & mortificatio cum magis obvia sint in carbunculis, patet, quod ejus venenum consistat in tali acri caustico lixiviali: Manifestant se quâdam minori pustula albicante, interdum pluribus, à quibus brevi cum ardore & dolore acerbo ulcus crustuosum simile, atque à candente ferro fieri solet, excitatur. Interdum citra præcedentem pustulam mox ulcus fit, crusta modo nigra, modo cinerea, quâ decedente ulcus profundum emergit, putridam carnem circum circa depascens & mortificans. Caro adhuc sana in confiniis carbunculi effervesceat, cum intensâ phlogosi & ardore, unde omnis carbunculus circulo rubro est circumscriptus, qui tamen interdum est lividus aut cœruleus in carbunculis malignis. CURATUR per contrarium acidum, unde mox opera danda est, ut caustica acrimonia destruat, nil melius resistit carbunculis quàm butyrum çnii, nam si hoc ducatur circulus circa mortificatum anthracem, statim separatur pars ægrotâ sana, & postmodum ulcus facile mundificatur & sanatur. Loco huius butyri çnii nobile est emplastrum magneticum A. Sale quod applicatum, brevi crustam inducit, quâ separatâ illin. unguent. bene maturum, crustam suppurans. Si suspicio est adesse quandam malignitatem, repetatur emplastrum, hoc facto, ulcus mundificandum, diu apertum servandum ac tandem consolidandum; Ut autem hoc emplastrum



melius operetur, optimum est applicare carbunculo *vesicatorium*, vel centrum carbunculi illinatur butyro *gñi* ad magnitudinem nummi rotundi; Sic vesica & eschara excitatur, quâ evanescente empl. magneticum melius operari solet: Hujus defectu *vesicatorium consuetum* applicetur, facta vesica discindatur & velcum unguento *Aegyptiaco* vel *Oli* curetur. Horum defectu scarificetur carbunculus & facta scarificatione, impone

*R.* succi symphyti major. scabios. calendul. aa. *℥j.* theriacæ vet. *℥ij.* Ovis *℥j.* vitell. ov. num. ij. incorporentur simulq; applicentur carbunculo scarificato, hoc aliquandiu continuandû, ubi malignitas corrigitur & carbunculus separatur.

*R.* succi calendul. absinthii, scabios. apii, myrrhæ, irid. flor. aloes aa. *℥j.* sarcocoll. *℥i.* mell. rosar. *℥ij.* hæc mixta mundificant ulcus. Videatur *Valerius in libr. 3. cas. 6.* Cum his externis etiam internè conveniunt alexipharmaca, in specie *gñum* & *alias fixa*, quibus iulepi blande acidi ex citro, cydonis, spir. salis, spir. vitrioli & sim. adhibendi sunt; Præter bubones autem pestilenciales etiam observandus est bubo venereus. Hic oritur ex acido viscido maligno, in dicto loco successivè coacervato, idq; laudabili naturæ conatu, nam sic præservantur à lue venerea, ut non eadem corripiantur. In Cura opera danda est, ut maturè aperiatur & virulentia eliciatur; Pro primo scopo imponatur Empl. Vigonis cum mercurio, malaxatâ cum oleo destillato ligni guajaci vel empl. diachyl. compos. malaxatum cum oleo destil. ligni sancti, vel empl. diachyl. malaxat. c. oleo *grivolatili*, ut horum remedio emolliatur bubo; perfecta enim suppuratio hoc in loco rarè aut nunquam accedit. Maturatus aperiatur, apertione larga, & materia evacuetur, mundificetur ulcus cum balsamo hyperici, mixt. cum oleo destillato ligni sancti & *griv.* & mundificetur cum unguento de apio, cui additum sit parum de *gñio* *trito* vel *artano corallino*, superponatur dictum empl. exterius; Internè usurentur primo lignorum decocta, postea purgantia, in fine sal & spiritus viperarum curam bubonum absolunt.

DE PARONYCHIA. Hoc quod attinet, sunt tumores ordinario obvenientes in extremitatibus digitorum, ultimis nempe articulis digitorum, ita tamen ut non excludantur reliqui articuli; PARONYCHIA tumor est dolorosus, ut subinde universum brachium consensu afficiatur. ORITUR ex humore acri, admodum corrosivo, immediate periostium, & ipsi adherentes tendines occupante, & quidem mediatè. Supervenit inflammatio, eaq; in apostema vergit, imò interdum ante factam apostemationem paronychia ad gangrenam vergit. Occasio hujus acidi est ut plurimum ex læsione ossis articulos constituentis, tunc enim ex osse transudat nutrimentum proximum, unde acorem contrahit & partes afficit, unde dolor; pro hoc sistendo nil melius est remediis ex lumbricis, nempe liquore lumbricorum in cli-bano facto, spiritus lumbricorum & similibus, digitis illitis: Item balsam. *gris.* Externe discutit dolorem & tumorem, si fieri etiam potest, maturè ad suppurationem producit Linimentum ex sordibus aurium cum saccharo saturni comixtû cum paucis ol. avel-lanatum expresso, optima sunt; convenit etiam, si digitus intrudatur in sterquilinum,

vel



vel  $\mathcal{R}$ . Anteum, quod humectetur cum sterquilino, & calidè digito dolenti applicetur, sic optimè discutitur & sistitur dolor & tumor.

De PERNIONIBUS. His subinde inflammationes superveniunt, affligunt imprimis partes optimas nerveas, tales n. partes si affectæ tument, & ex albedine ad aliquam cœrulescentiam inclinant, dolent, ita ut nunc cum, nunc sine exulceratione evanescant, ut tamen semper, quoties in clementia aëris, & frigus instat, dolor incrementum accrescat. Ut præserventur perniones, nihil melius est, quàm petroleum illitum, quod & præservat & factos jam curat. Item terebinthina loco refrigerato, dum imminet frigus, denuo vesica bubulâ imposita; juxta hoc oleum pini destillatū præcellens, quod est nobile præservativum & curativum. Si vero gravius læsæ sint partes à frigore, tunc ad eliciendum frigus optimum est cataplasma liquidum calidè applicatum; Sic omne frigus & dolor discutitur & resolvitur. Alias notum est, quod contra hos nihil melius sit rapis, in specie exsiccati; decoctum horum est egregium, unde etiam unguentum de rapis Myns. est elegans ad perniones curandas, convenit etiam si jam exulceratæ fuerint, contra quas egregium est; sic

$\mathcal{R}$ . rapa & mediocriter excavetur, infund. ol. rosar. & assetur sub cineribus calidis, quo facto si post expressionem linimentum applicatur pernionibus, easdem solet restituere & consolidare; alias expertum est linimentum Sculteri in observationibus. Item mucilagine seminis cydon. cum solani extractæ; adde parum tutia præp. convenit, si cum linteis multiplicatis applicetur pernionibus exulceratis.

TUMORES EX LYPHÆ VITIO, nempe si fiat, ut ex impedito lymphæ motu propter vasa lymphatica, vel obstructa, vel rupta, aut aliter affecta lymphæ fiat collectio aut stagnatio, exsurgunt TUMORES, qui vocantur SEROSI seu AQUOSI ad tactū molles, laxi, indolentes, & quibus à digito impresso nullum remanet vestigium. Interdum ad lucem vel candelam conspecti, pellucidi quodammodo apparent. Eadē lymphæ in cavitatibus quibusdā collectæ, occasionem præbet hydropi particulari, in parte selecta. Tumores serosi, sine ingenti sunt periculo, saltem quia subinde sunt comites aliorum affectuum tamen, si CURANDI sint, conveniunt validiora discutientia & solventia, eminet  $\nabla$  calce viva, cum spir. vini imprægnata, hæc & perse & cum spir. vini ebria est egregia, si cum spongia calidè applicetur, convenit etiam stercus bubulum cum pulvere cumini. Insignis vis latet in stercore bubulo, sic enim quando hoc applicant pedibus, qui podagra laborant, cum levamine id faciunt: vel convenit empl. de baccis lauri, vel hydropic. Augusfanor. imprimis tamen de baccis lauri. mixtum cum ol. & stercore caprilli, quæ cum melle rediguntur in Empl.

$\mathcal{R}$ . Empl. de baccis lauri cum stercore caprilli.  $\mathcal{Z}$ ij. melilot.  $\mathcal{Z}$ vj. M. applicetur calidè. Cum his externis jungantur interna, tam diuretica, quàm in specie diaphoretica; inter quæ remedia ex lignis, imprimis decoctum ligni Juniperini & sassaf. sunt optima. Eadem lymphæ, vitiosa tamen & crassior ac viscosior reddita, & cum chylo crudo massæ sanguineæ permixta & hinc inde distributa, hinc inde stagnans dat OEDEMATA, nempe tumores molles, laxos, digito prementi cedentes, ut tamen

hujus



hujus vestigia diutius retineant, & successivè denuò protuberent, indolentes sunt & albicantes. Præ cæteris partibus crura infestantes. Rarum est, quòd hæc œdemata per se oriantur, frequentius aliis superveniunt morbis, nunc chronicis, ut phthisi, asthmæ, nunc post morbos acutos, in ægris reconvalescentibus apparent, imprimis quando præmaturè ægri lauriori diætâ utuntur. Si per se apparent, malum signum est, quia metus est, ne morbi chronici superveniant.

CURA præmissis internis, imprimis stomachicis aromaticis cum originem dueant ex vitiata chylosi, Elixir proprietat. antiscorbuticum, essentia catarrhalis, etiam noduli alterantes & laxantes, cum sudoriferis & diureticis, externè diaphoretica & resolventia, nunc acriora alcalinis salibus turgida, nunc magis temperata alcalibus oleosis prædita sunt usurpanda. Conveniunt ergo externè omnia aromatica, in specie cataplasmata & fomenta ex absinthio rorem. origano, chamomill. & simil. hæc in vino vel lixivio communi decocta in forma nunc fomenti nunc cataplasmi. applic. Vel ℞. herb. rorism. bacc. junip. ana q. v. ebulliant in ∇. simpl. & lixivii s. q. fiat pediluvium.

In pedibus œdematosis est egregium. Lixivia in dictis casibus sunt optima, vide Hartm. & Platerum. Convenit etiam Empl. de baccis lauri, malaxatum cum petrol. vel ol. destill. succini, quotidie bis repetitum, vel etiam præparetur suffitus super lapides candefactos.

℞. succini pulverisat. ℥viii. aceti dest. ℔j. in lapid. candefact. & excipiat. fumus pedibus aut partibus œdematosis, postmodum applicetur dictum empl. Vel fiat Cataplasma.

℞. fol. tamarisci, rorism. rutæ ana mj. bulliant in ∇. & vino ad mollitiè, adde farinæ cicerum, fursuris frumenti ana ℥iii. sterc. vaccini, mellis optim. ana ℥iv. f. cataplasma.

Juxta hæc si acria desiderentur, eminet Aq. calc. viva, & lixivium ex ciner. sarment. vit. in quo bulliat sulphur commune. Tale lixivium etiam discutit dicta œdemata: Ol. tart. volat. rectificatum aliquoties à C. C.usto, illitum, mirum est. Non inferius est oleum guajac. dest. probè rectificatum. In contumacioribus tumoribus ℞. stercor. caprar. q. s. cui infund. urina humana, vel ipsius ægri; hæc mixta calidè impone parti œdematosæ in forma cataplasmatiss; vel finis equin. misceatur cum farina hordei & aceto, & simili applicetur modo. Si hujusmodi œdemata superveniunt morbis vel acutis vel chronicis, optimum est chelidonium majus, recens contusum, & plantis pedum applicatum.

SCROPHULÆ juxta œdemata. Lympha viscida & vitiosa, acida & quodam acore austero prædita, in poris & meatibus glandulosis collecta, ibidem induratur, & dat scrophulas & strumas, quales frequentius quidem collum, utpote ubique glandulis obsessum, rariùs alia loca occupant, utut subinde in mesaraicæ repertus abscessus fuerit. Scrophule & strumæ sub duplici sunt differentia: Vel sunt mobiles & pendulæ, vel immobiles seu fixæ; quæ reliquis partibus profundius



fundius inter textæ & iisdem firmitus irradicæ sunt: Porro attractu vel dura vel molles, vel dolentes vel indolentes, legitima l. norhe, dicuntur; natæ nempe ex acido vitioso & cancrroso ferè: legitima sunt maligna, illegitima verò benigna. Pro Cura ergo, emollienda & resolvenda sunt, per medicamenta potenter incidentia & penetrantia, viscida liquefacientia, & acidum viscidum corrigentia: Eminent ol. destill. Helm. in tr. tartarus non est in potu, cuius autor est Langius in Epist. 4. l. 3. juxta hoc est oleum & pulvis lacertarum cum aceto præparatarum, pulvis internè nobilis contra scrophulas, gummi imprimis & cum, & reliqua ex his parata, empl. de Gummi \* o. cicuta, crocat. Mynsichti sunt optima. Cataplasma ex fol. cucumer. asinin. optimum est; Si ista emplastra non suffecerint, impregnentur cum mercurio vivo, qui potenter penetrat. Hinc unguentum Vigonis de ranis cum mercur. duplici est egreg. vel ex Gummi caranna cum mercurio & Terebinth. subact. fiat empl. ad imitationem Barbetæ; Habetur amalgama mercuriale, ex quo & cum quo emplastra parata forsitan sunt egregia; emplastrum diachyl. cum mucilagibus v. gr. ʒj. adde mercurii vivi saliva extincti ʒj. Si verò non suffecerint, usurpanda sunt successivè ad quandam suppurationem ducentia, ad quam scrophulæ legitima interdum sponte tendunt. Conveniunt ejus loco empl. de meliloto cum oleo amygdalar. dulc. & pinguedin. serpentin. vel cataplasma ex cucum. asin. emplastr. magnetic. A. Salæ cum empl. dia. æris mixt. ad Imitationem Tab. In Cura cancri. B. empl. de nicotiana Plat. quem vid. c. 1. observ. 28. His & similibus suppurandæ sunt scrophulæ; Scrophulæ suppuratæ non statim sunt aperiendæ, sed quamdiu fieri potest reliquendæ, ut eo major glandulosa pars suppuretur, aperto enim abscessu tota glandula absumenda est, præstat vel commune digestivum, vel, quod melius, si cum tali digestivo & rus ritè paratus, ut fiat indolens, applicetur; Glandularum ulcus postmodum mundificandum & denuò incarnandum erit; pro mundificando sufficit balsamus æris. Si verò glandulæ sint pendulæ, commode filo seu seta equina pedetentim constringendæ sunt, ut sensim marcidæ spontè separentur; Si verò propriis tunicis sint incluse, subinde necesse est, ut, cum discutientia & suppurantia sint frustranea, chirurgi manu curentur, prospiciendo ut membrana tota tollatur, quod saltem fieri potest, ubi non magna vasa aut nervi ad glandulas tendunt; Cum his modo internè jungenda sunt fixa, acidum absorbentia, ut sponsia combusta, ossa sepiæ, remedia viperina, arcantum duplicatum, pumex præparatus, piper, pulvis sternutator. cui accedunt purgantia appropriata.

SCIRRHUS: Sic dictus Tumor durus, renitens tactui, qui sensim ut plurimum generatur in partibus mollioribus, & indolens est, & occupat tam internas quam externas partes; Nascitur ex coagulatione aut sanguinis, aut chyli crudioris, aut utriusque simul. Ex sanguine coagulato, quando inflammationibus malè tractatis supervenit, imprimis quando per repellentia malè tractatur, tunc enim talis tumor durus remanet seu scirrhus. Ex chylo crudo, cum interdum tumoribus, epithematibus nimis validè discutientibus tractatis superveniunt, sicuti mammae, in quibus lactis coagulatum hæret, tandem durum scirrhum contrahunt; ut plurimum tamen istis superve-

Pars III. R



perveniunt, quibus sanguis in poris viscerum per acidum nimium vel fixius, dicta materiam coagulans congeritur. In his scirrhis probè observanda est *differentia & distinctio*: Scirrhus vel indolens est & legitimus, l. dolens & nothus, qui subinde est cancrusus, unde si curatur, periculum est ne in cancrum degeneret. *Acidum* ergò temperandum & *durities* emollienda. Faciunt hoc *resolventia fortiora* discentibus moderatis permista: ut resolvatur tumor; Inter hæc eminet *cicuta, mandragor. Nicotian. cucum. asinin.* & similia, in forma empl. succulenti l. cataplasmat. applicata. Juxta hæc est *Gummi \*cum*, sive per se constituat empl. vel cum *empl. de cicuta* mixtum item *empl. diachyl.* cum duabus partibus *Gummi \*ci* mixtura scirrhum emollire solet, his non satisfaciendis ad mercurium recurrendum est, nempe

℞. Empl. deranis Vigonis cum mercurio duplicat, vel diachyl. cum pinguedin. ʒss. mercurii cum saliva extincti ʒij. mixta imponantur tumori scirrhuso.

*Emplastrum magistrale* habet *Agricolain chirurgi* a parva p. 689. convenit etiam *laminæ saturni hydrargyro illita & imposita*. His & similibus & imprimis *gumm. ammoniac* si non cedat, ad maturationem in pus, quantum possibile, deducendus est, temperatis tamen, nam nimis emollientia, aut nimis suppurantia periculosa sunt, quia scirrhus facile in gangrenam exulceratam abit: quod observet. imprim. in *Scirrhus dolenti*, qui *suppurantib.* tractatus abit in cancrum. Dolens ergò scirrhus si non potest solvi citra suppurationem, aut intactus est relinquendus, aut in duritiem lapideam indurandus, quod fit nitro in aceto soluto. *Hildanus c. 6. obs. 75.* habet unguentum in tumore scirrhuso ad cancrum inelinante, quod etiam in scirrhuso mamme mulieris, ubi metus suberat *cancris*, optimum fuit.

**CANCER.** CANCER est tumor plane singularis, primò vix ciceris aut pisi aut fabæ magnitudinem ostendit, ita tamen, ut in ipso subinde punctio percipiatur ab ægro, successivè incrementum sumit; Sub isto parvo initio tuberculum est durum nigricans, interdum lividum, punctiōibus molestum, ubi verò augmentum recepit, est durum, coloris plumbei, dolet in principio moderatè, in progressu vehementius, tandem exulceratur, ubi dolores sunt miserabiles, & in tali cancri ulceratione carnosarum & vicinarum partium depascentia solet adesse cum insigni ulceris fœtore. In incremento adest ardor pulsatorius, circa tumorem venæ nigro sanguine turgidæ sunt, quæ pedes cancri repræsentant. Hic cancer frequenter occupat mammas, hinc loca glandulosa alia, unde ulcera in locis glandulosis deteriora facta ad 69. degenerant. Sinasti, os, l. labia occupat, dicitur *noli me tangere*, item *lupus*; subinde enim alterum affligit. *Occasione* hujus interdum ex CAUSA EXTERNA, nempe *contusione* l. *lesione levi*, quâ tunc in parte læsa colligitur tale fermentum malignum, quod 69. infert. Accedunt *occasiones interna*, ut mensium fluxus suppressus aut hæmorrhoides deficientes, ut ferè in ætate consistente evenire solet; CAUSAM PROXIMAM statuunt *humorem melancholicum adustum*, id est, *acidum volatile insigniter corrosivum*, sed *natura arsenicalis*, in quo deprehenditur venenum pu-

refactivum



trifectivum & corrosivum. Hoc acidum occultum est in cancro incipiente, in exulcerato manifestius: Latet, quamdiu à novo acido vitioso, vel à causa externa nullo augmentum cepit: Si verò fiat de novo quasi effervescentia, fere est in curabilis. De modo curandi per remedia vide discurs. habit. in actis Hassn. p. 158. Cancrì ergò occultum est acidum nondum manifestum, adeoque scirrhus & scrophulas indolentes melius est non attingere, quam attingendo irritare; Si autem tangi debent, palliativè saltem tractentur, cujus loco acidum temperetur & edulcoretur, quod faciunt in specie *Hina alcalia*: si administrantur, necesse est temperata sint, unde ex iis quæ ad occultum cancrum conveniunt, sunt *Hina ex alcalibus plantis solanum, cicuta, plantago, 69. fluviales, rana, bufones & similia*; quadam internè quadam externe conveniunt; Internè remedia ex 69. externe saturnina, unde usurpetur emplastrum de saturno, nempe ex oleo rosarum, diutius in mortario plumbeo cum saturno calcinato terendo oleum rosarum inter duas laminas plumbeas tamdiu, donec fiat limimentum crassum & lividum.

R. Saturni usti ℥i. olei rosarum ℥iiss. croci ℥vi. M. ducatur in mortario plumbeo calidè cum pistillo plumbeo. Empl. saturninū Mynsichti & empl. de carne bubula Mynsicht. sunt in frequenti usu, ol. ranarū duc diu in mortario plumbeo, adde C. C. usti & saturni calcinati. q. s. Si verò cancer evadat exulceratus, pertinet ad cancrum ulcera quæ vix nisi ☉ cedunt. Convenit etiam cancro occulto amalgama mercurii cum saturno. Tale amalgama & inde paratum empl. est optimum. Dictum est, quòd gingivarum 69. occult. nisi ritè tractetur, item strumæ & scirrhus faciliè exulcerentur, nempe communis est affectio in scirrhis & scrophulis, item quibusdā excrescentiis, v. gr. polypo narium, verrucis & similibus, ut sinigrescant vel livecant, vel sint dolorosa, degenerent in cancrum exulceratum: Signum imprimis est dolor punctorius & lancinans, oritur hic, quia acidum istud volatile corrosivum obscure mordicat fibrillas quasdam nerveas & partes vicinas vel propter excessum, quoniam à nullo imbibitur, vel in specie, quia infestat partes nerveas & fibrillas admodum sensiles & faciliè irritabiles; vel fit dolor, quia istud acidum jam concepit occultam effervescentiā & dispositionem ad ulcerationem. Si tantillum acidi ergò in effervescentiam concitetur, etiam porro in exulcerationem promovetur. Hoc fit imprimis, si per propriè dicta emollientia & maturantia ad suppurationem producatur tumor, nam si sint paulò aciora, ratione alcali effervescentis cum acido dolorosam inferunt exulcerationem, & cancer manifestatur, in specie si hæc aciora fuerint mucilaginosæ & humectantia. Illa poros partis occludunt, & transpiratione impediunt, unde retenta, fiunt aciora: Hæc resolvendo acidum occultum istud in actum ducunt, quo soluto supervenit corrosio & exulceratio, hinc dicunt, in scirrhus dolenti foris humidi sunt nocivi, item foci cum ∇. sunt rejiciendi.

GUMMATA GALLICA. Sequitur alterum tumorum genus, & sunt ex alimenti partis proprii alteratione & corruptione, indeque paulatim facta coacervatione. Ad hoc tumoris genus pertinent imprimis gummata gallica, tumores duri, tactui renitentes, interdū dolentes, in ossium medio enati & immediate incumbunt periosio,



subinde ipsi dolorem nocturnum ostro opum gravissimum inferunt, tandem partes molles subjacentes & ossa subjecta erodunt, & cariola reddunt, tument. Quando acidum luis veneret malignum partes nerveas, in specie ossa infestans, in his se firmitus implantat, earum alimentum corrumpit, & porro coagulando in talia gummata indurât, atque partes vicinas erodendo ad ulcera perducit.

**CURA.** In mitiori casu sunt sudorifera ex lignis, in graviori *Grialia*. Præter interna applicanda sunt hæc gummata emollientia & resolventia, antequam ulcera ossium & partium mollium inferant. Conveniunt ergo *emplastra ex Gummi* fortiter penetrantibus, in specie *ol. destillato ligni guajaci* malaxando, quod oleum imprimis *cariem* præservat & curat, iisdem tamen semper *mercurialia* addenda, tanquam specifica alexipharmaca, hinc convenit *lamina saturni cum mercurio vivo illita*, item *mercurius fumo saturni coagulatus*, impositus, item ex *oleo terebinth. & oleo destillato guajaci cum mercurio vivo misto*, addito *opio*, quasi pro leniendis non nihil doloribus: Optime conveniunt in tumoribus sanguineis opium, dolorem enim sistit & simul resolvit.

**TUMORES RECIDIVANTES.** Ad hos pertinent tumores post curatos abscessus & ulcera sæpius recidivantes, nempe sæpius post abscessum induratum non ritè mundificatum, & maturè consolidatum, aut post ulcera partium imprimis nervosarum, non ritè mundificata, & post ulcera, quibus occulta caries ossium subest, etiam carie non ritè sublata consolidata recidivant tumores insignes, qui pederentim de novo suppurati novos abscessus & ulcera faciunt, quod fit, quando ulceribus non ritè mundificatis alcalibus balsamicis, aliquid de fermento ulceris corruptivo, tantillo licet, adhuc latitat, quod per motum fermenti alimentum partis proximum alteratum, corrumpit, & ejus in novum tumorem collectioni ansam præbet, & facilius, si ipsum nutrimentum partis præter naturaliter constitutum sit; his enim ex causis tumor, & inflammatio & irritatio supervenit: In his casibus opera danda est, pro **CURA**, ut massa sanguinea internis, in specie salibus volatilibus purificetur, & fermentum stomachale in naturali vigore conservetur, & acidi proventus prohibeatur, *externè* verò ulcus vel abscessus de novo factus probè mundificetur, & diutius apertus conservetur; *Mundificatur* vel communibus digestivis, vel balsamo sulphuris ritè præparato, si pertinacius fuerit malum, imprimis si suspicio est latentis forsan materiae purulentæ, dictis mundificantibus adde *mercurialia* vel, purum mercur. vel mercur. præcipitat. ossium caries appropriatis debet tolli.

**CALLI, GANGLIA & SARCOMATA.** Ad hos tumores pertinet etiam, si pars quædam tam carneæ quàm nervea, & hæc imprimis ex quacunque causa, imprimis externa, ita lædatur, ut nimia extensio stannium, fibrarum nervearum laceratio, pororum & meatuum ex naturali figuræ confusio & depravatio superveniat. Tunc enim his occasionibus fibrillis partium læsis, alimentum partis proximum ulterius recipitur, diutius retinetur, & magis quàm par est, assimilatur. His occasionibus generantur tumores partium similes an, ut **CALLI**, interdum **GANGLIA**, Item **SARCOMATA**. Sic **EXCRESCENTIE CARNEÆ CURANTUR**, vel emolliendo atque



atq; resolvendo easdem insensibiliter, vel aperiendo & excindendo radicitus. Prius locum habet in Callo, & gangliis, posterus in sarcomate. De CALLO ossium emolliendo vide Hildan. vel supra. Vel Ganglia & nodi resolvuntur insensibiliter, beneficio laminae plumbeae, quæ vel sola, vel cum mercurio vivo illita, vel oleo destillato Juniperi inuncta, firmiter imposita, sic enim successivè evanescit; conveniunt etiam folia sempervivi majoris, cui detracta sit inferior cuticula, quæ imponatur quotidie, manè & vespere removendo: vel

R. Gummi ammoniacum & in forma emplastri impone. Pertinaciori malo convenit empl. de ranis Vigonis c. mercurio. Vel

R. lamin. saturni infusa spir. vini & acet. destil. & adperso eûphorbio, hoc applicatum gangliis successivè illa evanescere cogit: SARCOMATA vero abscindenda & excindenda sunt, in casu, quando nempe commode excindi possunt; Si nempe non adhæreant nervis, vel quando sarcomata non conspirant cum vasis insignioribus arteriosis & nervosis. Si enim hæ duæ circumstantiæ absint, sarcomata excindantur; heterogenea substantia membranosa vel fibrosa postmodum blandis exedentibus & suppurantibus eradicetur. Separando sufficit unguentum Ægyptiacum, vel suppurantia communia, postmodum ordinariis consolidationibus pars læsa consolidetur.

EXCRESCENTIÆ. Similimodo generantur & alii tumores, suis propriis folliculis inclusi, qui omnes ex eò, quod foras nasci solent, excrecentiæ vocantur, & imprimis peculiare habent membranas liquore proprio refertas, qui liquor in corpore triplex est, nempe, quando dividuntur hi tumores in MELICERIDAS, quando tumores in se continent materiam similem melli l. pisis coctis. Si vero materia sit simplex, appellatur ATHEROMA; quando verò est spissior in forma sevi vel saponis, STEATOMA. Fiunt hi tumores ex nutrimento partium, cuiusdam nervæ, speciatim membranæ copiosiori retento, & nonnihil alterato, hincque in aliam substantiam transmutato. CAUSA, propter quam nutrimentum uberius colligitur & transmutatur, est, quia membrana aut ab externa causa violentius distenta dilatatur aut laceratur, his enim tandem isti tumores superveniunt, vel si à causa interna, levi tamen, erodantur loca membranosa. Fitenim exinde, ut, fibræ à se invicem separatis, & poris dilatatis & ampliatis, alimentum proximè uberius recipiatur, retineatur & extrorsum versus talem tumorem generet; Quod vero attinet folliculum proprium, videtur fieri ita, nempe fibræ crassæ aut laceratæ, aut à se invicem separatæ, ut in naturalem unionem non amplius redigi queant, à nutrimento distendente ipsæ in longius protenduntur, & augmentantur, & hinc inde emittunt fibras, quæ mutuo concurrentes talem membranam constituunt, quæ membrana nutrita & dilatata cum tumore incrementum capit. Quoniam succus nutritivus transudans non naturali situ transponitur, sed conglomatus coacervatur simpliciter, materia aut sevo, aut pulvi aut mellisimilis efformatur. Observatum etiam fuit, quod hi tumores propriis folliculis inclusi, subinde lunæ phases imitentur, quod videtur commune quibusdam tumoribus in partibus nerveis radicatis, item quod hi tumores sæpe & frequentius circa caput, collum, nucham & simil. reperiuntur, rarius in aliis locis, etiam carneis sarcomata protuberant. Facile patet, an sint proprio folliculo inclusi, qualis autem materia contineatur, vix potest cognosci, sed hoc parum refert. Hi tumores cystici sunt sine periculo, attamen, quia interdum enormem excrecentiam, interdum deformitatem important, curandi sunt.



**CURA.** Ergò observandum est, ut materia contenta omnimodè tollatur, sive insensibiliter resoluta discutiatur, quod fit rarius, & saltem in tumoribus recentibus, cujus membranæ firmiter nondum coaluerint, sive sensibiliter evacuetur, dum alteratur & quodammodo in pus mutatur. Materia, aperto tumore, evacuetur, vel integra membrana cystim constituens excisione penitus auferatur. In illo casu vel balsamus gr̄is, item peruvianus, vel gummi \*cum sufficit, vel lamina saturnina mercurio illita. Verum si tumor est confirmatus, & ejus membranæ firmiter coaluerint, sine sectione chirurgica vix tolli solet, unde semper membranæ cystin statuentes, radicibus tollendæ, nam si tantillæ, fibrillæ remanserint, in abscessu consolidato, semper nova materia colligitur, & novus tumor generatur, qui in ulcus diuturnum & fœtidum abit, vel in fistulam degenerat. Hæc tria ergo ut removeantur, necesse est, ut dicta cystis radicibus evellatur, quod fit vel cultro, successivè separando, vel unguentis erodentibus. Convenit ergò in hujusmodi tumoribus empl. ex gummi ammoniaco, pyreth. & oleo destill. succini, quod impositum tumorem maturare & ad suppurationem deducere solet, vide Barbetri Chirurgiam.

℞. picis navalis ℥ii. gummi \*ci, gr̄is ana ℥ß. m. f. empl. quod imponatur.

Hujusmodi tumoribus

apertis vel medicamentis vel sectione chirurgica, cystis penitus auferatur, quod fit imprimis per unguentum Ægyptiacum, vel solum, vel auctum cum terra vitrioli dulci & pauco ⊕, hoc facto & abscessu mundificato caro succrescens tumorem denuò replet. Tumor talis, si, quod frequentius fit, in capite excrescat, ob densam capitis cutem firmiter cranio circumtensam, non tam extrorsum prominere potest, sed potius latius tumor talis sub cute capitis expanditur, unde tunc testudo, item talpa & lupia appellari solet; In hoc tumore materia proprio folliculo contenta diutius retenta, subinde acrior redditur, & ipsum cariosum reddere incipit. Tales tumores si sunt immediatè supra suturas vel alio in loco situatæ, ut ex fibris membranæ duræ meningis per futuram transmissis oriuntur, relinquendi sunt intacti, ne periculum inflammationis duræ meningis inferatur; Si verò alio in loco, insensibiliter resolvendi vel suppurandi, vel factæ incisione curandi sunt, nempe folliculus vel excindendus & pulvere contra cariem ossium cranii caries præservanda.

**VERRUCÆ** fiunt, si fibræ nervæ (quæ copiosius extremitatibus vasorum capillarium intertextæ sunt) nunc solitariè nunc cum fibris subiacentibus laceratæ aut evulsæ, nutrimentum foras emittant, quod successivè coagulatur in verrucas; quæ si attritione & laceratione aliquali fibrillarum in digitis pedum fiant à calcis, dicuntur **CLAVI VERRUCÆ** hæc pro ratione radicis sunt nunc planæ seu sessiles, nunc peniles & ex angusto collo capite ampliore prominentes, quæ priores **Mirmecia**, posteriores verò acro chordones; sicuti hujusmodi verrucæ, si altius promineant & singularem duritiem habeant, in hominibus **cornua** appellantur, quæ sæpissimè pro fundamento habent os. Observanda autem sunt in

**CURA,**

**CURA,** hæc ex fibris nervæ  
spicent; Si pro  
dinibus laceratis  
tishis circum  
rucas tollit  
vocat Ciep  
eas evanesce  
fior & tenac  
Item \*cum  
Borellus c. 2.  
nus & fiat li  
tentim ero  
sale comm  
sensibiliter  
dum, Tima  
per potest a  
empl. Vigon  
men ista ver  
venereolunt  
soluti in ∇. p  
tati Div. alu  
tingantur d  
modum thy  
misceatur cu  
exicari & c  
**FUNGU**  
membranar  
ductis lacer  
si aperta cur  
stantiam ca  
quod præte  
tus inherere  
nem in tale  
**CAUSA**  
sejungat cir  
ratur, simu  
dum fungi  
cta extirpe  
pus ad tabe  
ergo est,



**CURA**, harum verrucarum imprimis in pedibus ratio habenda, *an* scil. solum ex fibris nerveis cutis originem ducant, *an* verò simul subjecti tendines læsi conspirent; Si prius, facile curantur, si posterius, difficilius, quia periculum est, ne tendinibus læsis inflammatio & gangræna inferatur. Verrucæ ergò hæc, consideratis his circumstantiis, **CURANTUR**, eas **ABSUMENTIBUS** iisque variis; in genere verrucas tollit *succus chelidonii majoris* sæpius crebrius repetitus, item est planta, quæ vocatur *Cieporum* verrucis similis propter figuram, quæ contusa verrucis imposita eas evanescere facit. *Lactithy mali seu Esula* verrucis illitum, easdem exedit. Si tenfior & tenacior sit, leniter vulneranda est, ut melius pateat introitus lacti esulæ; Item \*cum solvitur in  $\nabla$ . simplici, hac solutione crebrius tangantur verrucæ, vid. *Borellus c. 2. observ. 46.* item *spir. sulphuris & vitrioli* subigatur cum melle plus minus & fiat linimentum plus minus acre, quòd applicatum verrucis easdem pedetentim erodendo solet mortificare. *Limaces* sunt egregiæ, quæ abstergendæ sunt sale communi, sic produnt salivalem humorem, quo illitæ verrucæ crebrius insensibiliter evanescunt; Item *empl. de galbano Mynsichti* expertum est ad clavos pedum, *Timeus* & *Sennertus* hoc etiam recommendant, sic etiam pars emollita semper potest abscindi. *Empl. ex cera* cum tantillo *grii dulcis* absunt verrucas, sicut *empl. Vigonis de ranis cum mercurio* emollit clavos pedum & verrucas. Præ cæteris tamen istæ verrucæ merentur considerationem, quæ in locis pudendorum ex congressu venereo sunt natæ, ad has Itali utuntur *aqua forti*, sed melius est *pulvis mercur.* *trita soluti in  $\nabla$ . plantaginis cum alumine.* v. gr. *R.  $\nabla$ . plantagin.  $\text{ss}$ . mercur. præcipitati  $\text{Div}$ . aluminis  $\text{ss}$ . dissolvantur invicem, & cum penna huic liquori intincta tingantur dictæ verrucæ, sic emarcitæ pedetentim decidunt, vel si sint sitæ ad modum thymiet condylomatum in pudendis curantur, sc. *R.  $\nabla$ . calcis vivæ & misceatur cum mercur.* *eto*, hæc  $\nabla$ . fluida vel linteaminib. huic  $\nabla$  intinctis solent exiccare & curari.*

**FUNGUS**. Evenit subinde, ut circa articulos, ex dilatatione aut laceratione membranarum, vel extendinibus expansis læsis & violenta laxatione vel casu inductis læsionibus excrescat tumor mollis, pedetentim incrementum capiens, qui si aperta cute amplius spacium acquirat, incrementum acquirit & acrescit in substantiam carneam & mollem, albicantem, quæ dicitur Fungus. Rarissimum est, quòd præter articulos alia loca soleat infestare, semper tamen membranis radicitus inhaerere observatur. Post articulos etiam membrana cranii post vulnerationem in talem fungum erumpere solet, vel eidem talis fungus adnasci.

**CAUSA** autem fungorum est humor nutritivus retentus & collectus, cui cum se jungat circa articulos synovia, exinde substantia mollis, rara & luxurians generatur, simul tamen corruptionem & occultam acescentiam concipit, hinc interdum *fungi* sunt *cancrofi*. **CURA** difficilis sæpius nulla, nisi pars affecta extirpetur, & radicitus tollatur, quandoquidem pedetentim corpus ad tabem producit, omni nutrimento in fungo deperdito. Exscindendus ergò est, vel blandis exedentibus tollendus, in casu ubi declinat ad can-

crum;

CURA,



crum: Si & hoc sit periculosum, saltem pulveribus exsiccantibus acidum temperandum & imbibendum, ac in quantum possibile est, majus incrementum præcavendum: Tales pulveres sunt ex *aristolochia rotunda, myrrha, lapid. calamin. saccharo, vitriolo, calce viva* & similibus: Fungus mox in principio suppressendus est, ergo mox adspargatur C. C. ustum pulverisatum, *myrrha, pomphol. & similia*. Si *precipitat.* nec hæc suffecerint, mature usurpetur *mercur. precip.* si hic non suffecerit, lethale est malum. vid. *Hildan. in centur. 1. obs. & Scultet. obs. chirurg. obs. serv. 17.*

ANEVRISMA. Sequuntur tumores, qui vasa sanguinea occupant, & aneurisma-  
tis nomine veniunt: ANEURISMA est, dum arteria aut rumpitur, aut rupta ex  
quacunque causa, aut vulnerata loco venæ, aut arteriæ perveniam pertusam vul-  
neratæ sanguinem spirituosum in loco læsionis colligit; Hinc ex ista sanguinis  
collectione successivè talis tumor attollitur, sit pedetentim, si perfecta sit arteria.  
In hoc tumore sanguis corruptus, aut nonnihil spissior & obscurior observatur,  
unde tumor mollis, coloris sæpe ejusdem cum partibus vicinis, latus & interdum  
pulsatorius esse solet, & quando tumor digito impressus omnino introcedit,  
remoto verò digito subito recurrit, atque hæc magis locum habent in aneurisma-  
te non adeo ingenti aut in veterato, etiã in inveterato *pulsus* non adeo manifestus  
percipi solet, in tumore etiam *sanguis semi-grumofus* non tam subito in arteriam  
potest propelli: In partibus externis faciliè patent, in partibus verò internis subin-  
dè impercrutabilia sunt, & rupto aneurismate ad mortem perducitur æger: *Hor-  
stius in observ. anatom.* quod interdum *aneurismata* oriuntur in partibus internis, le-  
thalia in iis, qui morbo Gallico curari volunt. Externa sunt sine periculo, inter-  
dum ægri diu possunt esse superstites, quia tamen periculum est, ne sanguis tandem  
corruptionem vel gangranam concipiat, subindè necesse est, curentur, vide *Bo-  
rellum & Horst. de eodem.*

CURA. Cum frequentissima causa sit *pertusio arteria loco venæ*, mox forti ligatu-  
ra ligetur pars læsa, vel lamina saturnea imponatur, & fortiter ligata pars læsa fir-  
metur, in opposita verò parte mox secetur vena; Hoc neglecto, sit aneurisma,  
quod dum est in principio, necesse est, ut applicentur fortiter *adstringentia ex ter-  
ra sigillata, terra vitrioli dulc. bolo armeno, spermiol. Crollii, coloph. thure* & simil. cum  
laudano opiato mixtis, sub forma empl. applicentur cum forti ligatura, vel dictis  
emplastris imponatur lamina plumbea, cum forti ligatura. Curiosum est, quod  
observat *Horstius & ex eo Hæferus*, quando arteriæ applicaverit *laudanum opia-  
tum*, mox hæmorrhagia steterit; videantur. Non incongruum erit sequens  
emplastr.

℞. pulv. sumach, hypocistid. sangv. dracon. aloës, thuris ana ʒj.  
ex his cum albumine ovi f. empl.  
add. loco ceræ empl. contrarupturam.

Hoc



Hoc applicandum est mox loco arteriæ læsæ, cum forti ligatura superjecta, ubi etiam grumus sanguinis in loco est collectus, frustra applicatur, alias notum est emplastrum Galeni ex thure, aloë, pilis leporinis & albumine ovi. Sin his irritis aut neglectis jam factum sit aneurisma, similibus adstringentibus ulterior progressus præcavendus, aut per ligaturam & dissectionem rami arteriosi aneurisma tollendum, quod periculosum, sicut illud palliativum optimum est, ut aperiatur tumor, & postea arteriæ apertæ applicentur vitriolacea, blandè corrodentia, ut labia crassa successivè coalescant & coëant, postmodum locus ipse & foramen consolidantibus restituatur; Hæc methodus est nova, & reperitur apud Galenum, qui modus est hic: Chirurgi minister arripit brachium & fortiter premit, ubi arteriæ ex ramo axillari decurrunt in brachium, tamdiu ut nullus percipiatur pulsus in carpo. Postea Chirurgus aperit larga incisura aneurisma, & sanguis semigrumosis evacuat, postea in loco arterioso mox patet, ubi sit læsio hæc facta, denuò comprimatur arteria, & Chirurgus accipit globulos ex vitriolo albo formatos, eosque bombaci involutos applicat loco læsæ arteriæ, postmodum inspergatur pulvis ex sarcocoll. colophonio & resina cum stuppis cannabinis hoc pulvere imprægnatis, desuper applica plumaceolas cum forti ligatura, sic sanguis successivè transfudando liquefacit vitriolum, & vitriolum erodit labia vulneris, quo factò denuò coalescit; Hi globuli tamdiu relinquuntur, usque dum decidant, quod non fit, nisi arteria sit consolidata.

**VARICES.** Juxta aneurisma in venis observantur varices, nempe sunt nihil aliud, quam venæ laxatæ tunica, seu quando venæ tunica laxatur, ut fibræ ejus valde distendentur, ut postmodum in loco venæ distento hæreat sanguis, & stagnando tumorem in loco digestionis inferat, qualis tumor vocatur varix. Malum hoc grave est mulieribus in ultimis à partu mensibus.

**CAUSA INTERNA** sæpe est sanguis crassus, qualis dicitur melancholicus, id est, qui ab acido occulto crassiorem obtinet consistentiam, unde in motu impeditus sanguis, in specie circa venarum valvulas vas continens ex succedente sanguine novo ita distenditur, & talem laxitatem tunicæ venosæ infert, ut postmodum sanguis uberius collectus talem tumorem inferat: Præter hanc tamen causam etiam sanguis, naturaliter licet constitutus, in trunco tamen quodam in motu suo impeditus, in istius trunci ramis hærens, eosdem distendere & varicem inferre potest. Hac ratione, propter vasa iliaca venosa in mulieribus ab utero tumido compressa, videntur originem ducere varices, sequuntur venarum ductum, & tanquam venæ ampliores, colore ex cæruleo livido conspiciuntur, pressusque hic tumor quidem retro cedit, sed in momento redit. Malum hoc cum sit minus molestum, sed in quibusdam præservationis locum habeat, in specie in melancholia hypochondriaca, rarius curari solet, nisi vasorum ruptionem, & propter aciditatem ulcus prævum aut Gangranam minetur; Nam talia ubi imminet pericula, necesse est sub-



inde, ut curentur & removeantur varices. Si ergo nimius fuerit tumor, punctura acus sanguis crassior evacuandus, postmodum laminâ hneâ applicatâ tumoris incrementum coercendum vel in tumoribus varicosis levioribus applicetur *ung. Hartm. ex butyri majalis part. j. & succi cy. fluiat. l. p. ij.* quæ coque interius laminæ varicibus illinendæ. *Vel*

*℞* farinæ lupinor. ℥. j. sterc. caprar. exsiccat. ℥. iij. aceti non valde fortis, in quo *℞* ignitus quinquies fit extinctus, q. s. M. & vel in forma empl. spissi applicetur, vel fortiter ligetur aliquamdiu continuando; aut quod optimum in varicibus costarum à *Fernelio* laudat. *℞* aluminis roch. q. v. coque cum aceto acerrimo, hinc spongia tali aceto imbuta, mane & vespere foveatur locus, & postea strictissime ligetur, continuando per integrum mensem.

#### DE GANGRÆNA ET SPHACELO.

Communis affectio omnium affectuum Chirurgorum est, ut superveniat GANGRÆNA aut SPHACELUS. Nihil novi est, ex luxationibus per se, ex inflammatione superveniente corripit partes gangræna & sphacelo, vulnera rite curata, sic facile gangrænam concipiunt; Tumores imprimis sanguineos comitari solet gangræna & sphacelus, nempe quando gangræna sit principium mortificationis partis, sphacelus verò perfecta mortificatio partis: *Differunt ergo saltem gradualiter.* Gangræna est imminens sphacelus, ita se exhibent, pars præsertim mutatur in colore, & color natus floridus, plus minus rubicundus, pallefcit & obscurum colorem quasi corneum contrahere solet; hinc ex obscuro isto colore pedetentim liquefcit, sub his coloris mutationibus simul partes molles flaccescunt, & fiunt laxæ, molles, velut in facto ipso sphacelo cutis spontè à partibus subjectis separari possit. In parte pedetentim sensus imminuitur, & imminente quidè gangræna sensus deficit, qui in incipiente insigniter pulsât. Calor in parte imminuitur, & pars antea calida remittit, sine manifesta causa tandem friget. Hæc manifestò sunt in gangrænâ ut & sphacelo. Et hæc sunt vel à Causa externa vel interna. Externa sunt contusiones, luxationes, lacerationes, morsus animalium venenatorum & simil. Interna verò morbi pestilenciales: Variolæ, morbi chronici cum tumoribus juncti, hujusmodi enim in morbis supervenit gangræna, in specie in pollice pedis, qui non nihil lividus fit, accipit pustulam, sub hac maculam nigricantem, subito tamen pergit, & integram tibiam occupat. Quoad CAUSAS PROXIMAS, communiter & rectè dicunt Gangrænam & Sphacelum esse partis mortificationem, hujusq; causam esse calidi nativi extinctionem. Calidum verò hoc cõsistit in acido volatili & spirituofo, quod partis peragentis instar se habet in structura & coagulatione partis seu formatione partis. Hoc acidum ergo vitale conservatur & restauratur continuò à sanguine & spiritu vitali influentibus salis, & occultè acidis. Quæcumq; ergo acidum istud destruunt, vel fomitem ejus impedire valent, omnia gangrænam & hinc sphacelum inferunt, adeò ut exindè sequatur, quod in gangrænâ & sphacelo peccet imprimis



inprimis alcali, quatenus propter acidi destructionem emergit, vel quomodo in se genitum acidum destruere valet. Hinc subinde post gangranam & sphacelum supervenit partis factor & putredo, signum alcali agentis in acidum, & dissolventis sulphur partis. CAUSÆ REMOTÆ sunt, quæ illud acidum dissolvunt, & æris partes destruunt. Causæ remotæ, quæ ita acidum destruere valent, agunt hoc loco vel immediate, vel mediatè. Mediatè, quæ fomitem ejus, nempe influxum sanguinis & spiritus vitalis impedire solent, ut ligatura fortis, contusiones, lacerationes, & simil. quorum occasione propter vasa læsa impeditur influxus sanguinis & spiritus vitalis, & propter hanc causam partes nervæ præ reliquis maxime proclives sunt ad gangranam & sphacelum, quod minus sanguine & spiritibus vitalibus irrorari soleant. Immediate verò partes lædunt, inprimis insensibilis transpiratio prohibita, quæ retenta acrior redditur, & acidum virale destruendo partem mortificat. Venena & morbi maligni, morsus animalium venenatorum, quæ fermento suo maligno alcalinæ prolapia acidum destruunt, & sphacelum inferre possunt. Accedit refrigeratio partium, inprimis nervearum, quia oclusis poris impeditur transpiratio, & affluxus sanguinis grumescit, unde gangranam contrahit. Præ cæteris nota est cautela servanda, ne decipiantur in cognoscenda gangranâ & sphacelo: nempe si fiat, ut pars sphaceli interdum motum adhuc habeat, quatenus movetur à tendine oblongo, cujus musculus sit sanus; ne ergo partem mortificatam profana habeamus, cautissimè, ut reliqua signa conferamus. Fermentum autem istud inquinans sanguinè, & ejusdem sulphur vitale per modum malignitatis destruit, & sic ad mortem producit. De cætero, gangrena & sphacelus qui oriuntur à causa interna, in curabiles sunt, nam licet integra pars amputetur, in altera tamè parte iterum erumpit. Partes quo magis sunt sanguineæ l. carneæ, eo minus corripuntur gangrena & sphacelo, & facilius curantur; partes vero nerveæ uti facilius corripuntur his affectibus, ita difficilius curantur.

In Gangrana ergo ejusmodi progressus est inhibendus; in sphacelo verò pars jam mortificata separanda & ulterior mortificatio præcavenda ac sistenda venit. Prestamus id cum internis & externis. INTERNA sunt omnia theriacalia: eminet tamen camphora, quæ interne & externè sunt optima; unde spir. vini camphoratus, spir. theriacalis camphoratus detur: ▽ scordii, C.C. citrata, cum camphora & similibus sunt remedia quæ in morbis malignis usurpantur; Sic possunt administrari. Fuit hæc mixtura Tilenii:

℞. Theriac. flor. Sulphuris aa. ℥ss. rad. ireos florent. ℥vi. spir. vini ℥vi. Mixturæ hujus propinètur duo vel tria cochlearia & expectetur sudor. Inter EXTERNAM gangranam & incipientem mortificationem sistunt, varia explicata, eminet spir. vini l. theriacalis vel theriacalis camphoratus, lintea spir. vini probè imprægnata, pulv. aloes & myrrhæ conspersa. Item cum in gangrena imminet mortificatio acidi, externè vel acida, vel salsa in acidum primatū obtinent.



Hinc *jus brassicae acidae* experimentum est elegans ad sistendam gangranam, decoctum calcis vivae, mirabile in gangrana, ad progressum sistendum vel, solitarium vel si eodē decoquatur & vel si in decocto calcis vivae dissolvatur *Grus dulcis* add. spir. vini, quod Galli vocant *∇. phagad.* & decoctum lupini vino albo & *lixiv.* adde parum croci. Decoctū scoriarum & in aceto sistit gangranam, vid. River. c. 4. observ. 50. vel ex Minderero decoctū *✱ ci* in urina aegri applicetur. Tandem *simus equinus* coctus in vino & instar cataplasmatibus applicatus, fuit secretum Sylvii atq; Barberi. imprimis catapl. ex farina lupin. fabarum & simil. cum oxymell. paratum gangrana inpositum, sistit eam. It. caput mortuum aqua fortis, contusum & decoctum cum *∇rosarum* in qua summitates panni lintei sunt intincti & applicati aliquoties calide gangranae. Si verò gangrana processerit in *sphacelum*, cura est haec (1.) Separanda est pars aegra à sana, quod fit vel ferro candente, vel candefacto inurendo partem tamdiu, donec aegri percipiant. Qui horrent ferrum vel ignem, si *butyrum Gni*, hoc circulum ducunt circa locum mortificatum, nam mediante butyro Gni illito impeditur progressus ulterior mortificationis, vel si sphacelus non adeò profundus processerit, necesse est, ut locus scarificetur profundè, locus scarificatus eluatur aceto mixto cum spir. vini, postmodum applica unguent. *Aegyptiacum*, vel vulgare, vel *Hildani*, quo loca scarificata illine: vel loco hujus *R. S. præc.* & misce cum unguento quocunq; mortificativo, & illine scarificatas partes, vel ad imitationem *Hartmann.* est elegans remedium mercur. præcip. cum oleo nucum coctus in consistentiam linimenti obscuri, quo illinatur pars vel scarificata, vel in qua mediante butyro Gni separata pars est sana & aegra. Dum haec fiunt, ultra talia, quae hinc inde applicantur ad mortificationem tollendam, *epithema* imponatur v. gr. Ex *scordio, aristol. rot. rad. hirundinar. absinth. bacc. juniperi, myrrha, aloe, coque in ∇. vel aceto, it. vino, lixivio, adde alumen vitriol. S. marin.* & similia, quae applicentur, ut impediatur ulterior progressus. Instar omnium sit *epithema* & *cataplasma*. Hoffmanni in method. medendi p. 411. Si jam verò pars quaedam penitus mortificata sit, separetur à toto, modus separandi fit vel per ignem, vel ferrum; Amputetur cum cultro incurvato pars & postmodum cum ferra pro ossibus: Per *Δem*, quando habent cultrum planum & candefactum. Magis dolorosa est haec operatio, sed minus cruenta; quaestio est, an debeat fieri separatio in parte præcisè, ubi cessat mortificatio, an in parte mortificata, an verò in parte sana? Respondeo, si gangrana aut sphacelus est simpliciter à causa externa, separetur pars in vicinia loci sani, & aegris cutis tam firmiter ducatur deorsum, ut sic aliquid de parte sana amputetur. Si verò à causa interna, melius est, ut largiter in parte sana fiat sectio, ut nempe sic possit impedi recursum gangranae in aliam partem. *Borellus* habet singulare instrumentum, cum quo in ictu possit separari pars aegra; Abscessus in parte factus curandus suppurantibus & mundificantibus instar ulceris recentis.



I. N. I.  
COLLEGIUM CONSUL-  
TATORIUM,  
PROLEGOMENA.

**I**N resolutione casuum quatuor considerata, primò sub-  
jectum seu sedes morbi, seu pars affecta, tam per essentiam,  
quam per consensum. Secundò, causa tum proxima, tum  
remota, quæ affectum cum symptomatibus variis producit.  
Tertiò, prognosis; 4. Cura & methodus medendi.  
Dubia sæpe & difficilis cura est potissimum [1.] ob com-  
plicationem symptomatum, ut si gravida febricitet, mulier  
variolis laboret, [2.] ob idiosyncrasiam individuorum, quæ est non tantum in  
crasi succorum contentorum, sed etiam in partium solidarum mechanica con-  
formatione consistit, quæ in singulis individuis quoad porosulos differt.

Caput Primum.

DE APEPSIA.

Mercator Belga tenuioris fortunæ tempore hyberno per Westphali-  
am peregrinatur, Lipsienses petiturus nundinas, sed negotiorum causa per tres se-  
ptimanas hinc inde in Westphalia detinetur. Lipsiam veniens, conqueritur de  
nauseâ & fastidio ciborum, dolore gravativo circa præcordia, sub costis nothis,  
noctes habet inquietas, manè evigilans ejicit copiosè sputa viscida, percipit  
ructus insipidos, à pastu, licet mediocri, rubores & æstus faciem occupant, urina  
turbida, crassa, pallida; virium supervenit imbecillitas.

RESOLUTIO. Ex symptomatum syndrome & causis antecedentibus pa-  
tet, ægrum aepsia seu digestionis stomachi imminuta & vitiata laborare,  
(Er hat den Magen verderbet.)

CAUSA in ipso stomacho cruditatibus viscidis repleto hæret, unde fermentum  
ejus digestivum partim copia obruitur, partim tenaci visciditate hebetatur.  
Hinc dolor gravativus non tamen in regione stomachi ab ægro perceptibilis  
exoritur, sed orificium potissimum superius sub noctis requie lacescitum,



noctes inquietas & somnum turbulentum producit. Manè sputa viscida ex dissolutis sub nocte & attenuatis cruditatibus in œsophagum regurgitantibus, cum per pylorum ob clausuram ad intestina transmitti nequeant. Cumque stomachus cruditates dictas, quantum possibile, digerere nitatur, istæ verò ob visciditatem ad fermentativam volatilisationem ineptæ sint, non mirum, flatus & ructus insipidos eructari, appetitum prosternei dejecta activitate fermenti stomachalis, quo fit, ut ingesta in pastam acidam viscidamque faceant, cujus acoris ratione, & inde pendentis inæqualis succorum in primis viis fermentationis φλοζώσεις & astuaciones, ruboresque faciei post pastum superveniunt, urinæ cruda, pallida, ob errata primæ coctionis, & defectum fermentationis, in statu naturali, intime salina recrementa cum seroso vehiculo jungentis. Virium successivus defectus ex frustranea corporis nutritione.

Induxerunt hoc malum victus inordinatus & crassior densiorque, ob paludes ibidem frequentiores, fermentum digestivum stomachi hebetans.

PROGNOSIS. Malum etsi caret periculo graviore, neglectum tamen facile in febrem intermittentem, malum hypochondriacum, vel cachexiam diuturnam præcipitare ægrum potuisset, quod non metuendum, si lege artis cruditates resolvantur & attenuentur, hinc evacuentur & post modum appropriatis internis & externis stomachus roboretur.

CURA. Propriori scopo vinum absinthites cum radice helenii infusum, vel extractum absinthii in vino manè jejuno stomacho & bihorio ante cœnam per aliquot tempus sumptum egregie conducit.

℞. Sal. armon. depurati ℥j. spec. diagalang. ℥ss. M.S. Erweichendes Magen-Pulver. d. in 4. partes æquales mane & vespere.

2. *Evacuant* optimè vomitoria v. g. crocus metallorum in vini absinth. ℥j. per noctem infusus, manè post exactam filtrationem propina. Vel

℞. Tartari emet. gr. iij. sach. albiss. gr. vj. ol. menth. dest. gr. j.

M. fiat pulvis S. Brech-Pulver.

Sin horreant vomitum.

℞. Mass. pill. de gumm. ammon. Querc. ℥j.

extr. absinth. ℥ss. trochisc. alhand. gr. ij. vel gr. iij.

c. f. q. elixir. proprietatis fiant pillulæ pro una dosi.

*Instaurandus ventriculi vigor* internè cum elixir propr. ad gutt. 40. mane & vespere sub ingressum lecti hauriat cochlear unum vel duo spiritus Juniperi. Externè balsamis stomachicis regioni stomachi & scorbiculo cordis inunctis.

℞. Aqv. menth. ℥iij. spir. Juniperi ℥vj. Elix. Matthioli ℥iij.

Spiritus



Spiritus salis dulcis ℥j. spir. menth. ℥j. M. dosis cochl. j. vel alterum mane & sub ingressum lecti.

℞. ol. stomachal. Cratonis, menthæ aa. ʒi. caryoph. ʒ℥.

nuc. mosch. expr. q. s. pro corpore balsami S. Magen Balsam.

## Causa II.

INFLATIO STOMACHI CUM ASTHMA TE  
ET CARDIALGIA.

Mulier laudabilis constitutionis conqueritur de appetitu deficiente, superveniente difficili & anhelosa respiratione, quæ ipsa in tantum etiam exspectatur, ut decumbere amplius nequeat, citra suffocationis periculum, quin semi erecta jacere necesse habeat: adsunt anxietates insignes (grosse Hergeus anst) crebrioribus vicibus repetentes. Accedens Medicus eam singultientem offendit: Interdum ructu, licet magno conatu emisso, levamen percipit quoddam. Dolent hypochondria, omniaque ibidem tensa & plena esse asserit, ut ne digitum sub iis recondere queat. Medicus explorat intumescentiam in regione epigastrica, mollem, cedentem tactui, quem ægra refugit, indeque impense se dolere conqueritur.

RESOLUTIO. Affectus est complicatus: symptoma primarium Inflatio stomachi, secundarium asthma seu levis orthopnoea, cum cardialgia & anxietate.

*Pars affecta* stomachi tota capacitas, ratione inflationis, ratione vero anxietatis, cardialgiæ, singultus, primario orificium superius.

*Causa primaria seu proxima* cruditas viscida & pituitosa, fermenti activitatem obtundens. *Difficilis respiratio* ab impedito, propter inflationem ventriculi, diaphragmatis motu, præsertim ægra supina jacente.

*Hypochondria dolent*, quando tenduntur, id est, quando spasmi oriuntur in partibus membranosis peritonæi. *Singultus* succedit, quando motu constrictivo convellitur orificium superius ventriculi, quod in consensum trahit diaphragma. *Ructus cum molestia emissi*, quia irritatum superius orificium semagis stringit. *Dolor ventriculi & anxietates* proveniunt à constrictione & motu convulsivo ventriculi, & speciatim orificii superioris. *Anxietates* (wann es dem Patienten so web und baaq umbs Herze ist) in febribus tam malignis quam benignis plerumque sunt ex stomacho, rarius ex corde affecto, ob impeditum sanguinis motum, ubi simul *respiratio anhelosa* observatur.

CURATIO. In cura proinde malignarum febrium potissimum à contagio, quibuscunque in principio morbi vomitorium exhibui, semper quieti & magis pacati fuere, quam qui nullum sumpserunt, hi enim summas perpessi fuerunt angustias.



In puerperis vero *anxietas* observatur, propter rapidum motum sanguinis chylosi circa vasa pulmonaria & vicina.

*Hypochondria dolent, tensa & suspensa sunt*, non tam ob flatum distendentes, quam ob partium musculosarum spasmus. In luxationibus vertebrarum dorsalium, nervorum nonnihil translocatorum, fibræ in spasmos crispatae, variis symptomatibus dant ansam. Inflatio stomachi quò longior, eò magis imminet tympanitis.

Propter dolorem & flatum (1.) flatuum impetus sistendus (2.) pituita viscida evacuanda: (3.) fermenti robur instaurandum. *Propriori scopo* sequens clyster applicari potest.

℞. decocti chamom. ℥v. urinæ human. ℥ij. M. adde elect.  
de baccis lauri, de hiera cum agarico aa. ℥ss. ol. dest. tereb. ℥ss. M. f. clyisma. decoctum chamomill. *Errori smarini in cerevisia, additis sem. carmin. fœnic.* egregium experiment. *Foresti carminativum.* Castor. ejusque essentia ad ℥j. egregia, si ferre possit ægra.

Vel ℞. aqv. menth. fœnic. aa. ℥j. ess. castor. ℥ij.  
spir. sal. armon. anisat. ℥j. laud. opiat. gr. ij. syrup. cort. aurant. ℥ij.  
M. f. potio, dos. i. vel 2. cochl.

Ubi vero *astus & phlogoses*, ℞. Aqv. menth. fœnicul. aa. ℥j.

spir. nitri dulc. ℥ss. laud. op. gr. ij. syrup. cort. aur. ℥vj. M.

PURGANTIBUS trochisci alhandali addendi, nam colocynthide mirè dissolvuntur phlegmata viscida.

*Externè* ut spasmi remittant, si pertinaciter resistant,  
℞. Theriacæ q. s. imprægnetur ol. quodam destill. vel. ℞. Emplex. taçahamaca, malaxetur cum theriaca.

### Casus III.

#### DE PICA à SCABIE RETROPULSA.

Puella procax & vegeta, annorum 14. cujus labra muliebri profluvium nondum polluerant, corripitur ineunte vere, sponte sua scabie, cujus pertasa molestiæ & pruritus fastidiosi, nescio quibus linimentis eam curare sategit, corripitur hinc brevi post febri anxiosa, malignæ simili, qua tandem, difficulter licet curata, redeuntibus sensim functionibus naturalibus, redit postliminio etiam appetitus, sed minus consuetus, præ cæteris enim eduliis speciatim cretà subtilissimè trita delectatur, ejusque usu mira voluptate afficitur, palam pariter ac clam eam suffuratam comedendo. Parentes solliciti, ultra minas simul Medicum pro consilio vocant.

RESOLUTIO. Duo circa resolutionem hujus casus ponderanda: (1.) quæ sit causa proxima scabiei (2.) quomodo scabies retro pulsa febrem & picam intulerit.

Quoad



Quoad prius, *scabiei causa proxima* est acido-acre sub cuticula defixum, natum occasione interclusæ transpirationis. Hinc homines quieti & minus laboriosi, vel nonnihil sordidi solent affici scabie. Halitus naturaliter per cutem transpirantes falsi, sub cuticula coacervati, corrumpuntur, & acorem contrahunt, qui acor alcalinum & roridum nutrimentum partium, cum quo effervescit, similiter corrumpit, ut partim in liquamen acre, falsum degeneret, partim salia hæc in nutrimento hoc irretiantur, & viscositatem contrahant. Cujus viscositatis ratione facile aliis adhærescit fermentum scabiosum, & fit contagiosum. Acrimonia verò acido-salina parti affixa, incipit corrumpere nutrimentum proximum, & sic corpus inficit. *Pater hoc primò ex pruritu*, omne acidum acre cutim attingens, pruritus, si acius, rosionem infert. 2. *Ex pustulis*; Acida primò rubedinem, postmodum albedinem inferunt; Alcalia verò primò albedinem, hinc nigredinem: videbis hoc, si fonticulum unum cum butyro antimonii, alterum cum lapide corrosivo excitaveris. 3. *Ex squamis decidentibus*, acidum erodit cuticulam, hæc abit in squamas. 4. *Ex pure*, quod est sanguis fermentando transmutatus, sulphure ejus ab acido præcipitato. *Distinctio scabiei in humidam & siccam non est bona*, nam prout subjectum plus minus est ferrosus, scabies quoque est vel humida vel sicca.

CURA Scabiei infra cas. 27. tradetur, sitque per alcalina medicamenta & linimenta, cum ol. tartari per deliquium, aut cum Galibus, Grius enim alcalina est natura, & acidum absorbet. v. g.

℞ Extract. panchymagog. Crollii, mercurii dulcis ana gr. xv.  
scammon. ꝑrat. q. s. pro stimulo M. f. pillulæ.

Quoad posterius, scabies & aliæ excretiones cutaneæ repelluntur vel à pororum occlusionem, vel à motu sanguinis aliorum concitato. *Occluduntur pori* (1.) à frigore, vel extrinsecus admoto, ut, quando corpus denudatur, post sudorem frigori exponitur, fibræ nervæ se contrahunt, vel intrinsecus recepto: Huc pertinet haustus frigidus, à cuius ingurgitatione cutis se stringit, ob consensum nervorum & panniculi carnosum cum membranis stomachi. (2.) à viscidis, unctuosus, pinguibus, oleis expressis, emplastris applicatis, quæ poros illinire solent. Hinc scorbutici, & qui serum habent acius, à levi emplastri admotione pustulas & herpetem contrahunt, ob coercitos halitus acres. Ulceribus corrosivis meliori successu pulveres ex lapid. calaminari, cret. cerussa, sacch. huius conveniunt, quæ acidum absorbendo saporem falsum acquirunt.

Motus sanguinis aliorum concitatur à venesectione, purgatione, vomitu, clysmate, intempestivè applicatis, quibus sæpe motus naturæ expulforius ad exteriora pervertitur. In petechiis hinc venesectione maxime periculosa. Clysmata quoque in variolis vidi lethalia, deflorescentibus inde variolis, & diarrhœa colliquativa succedente. In puerperis si sit suspicio febris malignæ, lochia stringenda potius nonnihil, quam nimis pellenda suadet Willis. Quia tunc serum vitiosum



vitiosum, seu sanguinis vehiculum à partibus exterioribus materiam vitiosam interius, & ad uterum simul rapit.

*Repulsa* verò *scabies* & aliæ excretiones cutaneæ tam *periculosa inferunt symptomata*, quatenus excrementa cutaneæ, quacunque occasione vel immediate cum sanguine mista, vel sero soluta in cruorem reafusa, sanguinis texturam naturalem insigniter irritant, quâ vitiatâ depravatur spiritaliscentia, vitiantur fermenta, sicque à tantillo fermento tota massa sanguinea infici potest.

His ita suppositis in hoc casu pica fit à stomachi fermento inquinato ad modum acri, acido-salfo, quod cupit saturari iis, quæ acidum imbibunt, quale *creta*; danda proinde qualia appetunt, modò non nimia quantitate. *Febrius de absinthio* concessit cretam, sed cum mechoacanna mixtam, quibus fermentum destructum saturatur, & simul evacuatur. Itaq; (1.) fermentum ventriculi saturandum, hinc 2. per vomitum evacuandum. 3. stomachus roborandus, ad saturationem faciunt *Stialia & alcalia fixa*.

℞ Corall. rubr. præp. crysall. præp. ebor. ust. sal. absinth. ana ʒj.  
M. detur mane & vesperi.

*Queritur.* Quomodo *scabies* & excretiones cutaneæ retropulsæ iterum expellendæ? *Respondeo*, fermenta salina iterum separanda, ut separata à sero imbibit, & huius vehiculo in cute rursus desigi queant. *Separatio* instituenda mediante præcipitatione, quâ prægressa, serum purum transeolatur, fœcibus præcipitatis circa poros cutis congestis efflorescentibus. Danda igitur *alcalia*, quæ acidum in salum convertunt, ut *salia fixa & volatilia*, card. bened. fumar. absinth. viperar. C.C. fuligin. sanguin. humani; Si aestus urget, *Stialia fixa*, bezoardica, & diaphor. mixtura polychresta ex ℞ & lapid. 69. egregia sudorifera & diaphoretica.

℞ Aq. scabios. fl. sambuci. card. bened. ana ʒj. ℥. vini ʒvj.

lapid. 69. gr. xv. syrup. de fumar. ʒiij. M. pro 2bus vel 3bus dosibus.

Pertinet huc etiam *emulsio* ex semine napi, aquileg. card. bened. citri, sub nomine liquoris alexipharmaci à *Zwelffero* correctæ. *Fimus equinus* ad purificandam massam sanguineam est egregius. Tandem consilium *Zacuti Lus.* non improbandum, qui suadet ut cum alio scabioso concumbat, sic *scabies* redibit.

#### Casus IV.

#### DE CHOLERA BILIOSA.

Juvenis *εὐαγρος* & probè sanus exercitiis deditus, cum gravissima ira excaudivisset, ne in vindictâ instituere posset, bibit aliquantum vini cerasci, hinc domum rediens ingruente nocte ex improviso terrore gravi percutitur, unde sequenti die ob languorem universalem & lassitudinem artuum in lecto subsistere cogitur. Mater sollicita propinat dosin tincturæ bezoard. unde sudor sufficiens prolicitur cum aliquali euphoria; Die sequenti atroces anxietates eum

corripit.



corripiunt, (Er weiß nicht wo er vor Angst bleiben soll) ut in lecto inquietus se jactitet, sudores copiosi circa caput prorumpunt, flatus abdomen distendunt, sitis urget intensissima, modò calet corpus intensissimè, modò naturaliter tepet. Ex propinato remedio confortante nauseat stomachus, in vomitus erumpit copiosa materia viscida, flavæ, viridis, amarissimæ, cui & copulantur aliquot dejectiones per inferiora, cum flatu emissione, hinc levatur malum, æger comòdè satis se habet, die vero 4to eadem recurrunt symptomata, anxietates longè crudelius afficientes: adeò ut æger moribundi instar jaceat cum facie pallida & quasi exangui. Cum ad horam & amplius ita afflictus fuisset, tandem summo vomendi conatu, antea sæpius irritò, excernit aliquantum materiæ viridissimæ & amarissimæ; vocatus Medicus pulsum validum, magnum, celerem, invenit, rogatur ægro instituenda cura.

**RESOLUTIO.** Est affectus cholerae affinis, minùs acutus, per intervalla rediens; *Subjectum* morbi seu ratione transmissionis, ventriculus & intestina, seu ratione receptionis & excretionis.

*Causa proxima* est succorū acrium (acidi pancreatici & biliosi corrupti) in primis viis effervescencia. In ira turgescit bilis & sanguis. A terrore motus spirituum supprimitur & augetur acidū; amarum acre in stomacho ingentes creat anxietates, quales observantur ab assumptis vomitoriis, quando ultimò materia amara evomitur, orificia ventriculi tamdiu stringuntur, donec prævaleat pylorus & per superius molesta ejiciantur, sudores circa caput prodromus & effectus synopes. *Sitis* primariò affectus faucium, secundariò orificii superioris ventriculi, quod stimulatū ab acido famem, ab alcali vel salino sitim infert: Omnia amara ex intestinis regurgitantia ad stomachum, clamorosa sitim inducunt. *Spiritus vel clyffus* & in febribus ardentib. optime sitim sedat, quatenus alcali rodens corrigit; Quando acidum abundat, & membranas primæ regionis vellicat, urget rigor, quando verò sub inæquali isto concursu prædominatur pinguedo bilis, oritur phlogosis, unde præcipitantia & fermentationem sistentia conveniunt, in rigore quidem sal absinthii, os sepia crystallus; in phlogosi arcanū dupl. Myns. & Gniat. spir. nitri dulc. quando subito languet corpus, spiritus, sin successivè, massa sanguinea affecta est. Colores humorū & excretorū varii proveniunt à textura, radios lucis vel transmittente, vel reflectente, vid. Boyle de color. Albedo excretorū ut plurimum à commixtione minus exacta aquei & oleosi oritur, maximè si hoc ab illo præcipitatur, sicuti spir. vini rectificatissimus, cum aqua mistus lactescit; pus albicat, sulphure sanguinis ab acido in vulnere præcipitato, lac est album ab acido mannis impresso. Semina oleosa cū aqua trita emulsionem lacteam præbent, unde excreta candicantia, præcipationem quandam prægressam arguunt. Rubedo oritur ex sulphure seu oleo sale volatili digesto & dissoluto; omne oleum, ☉. & spir. volat. animal. aliquamdiu asservatus, tandem rubescit, ex dissolutis particulis oleosis adhærescentib. Si ✱. calx viva & sulph. destillantur, una spir. prodit rutilans



lans à sulphure ab alcali soluto, si huic spiritui aureo affundas aquam, totus liquor lætescit, & sulphur ad fundum secedit,

*Rubedo sanguinis* ex oritur à sale volatili intimè oleoso, seu sulphure dissolvente. *Urina quo rubicundior*, eò sulphure ab alcali volatili digesto abundantior: *turbida* contra fit *urina*, si aliquid aceri admisceatur, non ritè cum partibus reliquis uniti. In morbis acutis dum *urina elaya turbantur*, instauratum fermentum stomachicum designant.

*Fætor fecum* fit à putredine, quâ sub solutione concreti alcali liberatum agit in sulphur, illudque dissolvit. Sic sal tartari cum fl. sulphuris in crucibulo fustum immensum spirat fætozem. A purgantibus fortioribus excreta pessimè fœrent, quatenus istorum alcali acre in sulphur scybalorum agit.

**CURA.** *CrySTALLUS* preparatus uti bilis æruginosæ alexipharmacum audit *Sennerto & Langio*, ita magnæ in cholera efficaciam experimento *Heerii*. Spir. vini calidè stomacho applicatus egregius. In cholera biliosa cerevisia secundaria succo citri acidulata porrigenda, vel Julepi blandè aciduli v. g.

℞. flor. papav. err. mj. infund. in ℥. simpl. ℔i℥. spiritus sulphuris q. s. acidulata, stent in digestionem ad extrahendam Tincturam: Colaturæ adde syrup. corall. cort. aurant. aa. ℥℥. spiritus nitri dulcis parum M. S. Julep.

Casus V.

## DE CHYLIFICATIONE LÆSA EX CRUDITATE NIDOROSA.

Fœmina delicata lautioribus epulis dedita, bonisque fortunæ affluens, conqueritur de vagis, subitò invadentibus & recedentibus æstuationibus corporis aliquot horis à pastu, cum faciei vago rubore, accedunt subinde ructus terri saporis vix explicabilis, quibus interdum s. vel 6. noctis hora superveniunt vomitus variorum liquaminum, cibis quibusdam assumptis plus minus permittorum. Manè mediocriter se habet, sed ad juscum gallinacei, pro consuetudine hauriendi odorem nausæat, & assumptis paucis cochlearibus id seponit, superveniunt solidæ æstuationes, in specie caloris intensioris in regione stomachi, qui gulam flammæ instar urit, unde gravior sitis supervenit, cum appetitu circa prandium prostrato: Vocat Medicum pro Cura.

**RESOLUTIO.** Digestioni opponitur *cruditas*, quæ duplex, acida, quando fermentum ventriculi nimis acidum, nidorosa, quando nimis iners.

*Cruditas nidorosa*, quâ præsens ægra cum soda laborat, observatur imprimis in febribus acutis, oritur sæpiissime à pinguibus, ovis frixis, castaneis, butyro, lacte, comestis, fructibus horariis, cucurbitis, melonibus, aliisque facilis corruptionis, potissimum in stomachi cavitate diutius retentis. Hac qui laborant semper habent excrementa alvi liquida impensè fœtentia.

*Nausæa* fit ob spasmus orificii superioris. *Phlogosæ* ex inæquali succorum in primis,



primis viis fermentatione, quæ in massa sanguinea usque continuatur, unde he-  
licis mox à pastu calor & pulsus augetur.

Soda seu sensus rostonis & caloris in gula fit ab effluviis acribus ascendentibus.  
Sitis à sale acri lixivo, orificium superius stimulante, vel ex defectu lymphæ in  
faucibus.

Affectus non est lethalis, brevi curabilis; neglectus vero diarrhœæ vel febris  
ardentis superventuræ periculum minatur.

Quod ut evitemus, (1.) stomachus supra vel infra evacuandus (2.) si quid  
superest excrementi, corrigendum temperatis, v. g. crem. tartari, arcano dupl.  
off. sepiæ &c. (3.) stomachus blandis acidis vigorandus. Purgantia in cruditate  
nidorosa minori danda dosi, quia facile laxantur. Si soda prævaleat, præmit-  
tantur acidum absorbentia.

In præsentī casu, ratione cruditatis nidorosæ, conveniunt abstersiva, ratione so-  
dæ, præcipantia: utriusque scopo satis facit sequens.

℞. arcani duplic. ʒij. off. sepiæ præp. ʒj. pulv. nucist. gr. vj. M. pro  
2. dol.

℞. cremor. ʒij. corall. rubr. ʒj. M. pro 2. dos. in iusculo.

Soda desperata & cardialgia per crem. tartari curata traditur in Ephem. anno 3.  
pag. 385.

Casus VI.

DE CARDIALGIA SEU SPASMO ORIFICIī SUPERIORIS  
VENTRICULI à FUNGIS.

Anri faber ætatis consistentis, cœna peracta, quam sanus & hilaris assumpse-  
rat, lectum petit, nocte evigilans acutissimos dolores in regione dorsi circa  
medias thoracis vertebra percipit, tanquam pugione perforaretur, dolor à  
parte postica incipiens ad anteriorem partem sterni transit, [ der Schmerz  
denkt sich aus dem Rücken bis an die Herz-Grube ] ubi etiam intensè, minus ta-  
men acutè urget, cum insigni anhelitus difficultate, ita ut ex punctione vehē-  
menti cum dolore quodammodo suffocari videatur. Pulsus magnus, æqua-  
lis, paulò celerior, minimè durus: Medicus investigans causas antegressas,  
comperit ægrum die prægressa vasa argentea mercurio incrustasse & hinc de-  
aurasse, in prandio quoque illius diei fungos cum butyro frixos, quibus sæpe  
delectatur, comedisse.

RESOLUTIO. Affectus est cardialgia, seu spasmus & constrictio orificiī su-  
perioris ventriculī, quod maximè sensile & laceffitum sæpè totum nervosum  
genus in consensum rapit. Sic observata Epilepsia à dolore stomachi, quæ post  
vomitum cessavit. Nec rarò syncopes vagæ, potissimum in mulieribus exinde  
visæ.

Causa proxima est irritatio, quam sequitur spasmus. Remota fungi &  
bolæ



*boleti comesti*, qui rectè à Seneca vocantur venenum voluptuarium, habent acrimoniam occultam causticam, in viscidate admodum tenaci, vid. *Hild. obs.* hujus antidorum theriaca cum oxymellite: Non verò sumi mercuriales, qui solum tremores aut paralyfin inducunt. Dolor circa vertebrae dorsales, cum respiratione difficili observatur, quia quando orificium stomachi diaphragma perforat, supra vertebrae dorsales ascendit. Quando oesophagus aliquid convulsivi patitur, tunc dicunt aegri: [ *Es ziehet mir den Hals zusammen.* ]

*Pulsus durus*, id est, quando arteriae tenduntur, rigidae sunt & digito resistunt, nunquam verò observatur, nisi quando membranae quaedam vel inflammatae vel convulsae, v.g. in pleuritide, in doloribus nephriticis, colicis, apoplexia forti.

Morbus praesens est acutus, si augeatur, periculum Epilepsiae l. Syncopes supervenientis.

Proinde materia peccans per vomitum vel secessum exturbanda, tum dolor opiaris & specificis sistendus. Si dolor intensior, loco vomitus cathartica cum opio, sed in majori dosi offerenda. *Chamamelum* optimum in cardialgia: *sacculi cum aromaticis*, vino incocti, stomacho applicentur.

Casus VII.

#### DE CATARRHO EPIDEMIO.

Anno 1675. totam ferè Germaniam pervadens. Quoad morbum, qui hactenus epidemicè grassatus fuerat, observatum, quod universi anni tempestas fuerit admodum inaequalis seu inconstans, imprimis aestas pluviosa, indeque aquarum repetitae inundationes, cum spirantibus crebrioribus zephyris, hinc principio Septembris, circa æquinoctium, nebulae spissiores auroram obscurabant, circa meridiem claro solis splendore denuò illucescente, utut tandem pluviosum, & humidum tempus superveniret; Hinc sub finem Septembris & mense Octobri ubique grassari incipiebat coryza gravis & diuturna cum copiosa mucij rejectione, quam dolor gravativus & tensivus capitis comitabatur. Superveniebat huic post aliquot dies tussis crebra, ferina, (*Schaffhusten*) profunda, frequentissimè pectus concutiens, inanis & sicca, noctu praesertim affligens, donec transactis aliquot diebus & humida fieret; unde copiosis rejectis viscidis liquaminibus pedetentim cessavit. Quidam subita obmutescabant raucedine, verbum sonorum nullū proferre poterant, cum tanta respirationis difficultate, ut ferè suffocari viderentur, ex eo, quod pectus ipsis angustissimum & ubiq; repletum appareret, unde & tales nec tussire poterant, donec, cessante pectoris angustia & liberiore facta respiratione, tussis superveniret & raucedo paulatim cessaret. Plures cum dictis symptomatibus, praesertim in principio morbi, frigus vagum spinam dorsii penetrans interdum affligebat, aestu plus minus vesperi insequente ad mediā usq; noctem, & sic quotidie repetebat. Quidam dolore punctorio in alterutro latere affligebantur, occupante spatium costarum notharum & à regione spinæ dorsii lumbari sursum, anteriora versus ad sternū usq; ascendente,



depte, respirationem ob gravissimos dolores insigniter impediēte. Rejiciebantur in taliter constitutis quibusdam cruenta & viscida glutinosa, non tamen purulenta; aderat tunc simul calor, in principio intensius, cum pulsu crebro, celeri; Omnia tamen cessantibus doloribus cessabant.

*Queritur qualis affectus fuerit; unde ortus; quomodo curandus?*

**RESOLUTIO.** Affectus est catarrhalis, ex lymphæ p.n. effusione per irritationem externam.

*Pars affecta* in genere glandulosa, speciatim variat pro symptomatum varietate: nunc membranæ narium & vasa glandulosa laryngis, nunc circa corporis peripheriam.

*Causa materialis lymphæ* vitiata, acris, acida, plus minus abundans, p.n. mota, vitiata verò ex inæqualitate aëris in casu exposita. Aer pluviosus & nebulosus Massam Sanguineam vitiat, ut spiritus minus volatiles producat, hinc lymphæ asperior & copiosior, sal universale aëris plus minus enervatum.

*Causa efficiens*, seu lympham dicto modo vitiatam movens, *proxima* est spir. vitalis & animalis, qui irritatus fibras partiū variè movet, quib9 cōmotis etiā partium contenta moventur, unde loca glandulosa lymphā suā effundunt.

*Remota*, quæ efficientem internam moveret, est inclementia aëris autumnalis, nebulosi, qui cum sordibus, quibus scatet, attractus, nares, fauces, irritavit ad effusionem lymphæ; unde coryza, tussis, pleuritis, non secus ac spina infixæ dolorem & affluxum facit.

*Coryza* quidē orta ex irritatione membranæ narium internæ & pituitariæ superioris, ab attracto intra nares aëre asperiore, atomis asperiorib9 irregularibus stimulantibus referto, sicut effectum similem videmus à pulvere sternutatorio, solutione vitrioli albi, intra nares attracta. Ex irritatione fibrarum & spirituum facta lymphæ effusio.

*Tussis* successit ex irritatione simili membranarū faucium & laryngis, primū sicca, à simplici lymphæ effusione, acrimonia sua membranā asperæ arteriæ stimulantis, post humida, succedente excoriatione laryngis, ex qua succus ejus nutritivus exstillat, qui corrupt9 dat mucū, & tussim humidam. Micula panis intra laryngē recepta, ob irritationē, primo tussim siccā, si continetur, & humidā creat.

*Raucedo* ab humectatione nimia laryngis.

*Anxietas & plenitudo pectoris*, distensionem pulmonum impediens, à motu convulsivo pulmonū, qui ob retis fibrosi constrictionem non poterant distendi, unde nec tussire tales poterant. Ab opiatis cessabat, absq; materiæ rejectione.

*Febris catarrhalis* à lymphæ nimis acida cum sanguine effervescente.

*Rigor* ab acore partes membranofas circa præcordia vellicante.

*Astus* ex effervescencia lymphæ acidæ cum sale volatili oleoso sanguinis.

*Pleuritis notha* ex lymphæ acri, rodente, circa pleuram effusa oriebatur.

*Dolor*



*Dolor tensivus* à spasmo membranarum cerebri, ob consensum cum natibus: *gravativus* ex sanguine stagnante & turgente.

*Mucus* non causa, sed productum tussis, asperam arteriam leviter excoriantis, ex qua alimentum proximum transudans, cum lymphâ copiose affusa degenerat in mucum, qui in bronchiis collectus successive evacuatur.

Noctu affectus catarrhales exacerbantur, quatenus circa vesperam minora sit insensibilis transpiratio.

*Quoad curam*, [1.] Ratione causarum efficientium spirituum impetus sistendus, & nimius irritationis sensus tollendus per *opiatâ*, quæ in principio tussis sicca præsentaneè juvant, minus verò excoaratione jam facta.

[2.] Ratione causæ materialis *acrimonia lymphæ* temperanda per *salia volatilia, oleosa, balsamica; abundantia, sudoriferis & diureticis* tollenda.

[3.] Sordes, si quæ in naribus & pulmonibus restiterint, *incidentibus & resolventibus* removendæ, aliæque tensiones partium appropriatis restituendæ. Imminente coryzâ, ad præservationem suam, ut nares manè & vesperi balsamo apoplectico illinirent, ad aërem & læsionem jam inductam corrigendam.

*Coryzam* semper preffo pede sequebatur *tussis*, quam præcavebam *opiatâ, sudoriferis*: v. g. seqv. mixtura vesperi, parcissima cœna prægressa, ad eliciendum sudorem fumenda.

℞. ∇. serpilli ℥j. liq. C. C. succinat. ℥j. (vel loco hujus spir. C. C. essentia f. ℥ss.) laud. opiat. gr. ij. Syrup. papav. ℥ii. l. ℥iii. M. pro una vice. Loco hujus mixturæ

℞. liquoris C. C. succin. ℥ii. ess. opii ℥ss. M. dos. gutt. 30. l. 40. bis in die;

In principio hujus affectus & febris catarrhalis: Morbo verò aucto & naribus excoaratis, consultum, oleum destillatum anisi immittere, vel spir. salis ❄ci anisatum vel ❄vol. urina, C. C. crebrius, præsertim tempore vespertino, naribus admoveere & odorari.

His non sufficientibus, pulv. sternutatorius Helmontii, vel alius probatior in usum vocandus. Si dolor tensivus capitis conjunctus, guttæ aliquot olei dest. succini vertici illitæ, vel, si oleum acrius, bals. peruv. conducunt.

Succedente sicca tussi, adhuc in principio talia usurpanda, quæ lymphæ acrimoniam temperarent, faucium & asperæ arteriæ irritationem dolorosam sisterent & materiam incrassarent.

℞. ∇. scabios. ℥ij. asthmatic. ℥vj. Syr. papav. alb. vel diacod. Mont. ℥j. M. capiat cochlear tempore vespertino cum opiatâ. Vel

℞. ∇. scabios. ℥ij. asthm. ℥vj. spir. ❄ci anis. ℥j. syr. viol. papav. alb. aa. ℥ss. M.

Hoc sæpe tussis, superveniente blando sudore, sedata, sin verò tussis ad statum

jam



jam pervenerit, ut materia expectoretur, incidentia & expectorantia profuere v. g.

℞. ∇. hyssopi ℥ij. asthma. ℥℞. spir. ☉. vel quod melius, spiritus gummi ammoniaci cum ☉. parat. ℥ij. Syrup. Nicot. ℥℞. vel ℥vj. M.

Ut melius fauces & prae cordia stimulet, addi potest ℥j. Syrupi emetici Angeli Sala. Loco hujus mixturae succus raphani expressus cum paucis saccharo canto temperatus egregie incidit mucum: Si fauces, pharynx & larynx leviter excoriata, linctus blandi in usu fuerunt, v. g. looch passul. Syrup. diacodii Mont. viol. cū baculo liquoris.

Asthma opiatum & acridinem temperantibus curatum. In declinatione morbi, filationis inductae suspicio esset, ordinavi balsamum grisei anisatum & terebinth. quotidie ad gutt. 10. l. 12. in haustu jusculi vel cerevisiae calidae.

Febris catarrhalis curata fuit per Olia volatilia oleosa, imperando sudorem, speciatim mixtura supra de praeservativis proposita.

Pleuritis notha salibus volatilibus cum specificis & opiatum spir. ☉. \*ci anisat. liqv. C. C. succinat. tinctura grisei cum spir. \*ci, dente apri, maxilla lucii piscis.

℞. ∇. card. bened. pap. err. aa. ℥℞. spir. \*ci anisat. ℥℞. laudani opiat. gr. iij. Syrup. charefol. ℥ij. M. sumat cochleatim.

Pro alio aegro, qui praegresso frigore, aestu insolito, pectoris angustia & punitivo lateris dolore torquebatur, ordinavi seqv.

℞. ∇. fl. sambuci scabios. aa. ℥℞. lapid. 69. dent. apri praep. aa. ℥j.

☉. vol. maxill. lucii pisc. gr. xij. laud. opiat. per ferm. gr. iij. Syrup. card. bened. ℥℞. M. Mixtura hujus probe agitata capiat cochl. ij. expectando sudorem. Cum urina in hoc aegro esset turbida cum copioso sedimento lateritio, naturam diureticis juvi, tinctura tartari cum dimidia parte. \*ci, dof. gutt. 40. propinetur in ∇. menthae, serpilli cum Syrup. hederæ terrestris.

Inter externa profuerunt fotus calidifricci, & frictiones cum linteis calidis, sacculi avenacei calefacti, & empl. sequens

℞. ☉. vol. urinæ ℥iii. terebinth. ℥i. mass. empl. Barbert. ℥ii. M. in mortario marmoreo cum paucis empl. de meliloto, induc super alutam, applica. Nocent mucilaginosa & unctiosa, propter obstructionem pororum.

Opiata suspecta videri possent, quod motum naturæ & lymphæ excretionem impediunt. Verum conceduntur solum in principio, nequaquam in augmento & statu. Nec senibus opium concedendum, sed loco hujus extr. theriaca. Gravidis quoque interdiciendum plane, quia foetui nocentissimum; locum supplet Syrup. papav. vel diacodium Montani.

Purgantia in lymphæ vitiis nihil præstant, quia universam massam sanguineam turbant. Ast omnem paginam faciunt diaphoretica & diuretica, inter quæ in præsentia excellunt sal. vol. succini, essentia myrrhae cum spir. vini tartarizato, arcantum dupl. pro corrigendis urinis ad ℥j. bis in die.

Infantibus catarrhosis solus spir. ☉. ammon. anis. auxiliatur, si tussis affligat, gr. i.

Part. III.

V

vel 2.



vel 2. *theriaca*, adde *senibus* vertex *ol. dest. succini* inungatur, vel applicetur *empl. pro bregmate* malaxetur cum *balsamo Peruv.* & irrorandum pauco *oleo succini*.

*Casus VIII. DE DYSENTERIA.*

Mulier juvenula *evagra* & succi plena, sed hysterice affectibus levi causa obnoxia, simulque mensium difficultate non raro affecta, capit à Medico pill. seqv. horis matutinis cum regimine debito.

*Rx.* MP. de Hiera cum agarico gr. xv. vitrioli *Œtis* ritè præp. 3ß.

*scammonii* *Œrat.* gr. ij. extr. troch. alhandal. gr. j. c. f. q. *ol. dest.* tereb. f. pill. à meridie succedit evacuatio 6. 7. vicibus copiosa materię sordidæ, viscidæ & variæ, cum euphoria, sed nocte sequente evigilans, atrocissima perſentit in abdomine tormina, succedunt celerrimæ dejectiones alvi, vomitus; Ipsa doloribus vexata & excretionibus debilitata vocat Medicum, qui reperit eam summè debilem cum pulsu celeri, frequenti, excreta tenuia, rubicunda, instar loturæ carniū, sed intensius tincta, ægra in lecto se circumvolvitur, corpus mirè præ dolore incurvat & miserè ejulatur, postulat Medicinam.

*Resolutio. Affectus* est dysenteria. *Locus affectus* intestina tenuia, quia (1.) tormina sunt atrocissima, (2.) dejectiones tenues (3.) non statim sunt post tormina. (4.) Adest vomitus.

*Causa proxima*, Spiritus impetum faciens, irritatus ab objecto molesto. Specialiter, acidum rodens & excorians intestina, quod patet ex prægressis passionibus hystericeis, in quibus notoriè peccat acidum plus minus austerum. *Causa remota* purgans datum.

Mulieres hysterice à levissimis purgantibus maximè purgant, & sæpe sub operatione paroxysmum patiuntur, propter sensibile genus nervosum, & quia spasmis intestinorum consuetè sunt obnoxie.

*Vomit* in præſenti ægra non adeo malus, quia manū moderatè calidæ: Alias in dysenteria maligna vomitus malus, sæpiusque in dysentericis cum vomitu mortuis stomachus eschara obductus, & gangrenosus repertus. *Pulsus* auditus ex dolore, in aliis plerumq; febrim præſagitur. *Dolor contorquens* à spasmō intestinorum (*Es wind sich im Leibe*) lacerans ab excoſiatione, quam sequitur sanguinis deſectio ex venis capillaribus.

*CURA.* Pro Cura, acidum acre corrigendum, (2.) massæ sanguineæ reliquorumque humorum & succorum motus sistendus, & dolor mulcendus (3.) læſio inducta emendanda.

*Opiata* in principio possunt adhiberi, minus in progressu vel ſtatu, si metus gangrænæ.

*Corrigunt acidum C.C. uſtum; Terra sigillata*, quæ absorbendo acidum ab ita naturam aluminosam, unde simul adstringit, v. g. In dysenteria maligna sequens conducit optimè.

*Rx.* Terræ sigill. 3j. *Œ* diaphor. ʒj. laud. opiat. per ferment. gr. iij.

*ol. cinam.*



ol. cinam. gt. iij. M. f. pulv. pro 4. vel 6. dosibus, capiat cum  $\nabla$ . cinamomi cydoniata, simul quieta jaceat & si fieri potest, post unam vel alteram dosin blandum expectet sudorem. Abdomini, ut spasmi remittant, opercula calefacta vel seqv. sacculi tepidè applicari & pro usus exigentia reiterari possunt.

$\mathcal{R}$ . herb. chamom. cum fl. miiij. fl. verbasc. samb. aa. mij.

fol. quercus menth. aa. miß. Incis. includ. 2. sacculis rot. interpassatis, si hæc non suffecerint, ad specifica accessus fiat.

$\mathcal{R}$ . rasura priapi Cervi  $\mathcal{Z}$ ij. hepat. viperar. exsiccat.  $\mathcal{Z}$ ß. mag. Corall. cum succo citri  $\mathcal{D}$ ij. laudani opiat. gr. vj. M. pro 6. dosibus.

Lesiones intestinorum, si quæ super sint, curat balsam. peruv. in vitello ovi solum, (vitella ovi enim in dissolvendis resinis, in specie purgantium præstantissima.) Tinctura antiphtis. tinct. sulphuris viriori, bals. sulph. tereb. essentia balsami peruviani (quæ hoc modo paratur:  $\mathcal{R}$ . balsam. peruv. subigere terendo cum salis tart. s. q. pro pasta, cui affunde spir. vini tartarizatum, digere in loco calido ad extrahendam essentiam, dos. gutt. 20. gustu acrior est, sed ructus parit.) Aliis decocta vulneraria placent. v. g.

$\mathcal{R}$ . rad. symphyt. maj. tormentill. aa.  $\mathcal{Z}$ j. herb. veron. alchymill. aa. mij.

plantag. com. hyperic. aa. miß. concis. inf. q.  $\nabla$ . comm. coqv. colaturæ

$\mathcal{R}$ .  $\mathcal{H}$ j. adde Syrupide Symphyto Fernellii, corall. aa.  $\mathcal{Z}$ ß. M. cuilibet haustu gutta una vel altera balsami  $\mathcal{Q}$ ris tereb. vel tinct. antiphtis. possunt addi.

Si intestina crassa gravius affecta cum tenesmo.

$\mathcal{R}$ . lactis bubuli recent.  $\mathcal{H}$ ß. adde tereb. vitell. ovi sol.  $\mathcal{Z}$ ij. & si opus mell. rutac.  $\mathcal{Z}$ vi. M: fiat clyma.

Decoctum cydoniorum aromat. vinum absynthites, Elixir menthae tonum ventriculi & intestinorum fibrosum restituentia conducunt.

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$ . plantagin.  $\mathcal{Z}$ ß. cinam. cydon.  $\mathcal{Z}$ vi.  $\mathcal{G}$ nii diaph. gr. xii. diascordii Frac.

$\mathcal{Z}$ j. trochis. de carabe  $\mathcal{Z}$ ß. lapid. hæmatit. pulv.  $\mathcal{D}$ ij. syrup. plantag.  $\mathcal{Z}$ ß. M. detur.

### Casus IX. DE COLICA CONVULSIVA.

Juvenis Nobilis, per longum jam tempus, abdominis patitur tormina, quæ vocat (die Colicæ) ita quidem, ut quoties vel dulcia vel facile fermentescibilia, tantilla licet quantitate comedat, patiatur Colicam, dicit, (Es reißt ihm so sehr um den Nabel) unde & sæpissimè circa regionem umbilicalem mediam dolorè percipit, cætera licet sanus. Cum dicto malo subindè etiam subitaneis corripitur paroxysmis, in quibus, sensu & motu omni evanescente, corrui, nescius quid secum agitetur. Adstantes tamen tremere eum & oculos hinc inde contorquere dicunt; evanescente hinc pedetètim hoc ipso pathemate, sanus ad se redit; Ingruunt hi paroxysmi cum primis, quoties terrore aut iracundiâ subito corripitur. Alvi naturaliter siccioris, & constitutionis scorbuticæ est, circa cubiti articulos pustulas scabiosas & crustosas cum pruritu patitur, sanie manantes. Fit interdum, ut utrumque jungatur malum, ita ut ex dulcium esu patiatur mox colicam, (wann es Ihm dann so reißt im Leibe / so steige es alles

licetur empl.  
sucini.

us levi causa  
Medico pill.

rep.  $\mathcal{Z}$ ß.

f. q. ol. dest.

ateriæ sordi-

atrocissima

vi, vomitus;

qui reperit

bicunda, in-

vit, corpus

stina tenuia,

statim sunt

to molesto.

egressis pas-

us aurorum.

& sæpe sub

a, & quia

calida: Alias

um vomitur

us auctus ex

no intestino

tur sanguinis

near reliquo-

idus (3) latio

atu, si metus

idum ab in

igna sequens

r. iij.

ol. cinam.



es alles nach gerade bößer / und ihm Ihm ans Herz / als das Er dann nicht wiste / wie Ihm weiter geschehe / ) tunc corruit, & supra dicta patitur; Hæc ipsa propter mala continuo fascia vel zona coriacea firmiter hypochondria cingere solet, ut, quando colicam suam, ut vocat, ingruere persentit, zonam illam firmiter contrahere, & hypochondria arctè stringere queat, cum in finem, ut medio sui quasi impetu coërceatur paroxysmus. Vocat Medicum

RESOLUTIO. Affectus hodie notissimus, (frequentissimus) veteribus, ob neglectum nervorum usum, sub colicæ nothæ nomine absconditus, qui vocatur *Colica convulsiva*: Convulsiones Colicæ, propter intestina, & alias quoque partes convulsas per consensum.

Sicut nimirum punctura nervi in brachio causat convulsionem brachii: Sic nervis intestinorum laceratis, contractura & spasmus sequuntur. Pari ratione, quando calculus per ureteres vel in pelvis movetur, ob laceratos & contractos nervos, tormina abdominis, nausea, vomitus, subinde hemicrania istius lateris, cujus ren affectus, succedunt:

*Partus dolores* cum spasmis uteri, aliarumque membranarum conjuncti. Mulier apud Hæserum dolores nephriticos se pati credens, loco calculi puerum excrevit. *Passiones hyssericæ* nil aliud sunt, quàm *convulsiones colicæ*, maribus & sceminis familiares. *Sensus globi in abdomine commoti* fit à motu intestinorum contractivo. *Suffocationis merus* nec semper hyssericas urget, & viris quoque non raro accidit.

*Colica humorosa*, quales vulgò describuntur, rariores, & tamen cum spasmis intestinorum ut plurimùm conjunctæ, quos produnt dolores contorquentes & lancinantes, via flatibus interclusa, angustatis ob spasmum intestinis.

*Tormina infantum* conjuncta plerumque cum tensionibus spasmoticis abdominis, ab acido lactis corrupti, nervos vellicante.

CAUSA PROXIMA præsentis casus est *acre scorbuticum*, quod probant ulcera scorbutica, quibus non ritè fluentibus pejus se habebat, urina non raro signum scorbuti præbet, cui si cauda pavonis (cine Bettigleit) supernatet, de præsentia scorbuti testatur.

Inter CAUSAS REMOTAS [1.] *dulcium usus*. Dulcia facillimè fermentantur, & contenta corporis fermentant, ac per fermenti rationem, nunc accescunt, nunc bilescunt; In hoc casu optima *amaricantia*, *absinthiaca*, *castorina*, *myrrhata*. [2.] *Pathematum impetus*; Ira Spiritus movendo omnes corporis succos p.n. moveri facit, *terror* Spiritus figit, unde sudor frigidus.

Fermentum acre scorbuticum ascendit ex abdomine, non ad cor, sic enim palpitaret, sed ad orificium ventriculi.

Malum caret periculo, licet propter scorbutum difficilis sit curationis.

CURA

CURA  
convulsiones  
dum verò pr  
inordinatum  
Initium fia  
humana, juxta  
ad 3j. W  
Loco Lux  
acre scorbuti  
equum. 3j. si  
motus lista

In mulierib  
agger volat  
veniunt. v.

R

Externe ol.  
laterem ca  
hametum Pa  
umbilico il

In par  
deglutire ne  
ejusdem aff  
dum.

Extra  
stivis detu  
facto ad  
specialia

In gr



CURA tum ad principium morbi & augmentum, tum ad statum, in quo convulsiones Epileptice & lipothymie superveniunt, dirigenda. Respicendum verò primo, ad acre scorbuticum, cui salia volatilia oleosa (2.) ad spirituum inordinatum motum, cui opiatæ & nervina opponenda.

Initium fiat à clysmatibus ex lacte, suasu Horstii, Drawitz, Bartholini. Urina humana, juxta Lusitanum, quibus castoreum & opiatæ addit Deodatus. Theriacam ad ʒij. Willis; Alii philoni Romani ʒj. vide Borellum libr. 4. obs. 92.

Loco laxantis passule laxativæ, aurum fulminans conducunt. Hinc sal acre scorbuticum corrigendum volatilibus & diaphor. v. g. spir. fuligin. pulv. testic. equin. ʒj. suc. stercor. equini, fuligin. ad ʒß. cum aceto assumpta, vel, ut simul motus sistatur.

℞ ∇. chamomill. ʒij. spir. cochl. ʒij. \*ci ʒj. laud. hysteric. gr. vj. syrup. cort. aurant. ʒß. M. Vel

℞ ∇. menth. fl. chamomill. ana ʒiß. spir. \*ci, fuligin. C. C. succin. cinamomis. vel carminativ. de ʒbus ana ʒß. laud. opiat. gr. iij. laud. hysteric. gr. vj. syrup. cort. aurant. ʒvj. M.

In mulieribus addi potest essentia castorei, myrrhe, cum spir. vini tartarifato; si æger volatilia ferre nequit, vel eadem propter nauseam rejicit, fixiora conveniunt. v. g.

℞ ∇. scenic. matricar. ana ʒj. specif. cephal. ʒß. pulv. testic. equin. ʒj. laud. opiat. gr. iij. syrup. de alth. Fernelii ʒvj. M. detur.

Externè ol. succini, spica & c. stomacho, & abdomini illinetur, imponendo desuper laterem calefactum, vel emplastr. de galbano malax. cum oleo dest. succini. Galbanetum Paracelsi spinæ inunctum. Pinguedo cati sylvestris cum paucis Zibetho umbilico illita, egregia in colica convulsiva.

In paroxysmo, ubi maxillæ constrictæ, & propter convulsionem laryngis deglutire nequeunt, convenit spiritus \*ci naribus admotus, suffitus succini, bals. ejusdem affricetur naribus & temporibus, ultimò ad sternutatoria confugiendum.

Extra paroxysmum curatur ad methodum chronicorum, præmissis digestivis detur vomitorium, sine quo vix radicitus curatur morbus chronicus, quo facto ad Stitalia accedendum; hinc subjunganter volatilia vel generalia, vel specialia antiscorbutica.

℞ Aq. antiscorbutic. fl. sambuc. ana ʒiß. spir. cochlear. ʒij. lumbric. terrestr. ʒi. arcani duplicat. Myns. ʒi. syrup. sceler. Foresti ʒß. M.

Casus X.

# DE DIARRHOEA BILIOSA.

In gravida, ab esu uvarum & subsequuta consternatione, cum siti intensa,

U 3

appetitus

CURA



appetitu dejecto, doloribus lancinantibus circa lumbos, virium prostratione, & dejectionibus copiosissimis, aliisque symptomatibus, quæ recenset historia.

CAUSA PROXIMA fermentum defes vel deficiens, quamdiu appetitus integer, motus naturæ non turbandus, cum languet, curatio non differenda.

Purgatio artificialis diarrhœa.

Sanguis exsiccat, ardet, nitro in crucibulo fluenti injectus illud figit in alcali.

Diarrhœa ab errore externo intrepidè sisti potest, minus, quæ motu naturæ spontaneo accidit.

*Clysmata* ex lacte chalybeato cum terebinth. profuisse, vidit Auror.

*Vomitiva* in diarrhœa contumaci stomachi vitio comendat *Riverius*, & *Experientia*.

*Purgantia* verò minus conducunt.

*Optima theriacalia* cum *acidis* atque *opiatis*, *diascord.* acrimoniam temperat *gelatina C.C. in potu dissoluta*.

℞ Aq. plantag. ℥ii. menth. ℥j. cinam. ℥vj. aceti vini vel succi citri ℥vj. diascord. vel theriac. Andr. ℥i. vel ℥ii. ℞nii diaphor. ℥i. l. ℥℞. syrup. cydon. ℥vj. M. pro 3. l. 4. dof. expectando sudorem.

℞ Conserv. ros. vitriolat. ℥ii. theriac. Andr. ℥ii. boli vel terr. sigill. ℥ii. ad ℥i. cum syrupo cydon. fiat electuarium.

#### Casus XI.

#### CHLOROSIS INCIPIENS.

Mulier Itala 32. annorum, formæ alias integræ, constitutionis sanæ, succi-plena, postquam per 12. annos marito sano ac robusto nupta feliciter cum eodem vixisset, & aliquot liberorum mater facta fuisset; illo per mortem sibi erepto incidit paulò post in vomitus enormes, periodicè singulis diebus, apparente aurora invadentes, perque duas horas durantes, tanto quidem cum impetu, ut hoc cessante cervicis tendines adeo tenderentur, ut quasi tetano correpta, per aliquot horas non sine multo dolore illius partis & totius capitis torqueatur. Ipsa antea floridæ faciei evadit nonnihil pallida, ipsis labiis nativum colorem perdentibus. Mala hæc per integrum annum jam eam mirum in modum excruciarunt, mensibus semper ordinatim, licet nonnihil parcius fluentibus. In abdomine ac circa hypochondria rectè se habet. Plures Medicos consulit frustra; Flagitat nihilominus pro suo malo curam.

RESOLUTIO. *Affectus* noster est *chlorosis incipiens*. *Pars primariò affecta* sunt genitalia, ubi & focus morbi: Est enim ægra vidua, Itala &c. *Symptomatum* verò *sedes* est stomachus & primæ viæ.

CAUSA PROXIMA est corruptio genituræ muliebris, hinc aura virulenta



lenta expirans. Notum quæ aura ejusmodi orgasmum brutis certo tempore concitet. Hirci nisi crebrius ad venerem admittantur, odorem virosum spirant, ex inchoata seminis putredine. Ex odore tali canes se invicem cognoscunt. Odores penetrantissimi habent se instar fermentorum, quorum naturam per odores *Helmont.* explicat, quatenus summè sunt activa & volatilia. Fermentum stomachi; renum, se habet instar odoris. Odor aceti lac coagulat; odor ex chirothecis scabiosis expirans manus, ex genitalibus infectis partes sanas in lucem venerea corrumpit, odor sulphuris vina à corruptione præservat, odor camphoræ pestem curat.

CAUSÆ REMOTÆ exercitium veneris deficiens & tristitia.

*Vomit* fit partim mensium vitio, partim vitio fermenti, ab aura virulenta ex genitalibus, mediante circulatione advecta, corrupti.

*Matutino tempore vomit*, quatenus cruditates nitrosæ ex ingestis non ritè digestis noctu coacervatæ, stomachum gravant, & ad expulsionem irritant.

*Tetanus* oritur ex spasmis musculorum, per consensum cum nervis stomachicis.

PROGNOSIS. Malum anceps est, & metus Epilepsiæ imminens, itaque ocyus curandum.

CURA. (1.) Ut vitium genituræ corrigatur, (2.) Massa sanguinea & lymphæ vitiatæ purgantibus, & diaphoreticis blandis purgetur. [3.] Stomacho maturè prospiciatur.

*Quoad prius excellit camphora*, quæ in specie odores morbosos ex putredine ortos emendat, non tam extinguit, quàm refrænât impetus venereos, figit quædam spiritus animales, hinc in deliriis prodest, & somnum inebriando quasi excitat. Egregiè confert in potu ordinario crebrius extincta, quali potu furorem uterinum curavit *Bartholinus*. In forma sicca cum nitro & saccharo *Hni.*

℞ Nitri ꝯniati vel arcani dupl. Myrs. ꝯiii. sacch. saturni, vel potius crySTALL. miner. saturni cum spir. nitri parat. ꝯi. camphor. ꝯß. M. pro 6. vel 8. dosibus.

Capiat manè, & sub introitum lecti cum potu camphorato; cum his in principio larga venæsectio instituitur, eaque repetatur, vide *Hildan.* & *Forest.* in obs. *Vomit* gravidarum optimè venæsectione curantur secundo vel tertio mense. Nec in consuetum, fonticulos coxis supra genua inurere, in specie, si non amplius nubere velit. In principio curæ corpus purgandum ex hellebor. nigr. mercurio dulci.

℞ Extr. hellebor. nigr. gr. xv. ad ꝯi. Zrii dulcis gr. vij. ad ꝯß. scammi. ꝯrat. gr. ii. c. s. q. olei camphoræ fiant pillulæ.

Remediis ex camphora & nitro addendus est liquor salicis ex his incisus, verno tempore collectus, impetus venereos in mulieribus singulariter refrænans, manè & vesperi pro lubitu propinatus.

*Myrrhata* ad putredinem, *succinata* ad spasmos adjungenda.

Externe



Externè mensibus remorantibus & seminis vitii succurrendum per *peffos artificiales*, quales delineat *Rhumelius*, Instrumentum *Glauberi*, commodius videtur sequens: Phialæ longioris colli immittatur spiritus salis armoniaci, collum linteis involutum mulieribus applicetur; phialæ carbonēs candentes providè admoveantur, sic spiritus magis penetrabit.

## Casus XII.

## DE COLICA HUMOROSA HYPOCHONDRIACA A PEDUM REFRIGERATIONE SUSCITATA.

Ut nihil magis præter naturam est, quàm dolor: Sic Medicus dolorum sublatione facillè famam sibi parare potest. In colica quærendum, an alvus sit aperta, & fluat.

Cætera vide in *Casu 18. pag. 95.* In Collegio cas. D.D. Wedelii, cum idem hic casus ibidem extet, præter finem, quem in paginâ sequenti hic videre licet, quod ut propediem in lucem edatur, speramus & optamus.

Externè olea carminativa egregiè se gerunt, *ol. hyoscyami* ad  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . cum oleo carminat. *Myns. ol. Iovis, spir. & ol. Juniper.* Prodest etiam tegula calida imposita; omnia enim calida nervis amica, frigida verò inimica. *Empl. de hyoscyamo*, item decoctum *hyoscyami*, quo feliciter usus *Drauwitz.* In infantibus clamantibus aliquid *theriacæ* addi potest; vitandus potus frigidus, panis calidus; blandus calor eligendus: si acidum viscidum firmiter colo agglutinatum, fibras nerveas vellicando, dolorem colicum producat, vix aliis evacuari potest medicamentis, quàm gummi v. g. *ammoniaco & mercurio dulci* v. g.

℞ Aq. menth.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . Sal. tartar. vitriolat. gr. xv. gummi ammon. aceto solut.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . scamm. ros. gr. x. extr. troch. alhandal. gr. j. syrup. de pomis  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . M. f. potio.

Hoc colicus dolor cum successu mitigatus, aliis purgantibus & clysmatibus causam morbi non attingentibus.

In alvo pertinaciter obstructa cum metu Ileï, interna generosa & externa tentari possunt, (1.) Follis ano applicandus, ut intestina à scybalis secedant, vide *Amatum Lusitanum*, qui modus hodie paulò exoletus. (2.) Globuli *plumbi*, quibus *Ileon* ex hernia incarcerata imminens curavit *Welschius*; Si globuli fiant ex *Hydro* & *Mercurio* in minori quantitate, erunt ponderosiores, vid. *Helm. Henricum ab Heer. obs. 2.* præmitti possunt  $\mathfrak{z}\text{j}$ . vel  $\mathfrak{z}\text{ii}$ . olei amygd. dulc. ad lubricandas vias. (3.) *Mercurius vivus* ad  $\mathfrak{z}\text{iv}$ . propinandus, si successus voto respondere debeat.

℞ Aq. menth.  $\mathfrak{z}\text{i}$ . ol. amygd. dulc.  $\mathfrak{z}\text{vj}$ . Merc. viv. depur.  $\mathfrak{z}\text{iv}$ . M. f. haustus. D. *Ettmüller* in obstructione alvi contumacissima à contusione capitis, *Mercurium* ad  $\mathfrak{z}\text{24}$ . successivè propinavit, die demum 21. incepit prodire *Mercurius* cum scybalis. Ad remanentias & noxas à *Mercurio* exhaustas ordinavit *bezoardicum solare*; item decoctum ex *rad. helenii & fenicul.* pro sudore ex *Hæchstet.*

Casus



## CASUS XIII.

## HÆMORRHOIDES COECÆ DOLENTES.

Mulier vegeta & corpulenta, cætera sana, indeque luxui dedita, 49. annorum, conqueritur de dolore lumborum lancinante, gravante, distendente, successivè crescente, una cum intenso dolore ardente, rodente, & nonnihil pulsante in interioribus podicis, hinc laboriosam alvi dejectionem patitur, in tantum, ut eam cum summis doloribus exoneret. Accedit tunc tremor, φλόγῳσις & æstus ex præcordiis caput petens, cum faciei rubore intenso, & largo sudoris per frontem & tempora defluxu. Medicus ordinarius varia ordinat interna & externa, venam in brachio secat. Levatur his malum, sed supervenit difficilis respiratio, ita ut quoties parum ambulat, vel aliquot saltem scalas ascendit, spiritus nonnihil intercipientur, & libera respiratio impediatur, cum pulsatione sensibili in temporibus & pedibus. Malum hoc varia Medici opera pedetentim evanescit, redeuntibus prioribus in lumbis & regionibus vicinis molestiis. Vocatur & alius Medicus pro Cura.

*Resolutio* Affectus est hæmorrhoidalis, pars affecta intestinum rectum, ubi vasa hæmorrhoidalia tam interna quam externa inferuntur.

*Causa proxima* inchoata inflammatio intestini recti, circa situm vasorum hæmorrhoidalium, à sanguine ob copiam stagnante.

*Causa remota* est fluxus (1) menstrui cessatio (2) In corpore sano & plethorico. Quod autem omnia hæc pathemata à cessante ob ætatem (erat enim 49. annorum) menstruo fluxu ortum doxerint; Colligitur (1) Cum non rarum sit, cessantibus naturaliter mensibus in subjectis vegetioribus supervenire hæmorrhoides. (2) Nec rarum, loco menstruorum obstructorum, hæmorrhoides, hæmoptysin, hæmorrhagiam narium supervenire. (3) Habituoribus una cum mensibus hæmorrhoides fluunt. (4) In partu difficili partes genitales vicinæ tumescunt, tenduntur vasa, & sæpe hæmorrhoidum supervenit fluxus.

In præsentī itaque ægra plethorica Sanguis superfluum, per Uterum antehac evacuare solitus, ob locorum viciniam in vasis hæmorrhoidalibus restagnans, & levem inflammationem patiens, primum tensionem dolorificam lumborum, hinc dolorem ardentem, rodentem & pulsantem in interioribus podicis non potuit non producere. Alvi dejectio laboriosa, quia pars tumet, dolet, hincque ab egerentibus fœcibus lacessitur. Tremor, sudoris eruptio ab exquisito dolore, sicut totum corpus tremit, si chirurgus partem aliquam exulceratam tangat. Aestus, φλόγῳσις, à subita sanguinis superiora versus repulsionē. Difficilis re-



*spiratio à sanguine*, ob ineptam in brachio venæ sectionem circa præcordia & vasa pulmonum coacervato, stagnante, & tardius per pulmones circulato, factâ nimirum sanguinis ab inferioribus versus superiora revulsione: Sicut enim mensibus erupturis subito suppressis, vel parcius fluentibus sectio saphenæ in pede conducit, quatenus sanguis, spatio inferius facto, rapidiori motu versus inferiora fertur, ita in superioribus evacuatione instituta, eò motu liberiori ruit Sanguis, nisi forsan pro liberiori Sanguinis circuitu conciliando, instantibus mensibus data opera in brachio aperiatur, quod in suppressione diuturna cum fructu factum fuisse legimus apud *Riverium* in observ. aliosque. In nostra ægra *hirudines* applicari vel *saphena* aperiiri debuisset.

*Prognosis.* Affectus in se caret periculo, nisi forsan ob negligentiam *abscessus*, *fistula* vel *fluxus nimis* hæmorrhoidum superveniat, vel *asthmatica dispositio* inducatur.

*Cura.* Itaque quoad *curem* (1) dolor inflammatorius hæmorrhoidum cæcarum tollendus (2) symptomata removenda. (3) Recidiva in corpore plethorico præcavenda.

*Dolor Inflammatorius* sistitur (1) *Sanguinem stagnantem* circa vasa hæmorrhoidalia vel sensibilibus evacuando, vel, si hoc non suffecerit, insensibilibus discutendo. (2) *Anodynis* internis & externis ac appropriatis. In nostra ægra necesse est, Sanguinem sensibilibus evacuare; *Quæritur* per quas vias? Ægra est plethorica, cætera sana, patitur hoc malum à suppressis mensibus. Si venæ sectio in pede instituatur, metus est, ne à nimio Sanguinis versus inferiora impetu dolor augeatur; si in brachio, redibit difficilis respiratio. *Respondeo* hoc in casu suaverim, pro revulsione universali & liberiori sanguinis motu parando, venæ sectionem in brachio instituendam; post unum vel duos dies in pede reiterandam, demum evacuationem per hæmorrhoides tentandam.

*Discutientia partum interna*, *sudorifera* fortiora, pro liberiori sanguinis motu concitando specificis maritata: *pulv. rad. scrophularie*, *chelidon. min. partim externa*, cum anodynis & appropriatis subjungenda: Exempli gratia, *fovus ex linaria*, *floribus sambuci* & *verbasci* in lacte coctis; *ungu. de linaria* in mortario Heo ductum, *ol. momordica*, *asellorum* & *scarabæorum*, *theriaca* illita, & profundè applicata cum stupa cannabina aut bombace, si internè etiam hæmorrhoides doleant: item *balsam. ær.* ad extra cum oleo *papaveris expresso*, quando urget ardor.

℞.  $\nabla$  rosar. largiter camphorata, vel Spir. Vini camphor: cum lin-  
teis triplicibus applica:

item oleum papaveris, hyoscyami expressum.

Nota *opium*, cum ad gangrænam disponat, cautè applicandum. Vasa hæ-

mor-



morrhoidalia per *hirudines* aperienda. *Symptomata*, potissimum dolorosa alvi excretio, moderanda continuatis *emollientibus* & blandissimè *lubricantibus*.

*Recidiva præcavenda* (1) per *cucurbitulas* scarificatas singulis mensibus, partim in dorso, partim in cruribus, vel per *fonticulum* in crure.

(2) per *motum corporis* crebriorem. (3) *vitæ aloeticis*, *purgantibus aliis resinosis*. Fonticuli non nisi aliis frustra tentatis adhibendi in brachio uno, vel altero, vel utroque.

CASUS XIV.

DE CATARRHO SUFFOCATIVO.

Puer ingenuus, macilentus corpore, facie plena sed pallidiore, annorum 10, solet subinde nocturno tempore, alto oppressus somno, difficillimam respirationem incurrere, ita quidem, ut cum stertore & sonitu (adstantes dicunt *es pfeiffet*) Spiritum ducendo, expergefactus omni momento suffocandus videatur, facie sub iis angustis subtumescente, & ex rubro cœrulescente, cum extremorum refrigeratione. Accedit tussis crebra sed difficillima & inanis, cujus impetu nihil nisi tenuis aqua eaque pauca excernitur. Sic pedetentim remittit paroxysmus, superstitie febris aliquot dierum lenta, ipse verò æger cum facie subtumida rancus manet, & continuo tussit. Tandem elapsis 2. vel tribus diebus copiosam materiam viscidam rejicit, quo facto totius morbi absolutus est cursus. Redit idem paroxysmus crebrius, ut plurimum mensis spatio omni semel, idque autumnali & hyberno tempore præterit; Interrogatus, quid patiatur sub paroxysmo, de respirationis difficultate inque larynge titillatione conqueritur. Præcedit interdum dolor capitis, colli aut partium vicinarum, ipse æger subinde etiam dolori & tumori tonsillarum est obnoxius. Occasionem paroxysmo redeunti suggerit nunc auræ frigidae susceptio, nunc prægresso corporis motu & exercitio, aqualis extremorum refrigeratio.

*Resolutio.* *Catarrhus suffocativus* variè quidem accipitur, propriè tamen oritur, vel ex sanguine, vel ex lymphâ; Ex *Sanguine* quando restagnat in pulmonibus, unde subito imminet suffocatio. Rarior est, veteribus *syncope cardiaca* dictus, vide *Hoffmannum* & *Wepferum de Apoplexia*. Ex *lymphâ* fit duobus modis (1) quando membranam pituitariam posteriorem affligit, fitque cum continuo secreta lymphæ ex dicta membrana. (2) Quando asperam arteriam, qualis in præsentī casu, vid. *disp. de catarrhis Lipsiæ* sub præsidio Bohnii habitam.



*Pars affecta* est aspera arteria, ejusque cum primis caput, *larynx*, quæ eadem ratione à lymphâ afficitur, (als wann etnem etwas in dte unredhe Nehl fommet.)

*Causa proxima*, præsupposito Spiritu motore impetum faciente, *lymp̃ha*, in substantia & motu peccans. In motu quatenus quidem motus retro-gradus per glandulas conglobatas impeditur. *Substantiâ* verò, quatenus abundans acrimonia falsa laryngem irritat, qui irritatus se stringit atque clauditur, unde tum lymphæ copiosior effusio, tum *difficilis respiratio*, motu pulmonum ob aëris inspirationem denegatam præpedito. *Decoloratio faciei* ab impedito sanguinis circuitu ejusque stagnatione: *Tussis* ab irritato larynge. *Sonitus* ab incarcerato ob clausum laryngem aëre, sc. aëre per angustiam laryngis potissimum inspirato: Aliud verò est *stertor*, qui fit quando reciprocans halitus per materiam viscosam, circa caput laryngis sibi viam quærit, maximè ubi membrana pituitaria posterior, copiosam & tenacem lympham plorat. Hinc infantes sub dentitione ubi magis salivant, stertunt, Stertor sæpius est ex summitate laryngis, rarius ex pulmonibus, nisi in moribundis, phthisicis, & empyemate affectis. Lymphâ in principio est tenuis, acris, vellicans laryngem, unde *tillatio*, *tussis*, hinc aliqualis exoratio, unde exsudat tum proprium nutrimentum laryngem obviscans, quod successivè sub forma mucij ejicitur. *Redit malum singulis mensibus*, quatenus (1.) larynx semel inæqualis factus & debilitatus facilius afficitur. (2.) Quatenus luna humorum domina sub incremento expandit & turgere facit humores.

*Causa remota* refrigeratio humorum & aura frigida susceptio.

*Prognosis*. Metus est *phthiseos catarrhalis*, oriundæ ex lymphâ acris & tussi crebriori, quatenus debilitantur & spongiosi fiunt pulmones. Item *hamopyseos*, ex ruptura valorum à tussi.

*Cura*. In principio & incremento quatenus lymphæ vellicatio & symptomata maximè urgent. (1.) Naturalis lymphæ motus concitetur, per *salia volatilia* & *blanda sudorifera*. (2.) Motus præternaturalis lymphæ sistatur per *opiatâ* (3.) acrimonia vellicans per *incrassantia* temperetur, v.g. *papaverina*, *amygd. dulc. tragacanth. glycyrrh. juleb. viol. sperm. ceti* & in vehiculo calido propinatum egregiè acorem lymphæ lenit, & stagnantem sanguinem resolvit, alvum etiam laxat.

In Statu, quando raucedo, tussis humida, & materiæ rejectio adest, *attenuantia incidentia* & *expectorantia* conducunt.

Si per hora adsit, *venesectio* in principio, in brachio, *frictiones* & *ligatura brachiorum* instituendæ, ne sanguis nimis versus pulmones recurrat.

Puerum



Puerum præsentem sic curavi: In principio paroxysmi, qui derepente invadebat, mox inunxi verticem ol. dest. succini, brachiis ligaturas strictas admovi, mixturam sequentem cochleatim assumendam ordinavi.

℞ ∇ scabios. ℥iij Spir. sal. armon. anisat. ℥i℥. Syrup. papav alb. ℥vj. M.  
In Incremento ℞ ∇ scabios. serpill. ana ℥i℥ asthmatic. ℥vj. fl. æris ℥j. Syrup. scabios.  
vel papav. vel de jujubis ana ℥vj ad ℥j. M. probe agitando.

Mixtura hæc crebrius assumpta tussim minuebat, ut lymphæ copiosior affluxus, & manè mucosæ proventus præcaveretur.

In Statu sufficiebat succus raphani expressus cum paucis sacch. si quid restaret febricula lenta, blando sudore per liquorem C. C. succinatum, vel Spr. sal. ❖ci oleos. vel blandis diureticis ex succino & lumbricis removebam.

Extra paroxysmum præservationis gratia plura tentabam, temper tamen voracitas pueri & vita sedentaria cum somnolentia obstabant; unde fonticulum in brachio sinistro inurebam, quo levabatur: fluebat autem tam ubertim, ut manè & vesperti mutandus esset. Immutato habitu corporis, absque periculo poterit claudi; confer quæ habet Helm. tract. custos errans; quoad theoriam, & tractat. Ius duumviratus thes. 62. quoad praxin.

Pertinent huc tusses siccæ nocturnæ ominosæ, & ut plurimum prodroma phthiseos. Curantur per opiata & temperantia in principio. Si inveterata, difficulter curantur sine præmisso Vomitu.

Diuretica in declinatione optima. Sedes earum stomachus. Corripit sæpe juvenes parca diætæ. Post vomitoria curantur terra foliata æri. Egregiè quoque confert sequens Spiritus Asthmaticus.

℞ CrySTALL. æruginis ℥iij gumm. ammoniaci ℥ij. æris ℥i℥. M. destillantur per retortam amplam in excipiens amplum ex arena, prodit simul oleum fœtidissimum, singulare in tumore duro scyrrhoso scrofuloso. Plura vide casu 7.

C A S U S X V.

DE TUSSI FERINA HUMIDA.

Vetula pro ætatis ratione adhuc robusta, occasione inclementioris aëris hyberni sensim incidit in ferinam tussim. Primitus sentit vellicationem in faucibus, cum aliquali dolore & copioso sputi salis mediocris consistentiæ scretu, hinc pederentim tussire incipit, præsertim cum dorso incumbit, & hinc dum manè evigilat, cum mucis viscidis moderata reiectione. Intenditur paulatim malum, ut interdum graviter ac noctu tussiat, sed cum in summo conatu ac sonitu



ex profundo emergente (wie auß einem hohlen Topff/) copiosa viscida sed cum summo conatu & crebrius repetito ejicit, in tantum, ut ex laboriosa tussi non raro superveniat vomitus muci viscidissimi. Molum pertinaciter durat, appetitus prostermitur, sitis intenditur, febricula supervenit lenta, recumbens insigniter stertit, (sie verhält/) interrogata deinde de novo materia tussim excitantis proventu, ostendit regionem epigastricam, speciatim locum quem vulgari etymo scrobiculum cordis appellant.

*Resolutio* sicut vomitus est morbus convulsivus Stomachi, sic tussis cum motu convulsivo pectoris conjuncta, & velut vomitus pectoris est.

*Pars affecta in principio fauces*, imprimis *membrana pituitaria* posterior, in statu primario affectus *stomachus*, crebriore descensione lymphæ turbatus. *Sedem hanc monstrat* (1) situs vellicationis (2) Materiae eruptio (3) sonitus inter tussendum (aus dem Grund auß einem hohlen Topff/) (4) supervenit subinde vomitus, à quo melius habet, (5) peius habet cum dorso incumbit, quatenus tunc materia peccans magis orificium stomachi affligit.

Lympha acrior primum irritat œsophagum, hinc copiosus mucus, sub noctem cum primis, in stomacho colligitur, unde manè tussis molestior, & ejectio copiosior. *Tales tusses sunt chronicae*, propter lympham salam, digestionem stomachi turbantem, ut vix nisi vomitu curentur. *Stertor* est ex stomacho, *sercatius* saltem ex faucibus.

*Cura* ad sequentia potissimum dirigenda, ut (1) *causa vellicans* in stomacho removeatur (2) *Irritatio sistatur*, (3) si quæ in faucibus adsit *asperitas temperanda* & corrigenda.

*Prims* optimè expediunt vomitoria, præmissa, ubi visum fuerit, *digestivo*.

℞ \*i puri ʒss decur in lacte.

Post vomitorium, nisi faucium urgeat asperitas, sequens præscribendum.

℞ ▽ cabios. menth. ana ʒj. asthmatic. ʒvj. oxymell. squillitic. ʒj.

Syrup. de nicotian. de erysimo ana ʒss. M.

Vel si fauces simul leniendæ & mucus resolvendus, præmissis præmittendis optimum sequens.

℞ spermatis ceti ʒj. florum ʒris ʒi Croci ʒss M.

Pro duabus dosibus in cerevisia calida.

Pro leniendis faucibus optima viscosa, insipido-dulcia, v.g. glycyrrh. tragac. linctus vel looch passulatum, diacod. Montani cum Syrup scabios. & baculo liquoris sensim deglutendo.

Si vagæ simul urgeant angustie præcordiorum, ob mucum in status resolutum, præter clysmata carminativa, optimus spiritus carminativus de tribus gutt.



30. vel 40. in cerevis, calida, vel etiam spir. \*ci anisatus. Gargarismata saltem in ore tenenda. Egregium est decoctum raparum.

## CASUS XVI.

DE HERNIA CUM  
PASSIONE HYSTERICA.

Mulier 34. annorum agilis cætera & vegeta, queritur de duobus tumoribus ovi gallinacei magnitudine in inguinibus prominentibus, simul etiam insigni molestia, qui, dum supina recubat, disparent, dum tussit, aut erecta incedit, denuo prominent, eos tamen etiam gravida facta optimè perfert sine ulla molestia, post partum dictis tumoribus recurrentibus: Interim cum hæc, quæ suaveolentia, aversetur, fœtidis verò defæcetetur, frequentes levi de causa patitur paroxysmos, in quibus, prægressa gravi totius corporis refrigeratione, una cum tumultu aliquali in abdomine sentit aliquid sursum tendere, & præcordia occupare, (es wolle nach dem Herzen zu/) quæ ut impediat, forti ligatura hypochondria cingit, hinc vomitus & repetitæ alvi dejectiones, sub quo statu tumores molles aliàs & indolentes, admodum protuberant, indurantur, dolent, cum gravissimis doloribus & exquisitis torminibus circa regionem tumorum. Alsumpto decocto absinthii & matricariæ cum ∇ simplici, & corpore ad sursum forem composito, symptomata evanescent, ipsa vegeta resurgit. Hinc verò aliquando mense Februario linum carminando gravius se exercuisset, redeunt cum paroxysmo prædicta symptomata, sed atrocissima, in specie, præter vomitus, tumor circa inguen sinistram cum insigni duritie, intolerabili lancinante cruciatu & abdominis borborygmis, alvoque pertinaciter clausa eam affligunt, ægra ad quævis assumpta crebrius singultit, & violenter eructare videtur, sine flatu licet. Tertiâ, cum in hoc statu fuisset constituta, vocat die Medicum.

*Resolutio.* Affectus complicatus hernia cum passione hysterica. Causa buboneceles fuit ruptio peritonæi à nisu partus. Nota in herniosis non solum intestina; sed & omentum potest prolabi; licet in demortuis ob corrugationem ultra umbilicum non protensum videatur, revera tamen ad inguina usque dependet in vivis.

Ægra nostra extra paroxysmum bene habet, in paroxysmo tumor herniosus indurefcit, dolet, & ob spasmus intestinorum cum passione hysterica conjunctum, exasperatur.

*Prognosis*, metus est, ne ob vomitum hernia major fiat, vel alvo pertina-



pertinaciter clausâ superveniat *Ileon*. Itaque *Cura*. Quoad curam (1) ante omnia passio hysterica curanda, & *spasmi intestinorum tollendi*, quod fit (1) *antihystericis* & *aromaticis* (2) *blandis opiatis* (3) *Externis*, inter quæ excellent *Empl. de galbano*, umbilico impositum ad sistendam passionem hysterica. *Decoctum quoddam paregoricum* cum spongia, vel *Unguentum sequens* cum bombace tepidè locis tumescentibus & dolentibus applicatum.

℞. Ung. dialth. ℥ij. ol. anethi, hyperic. ana ℥ss. ol. anis. ℥ss. cumin. ℥j. M.

Cavendi vero *sacculi speciebus repleti*, qui dolorem possunt exasperare, ut & *cataplasmata*, quoniam facile frigescunt, & poros occludunt.

Nihil vero *herniosis* magis adversatur quam *frigus*, his ita actis, (II.) *Alvus laxanda* & blande evacuanda *clysmate* vel *blando laxativo*, ubi tensio, durities & spasmus intestinorum remiserit, in declinatione & principio, minus in *paroxysmo*.

*Extra paroxysmum*, *cacochymia hysterica acida appropriatis* & *diaphoreticis* corrigatur, *Hernia* reponatur, firmetur & consolidetur, *Alvus* teneatur semper aperta; *Quies* herniosis saluberrima, *vulneraria*, continuato usu adhibeantur, regio lumborum *pinguedine ursina* & *erynacei* inungenda. Cum *ligatura* applicetur *empl. de tacamahaca* & *contra rupturam an. q. s.* malaxetur cum oleo hyperici.

℞. Cinnabar. ℥nij. ℥ss. ol. dest. anis. gr. iij. laud. hysteric. ℥ss. c. f. q. syrup cortic. aurant. f. pill. pro duabus dosibus in paroxysmo.

℞. Extr. castor. gentian. ana. ℥ss. laudan. hysteric. ℥ss. auri fulmin. gr. vj. c. oleo anis. destil. f. pill. pro 2. dosibus.

Ad spasmus intestinorum tollendum & dolorem, sudorem promovendum, alvum provocandam.

*Cataplasma* ex pomis assis vel putridis cum croco, regioni umbilicali & rumoribus herniosis applicatum, abdomine toto pinguedine humana inuncto, & supposito ex melle applicato, profuit presenti agræ.

## C A S U S XVII.

## DE ASTHMAE CONVULSIVO.

Stannarius, vir robustus & optimè sanus, ætatis consistentis, incidit in *tussim noctu imprimis affligentem*, cum excretis viscidis atque cruentis, sed paucis.

Inter-



Interdium mediocriter se habet, nisi quod difficilior sit respiratio. Successive in tantum increfcit morbus, ut noctu gravissimæ anxietates suffocatoria eumprehendant, & lecto exilire, fenestram aperire, auram recentem capere necesse habeat, nisi omni momento suffocari velit; adeo, ut subindè noctes integras insomnes sedendo, & anxie cum alta, crebra & difficillima respiratione, respirando peragere cogatur, inspiratio media quasi via impeditur, cum tussi mediocri & pauca cruentæ mucilaginis rejectione. Accedente manè symptomata pedetentim remittunt, unde lectum & somnum repetit, interdium mediocriter se habet, alimenta capit, supinus & pro lubitu in utramque aurem dormire potest. Quæsitus de loco affecto, superiora & anteriora pectoris, pulmonum cubilia, ostendit. Causam antecedentem sciebat nullam, nisi forsan, quod paulò antè, quàm dicto affectu corripereetur, pondus gravius gestaverat. A purgante pessimè se habuit, venæ sectio, pectoralia, incidentia, expectorantia, antiasthmatica, frustra propinata, Ulterius ergo quærit auxilium.

Est *asthma convulsivum* frequens in praxi potissimum in arthriticis, dicunt (das Zipperlein ist in den Leib getreten / und machet kurzen Athem.)

*Causa proxima est nervus plexus fibrosus* se stringens, & impediens expansionem pulmonum, unde difficilis respiratio.

*Remota, fumi Friales metallorum.* In  $\mathbb{Z}$  vel luxuriat  $\mathbb{A}$  volatile, hinc cum nitro mixtum fulminat,  $\mathbb{F}$ rius à  $\mathbb{Z}$ ve vel  $\mathbb{H}$  liquefacto facile coagulatur. Figuli facile fiunt phthisici & asthmatici (von der Glätte) ponderis gestatio culpa caret.

*Cura.* Fumis ejusmodi metallicis inspiratis vomitoria,  $\Theta$  volatil. & pingua conducunt, reliquias liquor terra foliata  $\mathbb{F}$ ri ablumit. Pro preservatione ab ejusmodi tumis, butyrum, oleum amygd. d. lac cum sapone Veneto, quod mirabile.

Pectori inungatur sequ. spir.  $\ast$ ci teratur cum terebinthina, ut fiat massa candida, optima in affectibus pleuriticis. Idem Stannarius ante biennium immunis ab arthritide factus incidit absque causa in asthma, de die bene adhuc se habet, noctu à prima requie expergefactus, sine suffocationis periculo in lecto perdurare nequit, sed accumbit mensæ pronus cum difficillimo anhelitu, durante usque ad mediam noctem, hinc cessat: dicebat, (es seye alles gestremmet / und voll umb die Hypochondria, und wenn es auffhörete / gieng es schwer) forrè à remissione spalmi. Varia frustra tentata, tandem jussi ut mature canaret, & lectum petiturus largam dosin theriaca assumeret, cujus remedii ope benè habuit, quoties vero intermisit, solita rediit anxietas nocturna, quæ tandem redeunte podagra penitus cessavit.



## CASUS XVII.

## SUBLUXATIO VERTEBRARUM DORSALIUM.

Germanicè. Er hat sich weh gethan.

Juvenis robustus & vegetus evigilans aliquando manè conqueritur de difficili respirazione cum dolore tensivo hypochondriorum, quasi cingulo omnia ibi coercerentur, & ut omnia repleta & turgida (es seye im Weichen alles voll/ und spanne ihm daselbst/) surgens corpus non æque bene flectere potest; quin palus quasi dorso infixus videatur. Negligit hæc per aliquot dies, sed contumaciter omnia perdurant, alvus constipatur, abdomen murmurat, hypochondria magis inflari videntur. Tandem phlogoses superveniunt. Interdum extremorum refrigeratio, cum sudore frigido circa frontem & tempora, anxietates præcordiorum insignes, & lypothymia subindè imminet, pulsus celer, durus, vehementia & magnitudine moderatus. In malo ita confirmato vocat Medicum pro cura.

*Resolutio.* Affectus in se levis, qui tamen neglectus gravissima quæque infert symptomata. *Causa proxima* mutatio situs seu *subluxatio vertebrarum inferiorum* thoracis. *Remota* conatus ponderis gestandi.

*Symptomata* superveniunt sequentia: *Spasmi* circa hypochondria (es spannet und ist alles voll/) ab irritatis, ob dislocationem nervis: *Difficilis adest respiratio.* *Corpus flectere nequit.* *Phlogosis vaga* ob succorum diversorum in primis viis effervescentiam. *Refrigeratio extremorum, lypothymia, sudores synoptici,* propter motum Spirituum impeditum. *Pulsus durus* adest, quia spalmo corripuntur membranæ; Circa locum luxationis, facile aliquid colligitur Sanguinis, quod successivè corrumpitur, unde sudoriferis discutiendus.

*Prognosis;* si malum durer diu, *tetanos* vel *opisthotanos*, aut etiam propter lypothymiam repetentem *mors* supervenire potest.

*Curatio* peragitur repositione & firmatione, de qua vide *Sennertum*, si vero in malo graviore *inflammatio* repositionem impediat, ea prius tollenda, *cancerinis sanguine hirci, acidis, sanguinem stagnantem resolventibus, ut Spir. \*ci, sperm. ceti* cum pauxillo croci in cerevisia calida.

vel ℞. lapid. Op. præp. ʒj ʒnii diaphor. ʒj M. pro duabus dosibus, capiatur primam dosin in duobus cochlearibus aceti, expectando sudorem.

Facta



Facta repositione, in qua partes extendendæ, firmandæ eadem vino tepido, vel solo, vel cum floribus hyperici decocto, vel petroleum spinæ dorsi, præcordiis, & hypochond: calidè inungat vel fiat *emplex tacamahaca* malaxetur c. *bals. Peruv.* Pro reliquis symptomatibus & anxietatibus detur *spiritus carminat: de tribus.*

*Frequens malum est infantibus*, qui phlogoses inde patiuntur: si volunt cognoscere, an vertebra luxata, (So legen sie selbige auff den Bauch / und legen den linken Fuß auff den Steuß / und die rechte Hand dagegen / gehet der Fuß in die Hand / so sind sie nicht gebrochen.)

## CASUS XIX.

## FEBRIS TERTIANA INTERMITTENS.

Studiofus ad hypochondriacum malum inclinans, corripitur 5. April. cum nox prægressa præter morem fuisset inquieta, præcedente artuum lassitudine & cephalalgia, horrore gravi, in sequente æstu & siti, aliquot horas durantibus. Negligit autem talia, cum post noctis suavem quietem sequenti die melius habebat, nisi quod appetitus minor urgeat; Excipit vero hunc nox inquieta & anxia; appetente mane 7. April. aliquoties vomit varia liquamina multicolora amaricantia &c. hunc insequitur tussis sicca ultra semihoram graviter affligens, (locum irritationis scrobiculum cordis monstrat) qua evanescente, varia phantasmata mentem perturbant, quæ excipit leve corporis frigus, hinc intensus corporis æstus & ardor, extrema imprimis lancinans, cum efflorescentibus hinc inde maculis rubris & purpureis; comitantur talia insignes anxietates, ut æger hinc inde se miserè jactitet, hypochondria simul tendi videntur. Durat hæc tragœdia successivè remittendo, ultra 9. horas, maculæ etiam pedetentim evanescent, lassitudine solum & cephalalgia superstite. Nox insequens quieta, altero mane bene habet horis antemeridianis supervenit sudor copiosus universalis, cephalalgia reliquias tollens, à meridie optimè habet: vespere verò conturbari quidem in hypochondriis advertit, lassitudinem redire metuens, novasque turbas, vocat Medicum.

*Resolutio.* Est tertiana intermittens simplex, pluribus stipata symptomatibus propter labem hypochondriaco-scorbuticam; periodica tamen & ordinaria; aliàs in scorbuticis tales febres ut plurimum sunt erraticæ, & mentiuntur malignas, cum tamen non sint.

*Pars affecta vel subjectum inhesionis* tota massa sanguinea, quod testatur æstus, calor &c. radicationis prima via, ubi atrociora urgent symptomata.



*Causa proxima* est fermentum febrile salino acidum, ex læsa stomachi digestionem productum, magis verò volatile & activum in legitimis, quæ vehementiores & breviores habent paroxysmos; minus volatile, & subiecto viscido irretitum in nothis & lentis, sed diuturniores habent paroxysmos.

*Intemperantia* plerumque mater intermittentium. Convalescentes à febris acutis, avidius vorantes, incurunt in intermittentem, unde sæpe sola inedia, interdum largiori potu & subsequente vomitu curantur. Nec tamen semper in saburra excrementorum causa febris consistit, cum post multas purgationes nihilominus subsistat.

*Fermentum prædictum febrile* in stomacho delitescit, donec acidum se exerat, & partes nerveas primarum viarum vellicando & spasmodicè convellendo, horrorem, rigorem & frigus producat. Nec enim positivum frigus requiri manifestum est, cum sub rigore manus, & pedes tacti positivè caleant. Accidit quod frigus plerumque circa regionem hypogastricam incipiat. Porro spasmodicam fibrarum in primis viis contractionem excipit succorum effusio, unde anxietas, sitis, vomitus, aliaque symptomata circa præcordia. Vomitus in principio paroxysmi sunt symptomati, ex spasmis stomachi & intestinorum, quibus succi tam naturales quam morbose ejiciuntur, sine levamine; sic & sudor statim à paroxysmo est symptomaticus. *Vicque tamen* licet ægrum valde debilitet, non statim sistendus est, sunt enim bonum signum malæ causæ, quia semper aliquid de fomite morbi simul evacuatur. Tussis est ex stomacho & diaphragmate à febrili fermento irritato. Appetitus languet ob fermentum digestivum vitiatum. Si redit denuò sapor & cerevisiam ferre possunt, signum est fermenti instaurati. Cephalalgia, quæ est absque pulsatione temporum, ut in nostro ægro, est ex consensu stomachi, quæ vero cum ista, ex orgasmo sanguinis.

Et hæc inter alia sunt symptomata, quæ fermentum febrile in primis viis, fibras nerveas vellicando, producit: Sanguini vero ulterius communicatum, motum ejus naturalem fermentativum pervertit, & infringit, hinc frigus magis vel minus positivum. Dum verò à sale volatili sanguinis subjugatur, incallescit corpus & febriliter aestuat, donec particulæ istæ acidæ, in salum mutatæ, mediante sudore foras excernantur. Somni defectus & turbatio est ex molestia quadam circa præcordia & hypochondria, quando vel circa digestionem, vel circa fecum separationem fit erratum quoddam, quod confirmant, qui vesperi largius & serius cenant. Item hypochondriaci, quibus proinde consultum, ad conciliandum somnum antecenam exhibere & tialia. Ardor lancinans arinum & macula purpurea sunt à Scorbuto.

*Prognosis*; Metus est ne fiat chronica, vel propter inordinatam dietam aut acidorum abutum diversimodè mutetur.

Cura :

Cura  
tur. (2) Fer  
dore depure  
xylum dan  
intermission  
nisi in mulie  
ante paroxy

Hypo  
tu paroxyl  
destruunt f  
& è stoma  
horum usu  
rore & sym  
universali  
tum, consi  
latilia v.g.  
guinea, est  
dum, si sup  
tia appropri  
roborand  
diacis &  
destill. cary  
cto velemp  
zalaria larg

F

Vir  
& bacchi  
vomitu  
diā affici  
insolitu  
mediocre  
vires pro  
& vehem



**Cura :** Pro cura itaque sequentes indicationes (1) *Prima via evacuetur.* (2) *Fermentum febrile acidum volatile corrigatur.* (3) *Massa sanguinea ludo depuretur.* Prius optimè expedit vomitorium aliquot horis ante paroxysmum dandum, vel qui istud ferre nequeunt, iis lenis purgatio abstersoria die intermissionis danda, præmissio digestivo commodo. *Vene sectio* nihil valet, nisi in mulieribus quibus menstrua fluunt, quæ sub rigore supprimuntur, unde ante paroxysmum venæ sectio in talo instituenda.

Hypochondriacis, quando *anxietates ex stomacho* patiuntur, etiam in statu paroxysmi utiliter applicantur *clysmata*. Alterum obtinemus *specificis*, quæ vel destruunt fermentum febrile, *terrea alcalina*, *fixa vel volatilia*, vel abstergunt, & è stomacho educunt, ut *nitrosa, nitrum & niatum, arcanum duplicatum*. Circa horum usum *sequentia observanda*, (1) *alcalia fixa & terrea* optima sunt in horrore & symptomatibus circa hypochondria dos. a ʒss ad ʒj (2) danda præmissis universalibus (3) ante paroxysmum si una vel altera vice non juvet medicamentum, *consultum erit variare* propter *idiolyncrasiam* ægrotantium (4) *alcalia volatilia* v.g. *Spir. \*ci*, commodius dantur, ubi urgent symptomata in massa sanguinea, *astus* (5) declinante paroxysmo *julepi aciduli* conveniunt ad promovendum, si supervenire velit, *sudorem*. (6) Tempore intermissionis dentur *alterantia* appropriata, *ess. absinthij card. bened. centaur. min. Spir. \*ci* (7) sublata febre ad roborandum stomachum *Eluxir stomach.* & *latum*, item *Prop. P.* in hypochondriacis *otialia* dentur. Ingruente horrore & anxietate, *scrobiculus cordis ol. destill. caryoph. anisi, macis* cum fructu illinitur, imposito desuper latere calefacto vel *empl. de tacaham*. Qui cerevisiam fastidiunt, sumant vinum cerevisia & daria largius dilutum.

CASUS XX.

FEBRIS ARDENS BENIGNA  
EX IRACUNDIA.

Vir vegetus & sanus, tenuioris licet constitutionis, in convivio genio & baccho plus debito indulget, unde post noctem inquietam manè copioso vomitu & aliquot secessibus se exonerat. Tertiâ ab hinc die gravissimâ iracundiâ afficitur, unde aliquot interjectis diebus languorem & lassitudinem artuum insolitum percipit, cum aliquali siti, donec aliquando sub medio noctis post mediocre horrorem gravi astu cum cephalalgia intensa corripitur, junguntur vires prostratæ, sitis clamosa, inquietudines cum pulsu frequenti molli, magno & vehementi. Urina intensè tincta, emissa successivè turbida per totum &



contentis saturata. Medicus præscribit ℥ Aqu. rub. idæj. acetos. ana ʒiβ. ꝯ nīi diaphor. ʒj. syrup. papav. ʒj. Spir. nitri dulcis pro grato sapore M. juber cochlearim pro lubitu istam mixturam capere. Vesperti rediens offendit ægrum in priori statu, sed magis anxium, cum fluctuationis sensu circa præcordia, consequente simul, quoties de præscripta mixtura capit insigni æstuatione totius corporis. Hinc quærit ex Medico, qualis sit affectus, & quid porro agendum.

Annotata. *Febris est continua* ardens benigna. *Causa proxima fermentum* nidorosum seu corpus heterogeneum, *salino oleosum*, missum ex primis viis ad massam sanguineam. Bilis inspissata lardi instar ardet.

*Causa remota digestio vitata* ob inordinatam diætam, quæ fomitem suggessit, quam excitavit *iracundia*, in movendis corporis nostri contentis efficacissima, quæ non raro ex benigna febre facit malignam. Morsus hominis irati est venenosus instar viperæ vide *Hild. c. 1. obs. 84*. Iracundia verò ut alia externa, facile movet hominem tenuioris constitutionis (der eine schwache Natur hat) sicut enim in robusta natura ab acido digestivo valde coguntur contenta, & quasi concentrantur, ut sub firmiori miscela minus alterari possint, ita contra in constitutione tenuiori spirituum textura rarefacta est, facile mobilis & dissipabilis. Hinc à purgantibus facile moventur, & minus commodè ferunt Opiata.

*Urinarum inspectio* in acutis admodum est necessaria, quia si salia volatilia agunt in oleum, emergit color *rubicundus*, vide supra casum de cholera. Si verò acidum instilletur, *turbatur urina*, prius rutilans ab acido in urina existente per modum præcipitationis. *Intra corpus turbatur* quando acidum emergens præcipitat alcali oleosum. *Extra corpus*, quando sub inchoata corruptione acidum antè occultum fit manifestum. Quando *urina incipit turbari est signum coctionis*, quæ consistit in separatione quadam, quam excipit præcipitatio ab acido in stomacho instaurato. Si major sit præcipitatio seponit sedimentum.

*Prognosis* periculosus est morbus, cum ex iracundia contractus sit, cæterum minoris momenti, quam si absque causa manifesta ortus fuisset.

*Cura*. In principio statim tentandum, an vomitu radix febris evelli possit, quod ut plurimum felicissimè contingit. In nostro ægro dissuadere videtur, (1) quod natura jam dum vomitu se exoneravit, (2) quod sit constitutionis tenerioris, (3) quod signa coctionis in urina morbum principium transcendisse ostendant. Sed urgebit in contrarium (1) Æstuatio corporis ab assumpta mixtura. Dedi ergo vomitorium, unde supra & infra copiosa egerebat cum prostratione virium & refrigeratione extremorum, sudore frigido circa frontem; unde jussi vinum generosum crebrò admove re naribus, ad quietem componi regionem stomachalem theriacâ vino generoso dilutâ crebrius illinire, & sequi successivè exhibere.

℥ ∇ men-



℞ Menthae, rubi idaej, ana ℥i℥. cinam. ʒvj. Spir. theriacal. camphor. ʒiij.  
succo cydon. ʒj. ess. ambr. ʒ℥ M. Post mediam noctem jussidare dosin  
unam, alteram mane, tertiam vesperi sequentis pulveris.

℞ Eboris sine igne præp. ʒnij. diaphor. ana ʒj. bezoart. solar. gr. xv.  
laudani opiat. gr. iij. M. detur sic valde levatus fuit.

Quoad sitim Julebi simplicissimi optimi ex succo acetosella, rubi idaej. Cydon.  
reo. vel asservatis: per sumum ʒris cum ∇ fontana & paucissimo saccharo. Deco-  
ctum Citri Myns. Gelatina C. C. egregia in potu ordinario vel Julebo.

℞ ∇ fontan. ℥℥j. gelatin. C. C. rec. ʒi℥. ad ʒij. Syrup. rub. idaej ʒii. pap. alb. ʒj.  
adde pro lubitu tantillum Spiritus nitri dulcis.

Si alvus simul obstructa ℞ Decocti tamarindor. cum passul. ℥℥℥. Syrup. ace-  
tosae Citri ʒi℥ M. pro Julebo. ∅ ʒniatum egregium ad ʒij. vel ʒiij. in mensura  
potus ordinarii item nitrum depravaturn, nitrum ebulliat probe in lixivio forti,  
per blandum calorem inspissetur, & aqua eluatur, Spiritus nitri dulcis ob vim  
diaphoreticam & quatenus figit æstum humorum.

Opiata, evacuatis primis viis, danda cum bezoarticis, tinctura bezoartica.

# CASUS XXI.

## FEBRIS CONTINUA LYMPHA- TICA JUXTA SYLVIIUM.

Virgo annorum 18. cui difficulter fluere solent menses, negotiis domesti-  
cis assueta, nec ordinata utens dicata, conqueritur de lassitudine artuum spon-  
tanea, tensiva quasi contundente, cum cephalalgia & siti præsertim aucta. His  
aliquot diebus ita persistentibus, corripitur aliquando à meridie horrore medio-  
cri per aliquot horas, quem insequitur nox gravis cum æstu mediocriter intenso,  
cephalalgia gravissima, angustiis præcordiorum gravativis sine somno. Manè  
melius se habet, cephalalgia tolerabilior, calor præter naturalis quidem, sed mo-  
deratus, ut & reliqua symptomata; sed circa vespertinam omnia exacerbantur, nox  
priori similis; mane omnia remissa & mediocria, continuo tamen eadem ur-  
gent symptomata, quæ saltim vespertino & nocturno tempore exacerbantur.  
Medicus à meridie vocatus, præter jam dicta ægram offendit non nihil debilem,  
sed cephalalgiam & lassitudinem artuum præsertim conquerentem, calor natu-  
ralis intensior, isque continuus, non adeo acris, mordax, qui vesperi saltim inten-  
ditur, & per noctis medium gravius urget. Pulsus celer, frequens, magnitudine  
& vehementia moderatus; appetitus nullus, sitis intensa, cerevisiam horret,  
aquam appetit. Urina turbida, crassa, intensius non nihil tincta, facies & lingua  
saliva viscida infestata. Expectatur Cura.

Reso-



**Resolutio.** Est febris continua non admodum acuta, benigna, juxta Sylvium *lymphatica*, ex vitio lymphæ, sanguinis motum fermentativum turbantis.

Fiunt triplici potissimum modo, (1) per se, qualis præsens (2) à voracitate post curatas intermittentes, unde lymphæ viscida acidior. (3) Accidunt lue venerea correptis, morbo vel ingravescente, vel decoctis sudoriferis excessivè opugnato. Confer Sylvium de lue venerea.

**Causa proxima** est fermentum febrile ex vitio stomachi, præsertim cruditate acida lympham inquinante.

**Remota** lasa diata & menstrua parviora ex sanguine viscido inepto ad excretionem.

**Lassitudo alia positiva**, vitio lymphæ acore occulto tinctæ, qualis in præfenti, ubi adest simul contundens lancinatio, **alia privativa**, ex defectu spirituum, (wann alles zu schwär ist.)

**Cephalalgia cum** sit tensiva & gravativa, est ex consensu primarum viarum, unde propinato vomitorio cessavit. In glutinositate faucium ordinariò suis adest. **Angustia præcordiorum gravativæ** ex glutinosa pituita. **Calor remissior** proprius est febribus, quæ vesperti exacerbantur, præsertim lymphaticis, urinæ mox in principio turbidæ, in statu copiosum deponunt sedimentum. Horror in medio cursu subinde ingruit.

**Prognosis.** Febres hæ non admodum periculosæ sunt, nec curatu difficiles, modo non sub specie harum lateat malignitas. Solvuntur paulatim.

**Cura** peragitur (1) si prima via à fomite morbofo per vomitum liberentur, (2) lymphæ acida non nihil glutinosa corrigatur, & per sudorem vel urinam, quo melius natura vergit, evacuetur (3) symptomata appropriatis corrigantur. Ægram sic curavi. Vocatus mox à meridie sanguinem misi, propter mensium vitium, postea dedi alexipharmaca per biduum, imperando sudorem: Cum verò morbus in eodem statu permaneret, dedi vomitorium, hinc vesperti febris mitior fuit, nox quieta, cephalalgia nulla. Reliquias removi per ☉ \*cum, quod abstergit primas vias, resolvit lymphæ glutinositatem, & recementa per urinam & sudorem expurgat.

℞. arcani duplicati, ☉ \*ci pur. ana ʒss M. pro duabus dosibus.

In fine morbi ordinaui spiritum salis \*ci, bis in die, quo convaleuit.

Juvenem à nimia voracitate in similem febrem delapsam, præmissis duobus vomitoriis sequi curavi

℞. \*ci ʒj, antihectici Poterii gr. xij m. pro duabus dosibus, quod optimum, etiam si post curatas intermittentes hectica super sit vestigium.

Opiata nocent, diuturniorem reddendo effectum.

Juve-

Juvenibus, & glan  
quot dies st  
quæ vesperti  
celer & ferè  
extra paroxyl  
unde copiosa

℞ \*

xylmum, ra

Cum o

mitorio, spir

cernebantur

& inquietu

℞ rad. o

in

sul. minor.

gulis vicib

venereæ cur

FI

Colle

debiles dein

mitentes, tu

fœculentiæ

torum ope

cuidam im

pulmonum

valescentia

rum, quæ

convalesce

guineæ obi

Itaq

in urina ap

Quoa



*Casus XXI. Febris continua Lymphatica juxta Sylvium.* 177

Juvenis lue venerea inquinatus, protuberantibus in utroque inguine bubo-  
nibus, & glande exulcerata cum gonorrhœa virulenta, diætâ ludorifera per ali-  
quot dies strenuè usus, incidit in febrim cum lassitudine totius & æstu insigni,  
quæ vesperti exacerbabatur, & certis paroxysmis recrudescbat. Pulsus frequens,  
celer & ferè parvus, os glutinosum, copiosa viscida rejiciebat, anxius erat, calor  
extra paroxysmum moderatus, cum pulsu tamen febrili. Propinavi vomitorium,  
unde copiosa viscida rejecit, postea

℞ \*ci ʒ Barani duplicati ʒj M. pro duabus dosibus dentur ante paro-  
xysmum, ratione æstus ℞ \*ci ʒ Nitri ʒ niati ʒj quo aliquoties repetito cessavit.

Cum denuo de glutinositate oris & anxietate conquereretur, repetito vo-  
mitorio, spir. sal. armon. ad gutt. 30. quotidie dedi, cujus opera mira erant quæ ex-  
cernebantur per urinam cum euphoria. Cum remittentibus aliis, inappetentia  
& inquietudo adhuc urgerent, pro absolvenda cura sequentia ordinavi.

℞ rad. chinæ ʒ ʒ ratur. ligni sassafr. ʒi rad. liquir. ʒvj. santal. rubi. ʒiij.  
infund. in lbvj. ∇ communis stent in BM. per noctem, mane adde pas-  
sul. minor. conquals. ʒiij. coq. ad remanentiam lbj. capiat bis de die, adde sin-  
gulis vicibus guttas 30. tincturæ ʒnij, qua appetitus rediit, & ad ulteriorem luis  
venereæ curam dispositus fuit.

C A S U S XXII.

FEBRIS HECTICA LENTÆ SIMILIS  
OB ABSCESSUM IN MESENTERIO.

*Collectanea.* Quaritur curâ morbo acuto convalescentes, subinde vel  
debiles deinde maneant, vel morbos chronicos, cachexiam, hydropem, inter-  
mittentes, tumores pedum œdematosos incurrant? *Respondeo*; Fit illud (1) quia  
fœculentiæ morbosæ non sufficienter motu naturæ spontaneo, vel medicamen-  
torum ope evacuantur, (2) quatenus vel alteratio insignis succo, vel labes visceri  
cuidam impressa, unde insignis oritur dyscrasiâ: sic post pleuritidem sæpè ulcus  
pulmonum & phthisis oritur, (3) Ab inordinata diætâ & voracitate post con-  
valescentiam: (4) à perverso quorundam remediorum usu, tum fixorum terreo-  
rum, quæ magnam vim fermento stomachi digestivo inferunt, unde tardior re-  
convalescentia; tum acidorum ʒ-latorum, quæ sal volatile bilis & massæ san-  
guineæ obtundunt, quo factò secretio fœcum à chylo sufflaminatur.

Itaque quoad primū, si sudor febrilis non superveniat, & tamen fœculentiæ  
in urina appareant, sudorifero vel blandis laxantibus eliminandæ.

Quoad (2 & 4) Succis vel à causâ morbifica, vel perverso remediorum usu



alteratis, maturè succurrendum, bili quidem amaricantibus & spirituosius temperatis; fermento digestivo, acidis blandis cum aliis remixtis succurrendum, Viscerum labes potissimum & tialibus liquidis corrigenda.

*Questio.* Quæritur quomodo pus, pituita & semen in Urina secernenda? *Respondeo,* pus & pituita fundum petunt; pituita motu cum urina circumgyratur, pus ad levem vitri agitationem subito dissilit, & hinc inde vago motu urinam imprægnando lactescentem reddit. Semen verò in summitate natat, nisi magnam virulentiam nactum sit vide *H. er. observ. 18.*

## CASUS XXIII.

FEBRIS MALIGNA  
PETECHIALIS.

Mulier sana corripitur paulò ante solstitium hybernium per aliquot dies infueto artuum languore, sine causâ manifesta, cum insigni extremorum lassitudine, appetitus deficit, suis intenditur, lingua sicca, fauces glutinosæ fiunt. Cerevisium horret ceu nimis amaram, aquam frigidam desiderat. Calor insuetus isque continuus corpus occupat, moderatus tamen, & qui interdum, præsertim noctu, ad aliquot horas intenditur. Caput intensè imprimis circa frontem dolet. A pharmacopectio capit pilulas purgantes, æticio quas, quæ quinquies vel sexies eam laxant copiose, sed sine euphoria, qualibet potius symptomata, præsertim virium imbecillitas intenduntur, ob id die martis vespere, neglectâ cœnâ, capit theriacæ ʒj in cochleari aceti vini cubitum itura, dormit exinde inquieta, sudat insigniter, manè melius habere videtur, extra lectum tamen durare nequit, eadem interea subsistunt symptomata, vires infringuntur, nox altera die de novo inquieta, variis insomniis turbata, adstantes eam crebrò in lecto jectigantem & subindè anxie respirantem observant. Die Jovis vocatur Medicus, qui mulierem in statu enarrato offendit, calorem per sentit obicisum, acriorem tamen & præternaturalem acutum. Pulsus celer, frequens, in magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem inclinans, mollis, æqualis. Urinæ claræ, intensius tinctæ sine sedimentis. Dejectiones prægressâ nocte habuerat. Fœces obscure tinctas, insigniter fœtentes & hinc ipso mane (4) frons & tempora crebro sudore madent; Interrogata à Medico de quo queratur? Respondet. (sic befindet sich gar wol/nur daß sie matt/und sehr durstig seye:) Interim subindè se jactitat anhelosa, rotum videt, flagitat curam, & urget imprimis venæ sectionem.

*Resolutio.* Affectus primarius est febris maligna futura petechialis, ut ex symptomatibus colligitur, Symptoma maximæ considerationis est diarrhœa, occasione pillularum excitata.

Pars

Pars I

subita v. r. u. n.  
Malg  
aridis & ling  
tu celeri, del  
eludat. A  
delirium m

Causa

malix sang  
mas vias, ap  
lia sympto  
lis in sto. n  
lignis exte

Dian

Orgasmu  
clara. Fl  
neæ d. solv  
creis adve

Progn

symptoma  
vix motus

Cura

(2) correct

Mei

que te ne  
instituit,  
quæcunq

Sudo

rectum.

Cor

acre fiat

na fortiss

matus p

limatus

In

da, ut ac

vativum

servation



*Pars primario affecta massa sanguinea & spiritus tam vitales, unde subita virium prostratio, quam animales, unde symptomata nervosi generis.*

*Malignitas ex subita virium prostratione, sudore syncoptico, faucibus aridis & lingua sicca mox in principio colligitur; item ex anxietate insolita, pulsu celeri, debili & formicante, quanquam non raro naturali similis dignotionem eludat. Agra anhelosa & torum videt, indicio convulsionis musculorum & delirium imminens. Interrogata quid patiatur, de levibus conqueritur.*

*Causa proxima fermentum febrile malignum in alcali acerrimo, crassi massæ sanguineæ destruente, consistens, quod produnt symptomata circa primas vias, appetitus prostratus, nausea, sitis clamorosa, fauces siccae, glutinosa, qualia symptomata etiam excitant purgantia acrima, arsenicum ob vim causticam, bilis in stomachum regurgitans. Quin eschara quoque in stomacho febribus malignis extensorum visa fuit, qualis ab alcalinis causticis induci solet.*

*Diarrhoea est symptomatica, quia fit absque signis coctionis & euphoria. Orgasmi humorum arguunt murmura in hypochondriis, cruditatem uina clara. Fætor in excretis malum signum ab alcali maligno, quæ massæ sanguineæ dissolvente, sicut à purgantibus vegetabilibus acrioribus similis fætor in excretis advenit.*

*Prognosis status est periculosus propter summam malignitatem, atrocia symptomata & diarrhoeam colliquativam, quæ ut plurimum lethalis. Si evasura vix motus erit: cui expectandus sed paulatina solutio.*

*Cura. Pro cura (1) fermentum alcalinum acre malignum corrigendum (2) correctum mediante sudore eliminetur (3) urgentibus symptomatibus occurratur.*

Methodum hanc monstrat ipsa natura, quæ, si criticè seu paulatim absque remediis usu morbum solvat, non in principio, sed in statu secretionem instituit, & venenum jam correctum secretum subcommuni vehiculo, tero, quocumque fiat modo, excludit.

*Sudorifera sola naturam turbant, nisi fermentum alexipharmacis prius correctum.*

*Correctio verò consistit in temperatura quadam & textura mutatione, ut acre fiat mite & lene, volatile fixius & spissius, alcalinum salum. Sicut venena fortissima mutatione texturæ mitescunt, & Jonium per nitrum, & prius sublimatus per Jrium vivum cicuratur, ut fiant remedia. Arsenicum, & prius sublimatus assumpti corriguntur butyro, lacte, & per deliquium.*

In præsentii pro correctione probatissima sunt alexipharmaca, fixiora & acida, ut acetum imprimis camphoratum in Epidemias malignis optimum præservativum: spiritus nitri, & ris succus citri, liquores & rati juxta Helm, tam ad præservationem quam ad curationem egregii



℞ liquoris ꝑrati ℥℥. ∇ lactuc. ʒvj. cichorij, sambue. an. ʒvj. succi Citri ʒ℥.  
 o ꝑriat. ʒ℥. spir. nit. gutt. ʒo. tyrop. acetos. Citri, ribium ana ʒ℥. M.

Inter fixa sunt ꝑramineralium fixata, aqua minerales, partes animalium fixiores.

Alter scopus obtinebitur sudoriferis ex regno animali, modo volatilibus, si malignitas magis urgeat cum bezoarticis remixtis, modo fixioribus, si symptomata febrilia magis urgeant; sudorifera in tali casu cum vehiculis acidis sumta melius operantur, nec tantum excitant æstum. Gelatina C.C. est egregia ad quæcunque symptomata. Item camphora, qui ferre possunt, sequentem mixturam in ardentibus malignis usu multiplici comprobata habeo.

℞ ∇ flor. sambuci ʒij. aceti acerrimi ʒvj. ad ʒj.

theriac. seu mithridat. ʒj. l. ʒij. ad ʒij.

ʒnij diaphor. ʒ℥. ad ʒj. Syrup. rub. idæj. vel acetos. citri ʒvj. M.  
 pro duabus vel 3. dosibus.

Sudant hîc ægri, nec debilitantur, quiescunt, & ordinariò melius habent. Dare soleo tam in statu, quam in incremento.

Sudoriferis interponenda acida, ut debita sanguini redeat consistentia, & vires restaurentur, imprimis, si sudor volatilibus elicitus fuerit.

Si post sudorem fiant vegetiores, & pulsus major, bonum est, & sudoriferis insistendum, sin minus pessimum.

Vinum generosum ob acidum analepticum, optimum confortativum post sudorem, tam interius, quam exterius.

Tinctura bezoardica opiatum exaltari potest.

Diarrhœa ob metum graviorum symptomatum non statim sistenda, sed theriacalibus fomiti morbo obviâ eundum, sic sponte cessabit. v.g.

℞ ʒnij diaphor. ʒij. terræ sigill. ʒj. extr. theriac. gr. vj. M. detur in 2. partes. capiat cum vehiculo calido expectando blandum sudorem. Exterius theriaca cum vino generoso fervidè stomacho & hypochondriis sæpius applicari potest.

Quid verò agendum si menses superveniant? Respondeo si debita quantitate, absque gravioribus symptomatibus, naturæ relinquendum directorium. Si parcius & tormina abdominis superveniant, reliquis medicamentis miscenda myrrhata. Si copiosius & metus sit, ne excretio cutanea impediatur, acidula cum terreis & opiatum usurpanda. Si febris maligna est à contagio, & æger de anxietate præcordiorum conqueratur, quod signum, succos circa primas vias esse corruptos, maturè vomitus procurandus, etiam si tertius dies morbi sit. Venæ sectio nil valet.



C A S U S XXIV.  
DE VARIOLIS, COLLECTANEA.

*Acidum in Variolis primario peccare juxta Sylvium probant* (1) pustulae, pruritus, pus, crusta à cuticula ab acido erosa, ossa erosa, & ulcera depascentia ab acido in variolis. Idem quod mulieres lactantes pueros variolis obsessos, ulcera in mammis reportent. (2) Juvantia alcalina praesertim volatilia, sine quibus raro curantur variolae.

*Acidum hoc* sub fermentatione *massam sanguineam & lympham corrumpit*, ut subinde universum corpus una quasi crusta obducatur.

*Lympham* verò potissimum inquinari, patet ex tussi, affectibus oculorum ab acrimonia lymphæ, faucium & oris vitiiis, lvi venereæ ferè communibus.

*Causa remota* aër austrius frigidus, unde sal ejus nitrosum hebetatur, potissimum verò contagium. Mater gravida assidens variolis correpto, infantem variolis obsessum enixa est, ceu refert Meauriceau. Cephalalgia est ex orgasmo sanguinis. Sitis, vomitus, anxietas, alvi fluxus spumosis ex bile, ob admixtum ipsi fermentum acidum variolarum turgescente, & ad stomachum regurgitante; In specie diarrhœa insignem humorum arguit corruptionem, & in statu superveniens plerumq; lethalis.

*Epilepsia* oritur à vellicatione nervorum, à fermento acri ante eruptionem, & sub ea non adeò formidabilis, post eruptionem pessima, innuit exclusionem minus sufficientem.

*Hæmorrhagia* ante eruptionem fit ab apertione vasorum capillarium ex sanguine turgescente, estque bona, si continua. Mictio v. Sanguinis & dejectiones cruenta, quandoque in statu, separatione jam facta, superveniunt, ob erosionem viscerum & membranarum, quæ non raro gangrænâ corripiuntur.

*Curam* sequenti ordine hætenus institui: Vocatus in principio primo vel secundo die, quando incipiebant ægrotare, dedi *Ξarium dulcem cum conserva rosarum* in forma boli, pro bimulo gr. ij, & sic consequenter, qui modo per alvum, modo per vomitum, sæpe etiam nihil operatus fuit.

Si vero statim cum prostratione virium & jectigatione ingruerent, dedi *pulverem epilepticum cinnabarinum* cum euphoria.

Si symptomata circa primas vias, *tensio abdominis, murmura*, &c. urgerent, blandum *clyisma ex decocto avenæ vel lacte cum melle* injici curavi.

*Præterlapso principio ab alexipharmaca cum alcalinis accessi* v. gr.

℞. C.C. sine igne ʒj. myrrh. gr. vj. theriac. gr. ij. M. pro duabus dosibus.

Z. 3

vel ℞.



vel ℥. C. C. sineigne ℥j, myrrh. gr. iv. ☉ vol. C. C. gr. iv. M.  
pro duabus dosibus.

Dentur in incremento morbi secunda vel tertia die, dum æstus urget ante eruptione n, quibus insistendum quoque erumpentibus variolis, vel promovenda excretio per emulsionem ex sem. expellentibus cum myrrha & unicornu fossili. Dum jam astollebantur præscripti.

℥. Tincturæ gri ℥j essent, myrrh. cum spir. sal. \* vinosi fact. ℥j. M. detur bis, ter, 4. die & nocte ad gt. 15. 20. 25. pro ratione circumstantiarum.

In declinatione cum plenè essent in suppuratione pulv. lapid. cancr. cum tantillo Gri suppurationem promovi & reliqua symptomata sustuli.

Cum crustæ decidunt, post duas vel tres septimanas à primo morbi insultu, pro interna mundificatione iterum purgavi cum Grii dulci addito gr. 1. vel 1℔, 2. ℥. 3. jalap. pro stimulo in conserva rosarum. Symptomatibus sequenti modo obviam itum.

Vomitus in principio compescere nolui, si verò urgerent theriaca optima, vel gr. j. vel gr. 1℔ laudan. opiatum aliquoties datum, vel liquor C. C. succinat. gr. iij ad gt. vj. in potu.

Epilepsia si in principio vel incremento ingruat, internè liquor C. C. succinatus, vel pulvis cinnabar. epilept. externè si simul dolor abdominis tensus adsit, bals. ex oleo succini ℥j spic. gr. v. cum nuce mosch. express. regioni umbilicali & scrobiculo cordis aliquoties jussi illiniri.

Diarrhœa in incremento & statu sæpe funesta, occasione potus nimii vel frigidioris, potissimum si excreta spumosa & murmura abdominis conjuncta; itaque

℥. Terræ sigillatæ minutim pulv. ℥j. infundatur potui ordinari. M. S. trochl umb zurütteln.

Opiata cautè danda, ne exclusionem remorentur.

Viribus prostratis ℥. Tincturæ corall. cum spiritu cordis Cervi, vel ☿ typhorum C. C. cum vino. si à sudore nimio, panis similagineus, vino generoso intinctus sumatur.

Ad præservandos oculos, ne vel globum, vel palpebras obsideant variolæ, mater & mulier sana masticeit allium jeuno stomacho, & halitum oculis crebrius inspiret: Vel instilletur oculis succus ruta. Si palpebræ obsessæ, decoctum malvæ & meliloti cum linteis calidè applicetur. Si visus hebetudo à variolis superfit, vesicatoriis in nucha, pone aures aliisque appropriatis curanda.

Tussis & pectoris affectus, syrupo scabiosæ hederæ terrestris cum spir. \* et anisati curantur. Plerique variolis defuncti suffocatione intereunt, unde frequens respiratio anhelosa, Stertor &c. malum.

Si loque  
ca, curatur eff  
Denique  
linguntur, &

Mulier  
cumque pri  
tium comm  
pitur æstu,  
re repleta, i  
rente auror  
sudorem, tu  
Vocat  
scribit.

A meridie h  
promata, cu  
ram dosio a  
lius habet, r  
unde & die  
horrore per  
sinistra intus  
mittunt ty  
Grii bene l  
æstus cum  
tumet, do  
mammarum p  
promata re  
appropinq  
Curam,

Resol  
ab voracita  
Non



*Si loquela perdatur, vitio nervorum linguæ, præter volatilia antiparalytica, curatur essentia castorei, linguæ circa frenum crebrius afflicata.*

*Denique sæpe post variolas morbi chronici, ulcera vel alia symptomata relinquantur, curanda per salivationem vel Qrio dulci.*

## CASUS XXV.

## FEBRIS LACTEA.

Mulier juvencula, secundâ vice puellam enixa, optimè à partu se habet, cumque prima vice ipsa foetum lactasset, altera laboris pertoea, nutrici negotium committit. Die à partu nono, qui erat Hni, media nocte intenso corripitur æstu, cum siti & cephalalgia atque anxietate, mammae antea lacte moderatè repletæ, immensum tument & turgent, dolent insigniter & indurantur, apparente aurora, prædicta præter mammarum symptomata evanescent per levem sudorem, superstitè saltem insigni virium prostratione appetituque dejecto.

Vocatus Medicus die Solis præter externa mammis imponenda præscribit.

℞. C. C. sine igne ʒss, n. yrrh. gr. viij, ̄ absinthij ʒss. M. pro duabus dosibus.

A meridie horâ tertiâ capit unam dosin, unde omnia supradicta redeunt symptomata, cum simili ferocia perdurant ad mediam noctem, quo tempore alteram dosin adsumere debet, dubitat tamen an liceat. In sequenti die lunæ melius habet, mammae minus dolent, lac per papillas effluit, nox insequens quiescit, unde & die Martis optimè habet, sed à meridie hora secunda gravi corripitur horrore per horam durante, insequitur æstus gravis per aliquot horas: mamma sinistra intumescit de novo, induratur, dolo insigniter, post mediam noctem remittunt symptomata febrilia, mammae affectibus eodem tenore durantibus, die Mercurii bene se habet, ut & die Jovis, sed hoc ipso à meridie statâ horâ, rigor & æstus cum reliquis symptomatibus redeunt, dextra simul mamma induratur, tumet, dolo, & speciatim tumor durus ovi gallinacei ferè magnitudine in ima mammae parte paulò profundius tactu percipitur: post mediam noctem symptomata remittunt; mammarum saltem pathemata affligunt, ægra ipsa fatetur, appropinquante paroxysmo se aliquid prius in mammis percipere, flagitat Curam.

*Resolutio.* Est febris lactea per accidens typum tertiana observans, quia ab voracitatem prægressam ad hanc erat disposita.

*Non præcisè tercio l. 4to die à partu ingruunt hæc febres lacteæ, & septimo median-*



mediante sudore finiuntur, sed interdum nono demum die invadunt, præprimis in iis quæ non ipsæ lactat & hæ atrocioribus ut plurimum stipantur symptomatibus. Lochia ut plurimum *supprimuntur*, si febris intensior, nec redeunt, nisi ardore febrili profligato; sudore largius erumpente spontè tandem evanescent.

Quoad *Causam* febris hujus referenda vel ad fermentum mammarum per sanguinem refluxum totam massam sanguineam inquinantem. Vel deducenda a motu sanguinis fermentativo sub partus negotio æque ac menstruorum fluxu observabili. A qua turgescencia partus ipse, lochiorum fluxus & febris lactea proveniunt. Curiosum enim est quod mulieres sanæ, quæ ante imprægnationem ordinarias patiuntur menstruationes, sub decima à conceptione pariunt. (wann sie zum letzten ihre Zeit gehabt/zehlen sie die periodos, wann die 10. kommt/ordinariò pariunt.)

Dolores partus sunt à spasmodis uteri firmiter annexi ossi sacro.

Tumor & durities in mammis nunc particularis est, à lacte in glandulis coagulato; nunc universalis, quando ob dolorem fibræ mammarum spasmodicè stringuntur, vasa hinc angustantur, sanguis stagnat, & succedit inflammatio.

Symptomata febris lacteæ non faciliè lacti congrumato superveniunt, nisi dolor & hinc inflammatio succedant.

Coagulant lac frequentissimè ira & terror, non tam in vigilantibus; sed etiam in somnio obveniens.

Lactatio omissa, quam in priori puerperio sustinuerat, tubulis laxatis copiosum lac colligentibus, ad febrim lacteam nostram ægram faciliè disponit.

Est absq; periculo, nisi tardius lactea febris superveniens ob incuriam abeat in ardentem, vel tumor mammarum in abscessum.

Quoad febrim conveniunt sudorifera, fixiora & precipitantia, non neglectis, quæ lochiorum fluxum simul stimulent. Volatilia et si puerperis maxime proficua, cum tamen æstum & cephalalgiam intendere possint, fixioribus in hoc casu merito postponuntur.

Quoad lactis coagulum, interius diaphoretica & resolventia tam fixa, quam volatilia, Spir. \*ci ad ʒiʒ, imperando sudorem. Exteriori empl. crocatum Mynsichticum saccul. oryzae calidè applicentur, impedit lactis coagulum, & faciunt, ut mitius decurrant symptomata. In progressu vero morbi non sufficit.

Ægram sic curavi, post usum dicti pulveris repetitum dedi ʒrium. Cum mamma tumore doleret, & dura esset; inunxi calide sequ. spiritu.

ʒ. Spir. ʃ \*ci cum ʒ ʒiʒ essentia croci ʒiij M. applicato desuper empl. sequenti in medio, ubi papilla est, perforato. ʒ. Empl. de galbano crocati Myn-

Mynsicht. q.  
ol. philosoph.  
Deniq;  
pius removea  
giè discussus  
purationem  
tolerabilior.  
Die M  
ʒ.

Casus  
lii de Pleur  
Pleur  
bri, respirati  
leri, frequen  
qui non plu

Pars  
inflammata,

Caus  
infixa inflam  
angustatione

Finitur  
tionem, uno  
vel per supp  
ultra dies c

Itaque  
appropriati

ʒ.  
capiat coch  
eumin. def.  
sito desuper



Mynsicht. q. s. Malaxetur cum oleo q̄ri fœtido, vel si fœtorem ferre nequeant, ol. philosoph. vel terebinth. d. st q. s. induc super alutam.

Denique *sacculi ex oryza milio, vel avena*, calide superimponantur, & sæpius removeantur, sicut & inunctio quotidie ter repetenda. Quorum usu egregiè discussus tumor, nec faciliè continuatus usus quendam destituit. Si ad supurationem necessariò tendant grumi indurati, horum usum fines, & empl. erit tolerabilior.

Die Martis ante paroxysmum dedi sequens.

℞. Lapid. S. præp. ʒj, ʒ absinthii gr. xij. capiat hora prima ante paroxysmum, cuius usu repetito convaluit.

## CASUS XXVI.

## PLEURITIS VERA.

Casum similem vide in disputatione Wesneri sub Præsidio D. D. Wedellii de Pleuritica ægra habita.

Pleuritis vera *cognoscitur* ex his (1) dolore pulsatorio circa costas, febrili, respiratione difficili, pulsu duro, ob inflammationem membranarum, celeri, frequenti, non rarò intermittente, ob sanguinem certis in locis stagnantem, qui non plus debito formidandus, denique tussi.

*Pars affecta* non sola *Pleura*, sed etiam *pulmo* illius lateris, ubi pleura inflammata, quod confirmat tussis & materiæ copiosæ ejectio.

*Causa proxima acidum dolorificum* pleuræ affixum non secus ac spina infixa inflammationem (ob fibrarum nervearum contractionem, hincque ortam angustationem, & consequenter stagnationem cruoris) inducens.

*Finitur* vel per resolutionem, vel per materiæ coctionem, id est attemperationem, unde spura cocta, alba, levia, æqualia & copiosa cum tussi excernuntur; vel per supurationem, quando spura vel deficiunt, vel pauca, cruda, inæqualia ultra dies criticos durant.

Itaque in principio resolutio & discussio insensilis tentanda diaphoreticis appropriatis v. gr.

℞. ▽ papav. rhæad. card. bened. ana ʒi ss mandib. lucii piscis præp. ʒj.

ʒ volat. cujusdam gr. xij. laud. opiat. ferment. gr. ij. syrup. scabiol. ʒi M. capiat cochlearim. Convenit etiam *dens apri*, *lapis S.* Exterius *ol amygd. dulc.* *cumin. dest. bals. q̄ris*, cum *Ung. dialth.* loco dolenti illita, item *Spir. Xci*, imposito desuper latere vel linteis calefactis.



2. *Si hac via non cedat, coctio seu attemperatio materiae collectae iuvanda, per temperata dulcia & incrassantia, expectoratio acrioribus & acidiusculis expectorantibus promovenda.*

(3) *Si vero excretio, quae ad 20. dies se extendit, & tussis non succedat debite, sed ob abscessum tendat inflammatio, quod fit ferè post diem 14, suppuratio emollicatibus & humectantibus promovenda; Ut decocto alb. scabios. malv. ficu. passul. jujub. Exterius terebinth. cum vitello ovorum.*

Deinde quo vergit natura pus evacuandum. Optimè si sponte rumpat abscessus, quod fit cum rigore, quem excipit insignis æstus febrilis, tussis &c. Quod si verò symptomatibus remittentibus longius protrahatur apertio, iuvanda vomitu leni, Sternutatorio etiam. Rupto abscessu si ad superiora per sputum vergat natura, expectorationem optimè promoveret *Syrupus vel decoctum Nicotiana* ritè paratum. Vel

*℞. herb. hyssopi, hord. nostr. ana M j rad. helenii ℥ij, acori nostr. ℥j.*

*coq. in l. q. ∇. f. colatura edulcoretur c. l. q. Syrupi Nicotianæ Querc.*

*Vomitus quoque moderatus expectorationem promoveret. Acrimonia puris balsamo grisei, myrrha aliisque balsamicis temperandæ, Si ad inferiora per urinam vel alvum vergat, diureticis & laxantibus iuvanda. Clyisma paulo acrius per diarrhoeam succedentem egregiè pus evacuabit.*

*In vomica pulmonum convenit decoctum radice chinae, ligni sassafr. cum vulnerariis & balsamo grisei vel antiseptico Poterit.*

## CASUS XXVII.

### DE CACHEXIA CUM SCABIE.

Ancilla aliàs succi plena & formosa, jam ab aliquot mensibus deformis admodum redditur, dum scabie laborat per contagium contracta. Scabies humida, pustulae latae, ingentes, copiosum serum praesertim in artubus, fundentes, crura simul insigni tumore œdematoso ad genua usque turgent, manibus etiam tumidioribus existentibus. Conqueritur simul de sapore dulci nauseoso (sic empfindet immer ein süßen Eckel-Geschmack im Munde) sitis continua, cerevisiam secundariam bibit, quia primaria palato non arridet, bene appetit, probeque comedit, interdum dulcis & calidus halitus ex abdomine ascendere videtur (es kommt zuweilen als ein heisser Qualm aus dem Leibe.) In abdomine subinde varias agitationes percipit, qui exinde nunc insigniter tumet, nunc denuò subsidet, facies est pallida & tumida, urina parcius, quolibet mane vomitum jejuno stomacho patitur, menses ordinatè fluunt, nunc intra 14. dies redeunt, nunc ultra menstruum tempus deficiunt, bene dormit, petit medicamenta.

Resi-



*Resolutio.* Affectus primarius est cachexia, cui per accidens jungitur scabies in corpore disposito longè gravior.

*Subiectum* invasionis sanguis & lymphæ, quoad scabiem cutis; radicationis ventriculus & vesica f. ilea.

*Causa proxima*, acidum viscidum, pingue, errore primæ digestionis natum.

*Remota* bilis pinguis nimis, iners & parum volatilis, inde hæmatoseos defectus & plura phænomena, hepatis vulgò adscribi solita.

*Sapor dulcis nauseosus*, frequens est chronicis cum colluvie serosa conjunctis affectibus.

*Dulcia* mediæ sunt naturæ, inter acida & amara, de utroque sale participantia, copioso, pingui oleoso sulphure oblita & temperata v. g. mel, Saccharum, passulæ, succus ribium cum lixivio tartari præcipitatus abie in pastam dulcem blandam. *Amara* de copioso alcali participant, intimè concentrato cum oleo. Hinc resina plus minus amarescunt, & sunt salia volatilia oleosa concentrata ab acido. Hinc olea destillata empyreumatica contrahunt propter sal volatile cum pinguedine colligatum, amaritiem. Bilis concurrens cum chylo acido volatili dat tertium salsum, temperatè dulce. Si ergo bilis iners & pinguior cum acido viscido concurrat, fit sapor dulcis nauseosus, stomacho ingratus. Ex nullo subiecto magis pituita viscida colligitur, quam ex esu pinguium, quæ cum bile concurrente, fiunt inflationes & murmura abdominis. Et quia cerevisia, ob amaritiem in acidum viscidum primarum viarum agendo, molestiam in stomacho excitat, hinc aversatio cerevisiæ amara.

*Parcior* urina non tñum vitio, sed hæmatoseos defectu. Bilis, dum utilem cremorem à fecibus segregat, eo ipso cremorem quoque disponit, ut superfluum dimittat: Itaque non mirum, bile inerte utrumque claudicare. Hinc ab usu alterantium amarificantium, vulgò hepaticorum aperientium, urina copiosior, intensius tincta, & ampliore sedimento prodit, quod est spes convalescentiæ.

*Tumor pedum œdematosus*, alique similes in affectibus cachecticis commodè quidem à sero extravalato deduci possunt, non incongruè tamen fermentativa quædam turgescencia in partibus carnosissimis subesse videtur, quæ sub nutritione depravata instantur. Triplici potissimum modo tumores œdematosi generantur; (1) Simpliciter ex abundantia feri, quæ dum circulari per vala sufficienter nequit, tendit deorsum, & tumorem excitat. (2) Ex irritatione quadam in partibus nervosis, supervenit fibrarum contractio & spasmus, unde angustatio valorum sanguinis impedit transitum, & tumor, nunc sanguineus, nunc serosus oritur. Hinc odontalgia & podagra supervenit tumor, propter spasmus fibrarum



brarum nervearum, si sanguineus, (die warme) si letolus, (die kalte Sicht.) Tales tumores saepe oleis destillatis & acrioribus exasperantur, quatenus partes nerveæ vellicantur. (3) Ob vitiosam assimilationem, nutrimentum partium, quod fit vel vitio fermenti localis in parte, quomodo ulceribus, venenis, item in anasarca sub parcissimo potu, jungitur tumor, vel vitio nutrimenti, ad assimilationem inepti, quando p.n. fermentatur in parte, non secus ac pasta farinacea successive in tumorem attollitur.

*Scabies humida*, qualis ordinariò in subjectis cachecticis scorbuticis esse solet, fit ob nutrimentum aquosius & minus temperatum, quam ob rem promptius corrumpitur. Ubi namque nutrimentum proximum est balsamicum, & lino-volatile oleosum, non facile corrumpitur. Chirurghi dicunt (er hat ein heilsame Haut) contrarium fit in nostro casu.

*Prognosis Cachexia* ut plurimum post se trahit *hydropem*, qui in nostra ægra metuendus, nisi maturè & providè malo opponatur.

*Cura* præmissâ evacuatione universali ad sequentia potissimum dirigenda, ut (1) *acidum corrigatur*, (2) *viscidum resolvatur*. (3) *bilis acuetur* salibus, his scopis satisfaciunt *amaricantia*.

Hinc nostram ægram beneficio *absinthii* maximam partem restitui. Primum per aliquot dies dedi *liquoris Stivalis* gr. 20, unde dulcis nauseosus sapor evanuit, & urina liberius profluxit. Hinc singulo mane *Spiritum absinthii Urinosum in decocto absinthii cum simpliciter paratum* ad gr. 30. dedi, imperato sudore. Quibus per aliquot septimanas continuatis, melius habere visa; Hinc dedi *vomitorium*, & cum decoctum prius averfaretur, *absinthio affudi* V, de quo infuso mane & vespere cochlear j. instillatis guttis 30. *Spiritum \*ci* assumpsit, continuando ad aliquot hebdomadas, absinthium quoque cum pane butyrato sæpius esitavit; Sic integrè convaluit; *Pedes scabiosos* V Ψ calida sæpius abluit, & calido linceo involvit, sic evanuit *Scabies*; *Pro mensibus corrigendis* iussi parare *pulverem ex baccis lauri p. iij. Myrrh. pj. & omni mane largam dosin in vehiculo calido assumere*.

*Ad evacuationem universalem & purificationem Massæ sanguineæ in scabie.*

℞. Extr. hellebor. nigr. gr. xv. ad ℥j trochif. alhandal. gr. ij. ℞rii dulc. gr. xv. ad ℥j.

cum f. q. essentiaë fumarie fiant pillulae pro una dosi.

℞. Conserv. fl. persic. 3℔. extr. hellebor. nigr. ℞rii dulc. ana gr. xv. troch. alhandal. gr. j. f. bolus.

*Pro sudore alcalia volatilia* pro fixis ad cutis peripheriam penetrant. *Essentia myrrhe cum \*ci vino*. Vel V tartarificato, vel cinct tartari parata, *Essentia liquorum* à 3℔ ad 3j. Vinum medicamentosum ex *absinth. & hepatic. aperientibus*.

℞. C. C.



℞ C.C. (Δ) 3℔, Θ volatil. ejusdem 3℔. M. pro 1. dosi ad sudorem.

℞ ∇ flor. sambuci, fumar. ana 3j. Spiritalis \*ci 3℔.  
Syrup. card. bened. 3ij. M. pro 1. dosi.

℞ ∇ fumar. mentha ana 3ij.

Exir. Orit cum succo pomor. borsdoi ff. 3℔. M. detur pro cachexia.

*Externa ad affectus cutaneos sunt triplicia* (1) de genere *alkalium*, *saponariorum* & *abstergentium*, inter quæ excellit ∇ Ψ *ve polychresta* solum modo per repetitam ∇ x infusionem parata. Item *decoctum stercoreis gallina vel ovilli cum radice lapathi acuti* transcolandum, & calidè applicandum.

*In tinea capitis* optimum 80. Pri per deliquium, cum spongiola crustis applicatum, vel 8. olei amygdal. q. l. cum oleo tartari terendo f. linimentum, addito si pediculi urgeant, oleum spicæ.

(2) De genere *æreorum* v. g. *flor. æris*. ∇ Ψ *a, in qua æ tritum decoctum* v. g. in 1℔ j. ∇ Ψ *æ 3ij. æris. solutio scoriarum reguli* 8. n. sequ. mihi usitat.

℞. Ungv. alb. camphorat. vel enulat. 3j. flor. æs 3ij. Θ tartari 3j. c. f. q. ol. nicotianæ f. linimentum, manè & vespert articulis calide inungendum, & si non sufficiat, decocto ante dicto Ψ *a* cum *æ* e, vel scorii reguli 8. n. j. mane abluendū.

(3) De genere *grialium*. v. g. *cingulum grialis tutum*, si corpus sudoriferis prius purgatum, ab omni frigore externo probè præmuniatur. *Vel*

℞ g. purissim. 3ij. aquæ communi 1℔ j. agitentur probè, bulliant, filtrentur, & abluantur partes scabiola. ℞ ∇ Ψ *a* 1℔ j. g. n. j. dulcis 3j vel 3ij præcipitabitur quidè pulvis albus, sed ulus tempore movenda.

CASUS XXVIII.

DE PHTHISI.

Vir ætatis consistentis, conqueritur de tussi continua cum materiz copiosæ rejectione: Materia quæ per os rejicitur, est quandoque alba, quandoque livida, quandoque viridis absque fœtore, & quæ aquæ injecta, fundum non petit; jungitur raucedo crebrior, subinde tamen remittens. Ad oblata mediocriter se habet, saporem tamen retum, nec facilè explorabilem, cinerum aut lignorum putridorum instar mane in ore percipit. Urina boni coloris & consistentiæ, sed intensius tincta, pulsus celes & frequentes, magnitudine moderati. Noctes propter tussim inquietæ, & somnus admodum interruptus, simul verò ac somno indulgere incipit, copiosis sudoribus diffuit, non leviter eum debilitantibus. Corporis constitutio antea habitior, sit gracilior, partes extremorum carneæ molles & flaccidæ, tempora collapsa. Alvus quotidie respondet officio.



sed liquidiora & fluidiora solent esse excreta. Ex levi motu virium imbecillitas & respirationis difficultas, utrique lateri commodè incumbere potest, nisi quod dextro incumbens, omnia exasperari sentiat. Diu est, quod successivè malum in principio neglectum altius progressum sit, facie quo iam modo jam apparente Hippocratica. Originem morbi scit nullam, nisi quod lites continuæ & iurgia domestica uxorem inter & ipsum intercesserint. Flagitat curam.

*Resolutio.* *Affectus est phthisis*, ubi autè *alia vera, alia notha*. Sic vir quidam vescitur carne vervecina cum brassica, inde brevi corripitur tussi sicca, crebra & successivè humida, color faciei perit, fitque Hippocratica, durat ad biennium: Omnibus irritis, tandem cum forti tussi, duriusculum quid ex imo pectore sursum movetur, quod erat ossiculum parvum, cum brassica deglutitum, in aspera arteria defixum, quo rejecto, intra paucas septimanas sanus & floridus evasit. Plura ejusmodi exempla vide apud *Barthol. c. 2. hist. 29. Keckerm. observ. 72. Ann. 2. Miscell. curios. p. 58.*

*Sudores nocturni* dormientibus imprimis erumpunt, quatenus sub somno fibræ relaxantur & flaccescunt, unde sudor sponte emanat, qui cessat, quando evigilant.

Non rarò in ulcere pulmonum *fœtida rejiciuntur*, corpore nihilominus vegero & florido, ubi nimirum vis stomachi adhuc viger.

*Maxilla* illius lateris, cujus pulmo exulceratus, *ut plurimum rubet & calet*, altera pallida.

*Cura.* In Cura sequentes notandæ observationes & indicationes (1) *dy-crasia sanguinis & acrimonia lymphæ corrigatur*, (2) *sordes pulmonum per expectorationem removeantur*. Pro hoc scopo convenit *Nicotiana in decocto & syrup. hyssopi, marrubii &c. v. g.*

℞ herb. scordii, hyssop. marrubii, ana mß. pulverisatis adde myrrhæ, ℥iij. diaphor. ana ℥ij.

c. s. q. mellis vel pulpa passularum recenti fiat electuarium asperg. bals. æris anisat. l. myrrhato.

*Mel cum myrrha* in sputo fœtido optimum.

(3) *Nocuum pulmonum curetur vulnerariis.*

De Phthisi incipiente curiosum est, quod habet *Riverius cent. i. obs. 79. decocto lignorum curata.*

℞ rasuræ ligni Juniperini ℥iij, Gvajac. ℥ß, macerentur per 24. horas in MB. s. q. ▽ mane ebulliant ad consumptionem medietatis, in fine adde passul. min. conquassat. ℥ij. trajice per manicam Hippocratis, de hoc aliquoties bonus haustus sed absque sudore sumendus cum ℥iij. diaphor. & antiseptico Poterii vel balsamo æris, quibus peractis ad lac accedendum, si febris non adsit.

*Opiata*

*Opiata ubi  
seperando, con-*

*Historia  
qua cibiarum,  
auferendus, an  
plexia superv  
ricantibus &  
gnosci, nec dy  
rium excitand  
Vidimus tum  
tem, cum dolo*

*Cura.  
ad præcordia  
fœtio, cucurbi  
rate incrassat*

℞ ▽ p  
Sy  
Item opi  
v. g. lapid. &  
centinodum  
hic parum va  
scentia Arch  
Extra

*accurata  
Vitentur ac  
promovend*

*Vlcera  
da & protu  
tant summe  
cum alcali  
hic inspersu*



*Opiata* ubi tussis ad huc sicca & erosio nondum facta, lymphæ acrimoniam temperando, conducunt, & sensum irritationis sistendo v.g. *pillula de styrace Sylvii*.

## CASUS XXIX.

## DE HÆMOPTYSI.

Historia continet *hæmoptoicum* ab ulcere in tibia clauso. *Ulcera anti-qua tibiarum*, crurum, si curanda, fons prius respiciendus, & fomes in corpore auferendus, antequam claudantur, ne *dyspnœa*, *asthma*, *hæmoptoe paralysis*, *apoplexia* superveniant. Ut plurimum à cachexia scorbutica foveantur, hinc *amaricantibus* & *hepaticis* interius curanda. Sin verò vitium nequeat à priori cognosci, nec dyscrasia sanguinis corrigi, *fonticulus*, vel etiam quandoque *vesicatorium* excitandum. In infantibus excitati circa annos pubertatis claudi possunt. Vidimus tumorem circa cubitum, ad motum lunæ incrementem vel decrescendentem, cum dolore nocturno, inusto in brachio fonticulo evanuisse.

*Cura*. Primo in *paroxysmo* occupata tam in sanguinis fluxu, ejusque motu ad præcordia sistendo, quæ præstant (1) quæ motum ejus alio deducunt, *vena sectio*, *cucurbitula scarificata*, (2) ejus quæ acrimoniam temperant, & moderate incrassant, v.g.

℞ ∇ portulac. plantag. ana ʒiβ. corall. rubr. præp. ʒj. terr. sigill. ʒβ.

Syrup. papav. err. ʒiM. pro duabus dosibus.

Item *opiata*, *troch. de carabe*, & c. rum si quid grumosi subinde dissolvendo, v.g. *lapid. ʒi. tinct. vel decoct. fl. bellidis* mirabile resolvens vulnerarium. Externe *centinodium recens cum ✕ vini* contusum axillis applicetur. *Bufo exsiccatus hic parum valet, sed* ubi hæmorrhagia est ex solo impetu sanguinis & ex candescencia Archei v.g. in febribus tunc convenit.

Extra *paroxysmum* succi acres in corpore temperandi, quod fit (1) *accurata diæta*, ubi *lacticia* crebro in usu sint, incoctis prius *vulnerariis*, Vitentur acria, & sa, vinum, incandescencia, (2) *aucto corporis motu* ad promovendam insensilem transpirationem. Remedia sint *amaricantia aromata*.

*Ulcera crurum*, cacoëthica & antiqua nunc maturantia, nunc sordida & profundiora curatu satis ardua. Pleraque respuunt emplastra, sed auscultant summe *absorbentibus metallicis, cerussa, aloë, myrrha, croco* & *is per nem cum alcali ex ʒlo ʒiis in ∇ soluto* & subsequam edulcorationem. Crocus hic inspersus citò & tutò curat etiam absque emplastro. Si *ulcus sordidum*, præ-



præmittatur *digestivum*, ex *terebinth. vitello ovorum cum melle, myrrha*, & *extr. rad. aristol. rot.* Si *crura* simul *cedematosa* sint, vel ad *gangranam* inclinent, occurrendum *V camphorato*. Interius *amara balsamica*, ut *myrrhata*, continuò dentur, si hæc non sufficiant, *decocta lignorum sudorifera*, ut *rasura ligni juniperi cum baccis*. Quod si nec his cedant ad *salvationem* *Urialem* accedendum.

## CASUS XXX.

## STRANGURIA OCCASIONE

## PODAGRÆ CURATÆ.

Vir ætatis consistentis, nephriticis & podagricis affectibus crebrius obnoxius, urgente intenso hyemis frigore contrahit tussim ingentem & validam crebrius pectus concutientem, ejicit pauca silem & viscida, locum, ubi tussis excitatur, monstrat caput asperæ arteriæ. Accedit levior invasio podagrica circa manum dextram & cubitum sinistrum. Vocatus Medicus præscribit *Spir. \*ci* cum dimidio *spir. cochleariæ*, ter, mane, meridie & vesperi sub introitum lecti ad guttas 20. sumendum, exinde podagricus affectus cessat. Hinc 2do vel 3tio die gravis dolor in lumbis cum intensissimo vesicæ dolore supervenit, ita ut continuum mingendi conatum admodum dolorosum percipiat, pauca tamen emittit, vocatur pro cura Medicus.

*Resolutio. Affectus* primarius *stranguria* ad plures dies perdurans, *Pars affecta vesica urinaria*, speciatim *spincter & urethra*.

*Causa proxima acidum vitiosum*, in specie arthriticum, quod usu *Spir. \*ci* resolutum, & ex sede sua motum, aque sero absorptum, per *renes transiens*, dolores lumborum, ad vesicam delatum, *sphincterem & urethram* rodendo, *stranguriam* excitavit.

Solet alias in arthritide materia peccans, vel per sudorem, vel per insensilem transpirationem eliminari; Cum v. utrumque ambiens frigus, stringendo poros & densando succos, impediret, per vias urinarias fuit excreta. Notum quippe, quod arthriticis & nephriticis, diaphoresis etiam & diuresis in radice conspiciunt. Hinc appropriata *diuretica in arthritide*, potissimum *vaga*, tam curanda, quam præservanda, magni sunt momenti, in specie *volatilia*, *Spir. \*ci. lumbricalia*, *scarabai unctuosi*, ex *fixis arcanum duplicatum* *Mysichii*.

*Causa remota digestio vitiosa. Efficiens seu movens* fomitem morbosum *aer hybernus* inclementior, qui poros claudendo, & fauces irritando tussim



tussim atq; varias metastases acidi vitiosi induxit, donec tandem ad vias urinarias delatum stranguriam produxerit.

Notum enim in arthritide potissimum incipiente varias observari metastases materie morbificæ, potissimum ab usu præpostero topicorum. (Es kan leicht in den Leib getrieben werden.) Sic quidam cessante ab impositione empl. despermate ranarum podagra, asthmate, hoc vero cessante, rursus podagra corripitur.

Alius instante paroxysmo podagrico dolores exquisitissimos sterni patitur, qui evanescunt, superveniente podagra, hæc verò curatâ, majorum atrocia redeunt.

Stranguria tolerabilis malum est podagrâ, modo non ob diuturnitatem exulceratio vesicæ succedat.

Cum itaque in nostro ægro acidum podagricum laudabili naturæ conatu ad vias urinarias ducatur, sequentes observandæ indicationes. Ut (1) acidum acre temperetur. (2) Motus iste ad vias urinarias promoveatur. (3) Fomes morbosus removeatur, regeneratio in primis viis præcaveatur.

Vocabar ad ægrum, cum urgetet tussis sicca ab acrimonia lymphæ cum vesicæ gurgulio podagræ, hinc ordinavi.

℞. ▽ scabiol. menth. ana ʒiβ, Spir. \* ci anil. ʒiij, fl. æris ʒβ,  
Syrup. scabiol ʒvj. M.

Interdum circa vespæram dedi gr. j. vel gr. iβ laud. opiat, unde evanuit tussis, sed arthridis exasperabatur, unde Spir. \* ci ʒij. cum spir. cochlear ʒj. dedi imperato sudore, qui tamen ob clausuram pororum non successit quamquam podagra cessaret; verum supervenit tussis & stranguria, unde pro temperanda lymphæ acido acri & urina promovenda.

℞. amygd. dulc. ambros. ʒβ. fem. violar. ʒiij. papav. alb. ʒiβ c. f. q. ▽ al-  
kexengi f. emulsio ad ʒviij. adde lapid. percar. præp. ʒj. edulco-  
retur parum.

Optimè hæc contulit, tandem ad derivandum serum acrius per alvum.

℞. conserv. rosar. ʒβ. tart. G. lat. gr. viij. resin. jalap. gr. xv. M. Sic con-  
valuit integrè.

In stranguria aliisque vitiis à lymphæ acris ortis, sequentia etiam commenduntur, succus glycyrrh. decoctum ex fol. malvæ cum Syr. violarum, Conserv. florum malvæ, balsam. Indic. alb. in decocto petroselinæ juxta Lindanum, cujus aliquot guttæ in gonorrhœa virulenta egregiæ, potissimum si exulceratio facta. Borrax ob alcali temperatum, cancrina ut succus expressus. Euporiston est.

℞. ol. amygd. dulc. cum Syruo dialthi, Fernellii & lapid. S. præp.

Item ℞. Cort. aurant. ʒiβ lapid. percar. vel testar. ovor. calcin. ʒβ. ol. destill.  
aurant. gr. ix. cum pauco saccharo fiat pulvis pro tribus dosibus.

Semen violarum, hyperici, quod tritum odorem & saporem terebinthinæ refert.



Si vesica præsumatur exulcerationem passa, conveniunt *Ærea balsamica, balsamus æris terebinth. l. succinatus.*

Externè axungia hirci cum oleo terebinthina destillato pubis regioni illita.

Ad præservationem in affectibus nephriticis & podagricis *Tinctura nephritica, Spir. carminativ. clyssi compositi spir. \* ci.*

Si malum contumacius diata lactea instituenda, potissimum ex caprillo.

Juvenibus acidula pro potu, senibus *therma* pro infellu commendanda in vitiis urinae variis.

Ecce minina passionibus hysteriis aliàs obnoxia, quas, irritis aliis, *herba mentha* contusa in forma globuli pudendis intrusa lapsus profligaverat; aliquando subitò dolore gravissimo lancinante in regione pudendi, potissimum in dextro labio vulvæ corripitur, qui subinde sursum vertus umbilicum vergit; Pluribus incassum tentatis, suspicionem spasmi suscepi, unde præscripti

*℞: ʒ niii, lapid. percariana ʒj laud. opiat. gr. ij, ad gr. iij. Pro duabus dosibus, capiat ex cerevisia calida.*

A prima dosi sensibile levamen percepit, post alteram evanuit paroxysmus, levibus superstitibus vestigiis. Unde ordinavi emulsionem nephriticam, sed malè inde habebat. Itaque *Spir. \* ci. & essentiam myrrhae*, cujus usu jam per annum sana vit, & quoties aliquid sentit, statim ad spiritum prædictum refugit.

### C A S U S XXXI.

### DE HÆMORRAGIA UTERI.

Mulier Juvenis succi plena, habitus corporis mollioris & carnosius, secundò gestationis mense gravida, occasione terroris patitur abortum, ipsa exinde in omnib⁹ mediocriter se habens, convalescit. Cum vero frigori externo incautus se exposuisset, quarta ab abortu septimana, post graves dolores abdominis lancinantes & ad pudenda evagantes, copiosa supervenit uteri hæmorrhagia, Sanguis qui primò prodit, floridus, post aliquot dies idem fluxus continuat, sed sanguis tenuior & serosior prodit, diu noctuque profluens, ipsa hoc simul patitur incommodi, ut subinde lancinantes graves abdominis adsunt dolores, ad ilia qui prorenduntur, quos ordinariò major Sanguinis impetus excipit. Ipsa cum ultra hæc pertulisset septimanas, imbecillis admodum & pallida fit, sitis intenditur, appetitus cessat, variatendat, sed frustra. Postulat Curam.

*Resolutio.* Est hæmorrhagia uteri. Pars affecta Uterus, ejusque vasa ex prægresso abortu insigniter læsa, ob violentam placenta avulsionem.

*Causa proxima irritatio Uteri & spirituum*, qui copiosiore inde

Sanguis



Sanguinem ad Uterum movent. In uberiori Mensium fluxu semper respiciendum, vel ad irritationis sensum, vel ad sanguinis qualitatem, ana. crior, serosior. Utrumque in nostra ægra concurrir.

*Causæ remotæ* Uterum irritantes sunt (1) *abortus* vasa dilacerans, hinc (2) *frigus susceptum*, quod antea uterum læsum facile irritare potuit, accedente cum primis tempore ordinariæ menstruationis. Hinc *dolores lancinantes abdominis*, ab irritatione spasmodica. Frigus susceptum non raro lochia & menstrua actu fluentia supprimit, Sanguinem coagulando; Hic vero nondum fluentem & serosiores sanguinem, Uterum lacerando copiosius evacuat.

Nota fortis septimestris semper debet habere vestigium imperfectionis, vel circa auriculas vel circa ungues.

In cura sequentes observandæ Indicationes, ut

(1) *sensus irritationis* circa uterum & partes vicinas leniatur; Sublato enim stimulo, velut spina evulsa, cessat effluxus. Præstant id blanda opiata.

(2) *Læsiones* ab avulsione placentæ & suscepto frigore utero inductæ corrigantur. Quod præstant partim *traumatica* adstringentia, partim *aromatica* temperata, ut *Alia, cancrina, cinam. essentia & spir. melisse*.

(3) *Sanguis serosior* blanda inspiratione condensetur, v. g. *aqueis ansteris, in crassantibus, glutinosis*. v. gr.

℞. ∇ typhon. C. C. ℥iij, succi cydon. vel granat. acid ℥j, lapid. hæmatit præp. ℥ij, corall. præp. terræ sigill. ana ℥j, laudani opiat. gr. 16 Syrup. portulac. ʒvj M. detur.

Vel si huiusmodi austeri minus convenient, temperata eligenda. v. gr.

℞. ∇ plantag. menth. ana ʒiβ, cinamom. spirituos. ʒij, trochisc. de c. rabe ʒiβ M. F. poso dol. coch. ij.

℞. ocul. ∅ præp. ℥ij, terræ sigill. ℥j, laud. opiat. gr. ij, M. F. pulvis pro duabus dosibus, sumatur c. aceto vini temperatiori.

Matribus à partu læsis lapid. ∅. mirè recommendat Helmont.

Inter *Stialia* eminet *tinctura grisei Vatrioli & liquor Stis solaris*, qui deficientem sanguinem vi martis promovet, nimium vi ∅-lata sistit, quæ multiplici experientia probata commendo.

*Externe* ad spasmos dolorificos Uteri & membranarum nec adstringentia, nec refrigerantia, sed potius blanda aromatica commendanda v. gr. Empl. de galbano, de tacamahaca, cum oleo anethi, chamomill. malaxatum vel

℞. Galbani, terebinth. ana ʒj, sevi cervini, adipis porcor. ana ʒvj. liquefacie invicem; Illine calidè regionem Umbilicæ & viciniam, imposito desuper latere calefacto, vel locum hujus replet theriaca, simili modo adhibita.



## C A S U S XXXII.

## DE NEPHRITICO DOLORE.

Mulier Juvencula vini potui dedita, post levi horripilationem corripitur crebris vomitibus materiæ variæ, quibus superveniunt tormina abdominis vaga cum alvi occlusionē, incalēscit sub vesperam cœnâ parçâ per vomitum rejectâ, nox inquieta cum subrepentibus levibus passionibus hystericis, & præcordiorum vagis anxietatibus, quæ omnia matutino sequente exasperantur, ut vix lecto exsurgere audeat, adsunt dolores lancinantes & stimulantē, circa regionem pubis, urinam excernit crebrius, sed parci⁹, naturaliter quidem constitutam, minus tamen quàm solebat temperatam. A meridie eadem intensè & obscurè tincta sanguine quasi imprægnata observatur.

Crebrior simul urget, frustraneus licet, alvum egerendi conatus. Adsunt dolores dorsi & lumborum partim acuti terebrantes, partim obtusi, gravantes & contundentes quos sensibiliores percipit sub corporis agitatione, aut quando se erigere vult. Intra 3 vel 4 dies menstruat expectat purgationem. Consultitur Medicus, qui accedens pulum in omnibus moderatum, celerem tamen & durum observat. Curam rogat.

*Resolutio.* Nephritis in genere est affectus renum dolorosus, ut plurimum cum inflammatione.

Estque vel *calculosa*, vel *salina sive notha*, ut plurimum *scorbutica*, ubi salia corrosiva, circa renes coacervata, lancinant & rodunt partes nerveas membranas, ac si calculus adesset, vide *Dravviziū*.

*Partes affectæ* renes, speciatim *membrana interna*, quæ pelvim cum tubulis & ureteribus constituunt.

*Causa proxima* est *contractio spasmodica* ob vellicatas membranas renum.

*Causa vellicans* potest esse *calculus*, quem simul promovet instans menstruatio, nam mulieres nephriticæ pejus habent circa renes sub menstruationis tempore: *Causa remota acidum* in primis viis.

Symptomata omnia recensita à dolore, indeque orta spasmodica contractione deduci queunt. *Alvus enim clausa* propter spasmum intestinorum, & ab eodem fonte *passiones hystericæ* in mulieribus; in viris nephriticis retracto testiculi musculo cremastere spasmo affecto; *tensimus* etiam & cum primis vomitus,



mitus, qui licet interdum urgēat, antequam dolor nephriticus in lumbis percipiatur, tamen fit à vellicatione renum, licet respectu nostri non sit sensibilis.

Revera omnes dolores nephritici, partus, & qui instantibus mensibus urgent, sunt à spasmodica contractione.

In Nephritide notha irritatio fit membranarum interiorum renum ab acido acriscorbutico, sicut etiam in gonorrhœa virulenta confirmata nephritici dolores urgent, ut nec incumbere loco dolenti, nec erecti incedere queant. Si Calculus major, & symptomata diu durant, supervenit Epilepsia ob continuatos spasmos, in gravidis abortus. Si calculi inæquales, acuti, exulceratio renum, mictio cruenta;

In Paroxysmo (1) & ante omnia spasmus membranarum dolorificus tollendus, quod nisi fiat, frustra & cum nocumento adhibentur diuretica. Id verò præstant anodyna tam vegetabilia, opium, quam mineralia, æta, v. gr.

℥ ℥ niii vel nativa vid. in Ludovici pharm. v. g.

℥ ℥ niii vel nativ. ℔, lapid. cancer, ℔j, laud. opiat. gr. ij. M.

(2) Calculi excretio promovenda sublati prius spasmis, diureticis salinis nitrosi. Inter lithontripica excellunt nitrosa, Spir. ☉ tri, ☉ volatile armoniacale, nempe spiritui nitri instilletur Spir. ☿ ad punctum saturationis, inspissetur blanda evaporatione absque crystallisatione, & propinetur. Convenit etiam Tinctura Amelungii, lumbricalia, potissimum, spiritus tartari, quia suspicio est, quod calculum ægra contraxerit ab usu vini, quæ enim acidum vinosum optimè absorbent.

Vomitoria in paroxysmo nocentissima, extra paroxysmum pro præparatione optima, vid. Hild. obs. 6. cent. 5.

Purgantia saltem in principio paroxysmi exulent, cum tamen alvus semper servanda sit aperta, id obtinebitur, (1) per clysmata ex decocto carmin. chamem. cum urina human. ℥iij. & ol. terebinth. guttis aliquot. (2) per blanda laxativa v. g. passulata vel nephrocathartica emulsione semin. violar. v. gr.

℥ sem. violar. ℥iij. papaveris alb. ℥j. F. emulsio cum ∇ alkekengi s. q. adde lap. ☉. percarum ana ℥ss. M.

Aurum fulminans à gr. iij. ad vj. laxandi vim habet sine molestia, flatuum impetum sistit, fæcesque nigerrimo colore tingit. Magis mirum est quod solutio auri cum Spiritu salis tam insignes habeat effectus instar acidularum. Nempe aurum in √ solutum cum Spiritu vivo præcipitatum, edulcoratum, & hinc ad evaporationem Spiritui blando igne ustulatum, solvitur à Spiritu salis rectificato in liquorem aurei coloris, qui liquor propinatus in vehiculo calido à guttis 5, postea, 6, 7, 8, 9, sic gradatim ascendendo vires habet insignes, primum nauseam excitat,



continuatus mirabiliter primas vias abstergit, mucum tenacissimum dissolvit, & aliquoties instar purgantis alvum laxat, fœcesque tingit nigrè. Sic usurpatus in morbis chronicis idem præstat, quod magna quantitas acidularum. Primus hujus mentionem facit *Glauberus* In dem Frost der See-Fahrenden.

Externè exhibitis priùs *anodynis* Enis fiat infellus vel *balneum*, hinc regio lumborum oleo distillato succini vel petroleo, cum unguente anodyno *Myosicht. diatib. ol. hyoscyami* expr. illinatur, v.gr.

℞. Petrol. alb. ʒiſs. ol. papav. express. ʒj. ol. dest. succini ʒſs M. Mulieribus habitioribus, instantibus mensibus sanguis mittatur in brachio; actu fluentibus, sed minus sufficienter, in pede.

Extra paroxysmum à potu vini absteineat, alvus servetur aperta, usurpetur *Tinctura nephritica* vel *succus betule*. qui nitrosus est, & fortiori destillatione dat & volatile nitrosum. Loco diureticorum quæ raro satisfaciunt, adhibenda peculiari vi renibus dicata, eorumque fermentum in naturali Statu conservantia ex *terebinth. Junipero*, succino v.gr. *malvaticum juniperinum*, *bals. grise terebinth. &c.*

## CASUS XXXIII.

## DE LOCHIORUM RETENTIONE CUM URINÆ SUPPRESSIONE ET DOLORIBUS POST PARTUM.

Mulier partu perquam laborioso, in quo ab Obstetrice ruditer tractata, filium enititur, quem difficilis & tarda secundinarum earumque; frustulatum discerptarum exclusio sequitur. Hinc lecto imposita, altero mane graves abdominis lancinantes & ad pubem usque protensos dolores patitur, repetitis vicibus recurrentes, similes partus doloribus. Dolet simul acerbissimè circa pubis regionem, ita ut præ dolore tantum non ejulare conatur. Lochia parvè fluunt, similia loturæ carniū, eaque pauca, urina difficulter redditur, & tandem penitus supprimi videtur. Ponderis sensum in regione abdominis hypogastrica intrinsecus sentit, versus genitalia prementis. Tertia demum die vocatur Medicus, qui ægram præter enarrata frigidiusculè circa extrema, ac frontem sudantem cum singultu offendit, simulque pulsum celerem, frequentem magnitudine & vehementia moderatum, durum nonnihil deprehendit. Adstantes flagitant Curam.

*Resolutio.* Affectus est complicatus, consistens primariò in lochiorum retentione, & duriò in suppressione urinæ & doloribus post partum.

Pars



*Pars affecta, Uterus, hinc vesica & partes membranosa vicina.*

*Causa proxima grumi Sanguinis, à quibus irritatur uterus, unde dolores pasmodici, quales sub partus tempore adlunt, ab iisdem grumis ponderis sensus in regione hypogastrica.*

*Causa remota aer frigidus sub partu laborioso & tardiore adinatum exclusione admissus, qui puerperis sicut & potus frigidus, perniciosissimus, ita hic grumescentiam Sanguinis introduxit, & consequenter lochiorum suppressionem. Quod effluit, est saltem serum, à sanguine grumescente separatum, & pauxillo sanguine tinctum, hinc loturam carnis refert.*

*Urina suppressio est à læsione genitalium circa collum vesicæ, quæ impedit obstetricis manu durius tractata tumescunt, quem tumorem occursum aëris frigidi auxit sæpè collum vesicæ plane laceratur, unde urinæ stillicidium, plane incurabile.*

*Frustula secundina retenta potius hæmorrhagiam quam suppressionem lochiorum inducunt. Sicut etiam mola retenta, fœtus mortuus, debilis, ad copiosum Sanguinis fluxum disponunt.*

*Sæpè à frigore suscepto, vel potu frigido hausto abdo men à partu tumidum manet, vix nisi maturè, i. novo partu curabile.*

*Metus est, ne lochiorum suppressio febris acuta, urinæ retentioni graviora symptomata superveniant.*

*Excretio loturæ carniū similis inni it orificium apertum adhuc: Dolor spirituum motum ad Uterum, molientem excretionem arguit: neutrum malum.*

*In Cura (1) lochiorum fluxus promovendus stimulantibus & aromaticis, grumos resolventibus. Solis stimulantibus nil obtinebis, quam ut dolores intendas. Excellunt myrrha, crocus, borraçin & cinamomi. Item pro grumis resolvendis lapis ☉, propter vim traumaticam decoctum artemisia in cerevisia addito croco, tinct. & nni ex scoris reguli ad 3℔ Regia. Externe suffus ex colocythide, vel scoris reguli & nni, vel urina putrefacta, quæ leni calore & volatile acerrimum emittit, per infundibulum excipiendum in lochiis & mensibus suppressis. Si ægra habilior, & metus febris ardentis urget, Vena secanda in pede.*

*Puerpuræ nostræ ad lochiorum fluxum promovendum dedi*

*℥. borraç. vener. 3℔. myrrh. gr. xvij, croci 3℔. M. pro 2 bus dosibus, primam dolin lumpsit manè,*

*Alteram evomit, unde præscripsi*

*℥. & card. bened. artemis. ana 3℔ borraç. vener. 3℔. M. pro 3 dosibus.*

*A prima dosi sub vesperam sumpta sat commode fluxere lochia, in sequente manè pe-*



nē penitus supprimuntur cum ventris tumore, intensoque dolore & sudoribus frigidis, unde cum sanguinis grumos suspicarer.

℞. ▽ cærefol. matric. ana ℥i℥, aceti vini accerrimi ℥vj, lapid ☉ præp. ℥j, myrrh gr. xv, Syrup. arthem. ℥vj, laud. opiat. gr. i℥ M. capiat probè agitatam saltem cochlear,

Hinc sequentes sacculos calidè simul abdomini applicandos præscripsi

℞. herb. absinth. chamom. ana m℥ij, Matricar. m℥ij, rad. angelic. ℥ij, sem. 4. calid. maj. ana ℥ij, bacc. Juniper. ℥℥, Concisis & contulis includantur sacculis duobus, repetitis vicibus applicandis.

A mixtura prædicta Sanguis dissolutus fuit & evacuatus, cujus usum etiam in casu ab alto, lochiis à partu resistentibus & lésionibus uteri consolidandis, multiplici experientia confirmatus recomendo.

(2) *Urina excretio promovenda leniter stimulantibus, potissimum lapid ☉. Agræ dictæ sequens applicatum fuit,*

℞. herb. parietar. m℥ij. cærefol. m℥i℥ incisa coquantur ad consistentiam pultis, adde butyrum recens non salitum ℥j ☉ Scorpion. ℥ij, terebinth. dest. ℥i℥, M. F. cataplasma calidè applicandum pectini.

(3) *Doloribus urgentibus providè obviandum, commendo decoctum chamom. vulg. cum corticibus aurant. (quamvis sit nauseosum) addit. ad stimulantem myrrhæ & artemisia. Externe sacculi calidi imponantur, illito prius hypogastrio oleo destillato succini & juniperi.*

(4) *Virium prostrationi succurrendum, quod fit, absente febre, spirituosiss, ▽ cinamom, vino generoso, cujus odor & potus egregius ad refocillationem, Tinctura corall. cum spiritu Cornu Cervi,*

### C A S U S XXXIV.

## DE GONORRHOEA VIRULENTA CVM TUMORE TESTIS.

Juvenis veneri subinde indulgens petit consilium propter insignem cruciatum, quem patitur sub urinæ emissionē in radice penis, asserit simul continuū, paulatim licet profluere ex membro materiam tenuem flavescentem, interdum simul spissam, dolorem in glande excitantem, quæ glans rubet & tumet, simulque in confiniis ejus & præputii parva hinc inde ulcercula adsunt. Evanuerunt hæc symptomata aliquandiu, nescio quibus adhibitis, sed ecce recurrunt de novo & comitem sibi asciscunt, qui præ cæteris nunc urget, testiculi dextri tumorem, quo

quobis testicu  
pullatorio, ne  
acerbo cruetur  
tumor, & rube

### Resolut

vel cathetere  
Zus Q. h. vel  
de carabe vel  
lis prætens.  
norhææ gl  
dexter.

### Causa

priori non  
dū congressu  
satis, mulier  
si nimirum  
plorem, qui  
dum. h. abio  
Nu. tices inf  
xus & vici  
quas exulce  
nat, à qual  
præputium  
& gangran  
lymphæ cor  
plicat, & co  
feminalem  
lumbos usq  
mox infra  
branosa pe  
propagata  
to, membr  
bus reflu  
Acie  
venerea af  
pham inqu  
cium, ingu  
Affec  
grediatur.



quobis testiculum socium supererat, acerbissime dolentem, dolore tamen non pulsatorio, nec pungente, sed misere contundente & distendente, qui dolor cum acerbo cruciatu ad lumbos usque protendatur; Scrotum in isto latere & ipsa tumet, & rubet, ipsa lumborum regio fervere videtur, obnixè auxilium flagitat.

**Resolutio.** *Gonorrhœa alia benigna*, quæ non raro à masturbatione, vel cathetere male immisso excitatur, curatu difficilis. Conducuat tamè *tinctura Fris Galii, vel antiphthisca*, omni mane ad gr. 40. in vehiculo calido, & *trochisci de carabe* vesperti ad 3 β. sumenda, juxta strictam dietam; *Alia maligna*, qualis præsens. In hac laborant in genere *partes genitales*, speciatim ratione gonorrhœæ *glandula prostrata* magis vel minus exulcerata, ratione tumoris *testis* dexter.

**Causa proxima** *acidum virulentum* *Æreum*, cujus specificus sapor à priori nondum cognitus, qui ut plurimum *per contagium communicatur*, modo congressu, quando genitalia infecta & ulceribus venereis oblecta. His enim factis, mulieres admodum venereæ non inficiunt; *modo poculis, modo in lecto*, si nimirum lues venerea eò progressa, ut ulcera faucium vel genitalium saniem plorent, qui lecto vel poculis adhærens sanos inficit, non secus ac acidum viscidum si abiosum. Nec raro Parentes *Ærei* liberos simili labe infectos generant; Nuncies infantes inficiunt. *Acidum hoc virulentum* sub puris vehiculo est fixius & viscidum, atque nunc in urethram se insinuans, ad prostratas pergit, quas exulcerat, unde *dolor ab urina præterlabente* simulque lympham inquinat, à qua lymphæ corrosiva *symptomata Gonorrhœæ*. Nunc intra glandem & præputium se insinuans; *ulcuscula dolorem, ruborem*, tandem *inflammationem & gangranam* glandis introducit. Porro fermentum *Æreum*, antea vehiculo lymphæ corruptæ ex prostratis evacuati solitum, retentum, successive se multiplicat, & continuato materiæ alterabilis tractu ad testiculum pergit, & liquorem feminalem in vasis deferentibus inquinat. Hinc *tumor testiculi & dolor ad lumbos usque protensus*, cujus ratio *partim* in vasis spermaticis; *partim* in nervo mox infra renes ad testes derivato ex intercostalibus, *partim* in productione membranosa peritonæi, vasa spermatica involvente, & extra abdomen ad testes usque propagata. *Ardor renum* in gonorrhœa confirmata oritur ex acido virulento, membranosas partes circa renes rodente, cum sanguine vel lymphæ ex testibus refluxa eò delato.

*Acidum virulentum* *Æreum* intacta massa sanguinea (unde plerique lues venerea affecti admodum sunt vivaces,) potissimum succum nutritium & lympham inquinat. Hinc partes nerveas potissimum & glandulosas narium, faucium, inguinum afficit. Hinc nocuum in interioribus maxime percipitur.

Affectus in se periculo vitæ caret, solum merus est, ne in luem veneream progrediatur. Itaque

C c

Cura



**Cura** non differenda, quam in præsentia sic institui. Interius dedi *pilulas* appropriatas *Ex extracto Hellebori nigr. cum trochiscis albandal. & Qrio dulci*, quod alexipharmacum est luis venereæ. Hinc

℞ balsami *Qristerebinthinat.* ℥ij, detur quotidie bis ad guttas xij.

**Exterius.** ℞ fatin. fabar. ℥ij, pulv. semin. cumin. ℥iβ, coqu. in s. q. aquæ & aceti ad consistentiam cataplasmi. adde lythargyr. pulv. ℥j M.

Hoc cataplasma calidè tumori & scroto imponatur, cujus usu aliquot dies continuato, dolor mitigatus, & tumor imminutus fuit. Inde

℞ balsami *Qris Rulandi* ad extra ℥ij, ol. destill. cumin. ℥j, ungu. dialth. ℥i M.

Illinatur aliquoties de die calidè testibus & scroto.

Cum vero testis adhuc durus & solito paulò major esset, sequens ordinavi.

℞. Gummi ammoniaci aceto soluti, empl. de cicuta ana q. s. malaxetur c. s. q. ol. destill. tart. l. ligni guaiaci.

Inducatur super alutam, applicetur loco affecto, quo per triduum aliquoties renovato penitus disparuit tumor.

Applicassem mox in principio, nisi inflammatio obstitisset. *Empl. Vigonis de ranis cum Qrio*, in bubonibus venereis incipientibus præstantissimum, dubitavi genitalibus immediatè applicare, ob vim *Qrti genitalibus infestam*.

Quidam ad extinguendos pediculos linimento *Qrti* genitalia inungendo virilitatem amisit, sed abstinendo à litu, & substituendo oleum spicæ, brevi recuperavit.

In ulceribus penis *QPsi* cum *Saccharo Beni*, & si profundiora *Qrio dulci* pro injectione commendanda, maximè si *Qpucis* adsit.

In curanda lue *Qrea perfecta* quam produnt dolores nocturni, osteocopi, efflorescentia gummatum & pustularum in facie (1) *acidum* venereum corrigendum, (2) seu subiectum ipsius acidi dissolvendum.

Præmissa blanda evacuatione *Qrtali* per alvum ad decocta sudorifera accedendum, crebriori infessu in semicupio decoctum poterit esse sequens.

℞ rasur. ligni sancti ℥ij, corr. ejusdem ℥iβ, rasur. sassafr. ℥j,

*Qrti* viv. in petia ligat. ℔β,

*Qrti* crud. in petia ligat. ℥vj, infund. in *Q* comm. mensuris vj.

macerentur per 24. horas in BM. coqu. ad remanentiam tertiæ partis. Coletur.

Residuum decocti hujus in *Q* comm. mens. x. macera per 12. horas, coque ad consumptionem 3tiæ partis, in fine adde passul. min. contus. ℥ij. coriandr. contus. ℥j. cinamom. ℥ij. colatura detur s. *Ordinarte. Franc.*

De decocto bardana in lue venerea vide *Riverii observ. & Simon Pauli quadrip. botan. p. 363.* de priori decocto sudorifero capiat bonum haustum mane ca-







comedit, quia & cessante paroxysmo subinde potum & alimenta postulat. In paroxysmo balsamo odorato ad nares admoto sensuum internorum & externorum functiones redeunt, miro istarum partium motu adhuc affligente, simul verò ac remouetur balsamum, istarum sensuum functiones iterum cessant. Ingruente paroxysmo, semper motum præuium in hypochondrio sinistro percipit, quo ad anteriora præcordiorum accedente, præterea subito ingruunt symptomata, ipsa quid secum fiat, nescit.

*Resolutio.* Est *Epilepsia habitualis* ad differentiam symptomaticæ, qualis variolis, partu ientibus, febribus malignis &c. accedit. *Subiectum radiationis seu fomes morbosus* quærendus in *hypochondrio sinistro*, speciatim in *liene*, qui affectus ratione nervorum, reliquum systema nervosum conuellit, ob communionem cum stomacho & aliis visceribus per plexum mesentericum lateris sinistri.

*Lienem* verò potissimum affici persuadet (1) situs doloris ante paroxysmum & connexio lienis cum stomacho. (2) Animi pathemata, potissimum tristitia, quæ sola splenis vitia, difficulter curabilia, cum sensu doloris non rarò infert. (3.) Ratio doloris, qui obscurus, cum contra dolores colici sint punctorii & lancinantes.

*Subiectum primarium fibra nervorum motrices*, quæ sunt subiectum morbi. *Subiectum* verò *causæ*, *lien*.

*Causa primaria materialis* est *acidum* in primis viis genitum, inquinans fermentum lienis, & vellicans partes nerveas.

*Remota cruditates.* *Efficiens proxima impetus spirituum animarum*; *Remota vellicatio partium nervosarum.*

*Nota* in *Epilepsia habituali*, quamdiu appetitus constat, vel intenditur, tamdiu incrementum morbus, & difficulter curatur, quando verò absque grauioribus symptomatibus imminuitur, remittit morbus.

*Epilepsia habitualis* transit ut plurimum in *melancholiam*, quæ tandem abit in *maniam*, quam excipit *saturnitas*. Supervenientibus menstruis non rarò solvitur. Ea verò citra remedium usum an sint ventura incertum, unde maturè Medicus iis provocandis sit intentus.

*Cura* sequenti ordine suscipienda. Ut (1.) *Acidum* Nervos vellicans corrigatur fixis & absorbentibus potissimum *Styralibus*, quibus *volatilia* subungi poterunt. (2.) *Correlum* evacuetur per vomitum, aliquoties pro re nata repetitum, potissimum ex antimonio & quidem dosi majori. (3.) *Lienis vitium*

tunc

tunc internis  
volatilibus  
rigatur.  
plicata dosi  
(4.) Quod  
quidem cal  
commendat  
3ß. ad 3j  
paroxysmo  
vomitorio  
recurrere  
roledet dr  
tineta. Ju  
lissi præter  
diis frustra

pulvis, cuj  
Pro cephal  
applicato  
idiopathic  
ta. (5.) E  
quam mi  
& prævi  
specificis  
rum præ  
nantes, eo

In pa

Vir  
cum soc  
pallidus,  
tamen, &  
bem rev  
buisse, t



tunc internis resolutivis & absorbentibus, potissimum *salibus*, hinc *freis* & *volatilibus*, tum externis itidem resolutivis & penetrantibus appropriatis *corrigatur*. Præ omnibus commodè *Empl. deranis vigonis cum Mercurio*, duplicata *dosi Mercurii* in robustioribus, lieni impositum, sive tumeat sive non. (4.) Quod restat *fomitibus Epileptici*, specificis *deleatur*. Inter quæ, in præsentī quidem casu, quando per consensum partis alicujus affligit Epilepsia, præ aliis commendo *viscos*, speciatim *corylinum*, *quercinum*, *tiliaceum*, in magna *dosi* à ʒß. ad ʒj. in forma pulveris continuato usu. Virgo rustica ab octavo anno paroxysmo Epileptico correpta quotidie, fluentibus ritè mensibus, præmissio vomitorio, usu hujus pulveris repetito rariores paroxysmos, quos si recurrere percipiebat, sumebat hunc pulverem (*damit sühlete sie / wie wann es wieder druckere*) Hujus usu per tres menses sanata fuit, postea febre maligna extincta. Juxta hunc pulverem commendo *stercus pavonis*, ex quo, consilio Willicii præscripto, *verriginem contumacissimam*, aliis etiam generosissimis remediis frustra tentatis, curavi.

ʒ. Stercoris pavonis ʒij. rad. pæon. mar. ʒj. caryophyl. ʒiij. M. F. pulvis, cujus largam dosin, manè & à meridie capiat. Pro *cephalalgia*, quæ simul affligebat, verticem rasum oleo dest. *succini inunxi*, applicato desuper *Emplastro Vigonis de ranis cum Mercurio*, *cinnabarina* in idiopathica magis & sympathica Epilepsia conducunt, *salibus volatil.* combinata. (5.) Efferus *Spirituum motus compescatur anodynus*, tam vegetabilibus quam mineralibus. De *opiatīs* sequens notetur cautio, si paroxysmi periodicè & præviis certis symptomatibus recurrant, commodè instante paroxysmo, cum specificis possunt exhiberi: sin verò vagò & absque speciali symptomatum certorum prænuntio ingruat, tutius omittantur, ne ægritales ad melancholiam incli- nantes, eorum usu stupidi magis reddantur;

In paroxysmo *salia volatilia*. *Clysteres acriores*, de quibus Practici.

## CASUS XXXVI.

## DE APOPLEXIA.

Vir septuagenarius, aliàs sanus, sed inordinatæ diætæ assuetus, aliquando cum sociis extra urbis portas ambulans subitò corruit, sine sensu & motu, totus pallidus, ab adstantibus denuò excitatus, quid secum actum nescit, debilitatus tamen, & ob anhelitus difficultatem aliquando desidere coactus, denuò intra urbem revertitur. Interjectis aliquot septimanis, cum interea commodè se habuisset, templum petens simili ratione ex improvviso corruit, sed balsamo apople-



Etico relictus domum lento gradu repetit. Aliquoties hoc accidit, donec in-  
gravescente malo, extra parietes vix liceat egredi, quin ex levi corporis motu mox  
omnimoda anhelitus interceptione & simultanea caligine oculorum affectus,  
forti impetu non tam corrui, quam prostrernitur, sensu & motu carens. Ali-  
quando similiter prostratus naso mensæ alliso mediam ejus osseam substantiam  
sine perceptione dolorosa perfringit. Hinc consuluit Medicum.

**Resolutio.** Est *Apoplexia levis Idiopathica* & essentialis conju-  
cta cum fori *syncope*, qui affectus ferè temper videntur conjuncti. Repenti-  
na spirituum vitalium obnubilatio *syncope*, animalium *apoplexiam* inducit,  
*Principium mali* interceptus cordis motus & circulatio inhibita videtur esse,  
hinc spirituum vitalium & consequenter etiam animalium præpeditus influxus.  
Probatum id ipsum, quia ingruente malo respiratio anhelosa, cordis angustia,  
*exolupta* urgeant.

Motus verò cordis, sanguinis & spirituum intercipitur, denegatis spiritibus cor  
moventibus. Itaque

**Subiectum primarium** est *Cerebellum*, spiritus pro motu cordis non  
transmittens, qui *influxus spirituum animalium denegatus* hoc loco videtur esse

**Causa proxima** tum *syncope*, tum consequenter *apoplexiæ*.

Jam olim *Piso* mentionem fecit *syncope* ex nervo cordis affecto. *Syncope*  
*cardiaca* cum *Apoplexia* plurimis convenit.

**Causa verò remota** spirituum è cerebello irradiationem impediens  
hoc loco videtur *imperscrutabilis*, potest esse suspicio sanguinis, lymphæ,  
cerebellum inundantis, sed obstat paroxysmi brevitās. Itaque videtur aliquid  
*vaporosum*, afflatu cerebellum lædens, & quasi convellens. Motu excitatur  
paroxysmus, quatenus sanguis & spiritus concitantur.

**Prognosis** periculosus est status, & metuendum, ne vel ex improvviso ju-  
guletur, vel in *paralysin* alterius lateris transeat.

**Cura.** Cum tempore hyemali de præservatione potissimum esset sollicitus,  
ordinavi *spir. salis armoniaci* & *C.C. essentificatum ana ʒʒ.* de quo capiat quo-  
tidie bis guttas 30. ad 40. Item

℞. ol. succini ʒj. caryoph. macis ana ʒj. M. subige cum ol. nucis mo-  
schatæ ad consistentiam ballami, quo mane & vespere tempora, vertex & nucha  
cum regione stomachi inungatur. His rariores & mitiores fuerunt paroxysmi.  
Vere, præmisso digestivo, purgavi Extr. panchymagogo Crollii, Mercurio dul-  
ci, & ad præservationem ordinavi.

℞. ficuum pingue, min. incis. num. 4. sem. sinapi contus. ʒj. cardamom.  
pulveris, ʒij. c. s. q. syrup. fl. tunic. & spir. lill. convallium fiat electua-  
rium



*Casus XXXVII. Delirium Melancholicum Hypochondriacum.* 207

rium. de quo omni mane capiat quantitatem nucis juglandis jejuno stomacho, torbendo desuper jusculum calidum.

*Externè* cum usu prædicti balsami sequens *Empl.* capiti applicandum.

℥. *Empl.* de ranis Vigonis cum Mercurio, malaxetur c. f. q. balsami Peruv. cum vitello ovor. solut. induc super alutam.

Horum usu benè se habet hæctenus, ut spes sit imminens malum præverti posse.

Si æger fuisset habilior, fonticulum brachiis inulsißem, vel vesicatorium nu chæ aut pone aures admovissim.

In paroxysmo præter externa *volatilia*, naribus admovenda, *frictiones* linguæ & palati; si vox amissa, etiam laryngis. (scilicet *frictiones*) conveniunt. *Spirituosa volatilia* cochleari blandè instillanda, *clysm*a fortius applicandum: species residuæ abdomini supersternendæ.

His nihil proficientibus ad *ßernutationem* accedendum. *Vomitorium* in declinatione paroxysmi fortius, non est de nihilo, nisi suffocatio immineat.

Paroxysmo declinante vel finito, *sudor* imperandus *spirituosus & volatilibus*, addi possunt *anrum diaphoreticum Poterii*, & *8 nii.* ut febris, sic apoplexia, non sine sudore tuto curatur. Vehiculum pro sudorifero potest esse sequens.

℥. aq. salivæ ʒij. lill. convall. cum vino ʒj. spir. cerafor. nigror. ʒvj. syr. rup. beton. ʒijj. M. F. potio.

℥ cum *semine sinapi & aq. simpl. destillata* dat spiritum volatilem urinofum, crasin sinapis referentem egregium in soporosis affectibus.

C A S U S XXXVII.

DELIRIUM MELANCHOLICUM  
HYPOCHONDRIACUM.

Mulier mediæ ætatis, aliàs sana & fœcunda, ordinarîâ periodo menstrua fundens, ab aliquot mensibus recurrente subinde palpitatione cordis affligi cœpit, enata sine causa manifesta. Tristior quoque præter consuetudinem, anxia subinde & suspiciosa, nescia ob quam causam evadit, solitudinem amat, confortium aliarum fugit, pressius examinata de capite non nihil conqueritur quasi obnubilato, ita ut sibi quasi semiebria videatur [*das Haupt sey so dunnfärlisch und wie dumm*] somnus deficit, aut dormire saltem incipiens, ex tetrîs insomniis, subito cum terrore expergiscitur. Appetitus mediocris, interdum nullus, sitis nulla, alvus clausa, murmura & rugitus pererrant abdomen, Pulsus vehementes, rardi, rari, magnitudine moderati, subinde inæquales observantur. Aliquan-



do præter morem hilarior evadit, ridet, & ancillam suam ei melius donat, objugata obid à marito, mirè contristatur, lachrymatur acerbè, ut vix persuasionibus quibusvis luctus sisti queat. Hinc melius habet, sed nocte & die nonnihil exasperatur affectus.

*Resolutio.* Est *delirium melancholicum hypochondriacum* in confirmato namque etiam splen afficitur, quod patet ex tumore ejus, dolore, duritie & pulsatione.

*Subjectum* patiens & simul *causa proxima* sunt *spiritus*.

*Temperamentorum diversitas unde?* Temperamentum corporis & sanguinis, atque adeò mores hominum à spirituum constitutione dependent, pro diversitate texturæ sanguinis & multiplici inde habitudine spirituum oritur diversitas temperamentorum. Quorum sanguis & reliqui succi sale volatili oleoso uberiùs turgent, *cholericæ seu biliosi* dicuntur, & ratione taliter constitutorum spirituum agiles, activi, inconstantes, vagabundi esse solent, quorum sanguis contra & reliqui succi de sale prædicto minus participant, sed densiores, rigidiores, magis aciduli & minus resolubiles existunt, *melancholici* dicuntur, & ratione spirituum & fibrillarum cerebri duriorum & rigidatum, tardi obstinati sunt.

Quorum sanguis temperatus, volatilis, dulcis & oleosus est *sanguinei* dicuntur, suntque carnioti, jucundi, ingeniosi, &c. quorum sanguis magis temperatus ab uberiore chylo dulci & probè digesto, *phlegmatici*, obesi, sed ob molliorem fibrarum cerebri constitutionem, tardioris ingenii sunt. Si chylus aquosior & lymphæ abundantior sero, sic uno verbo: Tot sunt temperamentorum varietates, quot individuorum.

*Palpitatio cordis* oritur vel immediatè ab acido cor vellicante, vel ipse sanguis ad grumositatem disponitur, hinc faciliè irretitur intra valvulas cordis, quò factò, convulsivè moventur cordis muscoli.

*Pulsus inæqualis* melancholicis tam extra & absque palpitatione cordis frequens, nec admodum formidandus.

*Dolor capitis* fit ex hypochondriis, ob consensum generis nervosi. Hinc illico alvo soluta nova serenitas. Qui resinas acres purgantes sumunt, de dolore circa frontem conqueruntur, dum adhuc stomacho adhærent, Melancholici ut plurimum *obstinati* circa objectum, quod fit ob fibrillas cerebri rigidiores, duriores, minusque flexiles, hinc spiritus intra semel concepto obstinatè pergunt.

*Prognosis.* Malum in annosis, & ex gravianimi pathemate profectum, difficillimum est curatu.

*Cura.* Pro cura inter evacuantia universalia excellunt *vomitiva*, in dupla dosi vel iß, crebrius exhibita. Quo magis deliri & morosi, eo magis conducunt

cunt emetica,  
cato. Inter  
passulata, rari  
acidum in vili  
Quintura co  
Oli etis ana  
evadit corpori

Coralli

aperta, quo  
lentas sibi m

Ar

Hinc exhib  
bibebat, H  
tem vero.

Et laco

Post c

Plato, egr  
& à meridi  
bus. Alvi

D

Mulier fl  
terosi, conq  
quot ab hin  
cerans infi  
simul calor  
corporis co  
crassæ, tur  
tormina &  
alterum cr  
nè pessimè  
nus tumida  
est anxia, lu



cunt emetica, præmissis alterantibus salinis, v. g.  $\Theta$  hypochondr. vel arcano duplicato. Inter cathartica præstant blandè laxantia & abstergentia v. gr. decocta passulata, tartarus Solatus cum leni stimulo, Syrus dulcis magis convenit, ubi acidum in viscido hæret, universalibus præmissis ad  $\Theta$ lialia accedendum, v. gr.  $\Theta$ unctura cum succo pomorum dosis cochlear unum, item.  $\mathcal{L}$  Cremoris tartari &  $\Theta$ li  $\Theta$ rtisana, solve in  $\nabla$  fervida, coque ad mellaginem, quod rob in loco frigido evadit corpus  $\Theta$  linum flavescens dosis  $\mathcal{D}$ j ad  $\mathcal{Z}\mathcal{B}$

Corallia à Paracelso ad deliria commendantur. *Alvus* diligenter servanda aperta, quo alvus fluidior, eo minus capite laborant. Melancholicum, qui violentas sibi manus intulerat, curavi sequi.

$\mathcal{L}$  arcani duplicat.  $\mathcal{Z}$ ij, corall. rubr. præp.  $\mathcal{Z}$ j. camphor.  $\mathcal{Z}\mathcal{B}$  M. pro 6. dosibus, quotidie binæ capiantur mane & vespere.

Hinc exhibui Syrupi emetici  $\mathcal{Z}$ vj cum levamine, sed manebat anxius, multum bibebat. Hinc omni mane dedi liquorem  $\Theta$ rtis solarem gutt. 20. ad 30. sub noctem vero.

$\mathcal{R}$  sacchari  $\mathcal{H}$ ni  $\mathcal{D}$ j, laud. opiat. gr. ij, camphor. gr. iij. M. pro dosi sub introitum lecti.

Post tres dies repetii vomitorium, empl. gr. ex pro emetico cum tartaro Solato, egregio cum levamine, post continuavit mane liquor. Solarem  $\Theta$ lem, & à meridie  $\mathcal{L}$  arcani duplicat.  $\mathcal{Z}$ ij, Sacchari  $\mathcal{H}$ ni  $\mathcal{D}$ ij, camph. gr. xv. pro 8. dosibus. *Alvus* semper servata aperta, sic continuando fuit restitutus.

C A S U S XXXVIII.

DE ARTHRITIDE VAGA SCORBUTICA.

Mulier floridæ ætatis, corpulenta, succi plena, gulosa, temperamenti sanguineo serosi, conqueritur de sanitudine omnium artuum nonnihil lancinante, quam aliquot ab hinc diebus insequitur tumor cruris dextri, item circa genu dolens & lacerans insigniter, concolor tamen partibus vicinis, motum cruris inhibens. Adest simul calor totius p. n. Moderat<sup>9</sup> tamen & ut vocant vaporosus, una cum ardore corporis continuo, pulsuque magno, celeri, frequenti, molli quasi undoso. Urinæ crassæ, turbidæ cum sedimento lateritio, sequenti die anxietates superveniunt, tormina & tumultus abdominis, respirationis difficultates, eadem vespere & alterum crus simili modo similibus in locis cruciari incipit. Nox inquieta, manè pessimè habet, in brachio sinistro vagè seu variis in locis torqueri incipit, manus tumida admodum, digiti inflati, immobiles sine alia sensibili alteratione. Aegra est anxiosa, subinde animo defieit, caput admodum dolet, ipsa sudore calido ma-

D d

der,



det, nullo modo se movere valet, quia quolibet tantillo licet motu dolores exacerbantur, Appetitus nullus, alvus clausa, sitis intensa, Anxia, levamen ex Medicis querit.

*Resolutio.* Est arthridis vaga, scorbutica ad arthritidem fixam apparenter inclinans, quia articulos speciatim occupat;

*Subjectum radicationis massa sanguinea. Inhaesionis Articuli.*

*Causa proxima,* Acidum nervis inimicissimum, mediante lymphæ & sanguine serosiore ad loca nervea circa articulos advectum, ibidemque rodendo dolorem, cum nutrimento partis proprio effervescendo, vel etiam fibras stringendo; hinc angustatis vasis & poris stagnationem cauſando, tumorem producit, eumque vel frigidum œdematosum partibus vicinis concolorem, (die kalte Gicht) quando acidum est mitius, in specie in subjecto magis succulento, vel calidum rubieundum (die hitzige Gicht) quando acidum est acrius & volatilius. Ille minus dolet, sed tardius curatur, hic magis dolet, sed ritè tractatus, citius cessat.

Omnem morbum arthriticum seu fixum, seu vagum, ordinariò præcedunt & concomitant pathemata quædam, circa primas vias, unde si sine causa manifesta appetitus cesset, sudore suppresso, certus sit de paroxysmo instante.

(2.) Comitatur febricula plus minus intensa, à principio morbi usque ad statum, quæ nunc intermittentes æmulat, nunc continuæ catarrhali similis, omni vespere exacerbatur.

*Arthritis vaga* scorbuto propria, si confirmata tandem fixa evadit, & quo fixior est, eò facilius irritatur & difficilius curatur.

*Fixa* etiam non sine scorbuto in principio plus minus vaga observatur. *Nodosa* ubi Synovia in corpus calciforme coagulatur, & hereditaria est incurabilis.

*Prognosis.* Præseus vaga est absque periculo, si ritè tractetur, sin minus, metus ne contracturam inferat.

*Cura.* Præmissa itaque si opus fuerit, vena sectione, item clysmate, quæ hoc in casu valde proficua, addito ℞, ol. terebinth. & si visum fuerit laxativo ex tartaro ☉-lato cum scammonio ꝑrato & trochiscis alhandal.

*In paroxysmo.* I. Succorum in primis viis effervescencia, indeque natus impetus febrilis, precipitantibus appropriatis, cum diaphoreticis compescatur, v. gr. pulv. ex arcano duplicato, ☿io diaphoretico, ☿ nativa, &c. quæ continentur tamdiu, quamdiu symptomata febrilia adsunt.

(2.) Symptomata circa præcordia appropriatis volatilibus tollenda, v. gr. Spir.



*Spir. \*ci cum lumbricis terrestribus* item *Spiritus tartari, cochlearia, cum clyffs miner. usu. volatilia* non usurpentur, nisi præmissis fixis, acidum scorbuticum abforbentibus.

(3) *Dolores leniantur & tumores artuum resolvantur & discutiantur tam internis quam externis, moderatè anodynis; Spirituosa* externè bona quidem sunt, sed non omnes æquè ferunt, quoniam non rarò acidum quietum in motum concitando, paroxysmum vel revocant vel exasperant. Magis conducunt *paregorica blanda & lumbricalia.*

*Extra paroxysmum*, declinante sic paroxysmo, propinandum *decoctum Strobilorum pini* cum ana cerevis, &  $\nabla$  communis additis sub finem passulis, pro dyscrasia scorbutica emendanda, artubus quoque novo balsamo inungendis, àquè Sale scorbutico præmuniendis.

Ad recidivam præcavendam *Cura lactea* ad tempus continuanda. *Nota* lac usurpandum. (1) Non nisi universalibus & specificis præmissis. (2) *Extra paroxysmum*, quando corpus apparenter in statu sano est. (3) *Primis viis* mundatis. (4) *Stomacho adhuc calido.* (5) *instillatis aliquot guttis Spir. \*ci vel antiscorbutici.* Hinc singulis mensibus *pillula aloetica Glassiana* ex substantia aloes mucilaginosâ, separatâ resinotâ usurpandæ ante cœnam, *extracto hellebori* specificatæ, vel si succi viscidiores adsint *Gummi ammoniaco* exaltatæ vide *Ludovicum de vol. 7ri.*

Tandem *diuresis* non negligenda. Copiosior urinæ fluxus & largior sudatio, imprimis mane, præservativa podagricorum.

Ad arthriticam nostram vocatus, cum esset gulosa, eusarca, *vena sectionem* institui in brachio, cui alias erat adueta, idque cum levamine.

Quæmissa propter symptomata præcordiorum præscripsi *clyisma emolliens cum e le tartari.* sequenti die

$\mathcal{R}$ . arcani duplicati,

$\mathcal{E}$  nii diaphoretici ana  $\mathcal{D}$ j,

laud. opiar. fermentat. gr. ij. M.

pro quibus dosibus.

Hinc sudor copiosius erupit, cumque antea saltem crura dolore & tumore affecta essent, nunc brachia quoque tumere & dolere incipiunt. Continuavi hunc pulverem cum *decocto strobilorum pini cum passulis.* Superveniebant insignes *passiones hysterice* hinc ordinavi *clyisma,*

$\mathcal{R}$ . Spec. pro decoct. carminativ. Myns.  $\Theta$  7ri  $\mathcal{Z}$ j coqu. in  $\nabla$  communi colaturæ  $\mathcal{R}$   $\mathcal{Z}$ ix adde electuar. de baccis lauri  $\mathcal{Z}$ j. ol. destill. succini  $\mathcal{D}$ ss, vitell. ovorum no. j. M. applicatum fuit cum levamine.

Interne



*Internè* omni bihorio accepit guttas 30. *liquoris C. C. succinati*, quorum usu passio hysterica evanuit. Hinc pulveres modo laudatos usurpare jussi, sed ne nauseam excitarent, decoctum strobilorum omisi, & saltem in potu ordinatio, cui *Spiritus cochlearia* instillatus usurpare jussi, item loco prioris sequentem ordinavi.

℞. ℞ nii diaphoretici. arcani duplicat. ana ℞j.

℞ ℞ nii gr. xv. M. pro duabus dosibus, expectando blandum sudorem.

Pro anxietate præcordiorum & lipothymia usurpavi *Spiritus Carminativum de tribus cum Spiritu cochlearia mixtum*, dos. gutt. 30. bis, ter in die, & statim levamen circa præcordia percepit.

*Externè* locis tumentibus imposuit *lumbricos vivos*, donec moriebantur, sensibili cum levamine.

*In fine morbi* usurpavit crebrò *Spiritus \*ci* & sic convaleuit.

Superiori anno cum recidivaret malum post *vena sectionem*, præmissa blanda laxatione, accessum feci ad *Spir. \*ci* quia aberat febris. *Externè* jussi usurpare *Spir. \*ci cum Ψ parat. mistum cum ∇ articulari*. Sed nihil proderat, potius augebat malum. Hinc

℞. Gummi Tacahamac. ℞β, Empl. diaphoret. Myns. ℞j, malaxetur s. q. olei tartari destillati. induc. super linteam applica articulis circa genu, manus, quod dolorem levabat.

F I N I S.







## I. N. J.

*Valetudinarium Infantile.*

**S**I quis alius, certè ingeniosus per Ignem Philosophus & Medicus *Helmont*, de tenera *Infantum Valetudine* est sollicitus, dum nutritionem eorum non solum ad *Vitam sanam*, quin potius ad *Vitam longam* novâ paradoxâque ratione instituendam docet. Meritò sanè. Siquidem mutabilis ista & instabilis *Vitæ nostræ* conditio, utut communis sit omnibus hominibus, inprimis tamen infantibus propria magis esse videtur, quatenus sub tenerâ eorum constitutione, minusque validâ viscerum structurâ, & fermentorum (speciatim istius, quod primæ ceu fundamentalis inservit digestionis) nondum sufficienter exaltato vigore, quoscunque sub nutritione commissos errores graviter luunt, indeque fœcunda morborum suscipiunt semina, quæ per totum subinde *Vitæ* cursum perniciosos fructus progerminare solent. Ut ut enim sub pubertatis tempore, generalis vigor, fermenti ad instar singularis, sanguineæ masse inspiratus, spirituosior in sanguine excitans fermentationem, & fermenta viscerum reliqua exaltans, contractas sub nutritione infantili labes subindè auspiciato corrigat, & quasi abstergat, ob id namque secundum *Hippocr. s. s. aph. 7. Epilepsia quibus ante pubertatem contingit, mutationem recipit*: confer. *Celsus l. 3 c. 24.* Nihilominus hæc ipsa superveniens alteratio, ad *Vitam sanam* suo modo conferens ad *longam* tamen reddendam hanc ipsam, inefficax & languida planè deprehenditur. Determinatur namque universaliter *Vita longa* aut *brevis*, sanaque aut ægra primariò pro *indole seminis parentum*, & hinc secundum *alimentorum & climatum bonitates*; Ita ut ipse inevitabilis *Vitæ terminus*, divinitus pariter ac naturaliter præfixus videatur, qui ex radicali vitæ seminalique primordio secundum causarum naturalium inviolabilem legem, quibusdam brevius imminet, ab aliis longius



V. eleg E-  
pist. de se-  
cretis ope-  
ribus artis  
& Naturæ,  
in Naturæ  
miraculis  
expertissi-  
mi Ade-  
ptorum  
Rog. Ba-  
conis, c. 7.

longius abest, quousque scilicet primordiales in semine radicatae potestates vitales se extendunt, quem amplificare mediis hactenus quidem cognitis & usitatis *impossibile*, attingere, legitimo causarum effectuumque regimine *proclive*, prævenire ex perverso earundem usu, *facile* possumus. Huc namque alimentorum & climatum inprimis facit bonitas malitiaque, atterens per morbosos affectus robur potestatum Vitalium, easque plus minus enervans adeoque & brevius & ærumnosius reddens Vitæ curriculum. Horum insultus refrænare quidem non nihil valent regulæ diæteticae, & rerum non naturalium rigorosum regimen: sed ad istum vitæ terminum vix exactè sanam conservabunt vitam, nedum ut fines ejus ulterius queant extendere: adeò ut frustra sic Claud. *Deodatus*, dum in suo *Pantheo Hygeast.* ad 120. annos per diætetica media salubriter Vitam producendi rationem docere nititur. Longè alia enim pro Vita longâ indaganda sunt remedia, talia scilicet, quæ vitæ radicem ex seminali primordio oriundam, in sanguine ceu parte primigenia explicatam, & in specie in parte ejus Sulphureâ ceu principio activo, h. e. ut aliâs explicant, in calido nativo & humido radicali fundatam attingant, eam quantum possibile sarram rectamque partim conservent, partim balsamicâ quadam virtute ob omni alteratione destructivâ præservent, adeòque primis nostris constitutivis, ut loquitur *Helmont. Tr. arbor Vita* assimilari vel adjungi queant. Quæ inprimis ex Vegetabili regno, ceu medio inter animalia, & ipsa in radice breviter caduca, & mineralia ceu nobis incompatibilia propriè investiganda docet præfatus *Natura Consultus*, & *excedri* in corruptibili ligno haurienda monet, cui alii balsamicam *juniperi* fruticem, *Therebinthum* alii substituunt. Sed quàm pauci hic desideratam obtinere possunt Phyllidem, cum & ipse *Arcanorum Monarcha Paracelsus* cespitalle in hoc puncto graviter non paucis videatur. Si ergò ad vitam longam pertingere non æque liceat quibusvis, saltem sanam hanc ipsam pro viribus conservare annitmur. Cum verò causas inter, propter quas tam brevi termino circumscribitur nostra vivendi ætas, simulque tot morborum ærumnis continuo comitata decurrit, vix graviore inveniantur, ut ex supra dictis vel spontè patefcit, quam *Parentum plus minus morbosorum character hereditarius*, & hinc *perversa puerorum nutritio*, ita ut hæc posterior unicus ferè sit fons, ex quo tantum non omnes infantiles morbosæ ærumnæ largiter scaturiunt, ac subinde toto vitæ cursu pertinaciter ægros affligunt, ob id

affe-

affectuum i  
sas, & cur  
delineare el  
assistere vel

Histon

§. 1. S

ut collecti  
nutriment  
nutricis en  
tur, eoqu  
post partu  
menses se  
folis circu  
annuo spa  
ultimis me  
soleat, dor  
ablactetur

§. 2.

fociare sol  
sæpius si a  
ut plurim  
quas nutr  
propriâ c  
sub finem  
& ita fac

§.

nobnoxii  
statim de  
dant ob e  
norum to



affectuum infantilium ex erroneâ nutritione enascentium & causas, & curandi pariter ac præcavendi rationes præviter hac vice delineare est animus, cui cœpto *Divinus Archiater*, clementer assistere velit.

C A P. I.

*Historiam Nutritionis infantum morborumque eorum tunc temporis frequentium recenset.*

§. 1. Simul atque in lucem editus est fœtus humanus, ligatoque Nutritio fœtus cum Lacte.  
 funiculo umbilicali probè ablatus, lecto reconditur, ut collectis in utero materno incrementis excretis, aptior fiat pro nutrimento Lactis ex mammis vel maternis, vel ad id conductæ nutricis emulgendo. Quo ipso loco potus ut plurimum sustentatur, eoque ob id frequentius propinato, adeò ut teneriores primis post partum mensibus, subinde omnibus bihoriis, post 3. vel 4. menses sexies aut septies postmodum bis rervè sub unoquoque solis circuitu lactetur. Hoc lactis Potu sustentatur ut plurimum annuo spatio, à quibusdam etiam biennio, rarius triennio, ut ut ultimis mensibus etiam potui locis patriis usitato sensim assuesieri soleat, donec perfectè à lactis usu removeatur, adeoque ut dicunt ablactetur.

§. 2. Cum hoc lactis liquido, & quasi Potulento nutrimento Et cum pulce.  
 sociare solent esculentas pultes, bis quotidie ad minimum, etiam sæpius si adolecant magis magisque easdem propinando, ex farinâ ut plurimum triticeâ aut secalinâ puriore, & lacte vel aquâ paratas, quas nutrices quædam prius in os proprium ingerunt, cum salvâ propriâ colliquefaciunt, postmodum in infantum buccas intrudunt, sub finem mammam præbendo, ut super ventu Lactis diluatur probè, & ita facilius ut sperant concoquatur.

§. 3. Sub hoc nutritionis cursu, frequentissimis tenelli Morbi in-  
 nobnoxii sunt ægritudinibus, quæ & ipsæ post ablactationem non tantum  
 statim definunt, quin interdum factâ ablactatione demum se pro- præcipui.  
 dant ob errores circa nutritionem commissos. Primitus intesti-  
 norum tormina frequentissimè cruciant illos cum quibus excreta



alvi à consuetâ flavedine subinde defleunt & obscuriori Colore subinde vitidi omninò, porraceam vocant Practicibilem, tinctæ apparent: quin & cum hoc peregrino colore (rarius sine eo) eadem ipsa non in debitâ fluida æqualiter permixta consistentiâ cernuntur, sed in parvos quasi grumulos discerpta (mulieres dicunt, *es gehet von ihnen wie gehacktes / oder wie gehackte Eyer /*) procedunt: præter quas vitiosas excretiones, & copiosior alvi fluxus seu diarrhæa non raro eos delassat. Juxta has passiones, & vigilæ pertinaces maximè necessariam junioribus somnolentiam quietem tollunt, aut interrupti pavores eandem turbant, prodromi scilicet gravioris mali Epileptici, cui vel maximè ista atas est obnoxia, sive interiores abdominis tantum convellantur partes & thoracis, (quod nostrates vocant *die Schwere Noth im Leibe*) sive externa simul concutiantur membra, Hypochondriorum præterea flatulenta intumescentiâ, tumorque præcordiorum angustat eosdem, non minus quam difficilis respiratio, tussisque perquam vel ex eo molesta, quod aut nesciant aut nequeant rejicere ea, quæ ad tussim proritant, nisi repetitus vomitus spontè natura vitiosa auspiciatò eliminet. Ut ut autem viscerum & membrorum mollis extensibilitas aptissima sit, pro uberiori augmentante nutritione; crebrò tamen exarescunt potius, aut deficiente nutrimento atrophîa laborant, aut nutriantur licet, vitio tamen hujus nutritii succi parva non rarò efflorescunt tubercula, in ulcera saniosa & cutaneas partes instar favorum in mellificio exedentia, aut tineæ instar cranii tegmina erodentia: quibus malis nec linguæ artificiosus musculus, nec palati concamerata structura carent, quin ulcusculis aphthis appellatis infestentur. Ut nihil dicam de febribus variis, in specie lentis, item de variolarum & morbillorum contagioso insultu, musteum tenellorum sanguinem non minus quam paulo adultorum magis, febrili turgescentiâ & tantum non effervescentia turbante. Supervenit tandem, & dentitio, dolorosa eadem, & pessimorum symptomatum concitatrix: non secus ac intertrigo, seu cuticulæ tenerrimæ hinc inde facta excoriatio. Ac ne malorum aliquid desit, Lumbricorum incondita turba, quibus non malis mulctat infantes? in intestinis qui hospitantur, dum Crinones seu capillares vermiculi intercutanea loca catervatim inhabitant.

Humanæ  
Vitæ miseria.

§. 4. Talis tantaque malorum strages imminet pueris, ut rectè cum *Plinio in Proem. Lib. 7. hist. natural.* dicendum sit, à  
suppli-

supplicis v  
est: aut a  
bulla in om

§. 1.

quod fect  
randem e  
etiam un  
periculun  
intrapula  
eo durare  
bile videri  
periculosa  
uteri mat  
graviter  
gido, hu  
tatio, & a  
reciproco  
totius cor  
sanè, qua  
expiratio  
Hæc ipsa  
non ad e  
sanè in r  
vel fulig  
vel hujus  
attendan  
respirati  
tamdiu  
guinis p  
hic Aeri  
sanguis i



*supplicis vitam auspicatur homo, unam tantum ob culpam, quia natus est: aut asserendum cum sapiente Solone, homo est putredo in exortu, bulla in omni vitâ, esca vermium in morte.*

C A P. II.

*Originem morborum infantilium declarat.*

§. I. **N**on absque præmeditatâ ratione miratur *Harveus de Primæ re-  
Generat. animal. Exerc. de Partu. p. m. 501. quâ fiat, spiratio  
multum  
habet in  
recessu.*  
quod fœtus non tantum ultimis gestationis mensibus in utero, sed etiam  
tandem extra uterum, dum membranis adhuc integris est opertus &  
etiamnum in aquâ sua manens, per aliquas horas circa suffocationis  
periculum superstes sit, idem tamen secundinis exutus, s. semel aerem  
intra pulmones attraxerit, postea ne momentum quidem temporis absq;  
eo durare possit, sed confestim moriatur, Ast æque si non magis mira-  
bile videri possit, quod fœtus ex tam subitanâ, adeoque adparenter  
periculosa mutatione, quam subit, simul atque ex claustris vapidis  
uteri materni in liberum apertumque irrumpit aërem, non statim  
graviter & ferè lethaliter ægrotet? quidni enim loci calidi cum fri-  
gido, humidi anxiosi que æstuarii, cum aurâ siccâ patulâque permu-  
tatio, & ab aere in pulmones primò irrumpente & inde succedente  
reciproco respirationis negotio, maxima in sanguine facta mutatio,  
totius corporis sensibilissimam inducat alterationem? Tantam  
sanè, quantam post primam hanc inspirationem, usque ad ultimam  
expirationem per totum vitæ cursum, vix perferre videtur animal.  
Hæc ipsa tamen, quam tunc suscipiunt corporis mutatio infantes,  
non ad ejus destructionem, sed perfectionem potius tendit. Plus  
sanè in recessu habet operosum respirationis negotium, quam ut  
vel fuliginum explosioni, vel sanguinis simpliciter refrigerationi,  
vel hujus saltem circulationi, vel soni formationi inserviat, modo  
attendamus mirabilem aeris naturam & effectus, simulque nexum  
respirationis cum Vitâ, ita ut quamdiu extra uterum vivimus,  
tamdiu etiam necessariò respiremus, & contra. Scilicet ad san-  
guinis perfectionem & spirituaſcentiam vitalem primariò tendit  
hic Aeris ſuctus, ita ut hujus medio attenuetur & resolvatur  
sanguis in pulmonibus, & inprimis ejusdem sulphur hoc modo.



quodammodo resolvatur & volatilifetur, quo sub aucta fermentatione in Corde cum Salibus sanguinis volatilibus coeat in Gas spirituosum volatile seu spiritus vitales, calidos & probabiliter lucidos, ac ita sanguis quasi accendatur. Quod cum ritè fiat primitus in fœtu, dum utero materno egreditur, non potest non ex debitâ perfectione sanguini tunc primitus inducta, adeoque ejus majori spirituaſcentiâ & intensiori incaleſcentiâ ex aucta ejusdem fermentatione, cum rapidiori per omnes meatus circulo & uberiori spirituum animalium proventu, indeque organorum corporis quorumcunque ad motum ſingulari niſu, fœtus quaſi noviter aut propriè animatus reddi & vita perfectâ animali dotari, qui antea in uterî materni clauſtris, ſaltem plantæ cujuſdam, aut zoophyti vitam egiſſe videtur. Occultum nempè vitæ cibum in aere contineri, ſublîmiorum naturæ ſcrutatorum communis fert ſententiâ: idque ratione Salis ſui, ut ſic dicam, mirabilis, quæcunque penetrantis, reſolventis & volatilifantis, atque univerſalis quaſi ſolventis. Unde tanta reſpirationis ad Vitam emergît neceſſitas, ut quæcunque animalia, ſimul atque ex ovis ſemel eruperint, aeris perneceſſariò victu nunquam carere poſſint, ipſis etiam infectis eodem indigentibus, non ſecus ac piſces, aquarum licet incolæ.

Quare infantes omnes non æque lac matris perferre poſſunt.

ſ. 2. Cum E. ad perfectivas potius quam deſtructivas alterationes pertineat, dicta fœtus ſingulariſſima paſſio, quam primò in mundum ingreſſu ſuſcipit, ſaltem hæc ipſa rationem videtur ſubminiſtrare probabilem, qui ſiat non rarò, quod matres quædam cacoſchymicæ, & in ſpecie noſtrates ſcorbuticæ, quos in utero feliciter geſtarunt, & optimè lacteo nutrimento aluerunt fœtus, poſtmodum factâ excluſſione citra periculum lactare ipſæ nequeant, quin potius ſi eoſdem ſanos conſervare velint, conductæ ad id nutrici committere neceſſe habeant, qui alias ſub proprio matris lacte eò nempè ex quo ipſæ partes corporis primo coaſuerunt, adeoque iſdem appropriatiſſimum ſit, continuo ploratu torminibus, non rarò quoque ſupervenientibus Epilepticis inſultibus, aliisque variis pathematicis, non levis ægritudines teſtentur, ſubindè ad mortem terminantes: quæ omnia alieno lactis ſuperveniente ſuctu, ſucceſſivè evaneſcant & non raro cum optimo infantis habitu permutantur. Solutionem hujus dubii ſubminiſtrat præſata ſanguinis & totius corporis per inſpiratum aerem alteratio, ſub qua ipſa ſanguis citatiori fermentatione turgescit, & ab inſpirato aere reſolvitur, unde ſimul morboſa ſemina, ſub nutrimento lacteo in

in utero m  
partim ſang  
dentes, ſu  
ſtomachi fe  
largæ mor  
magis, qu  
nutritur in  
ſimum ſen  
evenit atq  
ratione ad  
tentia & a  
affectus,  
ergo à ma  
tus, &  
modo ſub  
magis &  
mantur m  
tur ſanguin  
vetur ſanit  
ſpeciatim  
effloreſcer  
affligantur  
intensiori  
pitando ſe  
extrudit,  
menti veh  
& promior  
pheriam],  
ubi cum r  
cuticulæ  
noſtratis  
videtur, c  
exiſtit eff  
ſ.  
ſanguinis  
& animal  
ad motus  
fœtus rec  
adeoque



in utero matris communicata excitantur, & ceu fermenta exotica partim sanguinis Crasin vitiant, partim alios à sanguine dependentes, succos in specie lympham & bilem alterant, aut ipsum stomachi fermentum protopepticum inquinant, unde successive largæ morbosorum affectuum segetes progerminant. Idque eò magis, quo amplius simili, inquinato nempe à morbosa matre lacte nutritur infans, & ita seminibus morboris, nempe igni oleum, aptissimum se multiplicandi subjectum subministratur. Simile ferè hic eveniatque id, quod tempore verno, sub renovati quasi aeris inspiratione adultis etiam crebrius accidit, ut scil. eodem tempore latentia & antea sopita morborum semina quasi evigilent, & varios affectus, & corporis passiones, ceu tot flores protrudant. Mature ergo à mammis propriis abigant necesse est matres tales suos fœtus, & alienis in tali casu tradant, pauperculis licet mulieribus modo sub moderata diata, & laborum continuato exercito, sanæ magis & vividæ existant, ut temperato & salubri tali lacte opprimantur morbosa fermenta, inprimis salino scorbutica, & corrigantur sanguinis dyscrasie, quo constans & firma magis exinde conservetur sanitas. Ex hoc ipso etiam ratio indaganda, quare infantes, speciatim nostrates, recens nati, subinde 3. aut 4. à partu die efflorescentiâ cutis miliari purpurâ, germanis *der Gutesel* dictâ, affligantur, quatenus scil. ex respiratione factâ Massa sanguinea intensiori fermentationis gradu agitata, Salia heterogenea precipitando separat, & ceu feculentias non ritè miscibiles ex suo misto extrudit, quæ ipsa sero solatice, ceu communi nutrimenti & excrementi vehiculo imbibita, occasione balnei in recens nato instituti, & promota hac ratione liberioris perspirationis, ad corporis peripheriam, in specie glandulas intercutaneas miliares deponuntur, ubi cum rubedine, pruritu & aliquali subsequente excoriatione seu cuticulæ desquamatione pedetentium exhalant. Revera purpuræ nostratis origo, ex scorbuticâ affectione matrum originem ducere videtur, cujus productum inter alia pathemata, & purpurata hæc existit efflorescentia.

§. 3. Monitum fuit, supra §. 1. spirituaſcentia majori sanguinis ab inspirato aere promota, indeque spirituum vitalium & animalium concitatori impetu, in organis quibulvis, insignem ad motus nisum excitari. Exinde namque originem ducit, quod fœtus recens editus, non tantum artus validè moveat, & vibret, adeoque digitos variè inflectat, sed quod in specie urinam brevi post

Excreta  
infantium  
naturalia.



post per urethram emittat, crebriori vomitu cruditates stomachi ejiciat, & alvi recrementa varia protrudat. Quæ ipsa in utero nunquam naturaliter excernuntur, adeo, ut certum signum foetus in partu, ex labore & nimio conatu mortui referatur *Velschio de Agagrop. Diss. 2. p. 61. cur. 6.* si meconium seu alvi excrementum antequam foetus prodierit, emittatur: ut ut contrarium huic asserto exemplum reperiatur apud *Rulandum Thes. Curat. Empir. p. 300. s. cent. 3. c. 66.* Sternutare etiam interdum foetus recens exclusus observatur, dum ex membranâ narium irritatâ, nervis intercostalibus per consensum connexionis effectis, etiam convulsiva partium cui inferuntur sequatur commotio & concussio. Hæc ipsa tamen omnia, cum opera potius sint naturæ, quam morbosa symptomata, ob id propius ad affectus p. n. accedamus.

Capita generalia  
causarum  
morborum  
infantum.

§. 4. Causas E. generales dum evolvimus affectuum infantilium supra enarratorum p. n. duæ principales se offerunt, unde omes supra memorati affectus, primam nanciscuntur (excluso tamen semper vel vitio parentium hæreditario, vel aliunde hausto fermento contagioso) originem, nempe obstinata *retentio excernendorum*, & perversa *ingestio nutriendorum*, ibi quidem eminet fecum primarum viarum, & in specie *Meconii suppressio*, & hinc insensibilis *transpirationis oclusio*, hic vero primario se offerunt *Vitia Lactis & Errata Pultis*.

Cap. 1. re-  
tentio me-  
conii.

§. 5. Feces primarum viarum quod attinet, præter ventriculum albicante plus minus, lentaque materia refertum, pituitosa & flava, interdum variegata recrementa intestina tenuia occupant, sic uti in crassioribus excrementa duriora, crassiora & quasi picea, ex viridi nigrescentia, papaverculum seu meconium quibusdam appellata (ut ut meconii vox generaliter *Hippocrati, de Vict. acutor. s. 96. no. 9* quod primum natis exit excrementum denotet) hospitantur & omnia ex nutrimento per os sub formatione & nutritione foetus in utero, hausto, genita sunt. Hæc ipsa maturè ex corpore infantis expurganda sunt, ne retenta diutius, aut pertinacem alvi obstructionem inferant, aut lactis nutritivi distributionem impediant: aut sub distributione per intestinorum gyros, idem corrumpan, & æruginoso virore tinctum ad corruptionem disponant aut intestinis pertinaciter adhærendo & acrimonia acida rodendo, tormenta crudelia inducant. Constans sanè Practicorum est sententia, frequentissimum atrocium torminum, ut & Epilepsiæ esse fomitem, feculentiarum harum diutina minus retentio, & hinc in  
deterius

deterius cor-  
ribus super  
quisquiliaru  
vida, ordin  
ipsa feculent  
antequam a  
nistro medi  
cæteris me  
p. n. est, q  
mento foet  
ditor caset  
cipiratus:  
retinere so  
obscurum  
morâ in in  
ipsa mutat  
sunt.

§. 6.  
fantibus oc  
sit necessite  
Medicinâ  
stitutum,  
Præ cæteri  
id necesse e  
universalis  
proximi,  
effœta fecu  
tur, partu  
mistum fi  
tum corp  
nosâ obdu  
cessivè cut  
effluxus in  
in massa  
mentatio  
cutis depo  
næ simul  
sint insign  
facile acri



*Valetudinarium Infantile.*

deterius corruptio : sicut & Icterus 3. aut 4<sup>to</sup> die à partu infantibus supervenientem , imò ipsis interdum conatum ex harum quisquiliarum fonte non ineptè alii derivant. Ipsa Natura provida , ordinaria lege brevi à partu vomitu pariter & secessu hæc ipsa feculenta quantocyus ex œconomia animali proscibit , etiam antequam aliud quid moliat , præmonstrans his ipsis viam ministro medico , quid sub tardiori ejus conatu ipsi agendum sit. Præcæteris meconium melè audit , idque sub merito , acidum nempe p. n. est , quod in ejus recessu peccat. Cum enim oriatur ex nutrimento fœtus in utero quas lacteo , nil aliud esse videtur , quam cruditor caseus , à reliquâ nutritivâ substantiâ sequestratus & quasi præcipitatus : qui ipse a coram à stomacho semel conceptum plus minus retinere solet : inde quo occurrendo bili in intestinis cum eadem in obscurum ex nigro-viridescens colore coit , & pedetentim morâ in intestinorum cellulis diuturniori coagulatur firmius : quæ ipsa mutatis mutandis & reliquis recrementis accommodari possunt.

§. 6. Peruo ad insensilis transpirationis morbosam in infantibus occlusionem , cujus quanta in omni vitæ genere & statu sit necessitas pariter & quantitas , eleganter docuit *Sanctorius* in *Medicina Staticâ* , adeo ut corpus nostrum in continuo fluxu constitutum , atmosphæram certam , ubique in ambitu circumfundat. Præcæteris infantes , cum copioso sustententur nutrimento , ob id necesse est , copiose quoque transpirent , partim ut nutrimenti tam universalis seu remoti Massæ sanguineæ , quam particularis , seu proximi , hinc inde distributi puritas ab omni vel heterogeneâ vel effœta feculentiâ partibus non assimilabili facta tectaque conserve-  
tur , partim si quid feculenti sub nutritione enatum ipsis commistum fuerit , ex partibus solidis eliminetur. Jam vero infantum corpora ordinario quasi crusta aut lanugine viscidâ & glutinosa obducta esse solent , ex liquore nutritivo in quo innatant successivè cutis extimæ regioni adhærente , à qua ipsa insensilis halitus effluxus insigniter impediri solet. Retenta E. talia transpirabilia , in massa sanguinea si coacerventur hujus æquabilem turbant fermentationem , & ad febres ordinario disponunt , sin verò sub poris cutis deposita hæreant , corruptionem subeunt variam , & cum salinæ simul esse soleant profapiæ , & falso sapore , adeoque composito sint insignita , plus minus licet , (vid. *Tachenius Hippoc. Chym. p. 78.*) facile acrimoniam intensam , vel salsam simpliciter , vel , idque ut plu-

Cap. 2.  
Transpira-  
tionis oc-  
clusio.



rimum,  $\Theta$ so acidam contrahent, unde digestionem particulari seu privatâ partium sub cutaneorum turbatâ, cutanci affectus efflorescunt, alterato & corrupto ab illis retentis nutrimento earum proximo & pessumdato plus minus fermento istarum partium digestivo. Quæ ipsa eò promptius eveniunt si & ipsum transpirabile ex nutrimento minus temperato oriatur, sive propriâ culpâ tali, dum in se ipso acrius  $\Theta$ sus. aut faciliè acescibile, aut alias plus minus vitiosum extiterit, sive digestionis primæ errato vel non corrigentis nutrimentum minus adæquatum assumptum, vel ipsum acore. p. n. inquinantis, tale redditum fuerit. Quod si verò temperata magis, pinguique extiterint transpirabilia retenta, adeò ut minus, acrimoniam  $\Theta$ so acidam degenerare queant, cohibita tamen, partim propria naturâ partim tepore loci humido, in infantibus semilacteis ad putredinem ruunt, ex emergente tunc alcali destruyente acidum, quâ occasione, larga animalculorum variorum seges successivè emergere solet.

Cap. 3. Vita  
Lactis 1. alieni.

§. 7. Erat hæc excernendorum retentio, ad nutriendorum vitiosam pergo ingestionem: Ubi primario se offerunt *Lactis vitia*, quorum primum est, si fuerit *alienum*, h. e. dum non à propriâ matre tenellis porrigitur mamma, sed nutricibus hoc negotium committitur. Quod ut pateat clarius, præsuppono 1. fœtum in utero materno nutriri non solum per umbilicum, sed simul etiam per os: vid. *Dissert. Segeri de Hipp. Orthod. & Democr. Heterod. in Nutrit. fœtus it. Cl. de la Courvée, tr. de nutrit. fœtus in Utero it. Harveus de generat. Animal. Exerc. 58. it. 56. & Exerc. de humor.* 2. Nutrimentum utrobique non esse sanguinem sed lac seu chylum lacteum, cum sanguine per arterias (cum aliæ nondum repertæ sint viæ, in vaccis licet lactantibus instituta fuerit inquisitio anatomica) ad uterum delatum: vid. præter loc. cit. *Needham. tr. de format. fœt. c. 1.* 3. Lac mammarum & ipsum revera esse chylum, in mammarum glandulis secretum & ductibus particularibus exinde ad papillam delatum: vid. *Densing. de Lacte, & Charleton Exercitat. de Galaxia.* Jam verò unicuique mulieri suum proprium est lac, seu specialis lactis proprietas ac idiosyncrasia, (ut taceam Lac diversum in una mamma observatum fuisse, ab eo, quod erat in alterâ, à *Lysero*, *Observ. XI. annex. cultro suo anatomico*) oriunda ex speciali fermenti digestivi stomachalis differentia (nam hoc unaquaque specie magnam subit latitudinem) secundum quod, ut in unoquoque individuo, tam naturaliter quam p. n. constituto distin-

ctus

ctus est appo  
licet assum  
uterino mat  
consuetu lo  
soleant, Hip  
assumendo  
ludere infig  
butum ulte  
re hujus cra  
stomachi  
niens mag  
machi dig  
Instituant  
fallax tam  
&c. judic  
quæ lactis  
bosis, cum  
lacin sensib  
ctis condit  
Cibis. H  
adscititiae  
inde latran  
chylia & in  
prietates na  
minus etia  
fant. nutrit  
leni, quo  
lav. g. obl  
Deodato,  
cum lacte  
à Cervæ it  
minus faci  
se sufficiat  
nus, fortit  
vant. C  
dum morbi  
plicata] p  
Morb. inf



Etus est appetitus ita etiam distincta digestionis est ratio, eorundem licet assumtorum. Diversum ergo lac mammarium nutricis, a lacte uterino matris, in stomacho infantuli, ipsi aliàs non asueti, [cum consueta longo tempore, licet deteriora, insuetis minus molesta esse soleant, *Hippocr. s. 2. aph. 50.* indeque ob intimam symbolizationem assumendorum c fermento] non potest non subire corruptionem & lardere insigniter digestionis primæ arduum negotium, quin & distributum ulterius ad Massam sanguineam, heterogeneitate suâ turbare hujus crasin, & fermentationem Vitalem, antequam successive stomachi fermento alterato, & sanguinis crasi immutata, conveniens magisque homogenum fiat nutrimentum, cum generalis stomachi digestio præsit quibusque singularum digestionum coquinis. Instituantur licet varia lactis examina bonitatisque ejus scrutinia; fallax tamen est, quod ex consistentiâ, colore, sapore, pinguedine &c. judicare volunt Practici cum insensilia ut plurimum sint vitia, quæ lactis corrumpunt miscelam, [ut non tantum in seminibus morbosus, cum lacte transplantatis, sed in specie vitiiis moralibus per lac insensibiliter communicatis est manifestum] adeo ut revera lactis conditiones & vires metiendæ sint ex sanitate bestię, vitæ ejus & Cibis. *Helmont. tr. sextupl. digest. §. 74.* Cum verò nutrices adscititiæ sint ut plurimum pauperculæ, & quibuscunque eduliis subinde latranti respondeant stomacho, vix fieri potest quin & Caco-chyliâ & inde oriundâ caco-chymia laborent. Morbosæ hæ proprietates naturales, uti per lac communicantur à nutricibus, ita non minus etiam morales, de quo meritò conqueritur *Helmont. tr. Infant. nutrit. p. m. 523.* cum legitimo sensu verissimum sit illud *Galeni*, quod mores sequantur temperamentum corporis: sic puella v. g. observata fuit, admodum siticulosa, ex nutrice bibacula à *Vid. Reies Deodato, Valetud. p. 26.* Cum & brutales proprietates & mores cum lacte in infantem penetrant ac in vitam perseverent, ut in pueris à Cervæ item à capræ lacte nutricis observatum fuit. Sed hæc cum minus faciant ad scopum nostrum, ob id vel summis labris ea delibasse sufficiat. Quæ ipsa de lacte ex chylo elaborato explicata hactenus, fortius adhuc eos stringunt, qui ex sanguine lacte fontes derivant. Consultissimum ergo fuerit, ut matres sanæ, vel non admodum morbosæ [tali enim in casu observanda venit thes. 2. supra explicata] proprios nutriant fœtus: de quod vid. *Sennertus Tr. de Morb. infant. p. 1. c. 1. qv.*

Vid. Reies  
campum  
E-  
lys. quæst.  
47. p. 586.



An loco lactis aliud nutrimentum cerniat.

§. 8. Hæc ipsa simul ostendunt quam aliena sit à vero eodem opinio, qui consideratione facilis corruptionis lactis in infantulis, indeque natorum variorum malorum, alio potius nutrimento, quam lacte tenellos cibare & educare malunt. Adeoque vel hordeata juscula, vel ex Crepatura hordei addito vitello ovorum emulsioni similem misturam, vel juscula avenacea, vel amygdalarum emulctum lacteum succum, aliudve simile substituunt, quo etiam nutrimentum Helmontii pro pueris, *Tr. Infant. nutrit.* pertinet, ex pane tantisper cum tenui cerevisia bullito cum melle. Siquidem nec frustra, nec sine prægnanti ratione, aut ornatus saltim gratia, mammæ mulieribus & in iis mox post partum Lac, non secus ad reliquis brutis terrestribus, uti & quibusdam aquatilibus concessum fuit à Natura, quin hæc ipsa potius digito quasi intento hanc fatuum nutritionem monstraverit. Hinc aves mammis carentes earum defectu, grana deglutita & in ingluvie aliquali morâ macerata, ac ita ad fundendum citius lacteum suum nutrimentum prædisposita evomunt denuo pro meliori pullorum sustentatione. Tenerior siquidem infantum est stomachus, minusque exaltatum fermentum eorum digestivum, unde quæcunque fere ingesta, laboriosam saltem, si non & defectuosam penitus redderent digestionem, quæ facillima, & summè nutritiva erit, dum lac ceu chylus, jam ante in nutrice elaboratur ipsis suggeritur. Talis scilicet succus, ex quo & primitus machina eorum corporea constructa fuit, & ipse fœtus jam in utero sustentatus, & quem ceu jam consuetum facillimè digerere & concoquere potest. Quod si quædam ex lactis alteratione in infantibus metuenda erunt pericula, ea sanè in se, sunt facile corrigibilia, modò maturè & legitimè iisdem occurrantur. Unde & rarissima eorum observata fuerunt exempla, qui defectu nutricum feciliter adoleverint.

Vitia lactis  
2. Morbosi.

§. 9. Nam si vè nutrix sive mater sitienti satisfecerit puerrulo, nisi sana vegetaque gaudeant corporis æconomia indubitatum est, morborum semina radicesque firmissimas in eum tanquam per medium fomitem transplantari. Lithiasin per nutricem in puerum derivatam notavit *Helmont. tr. nutrit. infant. ad V. L.* Lue & ea per matres infectas puellas inquinatas binas observavi in nosocomio Patavino: nutrices habitus serosioris ad effectus catarrhales proclives reddere, quos nutriunt infantes, compertum est: Scorbuti labes multiformis per mammæ propagari in sugentem, nemini mirum, quum contagiosa ejus indoles sit notissima. Sed res ipsa cum loquatur,

loquatur, quæ  
proprio co  
nis causa, id  
rosioris & s  
mammarum  
conducens  
nari nequit  
stile & in m  
§. 10  
nello infan  
que uberio  
vel ex eo fi  
sus fœtus  
querquem  
depuratur  
id provida  
statim lac  
Colostrum  
minus stom  
stergat bla  
collecta re  
naria prob  
magis lact  
ruptio, cu  
sum. Hin  
rius purgat  
gatrici vis  
bustis, au  
mox trad  
gravatur  
retardatur  
casio subn  
liabus leth  
guedine  
Chymic, p  
quo quæ  
tam studi  
infanti  
quod etian



loquatur, quid opus ulteriori diductione? Quin etiam sana licet in proprio corpore deprehendatur nutrix, si tamen propriæ constitutionis causa, idque ex ratione peculiaris in stomacho digestionis, vel serosioris & salioris sanguinis constitutionis, vel certæ in glandulis mammarum texturæ, serosius, acrius, aut salius aliove modo minus conducens infanti Lac colligat, etiam citra lugentis noxam id propinari nequit, quin nutrimentum tale, ipsi minus appropriatum, hostile & in micum, evadat.

§. 10. Sed utut sanissima etiam si mater vel nutrix, tamen tenello infantulo ipsum lac probè excoctum, crassius, spissius, adeoque uberius nutrimenti, non æque primo statim haustu convenire, vel ex eo fit manifestum, quod in utero materno adhuc conclusus fœtus nutrimentum lacteum per os hauriat admodum subtile, per quem duplicem chorii & amni membranam probè filtratum & depuratum, quo teneriora facilius perluat abdominis viscera. Ob id provida mater natura, post partum, in salutem editi fœtus, non statim lac perfectum pinguius & spissius subministrat, sed præmittit Colostrum, h. e. serosiores tenuioresque Chylum, ut hic ipse minus stomacho faceat negotii, quin potius serositate salinâ abstergat blandè stomachi mucum, intestinorumque sub gestatione collecta recrementa expurget, ac virtute diureticâ, organa urinaria probè eluat, ut ita supervenienti successivè alimentoso magis lacti, facilitetur digestio, & impediatur facillima ejus corruptio. cum revera tale Colostrum sit alimentum medicamento- sum. Hinc istud, quod die primo secturitur ad mammas, potentius purgat, quod secundo & tertio minus, donec succedat purgatrici vis nutrix. Quam pessimè E. suis consulunt natis, qui robustis, aut obesis, aut qui jam aliquandiu lactarunt, nutricibus mox tradunt eosdem, à quorum lacte butyroso & caseoso nimis gravatur tenellus stomachus, & digestionis opus inde insigniter retardatur, ac cruditati acidæ, lactisque coagulo promptissima occasio subministratur. Illustrat hæc Epilepsiæ exemplum, aliquot filiabus lethale, ex nimia lactis, materni licet, butyrositate & pinguedine, quod recenset *Hoffmannus Tr. de usu & abus. medic. Chymic. p. 49.* Quod si verò matres nutrire intendant suos fœtus, quo quæso consilio corrigunt naturæ prudentissimos conatus, & tam studiosè emulgent, salutare hoc colostrum, quasi nocere possit infanti, quod ceu divina medicina ipsi propinandum foret. Id quod etiam contra quendam Medicum ur sit sufficienter *Veslingius.*

Vitia lactis  
3. nimis nutritivi.



obs. & Epist. 28. p. 123. & ante eum *Spigelius* in erudito scripto de formato foetu. c. 13. p. 16.

Vitia Lact.  
4. superflue  
ingesti.

§. 11. Sed tolerabile adhuc, quia facile corrigibile esset hoc erratum, nisi gravius longè, familiarissimum licet se offerret, nempe superflua & inordinata, & tantum non coacta lactis infusio, qua matres pueros suos, nimis alendo, sæpè necant, & dum lactant mactant, ut recta observat *Kerckringius spicileg. anat. obs. 40.* Dum ad quemlibet ex quacunque causa excitatum infantis ejulatum, ipsi renuenti licet, subinde de papillis in os intrudunt, ac lac sugere cogunt, priori, licet crudo adhuc, subacido & nondum concocto in stomacho hærente, unde novi superingesti necessaria congruementia, caseatio, ac utriusque in pastam acidam, viscidam, corruptio succedit: unde Pylorus indignatus vel se pertinaciter stringit, qui aliàs de seipso in pueris arcto munitur sigillo, observante hoc etiam *Laud. Kerckringio c. l.* & planè non aut difficulter saltem talia caseata transmittit, ut ulteriori morà in loco isto tepido in deterius, ac ex cruditate acidà in corruptelam putredinosam labantur, ac in liquamina putrida, flavescentia, nidorosa &c. tandem degenerent: vel graviore furore percitus idem Pylorus salutari licet effectu, per gulam omnia ista vitata remittit: vid. *Helmont. tr. Infant. Nutr.* qui Tragædiam hanc graphicè & eleganter delineavit. Præstat sanè hic peccare in defectu, quam in excessu, cum repletiones ad extremum productæ, graves esse soleant, teste *Hippocr. f. i. aph. 4.* & sicut repletio omnis, in specie panis in adultis, ita sanè lactis in renellis est pessima: hinc enim consequenter impura corpora, quò magis nutriveris eò magis læseris. *Hippocr. f. 2. aph. 10.*

Vitia lactis  
5. per malā  
diætā depravati.

§. 12. Periculosius jam urget Fatum misellos lactentes, ex perversa & sæpissimè inordinatā lactantium diætā, circa quam saltem alimentorum promiscuam ingluviem, affectuum neglectam refrigerationem, & excernendorum pariter ac retinendorum peccata considerabimus.

1. quoad as-  
sumpta.

§. 13. Sanis quidem omnia sana, modo per internam appetitus dictaturam imperentur, quod enim sibi, nutrit; adeò ut in sanis scrupulosus alimentorum delectus, reverà sit frustraneus, quin potius si appetitus circa aliquod objectum feratur intensius, inprimis consuetum, [nam in insuetis appetitus subinde medicamentum quærit] vix denegandum sit, quia fermentum digestivum potenter qualibet in sui ditionem trahit & coarctat, ut talia cum moderamine mediocritatis propinanda sint, cum sobrietas rectè cardo totius dicatur diætæ; id quod nutricibus conductitiis in

specie

specie observ  
quenter nim  
Lactantes ta  
rum erratum  
siones, & al  
ut plus minu  
manifestò er  
cteo chylo  
cus ac floru  
imò admod  
vavi à nutri  
& ipsi lacte  
lin. Cetur.  
nutricibus  
dicta, infan  
crasias infan  
quæ à nutri  
pla recenset  
Verum in spe  
lenta, etiam  
linquant, u  
infantiliu  
dum fecerun  
præmaturè  
rent, id qu  
fantes nati  
minus sint  
Cum præ  
recte assera  
de Vino,  
Chym. c. 22  
super hunc  
specie, ut  
ultimis 2. v  
tamen dosi  
tur, amicu  
quotidianu  
merito inte  
gulo ad gru



specie observandum, ut plurimum egenis, adeoque famelicis, & frequenter nimio nutrimentorum excessui primitus indulgentibus. Lactantes tamen præ cæteris tenellos respicere debent, cum leve illarum erratum, ut ut ipsis innocuum, his graves subinde inducat passionibus, & assumptorum plures proprietates in chylo persistentes, ut ut plus minus infractæ aut alteratæ, sui tamen præsentiam in lacte manifestò exerant, & anisum pro augmentando aut corrigendo lacteo chylo assumptum, sui in eo præsentiam odore testetur, non secus ac florum sambuci in lacte decoctorum insons esse solet potus, imò admodum proficius pro lactis augmento, quos tamen observavi à nutrice fortius dicto modo decoctos, & liberalius potatos, & ipsi lactenti copiosum excitasse alvi profluvium, confer *Bartholin. Cetur. 2. hist. 63. p. 338.* Nil dicam hic de purgantibus, quæ nutricibus propinata, infantes purgant, & omnia in primis propriè dicta, infantibus sunt inimicissima. Tacebo peculiare idiosyncrasias infantum, quoad certa assumpta à parentibus transplantatas, quæ à nutricibus neglecta, graviter tenellos lædunt, quam *Exempla recenset Digby de Natur. Corpor. Tr. 1. c. 38. p. m. 424. 436.* Verum in specie urgeo acida, quæ sive sint condimenta sive potulenta, etiam Vinum, [in non assuetis] sui vestigia in dulci Lacte relinquant, ut ut sensibus abscondita, postmodum tamen torminum infantium ex acido rodente auctores. Unde & cautiores matres, dum fœtum in utero inclusum gestant, acida nimia fugiunt, ne præmaturè infantes torqueant, aut fomitem Epilepticum ingenerent, id quod sæpius observavit *Celeb. Sylvius*, quod nempe infantes nati à matribus acido non adeo indulgentibus, Epilepsiæ minus sint obnoxii idque etiam adeo pluribus matribus prædixit. Cum præterea acidorum abusus ad abortum gravidæ disponere rectè asseratur à *Beckio, in Medit. & exprim. p. 214.* Quod etiam de Vino, quod nempe fœtum pellat, asserit *Hartmannus Prax. Chym. c. 228. §. 3.* Unde etiam *Joh. Ant. von der Linden* in Comment. super hunc locum, primis gestationis mensibus Vinum gravidæ, in specie, ut vocat, calidioribus prohibet, metu abortus, quibus ultimis 2. vel 3bus mensibus, Creticum aut malvaticum, in parvâ tamen dosi concedit. In quo tamen acido frequentissimè peccatur, amicum enim ac gratissimum cum sit stomacho, tantum non quotidianum ejus percipimus appetitum. Caseo itidem non immerito interdicitur nutricibus, ne hoc tanquam præmaturo coagulo ad grumescentiam p. n. jam in mammis lac disponatur. Ce-

revivis



revisia non ritè fermentata, aut fecibus turbata, ut ut robustiores in nutricibus intestinorum tunicas, minus afficiat, à fermento stomachi ferè subacta, pueris verò quod diarrhæam torminosam excitet, compertum est. Id quod similiter de fructibus horæis succulentis, facile fermentescentibus manifestum est: sicut aridiores è contrario alvum pertinacius sistunt, quod contigit in infante, cujus nutrix avidius castaneas assumerat, teste *Timao l. 5. cas. 15. p. 252.* Cautas ergò nutrices esse jubeo, in assumendorum ratione, plus minus tamen, prout nempe aut consuetudinis aut digestionis primæ vel absolutioris vel deficientis adeoque subactorum plus minus & alreratorum à fermento digestivo ingestorum in iis fert ratio.

Quoad 2. a-  
nimi pa-  
themata.

§. 14. Affectuum exorbitantiæ jam attingendæ sunt, quorum inordinatus insultus, ut generaliter spiritus animales totumque genus nervosum, & in his mediantibus massam sanguineam & reliqua corporis contenta liquida commovendo insigniter alterat, ita specialiter nutrientium depravat lac. Præ cæteris iracundia & terror nutricum nimius, nocentissimus est infantibus, & ab utroque, in specie priori Epilepticas excitari convulsiones notissimum est. Turbant sanè affectus omnes concoctionis primæ negotium, adeò ut ex tristis nuntio esurienti inopinatò allato, adeoque incusso sic terrore, statim pereat omnis appetitus, unde digestionis consequenter impedimenta, & cruditatum acidarum occasiones: qui effectus itidem, ex Iræ furore expectandi sunt, sub cujus fervore vel maximè sanguinis ebullitio & quasi febrilis effervescentia c. bilis orgasmo considerandi veniunt. Ex alterato ergò ac depravato chylo simile generabitur Lac, aut hoc genitum licet in statu peccato, sub intestinâ tamen affectuum rebellionem, & inde natâ omnium corporis contentorum à spirituum vario ac p. n. impetu, non potest non insigniter alrerari, & variè commotum ac quasi secundum minima concussum in partes secedere, & butyri ac casei ex seroso vehiculo quasi separationem p. n. pati. Vix sanè quicquam frequentius est, ac terrorem, non minus quam iram, lactis inducere coagulum, ac in mammis grumescentiam, unde tandem inflammationes, dolorosissimique abscessus, & in specie Erysipelata superveniunt: sicuti à tali lactis semicaseati suctu, mille malis infans mulctatur infans, & speciatim ad Epilepsiam ordinariò disponitur. Observavi juvenulam primiparam, quæ suum alitura infantem, pro uberiori lactis proveutu, & meliori papillarum protuberantia simul catellum subinde mammis admovebat. Evenit casu, ut graviter perterre fieri

catellum ma-  
noceret: qu-  
lus, quæ pro-  
nuit. Sed  
lites nociv-  
variis affect-  
cialiter nut-  
trimentum  
viter labef-

§. 14.  
rata, quæ  
primi hæc  
ter in salu-  
tamen, s  
primis gest-  
ordinariâ  
xempl. Sch-  
tingit excre-  
quæ langu-  
denud lan-  
Id quod it-  
T. 9. qv. 3.  
struationis  
brim, seu  
currentem  
danus in C  
lactunc ter-  
& turbetur  
tationem  
adulti cer-  
non nihil  
lædunt ur-  
teratio, s  
ad corrup-  
acquiritur  
tis observ-  
Org. Vir-  
ptem, ab i



perterre fieret puerpera, unde repente, ad se cum rediisset animus, catellum mammas exfugere permittit, ne alterato isto lacte foetus noceret: quo facto brevi post gravi Epilepsiâ corripiebatur Catellus, quæ propinatâ Theriacâ & insequente gravi sopore demum evanuit. Sed præter has sensiles coagulationis & grumescentiæ qualitates nocivas, & alias multivarias difformitates induit lac, ex tam variis affectuum fluctibus, quibus sanè non tam matres, quàm specialiter nutrices obnoxiae succumbunt, quarum singulae infantis nutrimentum lacteum morbosè disponunt, & ita foetus sanitatem graviter labefactant.

§. 15. Excretorum supersunt considerata in nutricibus errata, quæ inter menstruorum consideratio primatum obtinet. Sup- Quoad 3.  
primi hæc ipsa, ut in gravidis, ita & in lactantibus (probabili- excreta.  
ter in salutem foetus) naturæ respondet legibus, in habitioribus tamen, sanguine turgescentiore præditis viraginibus dictis, tam primis gestationis mensibus, quam ipso lactationis tempore eadem ordinariâ erumpere periodo observatur crebrius, collectore *Exempl. Schenkio obs. p. 574. & 630.* Quoties vero sanguinis ista contingit excretio, toties sensilis in tenellis observanda venit alteratio, quâ languidi, lachrymosi, ac imbecilles fiunt, donec obturato denuò sanguineo fonte, dicti languores etiam denuò remittant. Id quod itidem observatum à *Paul. Zachia Quest. Med. Legal. l. 7. T. 9. qv. 3. p. 599.* singulari scil. fermentativo motu sanguis sub menstruationis tempore agitur & turgescit, unde & menstruum febrim, seu omni mense, quum sanguis per genitalia avacueretur recurrentem, ex acriori scil. effervescencia observavit *Lindanus in Coll. M. S. super Hartmann. Prax. Chym.* Quidni ergò lac tunc temporis, & similem fermentativum concipiat motum, qui & turbet infantis primam digestionem, & vitalem sanguinis fermentationem vitiet, forsan simili quodammodò ratione, atque quando adulti cerevisiæ potui vel vini adsuerti, ex potu talis liquoris adhuc non nihil fermentantis ceu extraordinariè affecti subindi non leviter læduntur. Verum enimverò, insignior longè lacti imprimitur alteratio, si per fecundum coitum nutricis impediatur menstruatio, ad corruptionem exinde lac disponitur, & horridam quodammodò acquirit impressionem, foetus ferè abominabilem; id quod & in brutis observabile est, ut curioso exemplo observatum à *Grafio de Org. Viror. Genit. pag. 126.* Lac ita depravatum, ne dicam corruptum, ab infante haustum degenerat in ejus stomacho in vitiosum ca-



coagulum, tenello infantis stomacho mirè infestum, adeo ut eidem exindè stigma, per totam vitam durabile imprimatur, unde casei aversionem, tam multis familiarem, non absque summâ probabilitate deducunt *Schockius lib. de aversat. cas. & Ill. Digby de nat. corpore. c. 38. pag. 437.* Ob id & Medicorum est præceptum, ut toto lactationis tempore nutrices à coitu abstineant, unde etiam lactantes matres à redditione debiti excusat, propter insignia fœtus nocumenta, *Paulus Zacchias loc. supr. cit.*

Cap. 4. Vitia pultis. an præparatione.

§. 16. Hæc vitia lactis fuere, resiant adhuc errata Pultis, ceu secundum genus errorum in assumtis. Detestor autem in pulte in primis farinæ crudæ usum, quæ cum lacte vel aqua subacta & cocta, ac in pulmentum instar viscosi glutinis redacta, quid aliud dabit, quam pastam tenaceam, crudam & viscidam, ulceriorem bibliopegis pro glutinandis chartis, quam infantibus pro nutritione: siquidem ob fermentationis farinæ in panificio pro adultis etiam summè necessariæ defectum difficillimæ eadem existit digestionis, quia laboriosa in ventriculo fermentationis. Panis ex quacunque farinâ confectus, non ritè fermentatus, ac ita pro digestionis stomachali facilius suscipiendâ, & in aliis una assumtis promptius adjuvandâ ineptus, ex defectu acidi spirituosissimi volatiliss, crudam farinæ mucaginem solventis & volatilissantis, quantum noceat sanitati, etiam adultorum, & quam fecundus sit genitor morborum chronicorum, præter quotidianam experientiam vel mulieris loquitur sexus, ex talis panis usu, menstruorum patiens defectus, & cachexias, ut pluribus videri potest *Kergerus de ferment. f. 3. c. 2. p. 236. & Schockius de ferment. c. 2. & 3.* At robustus est adultorum ex spirituosiori ac acriori fermento stomachus, debilis è contrâ infantilis:ingere tale pulmentum glutinosum & viscidum, & superaffunde lac butyro & caseo pingui turgidum, quid putas futurum exindè in stomacho infantili? tenax nempè & glutinosus, vitiosoque acore intensè tinctus emerget mucus, mille malorum in junioribus talibus fecundus parens. Compertum sanè est, sponte suâ & faciliè quamlibet farinam liquore sufficienti subactam: & in loco tepido asservatam, acescere insigniter, & hinc fermentare & spumose turgescere, etiam citra fermenti additionem: id quod si fiat in stomacho infantis, ex p. n. & stomacho peregrino pultis acore corrumpitur superingestum lac, & in grumos caseosos densatur, adeoque tota digestio prima exinde depravatur insigniter. Potius ergo farinæ talis pro meliori digestionis fermentativa præparatio

extra

extra corpus  
eadem in sto  
hoc, & reje  
dici, uti de  
cunctis Ve  
tur simul H  
structionem

§. 17.  
pationem  
permission  
intrudunt,  
dennis suffi  
cum pulte  
ratione hu  
ejus vehicu  
ob id minu  
exinde faci  
mis si tanti  
verit.

§. 18.  
fontibus, d  
causandi in  
nnnc viscid  
ventriculo  
cruditate ac  
ex quâ tot  
Hunc f. Ga  
cidum seu  
simus namo  
mè scil. La  
scit, idque  
spisse scit,  
cum butyro  
subsider, &  
lymbolum  
cum retent  
loci, h. e.  
rum, ut  
necessariò &



extra corpus præmittatur, quam quod cum tanto sanitatis periculo eadem in stomacho demum instituenda supponatur. Perspexerunt hoc, & rejecerunt ob id tales pultes jam olim plures insigniores medici, uti de hoc videri potest *Velschius de Vena Medinens. f. Dracunculis Veter. Exercit. de Verm. Capill. infant. p. 261.* conferatur simul *Hildanus cent. 6. obs. 34.* qui periculosissimam Pylori obstructionem, à tali spissa pulte natam observat.

§. 17. Post pultis præparationem, culpo etiam ejus usus <sup>2. in usu</sup> pationem, dum nutrices eandem prius in ore volutant, & salivæ patione, permissione, debitam fluiditatem conciliant, indeque infantis ori intrudunt. Jam vero salivæ singularis est vis fermentativa, à modernis sufficienter declarata, ratione cujus proficua sanè esset ejus cum pulte miscela, si exactè sanà nutrix eam institueret: Sed cum ratione hujus virtutis fermentativæ, etiam morbosa contagia sub ejus vehiculo promptissimè communicentur, seque multiplicent, ob id minus istam nutricis delibationem permittere possum, cum exinde facilè ad morbosam corruptelam puls disponatur, inprimis si tantillum scorbutici fermenti gingivas & salivam inquinaverit.

§. 18. Detectis ità remotioribus causarum morbificarum fontibus, dum exactius nocendi rationem proximam seu rationem <sup>Causa proxima affectuum infantilium</sup> cauſandi inquirimus, perspicuum evadit, succum vitiosè acidum, nunc viscidum, nunc aqueo serosum defectu primæ digestionis in ventriculo, ejusque intestino duodeno perfectionis, adeoque ex cruditate acidâ coacervatum, esse causam proximam & radicem, ex quâ tot morbi infantiles frequentissimè propullulare solent. Hunc s. Galenicorum pituitam acidam, seu Paracelsistarum ⊕ acidum seu Tartarum fecalem appellare velis, mihi perinde est, sumus namque in verbis faciles, mobo in rebus conveniamus. Facili-  
mè scil. Lac, seu sanum seu alteratum in stomacho tepido p. a. ac-  
scit, idque eo magis, quo copiosius aut inordinatius ingeritur, hinc  
spissescit, & factâ per coagulum feri à contentis separatione casei  
cum butyro perniciosus grumus nunc in stomacho, nunc intestinis  
subsider, & plus minus pertinaciter agglutinatus hæret, conferente  
symbolum pulte farinaceâ crudâ & viscida facilè aceſcibili, una  
cum retento & plus minus corrupto meconio, unde ex conditione  
loci, h. e. stomachi calidi, & ratione contentorum recremento-  
rum, uti & ingestorum lacteorum & pultaceorum intensus acor  
necessariò & defacili oritur, qui nunc materia viscida irretitus, in



primis viis suas ludit Tragœdias nunc vehiculo aqueo seroso, & lymphatico ulterius distributus etiam aliis & remotis in locis mille malorum existit artifex. Clara hæc evadunt sponte, modo superioribus thesibus explicata probè consideremus, in specie in th. 5. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. & c. simulque observemus pleraque infantum mala per remedia acidum destruunt, de alcalium tam volatiliū quam fixorum proficiā, uti & per aromatica & volatilia Oleosa optimè percurari.

Variat sub-  
inde causa  
proxima.

§. 19. Quæ tamen ita intelligenda sunt, non quasi alia nulla in corpore tenello sint errata, quam quæ ex dicto acido oriuntur, ubi quæ enim excipiendi sunt hæreditarii morbi, uti & à lactantibus transplantata morborum feminaria, aut aliorum hausta contagia. Præterea mille larvas induit Lac sub sui corruptela, mille inde nocendi artes, non tantum dum adhuc in mammis turget, sed in specie dum infantis in stomacho corrumpitur, hinc in intestinis tam à bile quam succo pancreatio alteratur, subinde à restitante meconio similibusque excernendis inquinatur, quin & propriâ sponte, de facili corrumpitur, unde diversimodè dulcescit, amarescit, colliquefcit, viridescit, livefcit, putrescit, verminescit, aliasque quam plures peregrinas asciscit sibi qualitates: nam & jam in tenellis sexcenta seu potius infinita Hippocratèa, de quibus autor *Libri de Prisc. Medic.* locum inveniunt. Unde tam in abdominis visceribus, quam massâ sanguinea & inde derivatis reliquis contentis liquoribus activis quamplurima p. n. nocumenta præstò adsunt. Ut ut ea, quæ ex cruditate acidâ veniunt, sint frequentissima, quia talis corruptela est familiarissima.

Unde aci-  
dum adeò  
vitiosum in  
infantibus.

§. 20. Paradoxon equidem videri possit, quî in semilacteis infantibus adeoque dulci rore ubique perfusus, ex lacte dulci primit⁹ concretis, & eodem cū pulve insipido dulci enutritis, acor adeo nocivus & subindè intensus oriri possit, à quo tam terra superveniant symptomata. Sed clarius redditur facilè totum negotium, modo aspiciantur assumpta tam matris utero gestantis, quam nutricis lactantis. Hæ ipsæ enim præter manifesta acida, quæ ut supra §. 13. monitum fuit, ex dictamine appetitus hauriunt, vescuntur saltem pane & bibunt cerevisias. Panis omnis in specie secalinus continet in se spiritum intensè acidum, volatilem tamen, adeoque in se saluberrimum, duriora tamen etiam corpora v. g. Coralia, ferrum, Vitrum & c. aliaque rodentem, qui cum aliis assumtis lacti simul materiam præbet. Ut ut autem acor hic ipse, partim sub sto-

machi

machi digel-  
tur plus mi-  
facile data  
facilis lacti-  
tamen infan-  
vel maximè  
scentiæ, c  
ciat, quin  
fecibus no-  
facilimè a-  
dulam, à  
est cura,  
earum de  
occasione  
Quid fructu-  
similia, g  
miliarissim  
frequentiss  
maces sub  
quosum et  
eosdem p  
§.  
gandi sup  
fantibus fe  
pissimè ex  
intestino  
ciatus, cu  
Epilepsia  
naverit e  
ut plurim  
ginosa,  
dore spir  
rum raris  
rà sub co  
vedo in b  
corum  
fuit,  
censet M  
in Exam



machi digestionem, partim bilis alcalinæ in jejuno permissione alteretur plus minus in falsum volatile, sicque occultetur, nihilominus facile datâ occasione denuo se exferit, & operatur; hinc enim tam facilis lactis acescentia, & assumpta acida matri ac nutrici innocua tamen infantibus per lac revera ad gustum dulce sunt torminosa, & vel maximè hostilia. Cerevisia vero quæcunque facillimæ est acescentiæ, cum modica lupuli pinguis aromatica conditura non sufficiat, quin tandem acescat, ut taceam vel cerevisiam novellam, à fecibus nondum sufficienter depuratam, fermentando in stomacho facillimè acescentem, aut cerevisiam inveteratam jam nonnihil acidulam, à nutricibus subinde hauritam. De cætero his ipsis vix ulla est cura, quantum sua assumpta fætum aut infantem afficiant, ut ut earum delicta, diu post demum luant infantes, idque datâ qualibet occasione, ut plurimum per Epilepsiam, ut supra §. 13. monitum. Quid fructus horæos memorem, efferviscibiles facillimè, acetaria & similia, gravidis pariter ac lactantibus citâ reflexionem in fætum familiarissima. Adeo ut *acidum* sit, quod morborum infantilium frequentissimus est autor, sicut subiectum ejus *viscidum* eos contumaces subinde reddit, aut crebrius recidivantes, vehiculum verò *aqueosum* etiam in remotioribus locis: & extremâ corporis peripheria eosdem propullulare facit.

§. 21. Jactis hisce fundamentis facilis est via, ulterius indagandi supra enarrotorum morborum generationes. Tormina infantibus ferè inevitabilia ab acido oriuntur, quod ex stomacho, sæpissimè ex lactis coagulo & esu acidorum à nutricibus delapsum, intestinorum membranas pungit, rodit & lancinat, unde isti cruciatus, cum convulsivis spasmodicis juncti, prodromi exinde non rari Epilepsiæ, iique eò crudeliores, quo viscidiori glutine se agglutinaverit eorum parietibus. Horum indicia, præter ejulatum sunt ut plurimum excreta virida plus minus, seu ut vocant porracea & æruginea, oriunda ab acido excessivo & vitioso (nam acidum acre odore spirantia) cum bile. Quæ Oleosa volat. permista, ex quorum miscella viriditas ista exsurgit. Equidem viridis color reverà sub concursu plurimum ex miscela *flavi* & *cærulei* emergit: flavo in bile clara est, & conspicua: cæruleus color in nullo succorum corporis unquam nec naturaliter nec p. n. observatus fuit, unde rarissimum; & fere unicum est exemplum, quod recenset *Meera*, de lacte nutricis saphirinum colorem exacte referente in *Exam. Diatribæ de Febr. Willissii* p. 65. Cum tamen cæruleus

Unde tormina & varia alvi excreta Infantum.



color ed nigrum accedat propius, adeoque in certâ luminis maximam partem intrò susceptione in porulos, & cum umbrulis mistione consistat, loco hujus in corpore absentis, acidum, perspicuum licet constringendo tamen & angustando aliquali subjecti coagulatione, poros flavi corporis sufficiet, inprimis si dictum acidum & ipsum in subjecto nonnihil densiore & crassiore hæreat, ut exinde viridis ceu medius inter cæruleum & flavum color emergat. Comprobat dicta experimentum *Graffi*, de succo pancreatico thes. 145. 147. ubi bilis flava ex miscelâ cum spiritu Vitrioli atro virescentem induit colorem. Nec est, quod quoad experimenti fidem obijcias, id quod alio mihi obtigit tempore, in spiritu Vitrioli adhuc contentas adhuc esse, & sub rigoroso ignis examine c. acido simul elevatas metallicas *Feas* & *Osles* particulas, quæ attractu alcali bilis præcipitatæ virorem repræsentent, sicut eadem attractu gallarum in Vitriolo atrum colorem induant; nam idem experimentum tentavi & cum spiritu *Solis* plurissimo, non secus ac cum spiritu *Q*, & ubique idem fuit successus & eventus, quod nempe istâ misturâ inrensus viror efflorescit, id quod simili ratione de lactis vitioso acore virorem cum bile producente verum erit. Unde subinde etiam grumosa apparent talia, sub infantum torminibus excreta, quia lac à præternaturali acido in grumos caseosos coagulatum, istam larvam induit. Non tamen semper talia grumosa simul sunt viridia, quin subinde sint flava. Scilicet discoloratio horum excrementorum oritur à bile per acidum mutata & corruptâ, sæpè tamen evenit, ut feces excernantur flavæ, quæ pauco tempore postmodum colore viridit tinguntur. Causa hujus prænomeni est, 1. quod acidum in bilem, quamdiu in corpore fuit, sufficienter non egerit, propter impedimentum lactis, continuò vel brevibus intervallis tantum assumptum, quippe quod ejus cum temperando infringat. 2. quia non nisi finitis effervescentiis præcipitationibus mutationem rerum accurratam observamus: unde post excretionem, dum aeris accedit adjumentum, finitâ mutuâ actione & reactione permistorum, color tandem tertius emergit. 3. Quia & ipsa commista excreta facilius forsan in aere libero novum coloris schema arripiunt, quam dum intestinis adhuc sunt coercita. Observandum quoque hoc loco atrocissima non rarò adesse tormina, excretis alvi aquæ instar leviter flavescents fluidis, quæ nimis fluida, subinde adeò actia observantur ut & podex excoriari exinde soleat.

§. 22.  
cumbat, qui  
appetitus de  
vel coagulati  
cum quotidie  
ceui hostile p  
inde oneret  
vid, *Hæfer*  
retur quoq  
tus sequitur  
salubris tan  
malorum,  
taliam diutius  
stæ instar fa  
intumescen  
tu difficiliter  
strum impet  
tates, inde  
Eadem est o  
nistympani  
pasta nempe  
simul alcali  
rinacea plus  
cum lacte le  
statumque  
chondria &  
hypochond  
rum impetu  
dos, & simi  
ficienter *H*  
li non tamen  
§. 23.  
ventriculi o  
nexionis di  
inspiration  
tumacissim  
rosalia a  
superius, ve  
acrioribus



§. 22. Quod si copiosius tenaciorque grumus stomacho incumbat, cui per pylorum transitus negetur, non potest non exinde appetitus deici, & activitate fermenti digestiva lacte vel copiosiore vel coagulato obruta, horror mammae oriri, cum absolutâ appesiâ, & hypochondriacorum inflatione, cum quotidie observemus, istud quod semel stomachum laeserit, ceu hostile postmodum, diu ab eodem averfari: quod si gravius exinde oneretur stomachus, vel obstruatur omnino Pylorus, de quo vid. *Hæferus Herc. Med. p. 149*, item *Hildanus cent. 6. obs. 34.* & irriteretur quoque, hujus convulsiva contractio, quam vomitus violentus sequitur supervenit tenella corpuscula insigniter quidem lædens, salubris tamen, quatenus excrementa ista removet, & graviorum malorum, jam jam imminentium est medicus. Finge enim hæere talia diutius in Ventriculi bursa, facile ex acore fermentativo, pastæ instat farinaceæ intumescunt, & impetuoso flatuum proventu, intumescunt præcordiorum, hinc diaphragmatis impedito motu difficilem respirationem, & ex horum flatuum in orificium sinistrum impetu, hujusque pertinaci strictura, præcordiorum anxietates, inde inquietudines, somni impedimenta, vigilias inferent. Eadem est origo hypochondriorum inflationis, & totius abdominis tympanitica distensionis, nam loco saltem differunt à priori; pasta nempe acida viscida, vitioso acore fermentata, concurrente simul alcalino bilis stimulo Gastale flatuosum eructat. Scilicet farinacea plus cruda acescentiam necessariò subit in stomacho, unde cum lacte lemicoagulato turgescencia fermentativa, de quo supra, flatuumque & modo dictorum symptomatum in & circa hypochondria & Epigastria fertilis proventus. Cogitemus adultorum hypochondriacum affectum: & in eodem flatuum & borborygmore impetus, ex acido viscido digestionis primæ relicto p. n. oriundos, & simile ferre in infantibus usu venire per spiciemus: cum sufficienter *Helmont. Tr. de Flat.* horum originem ex acido, stomachali non tamen fermentali ordinario demonstraverit.

§. 23. Quod si tenacior talis, acidiorque mucus superiori ventriculi orificio firmitus adhæserit, per consensum firmissimæ connexionis diaphragmatis simul irritabitur musculus, unde hujus sub inspiratione factâ convulsiva contractio, singultum, subinde contumacissimum, ininfert, sicut ventriculi cavo si magis fluctuent pituitosa talia acida, aut  $\Theta$ so acida, eaque successive irritent orificium superius, vel insensâ & molestâ suâ præsentia, vel saltem halitibus acrioribus, excitabuntur sub expiratione occasione vellicari diaphragma-

Unde Anorexia, Vomitus, Præcordiorum, & hypochondriacorum inflatione.

Unde singultus, tussis, asthma infantum.



diaphragmatis, ipsique compatiens musculorum expirationi inservientium horum convulsivi motus, unde repetentes tusses concutient tenella pectora. Revera enim ex stomacho, huiusque in se ipso coacervatis cruditatibus infantum exoritur tussis, subinde tantâ violentiâ repetens, ut non nisi superveniente Vomitu copiosiusque mucij reiectione ad tempus cesset. Rara autem infantibus sicca tussis, aut quæ ex Laringis asperæque arteriæ oriatur irritatione, obvenit, nisi interdum inclementioris aeris afflatus & liberior haustus suo modo ad hunc disponat. Idem asserendum de tussi istâ, quæ sub dentitione laboriosiore frequenter turbat infantes, quam copiosior salivæ subinde Sso acrioris defluxus in stomachum, & in primis uberius ejus ex membranâ pituitariâ posteriori seu inferiori transsudatio, & inde defectuosa reddita prima digestio, cruditatum accumulatio infert. Idem asserendum de infantum asthma, quod ut plurimum ex ventriculo onerato oritur, dum mucilagines acidæ coacervatæ & flatulentâ turgescentiâ tumefactæ, molestum tale asthma producant: hinc enim etiam provocato Vomitu statim liberantur, autore *Primerosio de Pueror. morb. p. 73.*

Unde lumbrici in Infantibus.

§. 24. Quod si mucus similis, blandior tamen & dulcior ex alimentorum quocunque modo digestorum reliquiis in intestinorum canalibus diutius hæserit occasione loci caloris & inchoatæ successivè putredinis occultata lumbricorum semina excitantur, foetusque vive excluduntur. Semina scilicet vegetabilium Cerealia, in specie secalina & triticea, vel immediatè in pulvere farinaceâ vel mediatè cum lacte ex pane comesto genito ingesta, seminali insectorum contagio, (quod sub minimâ etiam mole latere potest, utpote constitui dicitur saltem 2800. partem sui seminalis corporis) quasi imprægnata, data occasione hæc excludunt. Accedit, ut monui, tepor loci blandus, vis digestiva ventriculi debilior, quâ digerendo non subiguntur omnino dicta animalculorum semina primordia, & temperata bilis acrimonia infantum, defendens aliâ succos quos attingit à tam promptâ putredine & verminatione: unde & ibi, quo fermentum fellis non pettingit, lumbricorum est Patria, autore *Helmontio tr. 6. pl. digest. §. 82.* hinc & Tinearum in adultis causam potissimum in obstructionem cystis felleæ refert *Hartmann in Prax. Chym. c. 156. §. II.* Talibus E. occasionibus facillè viva ista putredo excitari poterit.

Unde atrophiciæ febres lentæ, Ti-

§. 25. Cum ergo ex supra dictis subinde mucus crudus accidus & viscidus loco nutritii succi distribuendus sit, non possunt  
non

non eodem  
que lacte  
farciri, un  
menti trans  
tuli, accede  
1. c. 14. §. 5  
1. c. 14. H  
Ut taceam  
pri pro nut  
chexia sup  
so acore,  
dem, pro  
sario de  
ficatio, &  
cielentæ,  
quinatur  
acrimonia  
glandulas  
in specie tu  
ryngem et  
transudati  
balsamicu  
ultima, &  
gritudines  
phæ labe  
partibus co  
tribuitur  
acore, ar  
visciditate  
quibus ac  
effervesce  
donec mu  
simileliqu  
sures eros  
viscido,  
mentum  
cessivè ip  
ximam ad  
lactea, ite



non eodem intestina aut admodum incrustari, aut oscula ductus-  
que lactei eodem obstrui, aut glandulæ mesaraicæ consequenter in-  
farciri, unde tumores abdominis protuberant, & denegato nutri-  
menti transitu, insigni totius corporis atrophîa contabescunt infan-  
tuli, accedente simul ut plurimum alvo laxiore: vid. *Sylvius Prax. l.*  
*1. c. 14. §. 56. p. 168. it. Prax. Barbette. l. 3. c. 2. obs 3. & Anat. Præf.*  
*l. 1. c. 14. Hæserus Herc. Med. l. 7. p. 649. Sydenham de febr. p. 89.*  
Ut taceam hoc loco dyscrasiam lactis alieni, nempe nutricis, vel ine-  
pti pro nutrimento infantis, vel vitiati, unde ibi atrophia, hic ca-  
chexia supervenit. Quod si minus viscidus, crudus tamen & vitio-  
so acore, vel saltem acri-salfo sapore inquinatus distribuatur tan-  
dem, pro sanguine augmentando & corpore nutriendo, neces-  
sariò depravatur exinde M. S. Crasis, vitiaturque insigniter sangui-  
ficatio, & oritur p. n. ejus effervescentia, unde febres variæ, in spe-  
cie lentæ, sub vesperam præcipuè exacerbantes superveniunt. In-  
quinatur hinc necessariò etiam Lymphæ latex nimio acore nimiaque  
acrimoniâ, simulque subinde nimis viscida redditur, unde & circa  
glandulas tumores, & catharrales affectus infantibus superveniunt,  
in specie tussis siccæ nocturnæ, ex lymphæ talis acido acris ad la-  
ryngem effusione: it. per membranam pituitariam inferiorem  
transudatione oriunda. Obrunditur econtrâ bilis ☉ vol. oleos. seu  
balsamicum, unde perfectio digestionis primæ in intestinis deficit  
ultima, & ita magis magisque propullulantes jam confirmantur æ-  
gritudines. Quod si cum tali plus minus intensâ sanguinis & lym-  
phæ labe, nutrimentum exinde pro augmentandis & sustentandis  
partibus confectum, has ipsas subintret, & per earum porulos di-  
tribuatur, nullo modo perfectè ipsis assimilari potest, quin potius  
acore, antea quidem apparenter occultato, & aliquali simul  
visciditate ipsis inimicâ, hinc inde in postulas congeratur, in  
quibus acor denuò manifestatus cum vicino rore partium acrius  
effervescit, hinc altior tumor, intensior rubor & ardor supervenit,  
donec mutuâ temperaturâ, nunc in pus, nunc in saniem, nunc aliud  
simile liquamen abeant, & per cuticulam prius in squamulas & fur-  
sures erosam exeant: relicto adhuc post se fermento subtili, acido  
viscido, corrumpente ulterius novum, inculpatæ etiam notæ ali-  
mentum istudque in similes lordes transmutante, serpente ita suc-  
cessivè ipso malo ulterius, & inquinante & excedente acore suo pro-  
ximam adjacentem partis substantiam, ut in favis, tineâ, crustaque  
lactea, item furunculis infantum obviùm, Quæ omnia, eò facilius  
eveniunt,



eveniunt, eoque pertinaciores radices figunt, quo minus transpirabiles sunt partes ita affectæ, & quo magis poris earum clausius, dicta excernenda successivè congeruntur.

Crustæ lactæ origo.

§, 26. Facta modò lymphæ p. n. acidæ ac viscidæ, item crustæ lactæ mentio, uberiolem suæ explicationem urgent. Siquidem dictas corporis, & inprimis faciei & capitis defœdationes pustulosas crustosas, ulcerosas, quæ crustæ lactæ, achorum & tineæ non vèni solent, quarum descriptiones & differentias saltem accidentales, vide sis apud Practicos, reverà ex lymphæ nimis, seu p. n. acidæ plus minus simul viscidæ vitio originem ducere arbitror: Lactæ vel matris sub gestatione fœtus, vel nutricis sub ejus Lactatione vitioso, causæ remotæ vices obtinente. Semper enim ferè cum hisce defectibus glandularum in Collo & circa caput densè confitarum item parotidum &c. tumores conjuncti esse solent, ita quidem ut vel præcedant, vel simul affligant, vel dictos affectus declinantes subsequantur. Rarissimè hoc posterius observatur, & vel metum recidivæ, vel mutationem defœdationis dictæ in alium affectum p. n. secum trahit: Istud prius frequentissimè accidit, ita ut mulierculæ etiam per experientiam edoctæ, ex conditione dictorum tumorum, quasi scrofulosorum & quos ordinariè *Haupt-Drüsen* appellare solent, affectuum talium diurnitatem, vel magnitudinem, aliàsve circumstantias probabiliter prælagire soleant. Certè observavi tumores tales glandularum, ad parvi ovi gallinacii magnitudinem in collo, mox infra aurem protuberasse, cum crusta lactea caput obducens evanisset, quo tumore successivè subsidente, & tandem dicta lactumina denuo efflorescebant. Non amplius enim dubitatur, glandularum functiones versari circa lymphæ præparationem, & distributionem: unde sponte patescit lymphæ vitium primarium subesse ita quidem ut ejus consistentiâ materiali obstruantur glandulæ, & inde consequenter intumescant, ejus vero aciditate, ob largiorem in partes inter cutaneas capitis extimas effusionem, ex denegata plus minus debitâ distributione & motu per glandulas, pruritus intensissimus in dictis locis, cum pustulis rubris successivè in pus abeuntibus, & squamis in sequentibus ac furfuribus, ex cutis & cuticulæ erosionibus superveniant: quæ omnia, pruritus, purulenta sanies, crustæ & squamæ, de aciditate agente causæ peccantis manifesta sunt indicia, ut alio loco & ab aliis probatum est. Ut taceam, asperiora facta hæc mala, ad cranium

cranio usque  
osseas substra  
morb. infan  
reliquis loci  
bus hinc in  
has inter ca  
acidior ead  
faniem fun  
ferè magis  
& densè su  
successivè  
varia glan  
experienti  
tio talium  
contagios  
tiana, Sul  
paria plan  
scabies. Equ  
defœdation  
quod nega  
num, sed  
ctenus fun  
9. mensium  
dicta crusta  
gram mire  
vissima tuss  
copiosi mu  
rhæa serosa  
riarentur:  
quidam E  
arbitror ly  
glandulas  
per quas ly  
speciatim  
ta, indux  
tis fluentis  
festam red  
§. 2  
billorum



cranium usque penetrare, istudque erodere, pro more acidotum, osseas substantias facile erodentium, de quo vid. *Sennertus lib. de morb. infant. p. 2. c. 3. p. 28.* Unde & capitis partes extimæ, præ reliquis locis dictis infestantur malis, ob copiosiores glandulas, quibus hinc inde speciatim collum stipatum est. Differentia autem has inter capitis defædationes observatur, quatenus nunc acrior & acidior eadem fuerit, unde ulcuscula manantia & copiosam acrem faciem fundentia emergunt, vel quatenus eadem minus acris, sed ferè magis temperata & viscida extiterit, sic enim crustæ densiores, & densè subinde compactæ, & sibi invicem superstratæ generantur, successivè decedentes: ima etiam pro lymphæ ita peccantis ratione, varia glandularum quoque observatur constitutio, de quo uberius experientia adhuc consulenda venit. Et sanè non levis est cognatio talium luctuminum, ceu adultorum scabie, cum & subinde contagiosa deprehendantur, & iisdem remediis, in specie nicotiana, Sulphuræ, & c. curari soleant, & retropulsa ut vocant, paria planè inferant symptomata; ita ut quasi particularis capitis sit scabies. Equidem vulgi fert persuasio, salubres esse infantibus tales defædationes, quatenus præservent eos, à gravioribus affectibus, quod negari suo modo nequit, quatenus sunt bonum quidem signum, sed malæ causæ, quæ si abesset, magis conducere. Quæ hætenus sunt exposita, videtur confirmare quem observavi puerulus, 9. mensium p. p. vitio nutricis cacochymico-scorbuticæ insigniter, dictâ crustâ lacteâ super cranii hemisphærium, & faciem ferè integram mire deformatus: quæ cum spontè evanuisset successit gravissima tussis, tenellum pectus insigniter & continuò quatiens, cum copiosi muci in stomacho & Oesophago pæsentia, una cum diarrhæa serosa adeò acris, ut etram extrema podicis & vicina loca exco-riarentur: totum corpusculum insigni æstu fervebat, & insultus quidam Epileptici, subinde istud convellebant. Factam fuisse hic arbitror lymphæ peccantis metastasin, præter alia loca in specie ad glandulas salivales, & quæ laringem irrorant, ut & ad pancreaticas, per quas lymphæ ista acida acris, non adeo viscida, uberius effusa, speciatim dictam tussim & diarrhæam, alia ut transeant symptomata, induxerunt. Dicta modò, etiam rationem aurium humiditatis fluentis, exco-riationis & exulcerationis, item Labiorum manifestam reddunt.

§. 27. Hæc ipsa vel manu nos ducunt, ad evolvendam morbillorum, & in specie Variolarum abstrusam aliàs naturam, Quæ Variolarum radica-  
cara origo,



cum harum, quatalium, fiendi modus & effectus cum modo dictis affectibus in quamplurimis conspirent, & etiam Tinea Capitis, non rarò post variolas superesse, aut etiam easdem insequi soleat. Torquet imprimis Philiatros, inevitabilis ferè harum insultus omnibus Europæis, ne dicam de aliis quibusdam nationibus. Ex menstrui sanguinis reliquiis multi cum Arabibus earum radicem derivant, alii ex repetitâ post semel factam conceptionem Quæ libidine: neutrum mihi satisfacere videtur. Quin potius si certò statuendum est, quod aliquod nobis quasi implatatum habeant principium, ratione cujus nemo ferè easdem effugere queat, earum radicem ex corruptelâ lactis nutritivi, tam in, quàm extra uterum, & vitioso viscido acore tenellos inde inquinante derivarem, exinde enim & frequentissimè saltem infantes & pueros, rarissimè demum adultos affligere solent. Qui vitiosus acor aliquandiu occultatus, tandem occasione datâ, in specie excitatâ M. S. per fermentum simile extrinsecus inspiratum vel haustum, perniciosas febriles effervescentias excitat, concurrente acido fermentativo viscido cum Oe vol. mass. sanguineâ, donec præcipitato & subjugato acido isto vitioso, & sero involuto, criticâ sanguinis purgatione hinc inde per vasa capillaria in specie beneficio glandularum intercutanearum miliarum excernatur, & sub cuticulâ hærendo, successivè in pustulas coarvetur, quarum contentus salsacidus succus effervescono ulterius mirescat, donec in pus perfectum abeat, quod cum cuticulâ erosâ tandem in crustam duram & crassam condensetur, erodente interea sub hac ipsa acido cutim subjectam in foveas plus minus, prout magis vel minus effervescentia febrili temperatum fuerit. Unde & ulcera subinde perniciofa & cacoëthea ex variolarum pustulis tam in partibus externis quam internis, in specie in tenerâ vesiculosa pulmonum substantia oboriuntur, pro conditione acidi plus minus virulenti varia, quod ipsum in dictis Variolis ossa non rarò arrodere & corrumpere assolet, id quod expertus testatur *Parans de Variol. c. 1.* Hinc etiam Liberi à parentibus, morbo gallico laborantibus prognati, omnium gravissimè à Variolis affici solent, observante hoc Horstio. l. 6. obs. append. p. m. 308. quod non ineptè illustrat Quis dulcis, ceu singulare alexipharmacum curans pariter & præservans Variolas: confer *Miscell. Acad. N. C. anni 3. obs. 9. & 36.* Ob id & convulsivi motus & Epilepsiæ insultus præcedunt earum eruptionem, morsicante acido vitioso nervos, & ad cri-

ad crispatur  
tus spiritus a  
tiosum mire  
istud per suc  
abforbens,  
reicio hoc  
vatim grass  
crocoscop. o  
hist. 20. R  
rum pullul  
ordine cau

§. 2.  
rum insult  
fermenta i  
tutitate tar  
ctibus, sec  
chialum ad  
Quæ consive  
tritione sani  
trahunt vit  
lactatione  
mutatâ dia  
& instar sec  
defiguntur,  
deuntes sub  
si a. semini  
epidermid  
tâ occasio  
& morbill

§. 2.  
narum, sec  
ris, fauces  
sculis parv  
excorians  
Fons pecc  
& pultis,  
aut salivæ  
tamen in i  
sum ex stor



ad crispaturas eorum fibras, & hinc inordinatos ac impetuosos motus spiritus animales irritante. Unde & myrrha, acidum, istud vitiosum mirè temperans, non minus quam castoreum, & Oia Volat. istud per sudorem eliminans, & fix. ebor. l. Unicornu fossil. istud absorbens, pro harum medelâ utramque faciunt paginam. Non rejicio hoc iplo, vermiculorum exercitum, in singulis pustulis acervatim grassantem, *vid. Borellus centur. 2. observ. 72. & Observ. microscop. observ. 31. p. 21. it. Lipsius de Variol. Bartolin. centur. 5. hist. 20. Rhodius cent. 3. observ. 64.* cum nullum pus, absque horum pullulante segete reperitur, sed hos tanquam effectus, spontè ex ordine causarum morbosarum in pure supervenientes, transmittito.

§. 28. Nec scrupulum injiciat, aut tardior in quibusdam earum insultus, aut repetitus etiam accessus. Nam diutius morbosa fermenta in corpore delitescere possunt, donec sub suâ dierum maturitate tandem evigilent, id quod ex hæreditariis non tantum affectibus, sed etiam ex Canis rabidi salivali fermento, ex febrium petechialum ad aliquot hebdomadas interdum latente contagio, ex Luis &æ coſſivente diuti<sup>9</sup> seminio patet &c. Unde & infantes qui sub nutritione sani erant & vegeti, post ablactationem subinde cutanea contrahunt vitia, achores & similia dū vitia lactis per consuetudinem sub lactatione quasi appropriata naturæ, citra nocumentum adsunt, quæ mutatâ diætâ per effervescentiæ motum in musteo sanguine separata & instar secum præcipitatâ, hinc inde per sanguinis circulum sub cute defiguntur, & ibidè coacervata suas morbosas ludunt Tragœdias, redeuntes subindè pertinaciter, quamdiu tantillum miasmatis morbosi a. feminii fermentativi, nunc sub sanguinis Velamento, nunc sub epidermidis Tegumento latuerit: quod ex materiâ conveniente datâ occasione se multiplicat, & malum renovat, quæ ipsa de variolis & morbillis pariter asserenda videntur.

§. 29. Itâ quidem se habent, exulcerationes partium externarum, sed præter has etiam interiores quædam, speciatim partes oris, fauces palatum, lingua, ipseque non rarò Oesophagus, ulcusculis parvis scatet, aphthæ appellatis. Harum origo est acre acidum, excorians & exulcerans plus minus, dictarum partium superficiem. Fons peccantis acidi, potissimum est in stomacho corruptela lactis & pultis, nimiaque ejus acescentia. Ut ut enim aut lactis nutriticis aut salivæ ipsius infantis à quibusdam nimia accusetur ecrimonia, vix tamen in infantibus aliam originem agnoscunt, quam acorem vitiosum ex stomacho exhalantem. Nam & in adultis frequenter con-

Quare Variolæ interdum tam tarde se ostendunt.

Unde Aphthæ.



tingere solet, ut correpti febribus, cruditatibus recrementosis, in specie porraceis in stomacho existentibus, aphthis molestè laborant, nisi maturè fomes removeatur à Medio ex Ventriculo.

Pavores infantum & epilepsia unde.

§. 30. Superest funestum adhuc tenellis symptoma, nempe pavor in somno, oriundus ex explosivo ferè impetu spirituum animalium in nervos: qui cum sub somni requie blando tardoque gressu influere debeant impetuosius irruentes inopinam totius corpusculi ex fibrillarum nervearum momentaneo contractivo nisu inferunt concussionem, adeò ut non ineptè mulierculis prodromi habeantur convulsionum Epilepticarum, infantibus admodum familiarium, ex simili inordinato & perverso spirituum animalium motu in cerebro, & violentà explosione in nervos oriundarum. Frequentissimè v. parisi vagi & intercostalis ramificationibus annexæ partes abdominis & Thoracis convulsionibus hujusmodi Epilepticis præ cæteris partibus tentantur admodum torminosæ, quas mulierculæ convenienter admodum, *die Schwere Noth im Leibe* appellare solent. Scilicet continuus & nunquam interruptus spirituum animalium in hos nervos est motus & influxus, pro continuando motu Cordis, diaphragmatis & respiratori inervientium musculorum primariorum, ut & Ventriculi & intestinorum motu peristaltico perficiendo, unde consueto quasi tramite longè promptius irruunt in dictarum partium nervos spiritus animales, quam in membra externa in infantibus magis quieta, adeoque dictos spasmos internos frequentius concitant. Quod si v. crebrius repetant, tandem totum spirituum animalium exercitum integrumque nervorum systema, per consensum & continuitatem motus similiter afficiunt, unde universalis tandem supervenit Epilepsia, de quâ dicunt, *die Schwere Noth bricht auß*. Has & similes passiones, post nervosarum sensillum fibrarum quocunque in loco irritationem consequentes, unde melius deducemus, quam ex supra sæpius insinuatîo acido? per se nervis inimicissimo, multo magis in tenellis, quorum fibrarum nervearum mollior textura faciliè mobilis, & ita in convulsivos motus citispabilis ut sic dicam existit. Hinc quæ propiores sunt partes fonti vitiosi acidi, stomacho nempe & intestinis, aut mediantibus nervis connectuntur iisdem, etiam frequentius patiuntur convulsivos spasmos, qui continuati ulterius in tantum, donec totum nervorum systema in cerebri cerebellique confiniis concutiant, universalem tandem Epilepsiam superveniente spirituum impetu inferant: uti in adultis subinde in membro quodam externo

externo loco  
apparente at  
universum n  
primis visci  
quam epileps  
per alcalia v  
mam infant  
domine late  
nis negotio  
lem ascensu  
confirmati  
ci insultus  
graviora to  
scant Epile  
c. XI. p. m.  
ruginis inst  
Epilepsiam  
cedat, pleru  
ex acido la  
de Morb. fac  
ca aures, vo  
Epilepsia: vi  
etiâ ex acido  
infantis per  
§. 31.  
inde comita  
jus occasio  
præterquar  
primariò ur  
givæ in den  
cum sensilis  
cum partibu  
dotalgia a  
sensum affi  
inferente,  
loribus tan  
& inde cor  
pius, q  
nerius & m



externo locus latet epilepticus, qui per continuatos spasmos, sub apparente auræ frigida sensu sursum delatus ad cerebrum, tandem universum microcosmum concutit, ita pari ratione ex acido, imprimis viscido in abdomine hærente, tam spasmi leviores interni, quam epilepticus totius corpusculi insultus oriuntur, optimæ ob id per alcalia volatilia, experientia teste curabiles. Adeo, ut rarissimam infantum existimem Epilepsiam cujus focus acidus non in abdomine lateat, aut ex abdomine non derivetur, excepto dentitionis negotio, ita tamen, ut circa halituum aut fumorum impossibilem ascensum, malum dicto modo explicari queat. Pro quorum confirmatione, quod nempe infantum nocturni pavores & Epileptici insultus ab acido peccante excitentur, annotasse sufficiat: 1. quod graviora tormina cum excretis æruginosis, frequenter comitem asiscant Epilepsiam, teste præter *Quercetan. in Tetr. graviss. c. affect. c. XI. p. m. 116. Lindano super Hart. Prax. chym.* qui vix virorem æruginis instar intentum in infantum excretis observari asserit, citra Epilepsiam: quod si dicta materia ita sit acris, ut febris etiam accedat, plerumque interimit pueros, tormina vero & talia excrete, ex acido lactis corrupto, superius derivavimus. 2. *Hippocr. lib. de Morb. sacro* asserit, infantes, si ipsis ulcera in capitibus, vel circa aures, vel in facie, vel in reliquo corpore excitentur, liberari ab Epilepsiâ: vid. *Sennert<sup>o</sup> de Morb. Inf. p. 2. c. 3. p. 28.* quas exulcerationes etiâ ex acido lymphæ supra deduxim<sup>o</sup>: quibus 3. accedit cura Epilepsiæ infantilis per alcalia volatilia, item per Terrea, acidum absorbentia.

§. 31. Modo insinuatum fuit, Epilepsiam & dentitionem subinde comitari, hujus ergo dentitionis negotium, & symptomata ejus occasione excitata, hic evolvenda erunt. Equidem nil aliud, præterquam gingivarum à dente accrescente perforandarum dolor primariò urget, similis quodammodò illi, dum acido morbofo gingivæ in dentium radicibus punguntur, & quasi perforantur. Sed cum sensilis gingivarum, ex interspersis variis nervulis substantia, cum partibus vicinis insignem consensum habere soleat, quod ex odontalgia adultarum, subinde dimidiam Capitis sphaeram per consensum afficiere, interdum musculi temporalis aliquem spasmum inferente, notissimum est, de facili evenit, ut atrocioribus sub doloribus tandem universum ferè nervorum systema simul vellicetur, & inde convulsiones Epileptica superveniant: idque eò promptius, quòd vel per se & in seipso nervorum systema infantum tenerius & mobilius extiterit, vel ipsum ex perversâ diætâ matris vel

Dentitio  
difficilis.

nutricis,



nutricis, acidis abutentibus, de quo supra, in primis suis staminibus debilius & facilius irritabilius redditum vel ex lymphâ vitiosâ commotâ hinc inde irritatum fuerit. Cum verò ex dolore gingivarum, vicina glandularum præprimis salivarium vasa & illas integentes membranæ vellicari soleant simul, hoc ipso uberior salivæ in os effusio, indeque effluxus, quod vocant *das Geisern* ordinariò comitari, interdum aliquandiu præcedere dentitionem molestiorem solet. Quæ lymphæ si & ipsa minus temperata, sed falso-acida plus minus fuerit præter rosionem faucium & laryngis, indeque excitatam tussim subinde siccam seu inanem, ad stomachum copiosior delata, anoxerias, nunc aepusias, interdum vomitus cum tussi ferinâ, aut certè in intestinis diarrhæam plus minus serosam excitabit, vel nervosum genus hinc inde vellicando ad Epilepsiam disponet: quæ scilicet symptomata ordinariò præter vigilias, inquietudines ejulatum, febrilem æstum, dentium eruptionem comitari solent.

Febres.

§. 32. Restant adhuc febres, ut ut lentarum jam supra §. 25. rationem deduxerimus, non minus quam variolarum & morbillorum, §. 27. similiumque cum exanthematis se exhibentium, Cæterum præter has & aliæ febres variæ, aut continuas ardentibus similes, aut periodicæ continuæ, aut catarrhales, similesve frequentes sunt infantibus, quarum rationem omnem ex *ex corruptione lactis internâ*, aut ex *pororum cutis occlusione externa*, optimè explicabimus. Præter acidam enim cruditatem, quam puls & lac in stomacho infantuli subeunt, & unde ejus febres frequentissimè, nunc lentæ nunc acutæ scaturiunt, etiam variæ aliæ omninò lactis sunt depravationes, jam supra §. 19. insinuatæ, si ve in ventriculo sub digestionem, si ve in intestinis sub hujus digestionis perfectione & secum separationem obveniant. In specie cruditas nidorosa appellatur, dum flava copiosa ejiciuntur à renellis, id quod neutiquam tali in casu bilis tingentis est opificium. unde enim tanta in fœtu juniore bilis abundantia? nisi infantulos ferè omnes primo sui initio biliosiores Viris seipsis dicere velis: neque amarescunt semper hæc ipsa, sed dulcescunt potius subinde, & avidè à canibus amari omnis oforibus comeduntur. Lac potius vitiatum quacunque ratione digestionem ventriculi spontè de facili citrinescere, sufficienter declarat *Helmont. tr. schol. pass. decept. c. 3.* aded ut hujusmodi digestionis primæ multiplicia errata, ex alimentis & hinc affectibus nutricis primariò oriunda, cum non corrigi possint in secundâ digestionem, necessariò sanguineam crasin, in tantum alterabunt, ut hujus p-n. effervescentiæ febriles

febriles variæ libet infantum tis observandæ gestionis primarum addiphæ casionibus febriliter purificæ vel crebra li denique bal ut fordes cu bras retis C spirationi a constipat, brilli ferment

§. 33. Variolarum cunctos, a tum, quate lent. Propri si nutriment quod Crinit prominere Efferve Ge quali pedicu primis & pe 24. p. 118. L Sicuti & Sir ratæ, differ nes vermicu nudo oculo dulcedine a verò ipsi ini magis per tr nim Colori minentibu in fine Vill ut ab am stiano Sch Aulico de



febriles variæ inevitabiliter superveniant : id quod pariter in quibuslibet infantum , etiam ab lactatorum febribus tam lentis quam acutis observandum venit , quæ omnes ferè pro causâ internâ errata digestionis primæ in Ventriculo , & intestinis propter ordinariam eorum addiphagiam agnoscunt. Et quidem eò citius ex enarratis occasionibus febris accenduntur , quo minus per cutis cribrum insensibiliter purificatur sanguis , id quod vel defectus caloris ambientis , vel crebra linteaminum , non sufficienter calefactorum mutatio , vel denique balneorum neglectus usus inducit. Calidi sanè balnei lotio , ut sordes cutaneas infantis copiosas abstergit , & removet , ita & fibras retis Cutanei laxando , pororum apertioni , & copiosiori transpirationi amplam occasionem suggerit , cujus intermissio & poros constipat , & ex heterogeneorum coacervatorum impetu , huius febrili fermentationi uberrimam occasionem suggerit.

§. 33. Facta superius mentio vermiculorum in purulentis Variolarum pustulis , atrophia quoque superius considerata , diducunt nos , ad considerationem Vermiculorum Capillarium infantum , quatenus hi ipsi atrophiam simul jnnctam semper habere solent. Proprio nomine *Comedones* , ab abjuncta infantis Tabe , quasi nutrimentum comedendo largius absument , it. *Crinones* à figura , quod Crinium s. Pilorum curtorum nigrorum formâ foras interdum prominere per poros Cutis soleant , appellantur : Germanis , *die Mite* , *Esfer* , *die Zehrwürme*. Differunt à Sironibus , vermiculis minutis quasi pedicularibus in pustulis purulentibus sub cuticulâ manuum imprimis & pedum enatis : de quibus *vid. Sennertus l. 5. Prax. p. 1. c. 24. p. 118. Langius l. 2. Epif. 42. Gœdardius Metamorphos. p. 1. p. 126.* Sicuti & Sironum & Crinonum formæ per Microscopium consideratæ , differentes planè deprehenduntur. Sunt ergò dicti Crinones vermiculi , Capillorum spissorum seu setarum formâ curtarum , nudo oculo aspicienti se exhibentes , quando nempe mellis affrici dulcedine allecti in loco calido foras prorumpere nonnihil , frigoris verò ipsi inimici sensu denuò intrò repere observantur. Accuratè magis per microscopii adjumentum iidem observari possunt , sic enim Coloris cinerei , cornubus seu potius antennis binis longè prominentibus instructi , oculis rotundis glandiusculis , caudâ oblongâ in fine Villosa uno nomine aspectu horridi , observari solent : prout ab amico curioso & artificioso , nempe Domino Christiano Schaffero , Sereniss. Dno. Saxon. *Mauritii* Appelle Aulico dexterrimè , non secus ac alia minutissima infe-

Comedo.  
num Origo.



ctula, in specie Sirones, item Termites seu potius lendes caleorum &c.) hacce sub formâ accuratè, per microscopium observati & delineati fuerunt: ubi: a. quantitatem & figuram eorum exhibet, prout nudo oculo occurrere solent. b. ostendit Crinonem integrum per Microscopium accuratè observatum & ab iplo observatore dextre delineatum. c. est similis Crino sed cui sub separatione à Cuticulâ corporis, cauta truncata fuit: d. itidem Crino est alius, sed majorem sub sui à cuticulâ separatione noxam passus &c. Occupare magis loca musculosa, inprimis dorfi, hinc scapularum, humeri, it. surarum & crurum sub cuticula assolent. Infantes inprimis teneriores, minus robustiores affligere solent. Originem iis subministrat suppressa insensibilis transpiratio, ut rectè id suspiciatur *Horstius l. 4. obs. 53. p. 254.* quæ temperata si fuerit minusque aeris, dulcis & pinguis, retenta diutius ad putredinem ruit, unde occultata antea, & oppressa penitus principia seminalia quæ & minimo seu ut vocant in atomo sensibus imperceptibili latere possunt, sui juris facta, destinationes naturales exequuntur, & in viva animalcula prouunt *V. Velschius Diss. de Vermic. Capill. Inf. p. 363. annexâ Tr. de Vena Medinens. it. Borellus 1. Obs. 80. & Sennertus. l. 2. Prax. p. 2. c. 24. p. 302.* Nempè in Lacte, ratione alimentorum ex quibus generatur, non secus ac in pulte, milleformia insectulorum & vermiculorum latent semina, quæ in tenello infantis stomacho, non aded exactè alterata, facillè data occasione evigilare, & in actum secundum erumpere valent: hinc & quidam Crinones hos, illis vermiculis seu ascaridibus similes asserere volunt, qui in antiquis caseis innasce observantur. Hi ipsi Crinones animati molestiam admodum prurientem & continuò lacescentem plus minus tamen, sub cuticulâ admodum sensili excitant, indeque inquietos, ejulantes, & vigilantes reddunt infantes, quibus ut ut sæpius porrigant mammas nutrices, quas etiam exhauriunt, tamen inquietudine, vigiliis, ploratu confecti, minus dictum alimentum concoquere aut ritè assimilare possunt, donec emacientur tandem, & ità successivè in Tabem prouant: ut ob id existimem, non tamen ratione nutrimenti, à vermibus exhausti, quam ratione symptomatum ab istis inductorum, maciem & tabem consecutivè supervenire.

Intertriginis ordo.

§. 34. Intertrigo denique acerbo dolore exerceat infantes, peccante in specie Urinâ cujus continuâ humectatione, & hinc Salina acrimoniâ, tenerrima epidermis emolliri & relaxari, & pedetentim penitus erosa separari solet, in locis præsertim inter femora & circa

circa clunem  
ferit, læsatur  
nem partis tu  
partium div  
transpiratio  
tim in articu  
solet: in mu  
identitatem

Præserv

§. 1.  
sæ nutritio  
est, ne tam  
omnis aru  
curamus ca  
lostrum inf  
namq; est n  
modice nut  
dies, ut re  
A fieri nequ  
minus evac  
cens natis C  
rum opelu  
puritates,  
vomitu au  
sit, cum v  
incommo  
men omni  
maneant,  
lum prop  
mum sem  
nor. c. a  
lo pulv. co  
§. ad illo  
tur. Opra



circa clunes sitis. Ecoriationem istam, ulterius si processerit, læsarum partium gravius exulceratio, etiam ad mortificationem partis subinde tendens subsequitur, aliaque pathemata pro partium diversitate, subinde variantia. Præter Urinam & insensibilis transpiratio, aut sensilis transudatio, in locis impeditis, nominatim in articularum flexuris: & sub axillis modò dicti mali autor esse solet: in multis nempè sudor & Urina convenit, adeoque affectum identitatem comitem secum trahere solent.

CAP. III.

*Præservationem & Curationem Morborum Infantilium docet.*

§. 1. Cum tanta mala teneros circumdant infantes, perversæ nutritionis causa, maturè iis occurrendum, periculum namque est, ne tam malè stabilitis primis sanitatis fundamentis, in posterum omnis ærumnosè trahatur ætas. Quatuor Universalioribus ut occuramus causis pro meconii purgamento, nil æquè convenit, ac Colostrum infanti propinatum, ut supra §. 10. monitum. *Alimentum namq; est medicamentosum, quod Natura eum in finem generavit, ut modicè nutriendo, leviter pro infantis imbellicitate purget per aliquot dies, ut rectè asserit Spigelius tr. de format. fæt. c. 3. p. 17.* Quod fieri nequat, studiose in id incumbendum, ut pharmacis nihilominus evacuentur dictæ sordes. In hunc finem propinare solent recens natis Ol. amygdal. dulc. recens expressum c. Sacchar. albiss. quorum ope lubricatis & absterfis stomacho & intestinis, copiosæ impuritates, gestationis tempore collectæ, ejiciuntur, interdum & vomitu auspiciatò eliminantur, ut ut soli huic Oleo non fidendum sit, cum vel rancescendo faciliè, infanti propinatum, non leve incommodum in primis viis inferat, vel non rancidum licet, vix tamen omnia tam exactè eliminat, quin subinde aliquod sordium remaneat, Alii in usu positum habent, mell. rosat. solutiv. tantillum propinare, felliciori sanè cum successu. Mihi convenientissimum semper visum, & usu compertum fuit, si pulpa passular. minor. c. ana Syrup. de cichor. rhabarb. mista, addito pauxillo pulv. corall. rubr. præp. & Ocul. ☉ præpar. ana, horum ʒj. l. ʒʒ. ad illorum ʒʒ. addendo, cum parvo cochleari leniter infundatur. Optatò sic rejiciuntur omnia excrementa, tam per inferiora, quàm

Ut meconium removendū.



& interdum per superiora, & vitiosa meconii aliarumque sordium acescentia, futuro lactis succui perquam nociva optimè simul siccoërcetur. Denique *Syrupus de spina cervina s. domesticus*, est convenientissimum abstergens omnium sordium, & laxans infantum, speciatim si loco sacchari cum melle per se depurato sub insolatione, confectus fuerit, vix unquam fallens & sine nullo incommodo evacavans, imprimis c. pulv. Ocul. & si subactus fuerit.

Insensibilis  
transpiratio  
ut promo-  
venda.

§. 2. Ut verò insensibilis promoveatur transpiratio, ceu alter fons morborum infantilium, auspiciato solent mulierculæ, recens natos infantulos immergere balneo aquæ dulcis tepido, s. sub acido, non, qui asperrimus & sanæ rationi pariter ac constitutioni sanæ reluctans erat Veterum Germanorum mos, *V. Sennertus l. de Morb. Infant. part. 1. c. 4.* ▽ frigida aut flumini, ut hujus medio abluantur sordes viscosæ, lanuginis instar investientes teneram epidermidem, & accedente blandâ frictione ita aperiantur & magis patuli reddantur, conniventes aliàs cutis Pori. Non ineptum est, quod in more positum, ut saponis adjumento, removeatur hæc sordium coacervatio, & hujus alcalinâ lixiviali acrimonia promptius detergantur ista caseosa quasi concrementa extracutanea, sicuti si reiterantur crebrius hæc balnea, postmodum ipsi ▽, qua abluantur, modicum lixivii addere non inconsultum videtur, ut eò melius, tam resolvantur & detergantur dictæ sordes, quam hujus alcalini & beneficii, præcaveantur maturè cutaneæ infantum efflorescentiæ, ceu quas jam enatas, optimè tollunt talia alcalia, ut infra monebitur. Reiteranda autem sæpius est hæc balneatio, quoties sanitatis infantis, & in specie Virium permittit ratio, idque in primâ septimanâ quotidie, reliquis alternas aut tertiis diebus, donec exactè purificatus, glaber, mollis, rubicundus & ubique nitidus appareat fœtus. Non rarum est, flavedine quodammodò croceâ, adeoque Icteriâ decoloratione tinctos in lucem prodire infantes, quæ extraordinaria Tinctura vix melius dictus Balneis detergi penitus, & deleri poterit, quibus ab aliis simul succurri solet, gr. i. croci optimè triti in lacte nutriticis vel alio conveniente liquore exhibiti, & aliquoties in die propinati, quo ipso dicta cutis defœdatio promptius extingui potest.

quomodo  
lactis vitio-  
se alteratio  
nes corri-  
genda.

§. 3. Lactis denique & Lactationis perniciofa errata, ex iis, quæ supra §. 7. c. 10. 11. 12. 14. 15. recensita fuerunt, facillimè quivis corrigere valet. Ad hoc vero semper habeatur respectus, ut omnis ejus vitiosa acescentia, hincque grumosa coagulatio, ceu familiarissi-

ma



ma vitia, quantum possibile præcaveatur. Commendatissimus ob id nutritici sit *ansi* & hinc *feniculi* usus, siue semina eorum post singulos pastus comedantur, siue posterioris saltem radix, herbaque, quacunque ratione usurpetur: præter lactis enim ubertatem, etiam saluberrimam vim ipsi simul conciliant, aromaticâ volat. oleosâ naturâ, & acescentiam ejus præmaturam & coagulationem optimè prohibent, quin & tormina & flatus infantis feciliter tollunt. Caveat simul sedulo nutrix, ne aquæ frigida diutius aut crebrius manus immergat, & statim ab hoc lac infanti infundat, nec enim infans tantum, sed & ipsa nutrix ventris torminibus ex tali occasione læpissimè observatur corripit. Quod si inopinato terrore concussa, vel irâ percita nutrix, lactis graviolem alterationem metuat, postquam lac ex uberibus prius emulserit, assumto spermatis Ceti ꝯ. ad ꝯj. c. ꝯ diaphor. gr. XV. ad ꝯj. in haustu cerevisiæ calidæ, ad blandum sudorem se componat, quo omnis lactis corruptela sic emendetur: vel recipiat, in tumore, dolore & duritie superveniente, & ita inflammationis metu, C. C. f. Δ. ꝯj. ꝯ. diaphor. ꝯ. ꝯ vol. viperar. aut C. C. gr. viij. M. aut C. C. f. Δ. ꝯ. ꝯ. card. benedict. ꝯ. ad gr. XV. capiat in ∇ flor. sambuc. & pro suderifero resolvente assumat: vel horum loco spiritum ꝯ\* ci a ꝯ. ad ꝯj. in ∇ card. bened. hauriat, & sudorem plus minus largum expectet: Imponendo simul mammæ, in leviori quidem affectu, Emplastrum de sperm. Ceti Myns. in graviore vero inducendo mammæ emplastrum de galbano croatum Mynsicht. cum anagumm. ammoniat. in ꝯ sol. invicem liquefactis & linteo denso inductis confectum, quam calidè perferre potest: utroque in casu desuper sacculum interpassatum ex oryzâ confectum probè per calefactum imponat desuper, ut per sudorifera ista alcalina, dissolutum lac, horum adjumento promoveatur in motum, & stagnatio ejus ac grumescencia ita corrigantur mature.

§. 4. Pultis denique post Lactis curam, restat correctio, quæ in hoc consistit, ut omiſſâ farinâ, loco ejus panis triticeus, vel ut vo-  
cant simlagineus non nihil exiccatus vel induratus minutim tritus, pulvis emen-  
danda.  
cum lacte vel cum ∇ in pultis coquatus consistentiam mollem, tantillo seminis anisi pulverisato addito. Experientia me hætenus docuit optimè conducere tenellis tale pulmentum, ubertimque eosdem nutrire. Fermentatus enim panis, adeoque facilè resolubilis, promptiusque in stomacho digestibilis, quidni crudæ farinaceæ pastæ præferendus erit? Pauciores flatus inde elevabuntur, & liqui-



dior mucus post ejus usum restabit, faciliusque longè qui abstergi queat, quam è communi pulve fieri solet. Quibus hæcenus dictis ritè observatis, nullum dubium, quin infantes vitam sanam sint conservaturi diutius.

In Cura  
morborum  
Inf. oia vol  
primatum  
obtinent.

§. 5. Sed quam facilè hæc imperantur, quæ tantum non impossibilia sunt, ut observentur, idque tam à matre, quam à nutrice. Si recolentur superius, cap. 2. dicta, non poterit tam rigorosum regimen institui, quin tandem succus acidus copiosior vel parcior, acidior vel temperatior, viscidior vel serosior colligatur interdum, unde morbi infantiles plerique successive propullulant. In genere E. pro horum Curâ remedia talia conveniunt, quæ acidum destruerent, viscidum incidere, seu attenuare, utrumque pro ratione occasionis evacuare valent. Adeoque mox natiuitate propinanda sunt, & subinde repetenda remedia temperata, his indicationibus satisfaciencia. Quæ inter facilè patet nil æque præstare, quam oia vol. in specie oleosa, quæ optimè acidum corrigunt, & cum eo osum tertium blandum componunt, diureticum pariter & diaphoreticum, prætereaque penetrando potentissimè, attenuant, & resolvunt quascunque obvias visciditates. Unde spiritus o\*ci, inprimis cum aromaticis destillatus, sicque factus oleosus, item spiritus o\* anis. aut caryophyllatus; & quem mille encomiis extollo pro curandis infantibus, liquor C. C. succinatus, à B. D. Michaelis primitus in usum vocatus, & hæcenus mille experimentis, multis in casibus adulatorum pariter ac juniorum utriusque sexus comprobatus, pro infantibus curandis sunt optimi. Paratur modo laudatus liquor, ex spiritu C. C. probè rectificato & ab oleo empyreumatico depurato, qui affunditur oia vol. C. C. & o vol. succini (ab omni oleositate empyreumaticâ crebrioribus c, Aq. & S. V. solutionibus & inde præparationibus purificato) ana. q. s. ut imbibat & solvat intimè dicta oia, quæ mistura ut ut effervescat primitus, cum succini oia vol. acidum suavissimum, admodumque delicatum conjunctum habeat, brevi tamen amici coeunt. & digestionem debita ac cohobatione reiteratâ liquorem hunc commendatissimum constituunt. Nec est, quod generosa nimis, nimisque graduata putes oia vol. pro infantibus, nam circumspiciendus usus, in Lacte nutricis, vel in Aq. & syrupo menthæ fœniculæ &c. & limitata ad guttulas saltim dosis, tenellis pariter ac paulo robustioribus infantibus eadem optimè accomodare novit. Miratus sum sapius, à quibusdam vel præcon-

ceptis

ceptis opinio  
cum pavore  
sanum cura  
rum manus e  
& fixa per sp  
jungenda eu  
Reguli 8ij.

§. 6.  
alia subiecta  
infantibus  
reconveni  
commendat  
reum bene  
rum, & co  
themata op  
mnem cor  
que corrup  
gam ab Hel  
racelsusiple  
stis præfer  
Tinct. E. sal  
extracta, lo  
struo capi p  
& resolvers  
cido paratur  
ritu o\*ci, l  
mirificè con  
consuetu m  
nique suo m  
est, ut vel ca  
dimid. ad g  
sa temperer

§. 7.  
leosis, adju  
xiora paulè  
ocul. 69. &  
ralia, C. C. t  
ut & Ebur.



ceptis opinionib' ex cæcatis v. experienciâ debita destitutis medicis, cum pavore quasi audiri  $\Theta$ ium vol. mentionem, speciatim pro infantum cura, cum tamen sub legitimo & circumspecto usu, Deorum manus eadem vocandi existimem, Volatilibus hisce alcalibus, & fixa per spiritum Vini temperata in solutiones tinctas etiam subjungenda erunt, inprimis Tinctura Tartari & Tinctura scoriarum Reguli  $\S$  ij.

$\S$ . 6. Præter salia hæc volatilia, aciora vel aromatica, etiam alia subjecta aromatica oleosa, suo  $\Theta$ e vol. non destituta in genere infantibus ægris fructuosa sunt: quæ inter *anisum* & ejus semen mire convenit, quod ad  $\Theta$ j. pulv. recens quoque pro levi evacuante commendat *Heurnius method. ad Prax. l. 2. c. 26.* Juxta hæc *Castoreum* benedicta etiam est medicina, temperans mirè acidum austerrum, & convulsivos spasmos quoscunque, torminosaque inde pathemata optimè sistens. Quibus meritò annumeratur *myrrha*, omnem corruptivum acorem tollens, & balsamicâ vi, quamecunque corruptionem putredinalem inhibens, indeque ad Vitam Longam ab *Helmontio* commendata. *Tr. Arcan. Paracels. p. 626.* *Paracelsus* isple in Contil. Sterzingensibus commun. ceu optimum pestis præservans, myrrham junioribus & infantibus commendat: Tinct. E. salutis *B. D. Langii*, ex myrrhâ c. Spiritu Vini Tartarificato extracta, loco cujus & Spiritus  $\Theta$ \*ci c. Spiritu Vini paratus pro menstruo capi potest, salutare erit pueris remedium, corrigens acidum, & resolvens viscidum. Facit huc etiam elixir proprietatis absque acido paratum per alcalia, vel fixa, ut  $\Theta$  Tartari. vel volat. cum spiritu  $\Theta$ \*ci, hoc ipsum enim iis, qui adhuc lactis gaudent nutrimento mirificè conducit, sicut post ablactationem, ad quod cum acido consueto modo vulgo conficitur, tutò concedi potest. Hisce denique suo modo Theriacam & Mithridatium annúmero, quorum non est, ut vel caliditatem vel narcosin opiatricam pertimescas, modò à gr. dimid. ad gr. j. l. ij. pro ratione ætatis propines, quæ & acida vitiosa temperent, & inde illatas noxas dolorosas blando sopore fallant.

Deinde aromatica vel oleosa.

$\S$ . 7. Hisce acida corrigentibus vol. partim  $\Theta$ inis, partim oleosis, adjungenda simul erunt denique concreta quasi terrea, & fixiora paulò, acidum, quod talia rodit, in se absorbentia, qualia sunt ocul. 69. & (his vix nobilioris usus) margaritæ præparatæ, Coralia, C. C. tam communi modo, quam Philosophicè ut vocant ustum, ut & *Ebur*, simili modo tractatum, *lap. bezoar. animalis*, in genere

Deniq; fixa & paulò terrestriora.

omnes



omnes animalium partes ossæ, imprimis marinorum seu aquatissimum, & dentes, quo & *Unicornu* animale pertinet, it. *dens Hippopotami* & similia, ex quibus etiam pulvis marchionis compositus esse solet ad *Tormina* & *Epilepsiam* infantum mulierculis decantatissimus: loco cuius feliciter usurpari potest sequens: Recip. Ocul. 69. pp. 38. C. C. f. Δ. 5j. Corall. rubr. præp. 5ss. myrrhæ. el. gr. vj. l. 1x. theriac. gr. iv. olei d. anisi gutt. vj. M. fiat pulv. pro puerorum affectibus quamplurimis convenientissimus, qui si acuatur aliquot cranis 0 vol. C. C. vel cranij hum. vel viperar. erit usus ejus longè salubrior, magisque præsentaneus.

Quomodo  
purgandi  
infantes.

§. 8. Temperatus ita partim, partim resolutus succus acidus, necesse interdum est, ut eliminetur foras, idque per alvum imprimis obstetricante naturæ defectibus arte. Opratam opem hic ferunt Clysmata, cum 0 Tart., similivè lixiviali acuata, quæ mucus in crassioribus intestinis resolvunt, optimeque educunt, & stimulo reliquis intestinulis ita injecto, cætero mucos descendenti vias patentiores reddunt. Parentur saltem ex decocto fl. chamomill. 3j. ad 3ss. ad 3ij. pro ratione ætatis, addendo mell. rutac. 3ss. 0 Tart. 5ss. ad 5j. ol. d. anisi. gutt. iij. l. iv. quæ injecta feliciter operantur: vel loco talium Enematum ex lacte dulci c. therebintinâ in Vitell. ovi dissolut. mista clysmata sunt admodum egregia, idque ubi dolorosa abdominis simul urgent symptomata: quin & fortius per clysmata ubi stimulanda alvus, & detergendus mucus, non rarè vitreus, etiam talibus ex simplici vegetabili decocto paratis, pro fortiori acumine addentus est syrupus emeticus à 3j ad 3ij pro ætatis ratione, aut etiam infusum quoddam 9iale, nomine 7æ benedictæ aliàs cognitum: qualia pertinacioribus in malis, epilepsiam etiam jam minitantibus, quæ ferè semper in infantibus fomitem obtrinet in abdomine, convenientissima. Quod si necessitas incumbat, ex lacte farinaque congestum mucum ex superioribus locis potentius eliminare, præter ea, quæ supra §. 1. hujus cap. laudavimus, ( quæ inter syrupus de spinâ Cervicâ vel solum, vel cum syrupo de fumar mistus, & subinde exhibitus, omnibus palmam præripit ) imprimis jalapæ pulvis, cum triplo C. C. usti l. f. Δ mistus & ad gr. 2. l. 3. & plura, ætatis habitâ ratione propinatus, elegans est laxans, ordinatum à *Ludovico in acurvat. Pharmac. diss. 1. p. 19.* non minus quam dimidia l. unica pilula aloëtica ab eodem c. l. præscripta. Habitioribus paulò eadem mutata saltem dosi conveniunt, non minus, quam aliquot gran.



gran. & dulcis, in specie ubi ablactati fuerint, qui & mucum resolvit, & præterea quoque verminationi resistit. *Manna quoq; Calabrinæ* purior, pulvi addita, & tenellis propinata quantitate plus minus, auctâ, §ij ad §ss, pro scopi vel ætatis ratione, suaviter & blandè eisdem laxare solet. Singulare aliàs pro referendâ alvo infantum quid obtinet Muscerda, non nisi superflue delicatis horrida, cujus minutarum Pilular. no. j. l. ij. aut iij. pulv. & cum lacte vel pulve potius exhibita ad imitationem *Rulandi Thesaur. l. 3. p. 220.* vel earum 8. aut x. in lacte macerata & per linteum leniter expressa ac propinata, egregiè laxant infantes. Non me latet, esse qui scammonii usum reliquis præferunt, & ejus aliquot granula in emulsionis formam redacta, admodum commendari, vel si ejus gr. i. aut ij. syrupo de cichorio addantur. Sed hæc vix, præterquam in ablactatis & robustioribus locum habent: horreo esulinam vel rithymalinam scammonii virulentiam, adultis & robustis gravem, & subinde nocivam, tantò minus infantibus tolerabilem. Novi etiam per nutrices quosdam purgare velle infantes, quo pertinet aliquo modo, quando Papillis pulv. quidam laxativus inspergitur, de quo *Panarolus Pent. 5. observ. 10.* sed propter summam incertitudinem doseos, quæ in tali casu ad fœtum certò determinari nequit, adeoque ob metum, ne plus debito purgentur tenelli, minus tutum negotium existimo. *W. Bartholinus. 2. hist. anat. 93.* Vomitus si in pusionibus interdum, in specie in asthmatis aut gravioris suffocationis metu provocandus sit, vel per radiceos florentinæ, ad gr. aliquot, vel parum *syrupi Antimonialis emetici*, in f. qu. ▽ menth aut fœnicul. dissoluti, etiam infantibus tutissimi, idque repetitis potius vicibus, idque tutius, quam semel pro unâ dosi, idque periculosius propinati, sufficit, suadente hoc itidem experto *Ludovici c. l. p. 197.* Nam Faucium irritatio cum pennâ oleo intacta, molestior est, minusque efficax Vomitorium.

§. 9. Hisce in genere ita prælibatis, facillimè patet, specialium morborum infantilium curatio: quam & ipsam ne aliquid deesse videatur, levi calamo perstringam. Tormina E. quod attinet, cum flatibus, aut viridibus porraceisque aliisve dejectionibus p. n. conjuncta, non crebrò nimis præbenda est mamma, interea verò cum lacte potius pulv. Corollar. & ocul. ☉. præp. additâ semper anaticâ portione pulveris seminis anisi, aut loco talium pulv. marchionis, aut qui præsentanei magis est auxilii, supra §. 7. præscriptus pulvis, infundendus: Vel istis acidum absorbentibus, castorei parum addendum, & quacunque ratione fieri potest, propinandum. Theriacæ etiam

Quomodo  
infantes  
curandi.

Tormina.

† f

vel



vel mithridatii pisi vel minoris vel majoris quantitas, sub vesperam exhibita, blandam quietem sopiendo tormina præstat. Sin pertinacius malum fuerit, nec talibus crebrius repetitis quiescat, ita ut jam vel Epilepsia metuenda, supra dicti §. 5. Spiritus & liquores  $\odot$ ini vol. sacra, erunt anchora: vel fiat mistura, Recip. syrup. de spin. Cervin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Spiritus  $\odot$ \* anis.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ocul. 69. præp.  $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . M. diluantur c. paucâ  $\nabla$  fœniculi, & ita cochleatim propinentur.  $\odot$  fulminans magnâ hoc in casu observatur efficaciam, ut non immeritò à quibusdam insigniter extollatur, contra tormina Infantum, & pertinacem nimis alvi obstructionem, etiam imminens exinde Epilepsiam: datur infanti aliquot dierum, aut etiam unius septimanæ, gr. j. cum gr. iij.  $\odot$  depurati vel  $\mathfrak{z}$  iati, datur etiam solum, absque addito, in iis, qui jam sunt aliquot septimanarum ad gr. ij. vel iij. propinatur in lacte, vel quod melius in vehiculo  $\nabla$ æ destillatâ idoneo, & præter alios affectus, quos aliquoties admiratus fui, tormina sistit, horridas dejectiones alvi promovendo, & insultus epilepticos sopit. Varietas observatur in ejus operatione, nunc citius, nunc tardius operatur, debilius itidem, aut vehementius, prout uti suspicor plus minus in Ventriculo infantis à grumo lactis, vel muco pituitoso irretitur, & quasi in viscatur. Suppetias hæc simul ferant inunctiones externæ, ex oleis destillatis cumini, carvi, anisi, fœniculi, chamomill. cortic. aurant. &c. oleo chamomill. per infus. ceu corpore, a. oleo nucist. express. aut ol. stomachal. Craton. exceptis, ne illorum destillatorum acrimonia dolorem ex excoriatione inferat, & circa umbilicum inunctis. Quod si tenacior mucus dictorum malorum fuerit autor, exterius specialius unguentum conducet, ex gumm. ammoniac. in  $\mathfrak{x}$  sol.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . therbinth aloës a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . sevi Cervini & butyri non saliti q. s. pro consistentiâ debita, ulterius quoties illiniri debet oleo d. anis. irrorandum, & ita dictis locis umbilicalibus applicandum, quoties opus fuerit, aliquali portione fellis tauri acuendum. Cum vero pathemata hæc insigniter exasperari soleant, alvus si clausa fuerit, ob id studiosissimè proficui<sup>9</sup> clysmatum supra laudatorum usus observandus erit: attendendo sedulò, magisne acrimonia acida, an visciditas causæ peccantis urgeat, ut ita defectus aliquis instituatur. Speciatim tenuia & liquida, laticis cujusdâ instar plus minus flavedine tincta, ut ut acerrima, & præter gravia infantû tormina, etiam excoriatione podicis subinde inferentia observantur, excreta, in quo casu, Clysmate simplici ex Lacte bubulo cum paucis saccharo imprægnato, injecto, & dicta acrimonia temperari, & quæ imminet intestinorum crassorum gravis læsio ac

excoria-

excoriatio tu  
que felici suc  
quoque abdo  
reliquis prof  
par. crebrius  
ritus  $\odot$ \*ci a  
mini, anisi, c  
tur,

§. 10  
ut vocant  
evacuatus  
moschat, c  
tendus, vel  
ces etiam ex  
gendus, idq  
infantes, n  
in Vino cor  
frustulum p  
vel aliquot g  
chal. regio i  
rejiçiantur  
nis motu ex  
marum mo  
rum per ista  
Vomitui Vi  
mis cohiben  
anhelando a  
sis speciebu  
ctu, studio  
sens nam qu  
laginosâ re  
Erythimo op  
non minus  
temperatu  
mitior qui  
in taleolas  
substituiri  
affecta & a  
tumax sicca



excoriatio tuto præcaveri potest. Recensita hæctenus & ipsa, non absque felici successu, in inflatione hypochondriorum, aut tympanitica quoque abdominis distensione in usum revocari possunt, anisi præ reliquis proficius est usus, sive ejus pulvis cum dimidio Corall. præpar. crebrius infanti propinetur, sive eleosacharum anisatum, aut spiritus  $\Theta^*$ ci anis. sedulo ingerantur, & extra quoque oleum destill. cum mini, anisi, cum oleo chamomill. vulg. calide hypochondriis illinantur.

Hypo-  
chondr.  
inflatio.

§. 10. Quod si Vomitus turbet infantes, isque per essentiam ut vocant fuerit, sinendus est, donec vitiosus mucus, aut acris latex evacuatus fuerit, & cum moderato lactis usu interius pulv. ex nucem moschat. corall. & caryophyll. paucis propinandus, & subinde repetendus, vel temperatior cinamomi  $\nabla$  spirituosæ infundenda, Theriacæ etiam externus pariter ac internus usus in minutâ dosi non negligendus, idque etiam si per consensum fuerit: quod si ablactati fuerint infantes, non immeritò decoctum caryophyll.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . & mastiches.  $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . in Vino commendat *Joel. Prax. l. 9. f. 4. mebr. 3. p. 344.* Externe frustulum panis Vino malvatico ebrium stomacho imponendum: vel aliquot gutt. ol. destill. macis, ol. nucist. express. exceptis, stomachal. regio inungenda. Quod si variegata, multiformia, Vomitu rejiciantur recrementa, cum talia non absque perverso regurgitationis motu ex superioribus intestinis in Ventriculum, eveniant, clysmatum modò laudatus usus non negligendus, perversum intestinorum peristalticum motum irritando inferiora versus corrigens, & ita Vomitus Violentiam cohibens. Sed ut supra monui, non est citò nimis cohibendus vomitus, inprimis quando nausea urget, aut stertor anhelando auditur, quin potius in tussi ex stomacho, præ cæteris tussis speciebus furibunda, difficilique respiratione & asthmatico affectu, studiose, nisi sponte superveniat Vomitus, provocandus erit, præsens namque levamen affert: Pro reliquiis a. materiæ acidæ mucilaginosæ resolvendis, syrupus de nicotiana legitimè paratus, ut & de Erysimò optimè cum  $\nabla$  hyssopi vel menthæ propinati conferunt, non minus, quam raphani succus recens cum saccharo depurato temperatus, ingratus licet, efficacissimus tamen est: in cujus locum, mitior quidem non minus tamen potens, liquor sacchari ex raphano in taleolas inciso, saccharoque largiter insperso defluens, commodè substituitur. Quod si non ex stomacho, sed pectore a. larynge potius affecta & à lymphâ acriori, vel aere inclementiore irritata, tussis contumax sicca, sæpius nocturna oriatur, sperma ceti, quacunque ratione

Vomitus.

Tussis &  
Asthma.

Catarri.



commodissimè in jusclo vel cerevisia a. lacte probè calido propinandum erit, spiritus quoque  $\odot$  xci anisatus, insigni hic meritò extollendus encomio, etiam ubi dentitio difficilior talem tussim, quod interdum contingit excitaverit, quo in casu vomitorium interdum præmittendum erit: sed præ cæteris Liquor. C. C. succinatus, supra pluribus laudatus, in affectibus infantum Catarrhalibus quibuscunque primum meretur locum. Nec contemnendum hic est euporiston muliercularum, ex *Cratonis, trium Imperatorum Archiatri*, experientia ipsis compertum, nempe jusclo decoctionis raporum c. saccharo sedulo infantibus porrectum. Adultioribus paulò, decoctum rad. helenii c. uvis corinthiacis in Vino paucò addito saccharo confert, non minus quam loch de passulis cum mucilagine seminis linia. cydoniorum permistum est blandum temperans. Externè in tali tussi sicca inunctio plantarum pedis vespertina cum pinguedine lucii piscis est proficua. Quod si verò singultus ex quacunque causa adfuerit, isque paulo pertinacior sit, vomitus in primis conducit, evellendo acres acidas sordes, stomacho in specie sic dicto adherentes, propinando postmodum pulv. Joelis in omni singultu ab eodem æstimatum, ex C. C. usto & Corall. præp. an. mistis conflatum, gutt. j. l. alteram Ol. d. cinamomi a. anisi addendo, nec omitendo proficuum Theriaces usu aut quod sæpius jam laudavimus, nostras aroma, anisum nempe, singultui etiam adultorum appropriatum, externo pariter ac interno usu, non minus, quam polychrestum Castoreum.

Singultus.

Lumbrici.

§. 11. Vermium otiosa proles, mille incommoda inferens, feliciter vix exturbabitur, quam  $\Phi$ ialibus per os exhibitis, infusis tunc simul clysmatibus ex lactis vaccini vel muliebris  $\mathcal{Z}$ ij, ad  $\mathcal{Z}$ ij. additâ sacchari s. q. ut illorum hostili impetu, in fugam versi lumbrici, hujus dulcedine allekti, melius decipi queant. Usurpantur  $\Phi$ ialia vel in formâ  $\Delta$ æ ut vocant, Hermetica, s. quam  $\Phi$ ius vivus in eadem bulliendo suo contagio infecerit, vel in forma pulveris, si nempe  $\Phi$ vivum cum certo quodam succo ut inquit *Schræderus Pharmac. l. 3. c. 5. p. 398.* id est, cum saccharo continuatâ tritura in pulverem redactum propinaveris in cochleari ligneo, loco cujus & in ablactatis  $\Phi$ ius dulcis cum conservâ fl. persicorum, l. cum saccharo in rotulas redactus commodè usurpatur. Quod si quis horreat ad  $\Phi$ ii nomen, is gentianæ pulverem cum CC. s.  $\Delta$ . & tantillâ myrrhæ, jurato lumbricorum hoste (vel quæ præsentaneam magis fert opem, Tinctura salutis) exhibere poterit; vel saltem spiritum &  $\odot$  vol. C. C. adeoque & polychrestum

chrestum liq  
guentum ex  
thid. acuata  
namque faci

§. 12.

laudata sæpi  
tem corrige  
atus, præm  
id lactation  
nem liquor  
erit proficu  
ut & arcan  
risata, erun  
Linimenta  
Martiato, a  
quorum fo  
anat. Præf.  
dium ab Ha  
quod Verter  
litum: cum

152. & spe

§. 12.

neglecta ba  
stam Lactea  
viperinis in  
per. Pulver  
pra laudat  
aut Ocul. S  
 $\Phi$ ialia, quib  
tica in tene  
spon. 43. p.  
endæ, pulv  
xietates præ  
supervenit  
perim. Ph  
mentis sat  
blandè in  
bitur succo  
vel diapon



chrestum liquorem C.C. succinatum Applicare potest præterea unguentum ex aloë hepaticâ c. felle tauri subacta, & cum Ol. colocynthid. acuata regioni umbilicali, cum portione vesiculæ suillæ, sic namque facillè invisi hi hospites eliminabuntur.

§. 12. Quod si denegatus alimenti transitus atrophiam inferat, Atrophiam. laudata sæpius volatilia, & alimenti depravationem ejusque visciditatem corrigent, & forti penetratione reserabunt obstructos antea meatus, præmissis & interdum iterato sub inde blando laxativo, quæ ob id lactationis tempore subinde iteranda erunt, sicut post ablactationem liquor Tartari à *Barbette in Prax. l. 3. c. 2. obs. 3.* commendatus erit proficiuus, ut & Tartarus Vitriolatus Tacheniano more paratus, ut & arcanum duplicatum *Mynsichti*, & Tinctura Vitrioli & Tartarisata, erunt utilissima. Externè ad resolvendâ spissiore mucilaginé Linimenta ex gumm. ammon. supra §. 9. laudata, it. quæ sunt ex Ung. Martiato, althææ composito, Ol. Philof. felle tauri &c. erunt proficiua, quorum formulæ, vid. in *Sylvii Prax. li. c. 14. p. 167.* & *Barbette c. l. it. anat. Pract. l. 1. c. 14.* Ceu præsentissimum, sapeq; probatum remedium ab *Hæfero Herc. Med. p. 349.* commendatur Pulmentum illud, quod Vertex ferreus rotæ molaris, inter movendum colligit, extra illitum: cum hisce conferantur *Miscell. Acad. Nat. Cur. anno 2. obs. 152.* & speciatim anno 3. obs. 250.

§. 12. Quod si Cutanea ex vitiata nutritione subinde etiam Tineæ & Achores. neglectâ balneatione efflorescant Vitia, in achores, Tineam & crustam Laeteam &c. internè alcalinis Volatilibus sæpè laudatis, in specie viperinis insistendum, tantillum Liquoris C.C. succin. aut ⑥ vol. viper. Pulverisve cujusdam Viperini propinando, vel Tincturam ③ supra laudatam crebrius guttatim exhibendo, vel C.C. f. Δ. aut ③ diaph. aut Ocul. ⑤. c. paucâ myrrhâ iteratis vicibus usurpando. Externè Zialia, quibus hoc in passu subindè abutuntur, vitentur, cum Epileptica in tenellis adeò subjectis inducant symptomata, *Timao* teste *Respon. 43. p. 106.* nec lotiones pro curandâ tineâ ex Nicotianâ instituendæ, pulverisvè ejus insersiones ebrietatem enim turbulentam, anxietates præcordiorum c. lipothymiis Vomitus, & copiosos, secessus supervenisse talibus observatum est, à *Celeb. Boyle Usefulness. of. Experim. Philos. p. 211.* & à *Fehriotr. d. absinth. p. 90.* Potius Postulæ linimentis saturninis a. Sulphureis acidum absorbentib. a. temperantib. blandè inungantur, quib. si add ⑥ Tartari modicum, exoptatus habebitur successus v.g. pulv. fl. Sulph. excipiat ungu. de ceruss. camphor. vel diapomph. c. l. q. Ol. nicotian. vulgar. addendo ⑥ Tartari plus minus,



aus, prout acius vel mitius postulamus linimentum, quo ipso illitæ pustulæ optimè exarescent & curabuntur, facit huc etiam unguent. expertum *Panaroll. Pent. 5. obs. 31.* ex Sulph. axungia (portinâ) & succo limonum, quò illitus locus tineâ defœdatus aliquoties, & postmodum decocto malvarum ablutus, optimè restituitur. Vulgaria fugim<sup>9</sup> meritò Unguenta, & Linimenta, ubi simplicia cerâ, Oleis, therebinth. pinguedinibus, resinis similibusvè permixta, & partim saturata, partim obruta & subacta, nullam operandi vim exferere valent, nisi quod poros cutis dense incrustando malum longè deterius reddant. Merito a. duplex harum in Cute efflorescentiarum status, duplicem mendendi rationem Medico insinuat. Interdum enim pustulæ hæ, ex acriori acido in manantia jam degeneraverint ulcuscula, acrem plus minus, tenuemque saniem jugiter plorantia, quibus leviter linteo, vel spongiolâ, & spermatis ranarum turgidâ absterfis, inspergantur pulveres acida absorbentes, viscida modice resolventes, & ita ut vocant exsiccantes, & detergentes, qualia componuntur ex Creta, Lacte Lunæ, Succino C. C. usto cerussa. tutia, myrrha, fl. Sulph. & similibus, præ cæteris crocus. & ex ejus  $\odot$  lo per lixivium  $\odot$  Tartari præcipitatus & probè edulcoratus, ex nodulo leniter inspersus, mirabilis existit, cui tantillum  $\odot$  Tart. cosmetici summi, quantum nempè sine doloris sensu perferri potest, inprimis si contumaciores fuerint, aut subinde repullularint defœdationes dictæ, consulto permiscetur. His namque absorpto acido, & deterfo viscido, sponte successivè coibunt ulcuscula, idque citra ullum recidivæ metum. Sic enim v.g. *Lactumina, der Ansprung* / faciei si offuscant nitorem, pustulis in specie manantibus inspergendum est: *℞. pulv. Lap. calam. ʒj fl. Sulph. Dij. cerussæ. ʒss.  $\odot$  Tartari gr. xij l. xv. M. f. pulv. subtiliss. inspergendus.* Quod si v. mitius in dictis ulcusculis peccaverit acidum, idque jam sub sua  $\odot$  sedine temperata cum purulentia viscidâ coiverit, in tenaces & subindè spissas crustas, sufficiant simpliciter alcalia fixa crustas emollientia, & acidum vitiosum in radice penitus destruentia, quem in finem vel lixivio vulgari blandè humectentur, subinde dictæ pustulæ, vel oleo Tartari per deliquium eadem blandè quasi illinantur, vel ex dicto oleo per deliquium cum oleo expresso amygdal. dulc. fiat subtilis litus, dicto modo applicandus; Quod si grandiores tumores glandularum circa capitis protuberent confinia, applicandum est pro eorum dissolutione Empl. de melilot. malax. c. ol. Philosoph. vel fiat composuit. ex eodem cū Emplastr. de galbano Crocato, *Myns.* & ita

& ita impo  
modo rece  
morbo sum  
lymphæ co  
etur morbu

§. 13.  
earum, seu  
nem, inde  
optimè ter  
leg. nastur  
in emulsi  
redacta, q  
ro & § dia  
creditor, e  
castorei co  
cibus exhib  
venit. M  
sus, tot exp  
salutis supra  
storei, tam  
fœrida, cu  
ter ac curat  
Dictis usib  
mus) simili  
ducit, ste  
in Variolis.  
pustularum  
est ad matur  
reiteratus a  
horum exar  
nerioribus  
vix inveniet  
super ejus  
confert,  
potu quotie

§. 14.  
infantum in



& ita imponantur, aliquandiu relinquendo. Quaecunque autem modo recensita externa, non nisi præmissis internis, & fomitem morbosum tam in primis viis, speciatim in stomacho, quam in latice lymphæ corrigentibus & delentibus in usum vocanda sunt, ne pallietur morbus externus, & gravior internus inducatur affectus.

§. 13. Variolæ vel morbilli si affligant infantes, expulsionem Variolæ earum, seu acidi visceris peccantis ex lymphæ & sanguine separationem, indeque natæ febrilis effervescencia mitigationem promovent optimè semina ista expulsiua dicta, napi videlicet. card. bened. aquileg. nasturt. &c. cum additâ myrrhâ pauca, c. v. sambuc. & scabios. in emulsionis formam, ad imitationem *Zwelferi Phar. reg. p. 209.* redacta, quæ infantibus perquam salutariter porrigitur. De cætero & diaphor. tam vulgare, quam quod magis appropriatum hic creditur, ex *§io Vitæ* paratum, additis granis aliquot myrrhæ item castorei consulto in v. vel vehiculo appropriato iisdem, reiteratis vicibus exhibetur, non secus ac C. C. f. Δ. simili modo salubriter convenit. Myrrhæ nunquam in Variolis aut morbillis negligendus usus, tot experimentis jam confirmatus, unde & essentia myrrhæ seu salutis supra laudata, comprobata hic est efficaciæ, uti & essentia castorei, tam simplex, quam quæ magis est composita ex castoreo & alia foetida, cum spiritu vini Tartarificato parata, seu præservativa pariter ac curativa suo modo Variolarum ab aliis est commendatissima. Dictis usibus (nisi superflue delicati in remediorum selectu esse velimus) similiter infusio stercoris equini in potu ordinario mirè conducit, stercoris tamen ovilli usus, huic adhuc præferendus est in Variolis. sicut in Morbillis Caprillum eminet. Promotâ sic pustularum eruptione & corporis fervore tepescente, id quod deest ad maturationem earundem, pulv. ocul. &c. myrrhâ crebrius reiteratus absolvit. Quod si gravior acrimonia, sub eruptione horum exanthematum, Epileptica intulerit symptomata, in tenerioribus spiritus C. C. Succin. aut Θ vol. Cran. hum. par sibi vix inveniet remedium, sicut robustioribus paulo Cinnab. & super ejus basin constructum specificum Cephalicum, optimè confert, in primis c. dictis Volat. sociatum. Nutrix interea in potu quotidiano diligenter gelatinam C. C. dissolvat & hauriat.

§. 14. Aphtharum molestiæ, quæ ut plurimum lactationem Aphthæ infantum impediunt, ut removeantur, egregiè confert raparum in v. cocta.



coctarum, succus expressus, cui tantillum sacchari vel mellis additum fuerit, quo eluatur & abstergatur frequentius os eorum: vel quod aliis per placet, raparum supra Ae, tecto vase, sine  $\gamma$  assatarum succus expressus, etiam sine saccharo optimus, dicto modo illitus. Aut horum loco  $\Delta$  extinctionis chalybis, in quo salvia & parum mellis bullierint modicè commodè pro eluendo ore administratur. Decoctum quoque veronica cum melle in  $\gamma$  simplici factum, pro ore eluendo, est usu frequentiori compertissimum. Quod si maligniora, aut etiam serpentina oris fuerint ulcera, idque in ablactandis imprimis, nam lactentium nutrimentum lacteum pro medicina ex parte inservire potest instar omnium sit linimentum ex melle c. tantillo spiritus Vitrioli, vel quod magis placet, c. spiritu  $\Theta$ is impregnato subinde ori illitum.

§. 15. Epilepticos tandem insultus, eorumque prodromos somnū turbantes pavores, ut curemus, nobile est remedium Sulph.  $\Xi$ ii, ex huius scoriis ultimā vice certo modo precipitatum, gr. j. & in robustioribus paulo gr. jss. dos. Epilepticos insultus tam imminentes quā præsentes sistens, simulque mineram morbi, si quā reperiatur in primis viis, auspicatō vomitu exturbans, quibus locis repurgatis, etiam repetitis, vicibus sine tali effectu tuto propinari potest, blandā quiete & diaphoresi, non vercam hanc potius quam matrem puerorum sopiens. Interim nō rejiciendum puto, communia euporista, qualia sunt pulvis marchionis, ratur. cran. human. Unicornu marin. & hippopotam vel Unicornu fossile, bezoar lap. &c. omnia enim hæc acidum nervos infestans absorbent, & ita malum, non mediocriter levant, interdum planè tollunt. Quibusdam præterea ceu inter secretiora ad Epilepsiam Infantum remedia asservatur pulvis iste citrinus, seu farina musco terrestri clavato, h. e. lycopodio insidens Sulphureæ prosapiæ, adeoque faciliè flammam concipiens, & instar pyri pulveris crepitum edens, qui ad  $\mathfrak{D}$ ss. ceu summum Epilepticum puerile commendatur: cui tamen adhuc præferendam existimo similem Sulphuream farinam in julis Coryli pro vere reperibilem: cum Coryli lignum mirabile istud heraclinum oleum, singulare antiepilepticum Rulandi fundat, ritè destillatum, sicut & viscus Corylinus, nobile euporiston ad Epilepsias esse solet. Sed ubi talia non suffecerint, omnibus præferendus est, liquor C. C. succinatus crebriori experientia ad pueriles affectus epilepticos comprobatus, ex quacunque causā originem traxerint, etiam si dentitionis difficultas easdem excitaverit, suo tamen optimè officio satisfacit. Externè abdomini, cordisque, ut vocant, serobiculo inungendum est balsamum succini, ceu optimum euporiston.

§. 16. Den-

§. 16. gravissimo  
moveatur, &  
mitigandis, c  
& gingivæ m  
brius succo  
dæ, aut balla  
567. descrip  
aridum in  $\gamma$   
tur, ut huius  
antur gingiv  
recentis, lu  
lectus, & gi  
pensè quib  
ctum & me  
modo appli  
perior ejus  
gnum exhib  
libiq; comp  
97. Extra m  
loroso dicto  
oleū amygd  
aut psyllii, T  
venientia sy  
optimum fe  
quibus, cum  
tentantur in  
servetur tali  
tur, conf. H  
tritis caco  
torum crasi  
laborare aff  
vehiculo pu  
inprimis m  
§. 17. etiam med  
cunque æta  
mitioris spi  
hollaticum



§. 16. Dentitionis laboriosum, & tenellis ob symptomatum gravissimorum syndromen subinde mortiferum negotium ut promoveatur, & doloribus leniendis & symptomatis supervenientibus mitigandis, omnis opera impendenda erit. Dolor ergo ut leniatur, & gingivæ minus sensiles, simulque molliores reddantur, eadem crebrius succo Cancr. fluvatilium contus. c. ∇ fl. cyani extracto illinenda, aut balsamo puerorum dentientium à J. D. Horstio in dispens. p. 567. descripto, eadem inungenda: rad. altheæ frustulum recens, vel aridum in ∇ malvæ maceratum, sæpius masticandum infanti præbeatur, ut hujus mucilaginis à salivâ sub masticatione extractâ, emolliantur gingivæ melius: cujus loco non ineptè alii frustulum corii lardi recentis, substituant. Sanguis ex crista galli parum incisa recens collectus, & gingivis illitus, ad dentium eruptionem promovendam impensè quibusdam laudatur. Non secus ac leporinum cerebrum coctum & melle permixtum, ceu unum ex potentissimis remediis, simili modo applicatum. Aliis irritis, si protuberantia gingivarum, & superior ejus candidior reddita ora, dentis jam proximè absconditi signum exhibeât, scalpello eas incidit *Parvus* l. 23. c. 67. quod ceu tutum sibiq; compertum & summè proficuum commendat *Borellus* 1. obs. 97. Extra maxillæ & regioni temporum loci dolentis pro spasmò doloroso dictorum locorum leniendo illinatur medulla ciurum Vituli, oleû amygdal dulc. chamomill. ungu. d' altheæ: mucilag. rad. altheæ, aut psyllii, Theriaca &c. Ut verò reliqua interea mitigentur supervenientia symptomata, qualia primariò sunt febris & convulsiones, optimum fuerit, si alvus quantum possibile servetur probè fluida, nã quibus, cum dentes erumpunt, alvus crebro demittit, minus convulsione tentantur inquit *Hippoc. de dentit. Lib.* hinc vel sponte alvus fluidior servetur talis, vel eadem clysmatis, similibusq; remediis laxior reddatur, conf. *Hæfer.* Herc. med. p. 355. Indeque speciatim in iis, qui ex nutricis cacochymia minus laudabilem sanguinis, reliquorumq; cõten-torum crasin obtinent: nam & tales ordinariò gravius sub dentitione laborare assolent. Internè Gelatina C. C. recens, crebrius quocunque vehiculo propinata, & hinc Liqu. C. C. succinatus, ob convulsionum inprimis metum, medicamenta sunt tutissima & utilissima.

§. 17. Ad febres nunc devolvimur, quarum varietas, variam etiam medendi methodum exigit. Intermittentes, ut ut rariores, quocunque ætatis tempore affligant pueros, curat præmissis in specie Vomitoriis spiritus ☉ci, aut loco hujus ☉ absinth. fixum, vel deniq; ☉ holsaticum dictum aliàs arcanum duplicatum Mynsichti. Continuas



verò lentas, ex acido viscido, hisq; cognatas catharrates, ex lymphâ nimis acidâ, post laxativa & clysmata, vix aliud remedii genus melius, quam spiritus ☉ & ci. simplex aut anisatus aut Liqueor C. C. succinatus curabit, in specie posteriores, ad quas etiam Tinctura myrrhæ salutaris existit. Quod si verò ab lactari sint, optimè liqueor Tartari, supra laudatus, it. ☉ & cum c. dimidio Ocul. ☉. sæpius reiteratum, eas profligabit. Continuae ardentes, hisq; similes, ut ut raræ affligant tenellos, eos tamen Vomitu, in primis præmissis, aut aliis evacuativis, profligant ☿ diaph. ut & C. C. f. Δ. & cum eodem compositus pulvis febrilis Ludovici in pharmacia p. 280. & 282. quin & in potum ordinarium, quem præter lac a vide subinde appetunt, in nodulo infusum sterco equinum, vile quidè, sed non nisi delicatis superstitiosè contemnendum est euporiston, loco cuius tamen & Gelat. C. C. tam infanti, quam in specie etiam Nutrici in potu ordinario frequenter propinetur, insignis his in affectibus usus. Aliàs si robustiores paulò extiterint ☿ atum, uti & arcanum dupl. Myns. modò laudatum, cū modo dictis exhibita, sunt egregiè proficua: quin & nil impedit, quò minus etiam misturæ blandæ acidulæ, pro compescendo æstu sitique molesta propinentur, sicut & feri lactis cum succo Citri acidulari potus est non ingratus. Quod si malignitas conjuncta fuerit, præter modò enarrata etiam emulsio supra de Variolis laudata, c. C. C. f. ∇, diaphor. Terra sigill. & similibus in specie convenit. Misturæ quoq; cum diascordio Fracastorii, aut moderatâ Theriacæ dosi imprægnatæ in paulo robustioribus tuto in usum revocari possunt.

§. 18. Crinones, v. Vermes si affligant pueros, post Tincturam ☿ ii Balnei repetitus usus, præservative pariter & curativè eosdem remover. Pro maturandâ tamen genitorum remotione, consultum est, ut Balneo ∇æ dulcis, mellis modicum addatur, quo sub lotionè hujus dulcedine allecti vermiculi per poros capitibus suis prominentes commodè, vel unguibus acutioribus, vel vossellâ exigua subtiliter extrahi queant, id quod aliquoties reiterandum erit. Alii in more positum est, ut ablutos in Balneo infantes, manu melli intinâ & blandè perficient, & hinc prolectos Vermiculos vel crustâ panis duriore in formam aciei cultri rescissa, idque tutius, vel scalpello, idq; minus securè abradant & removeant. *Petrus à Castro, Tr. de Colostro.* mulierum Lusitanarum experimento fuliginem Caminariam cum melle & lacte mixtam, dorso illitam laudat. Præ cæteris, modò dictorum, uno alterovè præmissis convenit ∇ aloëtica *Timæi*, quotidie aliquândi inuncta: de cuius usu; *vid. l. 5. cas. 23. descript. c. l. cap. 4.* quinimò putarim,



putarim, & hermeticam s. decoctionis Quivi, uti Lumbricis & sca-  
biei optimè conferre solet, etiam eandem in Balneo cutim abluendo  
usurpatum, citra ullum periculum dictos Crinones necare & tollere  
posse. Plura de his *vid. in Velsch. supr. cit. Locis.*

§. 19. Intertrigo, si tenellam Cutim cuticulæ tegmine spolia-  
verit, vix citius aut jucundius removetur, quam croco & ex Vitriolo  
præcipitato supra laudato, sine ullo vel minimo sensu excoriata loca  
restituens: cujus defectu & Terra Vitrioli dulcis consulto substitui  
poteft: Vel si macularum in linteis exinde nata flavedo sit obstacu-  
lo, usurpetur pulvis ex C. C. usto, creta, & pauca cerussa, quæ ipsa  
nodulo tenui inclusa suspensa manu blandè inpersâ, super imposito  
lineteolo quicquid fuerit mali, sistunt.

§. 20. Hæc ipsa, quæ hæctenus tractata fuerunt, uti primariò,  
de tenerioribus, & quæ nutricis adhuc sustentantur Lacte intelli-  
genda veniunt, infantibus, ita eadem mutatis mutandis de facili  
quoque ablactatis & vegetiore robore jam jam adolescentibus ap-  
plicari possunt. Modò consideremus, quoscunq; infantes, & spe-  
ciatim qui laetiori gaudent dicæ, & à teneris unguiculis luxuriosè  
magis, quam salubriter educari solent, ob communem iis ad dipha-  
giam & quasi voracitatem obnoxios esse cruditati acidæ ex qua ceu  
uberrimâ scaturigine, similia iis, quibus sub lactatione, ex lactis p.n.  
acescentia & corruptione &c. &c. conflictari solent, mala in eosdem  
largiter redundare solent, quæ ipsa etiam, aut iisdem ferè aut simili-  
bus medicamentorum generibus profligenda erunt, quo tenera hæc  
proles, in Divini sui Creatoris Gloriam, & Proximi Salutem benè  
educari ac institui jussit. Ipsi Conditori Cœli & Terræ, sit

S O L I G L O R I A.





# I. N. S. S. T.

## De Virtute Opii Diaphoretica.

**S**Terile, si quoddam aliud, in Scholâ Medica semper ex-  
titit dogma illud, à superiorum seculorum in *Galenum & Avicen-*  
*nam* Commentatoribus nobis relictum, quo simpliciter ex quatuor  
sic dictis qualitatibus primis, eorumque absque fundamento, gra-  
duationibus multiplicibus, mirabiles corporum vires & præsertim sim-  
plicium operandi rationes, tantum non omnium dilucidare saragunt. Su-  
perstructum fuit illud, si primam ejus perscrutemur originem, ruinoso &  
arbitrario saltem Peripatetico Elementorum quaternioni, qui præter alias  
turbas, tam in Theoria Physices, quam hujus Praxi, Medicina, huic quoque  
asserto primas occasiones suggessit: aded *Dogmata Aristotelis, nullum ad-*  
*iumentum, sed potius multum impediementi adferunt Medicis studiis, sive*  
*tum Theoria, tum Praxi*: ut loquitur Eruditiss. *Jungius*, in *Doxosc. Phys.*  
*Min. p. 2. S. 1. proæm. Aff. 1. Schol. 3.* Sanè si ritè negotium hoc confi-  
deremus, nullas tales in corporibus deprehendere licet, cujusvis generis  
qualitates, quas ipsis ordinariò affingimus, seducti nimirum per pluralita-  
tem attributorum respectivorum, quorum originem ad tot distinctas ent-  
itates qualitatum malè referimus, cum ex pluralitate & diversitate occur-  
rentium saltem objectorum externorum oriantur. Aded nec Ignis est ca-  
lidus, calorisvè tantillum possidet, nisi in quantum organa nostri corporis  
ita sunt fabricata, ut ratione motionis celerissimæ ab acidis ejus particulis in  
iisdem excitata, quam caloris nomine appellamus, illi calorem attribuimus:  
pariter atque nec ferrum ab eodem calefit, nisi in quantum hoc ab igneis  
istis particulis in sui minimis motum, nostris sensoriis talem impressionem,  
caloris notione insignitam facit. Potius qualitatis nomine, (*ποιότης &*  
*ποιέν*) cum Curioso isto Gallo, facilitatem sive agendi facultatem intelli-  
gamus, quæ omnis, cujuscunque fuerit generis, nunc immediatè, nunc me-  
diatè,



diatè, ex corporum essentia & constitutivis principiis fluunt. Pluribus jam suspecta fuit ista, per qualitates præsertim primas putatas, Philosophandi in naturalibus ratio, unde *Fernelius* pariter ac *Sennertus*, insanix opus esse dixerunt, ad manifestas qualitates omnia reducere velle. Quarum loco, cum occultas substituere nitantur, profecto negotium potius implicant, quam explicant, dum manifestarum illarum æque abscondita sit, quam occultarum qualitarum natura: & nemo Illorum, caloris in Igne Naturam & operandi modum clarius explicare potuit, quam magnetis, ferri vim Locomotivam. Observarunt hoc plures, in Theoriâ Physica excellentes Medici, unde sub ætatis suæ tenebris, si quis alius *Lynceus Fernelius*, hinc inde in eleganti & erudito, de *abdit. rerum causis* Tractatu, operationes corporum singulariores, à tota eorum substantiâ oriri statuit, pluribus applaudentibus Naturæ consultis, id quod reipsâ idem sonat, ac cum Modernorum plurimi, audacis ingeniosique ( ut *Boyleo* hætenus incomparabili, in *præfat. introduct. in Chym. Scept.* audit ) *Helmontii* terentes vestigia, ex feminibus & virtute rerum seminali, quaslibet concretorum naturalium dotes derivant. Nempè ut illi, in rei substantiâ, formam in specie considerarunt, per materiæ modificationem operantem, ita hi principium seminale, mediante speciali materiæ texturâ, seu quorumvis attributorum & qualitarum fundamento, activam, respiciunt. Atque hic terminus est ultimus, ultra quem progredi nescit humana de naturalibus rebus cognitio, siquidem tam Tota istorum substantia, quam vis horum seminalis à priori nobis Mortalibus planè delitescit incognita, quia immediatè fuit ex imperscrutabili sapientia & omnipotentia Divinâ, cujus revera sunt characteres, ab aliis Ideæ appellati, materiæ sub primâ corporum creatione impressi, quorum beneficio & adhuc dum fecunda existunt rerum semina, & qui ipsi à priori nullo modo, sed à posteriori saltem per effectus à nobis cognoscibiles existunt. Exerunt autem se, tam in corporum productione, quam productorum operatione, per multiplices materiæ Schematismos, sive conformationes & permutationes mechanicas, ac propterea ex materiæ secundum minima texturâ ac modificatione multiplici & inde dependente variâ ad alia conereta habitudine sive respectu, tam activo quam passivo, seu fonte tot attributorum, clare magis, magisque distinctè, quam ex qualitatibus, nominatenus saltem notis, quibusvis, admirabiles istæ operandi rationes explicandæ veniunt. Specialis autem ista à semine immediatè fluens, & in minimorum figurâ, magnitudine, situ, ordine, & nexu &c. proximè fundata textura, cum sub tantâ specierum & individuorum varietate tantum non sit infinita, pro sublevando ab infinito abhorrente intellectu humano, in pluribus explicandis corporum Phænomenis, ad bina universaliora ista naturæ inprimis, hinc &



artis, illius imitatricis instrumenta materialia quasi mechanica, minima acidi & alcali confugere omnino necesse habemus. Quæ omnia & isti agendi facultati corporum, horumve partium, respectu cuius in animalium præsertim hominum corporibus, nunc alimentorum, nunc medicamentorum, nunc Venenorum nomine veniunt, applicanda sunt. Quatenus illa, ratione materialis seu mechanicæ secundum minimam texturæ, partium nostri corporis texturam & constitutionem, vel conservare, vel immutare vel destruere valent, quas actiones necessario nostræ cognitionis sensuæ, hinc & intellectualis respectu, varii conceptus & notiones multiplices comitabuntur, quarum occasione tot qualitates in istis objectis vulgò statuuntur, quot attributa respectiva in iis deprehendere licet: quod ut perquam inconveniens est, ita multò magis, multiplici errori anam subministrare solet, si ex quatuor elementorum horumque primis qualitatibus, earumque Syzygiis particularium istarum qualitatum originem, & operandi modum derivare velimus. Illustrat hæc omnia ut unicum in medium producamus, *Opium*, vi suâ polychresta, nec unquam satis laudatâ, qua & somni nobis dulcedinem conciliat, & doloris suave lenimen præstat, & quavis in Republicâ nostra microcosmicâ turbata pacatiora reddit: cujus singularissimæ dotes, dum ab uno frigori ejus summo adscribuntur, quod tamen calidum intensè ab alio affirmatur, dici nequit, quas lites excitant, de Lanâ caprinâ omnes. Quas ut in præsentiarum missas faciamus, vis ejus diaphoretica nos monet, quam solam considerare est animus cui cæpto supremus annuere velit *Archiater*.

## C A P I.

*Effectus Opii in partes contentas considerat.*

Thef.

Opium quasvis excretionem sistit, præter sudorem, idque nec in partes solidas nec in partes fluidas agendo, sed saltem spirituum animalium impetum refranando.

## §. I.

**G**Ravissimè licet decumbant ægri, & pessimo versentur in statu modo, somni blandâ frui datum sit illis quiete, præsentissimum solamen, & levamen exoptatissimum ex eo percipere assolent, adeò ut arcanum in Medicina,

supra

supra omne.  
Basil. Chym.  
licet bene  
xiones, ex

§. II.  
tenus artis  
pium huius  
auxiliis for  
ad somnium  
quasvis ex

§. III.  
tentorum  
mè de p. n.  
ta loca extr  
torum flux  
pium, sed  
cum pulsus  
rat, quietio  
& minus fr  
trajectionis  
quoque tar  
subinde fa  
minus copi  
hibuisse co  
summè nec  
vita cum m  
ctici, ne ni  
exactissime

§. IV.  
motu ab op  
muntur, dy  
bile est, non  
siones, qu  
sive alvum  
ter ab Op  
sistendus v  
præsertim  
patiuntur i  
ipla copiosi



*supra omnes gemmas & Lapides pretiosos*, merito somnus audiat *Crollio: Basil. Chym. c. 7. p. 198.* Nam præter alios usus, & hoc simul ex eo sperare licet beneficii, quod juxta tritum Practicorum axioma, *somnus omnes fluxiones, excepto sudore sistere soleat.*

§. II. De somno naturali quod hic asseritur, hoc ipsum de eodem, quatenus artis beneficio per soporifera remedia, quorum antesignanum est Opium hujusque nunquam satis laudatum Laudanum, adedque de ipsis etiam auxiliis somniferis affirmandum pariter venit, quod hæc ipsa præter suavem ad somnum propensionem, quosvis humorum motus cohibere, & specialius quasvis excretiones præter sudorem compescere soleant.

§. III. Quotidianæ hoc debetur experientiæ, quæ tam de naturali contentorum in corpore nostrâ machinâ motu, hoc confirmat, quam vel maximè de p. naturali eorum, vel in certa loca intra corpus effusione, vel per certa loca extra corpus excretionem idem ostendit. Equidem naturalem contentorum fluxum per alvum & vesicam non solum cohibere aptum natum est opium, sed ipsum etiam sanguinis in orbem reditum sedatiorem suo usu reddit, cum pulsus exindè factus rarior & tardior, quam ante ejus exhibitionem fuerat, quietiorem sanguinis circuitum innuat, & respiratio ipsa quoque minor & minus frequens exinde reddita, moderatæ magis per pulmones sanguinis trajectionis testis adsit. Sub quo sanguinis blandiori fluxu & refluxu, lymphæ quoque tardior necessariò sequitur motus, proptereaque ex opiatorum usu subinde faucium ac Linguae aliqualis siccitas, & sitis urgentia observari solet, minus copiosa salivali lymphâ illas eluente. Quin imò, in tantum etiam cohibuisse contentorum corporis reciprocos fluxus, ad vitam continuandam summè necessarios, opiata observata fuerunt, ut penitus cessantibus his ipsis, vita cum morte commutata fuerit. Ob id scilicet tam sollicitè monent Practici, ne nisi sub aliquali adhuc virium robore, remedia istiusmodi, nec nisi exactissime correctâ, propinentur.

§. IV. Evidentiora sunt longè, quæ sub p. n. contentorum corporis motu ab opiatâ contingunt. His & vomitus & diarrhæa auspiciò supprimuntur, dysenteria graviore absque opio succurrere difficile, ne dicam impossibile est, non secus ac Cholera. Sanguinis quæ fiunt, eò periculosiores effusiones, quo vitæ nectar immediatè magis exhauriunt, per quæcunque loca, sive alvum, sive vesicam, sive nares, sive os, sive uterum, &c. frequenter ab Opii vi compescuntur. Diabeticorum urinarius nimbus per Opiata sistendus venit. Quas lymphæ effusiones catharrales inducunt affectiones, præsertim thoracem cum asperâ arteriâ, (cei quæ frequentiores magis illius patiuntur inundationes) affligentes, ab opiatorum vi promptè reprimuntur. Ipsa copiosior, etiam à Dio concitata salivatio per Opium moderamen patitur.

Ut



Ut taceam februum universum exercitum, in corporis fluidis, præsertim sanguine, ferè omnia sursum deorsum miscentem, cujus impetus ferociores & reprimat Opium, ac refranat in continuis benignis, in malignis verò utramque faciunt in cura paginam, ut loquitur *J. D. Horstius judic. de Chirurg. Infus. p. 47.* Dum intermittentium paroxysmos sensibilibiter repellit, rigores potenter minuendo, & cætera symptomata mitigando.

§. V. Sed in omnibus his contentorum ab opio quoad sui motum factis immutationibus sudor superest, qui tantum abest, ut ab Opiatis sufflaminetur, ut potius strenuè & profusè proliciat, tam ab iisdem solitariè assumptis, quàm aliis præsertim diaphoreticis additis, quorum agendi potentiam, mirum quantum opium intendere satagit, adeò ut inter sudorifera excellere Opium dicatur *Walao tr. meth. medend. p. 65.* cui constans Practicorum concentus omninò suffragatur, & ante Eum jam notarunt, tam *Germanorum Plinius, Gesnerus, in Epist. l. 2. p. 61. & 69.* quam *Platerus in Obs. l. 2. pag. 491. & l. 3. pag. 633. & 727. Conf. Hochstettius decad. 3. cas. 1. Schol.*

§. VI. Considerandum jam ante omnia, qua ratione priores illos, liquidorum motum sistendi effectus perficiat Opium. Ubi inprimis observandus venit duplex in Medicina corporis nostri hydraulico-pneumatica contentorum sive humorum motus: Localis unus, sive progressivus, alter intestinus sive plus minus fermentativus. Localis, totius molis liquidæ per suos ductus & canales est translatio, respectu cujus in sanguine Cordis musculi antliæ vices subit, transvasando ex venis sanguinem per medios pulmones in arterias, præter quod officium, an aliud præterea sanguini conferat beneficium, meritò dubitatur, saltem hæcenus ignoratur. Intestinus ille secundus, est minutarum illarum contenta nostra liquida sive humores componentium particularum continuus reciprocus motus, ratione cujus non tantum in fluiditate continuâ conservantur eadem, sed etiam fermentationis & turgescentiæ, tam naturalis quam p. naturalis, & inde natæ multiplicis alterationis & immutationis, secundum minutarum istarum particularum Syncrisin, diacrisin & metastasin, subeunt vicissitudines, undecunque etiam, minutarum illarum continuatus dependeat principaliter motus, ut ut Opium sidiætorum varietas, præsertim acidæ, instrumentaliter plurimum omninò conferat.

§. VII. Intestinum hunc motum ab Opio supprimi, à nemine hæcenus assertum fuit. Ac obstat exilis ista, aliquot saltem granorum dosis, quo minus Crasin materialem illorum immutare, & consequenter dependentem ab illâ intestinum motum sistere plus minus valeat: de quo pluribus infra. Quatenus tamen, ut ex sequentibus patebit, localem humorum motum refranat, & supprimit plus minus, etiam ad intestinum motum, ab illo certà ratione, quoad

quoad aliquo  
ferre poterit  
vel oritur  
felleis & pa  
Hac enim f  
scere, & in  
le est.

§. V.  
plus minus  
sto Vino et  
suum num  
tia theriac  
tem guttar  
veniunt: r  
strumental  
mnis oritu  
vim suam e

§. IX  
hibere nequ  
turali impe  
ta, secund  
distribuun  
in pedibus  
ruditiſſ. oli  
Opium erg  
psi subſunt  
antimonial  
rum, & V  
cari, quib  
hoc confer  
mul evacua  
nondum h  
cohibeat,

§. X  
ne ab Opio  
cum ab his  
monſtret.  
tiones, pa  
quæ non f



quoad aliquam modificationem dependentem, nonnihil moderandum conferre poterit; præsertim si ex confluentiâ quorundam liquidorum, hic ipse vel oriatur Primariò, vel ab iis certâ ratione intendatur, qualis est Chyli cum felleis & pancreaticis liquidis, sanguinis cum his ipsis & lymphâ: &c. Hac enim ferè ratione, ex parte & febrium impetum nonnihil compefcere, & intermittentium præsertim plura symptomata refrænare, probabile est.

§. VIII. Localis ergò speciatim est motus fluidorum, quem Opium plus minus sistere valet. Ut quando superiori anno, Juvenis incautius hausto Vino emetico §. 1. in hypercatharsi ultra 14. dies adeò copiosâ, ut successuum numerum referre, (mendacii suspensionem declinans) non libeat, essentia theriacalis cum dimidio eff. Opii propinata, præsentaneam opem, 40. saltem guttarum dosi attulerit. Circa hunc motum localem tria consideranda veniunt: 1. ipsum fluidum motum; 2. pars Organica, à qua & per quam instrumentaliter movetur; & 3. spiritus impetum faciens, à quo principaliter omnis oritur motus. Unde unius vel alterius horum trium respectu, Opium vim suam exerere, omnino necessarium erit.

§. IX. Humores fluidos quod attinet, horum motum, quâ talium cohibere nequit opium. Locali in motu, fluida illa passivè se habent, & quæ naturali impetu, deorsum saltem ruerent, intra certos corporis canales coërcita, secundum horum conformationem, pro moventis impetu undiquaque distribuuntur, adeòque supra & infra nesciunt, suntque tam in fronte, quam in pedibus, ut de sanguine loquitur *Helmont. tr. Terra: §. 7. cum quo conf. Eruditiss. olim Patavinorum Sanctorius: in Meth. Vid. Error. p. 710. & 874.* Opium ergò talem motum, quemodo in his fluidis inhibebit, dum alieno ipsi subsunt & parent imperio. In quem scopum finge, occasione speculorum antimonialium, cum Vino infusionis croci metallorum aut Vitri. §. haustorum, & Vomitus multiplicis materiæ, & variarum sordium secessus provocari, quibus quocunque modo a, quanto societur opium, quid adjumenti hoc conferet fluido, qua tali, siquidem hujus mole obrutum & abreptum, simul evacuabitur; Nam consistentiam fluidi, ab Opio minuari immediatè, nondum hætenus compertum fuit, Adeò, ut Opium fluidorum motum cohibeat, absque ullâ in fluida ipsa actione.

§. X. Considerandæ jam partes solidæ, quâ tales, an harum ex affectione ab Opio susceptæ, illæ in contentorum motu alterationes dependant, cum ab his moveri liquida, & modo §. 8. dictum sit, & experientia ipsa comonstret. Sed quò minus & harum respectu, Opium sistat contentorum Lationes, patet non solum ex parva istâ dosi, quâ propinantur, (de quo infra), quæ non sufficiens est, ut partes solidas tam notabiliter in suis functionibus



motivis cohibere queat, sed etiam ipsæ solidæ partes instrumentaliter se habent, ad fluidorum motum, quatenus principium movendi ex seipsis non habent, sed ab alienâ potentiâ, ceu organa saltem moveri & ipsæ soleant. Ad hæc, quâ ratione in eas agit Opium, an ratione texturæ illarum materialis, & inde natarum multiplicium proprietatum sensualium sive temperaturæ, an ratione conformationis suæ mathematico-mechanicæ, ratione cujus in esse organico constituitur? Non ratione hujus, cum immutatæ organisationis seu conformationis ab Opio inductæ innotescat vestigium: pariter atque in ipsa texturâ materiali, quâ tali, inde natis qualitatibus temperaturaque, ab Opii usu, ulla immediatè facta mutatio haud apparere soleat.

§. XI. Dum ergo Opium proximè, nec in continentes seu solidas, nec in contentas partes seu liquidas, harum motus, & inde natas excretiones sistendo agat, supersunt spiritus, sive impetum faciens Hippocratis, quos consideremus, quid hoc in negotio vel agant, vel patiantur ab Opio. Hi scilicet sunt, animales speciatim appellati, qui fibrarum motricium beneficio, omnis in corporis Oeconomia localis motus existunt autores primi. Hi Rota sunt suprema sive magna; quæ alias Rotas in corpore humano (tanquam artificiosissimo automate) circumagit, ut eleganter loquitur *Illustr. B. de Verulamio: Inst. V. & M. p. 94. 193.* Horum ergo quamdiu viget impetus elasticus, etiam fibrarum motricium ritè fabricatarum tonus, & inde dependens tam ad externorum objectorum promptissimè recipiendam impressionem sensilè proclivitas, quam continuus ad motum nixus, debito in robore vigeant, adeoque quamvis partium continentium localis motus, cum contentarum promptissima undiq; distributione, quin & pro occasionum varietate, in ordinatâ commotione & nonnunquam exclusione continuabit. Sufflaminato autem nonnihil spirituum illorum impetu motivo, & inhibito quadatenus radioso illorum influxu, cessabit etiam proportionaliter fibrarum tonus, remitte unâ sensilium facilis receptio, & languescet fibrarum motivus nixus, adeoque contentorum hinc sedatior longè ac tardior superveniet fluor.

§. XII. Refrenat hunc spirituum impetum, & segniores quasi reddit eosdem Opium, quod notissimi ejus in corporibus nostris effectus, *somnolentia & indolentia* testantur. Ibi languescens Spirituum impetus, minus vigorosè per universum systematis nervosi extenditur, unde præsentis licet undiq; non æque sufficientes tamen pro sensationum & motionum externarum ob-eundis munitis esse solent. Hinc flaccescente fibrarum sensilium Tono, haud æque validè ab objecto licet intensiori vibrari poterunt, unde nec spirituum jam in Elatere suo remittentium sufficiens percussio ad primum commune sensorium fieri, nec fibrarum dolorosè commotarum superveniens spasmus ordinarius

ordinarius &  
quali quali st  
pariter local  
fluidorum r

§. XI.  
tus, & remi  
motum mo  
pescere sole  
teatorum n  
ejusdem m  
motio. Ne  
fibrarum s  
provocatur  
perficitur.  
tica, aliq  
remorato c  
unde super  
tas, apertas  
fusio.

§. XI.  
inde minin  
pungit & r  
parte, a  
lacerationis  
malæ, nun  
so superven  
nervearum  
pressa. A  
rit, vel loc  
tandem do  
tium tumo  
tillo asperio  
molestatus  
nâ vicidic  
mentiore  
ficientissim

§. X  
nus sufflan  
tum ejus fi



ordinarius & convulsiva tensio procedere poterit. Sub quo spirituum aliqui quasi stupore per Opium inducto, & sensationes externas, & motiones pariter locales, tam partium solidarum, quam contentorum in illarum alveis fluidorum remittere insigniter, necesse erit.

§. XIII. Et horum duorum effectuum ratione, *torpescens* nempe *tactus*, & *remittentis* fibrarum motricium *Toni*, accidit, quod Opium quosvis humorum motus sistere, & speciatim quasvis excretiones, sudore excepto, compescere soleat. Hæc duo enim ferè in quovis tam naturali, quam p. n. contentorum motu sunt obvia, partis scil. moventis irritatio, & hinc fibrarum ejusdem motricium contractio, indeque fluidorum contentorum multiplex motio. Nempe quotiescunque pars quædam, sensu molesti vel noxii infestatur, fibrarum sensilium inordinata & vehementiore vibratione, spirituum ad eam provocatur impetus, à quibus aucta & plus minus spasmodica earum tensio perficitur. Contractis sic fibris, vasa quoque tam sanguifera quam lymphatica, aliaque, & quicunque partis meatus stringuntur plus minus, indeque vel remorato contentorum transitu, horum circa locum ita affectum stagnatio, unde superveniens tumor, vel copiosior per vias aut consuetas, aut insuetas, apertas tamen vel faciliè aperibiles, pro circumstantiarum ratione, effusio.

§. XIV. Pro quorum illustratione considera, acidum illud, mole subinde minimum, quod dentis plus minus carioli radicem nervæam, & fibrosam pungit & rodit, ac dolorosè irritat. Brevi exinde, non faciei saltem ex illâ parte, ac temporum, sed totius capitis hæmisphærii tensionis & plus minus lacerationis sensus, spasmi fibrarum manifestus index, cum non raro tumore malæ, nunc sanguineo, nunc lymphatico, h. e. Phlegmonoso aut ædematoso supervenit, cum copiosissimæ salivæ limpide effluxu, pertinaciori fibrarum nervearum stricturâ ex glandulis immediatè, mediatè ex sanguineis vasis expressâ. Ast Opium si interno usu, somnum provocarit, doloremque levavit, vel loco dolenti applicatione sensilitatem ejus stupefecerit, vel suâ sponte tandem dolor desævierit, breviter & hemicranie affectio, & externarum partium tumor, & ptyelismi profluvium cessabunt. Quæ ipsa, & Oculi à tantillo asperiori pulvisculo læsus, & digitus à parvâ spinulâ in sui extremo infixus molestatus, & stomachus à spiculis glibus irritatus, & recti extremitas, à refinâ viscidiorè aloës infestata, & asperæ arteriæ sensibilissima tunica ab inclementiore aëre læsa, aliaque sexcenta Corporis Oeconomîa quotidie obvia sufficientissimè mutatis mutandis confirmant.

§. XV. Spirituum ergò imperum sistendo, & motum eorum plus minus sufflamando, adeoque tam sensus in patte acumen hebetando, & motum ejus fibrarum præsertim peristalticum impediendo, quasvis fluxiones



sistit Opium. Hæc ratione Opiata, v. g. Theriacalia, & Vomitus, & hypercatharles, & diarrhæas, & dysenterias sopiunt. Non secus ac hæmorrhagias, sensum in parte ex qua effluit vellicantem mitigando & sanguinis impetum motivum nonnihil cohibendo reprimunt. Adeoque illis saltem hæmorrhagiis propriè convenit, quæ vol occasione molestæ sive sensilioris irritationis, aut excitantur, a. continuantur, a. sæpius recidivant; (quas inter occasiones ipse serosior & acrior sanguis non ultimas tenet) vel quæ occasione inordinatorum spasmodorum in vasis sanguiferis subinde accidunt. Eodem ex fundamento & tenues Catharros sistere partim, partim incrassare dicuntur papaverina, Opii parentes, dum sensum molestæ in pharynge pariter ac larynge irritationis levant, & hac occasione factam lymphæ uberiorem per fibras constrictas ex glandulis expressionem sive excretionem sistunt: eo quod de latice isto jam excretum fuit, exactò sui cum nutrimento asperæ arteriæ rorido chyloso, ante sui assimilationem simul transudante, miscelâ & unione, spissiore consistentiâ, & ex particularum activarum subactione debitâ, convenientem & tactui laryngis proportionatam temperaturam intereâ acquirente, adeoque coctum & incrassatum apparente, facilioris subtili paulò viscidiori consistentiâ, ab impetu aëris elisionis & excretionis. Sanè Phthisici ex pulmone, sensile beneficium ab Opiatis recipiunt, ritè administratis, nam & sordium copia exindè minuitur, non supprimendo easdem, sed continuam regenerationem præcavendo, & eadem meliorem consistentiam nactæ, faciliori cum conatu expectorantur. Sanè haud semel miratus sum Phthisicos etiam diutius, ac per aliquot septimanas, continuum Opii usum, citra ullam sensilem vel notabilem noxam aut alterationem ferre posse: id quod & olim observavit Crollius: Basil. ubi de Elect. Laudan. it. Hartman. de Opio. Theor. 8. quæst. X. pag. 158.

## C A P. I I.

*Vim Opii sudoriferam explicat.*

Thef.

Opium per accidens, mediante largiori parorum Cutis hiatu, sudoris profluvium promovet.

## §. I.

**O**pium ritè paratum, & in laudandum laudanum exaltatum, vi sudores excitandi, & insensilem transpirationem, insensilem transudationem augmentandi



mentandi pollere insigni, docente magistrâ experientiâ, supra insinuatum fuit, ut ut quasvis aliâs liquidorum excretiones inhibeat. Investigatu itaque omnino dignum videtur, ex Theoretico causarum scrutinio, hæc ipsa operatio, pro meliori sui ad praxin applicatione.

§. II. Ad hoc, ut ritè extillet ex corpore nostro sudor, 2. exactè distinguenda veniunt: qualis nempe 1. sit sanguinis status, à quo aptus reddatur, dimittendo promptius serosolatici, quibusvis tam ipsius sanguinis, quam solidarum partium à nutritione privatâ, ex materiæ necessitate relictis superfluis aut effœtis, & eatenus excrementitiis particulis imbibitis onerato: hinc 2. qualis cutis ejusque pororum, seu sudoris cribrorum necessaria sit conditio, pro transmittendo ritè sudoris latice, ejusque promovendâ plus minus excretionem.

§. III. Prius cognosci haud poterit melius, quam si ratio habeatur attentè eorum, quæ in spontaneo sudoris profluvio, sub exercitiis ac motu corporis, subsistentiâ in loco calidiore, &c. cuiusvis obvia sunt, & quadruplici Phænomenon non differentiâ terminantur. Pulsus scilicet 1. semper celerior & frequentior, repidiorem sanguinis per cor & universum corpus motum ostendit, (sive spirituum corpus musculum moventium imediatè, sive sanguinis cor pro crebriori motu stimulantis occasione eveniat) quibus adjuncta ejus magnitudo, intensiorem turgescientiam & fermentativum motum auctum innuit: quæ ipsa necessariò, ex intestino particularum in sanguine motu, præsertim acidarum cum aliis alcalinis & terreis, concitatio 2. sensilior totius corporis calor ac æstuatio comitatur. 3. Supervenit his habitus corporis exterioris & rubor, & mollior, & aliquis turgescientia, siquidem sanguis taliter alteratus, undique per quævis capillaria celeriori trajectioni quidem penetrat, sed languescente non nihil, circa hæc ipsa impellentis impetu, vix tam promptè a venulis excipi poterit, quin ulteriori per arteriosa vasa affluxu, aliquali subsistentiâ copiosius solito partium solidarum poros undique repleat, indeque ista Phænomena exhibeat: unde 4. penetrans undique latex aquosus, sub tali sanguinis alteratione & imprimis intensiori æstuatione, & ipse rarefactus, & quasi porosior factus, adeoque imbibendis ex sanguine & abstergendis ex solidis partibus quibusvis heterogeneis, præsertim Oïis particulis aptior redditur, facillimè qua datâ portâ prorue- re, & speciatim per cutim transcolari potest. Uterque ergo motus sanguinis, tam circularis, quam fermentativus, ille quidem celerior, hic intensior, sanguinem sub sudore necessariò attenuatum, resolutum, & quasi liquefactum exhibent, cum non nisi tali sub sanguinis statu, illa ejus Phænomena apparere queant. Unde etiam propriissimè dicta sudorifera, nempe Oïa vol. tam manifesta quam occulta, tam libera, & sui quasi juris, quam in ol. concentrata, non nisi tali sanguinis in consistentia suâ & texturâ alteratione sudorem provocare videntur. At-



Attenuatus ita sanguis, hoc ipso simul disponitur, ut seri, communis istius alimentum & excrementi vehiculi, facilem secessum & promptam separationem patiatur.

§. IV. Cutim quod spectat, huiusque sub sudore constitutionem, observanda venit curiosa ejus & artificiosa structura. Est hæc rete sanè mirabile, ex fibris arteriarum, venarum, nervorum & tendinum variè inter se complicatis contextum, ita tamen ut nervoso generi, plusquam venoso in sua structura acceptum referat, tanta & nervearum & tendinosarum fibrarum copia, cum inter textis arteriarum venarumque capillaribus, ut exilissimis sic numerosissimis gaudet. Necessario v. in taliter constructa corpus investiente tela, foraminula meatusq; complures extabunt ex quibus creberrima duo emergunt corpora: *papillæ* primo loco pyramidales innumerae, nervorum scilicet extremi fines, horumque fibrarum ultimæ portiones cutim perforantes conglobantur, & ita in extimam cuticulam usque desinunt, genuinum scil. tactus organum, quas oculatissimo debemus *Malpighio*, tr. de extern. Tact. Organ. secundo loco observanda sunt *Lymphatica vasa*, excretoria copiosissima, ex glandulis miliaribus, cuti sive substratis sive simul intertextis enata, quarum ratione interior cutis substantia *Lindano* carnea asserta, à *Willisio* potius glandulosa statuitur *Pharm. Rat. Vol. 2. f. 3. c. 5. p. 461.* Disperguntur excretorii hi tubuli in universo exteriori corpore, per quæ eos sudorum rivuli, quorum fontes illæ sunt glandulæ intercutaneæ, confertim adeò effluunt. Sanè, non sensibilis tantum transudationis, sed etiam insensibilis transpirationis officinas has ipsas esse sunt, qui existimantur, ut triplicem viarum per quas aliquid in superficiem corporis exponitur, differentiam explicet *Pechlinus: de habit. & color. Ethiop. p. 87.* quod ipsum tamen ulterius rimari, ad præsens minus facit institutum, cum circa sudoris scaturiginem saltem occupati simus.

§. V. Communis his vasis excretoriis, eorumq; orificiis, cum aliis in corpore nostro obviis colatoriis officinis affectio erit, ut & aperiri & claudiqueant, adeoque transmittendo humori faciliorem vel difficiliorem transitum concedere. Cuius asserti huius veritas obvia erit, alterationes, quæ peripheriæ corporis cutaneæ sub tempestatum mutationibus accidunt, consideranti; Æstivo tempore & hiant apertius meatus isti, & continuâ laticis transmissione, madescit ordinariò corpus, hinc vehiculi aquosi per cutim factâ trajectione rarior & parcior mixtus; ast dum hyberno gelu quælibet rigent, & rigidior, saltem asperior, deplumati anseris ad instar, evadit cuius & conclusis istis meatibus, copiosior Urina secretio supervenit. Manifestum idem evadit, ex alvi majorè lubricitate, occlusionè meatuum sudoriferorum supervenienti. Memoranda ob id *Gabelchoveri*, Practici multæ experientia, *Cent. 3. cur. 73. annot. p. 122.* est sententia



sententia, qui sunt densæ texture, & habent cutim spissam, & poros arctos, sæpius quotidie egerunt, quam qui poros habent apertos, ex quibus vapores & humiditates possunt resolvi, egestiones exsiccantur, & corpora sunt magis constipata. Hinc ergo colligi potest, quare in fine æstatis, & in principio autumnii, fluxus alvi sæpius accidunt. &c. id quod propriâ experientiâ convictus etiam ingenuè fatetur *Malpighius*: c. l. p. 43. & 40. In his casibus, non liquidi quâ talis, secernendi, sed organi secretionis saltem est diversitas, quo in peripheria corporis ocluso, per similia in intestinua hiantia, & ipsa glandulosæ texture colatoria, quæ eleg. demonstrat *J. Peyerus*: *degland. intest.* fit excretio. Ob id sedulo in praxi, fluore alvi quæcunque correptorum, dedi semper operam, ut pori meatusque cutis, quantum possibile ferventur aperti, & corpus ad diaphoresin blandam continuo sit dispositum, quo ipso non leviter sufflaminantur enormes istæ alvi dejectiones, sed etiam, si quæ successivè effervescent febricula, faustâ istâ contentorum corporis, per poros cutis transpiratione extinguitur. Adeo per plurium seculorum ætatem, hæc foraminum intercutaneorum vel hiscentia, vel conniventia fuit observata à Medicis, ut non ultimam febrium causam, in pororum cutis occlusionem rejecerit *Galenus*; & per experientiam convicti Practici fateri necesse habeant, nullam febrem tutò, & absque recidivæ metu judicari posse, quæ sine sudoris uvacuatio-  
ne deferbuerit.

§. VI. Urget jam nostram meditationem, unde nunc patentes, nunc conniventes sint isti transudationis meatus excretorique tubuli. Variæ equidem se offerunt causæ, tam connatæ, quas inter est naturalis cutis textura vel rarior vel densior, quam acquisitæ, partim per consuetudinem, secundum varium rerum non naturalium usum, partim per ægritudinis p. n. alterationem: unde meatus dicti vel exstaminum fibrosorum tensione nimia, turbari aut obliterari, vel ad motis aut excretis variis constringi, arrodi, vel iisdem viscidioribus aut glutinosioribus obstrui possunt. Præcæteris, ceu frequentior causa, consideranda venit Tubulorum istorum, imò, ut probaliter arbitror, & ipsarum glandularum, à fibris nerveis contractis, occlusio, vel ab his relaxatis reclusio. Tendinosum nempe maximam partem stamen esse & fibrosum, quod cutim constituit, supra insinuatum fuit: unde pro nervearum & tendinosarum natura, non sensui saltem tactus externo, cui illarum extrema papilliformia sufficiunt, sed etiam motui cuidam dicatæ erunt, eoque pro fibræ motticis naturâ, abbreviationis seu ut vulgò dicunt, contractionis & relaxationis: unde necessariò tubuli isti excretorii, & ipsæ simul glandulæ nunc stringi, adeoque has comprimere, illos coarctari, nunc, nunc relaxari, & has sic porosiores, illos patentiores reddi, necesse erit. Argumentum hujus rei, & externus tactus & interna imaginatio suggerunt. Quoties vel frigoris, vel ingrata humiditatis occurrat  
contactus



contactus, mox corrugari cutis, pori claudi, anserinæ pellis facies, hinc emergere solet. Evidentiori exemplo, avium plumæ, feliumque pili hoc repræsentant, dum frigoris occurſu, erectiores ſitu, animalia dicta hiſpidiora apparere faciunt, fibris iſtis inter cutaneis nerveis, cutis poros ſui contractura ſtringentibus, & ſimul plumas ac pilos ex obliquo ſeu declivi ſitu in rectâ magis lineam erigentibus. Imaginationis vis, ut per totum microcoſmi regimen ſe diffundit, ita & extremos ejus limites attingit: tantum tamen non quotidie occurrit, ut ex rei vel horridæ vel terribilis, aliusve ſimilis, vel ſimplici ſaltem narratione, præſertim in delicatioribus, mox cum horroſis, aut ſaltem frigoris quodam ſenſu, peripheria corporis undiq; contahi, pori arcti claudi, cutisq; in anſeris faciem corrugari ſoleat, quaſi omnes, quotquot occurrunt, portas, ab hoſtili inſultu præmunire velit, conſervationis ſuæ provida Natura. Obſervavit ſane *Malpighius* c. l. p. 19. *in extremo pigito, cuticulâ per admotum ferrum detractâ, ubi ſudoris iſta vaſa excretoria hiant, convexam quandam pelliculam, interiora verſus, non abſimilem curbitula, extendi, ad edendum forte valvule miniſterium, ut interdum tenſa, detineat ſudorem, & relaxata, exitum permittat*: id quod ad præſens negotium illuſtrandum ſimul non parum facit, ut ut clarior & ulterior per experimenta anatomica confirmatio adhuc in hoc paſſu expectanda videatur. Ad hæc modo laudatus Autor, c. l. p. 39. ad miliares iſtas ſub cute glandulas, per tranſverſum excurrentem nervum hiare, aſſerit: præter alios uſus, ob id primariò, excretionem per dictas glandulas, nunc eas ſtringendo, aut laxando, certâ ratione moderari poſſit.

§. VII. Sed in coarctationis vel relaxationis hoc negotio, tam glandularum, quam tubulorum excretoriorum, fibræ iſtæ cutaneæ, non niſi inſtrumentaliter ſe habent, ipſo impetum faciente, ſpiritu ſc. inſluo, ſpeciatim animali dicto, ceu principali agente, id muneris exequente: unde & vel externam ſenſationem, vel internam imaginationem, utriobique ſpirituum animalium motum prævium, & ad cutim concitatum impetum ſequitur ſaltem talis ſtrictura nimia, aut relaxatio. Nempe uti à ſpiritu animali & ſanguine vitali, tonum debitum ſeu naturalem tensionem obtinent, indeque & irritari paſſivè ab objectis minus proportionatis, & ſimul iisdem reſiſti activè valent, ita etiam hujus Toni ratione, & ipſa cutis, ejusque pori; vel arctius ſtringi, vel laxius dilataripotunt.

§. VIII. Ex quibus hætenus prolixius declaratis, vel ſuâ ſponte patet, ex parte cutis pro ſudoris tranſmiſſione, hanc ſaltem neceſſariam eſſe conditionem, ut meatibus quibusvis, & tubulis glandularum potulis, ob fibras nerveas intercutaneas, relaxatas, adeoque cute exiſtente plus minus, molli, rarâ. poroſâ, undique ſudor ceu per cribrum, aut filtrum excerni & tranſcolari queat.

§. IX. Præ-

§. IX. alterando, riale textu- rates, & in al- rit. Offert ſe- Duum virat invenire, lo- petit: tr. de in Opio frig- adeo ut 2. p. ſoporiferu- retica deriv-

§. X. bus, gummi ſinam in ſe- quam diapl- ipſo, ceu ap- creta ſunt, ſi- puſculis in v- reſinam reſ- ſolutum, ob- per ſpiritu. C- anili, aut pi- nam liquida- ſentat. Si- Spiritum V- cum Δ com- tur, ipſo re- vel parcum- dum funde- p. 1. ſ. 5. c. 2- rata conſiſt- deprehend- probant h- experienci- mediante- extalibus- quod ſub- maticum



§. IX. Præmissis hæc, Opium examinandum, & quid vel sanguinem alterando, vel afficiendo cutim valeat, perpendendum, quod citra ejus materiale texturam, ex seminalibus primordiis natam, & inde varias ortas proprietates, & in alia corpora respectivas actiones, exactè evolutam, fieri haud poterit. Offert se hic in primis expertus per ignem Philosophus, *Helmontius*, qui tr. *Duumvirat.* §. 8. p. 275. se in Opio salem acrem sudoriferum, & amarum oleum invenire, longe ab Opio odore recedens, attamen soporiferum. asserit: quod repetit: tr. de Lithias. c. 9. §. 87. p. 728. dum inquit: quin imò, nec soporiferum in Opio friget, Sulph., sed valde amaricat, ejusque  $\ominus$  acre est, & sudoriferum: aded ut 2. primaria principiata elementaria in Opio considerata sint, Sulph. soporiferum &  $\ominus$  acre sudoriferum dictum, ex quorum alterutro vis diaphoretica derivanda veniat.

§. X. Sanè Opium pro ratione succorum inspissatorum ex vegetabilibus, gummosum concretum est, sed quod ceu nucleum medicamentosum, resinam in se complectitur. Resina hæc, est proximum virtutis tam somniferæ, quam diaphoreticæ subjectum, unde & S.V. mediante, ex Opio extrahi, & hoc ipso, ceu appropriato in texturâ menstruo simul exaltari solet. Resinæ, concreta sunt, singulariter concentrata, & ex pluribus diversæ naturæ minutis corpusculis invicem actè complicatis contextæ. Nempe quod in sicca consistentia resinam refert, hoc se è totum, per Ignem liquefactum seu attenuatum & resolutum, ol. Leo existit. Res clara est per experientiam, quæ ex oleis Leo atis, per spirit.  $\oplus$  i. rectif. vel per ol. Vitrioli, nunc resinam perfectam, ut in ol. L. anisi, aut pinguedinis humanæ, nunc concretum therebinthinatum, ceu resinam liquidam ut in ol. L. therebinth. nucis mosch: juniperi &c. repræsentat. Sicut idera manifestum evadit, si ex lignis medicamentosis per Spiritum Vinum probe rectificatum essentiam extraxeris, quæ facili labore vel cum  $\Delta$  com. præcipitando, vel Spiritum Vinum abstrahendo in resinam redigitur, ipso residuo ligno, per retortam  $\Delta$  e aperto, more solito destillato, nullum vel parcum Oleum suppeditante, quod alias copiosum & penetrans admodum fundebat, teste, præter experientiam *Willisio*: tr. *Pharm. Ration.* p. 1. §. 5. c. 2. p. 214. & *desferment.* c. 2. p. 16.. Jam vero oleos. L. ata, quæ mutata consistentiâ per aliqualem coagulationem resinas exhibent, nil aliud esse deprehenduntur, quam  $\ominus$  ia vol. à pingui occultè acido concentrata. Comprobant hoc non solum plura (nam de omnibus specialis aded nondum facta experientia) ol. L. ta, v.g. Tartarifati, therebinthinæ, C. C. &c. quæ mediante cum alcalibus fixis digestionem, in  $\ominus$  vol. abeunt, sed etiam fuligo, ex talibus oleosis maximam partem constans,  $\ominus$  e vol. oleoso turgida. Nam quod sub clauso vase Leando seu per  $\Delta$  m liquefendo, ab it in ol. L. empyreumaticum, hoc in aperto  $\Delta$  e de flagrando ab it in fumum & hinc maximam



partem fuliginem. Hæc fuligo præter Phlegma acidum suggerit spiritum urinofum, &  $\Theta$  vol. acerrimum manifestum, & Oleum empyreumaticum, simile oleum, ex ligno aliat Qando. Scilicet quantum pinguedinis,  $\Theta$  vol. in resinam alias colligantis concremando destructum fuit, tantum  $\Theta$  vol. contagio oleoso adhuc affecti haberi potest, quantum v. resinæ attenuatæ, oleo propter defectum deflagrationis haud liberatum fuit, oleum fuliginis constituit. Scilicet ut rectè loquitur *Helmont. tr. Complex. & Mist. Elem. fig. §. 33. p. 89.* *Fuligo, est partim  $\Theta$  vol. concreti, præservatum ab inflammatione, propter de evolantis commistionem, partimque est Oleum, quod evolandi celeritate combustionem præterfugit.* Tandem compertum est, Vegetabilia aromatica, & quæ per vesicam simplici Qatione Oleum & suggerunt, eadem fermentata, sub ministrare illorum loco spiritus ardentis, seu olea attenuata & in assentiali Phlegmate soluta, putrefacta verò, suggere  $\Theta$ ia vol. urinosa, satis copiosa, istis animalium  $\Theta$ ibus vol. similima, oleosa nempe pinguedinis resoluta per putredinē, adeoque sic simul acidi enervati, occasione. Ut adeò ferè concludendum videatur, Resinas & oleosa, essentialiter non nisi consistentia differre, utraque verò esse  $\Theta$ ia vol. oleosa, seu olei beneficio, ratione occulti hujus acidi, paulò intimus concentrata.

§. XI. In simili concreto resinoso, cum consistat vis opii, tam anodyna, quam diaphoretica, dividere illud, & utrique effectui, distinctum suum efficiens tribuere satagit *Helmontius*, ut ex supra allegatis manifestum est, adeoque Sulphuri vim somniferam,  $\Theta$ i vol. acri sudoriferam adscribere. Equidem negari haud potest,  $\Theta$ ia vol. præsertim oleosa, potissima esse, & efficacissima diaphoretica, eoque potentiora, quo acriora & penetrantiora, quæ effectivè sanguinem alterando, & quasi dissolvendo, sudoris rivos profundi faciunt, ut supra §. 3. insinuatum fuit, & per experientiam hæcenus confirmatum. Sed pro hoc effectu requiritur omninò determinata, eaq; tanta eorum dosis, quæ universæ massæ sanguineæ ad plures libras ascendenti, vel immediate, vel (si hoc minus placeat) mediatè (per præviam fluidorum in primis viis alterationem) alterandæ, plus minus sufficiens sit: quæ ad gr. xv &  $\Theta$ j. subinde ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$  extenditur; sed Opii sive crudi, sive quocunque modo præparati dosis medicamentosa (nam de consuetudinis legibus & alimenta & medicamenta multipliciter determinantibus, non attinet dicere) ultra  $\mathfrak{z}$ . l. 3 gr. ad summum haud extenditur, rarò si quidem hanc superare solet Medicus, sapius infra subsistere, cum vj. gran funesta admodum observata fuerint. Sanè, licet non intelligibile esse rectè *Helmontio* dicitur, *tr. Duumviratus §. 5. quomodo unicum opii granum, sat frigoris in stomacho causetur, satque vaporis actualiter frigidi in capite egerat*: ut nempe ex Veterum quorundam asserto, somnum inducat; ita pariter haud

ter haud con  
iam si purum  
sudore pro  
quædam san  
sudoris vel u  
Willis. addu

§. XI.  
dam, plu  
quam duoc  
Hinc enim  
opio altera  
de nec adeo  
infringere  
doleos, qu  
dum foret.  
tas.

§. XIII. H  
rum esse init  
se; attestant  
universo co  
& nullo per  
banribus, t  
chronicos,  
subinde est  
te dimanat  
sissimus nu  
ta corporis  
tempus) in  
scelâ acco  
feri, om  
tentia, mi  
saltem, ve  
tentia, vel  
convenit;  
nullum  
est. Ad  
quit.

§. X  
ex certis in



ter haud conceptibile existimo, quomodo unicum alterumve opii granum, etiam si purum  $\ominus$  vol. esset, sanguineam massam, quocunque modo alterare, & sudorem provocare possit; Nisi continuato diutius opii usu, successive alteratio quædam sanguinis, & inde derivatis cæteris succis inducatur, ratione cujus ad sudoris vel urinæ uberiorem dimissionem plus minus disponatur: uti exempla à *Willis.* adducta, *Pharm. Rat. p. 1. S. 7. c. 1.* ostendunt.

§. XII. Accedit & hoc, quod ipsum propinatum opium necessario quasdam, plus minus tamen in viis primis lubeat alterationes, tam in Ventriculo quam duodeno, unde si non infringi, certè non exaltari continget efficacia. Hinc enim quorum stomachus acidum digestivum intensius spirat, minus ab opio alterari solent, quia hoc magis subigitur, vel ab acido quasi castratur. Unde nec adeo commodè Opium, quam vis humorum acrimoniam corrigere vel infringere dicitur à *Sylvio: l. I. prax. c. 15. §. 26. 27. 37. & 48.* obstante exilitate doseos, quo notabili adeò effectu, etiam si repetitis quoque vicibus propinandum foret. Ut taceam alias rationes à *Willisio P. R. Vol. I. f. 7. c. 1. p. 291.* allatas.

§. XIII. Haud equidem melatet, minima ut plurimum maximorum morborum esse initia, & mole minimum corpusculum, maximos effectus præstare posse: attestantibus id apertè, alia ut taceam, venenis, in minimâ mole pernitiem universo corpori minitantibus: confirmantibus hoc contagiis, sub minimo & nullo perceptibili sensuum miasmate, universam corporis œconomiam turbantibus, tam acutos, quæ excitant morbos, ut febres malignas, quam quæ chronicos, ut in lue Pœâ & scabiæ manifestum est. Ita è contrario, & minimum subinde est medicamenti, à quo maximus & insignis effectus pro universi salutē dimanat, quod sub reliqui corporis cortice, tanquam exilis, ut ut pretiosissimus nucleus est reconditus. Sed iis remediis, quæ alterando contenta corporis, & sanguineam massam in crasi & consistentia solitâ (saltem ad tempus) immutando: operari debent, idque corporali seu materiali sui miscelâ ac contactu, qualis modus in opio,  $\ominus$  sui volat. acris, putati sudoriferi, omnino requiritur, ista minimorum, qua talium, maxima agendi potentia, minus applicari potest. Talia enim minima agentia, operantur saltem, vel quatenus vi alterativa & plus minus fermentativa immutare contenta, vel acutissima sui textura irritare sensibilia solida possunt. Neutrum opio convenit; non irritat, d. irritationis sensum potius tollit; non fermentat, quia nullum talis effectus vestigium in corpore observabile ejusque contentis est. Adeoque ad agentia ista maxima, sub mole minimâ, referri nequit.

§. XIV. Equidem inanis videri possit ille labor, qui virtutes operandi ex certis ingredientibus seu partibus integralibus concretorum investigare



fatagit, cum quælibet proprietates rerum, & inde agendi qualitates, tam occultæ dictæ, quam manifestæ putatæ, fluere è gremio seminum, rectè dicantur ab *Helmontio*, *tr. progym. meteor.* §. 28. unde etiam non nisi à seminali virtute, tam vis soporifera, quam diaphoretica opii derivanda erit, unde etiam *seminalem dormitivam vim* Opio adscribit, is ipse, *tr. Natur. contr. nesc.* §. 37. Sed ut ut agens seminale, in minimo fundatum sit, cum sui corporis saltem 2800. pars esse dicatur; tamen cum ens materiale revera existat, adeoque & generalissimis materiæ proprietatibus omnino obnoxium sit, (formalilicet agendi potestate in concreti generatione instructum,) prætereaque corporum genitorum proprietates quæcunque, non nisi materiæ speciatim contextæ beneficio immediatè explicentur, ac ex speciali talis materiæ texturâ immediatè fluant, & non nisi ab illâ proxime dependeant. Pro ipsius quoque principii seminalis conservatione, certa materiæ cui inest dispositio, seu textura materialis requiratur, quâ destructa, & ipsa vis seminalis perit, unde *Δis seminum destructor* dicitur *Helmontio*, forsan quod seminale concretorum principium, non nisi sub Sulphureo delitescat tegmine, proxime ab *Δe* quod retextitur. Ipsæ denique rerum multiplices proprietates tam specificæ seu singulares, quam pluribus aliis communes, pro concreti textura materiali plus minus mutata & alterata, etiam & ipsæ mutabiles existunt. Sanè ob dictas causas, vis corporum operativa, non nisi in certis materiæ, ex quibus constant, particulis, & specifica harum textura proxime investiganda venit, ut ut originaliter virtuti seminali, omnia ista adscribenda veniant. In Opio ergo, ut ut cum tota papaverina planta, & quibusvis ejus partibus, tam solitis quam liquidis, & quibusvis earum proprietatibus, à seminali potentia vis sudorifera & soporifera omninò dependeat, tanquam à primo efficiente, proxime tamen, in materia seminali seu formalari per seminale ens facta textura, utraque consistit. Unde etiam pro mutatione texturæ illius Opii specialis materialis, secundum simplices mechanicas aliasvè communes modificationes, ab aliis agentibus factas, tam vis sudorifera, quam anodyna v. g. castrari per acida, aut nonnihil mitigari & corrigi per alcalia afolet.

§. XV. Cum itaque Opio nullum jus sit alterativum in sanguinem, pro eliciendo sudore, proximum est, ut consideremus, quâ ratione cutim pro sudoris adjuvenda excretionem afficere valeat. Quo in negotio alius superest nullus modus inodus, nisi ut tubulorum excretoriorum ac pororum aperturam, glandularum laxitatem, & hinc cutis raritatem promoveat, adeoque nervosorum staminum relaxationi inserviat. Jam vero ex supra ostensi i. c. §. 10. manifestum evadit, opium nullam partem solidam qua talem, adeoque nec cutim, in excretionis negotio adeò notabiliter afficere posse, adeoque nec

nec fibrarum  
randi modo  
vitatem allat  
reticulum aff  
fibras cutis v  
ne, sicque  
dularum sp  
fusionem p

§. X  
animalibus  
nicarum fi  
dio & fibre  
cidio re hin  
per tubulos  
per acciden  
ris profluvi

§. X  
tionem ejus  
iam in iis, c  
labore & di  
ut jam sup  
lastica, un  
bus pro nec  
motrices fi  
indeque tan  
cesset quib  
mittente fil  
pus largite  
rit, quod  
ad talem e  
scil. opiato  
fectu vel o  
dam corpo

§. X  
tium parit  
elici soleat  
neglect, no  
mors impe  
ut & in



nec fibrarum laxitatem, nec earundem contracturam efficere, cum huic operandi modo & rationes eadem, quæ modo contra ejus in sanguinem activitatem allatæ, repugnent. Necessariò ergò sequitur, cum ipsum cutis reticulum afficere nequeat, nec contenta fluida alterare, in spiritus animales, fibras cutis vario tono moventes opium saltem agere, & horum adeò ratione, sicque mediante saltem fibrarum laxitate, hinc cutis mollitie; laxâ glandularum spongiositate, & tubulorum excretoriorum aperturâ, sudoris profusionem præstare.

§. XVI. Supra scilicet explicatum fuit, c. i. §. 12. Opii usu, certam spiritibus animalibus quasi legnitiem & torporem, indeque in movendis partium organicarum fibris languorem induci, quo ipso vel spontè sequitur, eodem remedio & fibroforum cutis staminum & tensionem adeò relaxari, ut flaccidiore hinc redditâ cute, & copiosius emulgere ex M. S. glandulæ, & uberius per tubulos excretorios excernere valeant. Paucis ut rem explicem, Opium per accidens, aperturam pororum sudatoriorum procurando, uberius sudoris profluvium emanare adjuvat.

§. XVII. Ut assertum hoc nostrum pateat clarius, somnus in confirmationem ejus accedat, qui promptissime sudores profluere facit spontaneos, etiam in iis, qui vigilantes tale quid haud sentiunt, aut interdum non absque labore & difficultate elicere valent, ut ut quasvis alias excretiones sistere soleat, ut jam supra monitum. Languet in somno, spiritus impetus visque eorum elastica, unde debiliori radio emanando, & saltem motibus sic dictis naturalibus pro necessitatis vitalis saltem urgentia inserviando, minus tendere cæteras motrices fibras pro motu animali in partibus præsertim exterioribus valent, indeque tardiores fluidorum motum localem hoc ipso procurant, qui ut ut cesset quibusvis aliis in locis, per apertiores tamè nunc cutaneos meatus, ex remittente fibrarum stringentium tono, uberius profluit, & sudoris latice corpus largiter irrorat. Somnum talem arte conciliant opiata, unde clarum erit, quod & ejus consequens, sudoris profluvium, modò contenta fluida ritè ad talem excretionem disposita fuerint, parili ex ratione superveniat. Hinc scilicet opiatorum ex usu, sudor emanare vix observatur, nisi somnus illorum effectu vel obrepat, vel debita saltem quies aut indolentia, aut lassitudo quædam corpori, ejusque partibus concilietur.

§. XVIII. Illustrant præsens negotium similes spontanei Syncopi Zantium pariter ac agonisantium sudores. Ut ut enim ex sanguineà M. non æque hi elici soleant, cum morientium sudor, antore Helmontio, tr. *Latex humor neglect, non sit tam latex in sui natura, quantum ros alimentarius resolutus, cui mors imperat, quod patet, nam statim corporis habitus sedit, pro ut & in syncope.* Quod pariter de pavidorum & per terre factorum frigidiusculo



diusculo madore pronuntiandum. Non tamen, nisi ex pororum hiatu, à fibrarum relaxatione nimia, spirituum moventium, sive illas tendentium ex defectu, spontanei hi sudores erumpunt. Nempè jam olim Hippocr. s. 5. aph. 71. annotavit, quibus arida & dura cutis obtenditur, sine sudore moriuntur, quibus v. laxa & rara, cum sudore vità defunguntur. Hinc istis & urina interdum involuntariè perfluit, aut alvus absque præviâ admonitione secedit. Iracundis ex opposito, vel furiosis, sudor nullus, spirituum ob concitatiorem impetum, & fortiorem fibrarum tensionem.

§. XIX. Parili ex ratione, & magnis in doloribus præsertim capitis, aliarumvè partium vel sensilium, vel cum nervoso systemata singulariter consentientium, observavi, corpore etiam quieto existente nullum sudorem prolici potuisse, nisi forsitan perniciosum, & quasi symptomaticum, eumque vel parcum vel saltem particularem. Non secus enim, atque talibus occasionibus, ex continuatâ spirituum agitatione ac motu, somnus impeditur, etiam non interrupto eorum in quaslibet partes, adeoque & cutis porosa stamina influxu, fortior horum tensio, tubulorum sudatoriorum oclusio, & inde sudoris suppressio secutæ fuerunt.

§. XX. Ea, quæ nos ambientia sudoris profluvium evocare solent, modò dicta roborant. Eminent hic calor ambiens, tam stragulorum, quam hypocausti, aliove artificio inductus. Fundite quidem hic ipse rarefecit corporis fluida, & ita ad excretionem sub sudoris forma, eadem potenter disponit. Sed hæc ratio sola haud satisfacit, quin considerandum simul videatur, caloris titillantem quasi motum, in tantum suavitatis conferre cutaneis fibris, in quantum molestiarum à frigore patiuntur: uti itaque hujus occursum irritatæ fibræ tendi, hinc pori quilibet occludi solent, ita illius gratâ applicatione, demulceri sensus, indeque relaxari istæ, & ita sudoris portæ aperiri denuò videntur. Madeat enim, & tantum non diffluat sudore corpus sub stragulo, simul atque aëri liberiori hoc ipsum expositum fuerit, dictum factum, in naturaliter se habentibus obdurari sudoris fontes videas, ut ut internam sanguinis fluctuationem, tam fermentativam, quam progressivam pulsus adhuc commonstret, quam aura ambiens frigidior tam citò alterare non valet. Blanditiæ e contra moderati caloris, uti amicæ sunt, universo systemari nervoso, cujus frigus inimicissimum existit, ita ejus occasione minus tendi, potius relaxari plus minus videntur fibræ etiam intercutaneæ, & tali occasione sudor promoveri.

§. XXI. Parratio est illius Phænomeni, si sub sudorem effluxu, manus vel pes denudetur, & exponatur frigori, non rarò sudoris rorem breviter evanescere observamus in reliquo corpore, aut notabiliter subinde

inde saltem  
calida, v. g.  
proventum  
inter se, spe  
quatenus co  
quam textu  
brilis horro  
ol. Q. cary  
universa co  
gò per conf  
brili rigore  
ratur. Pl  
& partibus  
gido in amb  
put etiam c  
dolore, qu  
& suavi som  
aut pede be  
citur, etiam  
minus: acc  
minus alter  
tione, cum  
quàm qui p  
deantur.

§. XX  
medicamen  
quieti, qui  
quam sudor  
dia. Crebr  
ternis totie  
tus, externa  
clauduntur  
plurimum  
stum Præ  
gri, diaph  
nem nobis  
memorane  
malignis pe  
vunt, &



inde saltem imminui. Contrarium fit, in difficilius paulo sudantibus, quibus calida, v. g. later calefactus, plantis pedum admotus, mirifice sudorum proventum adjuvat. Scilicet mirabilis est membranarum universi corporis inter se, speciatim cutis cum omnibus suis partibus consensus, continuatam quatenus constituit telam, unde una ejus extremitate affecta sensilius, & reliquam texturam simul idem quasi sentire & pati observamus. Sanè dum febrilis horror, frigusque universam cutim convelli, aut crispari facit, tamen ol. *Q. caryophyll. epigastrica* saltem regioni illitum, mirum levamen, & in universa corporis peripheria horrorem remissionem procurare solet. Aut ergo per consensum partium quarundam circa ista praeordia, universa cutis febrili rigore riget, aut per consensum certè talium partium solum illitarum curatur. Plantarum praesertim pedum miras cum universo systemate nervoso & partibus membranaceis quibusvis notatur consensus, dum pavimento frigidò inambulantibus, ut alvum laxari, aut intestina torqueri contingit. Caput etiam cum imis his partibus conspirat, unde & illorum noxam caput sui dolore, quasi lugere videtur, cum pediluvia interdum hujus dolorem leniant, & suavi somno temperent. Prout ergo consensus talis ratione, cum brachio aut pede bene maleve affecto, reliqua cutis vel blando vel molesto sensu afficitur, etiam vel relaxari hinc sudoris tubuli, vel claudi & stringi solent plus minus: accedente tamen simul ipsorum corporis & contentorum sensili plus minus alteratione, & hinc pro transudatione faciliore vel difficiliore dispositione, cum externa ista, aequaliter ferè tam nervosas extremorum partes, quam qui per eas ex arteriis in venulas circulatur, sanguinem afficere videantur.

§. XXII. Corporis quies, quantum ad sudoris provocationem per medicamenta instituendam, faciliorem necessaria sit, ex eo patet, quod inquieti, qui sunt aegri, & membra totumque corpus inconditè jactitant, nunquam sudoris effluxum experiantur, etiam post generosissima propinata remedia. Crebriori enim ista jactatione membrorum, & multiplici ab objectis externis toties mutatis simul impressione, inaequalis spirituum provocatur motus, externam ad corporis peripheriam, quorum impetu stringuntur pori, & clauduntur sudatorii tubuli. Quiete autem ab opiatis conciliata, faustus ut plurimum sudoriferorum sequitur effectus. Optimè memini, Expertiss. istum Practicum, *B. D. Michaelis*, in febribus malignis, si inquieti sint aegri, diaphoreticis, & alexipharmacis Opiata, & addidisse, & ejus imitationem nobis suasse, quod feliciter tunc operari observentur sudorifera. Hinc memoranda est *J. D. Horstii* *Judic. de Chir. Infus. §. 17.* sententia, in febribus malignis petechialibus, variolis, &c. Opiata utramque paginam absolunt, & hinc gravissimorum autorum consensu & experientia multiplici constat,



constat, maximè palmarium Robur Theriacæ & c. accedere Opii miscela. Nempe ut modo laudatus Vir differit, Opiatorum Sulph., à quo spirituum motus efferos, & concitatoris sanguinis turbas, frenandi, domandi, & sopiendi vim obtinent, feciliter sudorem desideratum conciliat.

§. XXIII. Negari equidem nequit, sub fortiori corporis motu, vel exercitio, sudare omnes profusissimè: sed dispar planè hujus in sanis, ab illo, qui in lectis ex ægris eliciendus, sudoris est ratio. Ibi rapidissimè circumscripta, & attenuata sanguinea massa, vincit fibrarum cutanearum, intensiore calore suaviter affectarum, & copiosiore humore irroratarum mediocrem resistantiam, spirituum copiis in musculis, tam cordis quàm artuum movendis, magis occupatis, unde nil miri, si copiosius effluat sudor. Aliter longè cum ægris, vel lecto decumbentibus res sese habet, in quibus minor impetus spirituum ad musculos, major ad fibras membranaceas & intercutaneas, in illis præsertim ægris, in quibus systema nervosum magis affectum à fermento febrili v. g. cum inquietudine & jectigatione fibras, undique stringit, de quo infra pluribus.

§. XXIV. Illustrant hætenus dicto non mediocriter ea, quæ circa urinæ excretionem, & hujus pathemata, quotidie ferè in praxi observabilia sunt, sicut aliàs urina & sudor in pluribus conspirare, & unius suppressio nem excretio alterius, quasi supplemento certo excipere solet. Nempe quod urina interdum supprimitur, aliam nullam ab orationem, nisi quòd pertinacius stingantur renum nervi, & hinc quasi corrugentur eorum fibræ, & occludantur transcolatoria oscula, quo spasmo ex Opiatorum usu remittente, & hiant denuò meatus, & ordinariò tramite transcurrit urina. Notabile hujus rei Phænomenon observari subinde licet in calculosis, quorum altero affecto rene, & à calculo in pelvi hærente interrupta urinæ viâ, & alter locius ren, benè valens officium negligit, adeò ut penitus hinc sequatur urinæ suppressio: id quod & *Fæstus*: l. 24. obs. 26. hujusque *schol.* observavit, pariter ac curiosum occurrit exempl. in *Act. Med. Haf.* Vol. 4. obs. 33. p. 102. Ad sympathiam seu ad consensum partium mutuum referre hoc solent Practici: idque, meo judicio, rectè. Sed quid est *sympathia* Græcorum, Latinorumve *Consensus* inter partes corporis mutuas, quàm quòd parte unâ p. n. quid sentiente, alia idem sentiat: sensationis omnis externæ quidem, qualis hic saltem locum habet, subjectum sunt fibræ nervæ, harum ergò ratione pars parti consentire, seu idem omninò sentire videtur. Scil. Consensus, seu in sensatione quædam communio, præsupponit sensum; sensus verò præsupponit fibras nerveas seu organa sensus: adeoque consensus propriè dictus est simpliciter ratione nervorum, impropriè dictus verò est, qui ex metastasi variâ vel causarum occasionalium vel productorum morborum

rum oriri sol  
partim utri  
mesenterii m  
vo. Fab. XI.  
hinc irritati  
vulis commu  
nalia commu  
Vomitibus, &  
conf. Drav  
moto calculi  
pito aliqua  
bent ægri.  
quam elega  
ctu proscript  
bus conf. sim  
non aliâ ex  
spirituum si  
inhibendo, &  
sicut in ultim  
torum alter  
pii usu, una  
agnoverunt  
§. XX  
superioribus  
tigit. Lab  
vicinam reg  
rodente, u  
verò præse  
gente, ade  
mnes nocte  
primis nota  
urina matu  
que parca a  
Opiati usu  
manè insec  
fatis Urina  
doloribus  
aderat calc  
olis, re



rum oriri solet. Renes ergò, cum nervos, sensationis organa habeant, partim utrinque ex propriis renalibus plexibus, partim verò simul ex plexu mesenterii maximo, Fallopiano aliàs dicto, conf. *Willis. Anat. Cereb. & nerv. Fab. XI. p. 263.* sanè hujus ultimæ ratione, facilè unius renis affecti, & hinc irritati nervorum spasmus seu crispatura convulsiva, alterius renis nervulis communicari, & hinc utrinque idem effectus fibrarum & meatuum renalium contracturæ excitari potest. Nam parili ex ratione, & renum calculum Vomitus, & Iliaca convulsiva tormina non raro comitari solent, ac contra. conf. *Dravvix. vom Schmerz machenden Scharbock. Tit. 9. p. 370.* Sed remoto calculo, & cessante irritatione fibrarum nervearum in renibus, vel sopito aliquandiu per opiata malo, & urinæ redit transitus, & melius hinc habent ægri. Lucem hinc acquirunt observationes istæ, non curiosæ magis, quam elegantes, de usu Opii diuretico in Ascite, aliàs seu lethali hoc in affectu proscripti, relatæ à *Bartolino cent. 3. epis. 46. p. 192. Et p. 49. 201. cum quibus conf. simul Willis. Pharm. Rat. p. 157 c. 1 p. 302.* Nempe, talibus in casibus, non aliâ ex ratione urinæ promoverunt fluxû, quàm vi suâ ut vocant, anodynâ, spirituum sufflaminando impetum, fibrarum nervorumq; renalium spasmus inhibendo, & hinc per apertiores redditos meatus, urinæ fluxum procurando: sicut in ultimo *Willisii* exemplo, (propter internam successivam forsan contormentum alterationem sudor & urina in desperato hydropico promanantes ex Opii usu, unam eandem efficientem causam, tam per se, quàm per accidens talem agnoverunt.

§. XXV. Occurrit pro dictorum confirmatione Phænomenon, quod superioribus annis, in mercatore hujus loci haud ultimæ notæ observare contigit. Laborabat hic ipse gravi dolore lumbari in latere sinistro, ad vicinam regionem se extendente, & protenso simul deorsum ad pubem, rodente, urente, & miserè torquente, interdium ferè quiescente, noctu verò præsertim à media nocte, crudelius & tantum non intolerabiliter affligente, aded ut lecto ob id surgere, & deambulando, aliaque ratione insomnes noctes, & dolore molestissimo infensas fallere cogeretur. Hoc imprimis notabatur evidenter, quoties dolores noctu urgerent intensius, toties urina matutina excernebatur tenuis, pallida, seu moderatissimè citrina, eaque parca admodum: quoties verò vel Balnei ∇ dulcis tepidæ, vel anodynæ Opiati usu, nox quieta, absque dolorum urgentia procuraretur, urinæ manè insequente intensius tinctæ, rubicundæ, cum copiosis Globis crystallatis Urinalis parietes incrustantibus visui occurrebant: sed recrudescuntibus doloribus, mox urina pallida, tenuis, pauca manè viscebatur. Nullus aderat calculus. Oriebatur saltem malum ex Globis scorbuticis acido Ovis, renes & vicinas membranosas partes rodentibus. Fibræ ob id



vellicatarum spasmo crispatae, & contractae, pororum angustiam inferebant, quas non nisi latex urinaris solus, absque contentis seu imbibitis Oibis pertransire poterat: aut si Balnei vel Opii usu laxarentur denuò fibræ, & patefcerent renales meatus, Oibus scorbuticis saturata transmittebatur urina. Verissimum scilicet est, ex affectu spasmodico à Oibus scorbuticis, nervoso generi insensibilissimis, adeoque tam in partium urinarum, quam abdominis doloribus præter alias occasiones supprimi posse urinam; ut accuratè hoc annotavit *Dravvizi* : l. *supr. cit.*

§. XXVI. Videntur sufficere, pro confirmatione partium, partim pro illustratione asserti nostri, Opiata sudoris profluvia excitare ratione spirituum animalium, sistendo illorum impetum, undecunque excitatum, & hinc tollendo spasmus seu contracturam fibrarum nervearum curis rete ex parte componentium, adeoque removendo pororum constrictionem & vasorum glandularum intercutanearum excretoriarum occlusionem. Sub quo tranquilliori spirituum motu, & pacatior status in totâ Republicâ microcosmica observabilis est. Remittente enim undique fibrarum, seu staminum partium solidarum, aut fundamentalium, iut compositionem mechanicam saltem firmantium, tensione fortiori, permeabiliores undique fiunt meatus, etiam alias exilissimi, promptius faciliusque quaquaversum penetrant contenta liquida quælibet, & perspirabilius universum sic redditur corpus. Ipsum sanguinis Nectar, vel febrili turgescencia & quasi ebullitione, rapidius pervasa raptum, aut fomentorum ac stragulorum calidorum applicatione notabiliter alteratum, & ad sudoriferi laticis dimissionem dispositum, sub tali corporis statu (sub quo & nimia effervescencia aucutiori sub febre, conturbans totam ejus massam, moderator ordinariò observatur) liberiore motu undiq; corporis perreptat latebras, speciatim intercutaneas in glandulas serosam sarcinam, & hujus sub involucri, quælibet heterogenea separata, & quasi ex ejus massa præcipitata recrementa, copiosè desponit, quæ sudoris in rivulos pededentim concrefcit & effluit.

§. XXVII. Saltem quâ ratione & modo in spiritus agant Opiata, ita ut sub exigua adeò sui mole, insignis sequatur alteratio in toto illorum systemate, inquirendum superest. Asserta & explicata fuit superius textura Opii pinguis seu oleosa vel Sulphurea, quæ pro more concretorum oleosorum speciatim oleorum Qatorum, in minimâ mole latissimè diffusiva existunt: declarat hoc, v. g. ol.  $\Omega$ . anisi, vitè cum vitello ovorum subactum, cujus quot sunt guttæ, tot ferè  $\nabla$  simpl. mensuras, odore, sapore & nonnihil colore imbuere solet. Tale ol. est saltem resina vi  $\Delta$ is liquefacta, & à crassiore reliquo corpore separata, qualis resina condensata adhuc & ita concentrata viger in O-

pio,

pio, cujus o  
les existunt  
se diffundun  
que penetrat  
tur. Unde  
partes minu  
minus alter  
doriferis or  
ciatione no  
explicare o  
ad Curios  
cum jam ol  
toto corpo

§. X  
bili effectu  
ni generosic  
tum non ad  
dor, hyp  
exanimat  
restituit, v  
quatenus  
cit, stupen  
stantis assu  
hystericos d  
tum Horati  
quodque eu  
phill. nac. r  
etiam pilul  
cave sis, ne  
moschus P  
mirabilem  
seqq.

§. X  
silium tran  
contractu  
efficaciam  
externè tu  
inditum,  
cas. 9. ut



pio, cujus oleosa resina ratione quoque latissimè diffusibiles & explicabiles existunt Opii atomi seu minima, quæ dum in minimo undique se diffundunt, ferè odorum instar latissimè explicantium, undique penetrantium, & ob via quæque plus minus afficientium se habere videntur. Unde etiam probabile videtur, ab odore tali subtilissimo, qui solidas partes minus tactu, ob subtilitatem afficere, liquidas ob perexiguam molem minus alterare valet, saltem subtilem & delicatam spirituum texturam, ab odoriferis omnium maximè alterabilem, affici, & mutua utrorumque, associatione notabiliter immutari. Odorifera hæc Opiatorum vis sensibilibus se explicare observatur, sub ejusdem secundum *Langelotti* methodum in *Epist. ad Curios.* præparatione & quasi fermentatione. Nec ignota fuit veteribus, cum jam olim & *Dioscorides* illam observavit, de Opio referens, odorem ejus toto corpore expandi.

§. XXVIII. Subtilissimorum talium odorum vis, tantum non sensibili effectu se exerit, in summè debilitatis, & lypothymicis, quos odor vini generosioris, vel cujusdam aromatis, ∇ Cinnamomi penetrantioris, tantum non ad vivos revocare videtur. Pariter atque zibethi, moschive odor, hypochondriacæ suffocationi obnoxias mulieres repentinâ syncope exanimat, quas castorei plumarumve incensarum odor volatilis denuò restituit, ut ut insigniter ægrarum idiosyncrasia hæc varient. Odor dico, quatenus spiritus animales in Odoratus corporeo organo sensibile afficit, stupendia talia concitat symptomata. Tantum enim abest, ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi fœminis, ut etiam paroxysmos hystericos dictos, efficaciter sistant & refrænent. Comprobat hoc Experimentum *Horatii Angenii*, Medici olim Eruditissimi, quod refert *l. 12. Epist. 7.* quodque eum nunquam fefellit: Rec. mosch. optim gr. v. cinamom caryophyll. nuc. mosch. ana. ʒj. M. in Vino odorato mista hauriantur: in quo loco etiam pilulas de moscho, ceu præsidium efficacissimum commendat. Sed cave sis, ne fortè nares feriat talium Odor. Sanè umbilico illita zibethum vel moschus Paracelso ad hysterica talia mala, laudantur. Plura quoad odorum mirabilem efficaciam vid. ap. *Helmont. tr. imag. ferm. impragnat. §. 16. & seqq.*

§. XXIX. Præstant tam singularia odores, dum per organorum sensillum transfennas saltem spiritus afficiunt, quid non facient, propiori sub contractu ac miscelâ, si invicem coire illis datum fuerit. Utroque modo efficaciam suam exerit opium. Quoad internum usum res alias nota est; externè turundæ in formâ, granum unum atque alterum laudani naribus inditum, profundissimum bidui somnum inferunt, teste *Timæo. cas. l. 2. cas. 9.* ut taceam poma somnifera, spongiarumque hypnoticas naribus



pro arcendâ agrypmâ identidem admovendas, Practicis quibusdam usitatas. Sub tali Ergo odore subtilissimo Opiata agunt in spiritus animales, quorum materialem texturam seu constitutionem, indeque dependentem impetum elasticum speciali suâ textura, seu seminali dote, ut alii vocant, adeò alterant, & quasi irretiunt, ut à debitis expansionibus remittentes, minus fibras sensorias aut motorias tendere sustineant, quia moderatio in sub motu, somni larvam induunt.

## C A P. III.

*Dubia nonnulla diluit.*

*Thes.*

Opium subind Vomitum provocare, secessum & Urinam promovere, Lochiorum fluxum adjuvare, sudores suppressere, Crises minus impedire observatur, &c.

## §. I.

Somno tam naturali, quam Opiatorum artificiali, quasvis excretiones, adeòque & vomitus sisti, supra innuimus, experientiâ quotidianâ confirmati. Obstacle non leve contra assertum hoc se offert ex eo, quod post Opiatorum vespertinum usum, vomitus matutinus, quin & interdum alvi fluxus infecutus fuerit, id quod & *Helmont.* non leviter aliàs Opio favens, observavit, tr. *ins Duumviratus* §. 62. & crebriori experientiâ in hoc confirmatus fuit *Rolsinkius Chym. l. 4. f. 6. c. 6. p. 248. Conf. simul. eleg. observ. Celeb. Widelie: Opiolog. l. 2. f. 1. c. 5. p. 92.* Sed conciliatio apparebit facilis, modò consideremus, opiata irritationis sensum, in Pyloro præsertim sopiendo, & spirituum animalium motum sistendo, adeoque fibrarum spasmodum præcavendo, per se Vomitus compescere, per accidens verò interdum, saltem ubi priores istæ operationes jam cessaverint, eundem stimulare.

§. II. Considerandus hic venit Opii sapor amarissimus, acris, in subjecto viscidissimo hærens, qui ob id non nisi difficulter exlinguâ, post levem etiam gustatum elui potest. Amarities ista singularis & specifica, ut inimica existit Linguae, ita hostilis admodum est stomacho, alias quævis amara, speciatim viscida horrenti, cum acidis inprimis delectetur. Tetrum  
illum



illum saporē mox horret Venterculus, & nausēā hinc concitatā sive gustatum saltem, sive assumptum fuerit Opium, tādium istud confiterur. Parili fere ratione, atque rhabarbari, aut aloēs, scamoniive odorem & saporē amaricantes singulariter mox nausēat stomachus, adeo ut quasi peculiarem tactum sive gustatum, secundum *VVillisium. Pharm. Rat. p. 1. f. 2. c. 1.* vel odoratum juxta *Helmontium, tr. Cast. Err. §. ult.* habere videatur. Nausea ista sopitur quidem aliquandiu primitus, quousque nempe Opii in spiritus viget actio, indeque & sensibilitas fibrarum ventriculi, & spirituum movendi eas nix aliquantisper sufflaminantur. Ast ni particulæ istæ hostiles, interea haud correctæ aut subactæ fuerint, sed viscidior illa texturâ pertinacius agglutinata hæreant adhuc interiori nervæ ac admodum sensili ventriculi tunicæ, facile molestæ istius continuæ impressionis occasione provocari spirituum impetus, & sub regimine pylori spasmus ventriculi, adeoque vomitus concitari potest. Confirmat hoc meum assertum non leviter, quod ab Opiopilulari in formâ exhibitio, & præsertim ab eodem spiritu vini saltem præparato, vomitum inprimis ceteri observavit *VVedelius. Opiol. c. 1. p. 92. & 93.* Viscidissimam enim & amarissimam sub hac præparatione opium retinet texturam, & quæ pilulari in formâ diutius in ventriculo hæret, & non nisi successivâ dissolutione corrigitur, adeoque diutius & sensilius parietes illius membranas afficit. His modo dictis, socianda simul & alia concausa, qualitas nempe & situs recrementorum præter naturalium, circa primas vias plus minus stagnantium aut turgescantium, qui mediante Opii operatione in spiritus, in motu suo plus minus oppressi, illa cessantē, denuo & interdum atrocius quam antea, commoti, simul vomitum, in stomachante jam ventriculo promovere solent.

§. III. Sanè non leviter hostile videtur ventriculo Opium, cujus ut digestionem ordinariò turbare observatur, ita etiam gravaminis ac compressionis circa ventriculi regimen, sensum, & vix explicabilem ab ægris molestiam circa præcordia Opiata inducere solent, idque præsertim siccâ in formâ, omnium maximè Pilulari si propinentur. Manu ergo hæc ipsa nos ducunt, ad legitimam Opii, quoad hoc punctum, correctionem, ac præparationem. Textura nempe viscida & glutinosa resolvenda, adeoque quatenus oleosa seu Sulphurea ad faciliorem sui diffusionem, simulque quasi promptiorem distillationem redigenda, & liquidæ essentiæ seu Tincturæ sub formâ propinanda. Promptioris sic operationis evadit remedium, & quod sine diuturniore in spiritus actione confortati vi potius, quam stupefactivi rationem habebit, ac absque singulari ventriculi, primariarum viarum molestiâ, citò tuto, & jucundè curabit. Quas intentiones haud melius assequi possumus, quam applicando generalia ista mechanica ( si non semper Naturæ, revera



tamen ( artis instrumenta , acidum & alcali. Illud agendo primario in alcalinas Opii particulas & hinc etiam in oleo fas, illarum medio universam ejus texturam alterando , urinosum nempe vol. figendo , ol. sum verò condensando , castrat & plus minus enervat generosam aliàs medicamenti energiam. Idque eò magis, quo potentius acidum fuerit, quale istud mineralium esse solet , unde acetum & saltem in hac præparatione , a. citri succus eligendus, utpote ex eadem cum Opio, vegetabili nempe prosapiâ. Parilis acidorum vis & in purgantia obvia, quæ omnia ab acidis , præsertim intensioribus aut fixioribus castrantur insigniter. Præstat ergò, pro supra insinuatò scopo , ad Laudani ex Opio præparationem adhibere alcali quodcunque fixum , v. g.  $\ominus$  Tart. seu generalem omnium vegetabilium deleteriorum aut Oeconomix nostræ hostilium, tam solutivorum, quam stupefactorum, aliorum vè correctorem. Agit scil. hoc ipsum sive siccâ, sive humidâ in viâ procedatur , in Opii texturam resinofam, attenuat hanc ipsam non nihil, dissolvit oleosum, viscidum incidit, acidum temperat, hinc nimiam acrimoniam corrigit, ac ita totum concretum promptius solubile & undique diffusibile, uti & cuivis fluido permiscibile reddit. Corrigitur hoc ipso simul acris & nauseosa ejus amarities, mitiorque & minus inimica ventriculo redditur. Aded ut considerationem ulteriorem mereatur omnino , utrum acrimonia ista resinarum, aromatum, purgantium &c. non secus ac opiatorum, non ex acido potius, quam ex alcali derivanda veniat. Cum quotidie observemus, oleum  $\Omega$ ta à calcinatis rectificatione mitiora & minus acris evadere. Correctum sit per alcalia Opium , optimè spiritus vini beneficio, in essentia Tincturæ vè consistentiam redigitur, commodè vel sub hac facie propinanda, vel imbibendo eadem pulveres quasvis, in pulveris larvâ obvelanda, aut spiritus dicti abstractione in extractum, redigenda. Sunt nonnulli, qui ulterius  $\ominus$  Tartari, vel  $\oplus$  Vini , vel ipsum Vinum addere amant , pro exactiori Opii correctione , methodo omnium certissimâ, quâ optimè præparatum Opium tutissimum evadit remedium. Vereor a. ne nimis cicuratum Opium debilius aut tardioris pro vehementius interdum urgentibus symptomatis operationis fiat. Dum ergò tam laudabiliter corrigitur Opium à  $\ominus$  Tartari, fixo, quid non sperandum erit , de eodem volatilifato ? penetrantioris omnino & potentioris hinc activitatis. Cujus locum interea suppleat,  $\ominus$  Tartari triplo oleum  $\Omega$  therebinthinæ probè imprægnatum, & ita quasi elixiratum ; Præparatio revera, quæ non absque præmeditatâ ratione primitus ordinata fuit à *Starkey* peritissimo Chymiatro Anglo, & crebriori postmodum experientiâ confirmata plus omnino in recessu habet, quàm ut obiter à *Willisio: Pharm. Rat. p. 1. f. 7. c. 3.* ad empiricorum remedia referenda sit.

§. IV.  
explicata fu  
ab Opii utu  
aliqualem a  
mulum, al  
fis intestine  
constringi  
cessive eor  
nantur sol  
desiderato  
tum potius  
fibrarum  
quæcunq  
speratum  
observand  
120. & pra  
p. 340.

§. V.  
Opiatorum  
dens pron  
fuit.

§.  
in puerper  
liberè fluu  
manifesta  
lent, tunc  
marum:  
sensibiliter  
ris occasio  
rituum or  
simul uter  
hæc loca  
manmis  
istorum i  
dem dum  
tur, nihil  
Par nemp  
occasione  
tis in cal



§. IV. Quæ modò de vomitu Opiatorum usui interdum supervenienti explicata fuerunt, eadem pariter excretionibus per inferius guttur, aliquando ab Opii usu observatis mutatis tamen mutandis applicari possunt. Sed præter aliqualem ab acrimoniâ nauseosâ in particulis ejus viscidis intestinorum stimulum, alio modo alvi solutionem promovere potest, quatenus in dolorosis intestinorum pathematis, eorumque fibrarum spasmodicâ contractura, constringi pertinacius solent intestina, & contenta minus, cessante ferè successively eorum peristaltico motu propellere. Frustra sub tali articulo propinantur solventia alvum quæ vel malum exasperant sensili stimulo, absque desiderato effectu, vel inverso penitus superiorum intestinorum motu, vomitum potius provocant. Sin verò Opio leniantur dolores, ut remittat inde fibrarum spasmus & durius antea emolliatur quasi abdomen, facile solutiva quæcunque, sive junctim sive seorsim modo dicta remedia propinentur, speratum sortiuntur effectum; id quod in Colicis & Iliacis Pathematis probè observandum, docente hoc experto *Wedelio*: *Opiolog.* p. 2. l. 2. c. 5. p. 120. & praxi idem confirmante, in *Misc. Acad. Nat. Cur.* ani. 2. obs. 238. p. 340.

§. V. Urinæ excretionem, eamque post eam quæ sit per sudorem Opiatorum usui subindè supervenientem, uberiorem, quomodò per accidens promoveat Opium, jam supra §. 32, c. 2. pluribus explicatum fuit.

§. VI. Revocant hæc in mentem istud ad Phænomenon persapius in puerperis observare datum fuit, dum nempe primis 2bus vel 3bus diebus liberè fluunt lochia, quæ sub turgescente in mammillis Lactæ sponte, absque manifesta causa alia, sive præcesserit lactea febris, sive non, supprimi solent, tunc scil. temporis, dum dolere & tumere, simulque indurescere solent mammæ: sed cessante dolore & vel insensibiliter translato aliorum lacte, vel sensibilibiter per papillas transudante, liberè fluunt denuò Lochia, Nempe doloris occasione intensioris, in sensibili illo mammarum globo, & turbatur spirituum ordinatus motus, stringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur simul uteri ejusque membranosa vaginæ fibrillæ, hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus, qui largiter redit, simulac cessante in mammis dolore, cessat etiam fibrarum contractura. Nec est, quod fluidorum istorum impetum ex locis inferioribus ad mammas hic objicere velis, siquidem dum durat adhuc mammarum repletio, aut per papillas etiam lac excernitur, nihilominus, modo dolor illarum remittat, redit lochiorum profluvium. Par nempe hic est ratio, atque intensiorum post partum dolorum, quorum occasione etiam supprimi plus una vice observavi lochia. Unde & memoratis in casibus (nisi in priori Lactea febris obster) opiata cæteris remediis

speciatim



Speciatim misturæ polychrestæ ex Lap. 69. c. aceto additâ myrrha, permiscere fausto cum successu consuevi, cujus usu restituto spirituum motu in ordinem, & relaxatis hinc fibris, tantum abfuit, suppressus exinde fuerit purgamentorum fluxus, ut auspicio potius redierit.

§. VII. Simile quidem observare licet in infantibus achoribus affectis, quibus sub dentationis doloribus, mox achores disparere solent, superveniente hinc febre continuâ lymphaticâ, plus minus acuta, subinde cum gravi ruffi, aut alvi fluxu comitata: sicut cessantibus doloribus istis, efflorescere denuò auspiciatò, cum febris aliorumque symptomatum cessatione solent achores. Nempè doloris occasione inordinatus spirituum redditur motus, & fibræ aliarum quoque partium sensilium præsertim inter cutaneæ istæ in facie, ceu proxima regione stringuntur, indeque achorosâ materiæ ulterior excretio impeditur, isto quod jam effluerit exarescente penitus & decedente. Hinc turbatur simul sanguinis tam progressivus quam fermentativus Motus, excernendis istis per faciei ambitum retentis, febrili ebullitioni occasionem subministrantibus, ac tussim vel diarrhæam inducentibus, ubi de acriori illo acido Osa lymphæ vel ad tracheam arteriam l. intestinorum tubulos aliquantulum excretum fuerit. Donec cessante dolore, & æquabilis spirituum redeat motus & ordinatâ magis fermentatione sanguinis mediante particularum istarum acidorum plus minus viscidarum secretio & quasi præcipitatio, ac intra poros cutis per glandulas ob de uno relaxatas fibras secretio superveniat.

§. VIII. Tandem Opium egregium esse sudoriferam supra pluribus excussumus, dubium tamen assertum hoc reddere videntur tabescentes. Notissimum est, phthisicos, vel ad phthisin declinantes ægros, copiosis sudoribus nocturnis esse obnoxios, ita ut quidem, ut simul atque perfecto somno corripiantur, mox toti sudoribus dissolvant. Observatio autem repetita in Praxi me hætenus docuit, præcaveri optimè posse sudores huiusmodi, revera colliquativos, Opii vespertino usu. Aliquot saltem exempla recensere juvat: Mulier plebeja 42. annorum pleuritide gravissimâ correpta, & jam ferè deplorata septimo scilicet demum die opem meam implorans, per Dei gratiam, sudoriferorum imprimis appropriatorum ope convaleuit. Restabant autem adhuc Tussis humida, difficilis nonnihil respiratio, aliaque similes speciei symptomata, Phthisin minitantiâ, quæ usu decocti heder. terref. & cherefolii sublata quoque fuerunt. Saltim sudores nocturni continui, pleno rivo emanantes, emaciantes insigniter & debilitantes supererant. Pro quibus coercendis præsentaneam Opem sensit ex Laud. Op. gr. iij. cum antihect. Poter gr. XV. misto, & sub introitu lecti, post moderatam prægressam canam assumpto, cujus usu primitus cessarunt isti sudores coque continuato penitus

penitus exar  
gravissimâ c  
spiritu minu  
venientibus  
tumax malu  
calor quasi  
simis sudor  
quibus coë  
hect. Poter  
horis duab  
co, pro tu  
Pilulæ, ex  
gr. iij. cum  
vespertinis  
sos noctup  
sudores C  
solet.

§. IX  
supponend  
continuatu  
alias aliqu  
quant ut p  
& ut ipsi  
non illos in  
mâ spiritus  
enim narco  
dicis tædic  
Phthisicis  
tura, und  
defatigan  
illorum ra  
pium, du  
alterat, &  
Phthisici  
solidas re  
nem, req  
mentaliu  
primis de  
minus po



penitus exaruerunt. Superiori anno Civis Academicus Jurium studiosus, gravissimâ corripiebatur hæmoptysi, ipso ex aliquot annorum tussi humida, spiritu minus libero, nativa corporis constitutione, aliisque similibus supervenientibus ad Phthisin disposito. Ussu convenientium remediorum, contumax malum sævire desit, ipso ægro cætera commodè habente, saltem quod calor quasi hæcticus ab omni pastu, cum tussi moderatâ humidâ, & copiosissimis sudoribus nocturnis etiam sub primis somni horis, superessent. Pro quibus coërcendis optimè contulit pulvis, ex arcani duplic. *℞. Lap. 69. anti-hæct. Poter. ana. ʒ℥. Land. opiat. per ferment. gr. IV. ad V. M. pro 4. dosibus* horis duabus ante cœnam assumendis. Non secus ac Viro perfectè Phthisico, pro tussi nocturna aliisque symptomatis nonnihil coërcendis præscriptæ Pilulæ, ex anthiect. *Poter. ʒj. sacch. Saturni ʒss. extr. croci. gr. vij. laud. ferment. gr. iij. cum s. q. bals. peruvian. in debitam consistentiam redactæ, pro 2. dos. vespertinis, ante cœnam assumendæ, præter alios usus, & sudores copiosos noctu promanantes compescuerunt. Adeò ut talibus in casibus reprimat sudores Opium nimios, quos deficientes, promovere optimè solet.*

§. IX. Pro hoc Phænomeno, tanè difficili dilucidando, duo præsupponenda veniunt. 1. Quod Phthisici omnium optimi, Opiatorum etiam continuatum usum ferre possint, ut supra insinuatum fuit, & cum eadem aliàs aliqualem languorem, & notabilem corporis lassitudinem post se relinquunt ut plurimum, in Phthisicis contrarium accidat, qui vegetiores exinde, & ut ipsis saltem videtur, robustiores potius redduntur. Quo ipso tamen, non illos intelligo, qui jam ad extremum Tabis gradum perducti, supremâ spiritus difficultate laborant, & subinde suffocandi videntur talibus enim narcotica, omninò futura essent necrotica, d. qui in Chronico & Medicis tædiosissimo affectu, medio adhuc sunt in oradu. Scilicet in præfatis Phthisicis subtilis admodum, ac rara deprehenditur spirituum animalium textura, unde & facile dissipabiles existunt iidem, ( indeque minimis motibus defatigantur tales ægri, ) & sub somni præsertim quiete contractiores magis illorum radii, minus extremas partes animant. Mutat autem eosdem Opium, dum condensando quasi, aut figendo nonnihil, raram eorum texturam alterat, & facilem dissipabilitatem coërcet, ut vegetiores hinc reddantur Phthisici. 2. Quod in genere ad fluidorum corporis nostri debitam in partes solidas receptionem, per easdem transmissionem, uti & ex iisdem excretionem, requiratur omninò certus fibrarum nervearum, ceu staminum fundamentalium Tonus, ultra materialis texturæ rationem, à spiritibus in suis imprimis dependens, qui scil. nec strictus sit nimis, nec angustatis aut occlusis plus minus poris intermediis, aut coarctatis præter modum vasculis tam traje-



Storibus quam excretoriis, impediatur debitus contentorum transitus, nec laxus nimis idem esse debet, ne flaccidioribus redditis partibus, aut pori meatusque earum ita per meabiles fiant, ut non tam transmitti fluida, quam spontaneo motu permeare eos undique, & ubique ceu per spongas penetrare videantur aut orificiola vasculorum receptoriorum ex tono illo flaccidior collabantur, ac ita debitam transmissorum fluidorum trajectionem sistant. Quibus præmissis, & ab omnibus facile concedendis, suspicor, in Phthisicis tam copiosos effluere sudores nocturnos quatenus sub somni quiete, spiritus animales, rarioris, ut supra dictum, texture, minus irradiant partes extimas, adeo ut debito fibratum Tono conservando minus sufficiant, unde per patentiores undique meatus, & poros partium intercutanearum, & speciatim glandularum, nutritius succus interdum ex alimentis congestus, sed ob sanguinis dyscrasiam non assimilatus, sponte sua, sub sanguinis circulo (simili ferè ratione, atque supra de syncopis monitum) penetret, & ita nec cum sanguine untius, nec in meatibus partium solidarum debite coercitus, promptissime, quâ datâ portâ ruat, & sub sudoris facie diffluat. Compescir vero hunc Opium in Phthisicis, corrigendo istam spirituum texturem, ut Tono fibrarum conservando melius sufficiant, quo partim transmitti naturaliter queat nutritius succus cum sanguine per vascula intercutanea & meatus ne proprio impetu elabatur, partim retineri diutius intra poros partium nutriendarum is ipse, eosdem irrorare & nutritioni deficienti aliquantisper sic saltem succurrere.

§. X. Dum itaque sudorem egregiè promoveat, quin & secundum superius monita, nimios contentorum tumultus, quibus Naturæ Medicatricis negotium, non raro turbari solet, non nihil refrenet laudandum Opium, suspicio suboriri possit, an perpetuæ sit veritatis Practicorum effatum, *Opium in stante Crisi haud adhibendum, quia Criticum Natura motum inhibere aut sistere soleat.* Multa equidem de Crisibus, eaque ad pompam magis Theoreticam, quam usum practicum facientia, hinc inde apud scriptores medicos deprehendi solent, quæ ad nostra Climata, eorumque Incolas & horum Diætam, indequæ natos affectus minus applicari possunt, unde etiam tam rari sunt veri motus Critici in ægris nostris, ut taceam incertum admodum dierum Criticorum computum, adeo ut bonus Medicus negligere debeat Crisin, ut loquitur *Helmont.* de febr. c. XI. §. 18. si scilicet eam possit anticipare, seu ante Crisis adventum morbum superare. Nihilominus cum ad quælibet attentum deceat esse Medicum, in acutis maximè morbis, quorum incertæ adeo sunt *Hippocrate* autore, prædictiones, ne in his circa Opiatorum usum, adeo polychrestum, nocuementi quid accidat ægris, omnino præcavendum. *Distinctio autem motuum Criticorum observanda est, dum quædam*

excretiones  
vellicatis, a  
provocantur  
vis Crises im  
hæa, hæc  
eveniunt sit  
concoctoru  
rem, item  
Opium,  
eas, quatenus  
terdum im  
nimium Cr  
per transpo  
terix ad sui  
cubitum, &  
motu medi  
pidiorem,  
cum sudore  
coctæ non  
paroxysmi  
Critica per  
ante parox  
solet parox  
coercere in

§. XI.  
rarò illo so  
Cutis Crib  
positionem  
tisque deb  
quacunque  
operatio d  
alias usus a  
tio, ne sit fi  
terus, obic  
ait, pro ubi  
tas, in The  
detur, Opi  
nus sudoris  
tu intestino



excretiones Criticæ fiunt , mediantibus simul partibus organicis, quibus vellicaris, adeoque sensu earum affecto, & hinc peristaltico concitato motu, provocantur partim, partim promoventur per eas excretiones, & tales quas vis Crises impedit, plus minus sinit Opium, quales sunt, quæ vomitu, diarrhæâ, hæmorrhagiis quibusvis accidunt, &c. Aliæ Criticæ evacuationes eveniunt sine tali partium activo & motivo concursu, per simplicem humorum concoctorum seu præcipitatorum motum transcolatorium, quales per sudorem, item per urinam observantur, & hæc Crises, minus impedire arbitror Opium, dextrè & circumspectè adhibitum. Quinimò promovere potius eas, quatenus graviora symptomata, motum contentorum Excretorium interdum impediunt, saltem plus minus turbantia sistere, & ita tutiorem ad minimum Crisim reddere valet. Idem asserendum videtur, de istis Crisibus, quæ per transpositionem fiunt, & quibus tumores superveniunt, has ipsas, & materiæ ad sui in certis locis secretionem, & inde coacervationem dispositæ decubitus, qui impedire valeat Opium, non video. Circulari enim sanguinis motu mediante, cum omnes modò memoratæ contingant Crises, eumque rapidiorem, aut concitatiorem refrænet Opium non nihil, hoc ipso ad meliorem cum sudore & urina excretionem, vel in apostema congestionem materiæ coctæ non parum conferre verosimile est. Intermittentium febrium quot paroxysmi tot parvi morbi acuti esse videntur, ordinariò ferè excretionem quasi Criticâ per sudorem, interdum verò per urinam finientes, præmissum in his ante paroxysmum Opium, cum specificis antifebrilibus, ut multum minuire solet paroxysmos, interdum penitus profligare, haud tamen sudorem in ilis coërcere in fine, aut impedire observatur.

§. XI. Eo ipso autem, quod sudationem saltem promoveat Opium, rarò illo solo pro sudorifero utendum erit. Haud enim sufficit, quod Cutis Cribrum ad transcolationem per meatuum aperturam & aptam dispositionem ritè se habeat, nisi & sanguinis alteratio ac quasi fusio, ambientisque debita temperatura unâ conspirent. Ob id appropriato sudorifero, quacunque formâ exhibendo, sociandum, & ita mutua unione utriusque operatio & effectus eò magis perficiendus. Opii nempe polychrestus alias usus ad sudorem sic specialius determinatur, sudoriferorum verò operatio, ne sit frustranea, præcavetur. Observavit hoc jam olim felicissimus *Platerus*, ob id in *Observat. suis* l. 3. p. 633. & 727. sudoriferis narcotica se addere ait, pro uberioris sudoris provocatione. Quinimò hoc Veneranda antiquitas, in Theriaces Mithridaticque compositione ac præparatione attendisse videtur, Opium insigni in dosi, cæteris quamplurimis ingredientibus, plus minus sudoriferis addendo, & una fermentando. Sub quo fermentationis motu intestino, tam oleosæ & resinosæ, plurium ingredientium ipsiusque adeò etiâ



Opii particulæ attenuantur & resolvuntur, ut inde penetrantiores ac magis activæ evadant, ( unde & ad decennium fermentationem extendere voluerunt Arabes ) quam novum concretum ex mutua confermentationis unione, Onium vol. ol. sum anodynum & sudoriferum emergit. Quod adeo rigoroſe urgent *Platerus in Obs.* & *Waleus in Meth. medend.* ut illæ compositiones absque Opio, ceu sua animâ vi sudorifero carere aſſerant.

§. XII. Ex hæcenus allatis, facile est intellectu, quibus in casibus Opium sudoriferis sociandum sit, nempe quodcumque symptomata urgentia impedimento sunt, quo minus sudare queant ægri. Nullum enim symptomata urgere solet, quin spirituum animalium p.n. impetus vel causæ efficientis proximæ vel concomitantis rationem saltem habere soleat, unde de facili, occasione tali contrahi fibræ cutaneæ, & coarctari excretorii pori possunt: ut taceam M. Sæ cæterorumque contentorum, vel perturbatos intestinos, vel concitatos nimis locales motus, sub tali statu simul plus minus sudoris dimissioni reluctantes. Frequens scilicet causarum efficientium, ut ut subinde mutuo subordinatarum observatur Circulus in Oeconomîa animali, adeo ut & contentorum vitia, plus minus vellicent partes solitas, quâ occasione irritantur spiritus, quorum impetus postmodum plus minus modificat illorum motum. Qualis circulus non minus manifestus est, in mutuo partium consensu, dum stomacho frequenter condolet caput, & hoc malè habente stomachus propriam subvertit Oeconomiam. Pariter & frequentissimè quibusvis urgentibus symptomatis, per consensum affecta cutis, claudit poros, sudorisque obdurat fontes.

§. XIII. Varias autem inter partes, quibus consentire solet cutis, specialem sui considerationem merentur præcordia, hoc est ista abdominis pars, quæ extrinsecus quidem regione epigastricâ & ex parte hypochondriacâ circumſcribitur, intrinsecus vero stomachum inprimis complectitur, prout hodiè hæc Vox accipi solet: & à *Celso in primis l. 2. c. 3.* ferè describitur. Ut ut enim Doctissimus *Fernelius* febr. l. 4. c. X. præcordiorum nomine, ventriculum, diaphragma, jecoris Cava, lienem pancreas, Omentum aut mesenterium simul complectatur, tamen Ventriculo ob eximium sensum, manifestum ejus cum cæteris partibus membraneis consensum, primariò præcordiorum appellatio convenit; ipso ejus officio communiter superiori, dicto, *æpædia* Veteribus appellato. Unde & *Celsus* præcordiorum dolorem stomachi infirmi indicium aſſerit; l. 1. c. 8. *Hæc ipsa præcordia*, ut modo laudati *Trium Gallia Regum Archiatri* verba c. i. mea faciam, *Et partes omnes quæ circa hæc sunt, quia membranis sepiuntur, nervosque sentientes suscipiunt à sexta* (secundum Veterum Anatomicorum ordinationem) *Cerebri conjugatione, eximio tangendi sensu sunt prædita; Magnâ etiam societate tum principibus,*

bus, tum exte  
mox principib  
num merac  
mox tamen e  
rar: Ex hisce  
festo afficit  
& frigida p  
Vomiturus  
fungos sum  
præcordia  
Ec. Ec. H  
calentes, p  
tiana, aut  
leniant, qu  
corporis ha  
vel exercit  
tus sudore a  
nelius de p  
quotidiana  
comptior n  
ferim pen  
illitis, for  
minui, inte  
netrant eni  
tam sensibi  
ægri, cui  
rum region  
per vomit  
sub illioiti  
nearum fil  
nemò faci  
§. X  
bitus corp  
doris tran  
branosus g  
hinc, quo  
bus in qu  
ut etiam i  
coactus fu  
ex partium



bus, tum externis corporis partibus connexa sunt, iisq; adeo consentiunt, ut affecta  
 mox principes partes, universumque corpus in consensum trahant. Sic enim Vi-  
 num meracius, liberaliusq; sumtum, tametsi Ventriculo nondum elapsum est,  
 mox tamen exulcerata Vesica, aut vulnerati Cruris, aut arthritidis dolorē exspe-  
 rat: Ex hisce autem sedibus febrium horrores rigoresque, in quibus cutis mani-  
 festo afficitur, suscitari elegantet idem docet Fernelius, dum c. i. ita pergit: Sic  
 & frigida potus liberalior, corpus universum frigore horrore vè concutit. Bilem  
 Vomiturus rigescit, multoque magis, qui alienum vitiosumque cibum, velut  
 fungos sumsit. Rigescit & cui calidum mordaxque medicamentum ventriculum  
 præcordiaq; ferit, non minus quam si nudam cutem, aut ulcus acrius compungat.  
 &c. &c. Hoc quoque vel inde constat, quod si accessionis initio humidi foci aptè  
 calentes, præcordiis imponantur, maximè vero Lien in quartana, jecori in ter-  
 tianâ, aut cuicunque alii sedi fomes inesse deprehendatur, horrorem rigorem vè  
 leniant, quia nimirum ipsi mali fontes demulceant. Jam verò sudores, non è solo  
 corporis habitu, sed & interdum è præcordiis moveri, hinc sciri potest, quod qui  
 vel exercitatione, vel Cardore exæstuant, si frigidam liberalius bibat, mox to-  
 tus sudore diffluat. &c. &c. Hæc ipsa sanè, quæ hætenus eleganter disseruit Fer-  
 nelius de præcordiorum cum habitu corporis cutaneo præsertim consensu,  
 quotidiana ubertim confirmat experientia, & quod de foci calente refert,  
 comptior moderna Praxis per olea & ta feliciter præstat, quatenus ab his, præ-  
 sertim penetrantioribus, v. g. caryophyll. aut macis, aut cinamon, præcordiis  
 illitis, foci lateris calentis desuper admoto, rigores horroresque manifesto im-  
 minui, interdum ab iis maturè applicatis penitus præcaveri, observamus. Pe-  
 netrant enim profundius talia olea & ta, & ipsum ventriculum sui quasi afflatu  
 tam sensibiliter afficiunt, ut meminerim, superiori anno crebrius vomentem  
 ægrum, cui & ta talia, oleo nucistæ expresso excepta ventriculi seu præcordio-  
 rum regioni frequentius illinebantur, sponte sua afferuisse, se in rejectaneis illis  
 per vomitum, linguæ iudicio exactè sentire linimentum illud, cujus odorem  
 sub illioitione alias perciperet. Jam verò in istis rigoribus horribusque cuta-  
 nearum fibrarum contracturam, clausuramque pororum simul contingere,  
 nemò facile dubitabit.

§. XIV. Prout itaque diversimodè afficiuntur præcordia, etiam ipse ha-  
 bitus corporis cutaneus per consensum multipliciter constitutus, adeoq; ad su-  
 doris transmissionem magis, minus vè dispositus erit. Mirabilis sanè est mem-  
 branosi generis in universa corporis machinâ connexio & consensus, mutuaq;  
 hinc, quoad tam actiones quam passiones conspiratio & concentus, iis in cali-  
 bus in quibus anatome nondum lucem subministrat sufficienter, adeò obscura,  
 ut etiam ignotam actionem regiminis, ingeniosissimus alias Helmont. fingere  
 coactus fuerit. Ex quo consensu etiâ nasci videntur horrores isti rigores vè, qui  
 ex partium membranarum abscessu, fonte suâ rupto, ordinatiò ægros affligit,



ruptique abscessus, haud postremi indices sunt, membranæ scil. perforatis, pus factum effundentibus, sicque sensibilibiter laxis, cætero membranaceo genere consentiente. Sed ut revertar in viam, illa inter pathemata, quæ ex præcordiorum consensu sudoris effluvia cohibent, eminent vel maximè inexplicabilis illa circa præcordia, seu stomachi regionem molestia, seu anxietates, quas *vulgò Hersens. Angst* appellitant, quasi ipsum cor pateretur primario; quæ frequentes videntur occasiones, pororum contracturæ, sudorisque ob id deficientis in morbis præsertim acutis malignis. Sæpius scil. in praxi malignarum febrium observamus, æstu ante maximè corpore, ægro ipso copiosius bibente, stragulis etiam cooperto, cum pulsu celeri, frequenti, plus minus vehementi & magno, (ut nihil dicam de illis, qui malignis in febribus, quoad urinam, calorem &c. sanorum similes apparent) nullum sudorem, etiam post propinata sudorifera elici posse, cute semper squalidâ & aridâ, ac quasi nonnihil corrugatâ existente, ægro alias naturali in statu, facillimè sudante. Jam equidem concedendum est, alteratum his in febribus esse insigniter sanguinis statum, impediens plus minus laticis pro sudoris materia secessum: quod tamen hæc sola, in tali ægri, præsertim siticulosi ac bibacis, statu, tali cum pulsu &c. causâ sit, denegati penitus sudoris, equidem persuadere mihi haud possum, quin potius arctior fibrarum cutanearum strictura, & hinc pororum clausura videatur sudorem impedire. Nempe ventriculo, ejusque superiori orificio malè affectis, speciatim fermento maligno, contagioso obsessis, ut anxii, inquieti, & agrypni, sine manifestâ causâ redduntur ægri, ita tantum non integrum membranofum genus consentire, hinc & cutaneæ fibræ contrahi videntur. Diffuso verò ulterius maligno fermento, & systema nervorum plus minus afficiente, eo magis & nervea cutis compati, hinc portas quasi undique claudere, & sudore quoque transitum pertinacius denegare pergit. Unde fermento maligno, quod acidum statuit, ab gialibus fixioribus absorpto, rexari pororum contractura, corpusque denuò transpirare, non ineleganter asserit. *Tachenius*: H. C. c. 21. p. m. 165. 167.

§. XV. Sed quod de præcordiis, fermento venenoso in febribus malignis obsessis modò monitum fuit, cujus hostili præsentia, anxietates ipsis ægris non explicabiles, inquietudines, agrypnæ excitantur, & per contentum hinc pororum corporis contractura inducitur, ulteriorem postulat explicationem. Nempe præ cæteris affectib<sup>9</sup>, perquam contagiosæ existunt maligniores febres quæ contagia fermentativa, vel fermenta contagiosa, utrumque rectè dici videtur, quæ inspirationis medio, ut plurimum se nobis insinuant, quasunque etiam alias corporis partes afficiant, semper simul ventriculo communicantur, indeque nunc citius, nunc tardius, pro circumstantiarum tam in agente quam patiente differentiâ, nausea, in explicabilis quædam circa præcordia molestia seu

seu anxietas,  
lus, horror,  
supervenient  
impressionem  
motoris spiritus  
tueatur, Con  
disc. super H  
experimenti  
tractum in  
venire est bo  
Es in constit  
ingluvie) m  
dus. Hinc  
res confessa  
tium, Tumu  
merbrock de  
culus vel Es  
servatus fuer  
gii suscepti su  
tuitur. Sa  
jæstigationi  
gione ita ma  
tento digito  
pessimè affec  
que hinc dive  
dorque supp  
chis, &c. an  
cutaneæ exc  
tendi, ex fib  
farentur ag  
sum cætera  
& cutis pori  
symptomati  
doriferi




seu anxietas, alvi etiam constipatio, sitis intensa, vagus, ut ut primitus leviusculus, horror, (ut taceam cephalalgiam & agrypniam, nunc citius, nunc tardius supervenientes) agrum affligere solent, horrente universo systemate inimicam impressionem, circa stomachum factam, & quasi undique contrahente ope motoris spiritus quosvis meatus, quo ab hostis peregrini insultu, eo melius se tueatur. Contagiorum hunc afficiendi modum, expertus insinuat *Lindanus*, *disc. super Hartm. prax. Chym.* dum inquit. *Ita autem propagari contagium, ego experimentis didici, tam in me ipso, tam in aliis; Miasma scilicet fuisse primum attractum in ventriculum, & statim nauseam subsequutam. Nauseam autem supervenire est bonum, signum enim est, non statim transire ad massam sanguineam; & in constitutionibus epidemicis notandum neminem nauseare, (nisi forsitan ex ingluvie) nisi qui miasma acceperit, & si adest nausea, mox vomitus provocandus.* Hinc etiam febrium malignarum sedem principalem in ventriculo esse, res confessa est, apud *Bartolinum cent. 3. epist. 42. p. 156. pariter ac apud Helmontium, Tumul. pest. p. m. 843. 967. 891. conf. Bartolin. cent. 3. hist. 68. 80. 50. it. Diemerbroeck de pest. l. 4. hist. 15.* adeo ut semper ferè in febribus malignis ventriculus vel Escharam vel inflammationem, vel alia hujus census contraxisse, observatus fuerit. Propterea etiam tam in malignioribus, quam peste ipsa, si contagii suscepti suspicio, sit, initium curæ à vomitorio optimo cum Consilio instituitur. Sanè si ægros tales in morbi progressu anxietatibus, inquietudinibus, jectionibus, cephalalgis, &c. affectos interroges, in quam corporis regione ita malè habeant, *wo ihnen denn so angst und bange sey /* epigastrium intento digito monstrant, & hoc ipso Medico insinuant, ventriculum imprimis pessimè affectum esse, per cujus consensum & capitis membranæ tendi, caputque hinc diversimodè dolere videtur: qua occasione & cutis contrahi pori, sudorque supprimi probabilissimum est. Exinde enim in variolis, purpuris, petechiis, &c. anxiis & hinc inquietis existentibus ægris, vix ac non nisi imperfectè, cutaneæ excretiones succedunt. Nempe ut membranæ sub epigastrio partes tendi, ex fibrarum irritatarum spasmò tali sub statu solent, quod ipsi interdum fatentur ægri *es sey als wenn alles darum voll sey und thone /* ita & per consensum cæteræ membranæ partes tendi, ut supra ex *Fernelio* deductum fuit, hinc & cutis pori simul pertensas & contractas fibras coartari solent. Pro quibus symptomatis mitigandis Opium optimo cum consilio selectis additur, vel sudoriferis, vel alexipharmacis, de quo cum supra jam actum fuerit, vela

hic contrahimus, & dissertationi præsentimponimus

FIN E M.

L.N.J.





I. N. J.

## De Coraliorum Tinctura.

Faber Pan-  
chymia l. 4  
6.9.

**N**ON Thales solùm Milesius, οφωv iste οφώραλ, firmiter sibi persuasit, ex Aquâ omnia primam sumisse originem, sed modernorum quoque quamplurimi, experientia adjuvantes rationum subtilitates, idem adstruunt, quibus ingens rerum varietas, quâ aquæ Oceani præprimis se jactitant, non leviter patrocinator, quæ ipsa fertilitatis palmam Terræ, ingenti rerum multitudine, quas tanquàm alma parens sinu suo quotidie excludit fovetque, superbienti ambiguum omnino reddit. Commoti exinde Antiqui Gentiles, Mari quoque Deum suum Neptunum tribuerunt, regio Tridentis insigni eum instruente; innuente hoc ipso, latè ejusdem per omnia 3. Regna. minerale, vegetabile & animale, diffusam potentiam. Adhæc spuma Maris est ista materia, ex quâ amica Venus, omnigenæ fertilitatis parens, enata fingitur. *Nihil enim aqua potentius, & efficacius in rerum naturâ reperiri potest, vita & mors ubi ipsa dependent, infinita que secreta & arcana sunt in intimis aquæ, quæ regna omnia prætiò superant & antecellunt.* Nos impræsentiarum sepositis cæteris ramum saltim Coraliorum rubrorum è maris fundo decerpamus, eumque, ut Chymicorum hætenus in exuendâ ejusdem purpurâ industriam fatigavit, paulò exactius, assistente Divini Numinis gratiâ, consideremus. Necesse est autem, ut primò

## Statum Controversiæ.

Legitimum formemus, considerando non tantum, quid Tincturæ nomine in specie intelligendum veniat, sed vel maximè ipsam Coraliorum essentiam exactius pensitando, quæ cognita fili Ariadnes loco ad superandum præsentis controversiæ Lebyrinthum nobis inserviet.

§. I. Ipsum

§. I.  
ducit vox Co-  
ratio vera ad  
puellam signi-  
Coralium è  
gonia dicitur  
Alii à Coral-  
vidius.

Hic  
Alii dictū e-  
rum esse re-  
catur quib-  
nio Dendri-  
omittimus)  
tes hoc ipso  
raliaque ob-

§. 2.  
gno, mine-  
tabili, an p-  
scens in dur-  
in lapidem  
enim decit  
remnenda  
dere videtur  
gendo exact-  
ornatu desti-  
tinet, sed pl-  
pria videtur  
di corallina  
crassitiem,  
Quod bac-  
Ad hæc rep-  
liorum indi-

Dioscor. l. 3.  
hin. 7.  
fert. E.  
cel. de  
subier  
Chym



§. I. Ipsum ergò quod attinet nomen, ex Græcia natales *Ganfi* hinc ducit vox Coralii, apud Latinos equidem usu recepta, ut ut Erymi Coralior. ratio vera adhuc dum lateat. Quibusdam enim à Græco *κοράλη*, quod 2. p. 23. puellam significat, nomen accepisse placet ob Poëtarum fabulas, qui Ovidius l. Coralium è virgis, cruore Gorgonis Medusæ perfusus (unde & Gorgonia dicitur) & in lapideam duritiem concretis, enatum narrant. Itē l. 4. de Alii à Corallis, Ponti accolis, nomen inditum putant; de quibus Ovidius. *Pon. Synonyma v. ap Gansum c*

Hic mea cui recitem, nisi flavis scripta Corallis. Alii dictū existimant Corallium, quasi *cor alens*, non enim postremum esse remediorum cordi robur addentium, de quo postea: vocatur quibusdam *κοράλη*, Latinis, frutex marinus læxus, (Plienio Dendritis, alia enim synonyma brevitati operam daturi consulto 564 Bauh. omittimus) quasi saxeam l. lapidem arborem dicere velint, innutentes hoc ipso, ambiguum ejus naturam, quam inter vegetabilia, mineraliaque obtinere vibetur. *platar. l. 39 p. 793. 798.*

§. 2. Nondum enim inter Eruditos lis ista decisa, cui re-*sic Paracel* gno, minerali an vegetabili inferenda sint Coralia? & si vegetabili, an plantam sui generis viridem invadendo succus lapide-*Mercuri* scens in duritiem istam coagulet, an verò jam emortuum lignum fixat<sup>9</sup> dici in lapidem transformet? Quod prius attinet membrum, (hoc *tur arcan.* enim decisò posterius per se patebit) ex utraq; parte non con-*corallini* temnenda se sistunt argumenta. Esse enim vegetabile persuas-*musc* dere videtur 1. arbusculæ elegantissima forma, quam sese surri-*dam Mari* gendo exactissimè representat, hoc uno excepto, quod foliorum *ob simi* ornatu destituta sit, qualem figuram nullum aliud minerale ob-*litudinem* tinet, sed plantarum generi, tanquàm naturalis quædam dos, pro-*corallina* pria videtur, sic refert *Matthiolus in Dioscorid.* se habere ejusmo-*appell.* di corallinam plantam, quæ propè radices brachii ferè habeat *De hac cō-* crassitiem, & è medio trunco in ramos elegantes se diffundat. 2. *tro. v. Pli-* Quod baccas ferat similes cornis & specie & magnitudine. 3. *nium l. 23.* Ad hæc reperiuntur furculi lignosi, qui ex parte tantum Cora-*Hist. natu* liorum induerunt faciem, ex parte verò ligneam vegetabilem, *ral. c. 2.*

† m

often-*matthiol.*

*Dioscor. l. 5. c. 97. Boet. l. 2. de gemm. c. 153. A. Bacc. l. de gem. c. 73. Ban-* *hin. Tom. 3. c. 33. l. 39. Hoffm. de med. officinal. qui ad muscum re-* *fert. Eichstad de confect. alkerm. c. 17. Calceolar. in Musf. 4. En-* *cel. de re metall. l. 3. c. 3. Tenzel. exeges. Chym. Kircherus Mund.* *subterr. l. 9. f. 3. c. 6. Ganf. de Corall. c. 2. Feburc. Traité de la* *Chym. p. 686.*

Phoralis,  
sum fiste o-  
mi, experi-  
aditruunt,  
his se jacti-  
m Terræ,  
u suo quo-  
ind reddit.  
m suum Ne-  
tes; innuen-  
vegetabile  
est ista ma-  
enata fin-  
naturæ re-  
creta Gar-  
e antecel-  
im Coralio-  
Chymico-  
fatigavit,  
eremus. Ne-

o, quid Tin-  
aximè ipsam  
a fili Ariad-  
anthum nobis  
§. I. Ipsum



ostendunt formam, sicque ex ligno & lapide compositi & quasi conglutinati videntur. 4. Notum quoque est sagacioribus naturæ scrutatoribus, sapius in fontibus quibusdam aliisque aquis, ligna à spiritu lapidifico, quo aqua ista egregiè imprægnata sunt, in lapidem converti, quidni idem fiat in mari, tantâ salis copiâ refertò, cum spiritus lapidificus salinæ esse prosapiæ statuatur? sic in vicino Jenensis civitatis territorio ejusmodi reperitur fons intrusum lignum in lapidem convertens; sic in Hiberniâ suprâ Armacanum urbem in stagno haud amplo hasta lignea defixa, pars quæ aquis tegitur, vertitur in cotem: (ut ut hoc quidam in dubium vocare audent) In Boreali Ultoniæ provinciæ parte fons est, qui ligna per septennium immersa indurat in lapidem. In Bohemiâ quoque propriè Thermas Carolinas fons est, in quo lignum diu durans in lapidem convertitur.

§. 3. Esse verò Minerale Corallium, ipsa natura ejusque essentia vel lippientibus monstrat, cum consistentia lapidea ejusque solida durities firmiter hoc ipsum persuadeat, qualem à succo lapidescente, lignum vel plantam imprægnante, frustra expectas. Ligna enim concreta in lapidem in certis aquis à succo lapidescente diversam planè repræsentant formam à Coralliis; sunt enim plerumque instar cotis, vel lapidis alterius ex granulis multis compactim concreti, & ex arenulis quasi concatenatim conflati; cum econtrâ Coralia continuum planè ostendant nexum, sine vestigio concretionis ejusmodi l. granulatæ compactionis: sed quasi cera Hispanica, in varias figuras per liquefactionem extensa, appareant, & non nisi vehementiori triturâ in pulverem vel arenulas redigantur. 2. Minus rectè accenseri vegetabilibus, sed mineralibus accensendum esse ex eo confirmatur, quod careat omninò radicibus, sicque non per alimenti veram introfuctionem & digestionem, vegetationi plantarum necessariam, sed saltim partium superadditionem crescat: patet hoc ipsum ex experientiâ sagacissimi Naturæ Scrutatoris Kircheri, qui rupis integram partem ex profundo maris extractam, totam Coralliis oblitam, inter rariora Musæi sui asservat, cui varia conchyliorum genera annata sunt; in hæc rupe, partim ex concavâ conchyliorum parte, & aliorum convexâ, partim verò ex ipsa soliditate saxeam erumpunt Coralia, nullis planè suffulta radicibus, utut diligentissimè circa eorum inventionem laudatus autor laboraverit, sed ipsi trunco velut agglutinata sine ullo perfora-

*Mund.  
subterr.  
l. 9. f. 3. o. 6.*

forationis,  
descendentem  
querentur,  
quoque vel  
non determi  
ut plantæ in  
agunt fund  
de adhæresc  
à Piscatorib  
tabulæ lign  
verant, con  
runt; sic M  
cranium Hu  
sic ex lapide  
que ejus co  
tereâ consi  
quas vegeta  
renuit: Cu  
Madrepore  
marini, al  
plantarum  
nè assimile  
esse easdem  
secus ac Co  
adeò invadi  
abundantiss  
istâ duritie  
harum disp  
naturâ ipse  
venit peculi  
dubio pro  
adscribunt  
tribus, h  
naturam m  
stirpibus li  
bus insigni  
qui in quan  
fundit Cor  
liis, delphi



forationis, vestigio spectata sunt: posito ergo indurari per lapidescentem succum plantam, saltem quoque vestigia radicum relinquenterentur, sicut truncus illibatus persistit; ut taceamus, nullum quoque vel fructuum vel foliorum in iis reperiri signum. 3. Adhuc non determinatè rupes in maris fundo proutuberantes incolit, sicut plantæ in Terrâ saltem crescunt & adoleſcunt in eâque radicum agunt fundamenta: sed, ut dictum, non petris tantum & saxis nudè adhærescit conchyliisque adnascitur, sed, ut citatus autor refert, à Piscatoribus una cum stirpibus extracta fuerunt ossa, lateres, saxa, tabulæ ligneæ, ferramenta, omnia Coralliis, quæ in eis excreverant, conferta, quin è duro delphini corio Corallia propullularunt: sic Magnus Dux Hetruriæ, Pisis in suo gazophylacio, habet cranium Humanum, ex quo Corallina planta excrevisse spectatur: sic ex lapide coctili aliquando nascuntur, ob solidam vero firmamque ejus coalescentiam nulla ex eo nasci planta potest. 4. Prætereà consimiles saxæ concrectiones in fundo maris reperiuntur, quas vegetabilium tractabili genti inferere saxea earum barbaries renuit: Cujusmodi sunt Pori, tam magnus, quam ramosus, it. Madreporæ variæ species, planta saxea, Abrotonoides, tubuli *Bauhin. in hist. Plant. T. 3. l. 39. c. 34. 35. 36.* marini, aliaque corpora saxea, ut Coralliis affinitate juncta, sic plantarum formam referentia, cum tamen saxeis petrosisque plantis assimilentur substantiis. Asserere quidem quispiam possit, esse easdem similiter plantas à lapidifico Spiritu coagulatas, non secus ac Corallium: verum cur quæso hic succus determinatas adeò invadit plantas, & quare non alias, quibus maris fundus abundantissimè confitus est, similiter vegetabilium species saxæ istâ duritie indurat? Fortè cum *Boëtiô* hoc propter singularem harum dispositionem contingere ais, vel quod succus lapidescens naturâ ipsorum substantiæ insit? sed quoad prius explicanda venit peculiaris ista dispositio, è progenie occultarum qualitarum dubio procul oriunda; quoad posterius, hoc ipso vegetabilium adscribuntur ordini, quo succum Lapidescens ipsiſ connotum tribuis, h. e. ex eo oriri asseris. 5. Firmiter admodum astruit naturam mineralem generatio Coralliorum, inest enim Corallinis stirpibus liquor quidam spermaticus, quem per canaliculos, quibus insigniores præsertim ramuli instructi sunt, de se emittunt, qui in quamcunque rem deciderit; ibi statim densatus, novam fundit Coralli propaginem: Hinc, ut suprâ relatum, in conchyliis, delphino, &c. Coralli furculus enatus fuit; hinc integræ planæ



in maris rubri fundo Coraliorum Sylva reperiuntur, tantâ earum copiâ condensatâ, ut ne piscibus quidem aditum concedant: sed hæc non conveniunt in plantas, quæ vel per furculos, vel semina vel radices, easque tam fibrosas, quam bulbosas aut tuberosas sese multiplicant: ut taceamus, aliena hæc planè esse à planta lapidefactâ h. e. à plantâ emortua. Quæ enim ratione planta in lapidem concreta generabit succum prolificum & sperma, quod similem plantam producat?

§. 4. Hæc sunt, quæ ex utrâque parte prostant argumenta: ex quibus non immeritò cum Eruditiss. Kircherò dicere quispiam possit: *Coralium quo nomine appellem vix difficio, nec enim plantis vegetabilibus nec lapideis excrescentiis id rectè annumerari potest, satius ita quæ ῥιδοφύον h. e. planto lapidem appellandam censemus, dico medium quid inter lapidem & plantam.* Sed cum rerum in Classes distributio non ab accidentali forma externaque earum configuratione, sed speciali potius essentia desumenda sit, Coralium ad mineralium & in specie saxearum propaginum seriem relegamus utur quoad externam faciem, arbusculæ speciem repræsentet, dicimusque Coralium esse lapidem in fruticis speciem concretionem.

§. 5. Necessè E. jam est, ut oppositæ partis argumenta diluamus: quod itaque externam fruticis configurationem attinet, non sufficit eadem ut vegetabilibus annumeretur Coralium, ab externa enim formationis similitudine ad ipsius essentia indentitatem non valet consequentia: non enim statim Frutex est quod *Gansius. c. 2. p. 25.* fruticis gerit speciem. Non secus atque *Fructus Medice* scutellatæ, orbiculatæ, vel turbinatæ cochlearum minorum referunt *te- 2. l. 17. c.* ita exactissimè, non tamen pro Cochlearum habentur domiciliis, *64. Bauh.* & *scorpioidis Fructus* (non tantum qui spinis horret, sed præprimis, *Tom. 2. l. 21* qui crassior est, colore viridi & sine spinis, longè exactius priori *c. 23. Ta-* erucam referens) adeò erucæ formam, ejusque in se convolutæ *berna. p. 2.* spiras repræsentat, ut ob id Germanis *Raupen-Kraut* vocitetur, *§. 8. c. 153.* non tamen pro veris habetur erucis: sic *fungus phalloides*, ut ut pudendis humanis utriusque sexus similimus, & boletus Cervinus, licet *Cervi* genitale sæpius exactissimè referat, propterea tamen animalium non annumerantur partibus, cum tamen eadem horum sit proportio ad res repræsentatas, quæ Coralii ad Fruticem quandam vegetabilem. Ut taceamus Coraliorum Fruticem ramorum saltem divaricatione, sine vel foliorum vel florum ornatu atque



atque radicis fundamento, plantæ referre imaginem: imò ipsa eo- *Kircherus*  
rum in ramulos expansio non adeò ordinata & artificiosa est, *Mud. sub-*  
qualem in vegetabilium conspiciamus gente, sed inordinatæ pla- *ter. Tom. 2*  
næ & quasi fortuitæ sunt eorum excrescentiæ, protuberantiis ver- *l. 8. f. 1. c. 8.*  
rucosis quandoque similes, quos hinc inde absque consilio ratione- *Boet. l. 2. c.*  
que jactant & exporrigunt, ut non tantum ad vivum depictæ eorum *72. Agri-*  
ostendunt imagines, sed vel maximè vera exemplaria ex mariti- *col. de nar.*  
mis asportata locis hoc ipsum confirmant. Cum interim notis- *fos. c. 14. 15.*  
simum sit, quam varias formas lapidibus imprimat ludens Na- *Excel. de*  
tura, ingeniosissimos quoque artifices in stuporem & admiratio- *lap. & gē.*  
nem quæ rapiunt; sic elegantissima Crystallorum est facies, & po- *l. 3. c. 77.*  
lygonæ naturæ geometricantis, topaciorum, amethystorum, *varia sa-*  
aliorumve figuræ, peculiarem ostendunt sapientiam. Sic sylvas, *lium for-*  
urbes, arbores, humanas figuras, brutorum facies mirabiles, & *mal. 3. c. 30.*  
innumeras piscium ac diversas picturas, integra hominum alio- *varia a-*  
rumque corporum simulacra lapidibus imprimi, hasque in tales *chatis schē*  
statuas elaborari Naturæ curioforum testantur monumenta: *et. Matth.*  
quidni idem Corallii contingat? cum in illis saltem per accidens, *in Diosc. l. 5.*  
& joco quasi Naturæ tam elegantes exprimantur formæ, in his v. *c. 7. cū qua-*  
exprimari suâ intentione & datâ operâ, ob certam materiæ dispo- *Lam. &*  
sitionem aliasque concurrentes circumstantias in arboris speciem *Cornarius*  
contingat elaboratio. Quod baccas attinet, suntæ aliquor cora- *mirantur*  
liorum spermaticus, post extractionem sub forma coriandri aut bac- *Plin. italia*  
cæ corni crassæ instar pinguedinis residens: quæ v. in Coralliorum *proferentē*  
monilibus, cornis & cerasis similes videntur, ex ipsorum truncis *Matthiol.*  
tornò & lyma prius purantur, mox myridis lapidis pulvere, & *c. 1. Wormi*  
terra quadam Tripolitanâ expoliuntur, & lucidum quendam le- *in Mus. c.*  
vorem contrahunt, cum iis diutius fricantur: quod verò *3. p. 231.*  
antur ligna, quæ ex parte suam obtineant naturam, ex parte sint *Kircher. a*  
Corallia, hoc ipsum ostendit, succum spermaticum per Coralliorum *supra p. 160*  
canaliculos extrusum, si quando incidat in plantulam veram li-  
gnosam, investire ejus corticem, & extraneo quasi amictu indu-  
re sicut sæpius à piscatoribus ramosa herba una cum Coralliis ex-  
tracta fuit, quam plerique myricam aut algam è maris fundo extra-  
ctam dicunt: dum corpora Nitro-Sulphurea, mira quadam  
amicitiæ lege, hanc plantam appetentes: nam lapidea ista lorica  
obducunt, sicut in Gazophylacio *Cardina. Barbarini* simile Cora-  
lium, tandem in myricæ affinem plantam desinens, invenitur: ubi  
v. hujusmodi algæ aut myricæ defunt, ibi nihilominus in ramos



extenditur eo modo, quo efflorescentiæ minerales in varios ramulos continuata partium superadditione panduntur. 4to jam supra satisfactum.

*Kircherus  
Mund.  
Subterr. f.  
3. tom. 2. c.  
6 Paracel-  
sus de glu-  
tin. Aqua  
Gansius c.  
2. Platea-  
rius apud  
eund. Ten-  
zelius ex-  
ges. p. 693.*

§. 6. Vindicata hæc tenus Natura minerali Coraliorum necesse est, ut genesis ejus quantum fieri potest explicemus. Generari ergo dicimus coralia ex succo quodam minerali Salino Nitroso, pinguedine & viscositate quadam Sulph. imprægnato, qui per subterraneum Ignem, per poros fundi maris erumpit, sed ubi attigerit marinas Aquas, protinus tum frigore, tum congelante earum falsedine, subsidet, primaque fundamenta agit futuræ concretionis, ex allabente v. & expirante continuo novo succo, coagulata ista materies sensim distenditur, sensimque in altum elevatur, quæ novo novoque corpusculorum Sulphureo-Salinorum affluxu non tantum condensatur, sed ulterius quoque ascendendo, ob copiam succi turgens, hinc inde in ramos erumpit, qui ex novo appulso succo primo quidem verruculas quasi promunt, quas recens salinus liquor ulterius extendendo, in furculorum ex ramulis enatorum speciem expellit; quod si abundantia nimia distendendo arbusculam dirumpat, vel ex ramuli extremitate exsudet, exstillans liquor spermatis naturam assumit, sicque novam corallii propaginem fundat, & quamcunque rem attigerit, tanquam fertile solum osculando, novo superingesto spermate in arbusculæ speciem similiter extollitur: Eodem E. modo celebratur hæc Coraliorum genesis, quo cæteræ Salium efflorescentiæ contingunt, vel quomodo enati sunt filices, alique lapides, qui ramulis insignes & fruticum speciem gerentes reperiuntur, quales se vidisse ad Albim propè ostium Tangræ memorat *Encelius* de re metall. l. 3. c. 3. Estque hoc id ipsum, quod loquitur *Paracelsus* tr. de glutine aqua: *Coralia oriuntur ex tenaci resinâ s. glutine, quod ipsorum proprium est, & prima ipsorum materia est quasi forma & liquor alicujus resinæ, quæ lapideam in se proprietatem habet: &c.* Rectè v. materiam Salino-Sulphuream statui patet ex lapideâ duritiæ Coraliorum, quæ ex Salino principio non tantum dependet, sed in specie quoque spiritum Lapidificum dictum in se continet, qui nil aliud est, quam Sal universi centrale, l. Sal Naturæ, vel Spiritus Salinus, subtilissimus, qui ut aliis aliisque sibi proportionatis Aquis, salibus & Sulphuribus junctus omnem lapidum atque gemmarum varietatem peperit, ita & Coraliorum materiæ sese insinuando eandem postmodum in lapideam istam duritiem induravit. Sal verò

Cora-

Coraliorum  
ætanus, qu  
latione eme  
sulphurea, c  
hæc ipsa qu  
conjungens  
scentiam fo  
Coraliorum  
spiritus lap  
canus subt  
sua succum  
causa adju  
succu ulteri  
spiret coëre  
ratur.

§. 7.  
duritiæ sub  
nebris mari  
tur Solis asp  
enim tantu  
succo, sed  
tum, omni  
informis in  
tur, qui inte  
dem, non t  
quoque sub  
altum exsur  
piscium tran  
duram eoru  
piscatorum  
omnino eff  
à solo Aëre  
tamen mini  
ipsis, figm  
non raro  
fatis firmar  
inter frutic  
cedunt imp  
fistulosum



Coraliorum Nitrosum esse vel Nitro Sulphureum affirmat Quercetanus, qui ex hoc quoque spiritum eorum ardentem in destillatione emergentem oriri asserit, huic Sali adjunxit sese viscositas sulphurea, quæ non coloris tantum elegantia decorat Coralia, sed hæc ipsa quoque salina conglutinans corpuscula, & visciditate suâ conjungens, soliditatem istam non parum promovet, & excrefcientiam formosam valdoperè adjuvat. Causa itaque materialis Coraliorum est succus iste salinus-Sulphureus; efficiens proxima est spiritus lapidificus ipsi inexistens, remota & sine qua non, est Vulcanus subterraneus. Ignis sub Terræ crusta reconditus activitate sua succum attenuans, resolvens & ad poros fundi maris elevans, causa adjuvans est marinæ Aquæ appulsus & urgens frigus, quod succi ulteriorem exhalationem repellens, & spiritum insitum ne exspiret coercens, ad congelationem egregie & coagulationem cooperatur.

§. 7. Ex modò deductis mox patet, quid de Coraliorum duritie sub aquis habendum sit, non enim adeo esse dura, in tenebris maris dum adhuc jacent sepulta, atque cum liberiori fruuntur Solis aspectu, facile ex modo generationis patere potest; non enim tantum sic omni nutritio & spermatico destituta essent, succo, sed ob duritiem nullum illius excursu concederent transitum, omnique proinde artificiosa carerent structurâ, & instar massæ informis insiderent rupibus; idem experientia eorum loquitur, qui interfuere Coraliorum piscationibus, à quibus dura equidem, non tamen lapidea deprehensa fuere. Interim tamen mollia quoque sub aquis existere omninò falsum est, qua enim ratione in altum exsurgerent? vel rapido maris motui resisterent? vel piscium transeuntium impetum sustinerent? Experientia quoque duram eorum soliditatem patefacit, dum extrahuntur, simulque piscatorum retia ab eorum furculis dilacerantur: Etsi in Aquis omninò essent mollia, unde post eorum extractionem durities à solo Aëre ambiente? atqui sic rursus solverentur in Aquis, quod tamen minimè ita se habet. Mollitiei v. quam tribuerunt antiqui ipsis, figmento, occasionem fortè dederit muscus iste villosus quo non raro obsita sunt, ex aquis dum extrahuntur. Duritiem n. satis firmam habent sub aquis, non tamen lapideam, sed mediam inter fruticeam mollitudinem & soliditatem saxeam sortita sunt: cedunt impellenti succo nutritio ex parte, & quidem ita ut in fistulosum canaliculum se excavari patiantur, sensimque cedendo ex

Denssing.

Vind. fact.

§. 8. p. 296.

ex Peires-

lio.

Beguinus

tyro. l. 2. c.

X. Boot. c.

153. l. 2.

Tencelius

ex epp. 695

Kircherus

c. l. Den-

sing. c. l.



De Coralliorum Tinctura.

¶ *¶* ex inferiori parte trunci densitatem respectu gracilitatis ramorum ostendant. Cur verò ex aquis extracta demum lapideam ossreamque assumant duritiem, causa primario in ambientis diversitate consistere videtur, quod succi illius lapidifico spiritu turgidi congelationem nunc promovet, nunc impedit; evulsa Corallia & in liberum aëtem tracta ab ambientis, humidum resolventis aëris, caliditate & siccitate, & deterfivâ humiditatis qualitate, intra exiguum tempus in perfectum saxum convertuntur, quod ipsum humiditas maris antea impediverat; confirmat hoc non tantum firmissima lignorum durities, post humidi resolutionem sese patefaciens, sed vel maximè Peireskii experientia, Coralliorum surculos post extractionem in leni fornacis vel Solis Igne indurantis. Quin tamen in aquis tandem quoque planè lapidescant non aded dubitandum est, inalescente spiritu labidifico & tandem indurante eadem: ut perfectissimam suam acquirant formam & consistentiam: quod asserit *Paracelsus*, ubi ad justam, in-  
quiens, magnitudinem pervenit, insito spiritu Salis & ætate induratur, id quod accidit vi ipsius propriâ.

Denssing.  
l.c.

tr. de glut.  
elem.

Aqua.

Tenc.

Exeg.

Chym.

p. 696. mo.

aus elabo-

randi. Gā

sius c. X.

Boot. c. 156

vid Kirch

Mud. sub-

terr. l. 9. f. 3

c. 6. Gansl

c. 3. Tence

lius. Exeg.

chym. p.

693. Faber

Panchym.

l. 4. c. 25.

§. 8. Haftenus de Naturâ Coralliorum, nunc ex differentiis paucis, quæ præfenti scopo conveniunt, perlustrabimus; Removemus autem hîc omnia factitia eorum & adulterata monstra, eaque solùm recipimus pro eliciendâ Tincturâ, quæ ex benignissimæ Naturæ gremio pronata, sunt, hæc ipsa verò cum sint rursus vel alba, vel rubra, vel nigra, (alias enim differentias, datâ operâ, sicco præterimus pede, utpote quæ pro extrahendâ Tincturâ non sunt usuales) ea tantum nostro inserviunt operi, quæ rutilante minii nativi colore se jactitant, quæque masculorum nomen habent, cum palescentes fœminæ dicantur. Hujusmodi verò coloris incunabula meritò cum Nobilioribus Spagyricis ex Sulph. deducimus, tanquam fonte, ex quo omnis colorum realium varietas in corporibus, spectanda emanat. Prout enim Sulphur à Vulcanò magis minusque depuratur, & Sal diversimodè exaltatur, non neglecto aliarum partium ad constitutionem corporis proximè concurrentium habitu, varia quoque colorum apparentia in corporibus oritur. Corallia quod attinet, eorum colores similiter ex Sulphure cum Salinoprincipio certo modo misto, hisque 693. Faber ab Igne subterraneo variè concretis & digestis oriri asserimus: in Panchym. quibus enim succus ille mineralis Coralliorum materies perfectè est coctus & elaboratus, Sulphur ejus optimè depuratum probèq; à sub-

à subterraneo  
probè exalta-  
pureo se osten-  
cruditas ob-  
lium, sin v  
mentia vel p  
exinde, calig  
miles color  
ctionis exh  
licet Cora  
gantem su  
mulcus vill  
fō æstimant  
abscondit;  
ris gestata  
lore inficiat  
ad carnes  
ut etiam ob  
culis liventi  
atomotum  
hæfione &  
ostendunt  
ne human  
quam heter  
tur, ipsi qu  
raliter cons  
febris ma  
fensio obf  
ita & un  
Et in huj  
quadam in  
appenfa C  
rotem ind  
sic dictis  
& furiosa  
plis afficit  
§. 5  
Spagyrici  
pro usu me



à subterraneo calore digestum, Sal quoque ab eodem suavi tempore probè exaltatum & resolutum, nobilissima Coralli species, quæ purpureo se ostendit nitore exinde generatur. Quod si nimia ejus sit cruditas ob defectum debitæ digestionis, album emergit Corallium, sin verò luxurians in succo Sulphur ab Ignis nimia vel vehementia vel propinquitate comburatur & corrumpatur, nigricans exinde, caliginosum *Paracelsus* dictum Corallium nascitur; sicuti similes colorum mutationes beneficio digestionis & in Igne coctionis exhibet continuò sedula Naturæ scrutatrix Chymia. Et licet Coralia ex pelago extracta, non statim manifestent elegantem suam purpuram, hoc tamen exinde provenit, quod muscus villosus, quo obsita sunt, (quem corticem quidem falsò æstimant, dum non in omnibus reperitur Coralliis) colorem abscondit, qui tandem eo detracto emergit. Licet quoque à Viris gestata diutius splendore suo radient, à fœminis verò citius pallore inficiantur, & appensa mulieri hystericae pallescant, sed si ad carnes mulieris sanæ affricentur, fulgorem recuperent, sicut etiam observatum est, ab instante morte morbove eadem maculis liventibus & nigricantibus conspurcari, hoc tamen saltem ob atomorum & effluviis ex corpore gestantis emanantium adhaesione & in poros eorum penetratione contingit: quo ipso ostendunt peculiarem quandam cum Tinct. microcosmi s. sanguine humano sympathiam; quâ id quod ex massa sanguineâ tanquam heterogeneum, præternaturale & excrementitium excernitur, ipsis quoque infestum & hostile est, effluviis ex sanguine naturaliter constituto minimè ipsis offensis: patet hoc præprimis in febribus malignis, in quibus ut sanguinea massa toto genere infenso obsidetur hoste (dum minutissimis tunc scatet vermiculis) ita & tunc Coralia magis quam aliâs splendorem deponunt suum. Et in hujusmodi casibus imprimis statuenda videtur simul actio quædam irradiativa *Helmontio* dicta, quâ etiam fit, ut rubra appensa Coralia hilaritatem & lætitiâ, nigra tristitiâ & mœrorem inducant, imò quâ illa affectibus melancholicis in specie sic dictis & Epilepsiâ egregiè opitulantur, hæc verò phrenitides & furiosas Manias sedant, pro vario scil. modo, quo *Archeus* ab ipsis afficitur.

§. 9. Ex hoc rubro Corallo, Tincturam elicere gestiunt *Tencelius* Spagyrici, quo colorem simul, cum nobiliori Coralliorum essentia *Exeg. p.* pro usu medico, rejectis Terrestribus aliisque inutilibus fecibus adi-

696. Liba-  
piscan- rius Gan-



*finis c. 8.* Pa piscantur. Est n. vera & propriè sic dicta Tinctura portio aliqua *racellus de* substantiæ propriæ corporis ex quo extrahitur, cum concentratio-  
*i. Q. E.* ne coloris & virtutis, idoneo menstruo extracta & exaltata: sic-  
 que Coraliorum Tinctura habebit ipsum in se esse formale Coralio-  
 rum. Quod verò extra ipsam datur, pro rejectamento habendum,  
 non secus ac in Moscho, demto odore, nihil aliud reliquum est,  
 quàm Cadaver; ita Coraliorum Tinctura est totum ipsorum esse  
 formale, quo habito cœtera susque deque habenda. Ex quibus  
 non difficile erit, Tincturæ veræ naturam ab apparente discernere,  
 quæ solum scilicet colorem sine essentiæ extractione obtinet. Licet  
 enim Tinctura in specie quidem colorem vel ejus saltem industria-  
 nem notet, dum à tingendo derivata sit, usus tamen obtinuit, ut  
 colori juncta nobilior Essentia Tincturam constituat, sicque nec  
 color sine essentiâ nec hæc sine illo Tincturæ laudem mereatur.

*Zwölfer* Veræ E. legitimæque Tincturæ hæc requiruntur conditiones: 1. *ut*  
*app. anim.* per extractionem, non v. Coralii corporis meram solutionem parata  
*adv. p. 59.* sit: ut enim illâ operatione essentia rei intima exhauritur, sic hæc  
 saltem res in calcem redigitur: ut in illâ purum ab impuro, essen-  
 tia ab excrementis segregatur, ita hæc eadem junctâ, statim discon-  
 tinuantur. Ex hoc sequitur. 2. Veram Tincturam eam non esse,

*Sennertus* *de cons. &* qua non remaneat abstracto suo menstruo sub colore suo proprio,  
*diff. c. 10.* sed vel Salis vel Calcis specie resideat, illud enim genuinus extra-  
*p. 391.* ctionis effectus, hoc v. corrosionis est, & illa Tinctura ex parti-  
*Zwölfer* bus Sulphureis & coloratis à toto oritur separatis, hæc verò ex men-  
*animadin* strui cum atomis corrosis conjunctione. 3. Necesse est etiam  
*pharm.* ne Tinctura, si debet esse vera, precipitari possit, sive contingat

*Augp. 438* per infusionem Spirituum vel Salium acidorum, in magisteria sic  
*Febuere* dicta, sive per menstruorum abstractionem & evaporationem in  
*Traicté de* pulveres Salinos albos, sic enim nil aliud quam subtilissimos pul-  
*la Chym.* veres menstruo corroderenti inexistentes Tincturam dedisse mani-  
*p. 687.* festatur. 4. Vera Tinctura rubra non nisi ex rubris Coraliis pa-  
 rari potest & debet, quod si enim similis operationis beneficio, ex  
 nigris vel albis quoque eliciatur Tinctura rubra, vel lippientibus  
 perspicuum fit, non à Coraliis, sed menstruis, per eorum vel lon-  
 gam digestionem, vel certam à corpore subjecto dispositionem  
 eandem oriri. 5. Ut corpus Coraliorum album & purpureo suo  
 ornatu spoliatum post extractionem remaneat; hoc ipsum enim  
 ut realem Tincturæ ex corpore extrahendo in menstruum transi-  
 tum notat, ita ejusdem coloris post extractionem remanentia

quid

quid aliud, t  
 Tinctura non  
 xuriat Sulph  
 ra ut ex Libr  
 parvam statu  
 pori permitt  
 Uncia differe  
 quam Regu  
 dicabitur.

Et hæc  
 ciant, sequi

§. 1.  
 ra, ex solo p  
 micorum su  
 veram dari  
 vel menstr  
 dacter men  
 pens multa  
 pro veris ve  
 possibilem  
 paratam, t  
 ita ut nond  
 nus prodita  
 facile per co  
 Sale & hoc  
 vix ac ne vix  
 forte per lgr  
 omnem spe

§. 2.  
 facimus.  
 Sulphure, a  
 trahi possit  
 haftenus in  
 struum illuc  
 acetum eoru  
 ostender,  
 ventus. S  
 acerrimam



quid aliud, nisi fucatam & apparentem ostendit Tincturam? 6. *Ue Tinctura non sit adeo copiosa*: non enim adeo copiose in Coraliis luxuriat Sulphur & abundat, sed ejus potius parcissima inest copia, ita ut ex Librà vix Unica una veræ Tincturæ parari possit, imò adeo parvam statuit *Lauremberg. c. l.* adeoque parcissimè & leviter cor-  
 pori permistam, ut per centenas Coraliorum Libras vix paucæ ejus Unciæ disseminentur. Hæc requisita nobis inservient postea tan-  
 quam Regula, ad quam processuum pro eliciendâ Tinctura veritas ju-  
 dicabitur.

Et hæc de Coraliis eorumque Tinctura in genere dicta suffi-  
 ciant, sequitur jam

## Decisio Controversia.

§. 1. An vera genuina & legitima detur Coraliorum Tinctu-  
 ra, ex solo principio ejus Sulphureo oriunda, valde discrepantes Chy-  
 micorum sunt opiniones, in genere tamen *quidam* omnino negant,  
 veram dari, sed omnem esse vel nudam Coraliorum corrosionem,  
 vel menstrui saltim talem colorationem: alii e contra hosce au-  
 dacter mendacii accusant, & nimis prompte in affirmativam pro-  
 pensis multas Tincturas, quæ non omne examen sustinent,  
 pro veris venditant: alii mediam terunt viam: non negantes  
 possibilem esse Tincturam veram, & secundum omnia requisita  
 paratam, sed valdè eam paratu esse difficilem, valdèque parcam,  
 ita ut nondum vera & stricte sic dicta à Spagyricis literis hæte-  
 nus prodita sit. Ossea enim & lapidea eorum compages, utut  
 facilè per corrosiva dissolvi possit, principia tamen Sulphur cum  
 Sale & hoc cum Terrestritatibus adeo esse firmiter connexa, ut  
 vix ac ne vix quidem postea unum ab altero separari possit, nisi  
 fortè per Ignem, qui tamen volatilizando & destruendo Tincturam  
 omnem spem eludat.

§. 2. Posteriores eamque veriores sententiam nostram  
 facimus. Compositum enim quoddam sunt Coralia & simul suo  
 Sulphure, à quo Tinctura dependet, debite imprægnata, hinc ex-  
 trahi posse per conveniens menstruum quis dubitet? & si nullum  
 hætenus inventum sit, quod huic satisfacere queat scopo, saltim men-  
 struum illud universale, Mercurius benedictus Philosophorum,  
 acetum eorum acerrimum, & Avicula Hermetis, efficaciam suam  
 ostendet, modo uberior paulò ejusdem apud Spagyricos sit pro-  
 ventus. Sicut *Rhumelius in Compend. Hermet.* per Aquam suam  
 acerrimam s. menstruum suum Universale eadem resolvit, posteaq;

*Gansius c.*  
*7. Laurem*  
*inaph Sala*  
*aph. 13. sec.*  
*1. Agricol.*  
*in Popp de*  
*Solep. 7.*

*Vid. Ang.*  
*Sala. aph.*  
*Chym. f. 1.*  
*aph 42 Tē-*  
*celi in Ex*  
*eg. 2 p. 689*  
*Sennert de*  
*conf. & diff*  
*c. 19. & pro*  
*am. in Inst*  
*t. 2. Crolli*  
*Basilchym*  
*Zwölfer*  
*Animad.*  
*in pharm*  
*438. & ap.*  
*59. Hartm*  
*in Crol. p.*  
*291. Gan-*  
*sus. c. 7.*  
*Rolsink. in*  
*Ch. p. 227.*  
*Laureb. in*  
*Salpar. 13*



*Eichst. de* cum Spiritu Vini extrahit. Et posito paucissimum inesse Sulphur  
*confect. alk* & inde oriundæ Tincturæ in Coraliis, hoc tamen una cum defectu  
*c. 17. Agr.* menstrui convenientis saltim summam difficultatem, non verò omni  
*in Popp. de* modam impossibilitatem declarat: & pauca licet extrahatur Tinctu-  
*Sole p. 7.* ra, non tamen eadem est nulla: licetque sit ardua ejusdem acquisi-  
*Rhumeli* tio, ob arctam principiorum unionem, non tamen supra Chymicæ  
*in Antidot* artis vires ejusdem possessio. Vulgares verò Pharmacopœorum Tinc-  
 turæ, vel aliæ etiam, quas elegantiores Spagyrici literis posteritati  
 prodiderunt, non sunt veræ propriæque dictæ Tincturæ, neque ri-  
 gorosum requisitorum examen sustinent, *sed vel colorata tantum  
 sunt menstrua, vel tincta eleganter Solutiones.*

*Hartmā.* §. 3. Quod itaque attinet primò Tincturas à menstruo  
*in Croll. p.* oriundas, hæ sunt omnes eæ, quæ ex Coraliis Igne actuali ante  
*293 Gansf* calcinatis oriuntur, & licet hæc menstrua aliquid solvant de Cora-  
*c. 8. §. 5. p.* liis, exinde tamen Tincturæ non est origo. Calcinatio autem  
*71 Zuvolf* ista fit vel cum Igne solo l. adjuncto unâ aut pumice, aut Sul-  
*Mantiss. p* phure aut Nitro. Quæ cum Igne fit solo, in eâ Coralia obler-  
*450 Señer* tis reverberationis gradibus, per biduum l. triduum calcinata,  
*Instit. l. 5. p* deponunt in Spiritum V. vel roris majalis suam Tincturam, fal-  
*3. §. 3. c. 9. p* sam scilicet non veram: diuturnâ enim & violentissimâ istâ Cora-  
*1395 Hofer* liorum torturâ, quid aliud nisi Sal quoddam fixum alkali (de  
*Herc. Me* quo quidam dubitant) cum Terrâ mortuâ conjunctum acquiri-  
*dic. l. 8. p.* mus, vel calcem quandam vivam acerrimam, destructa omni  
*1395 Grü-* Coraliorum essentia, omni eorum exhausta virtute, & expulsa  
*ling Flori-* Tinctura? Quod verò per vim Ignis expellatur omninò Tin-  
*leg Part 19* ctura, patet ex eo, quod non tantum ab albis Aquilæ Cœlestis  
*c. 2. p. 366.* alis s. Sale Armoniaci unâ eleveatur, sed cum Sulphuris quoque flo-  
*Crygnerin* ribus unâ ascendat & utrosque flores calore sanguineo ut imbuat,  
*Grüing. c.* ita viribus nobilioribus longè imprægnat, Coraliorum corpore,  
*5. p. 161. Fa* tanquam cadavere emortuo, ut in aliis contingit calci nationi-  
*ber. My-* bus resistente. Nobilior E. & spirituosior eorum essentia, in  
*roth. Spa-* qua vera Tinctura sepulta jacet, calcinationibus istis omninò pe-  
*gy. l. 3. c. 22* rit & evaporat; non secus ac Magnes valdè calcinatus vim attra-  
*Joh. Alpho* ctoriam omninò perdit, succinumque ustum vim trahendi paleas.  
*sus in Spe-* Non ignotum hoc fuit Aromatario illi Neapolitano, qui cum  
*culo Med.* electuario cordiali Regi Aragoniæ præscripto Coralia alba im-  
*Chistalum* miscere deberet, in defectu eorum, calcinando rubra, continuò  
*optim. p. 38* alba nactus est Coralia, ob quam fraudem à Rege 9000. Ducato-  
 rum



rum pœna affectus, Aromatarii dignitate privatus fuit. Cal- *Ganſi* §.9  
 cibus E. istis superfusa menstrua tinguntur ab iisdem, mediante *p.73 Schr.*  
 inprimis digestionem, non secus ac super aliis Salibus alkalibus idem *l.3.c.6. du*  
 fieri solet: qua ratione ex calce viva cum Modico Tartari vel *bia tamen*  
 etiam Nitr. certo modo conjuncta cum Spir. Vini Tinctura quo- *valde res*  
 ad colorem elegantissima extrahitur, vel (ut maneamus in ma- *videtur.*  
 teria proposita) ex calce Coraliorum affusa Aquâ calidâ extra-  
 he Sal, huic per repetitas solutiones & coagulationes purificato  
 affusus S. V. Tincturam sanguinei coloris similiter extrahit  
 cum tamen verâ Tincturâ nihil sit in Sale isto, quæ calcinan-  
 do jam longe evanuerit. Nec quemquam ambiguum reddat tran-  
 situs coloris in calcinatione ista, ex albedine in flavedinem, ex  
 hac in rubedinem, apparens enim tantum est, & Ignis violentia  
 succotali pinguntur Coralia; cur enim primò gradu sese ab-  
 sconderet nativus eorum rubor, & postea per gradus rursus e-  
 mergeret? siquidem & similes fucos in aliis quoque videmus cal-  
 cinationibus, nam Vitriolum viride primo leni Igne in albedi-  
 nem: mediocri in bruneum colorem, fortiori in intensam ru-  
 bedinem, fortissimo in nigerrimam abit calcem: & Tartarus  
 similiter, dum calcinatur, in varias ad instar Prothei se trans-  
 format facies. Ex hisce simili modo judicandum de Tinctura il-  
 la putatitia per Spiritum Coraliorum proprium acidulam ex iis *Schrod.*  
 immediatè per Retort. prolestum parata, posito enim elici ejus- *pha.l. 3.p.*  
 modi spiritum acidum ex iis, (obstinatè enim hoc affirmare *339. Gan-*  
 nolumus, cum nulla hujus à nobis facta sit experientia) verata- *sius parag.*  
 men Tinctura extrahi cum eo nulla poterit: in Coraliis enim per *291.p.91.*  
 Ignis istam violentiam jam omnis evanuit rubedo, & ipsa san- *Agric.in*  
 guine omni exhausta ex Retort. eximuntur: qualem E. ex hoc *Pop.p.852.*  
 Coraliorum cadavere iste spiritus eorum proprius extrahet Tin- *part.2.*  
 cturam? seipsum potius tinget, qualis mos acidorum alias esse *Boot.c.154*  
 solet, quemadmodum Acet. destill. super Coralia ad albedinem *Schr.p.335*  
 calcinata fustum, rubro quoque tingitur colore, non secus ac su- *Ganſi* par  
 per pumice calcinato, unde fictitia ista Tinctura. Sed quid sentien- *26. Poppi*  
 dum de hac cum pumice calcinatione, & unde parata Tinctura *Agr.in eu*  
 satis à quamplurimis celebrata? Falsissima hæc est, ne micam *p858 Laur*  
 quidem in se continens vel substantiæ vel Tincturæ coraliorum: *in aph.sal.*  
 nam 1. per vim Ignis omnis periit Tinctura; ut jam demon- *par.13.p.9.*  
 stratum. 2. pumex de eadem calcinatione ista nihil assumit, li- *Tenzel.p.*  
 cet enim albescens in principio Coraliis, pumex quodam- *697. Tēze*  
 modò *lius.p.699*



modo rubescat, postea tamen iisdem propemodum nigrescentibus, & tandem planè albo colore suffusus, nihilo magis, tingitur pumex, cum tamen quanto magis Coralia exuerentur rubedine, tanto magis eum indueret pumex, quod tamen contrariatur experientia. 3. Coraliis, quibus sic Tinctura à pumice extracta est, affunde spiritum mellis vel Urinæ & acquies etiam Tincturam, quæ e. est vera? nulla sanè. In hac enim ex Coraliis Sulphure suo exhaustis paratur, & in illâ ex pumice, qui nihil ejusdem Sulphur. Corallini in se continet. 4. Tinctura ex solo est pumice, qui per diuturnam calcinationem vi empyreumaticis & cujusdam alkalisationis ab Igne contractæ, Acet. destill. I. Spir. Vin. superfusum, mediante longiore digestionem tingit non secus ac idem lapis autore Libavio, crematus, Aquâ affusa simpliciter, simili modo tingitur, vel utidem pumex nimis calcinatus, Tinctura Smaragdina imprægnat Acet. destill. affusum autore

*Hartman*

*in Croll. p.*

*292. Gruli*

*Florilpari*

*19. c. 2.*

*Senner. l. 5*

*Inst. p. 3 f. 3*

*c. 9. Gansf*

*par. 12. 24.*

*Gansf par*

*30. p. 92. par*

*13. pag. 76.*

*Zwölfer*

*Mantiss. p*

*437 kesler*

*Cent. 1 Pro*

*cess. 85.*

*Gansius &*

*Hartman*

*in Croll. l. c*

*Agricola.* Adhæc cum Sulphure quoque calcinantur Coralia, horum p. j. illius p. iij. per horas 2. vel 4. & sic calida injiciuntur Acet. destill. quod per digestionem, cum calce illa Coralliorum, eam solvit, sicque se ipsum tingit: vel cum S. V. tandem Tinctura extrahitur; idque facillè mediante digestionem. Par ratio est cum Nit. cum quo fusa Coralia & probè calcinata, de se in auras transmittunt Tincturam, Salv. Nitr. fixum, cum calce Coralliorum alkalisatò relictum facillè beneficio digestionis S. V. tinget: quod patet vel maximè ex eo, quod restitans Coralliorum pulvis similiter rursus cum Nit. calcinatus, eodem modo iterum S. V. tinget. Alii hoc ipsum exactius perspicientes, Nitr. jam satis fuso, injiciunt pulverem Coralliorum, agitando continuo spatulâ, sic enim Nitr. Coral. Sulphur assumere creditur, ne evanescat materiæ postmodum calidæ Sp. V. affusus facillè hinc se tingere poterit. Sunt alii qui cum Nitr. pulver. Coralliorum ana in Retor. tubulatam injiciunt, propellendo sic Sp. Nitri & simul calcinando Coralia, ex qua calce Salinâ Spir. V. luteo colore tingitur, abstracto eo, pulverem in Aqua solvunt, in qua rubedinem sese prodere ajunt, pulverem rursus coagulatum in Oleum rubrum per deliquium solvunt super quo fusus S. V. statim rubescit &c. Sed quis putet aliquid remansisse Tincturæ in Coraliis, cum post omnem materiæ injectionem ad 12. horas Coralia Vulcani vim sentiant, & cur in Specie vinum primo luteo tantum colore, tandem vero rubeo tingitur, pulvere sponte in Oleum rubrum fatiscente; profecto cum



cum Chymicorum manus oculatae sint, non prius huic Tincturae Laurem adhibebimus fidem, antequam eam secundum praescriptionem *berg. in elaboratam* intueamur. Sunt qui cum Nitr. Coralia calcinant *Sal. aph. adjecto Sulphur. momento, mox terunt & cum Sp. V. Tinctura par. 13. p. 9* ram eliciunt, praecipitato Nitr. cum Oleo Tartari: Sed Tinctura haec saltem a Sulphure oritur, nam post S. V. evaporationem pulvis remanens plane est Sulphureus, & croceam Tincturam tradit, Spiritui Therebinthinæ, qui ex fl. Sulphur. similem Tincturam extrahere assolet.

§. 4. Similia Tincta menstrua, cum pulvere subtili Coralliorum interdum imprægnata sunt etiam sequentes Tincturae: Primò quidem ea, quæ cum succino destillando paratur, dum putant succinum esse magnetem Tincturae, sed rubedo, inde emanans, obscura nimis, succini est, non Coralliorum. Eiusdem valoris est quæ cum Spiritu Vini solo paratur, vel per digestionem, vel per crebrius repetitam destillationem, qua tandem Tinctura per alembicum prodeat, (ut ajunt, de quo dubitamus utut *Gansus* hoc oriri asserat, à Sp. V. per crebriorem destillationem exaltato) Nam notum est, quod S. V. in loco calido super subjecto idoneo, colore purpurâ nitidiore seipsum tingat, non secus ac Spiritus Terebinthinæ per levem digestionem seipsum rubrâ induit veste. Sic idem Sp. V. ex Coraliis calcinatis, h. e. ex quibus jam omnis exhausta est Tinctura, tamen colorem rubrum extrahit & quidem facilius ex his, quam crudis, quod forte ex illis in porositate ab Igne redactis particulae quaedam à S. V. imbibuntur, qui colorationem promovent, vel si S. V. affundatur Coraliis per Oleum Citri jam suâ Tincturâ privatis, nihilominus colore rubicundo tingitur, ut taceam S. V. plane imbecilem esse pro extrahendâ Tincturâ ex Coraliis, nisi antea debite sint reclusa. Hinc loco Sp. V. simplicis, S. V. Tartarifatum quidam assumunt, sed quidni hîc Sal Tartari in digestionem acceleret Tincturam, cum non dubium, quin simul partes quaedam coralliorum solvantur: ceterum Tinctura, quæ hac methodo paratur, copiosior est, quam ut ex Coraliis sic extrahi possit. Alii per liquorem Alcahesticum lapidum ex silicibus & Tartaro paratum, Coraliis affusum, eorum Tincturam extrahere, eamque postea S. V. affuso communicare volunt, sed nulli ignotum, quod super istiusmodi alkalia S. V. seipsum facile tingat: forte alio modo per eandem materiam, si cum eâdem fundantur Coralia in crucibulo per praecipitationem

Sul-

Schrodor.  
pharm. l.

3. c. 6. p. 341

Tenzeli<sup>o</sup> p

696 Kirch

c. l. p. 161.

Gans<sup>o</sup> c. 7

par. 6. 7. 8. 9

Schr. c. l.

pro 6 Hart

in Croll. p.

293 Phœd.

in fur. Ch.

p. 87 Fische

rus in Cor

por Med. I

3 Tit. p. 65

S. V. seipsu

ting. Agr.

in P. de Sa-

le p. 55. de

Tart. p. 709

Haupt. scr

Collis. p. 26

Grül. Flo-

rileg. part.

19. p. 367.

Celeb. Rol.

Ch. p. 303.



Sulphur Coralliorum per acidum quoddam separare & exinde Tincturam parare quis speraret? sed sicut ista præcipitatione, non solum acquiritur Sulphur, à cætero corpore solum omnino, sed simul minutissimus Coralliorum pulvis, ita eundem quoque insimul

*Gansius.c.*  
*I. par. 28.* S. V. imbibere poterit, sicque habebit non extractionem Coralliorum, sed elegantem eorum solutionem. Similem menstrui Tincturam præbet Spiritus roris majalis, qui Coralliorum calci per Ignitionem paratæ affusus ex iis Tincturam extrahere videtur, vel si secundum *Quercetanus* Coralia Igne reverberata cum menstruo cœlesti destillato, cum proprio suo saccharo, (h.e. cum Spiritu roris majalis cum manna parato) extrahantur. Non equidem rori majali suam in extrahendis Tincturis negamus efficaciam, utpote qui Sale Naturæ & Aëris omnia vegetante & vivificante egregiè imprægnatus est, sed quid extrahet ex Coralliis calcinatis? Verum quid dicamus de Spiritu ardente Saturni (quem multi vel omnino pro non Ente, vel saltem pro Spiritu V. regenerato habent) cum quo ex Coralliis Tincturam parare docent Chymiatristæ? ut & de Spiritu ardente Coralliorum, quem similiter pro S. V. ex aceto resuscitato habere possis, utur *Laurembergius* hos Spiritus compositos asserat ex Spiritu aceti & parte ardente Saturni vel Coralliorum, quæ pars ardens, separato aceti spiritu, remaneat) nisi quidam etiam sine aceto & non ex Sale tantum Coralliorum, sed ex ipsis immediatè Coralliis certo modo destructis parare velint? Res sanè ut adhuc incerta, ita & difficultatis plenissima. Quicquid sit, quæ cum Spiritu Coralliorum paratur, eam ipse rejicit *Hartmannus* ejus autor, eamque à menstruo oriri vult & *Sennertus*, qui simili modo ex albis Coralliis Tincturam rubram elici affirmat; quod si verum est, verum etiam erit de Spiritu Saturni, cum de similibus idem sit judicium.

*Exc. Rolli.*  
*Chym. p.* §. 5. Promovendus jam gradus ad tinctas Coralliorum corrosiones, easque imprimis per acida paratas menstrua, quæ subtilissimum coralliotum pulverem imbibent & accedente digestionis gestione, aliusve principii conjunctione, Tincturam prodiderunt. Vulgaris inter has est notitiæ, distillatio Coralliorum cum saccharo, sic per Retort. prodit liquor rubicundus, non secus ac saccharum cum Antimonio destillatum simili prorepat colore, *Tenzel p.* particulas tamen quasdam Coralliorum Spiritus acidus simul ele-  
*696. Rol.* vat corrodendo, per Oleum Tartari beneficio præcipitationis v. *Beguin* facile separandas. Alii solutionem Coralliorum cum succo limo-

num

num, vel berb-  
 rentes sic loco  
 citri ad consti-  
 Vini Tincturæ  
 ostendentes.  
 corticum citu-  
 albis in fundo  
 sum egregiar  
 hujus Olei a  
 tamen sua no-  
 colore aureo  
 ne, nitidior  
 quidam, qui  
 corrofit, sicq-  
 tum arcanum  
 endis propin-  
 pulveris. disse-  
 redigunt, q-  
 parte à solo  
 quodam inci-  
 Spiritum Vitæ  
 que loco me-  
 pulvisculum  
 Recip. Cora-  
 Aquali vistic  
 Tinctura rub-  
 dus, & col-  
 est, ingenuè  
 nam se vidiss-  
 lis per se T-  
 larenis Mel  
 jangatur cu-  
 super Coral-  
 Tincturam  
 liis oriunda

*Gansius par.*  
*Croll. p. 291.*  
*floril. c. 2. pa-*



num, vel berberum, vel citri pro eorum Tinctura venditant, acqui-  
rentes sic loco Tincturae magisterium non inelegans. Alii succum  
citri ad consistentiam mellis abstrahunt, posteaque cum Spiritu  
Vini Tincturam extrahunt, non minus pulchram solutionem  
ostendentes. vid. *Rosfinck. c. l. Boot. l. 2. c. 154. p. 310.* Cum Oleo  
corticum citri alii rubedinem Coralliis exuunt, hisce integris, sed  
albis in fundo relictis (& hoc Oleum citri corallatum calci Sol affu-  
sum egregiam Tincturam extrahere, sunt qui asserunt) sed subtilis  
hujus Olei acrimonia, subtilissimas Coralliorum partes Tinctura  
tamen sua non destitutas, corrodet & recipiet, cumque ipsum sit  
colore aureo, facile accedente ad solutionem istam debita digestio-  
ne, nitidior purpurâ renitebit. Fuit aliquando Pharmacopœus  
quidam, qui Coralia cum Aqua Cæsareâ ipsum Martem dissolvente  
corrosit, sicque Tincturam paravit, eamque Podagrigo, ob assum-  
tum arcanum Corallinum graviter decumbenti pro viribus refici-  
endis propinavit. Sunt, qui cum Spir. Vitrioli Coralia subtiliss.  
pulveris dissolvunt, & digerendo in Tincturam elegantis coloris  
redigunt, quæ non à solis corrosis est Coralliis, sed maximâ ex  
parte à solo Spiritu Vitrioli, qui vel ex levi pulvisculo, vel alio  
quodam incidente, rubrose colore tingit. Vel Spiritum Vini &  
Spiritus Vitrioli per frequentes cohobationes firmiter jungunt, eos-  
que loco menstrui adhibent, sed Spir. Vitrioli dum corrodit eadem,  
pulvisculum recipit & S. V. implantant, hinc facile rubescunt. Alii  
Recip. Corall. Libr. Vitrioli & Sal. gem. Ana. Uncias ij & affusa  
Aqua levistici per Mensem digerunt, sicque corrosione Coralliorum  
Tinctura rubra exurgit. Solvit quoque Coralia Spiritus Mellis aci-  
dus, & color rubicundus ex solutione ista oriundus ex Spiritu  
est, ingenuè hoc fatente *Crollio*, p. 288. qui nunquam etiam genui-  
nam se vidisse Tincturam aperte affirmat: facile enim Spiritus Mel-  
lis per se Tincturam assumit purpuream: sic si cum S. V. adjectis  
larenis Mel digeratur, dat Tincturam omninò sanguineam, & si  
jüngatur cum Sale Tartari instar sanguinis mel rubescit, facile  
super Coralliis calcinatis, aliquas eorum particulas imbibendo,  
Tincturam rubicundam in leni calore induet, minimè verò à Cor-  
alliis oriundam, nam Spiritu hoc abstracto, ex pulvere rursus per  
S. V. still p. 1.  
p. 136.

*Gansius par. 18. Conradus Med. destill. p. 1. p. 137. Boot. c. 154. Hartmannus in  
Croll. p. 291. Agricol. in Popp. p. 2. p. 855. Gansf. parag. 10. Sebrod. c. l. Grüling.  
floril. c. 2. part. 19. p. 365. Horstius l. 4. p. 2. p. 96.*



*Theatro,  
d' arcani.  
arc. 45. p.  
218.*

*f. 2. p. 24.*

*Agricol.  
de cor in  
Popp. p.  
855.*

*Tenzel.  
exeg. p.  
698.*

*Agricol.  
in Pop. p.  
858.*

*Kircherus  
l. 9. Mūd.  
subterra f.  
3. c. 6. p.  
161.*

*Tenzelinus  
p. 697.  
Conrad.  
medul.  
dest. p. 1.*

S. V. Tinctura evocanda, repetitâ digestionem: prætereâque tam copiosa sic paratur Tinctura, respectu Sulphur. Coraliorum, ut nullo modo ex his solis eadem oriri possit: Et idem copiosus Tincturæ proventus, suspectum reddit Locatelli processum, qui ex Sale Coraliorum cum Spiritu acido aceti ad abundantiam usque inebriato, per affusionem Spiritus mellis, Tincturam extrahit: & nulli dubitamus, quin hoc modo, & fortè etiam priori, ex albis Coraliis rubra Tinctura elici possit. Quod attinet Tincturam *Mynsichi*, cum Spiritu Mellis etiam paratam, ea non facilè limam subire potest, cum occultè & philosophicè admodum descripta sit, satis tamen accurata videtur, & si istis paratur circumstantiis, quales Autor consignavit, non ad eò longè à verâ Tincturâ abesse videtur. Sunt porro alii qui admodum superiorem istum primum *Hartmanni*, loco Spiritus Mellis, Spiritum Urinæ adhibent, extrahendo sic rubedinem: Sed fraudulentum quid subesse videtur, ex eo, quod Sal Armoniacum, cujus potissima pars est Sal Urinæ volatile (ratione vero hujus Salis Spiritus Urinæ agit, quicquid agit) solutus in aqua comm. & affusus Coraliis rubris, caruleum impensè colorem extrahat, sed unde hæc Tinctura? ut E. hæc est apparens, sane & illa cum Spiritu Urinæ ejusdem erit valoris, ibi enim per Sal Armeniac. ex Coraliis illibatis educitur Tinctura carulea, hîc v. cum Spiritu Urinæ ex Coraliis calcinatis, & cum Sale fixo Nitr. conjunctis, facilè similis spuria Tinctura exsurgere potest: Cum similiter Spiritus Urinæ Coraliis cum pumice calcinatis (hoc est è quibus à pumice omnis Tinctura extracta est, ut putant, vel potius è quibus omnis per Ignis volatilitatem simul exhausta est Tinctura) & plane dealbatis affusus, Tincturam rubram extrahat: quod ipsum de Spiritu Mellis non minus verum: Sel enim Urina mirificam colorum potestatem potentia in se continet, secundum quam ad variam subjectæ materiæ diathesin, modo hunc, modo alium colorem exhibet. Solutiones elegantes sunt etiam, quæ fiunt per spiritus vegetabilium acidos, quales sunt, qui ex ligno quercino, juniperino, corylino, quajacino, sassafra, sorbo silvestri, fraxino &c. per artem Spagyricam destillantur, quos aptissimos censet Spiritus Kircherus pro parandâ Tincturâ, ut & Tenzelinus; non tamen uniformis est processus. Quidam Coralia Ignita istis injiciunt spiritus, alii prius cum Oleo Sal. vel succo citri solutis Coraliis, alii cum Nitr. prius calcinati, hoc spiritus affundunt &c. sed in genere non sunt veræ Tincturæ, sed subtiles saltim solutiones, vel abstractione menstrui, vel facili præcipitatione in pulverem rursus

rursus redige  
Spiritus per  
facile enim  
acidis mens  
facile percipi  
ralis, quæ  
mum ex alb  
huc, quand  
Coraliorum  
S. V. in Tin  
star mellis s  
corall. p. j.  
factis acetur  
nem fallat co  
parari potest  
dictum etiam  
munis, quæ  
quorum spir  
quibus solut  
Coraliorum  
hitur cum S  
nes, & alie  
promunt Sp  
Retortâ pul  
est *Gansu* ju  
reliquiis Spir  
digesto. H  
tini, in qu  
Sulphur, ca  
gunt. Ex  
quæ per me  
(quamquar  
participet d  
tur, sive ab  
hoc super  
materia rest

p. 2. l. 4. p. 6  
Traict. de la  
suam temper



rursus redigendæ. *Solutio* quoque est Tinctura, quæ paratur per *tr. 10. p.* Spiritum panis triticeæ peculiari enchirisi ab empyreumate liberati, *137. Bott. l.* facile enim præcipitari potest; simile iudicium de reliquis cum *2. c. 154.* acidis menstruis præparationibus ferendum est, quæ non tantum *Schr ex* facile percipiuntur, sed copiosior Tinctura per ea elicitur ex *Commen.* raliis, quam ea revera in se contineant, & simili modo ut pluri- *Closs. p.* mum ex albis quoque Coraliis Tinctura parari potest. Pertinet *340. Deo-* huc, quando Coralia cum Acet. destill. soluta & abluta, seu Sal *datus in* Coralliorum, quidam etiam adhibent eorum magisterium, cum *panath.* S. V. in Tincturam rediguntur, quo sexies abstracto, eadem in- *hyg.* star mellis spissi in fundo Retort. remanent, vel quando pulveris *Conrad.* corall. p. j. Sal. comm. p. ij. funduntur simul in anemio his frige- *p. 1. Me-* factis acetum affundunt, quod extrahit Tincturam: sed nemi- *dull. de-* nem fallat color rubicundus, qui acidis ejusmodi solâ digestionem *stillat. p.* parari potest, autore *Sennerto.* Quod de acedo jam dictum, *135. & p.* dictum etiam sit de Spiritu Vitrioli, vel Spiritu Salis tam com- *2. p. 262.* munis, quam ex Salibus fixis vegetabilium, ut vult *Gansius* (de *Gansius* quorum spiritu tamen existentia non adeo est certa) paratis, *par. 17.* quibus soluta Coralia, postea S. V. tingunt. Vel quando pulvis *Boo. c. 154.* Coralliorum solutus in Spiritu Sal. & optimè edulcoratus extre- *Inst. l. 5.* hitur cum Spiritu Vini: quæ extractiones per repetitas digestio- *p. 3. f. 3.* nes, & aliquoties iteratas cohobationes, quintâ destillatione, *c. 9.* promunt Spiritum rubeum, (ut volunt) sexta v. cohobat. in *Gansius* Retortâ pulvis hujusce coloris in fundo manet. Sed ut optimum *par. 1. &* est *Gansii* iudicium, rubedo illa Coraliis accedere videtur, vel à *2. ac 3.* reliquiis Spiritus Salini, vel à menstruo sæpius affuso & multum *Croll. p.* digesto. Hisce annumeranda etiam Tinctura *Frat. Basilii Valen-* *289.* *tini*, in qua Coralia cum Spiritu Sal. soluta, postmodum cum Sulphur. camphora & calcinata, Spiritum Vini rubro colore tin- *Gansius* gunt. Ex hujusmodi solutionum censu est etiam ea Tinctura *parag. 25.* quæ per menstruum compositum ex Tartaro & Vitriolo paratur, *Sch. p. 337.* (quamquam pro varia præparatione modo plus, modo minus *Schröd.* participet de Vitriolo) sive hoc sic simpliciter paratum assumat *sub nomi-* tur, sive ab ossibus calcinatis prius quater cohobetur, menstruo *ne Tin-* hoc super Coraliis rubefacto, ab iis decantato & abstracto, *etur. Hol-* materia restitans affusum S. V. vel Aquam temperatam, vel Spiri- *lat. p. 339.* tum *Horst. D.*

† o 2

*p. 2. l. 4. p. 69. Davidf. in prodrom. comment. in Pet. Severin Danum. Febure* *Traict. de la Ch. p. 688. qui post corrosionem cum hoc menstruo ultimo per Aquam* *suam temperatam ex S. V. & Spru. Salis Tinct. extrahit. peculiarẽ modum vid. ap.*



Glanbe-  
rum p. 6.  
pharm.  
spagy. c. 28.  
per albas  
alas colum  
i. e. disti-  
liando cū  
magist  
Luna.  
Helm. tr.  
Ignor.  
actio re-  
gim. men-  
tionem  
facit Tin-  
ctura cu-  
iusdam  
volatilis,  
quā mira  
se presti-  
tisse asse-  
rit, non  
tamen e-  
iusdem  
prepara-  
tionem  
annotat.

tum Rosarum Tinctura rubicunda imprægnat. Nulli vero dubi-  
tamus quin simili modo ex albis quoque Coraliis eadem parari  
possit: & ipse Dominus *D. Langelot*, qui primus eam communi-  
cavit *D. Schrödero*, aliisque non pro sincerâ eandem habet, sed  
eam potius, quæ cum Spiritu vel Sale Aeris paratur, eidem  
alas colum præfert.

§. 6. Examinatis hæcenus Tincturis, quarum nobiliorum  
Chymicorum ingenuitas & candor, nos participes reddidit, iisque  
sub apparentium classem redactis, restat ut selectiores quasdam præ-  
parationes ejusdem apponamus; quæ utut verarum Tincturarum  
non merentur titulum, elegantioris tamen & efficacioris Coralio-  
rum solutionis nomine meritò gaudent: 1. Recip. pulverem  
Corall. rubr. solve in s. q. succi citri in digestionem, filtrenturque,  
filtratus liquor includatur Retortæ, vel cucurbitæ, omnisque hu-  
miditas abstrahatur & coaguletur lento Igne, affunde super mate-  
riam in fundo relictam S. V. vel quod melius Spiritum quendam  
appropriatum, ad 2. digit. eminent. & tridui spacio, beneficio  
digestionis, habebis spiritum rubicundissimum, qui Tincturam  
citri & Coraliorum in se continet. Elegantiores longè sunt Tin-  
cturarum Coral. præparationes, quas Magnus noster Decanus,  
*Dominus D. Michaelis*, parare solet, easque vel cum Spiritu Ligni  
sassafras, vel cum Spiritu Antiscorbutico, composito, unde Tin-  
ctura Coraliorum Antiscorbutica, vel cum Spiritu Cord. Cervi,  
quarum felicem energiam quotidiana experientia comprobat  
Elegantis quoque Tincturæ nomine venire potest extractio Cora-  
liorum secundum ductum Q. E. Coraliorum Fabri parata, in  
*Myrothec. Spagy. l. 3. c. 22.* Recip. pulv. Corall. eleganter rutilant.  
Sal. Armoniaci Ana. sublima, & sic Sal Armoniacu corrodet subti-  
lissimas earum partes, floresque rubicundissimi ascendent, attra-  
cta secum Coraliorum Tinctura, quam à Sale Armoniaco, cum  
Spiritu Vini aliove appropriato optimè rectificato separare & per  
lenem abstractionem ejusdem ad Tincturæ debitam consistentiam  
redigere poteris. Vel curiosiori modo hisce floribus Corallatis  
solutis in Aqua calidâ spiritum quendam acidum infunde, sicque  
præcipitando separabis Sulphur quoddam Coraliorum ardens, ex  
quo per S. V. quin Tincturam elicere queas nulli dubitamus: sicut  
hoc ipsum ab *Amico quodam singulari* bona fide nobis communi-  
catum fuit. Sic ex floribus Sulphuris corallatis, s. cum Coraliis  
sublimatis colore citrino, & intenso præditis, vel per S. V. optimè  
alko-

alkoholisatu-  
teris. Sulph-  
conjugium  
bit. Non  
quodam Pri-  
appellatus.  
Sigill. vel a-  
tur per Ret-  
brunet colo-  
aliquot Co-  
repetatur in  
& filtretur  
abstrahatur  
proventus.  
novo & ant-  
sus est. C  
universali N  
bita digesti-  
gma illud p  
ita omnis o  
omniò inf  
hoc ipso m  
cundam ip  
Tinctura,  
succu Berb  
Tinctura C  
paucissimis

Com  
sententia,  
imprimis le  
peculiarem  
tiam fovere  
sordibus r  
ipsaque ac  
adstipulari  
nectaris m

Enf. mod.  
Febure Tr



alkoholisatum, vel Spiritu Terebinthinæ Tincturam parare poteris. Sulphur enim per se vires possidet egregias medicas, quas conjugium subtilissimæ Coralliorum partis, non parum exaltabit. Non inelegans quoque & hic est processus, ab Italiæ quodam Principe in Secretis habitus, Tincturæ pretiosæ nomine appellatus. E. Coraliis super prophyrite pulverisatis cum Terra Sigill. vel aliâ, & Aqua fiant globuli, exsiccentur & destillentur per Retort. per gradûs, postremo fortissimus prodibit liquor brunæ coloris vel nigro-rubicundi, qui rectificatus, super frusta aliquot Coralliorum stet in leni calore & eliceatur Tinctura, repetatur injectio donec acquiratur sufficiens rubedo, depleatur & filtretur cum S. V. circuletur per menses, postea lento Igne abstrahatur ad debitam consistentiam; parvus autem est Tincturæ proventus. Sed novissimè egregius quidam Chymiater, Parisiis novo & antea inaudito modo Tincturæ præparationem aggressus est. Certò scil. tempore colligit Aquam Aëris, utpote Sale universali Naturæ insigniter acuatam, ex eaque, præmissa debita digestionem destillat primò phlegma, hic Spiritum &c. phlegma illud primò prodians, ut diaphanes est & planè perspicuum, ita omnis omnino saporis experts, & non secus ac vulgaris Aqua omnino insipida, ita ut vix ab eadem discerni queat, & tamen hoc ipso menstruo insipido extrahit ex Coraliis Tincturam rubicundam ipsumque eorum Sal: evaporata enim in Solis radiis Tinctura, Sal in cubica formâ residet, reliqua materia instar succi Berberum supernatante &c. &c. Hæc de præparatiore Tincturæ Coralliorum dicta sufficiant; considerandus jam ultimò paucissimis ipse

#### Usus Tinctura.

Communis Autorum ferè omnium & Chymiatorum est Conrad. sententia, vicordiali egregia instructa esse Coralia rubra, atque Medul. imprimis legitimam ex iis paratam Tincturam; præterea quoque destillar. peculiarem cum sanguine humano sympathiam & intimam amici- p.132. Boor. tiam fovere, eamque ab omnium heterogeneorum excrementorum c.154. Ber- sordibus repurgare: unde in morbis venenatis, febribus malignis, nard. G. ipsaque adeò atrocissimâ peste, non vulgariter commentatur: Penatus & adstipulari hisce videtur signatura rubedinis Coralliorum, qua Port. nectaris microcosmici Tincturam exactè repræsentat; imò Gansio S. Maria judice, de Præp.

† 0 3

Usus. mod. Chym Il-Unzer de Epil. Gruling. in Florileg. p.19. c. 2. p. 368.  
Febure Traic de la Chym. p. 694.



judice, Corallium viribus propè divinis omnes gemmas superat, nec gemmis tantum, sed cunctis etiam herbis præferendum videtur. Sed ne quid nimis. Egregias largimur Coralliis vires, Panaceæ tamen titulo ea in digna censemus: habentque essentielles suas dotes à divino Thaumaturgo in primâ rerum origine seminali suo principio implantatas, determinatas tamen & ad certos effectus restrictas: participem earum imprimis dicimus Tincturam veram, modo lucem liberiores aliquando ea aspiciat, eamque insigniter in supra nominatis affectibus commendatam volumus. Origo harum virium ex Sulphure cum Spiritibus Salinis, fixatis conjuncto, optimè digesto, concocto, & exaltato originem habere putamus, pro varia enim horum miscella, ut lapides gemmæque reliquæ virtutum suarum nobilitatem nanciscuntur, ita & Coralia. Sulphur enim tanquam totius Universi calidum nativum & insitum, miris splendidisque virtutibus præditum, ut pro varia rerum, præsertim Salium, secum combinatione varias & diversas induit virtutes, ita in primis in Coralliis, ob peculiarem suam nobilitatem, in quam ob summam coctionem & digestionem exaltatum est, actumque cum Spiritibus Salino-Nitrosis connubium, non potest non longè efficacissimum & saluberrimum toti Microcosmo reddi, cumque in vera Tinctura, à reliquis principiis tanquam recrementis secretum existat, statim hujus divina energia patescit. Interim tamen cum nondum licuerit adire Corinthum, in locum ejusdem tinctas artificiosè solutiones recipere cogimur, quæ ipsæ, ut ut supra enarratas virtutes in inferiore possideant gradu, non tamen omninò rejiciendæ veniunt, firmante earum stationem, non Boëtii tantum, sed quotidianâ quoque experienciâ: & cum præterea minutissimas Coralliorum substantiæ contineant partes, easque ex parte Terrestris, blandâ quadam adstrictoriâ facultate simul pollebunt, quâ non tantum egregiè partium internarum conservando tonum, & robur earum firmando eas recreabunt, sed omnibus quoque fluxionibus quancumque partium & in specie cruentis hæmorrhagiis masculè resistent, simulque præcipitatoria quadam facultate, nimias sanguinis effervescencias & inde ortos anxiosos ardores, suaviter compescent. Quæ ipsæ virtutes à menstruo magis adhuc determinabuntur, magisque appropriabuntur p. n. affectibus. Hinc quæ cum S. V. paratur ultimò insigne erit Spirituum confortativum, & totius Microcosmi à venenis præservativum, cum hic ipse spiritus sic elegantissimum Aurum portabile, effica-

c. 154.

p. 312.

efficacissimum  
invenimus in  
fuit, sic quæ  
tra Veneream  
tis corbutica  
miliarissimo  
fatica adhibe  
niaci subtili  
cellentissimu  
reginos ho  
ritorio; qu  
pitatione cu  
Sulphuris A  
venenatis &  
alexipharma  
quæ extra &  
indolis  
en



efficacissimumque simul alexipharmacum : quas dotes eminentius inveniemus in ista solutione, quæ cum succo citri primitus instituta fuit, sic quæ cum Spiritu ligni sudoriferi est extracta, divinum contra Veneream sceleratam est auxilium, non secus ac Tinctura Antiscorbutica miracula in hoc morbo præstare certissimum est. Familiarissimo quoque in usu *Excell. D. Langelot.* est Tinctura Holistica adhibetque in omni impuritate sanguinis. Quæ v. ab Armoniæ subtilitate elevata fuit, si cum eodem conjuncta maneat, excellentissimum meritò nominabitur Diaphoreticum, omnes peregrinos hostes sub fuliginum specie ex Microcosmi expellentis territorio ; qualem usum fortè sola habebit Tinctura, quæ ex præcipitatione cum appropriato quodam spiritu fuerit. Sed quæ cum Sulphuris floribus concinnatur, in peste in primis, morbisque aliis veninatis & pestiferis strenuam se ostendet. Sicut & ea, quæ cum alexipharmaco Solaris Terræ Spiritu paratur. Cum Aqua Aëris quæ extracta est, cum tanquam recens editus foetus, nondum indolis suæ ediderit specimina, de eadem adhuc experientia testimonia inquirenda veniunt. Quibus abrupimus & facimus.

F I N E M.



De





*De Præscriptione Formularum  
in Genere.*

C A P. I.

§. I.

**A**uxilia Pharmaceutica s. Remedia, sunt vel simplicia, vel composita: utraque rarius hodiè cruda, potius plus minus diversimode tamen præparata adhibentur. Exemplo sit *Theriaces*, Compositorum Antesignani, *fermentatio*, antè sui dispensationem, necessaria æque ac proficua: illius enim ope mirabilis ista ac discors simplicium farrago, mutuo quasi attritu & subactione accurata in concretum concors, *textura* & in Oleum sæ vol effectus anodyno-sudoriferi nonnihil analeptici, abit, & ingredientium quorundam activæ magis particulæ, resinosa præcipuè resolutæ, hincque diffusibiliores, indeque penetrantiores redditæ, partim exaltantur, partim corriguntur: ob id x. annos juxta *Arabes* fermentare debuit, & etiamnum hodiè longè diutius juxta *Persas*, quorum quidam xii. alii xxx. annos ipsi pro fermentat: assignarunt. *Pharmac. Persic. Fr. Angel. à S. Jos. p. 26.* Sulphur, naturæ quibusdam dictum balsamum, crudum, tardissimæ & difficillimæ in nobis alterationis ac appropriationis est, quod tamen à Tart. reclusum, & Oleum Destil. solutum, preparanda exinde vel Tinctura summè activo, vel extracto, longè magis medicamentofo, quia magis resolvable, & undique per corpus mediante quovis fluido diffusibile, reddi solet. Attenuativa, & incisiva, Gum. ammoniac. polychresta substantia, potius in essentia c. spiritu V. Tartaris: adhibetur, quam integrum ejus concretum, licet solutum, siquidem sociata in hoc acri illæ attenuativæ resinæ mucilagô temperata & inspissans, non potest non illius motum alterativum remorari: nisi veterum, & hos inter *Dioscorid. l. 3. c. 98.* ex præcepto, ad 3 j c. sol. propinare velis. Extractum gentianæ succosum, præ crudo illius pulvere, febrientibus sanè accommodatius existit. Eò scilicet quævis præparatio respicere debet primariò, ut *remedii* respectu, vel vis plus minus recondita, ceu



ceuperla ex stercore eliciatur, vel virulentia castretur, aut potius quasi invertendo corrigatur: *Ægri* v. intuitu, ut commodius assumul, quam crudum & ita melius ipsi applicari possit.

§. 2. Simplicibus verò aut compositis jam in officina quæ prostant tam Medici intentioni, quam ægri salutis sufficientibus, artificii oia inprimis præparatione exaltatis, haud opus erit novâ compositione: quin simplicissimè à Medico. in schedulâ præscribuntur, & signaturâ vel generali, vel in gratiam ægri, interdum speciali, subscribuntur. Quid opus est Mistura ex *S. V. camphor.* essentheriacal. spiritu *C. C. Nitr. &c.* nova diaphoresin ægri præcurare, ubi Mistura simplex, aut genuina ejus proles, Tinctura bezoardica, rite tamen, quod rarum est, paratæ satisfaciunt? quid compositionibus novis theriacalibus, quas ordinariò theriaca ipsa simul ingrediamat, satigare ministros? ubi theriaca sola ritè administrata, aut *Diascordium Fracastorii* sufficiunt. Pulv. Card. benedict. crebriori usu securant febricitantes plebei, citra tot pulv. aut composit. febrifugarum abusum. Balsamus Copayvæ quatenus interno sui usu gonorrhœæ resistere tam appropriatè valet, eo ipso tot aquarum & essent. castitat: syruporum, decoctorum, pulverum & emulsionum compositiones superfluas reddit: sicuti externè, quodvis vulnus, citò tutò, & jucundè curando, non secus ac *Ol. monimord. infus. aut Ol. sem. hyperici express.* & cum eo concinnatus bals. Sulphuris, nos tot balsamis vulnerariis, *Ol. balsamicis emplastris & misturis* interdum monstrosis, supersedere posse, ostendit. Talia itaque selecta, vel simplicia vel composita, facile ordinari à medico, ac præscribi, citra alias insigniores cautelas, poterunt.

§. 3. Si verò circumstantiarum plurium, ac præ cæteris symptomatum urgentium syndrome, in nostris morbis, ut plurimum complicatis, & ex intemperantia otiosa ferè anomalis, adeò urgeant, ut consuetis istis officinalibus consulere ægro nequeat Medicus, necesse est sæpius, extemporaneas ut ordinet compositiones, & schedulæ inscriptas Pharmacopœo miscendas transmittat, quæ *magistrales* alias, (ad modò dicturam differentiam) dicuntur. Siquidem *officinales*, ferè majoris apparatus esse solent, præ *magistralibus*, ob extemporaneam, compositionum, necessariò promptius commiscibilibus. Ordinata talis remedia ac circumspecta præscriptio, *FORMULA* alias dicitur, de *cujus genuino tantum præscribendi modo*, usum, applicationem cautelas, &c. practicis specialibus remittendo, hoc loco agimus.

IV. In his ergò præscribendis Philiatro 2. consideranda. 1. *Materia* ejusque debimus inprimis selectus 2. *Forma*: externa scil. seu materiæ istius concinna ad se invicem adaptatio, ut ægro, melius & jucundius applicari, sive internè, sive externè, queat, in quo *Finis* consistit. *Materiam* constituunt ipsa ingredientia, qualiacunque fuerint, ex penu 3. Regnorum deprompta, simplicia l.

† p

compo-



composita. *Formam* v. absolvent horum sub præscriptione situs s. ordo, respectu proportio, præscribendi modus, & deinceps in certam texturam, à Medico intentam coalescentia, quarum hæc *principalis* illæ *subordinata* dicenda sunt.

V. *Ingredientia*, non corpora elementaria aut omnium prima, sed jam plus minus (sub tali respectu) composita, adeoque formis suis specificis & dependentibus inde qualitatibus & proprietatibus respectivis instructa sunt. Unde in iisdem consideranda 1. *quantitas* 2. *qualitas*. Circa *quantitatem* 3. *materie* dimensiones & hic suo modo attendendæ: *longitudo*, secundum illorum multitudinem, *latitudo*, secundum dosin, *profunditas*, s. consistentia, h. e. ex mistis illis coalescens moles, & ejusdem color, sapor, odor. &c. Circa *qualitatem* v. consideranda in specie (apparens licet tantum nobis) *similitudo* & *contrarietas*: tam respectu sui ipsius in genere quam respectu ad corpus ægrum in specie. Atque his *Materia* habitus est expositus: *Formæ* ratio jam præcedenti §. ferè fuit declarata, & hujus in respectu, in materia ista, ratione longitudinis, debitus *Ordo*, ratione latitudinis, *concinna proportio*, & ratione profunditatis debitus *præscribendi miscendique modus* considerandus. Ex quibus tandem *essentiale Formulæ*, quasi mechanicum concretum coalescit.

VI. Patefcit ex dictis simul, neminem concinnam, & quæ Medicum decet formulam compositurum, nisi: 1. *exactam Materiam Medicam sibi comparaverit notitiam*, secundum omnia 3. regna: eamque tam *externam*, sive quoad attributa à priori sensuaria, qualis in officinis Pharmaceuticis & Mercatoriis, comparanda, quam *internam*, s. quoda attribuat à posteriori cognoscibilia, h. e. operandi vires vel facultates non nisi per experientiam vel propriam vel alienam (scriptorum Medicorum) cognoscibilem. In hunc finem vel ineptè etiam curiosum præstat esse Philatrum sub studii Medici cursu, ut in omnia ubicunque obvia minutissima, quæ, qualia, quanta &c. sint, unde nata, ejus usus, vel mechanici vel naturalis &c. sive intelligat, sive non intelligat inquirat sedulo, etiam si risu etiam interdum excipiantur talia quæ sita: dici non potest, quanta copia rerum, in occulto, & non sentientibus colligatur hoc pacto, quanta experientia, & denique quantus, usus, postmodum inde emergat. 2. *Preparationem simplicium saltem planiorem, exactè calleat*, quod sine operationibus chymico-mechanicis, fieri nequit: harum enim medio aperitur plus minus, alteratur, concentratur, respectu aliorum varia Phænomena exhibet idem simplex &c. Propterea Laboratoria, Chymicorum, Medicorum, Pharmacopœorum, quin imò juvat & mechanicorum, quicunque subiecta quædam ad materiam mediam spectantia tractant visitare, attentus si sit, numquam sine nova præparationis cujusdam vel enchiriseos &c. observatione disca-



discedat, nam & sic apud Oenopolas, zythopeptas, pistores, que menti curiosæ satisfaciunt reperiri licebit: non secus ac apud aurifabros, claustrarios, stannarios &c. quin & proprias manus adhibeat & carbones tractet ad Helmontii imitationem, nec deterreatur à crebriori infausto successu, siue enim procedat ex Voto, siue reluctetur tentamen, semper aliquid observare contingit, alibi quod proficuum esse potest, & hoc medio optima remedia, elegantissima artis opera &c. inventa fuerunt. Modo non saltum faciat, ac mox prolixos, aut laboriosos, aut non nisi exercitatis imitabiles processus inchoet, sales enim nihil commodi, saltem sumtum perditionem & in capite confusum Chaos Chymicum reportant. 3. *Compositionum officinalium* optimè gnarus sit: partim ut adhibere debite easdem, partim aliis associare aptè queat: alias metuendum omnino, ne cæco impetu, quid pro quo interdum arripiendo empiricum temerarium, non circumspectum agat Medicum. His ita primò observatis, certus sum, quod facillima erit quævis formulas præscribendi ratio: sub quorum ignorantia, non nisi trepidante corde & manu, vel ob sanitatem in ægro, vel ob famam in Medico, utrumque ex inepta formula, periclitantem, aliquid in schedula consignari poterit. Quod si nimis latè extendi requisita talia videantur, restringi possunt ad ea, quibus in præscriptione sæpius & frequentius utitur, ut hæc saltem juxta supposita bene calleat, pro ulteriori vero artis incremento & aliis pro viribus incumbat.

§. 7. Jam ut specialius ista tam Mat. quam Form. requisita considerare, se offert quoad materiam, 1. ejus *multitudo*. Equidem felicem istum ægrum prædicat, *Helmont*, cujus Medicus novit curare simplicibus, & dolus est, secundum *Arnold. de Vill. Nov.* compositis uti, ubi simplicia sufficiunt: scil. ut simplex victus saluberrimus & Naturæ convenientissimus, ita pariter Pharmacia: Natura utroque paucis contenta est. Quod si ex §. 3. compositis utendum sit formulis, quævis vitanda multitudo: quæ nec *Medico*, nec *Remedio* nec *Ægro* conveniens videtur. Non *Medico*, cum semper ignorantia ejusdam videatur indicium, tanta sub magistralibus compositionibus farrago: quasi inter tot ac tanta, simplicia aut composita, plus minus homogenea aut heterogenea pro præsentī casu debitum delectum instituere nesciat, id quod materiæ Medicæ superficiale ferè cognitionem innuit. Laboramus abundantia potius & luxuriâ remediorum, quam penuriâ, selectu saltem opus est, qui vix quam per experientiam, ac per cognitionem texturæ materialis secundum minima ex vi seminis nata, ceu operationum instrumenti, obtineri potest: Præsertim ubi non tam universalibus, sed quod magis expectendum, particularibus sine appropriatis ac specificis ægro succurrere est animus. Symptomatum (quam alii urgent) atrocitas & pluralitas, ex unâ ferè vel immediatè vel mediatè propullulant radice morbosa, quâ plus minus correctâ,



fructus isti morboſi marceſcunt : ſin atrocius urgeant , en Opiūm ritē præparatum , infraſta doſi cæteris ſociatum , tantum non omnibus ſuccurrere ſolet , externa ut taceam delinimenta . Nec rarum eſt , quod Naturæ motum , nimum dum damnus operam corrigendis ſymptomatibus , vel impedianus vel turbemus . Nec minus adverſatur *Remedio* ex pluribus compositio , ſiquidem horum genericæ ſaltem dotes , neglectis ut plurimum ſpecificis conſiderari ſolent , utrobique ſuperfluo labore facultates generales enim carminativæ , aperitivæ , abſorptivæ , tribus l. 4. ſelectis ſimplicibus , aut uno concinno composito obtineri poſſunt . Specifica pauca ſunt , quæ paucioribus iſtis univerſalibus ſociata , ſcopo ſatiſ faciunt . Quod ſi ſub plurium coacervatione , neglecta ſpecifica , appropriatum activitatis ſuæ objectum , ( ne per ſomnium quidem id cogitante medico ) inveniant , neceſſariō provocato hinc ſpirituum impetu , ex ſymptomatum novitate nova ægro turba , medico ſolicitudo excitatur . Imò attendendum & hoc , ne talibus compositis vel ex ſimplici miſtione , vel ex arctiori per determinatam præparationem in novam texturam unione , novæ vires medicamentofæ , priſtinis vel deletis vel infraſtis emergant . Simili ratione , ac ſimplici ex miſtione pulv. pyrius , aut ſcolopetans vim ſulminantem acquirunt , qui ſtreptus in  $\odot$  ſulminante ſimplici acidi intenſioris additione , obmutefcit , non ſine virium detrimento . Quis  $\oplus$  ſimplici ſaltem cum  $\otimes$  vivo miſtione , diutiusque continuata trituratione , juncta repetita edulcoratione , draco mitigatus ſive dulcis evadit , de cujus uſu tuto ſi dubites , ſaltem Docimaſiam *Daviſonii Philoſ. Pyroth. part. 4. c. 22. p. 178.* inſtituerelicet . Jalapa ac colocynthis , ſimplici cum  $\ominus$  Tartari ( hic quidem addito ſacharo ) miſcela & tritura cicureſcunt ferè penitus . Quid fieri jam putandum eſt , ubi præter miſtione , infuſiones , decoctiones &c. quibus vel exaltantur , vel caſtrantur , vel immutantur ſimplicium Vires , acceſſerit . Minus denique *Ægro* proficua eſt iſta multitudo , cum per læc. ſtercore ſimul ingerantur Ventrículo : cui tum demum hic labor incumbit , ut digeſtioni ſimili labore , concretæ medicamentofa diſſolvat , donec activæ & medicamentofæ particulæ reſolutæ , id quod poſſunt , operentur : ſub quo actu ut non tantum immutantur plus minus ingeſta medicamenta , ita ex oppoſito ipſe ventriculus à tot diverſis ingeſtis non niſi p. n. patietur impreſſionem : qui dum in ægris languet & conſueta horret , multò magis inſueta medicamentofa naſcebitur .

§. 8. Ut itaque debitis ſuis cancellis eo melius circumſcribatur quævis compositio *magiſtralis* ; omnia ingredientia , ad 4. hæc *puncta cardinalia* , quæ ſunt 1. *Basis* , 2. *Adjuvans* 3. *corrigens* : 4. *conſtituens* derigenda veriunt . De *Dirigente* taceo , lite nondum decisa . *Basis* eſt præcipuum medicamentum , cui ceu fundamento compositiois , ac principali ingredientii , ſive ſimplex & ipſa ſive ex aliquibus composita fuerit , reliqua tantum adiunguntur .

Cætera

Cætera inter  
baſeos , ut  
interdum ſe  
etiam ſtimu  
more Brend  
tur iſta , Co  
ſemper ſunt  
nem , vel ven  
hoſtilen alt  
Senna oper  
malignit. pi  
eò melius de  
vel odoris vo  
litatibus ſubi  
veniunt . Cu  
ex iſdem ſe  
hanc indiff  
conſiſtentia  
evadat medi  
§. 9.  
bendus pulv  
ſimul baſeo  
macis : con  
emergat : in

Er  
pu  
O  
M. f. pu  
§

Vel ſit ordin  
petitis vieib  
ſuccin. vel ſ  
eſt nullo , at  
aliquid fore  
ſit ſuccus Ch  
ſtillata vel q  
pulegii , ſcen  
tuat. h. m.



Cætera inter ingredientia minus principalia eminet *adjuvans*, quod effectuum baseos, ut *citius & melius* se exerat, promovere debet. In quem finem, cum interdum sensibilibus quidam requiratur stimulus, præsertim in purgantibus, etiam *stimulans* interdum audit, v. g.  $\S$  d. d. optimus stimulus est scammon. more *Brendeliano* præparatum. Quo verò *tutus*, ac simul jucundius operentur ista, *Corrigens* subinde addendum: Nec enim tam benigna aut correctæ semper sunt remedia, quin aliqualem, plus minus notabilem noxiam impressionem, vel ventriculo & intestinis, nervoso generi, ut purgantia, vel aliis partibus hostilen alterationem inferre valeant: corrigentia E. subinde permiscenda. *Senna* operatio Tartaro, cremore in decocto, & in infuso, corrigitur, Opii malignit. pipere & castoreo emendatur, ut horum ope illius in spiritibus impressio eò melius deleatur. Quin cum & ingrata subinde sint ægris, certo expuncto, vel odoris vel saporis &c. Remedia, pro infrigendis hujusmodi nauseosis qualitatibus subinde quædam, succus citri,  $\dagger$ ,  $\nabla$  cinamom. syr. sacch. &c. addenda veniunt. Cum denique pluribus modis remedia propinari ægro possint, & ita ex iisdem ferè ingredientibus plures formularum modi conscribi, determinat hanc indifferentiam, *Constituens*, à qua reliqua, mutua subtractione, certum consistentiæ modum acquirunt ut vel solidum, vel fluidum, vel mediū modi, evadat medicamentum.

§. 9. Exemplis binis negotium hoc declarare juvat: sit v. g. præscribendus pulv. vel bolus mediocriter laxans: *basis* sit *Jalap. adjuvans*, (quod simul baseos dosin plus minus limitat) crem. Tartari *corrigens* Ol. Destill. macis: *constituens*, requiritur nullum in pulvere, cum hic per se ex mixtura emergat: in bolo verò conserva sumat. aut fl. tunic. adhibeatur:

und talel fiunt formulæ.

R. Crem. Tartari gr. xv.  $\mathcal{R}$   
pulv. jalap.  $\mathcal{S}$ .  
Ol. Destill. macis. gutt. ij.  
M. f. pulv. D. S.  
Purgier Pulver.

Conf. fl. tunic.  $\mathcal{S}$ .  
Crem. Tart. gr. xv.  
jalap.  $\mathcal{S}$ .  
Ol. Destill. macis. gutt. ij.  
c. f. q. syros. sol. F. Bolus D. S.  
Purgier Zucker.

Vel sit ordinanda potio antihypochondriaco-sive hysterico diaphoretica, repetitis vicibus capienda. *Basis* sit vel composita, ex Ess. castor. & Liquor. C. C. succin. vel simplex, Ess. Castor. c. spiritu  $\odot$  \* vinoso parata; *adjuvante* opus est nullo, aut si pro scopo absorbendi vitiosos sapores in primis viis addendum aliquid foret, Lap. 69. Unicorn. verum sufficiunt. *Corrigens* saporis ratione sit succus *Chermes* vel syrup. borragin. vel syr. cortic. aurant. Denique  $\nabla$  Destillata vel qualiscunque, vel aromatica, vel appropriata, ut interdum dicuntur, pulegii, sceniculi, fl. sambuc. omnia ista sinu suo excipiat, & ita potionem *constituat*. h. m.



R.

▽ fl. sambuc. ℥ij.

feniculi ℥j

essent castor Tartaris. ℥ss ---- ad ℥iij

Liquor. C. C. succin. ℥ss ad ℥j

Lap. S. præp. gr. xv. ad gr. xxiv.

Syr. corrag. ℥ss ad ℥vj.

M. F. potio. D. S.

## Zertheilende Schweiß. Mistur, äußerliche mal.

§. 10. Consideranda jam materię *latitudo*, sive præsentī in negotio *Dosis*, h. e. quanto pondere ac mensura ingredientia præscribenda, sive *explicitè* istud, idque frequentius, secundum gr. scrup. drachm. uncias, & libras, sive *implicitè*, idque rarius, tantum in vegetabilium quorundam partibus aridis, ab faciliore dispensationem, secundum pugillos, manipulos, fasciculos, numerum parem vel imparem determinetur. Cum vero omne remedium, non nisi respectu hominis sit tale, cui alteratio certa illius occasione inducenda, sive activè sive passivè remedium ad hoc contribuat, ipsi vero homines multum inter se differant, tam habitualiter ex Idiosyncrasia seminali, quam accidentaliter, ex climatis, vitę generis, consuetudinis varietate, nullius remedii dosis absolutè determinari poterit, quin, respectu vel *primariò*, ad individuum patiens, vel *secundariò*, ad cetera associata ingredientia habito, eadem demum limitanda. *Subiectum patiens* quod attinet, in eodem remedio vel facilius aut difficilius, vel fortius aut debilius &c. effectum suum exserit. Siquidem pro partium solidarum majori vel minori Eutonia ac robore, fluidarum texturā concentrata magis & firmiori aut attenuata & subtiliori, acrimoniā in specie volatiliori magis resolvente & remedium actuante, aut fixiori concentrante & remedium enervante, spirituum denique systasi rariori ac magis elastica, vel densiori, ejusdem remedii, etiam in eodem subiecto variat effectus. Qui alios fortiter exagitat Tartarus *Emeticus* Myns. in gr. iij, hypochondriacome lancholicos vix tantillum etiam sub triplā movet dosi: Dum ☉ fulminans infanti lactanti tutò ad gr. j. porrigitur, ceu polychrestum iisdem auxilium, ultra gr. ss. unā vice vix dare poteris eidem, non itā diu ab lactato: illud ipsum ad gr. IV. c. paucò arcano duplic: Tertianario ultra X. secessus provocaverat, quod alia occasione in quartanarino ad gr. IX. c. quibusdam absorbentibus ne minimum commotionis sensum induxerat. Mirum quantas doses, repetito etiam usu, opiatorum, optime ferant phthifici ac Dysenterici? Apoplecticum vix potentissimus naribus insufflatus excitat helleborismus. Adeoque in quovis remedio, toties variat dosis, quoties, individuum vel numero diversum, vel numero idem, secundum 3. Res Medicas diversimodè alteratum occurrit. Ne tamen in suspensio penitus maneat hoc nego-

negotium, ne  
culola, dosis  
sicut rectum  
prænatural  
alterationes i  
similiter circu  
in contingen  
ratus insecut  
juxta quam  
ita pariter e  
§j. summa ℥  
vatur, dum a  
Epist. cent. 3.  
doses speciale  
piens, & alia  
renda: ab  
Prout ad juv  
raffenant, co  
ficit si crem.  
pp. gr. i. eam  
Opiata, quo  
unt: ▽ me  
ergo ingredi  
minanda ver  
§. 11.  
fitione exsurg  
rum quædam  
tantur vel in  
nova textur  
ctum turb  
aque contin  
aliquali text  
de cetero m  
codermis co  
porem. Sul  
contrahunt  
pientibus A  
prorumpen  
acidorum v



negotium, nec nisi per experimenta dubia, adeoque suspecta, modo non periculosa, dosi remedii unicuique individuo conveniens expiscanda sit, ob id sicut rectum norma curvi, & juxta, statum naturalem mensurandus quasi est præternaturalis, ad adultum, sanum, vel saltem neutrum respicere, & quæ alterationes insequantur certam remedii dosin attendere, eandemque in aliis similiter circumspectè observare convenit, & ista, quam ut plurimum (quod in contingentibus necessarii locum supplet) idem ac eodem ferè modo desideratus insecutus fuit effectus, *cui media ordinariaque dosi statutuenda venit*, juxta quam postmodum pro individuorum conditionibus *summa ac infima* & ita pariter *extraordinaria* determinandæ. Sic enim Jalappæ dosi media est ℥j. summa ℥ss. infima ℥ss. sed extraordinariè nec ℥j quendam movere observatur, dum alium gr. iv. l. vi. sufficienter exagitant. conf. *Barthol. Cent. hist. 69 Epist. cent. 3. p. 130. 133.* Ac in hoc sensu apud Medicæ scriptores doses speciales ubi vis consignatæ observantur. Ast præter individuum recipiens, & alia *ingredientia* pro determinando dosi remediorum simul conferenda: ab his enim impediri ac promoveri effectus medicamentosus assolet. Prout adjuvantia basin plus minus acuum, corrigentia hanc infringunt, aut ræstrenant, constituentia concentrant aut diluunt &c. Jalap. ℥ss. pro dosi sufficit si crem. Tart. gr. xv. eam adjuvent, idque eò magis, si præterea scammon: pp. gr. i. eam stimulet. Theriaca longè potentius sudorem movet ☩ junctæ Opiata, quorumvis evacuantium, præter diaphoreticorum, effectus imminuunt: ▽ medicatæ efficacius adstringunt, ☩ consortio, quasi Osa factæ Hisce ergo ingredientibus cæteris, baseos dosi absoluta, subinde varainda ac determinanda venit.

§. II. Superest materiæ profunditas sive crassities, hoc est, sub compositione exurgens moles, & hujus qualitates sensibus gratæ vel molestæ. Harum quædam ante missionem jam partibus insunt & compositione vel exaltantur vel infringuntur: vel non insunt, sed in composito demum ex hujus nova texturâ emergunt. Essentiæ resinol. rubin. in aqueis vehiculis vel lacteum turbidum, minus gratum, vel lividum liquorem exhibent: quod non æque contingit, S.V. Tartaris. vel Tinctura Tartari si præparatæ fuerint, ut ut aliquali texturæ & virium alteratione. ☩, succus citri, spiritus S, qui gratiam de cætero multis medicamentis conciliant, absorbentibus marinis ac Ostracodermis copulata, ex dulci, salissimum, quibusdam nauseosum reddunt saporem. Sulphurea alcalisatis in via humida sociata, ingratißimum fætorum contrahunt. Sin electuariis spiritum Vitrioli in conservis aut O crud. recipientibus Aërca absorbentia misceantur, super vasis ora motu fermentativo prorumpentia, vel visum, vel tædium ægro conciliant. Tincturæ, syrupi, pro acidorum vel alcalium commercio, varias Tincturæ mutationes exhibent.

Nauseose



Nauseose dulce & adstringens ☉ Vitriolum, Tartari Aëræ fol. junctum vel via sicca, secundum Zwölferum, vel via humidâ in liquore ☉ c. Aëræ hujus certo connubio, concretum tertium novarum planè tam exernarum quàm internarum proprietatum subministrat. In qualitatibus adèdque talibus sensibilibus quantum citra ægri incommodum fieri potest, gratia aucupanda venit sub materiæ miscendæ selectu. Horre decumbentium ventriculus consuetorum alioquin alimentorum odorem & saporem, quidni insuetorum remediorum? & multo magis sensuum cæteris quoque Organis horrorem incutientium. Arte Marteque tandem ubi ingesta fuerint, vel cardialgias, vel præcordiorum anxietates, vel post nauseas Vomitus expectandi. Minus metuenda talia, ægri palato hinc & naribus accommodata melius si fuerint. Quod & de aliarum partium sensu quasi particulari non minus interpretandum, oculis scil. propterea, præ aliis quibusdam partibus, minus acria administranda. Ad hæc multum in recessu omninò habet imaginatio, pro cuius ductu & hinc spirituum influorum modificato motu, gratius quod est palato remedium, propensionem majorem & quasi amicitiam erga illud in ægro excitabit, ut & assumatur lubentius, facilius retineatur & suavius operetur. Quoties enim imaginationis ex iussu, res alienæ & insuetæ quia singulari appetitu, atque adeo voluptate assumptæ, remedii appropriatissimi instar aut diuturnas febres, aut chronicos Ventriculi languores tollunt. Licito itaque stratagemata & hinc fallere interdum ægrum juvabit, ut sub fide desiderati à se remedii, aliud ipsi simile, sed magis proficuum propinetur, sane consensus hic, & imaginationis motus an quies, multum ad remedii effectum promovendum aut modificandum facient. Sequiori in specie sexui, crebrius se gratiosum his in punctis se exhibeat necesse est, ob hystericas passiones, aut cardialgias his non rarò simillimas, quæ uti per dulcia aut suavius odorata provocari subinde (idiosyncrasia summopere hic attendenda) solent, ita per ingratiore pariter medicamina, ob nauseam & ventriculi subversionem, quam sæpius concitant, paroxysmos istos vel revocant vel exasperant.

§. 12. Post quantitatem materiæ formularum, considerata ejus *qualitas*, circa quam ante omnia vitanda *Contrarietas*, quin elingantur *tam sibi, quam ægro Compatibilia*. Contrarietas *formalis* equidem nulla in naturalibus, aut saltem nullibi, præterquam in animali regno idque ferè quoque sublatori acceptione, sed saltem *effectiva* & quæ respectu nostri ita dicitur, quatenus quædam ex necessitate aut naturali, aut artificiali nobis adversantur, vel quatenus sub unione se ita alterant, ut depositis pristinis proprietatibus sensuum ex judicio se destruxisse videantur. Contrarietas hæc *effectiva* est, quæ in materia miscenda juxta formulæ præscriptum attendenda venit, tam respectu habito, ad *matetiam* miscendam, quam ad *ægrum* sanandum. In

*Materia*

*Materia non genda, ut Olus quæ magis in qualis in specimentis, acidum enim in Olu nus, si simul emergat. 6 vol. Urin five vol. alca Nec Lixivia in Tartarum præcipitatio mineralibus stibis simul. O\* miscen emergat cor talem ex cor net v. g. in p Vitriolatus nent pariter Prædicta anna in talibus fo vim in Terr intra corpus seu quod du in corpore i sui quod era c. crem. Tar coloris citr esset color alterabatur dialis, & c quasi gran qui per pr se repræsen prægnatis veri ☉ sit p quod tame licet, ☉ saturari, Ta*



*Materia* non superficialis illa, qua quædam non bene miscibilia sunt intelligenda, ut Oleosa v. g. Ol. amygd. dulc. c.  $\nabla$ . aut Vino, sperma ceti &c. Sed quæ magis interius penetrat, & ipsam texturæ mutationem junctam habet, qualis in specie universalis inter ista duo Naturæ & Artis mechanica instrumenta, acidum & alcali, hisque cognata subiecta alia, notari solet. Ex nova enim in  $\Theta$ sum textura, neutrum propriæ satisfacit destinationi: idque eò minus, si simultanea particularum aliarum syncrifi vel diacrifi novum concretum emergat.  $\Theta$ ia alcalisata hinc non præscribenda, cum  $\Theta$ \*, pro febrium cura,  $\Theta$  vol. Urinos. avolat, concreto  $\Theta$ e commun. æmulo relicto. Eadem sive fixa sive vol. alcalia,  $\Theta$ is societatem citra sui notabilem alterationem non ferunt. Nec Lixivialia eadem  $\Theta$ ialibus præsertim Vitriolaceis jungenda, illorum enim in Tartarum Vitriolat. saturatio, hujus in crocum, ferè adstringentem fit præcipitatio. Nec acida, præsertim mineralia, ac  $\Theta$ sa, fixatis metallicis aut mineralibus facile focianda, promptissimè aliud inde concretum emergit pristinis simul utrinque exutis potentiis. Elix. propriet. vulg. minus cum spiritu  $\Theta$ \* miscendum, cum novum exinde, mirabiliter alteratum sub præcipitatione emergat concretum. Nisi interdum Medicus, ex instituto, compositionem talem ex contrariis componat pro obtinendo quodam tertio: id quod optinet v. g. in potione febrifuga *Crolliana Basil. p. 298.* ubi extemporaneus Tart. Vitriolatus ceu conveniens digestivum, ante paroxysmum propinatur: pertinent pariter huc Misturæ versatissimi in felici praxi, *Sylvii*, passim in Lib. Ejus Pract. annotat. ex  $\Theta$ \* Lap. 69. l. corall. & Diascord. &c. combinatæ: mens scil. in talibus formulis non est saturare acidum, & ita aliud intra corpus absorbendi vim in Terr. destruere; sed arrodere saltem superficiali attractu ista objecta, quo intra corpus à potentiori acido promptius arripiantur ac ex  $\Theta$ \* præcipitentur, seu quod dum in istis concentratur, seu ab iis absorbetur,  $\Theta$ \* quasi regeneratū, in corpore in  $\Theta$ l. mutatum, abstergendo & resolvendo, & blande stimulando sui quoderat, faciat officii. Exemplo Tart. &  $\Theta$  hæc illustrare placet. Decoctio  $\Theta$ c. crem. Tart. solut. mediocris (in qua superficiali attractu Tart. sibi  $\Theta$ ungebat) coloris citrini dulcoris  $\Theta$ pecifici nō adeò intensi, inspissata, donec intensè  $\Theta$ rei esset coloris, instillato, spiritu  $\Theta$ \* simpl. aut Lixivio  $\Theta$  Tart. vix sensibilibiter alterabatur: ab  $\Theta$ \* vero, spiritu  $\Theta$  - spiritu Nitri, turbabantur liquor Tartareo  $\Theta$ ialis, & copiosum ponebat sedimentum, non Aëreum,  $\Theta$ iale, sed  $\Theta$ inum, quasi granulolum, gustu subacidum, hoc est, perfectus Tartarus regeneratus, qui per præcipitationem per potentius acidum liberatus à  $\Theta$  nativa in formā se repræsentabat. Hinc enim, si modo dictis cum acidis intensioribus in prægnatis liquoribus filtro à Tart. separatis, lixivium  $\Theta$  Tartar. instilletur, verè  $\Theta$  fit præcipitatio, sub formā sedimenti obscuri nonnihil viridescentis, quod tamen in aëre libero in crocum flavum fatiscit. Simili modo suspicari licet,  $\Theta$ em in liquore  $\Theta$  Tartarificati præfato intra corpus à potentiori acido saturari, Tartarum v. præcipitando regenerari, ac dum consuetis muniis fungi.



Ex Opposito, Crem. Tart. & ana decoctio fortis & multum imprægnata, non tamen potenter adeò Martialis quam Tartarei saporis decantabatur, & magna residuum cum nova  $\nabla$  diu beneque agitatum & decoctum liquorem aurei coloris, ad nigredinem vergentis, saporis intensius Martialis reddidit: quem ob fortiorem Mart. & Tart. amplexum, sive potius intimum congressum, nec  $\times$ , nec spiritus  $\ominus$ , nec spiritus  $\oplus$ , nec spiritu, Vitrioli tantillum immutabant quin omnia hæc acida, citra sensibilem alterationem ipsi se permiscebant: par ratio c. alcalibus, siquidem nec à spiritu  $\ominus$   $\times$ , nec à lixivio  $\ominus$  Tart. ulla mutatio, adeo pefectum  $\ominus$  sum, ex  $\ominus$  & Tart. concreverat. Quod si li- quori dicto, jam acidis imprægnato, alcalia instillarentur, post levem effervescentiam, præcipitabatur materia grumosa, & grossa, analoga quodammodo  $\ominus$  ex Vitriolo præcipitato. Sane suspicari licet,  $\ominus$  extra corpus jam plus minus ita saturatum, minoris usus futurum pro Cacheticorum acidis imbibendis, sicuti ex opposito, Tartari acidum, appropriato suo compari alcali Oliosio, per istam in  $\ominus$  concentrationem & diturnam coctionem spoliatum, minus regeneratum iri, sed odore saltem acido, si adhuc separabilis esset, parum vel nihil effecturum.

§. 13. Contrarietatem remediorum extemporaneè componendorum cum *Ægro* quod attinet, Idiosyncrasia hujus inprimis observanda, à priori licet non cognoscibilis, sive nativa, sive adscititia fuerit. Sanè ut sensibus grata, & alias consueta, licet deteriora, in *Hygiastico usu* reliquis omnibus præferenda, teste *Hippocrate*, cum tantillum Casei avertati frustulum, clam licet ingestum, totam ex opposito digestionem turbet, ita in *Therapeutico* negotio, quæ *ægro* accepta & compatibilia, nec hostilia, forsan melioribus præferenda erunt. Idiosyncrasia ista, tam quoad sensiles immediatè, alias *manifestas* remediorum qualitates, quam quoad non sensiles, sed *ocultas* perpendenda. Istæ ex *Ægri* patent relatu, hunc enim amara, alium acida, dulcia,  $\ominus$ sa &c. delectant, nunc, pilulæ pulveres, potiones &c. appetuntur. Sed circa occulta illa, quæ nulli sensuum patent, major omninò difficultas, neque enim nisi per experientiam, adeoque repetitas observationes cognosci possunt: nisi forsan vel ex hæreditario caractere per plures successiones innotuerint, aut ex *ægri* prævia observatione pateant. Sunt quos castorei sapor aut odor offendit plurimum, alios qui delectat: hi benè anisum, aut cinamomum ferunt, quod aliis fastidiosum est:  $\times$  quamplurimis in summis est deliciis, cujus tamen vel solo odore lypothymiam incurrit Mulier apud *Horstium ex Fabricio append. ad decad. 5. quest. 1. p. 117.* Sassafras lignum præ aliis suave summè tamen abhorruit Vestalis apud *Panarolum pent. §. obs. 22.* Sunt qui gammaros coctos, absque perturbatione insigni ne aspicere possunt, in *M. A. N. C. anno. 1. p. 299.* quomodo eosdem in potionibus vulnerariis sustinebunt? Quicquid ergo

ergo *Ægro* h  
formulis si

§. 14.

offert *Ordo*,  
& pro lubitu  
formula, si  
prius disper  
simpliciter  
præponunt  
formularum  
omnia hæc

§. 15

tam general  
ista, quæ  $\nabla$ ,  
ordinariè &  
decompos.  
ulus & esse  
alia  $\ominus$  vol. C  
alia Lap. 69  
portio inter  
baseos, ne  
mutuò con  
finem. Ex  
id in pulv. §.  
bus forsan d  
debita com  
se invicem c  
4pla, 6pla,  
sibi invicem  
v. hiulca at  
cum ad orn  
tione loqu  
Tinctura  
integram s  
ministrant  
ritus *Diijss*  
§. 1  
modum con  
Materia qu



ergo Agro haud compatibile & primario quod ex Idiosyncrasia repugnat, ex formulis simpliciter exulet.

§. 14. Materia hæc fuit formularum, sequitur Forma, in hac se primò offert *Ordo*, quo situanda sint ingredientia. Libertate hic gaudet Medicus, & pro lubitu ferè eandem instituere valet. Concinnior tamen ferè emergit formula, si quæ copiosius ingrediuntur, cæteris anteponantur, ut & ea, quæ prius dispensando aut præparanda, ut in decoctis, misturis &c. Baseos locus simpliciter in Arbitrio est præscribentis: non secus ac Constituentia nunc præponuntur, ut in misturis, nunc postponuntur, ut in mortuis: uno nomine, formularum crebrioris inspectio, & præscriptarum præparationis observatio, omnia hæc facillima reddunt.

§. 15. In Formâ sequitur ingredientium debita *proportio*, quâ dosi tam *generalis* eorundem, quam *specialis* aptè limitatur. *Generalis* dosi est ista, quâ  $\nabla$ , syr.  $\ddagger$ , succus pul. flor. folia. Fructus &c. pro hac ista formula ordinariè & aptè præscribuntur, quam Vide definitam in *Erudit. Wedelio, de compos. Med. Extemp. §. c. 12. &c.* *Specialis* est, quam cujusvis remedii usus & effectus particularis circumscribit, nam alia dos. est C. C. f.  $\Delta$ , alia  $\Theta$  vol. C. C. alia Mercurij dulcis, alia turbith. mineral. alia rhabarbari, alia Lap. 69. &c. In utraque *debita proportio* observanda. In *speciali* est proportio inter basin, ejusque adjuvans, ac corrigens, ne nimis exaltetur potentia baseos, nec infringatur ab iisdem, sed omnia pro effectu intento obtinendo, mutuo conspirent, & junctim Dosi legitimam constituent. conf. §. 10. circa finem. Ex hoc enim de judicio Medici præscribentis ferè judicari potest. Ob id in pulv. §. 9. jalap. una dos. sufficit, ob adjuvans egregium Tartareum: quibus forsan debilioribus gr. i. Scammon. additum integram dosin proportionè debita compleret. Quoad *generalem* dosin, ingredientium mutuus ad se invicem quasi sit respectus, ita ut eadem proportionè dupla, tripla, 4pla, 6pla, 12pla &c. aut quocunque alio modo his plus minus analogo, sibi invicem aptè respondeant, quo æqualis quasi, ac elegans, non v. hiulca aut aspera fiat præscriptio. Non equidem de necessitate hæc sunt, cum ad ornatum tantum faciant, tamen de majori Medici præscribentis attentione loquuntur. Sic enim in mistura supra §. 9. præposita  $\nabla$  &  $\text{Zj}$  respondet Tincturæ f. Essent.  $\text{Z}\beta$ , spiritus  $\text{Dj}$ , pulv. gr. iv. syr.  $\text{Zj}$  ad  $\text{Z}\beta$ . dant hæc dosin integram specialem, triplicata mutuo, pro repetito usu formulam istam subministrant: id quod majori omninò sit ornatu quam si  $\nabla$   $\text{Ziv}$ , Essent.  $\text{Zij}$  spiritus  $\text{Dij}\beta$ , pulv. xvij. syr.  $\text{Zv}$ . l. vii. invicem confunderentur.

§. 16. Restat adhuc, ut formæ ratione *præscribendi miscendique modum* consideremus, qui vel materiam, vel formam præscriptionis respicit: Materia quidem præscribitur vel *simpliciter*, vel *modificate*: ibi generaliter



herb. malv. rad. gentian. ☉ absinth. Mercur. dulc. spiritus ☉ \*, hic v. specialiter com. absinth. rad. helleb. nigr. præp. rad. chin. non carios. Mercur. dulc. ad extra, ad intra, spiritus ☉ \* succin. ☉ vol. Viperar. camphor &c. quæ tamen præscriptionum inspectio spontè docet. Formam denique, quæ respicit præscribendi ratio, est hæc vel *universalis*, quibus ferè formulis communis, vel *particularis* certis quibusdam propria. Illa in anteposito consueto R. sive recipe, quod quare quidam adeò horreant, nisi forsitan, quod in Veterum scriptis non æque reperiatur, sanè non vidè: & in postpositis M. F. l. a. D. S. hoc est, Misceantur, Fiat lege artis, dentur, signentur, ferè consistit, quibus & illud ana sub æquali ingredientium dosi accensendum: Hæc in qualibet ferè formulâ aliquid peculiare obtinet quando in pulveribus præcipitur redigantur in alcool, in quibusdam liquoribus filtrentur, colentur, stent in MB. per 12. l. 24. horas, hoc est, per 24, & quæ sunt aliæ similes præscribendi rationes non nisi sub speciali formularum tractatione exacte dignoscendæ.

§. 17. His omnibus ita observatis sub ipsa præscriptione emergit spontè sua ipsum Medicamentum sive quasi novum concretum remediæ essentialiale, magistraliter quidem sive extemporaneè, artificiosè tamen compositum, juxta Medici privatam ordinationem, ulterius adhibendum.

## C A P. II.

De Præscriptione Formularum  
in specie.

## §. I.

F Acimus jam accessus ad ipsas præscribendarum formularum differentias & distinctos modos, istos scilicet qui hodiernæ comptiori praxi accommodati, relictis jam antiquatis ac inusitatis, & qui pro magistrali compositione dirigenda, extempore à Medico præscribuntur. Applicatio præscriptorum per formulas remediorum, eorumque usus varius Practicis demandanda venit. Vitabimus enim quantum possibile *confusionem & prolixitatem*, illa errorum, hæc tædii in Philiatro genetrrix. Nihil ergò sumus acturi de *syrupis*, qui pro dispensatione sui semper parati prostant, nec magistraliter præscribuntur. *Vina Medicata* ad infusa pertinent, nec peculiarem præscribendi modum exigunt. *Prisana* pariter, sive *Hordeatum*, *Hydromel*, *Oxymel* decoctionum speciales quidem modi, non secus ac *Diata sudorifera*, sive lignorum decocta, tam primaria, quam secundaria. *Destillatum instaurans* est non ens, etiam si v. impinguans *Epiphan. Ferdinand. in Hist. Med.* foret, nudum nempè Phlegma quod



quod sine ullo usu hauritur. *Decoctum Galli* sive junioris sive senioris, jam rarissimi usus Pharmaceutici, ad culinas relegandum, unà cum *jusculis medicatis* ac restaurantibus, quorum omnium odor ægris vix tolerabilis, nedū ut ventriculus debilis, sub appetitu prostrato, eadem digerat, quin dum calore febrili interiora plus minus æstuant, cadaverisantur talia digestionis defectu, putrescunt, aut saltem in nidorem abeunt. *Conditum* idem cum Electuario. *Eclegmata* ferè inusitata, quorum locum syrupus quidam gratior, v.g. diacod. Mont. scabios. vel misti, vel cum Rob. passul. min. subacti, cum baculo liquiritiæ pro scopo temperandi sive demulcendi aut in crassandi supplebunt, sicut pro scopo attenuandi sive demulcendi aut in crassandi supplebunt, sicut pro scopo attenuandi & resolvendi isti de prassio, de nicotiana emeticus salæ c. spiritus Sulph. paucis gutt. sufficient. *Pandaleon Pasta Regia*, *Massa Panis*, *pineolatum*, *cupediarii* relinquendi, & quantum nutritii vel temperantis rotis languidus tabescentium Ventriculus ex istis hauriet? dum in pastam tenacem viscidam acidam in eodem abeunt. *Trochisci* magistrales vix præscribuntur ulli, cum ipsi officinales videantur quibusdam superflui. *Epithema* peculiarem haut exigit formulam, cum fluidi cujusdā, vel liquoris, vel misturæ, vel decocti, vel emulsionis determinatam saltem externam applicandi rationem denotet. Idem dicendum de *Clysmatis* ac *Gargarismatis*, quæ saltem in medicamentorum liquidorum, variâ forma adscriptorum, speciali utendi modo consistunt. *Fotus humidi*, & quæ huc pertinent, *Lotiones*, *Balnea*, *Insessus*, ad decoctorum speciales modos, ex applicandi varietate natos pertinent, nam simili ac decocta modo præscribuntur: etiamsi etiam sicca, *sacculorum* formâ adhibeantur, eadem tamen præscribendi, alia saltem applicandi ratio. Nec *scutum* differt à sacculo vel emplastro, dum ventriculo admoventur. *Frontale* nunc sacculus, nunc Epithema, nunc linimentum est. *Cucupha* est specialis saltem pulverum applicatio. *Collyria*, oculorum sunt remedia, multiplici formulâ præscribenda. Idem de *Errhynis* valet, *Sternutatoriis*, *apophlegmatismis*, & *dentifritiis*. *Cataplasmata* ad decoctionum speciales modos reducenda, sicut interdum ad misturas spissiores. *Pescatoria* peculiarem non constituunt formulam, quin pro ut pulverisati cantharides vel fermento pro cataplasmate, vel emplastro magistrali aut officinali includuntur, suum quod est faciunt, quid? quod eorum essentia, cuti imposita, vesicas excitet. *Suppositoria* non præscribuntur, sed officinalia ordinantur: ut taceam loco illorum globulos *die Biesen Kugeln*/commodius si non ut plurimum felicius applicari posse. Quod si extemporaneum desideres, prompte illud ex O, ad imitationem *Sala append. Myroth. f. 4. §. 13. p. 840. vel Sylvii. l. i. prax. c. XI. & XII. p. 119. 123.* concinnabitur. Quæ & qualia denique præscribuntur hodie *peffaria*, quin loco eorundem vel injectiones per metrenchytem, vel suffitus per instrumentum *Glauberi* ligneum, vel *optimè*



par parvam aut Phiolam aut retortulam vitream, longioris paulò colli usurpantur, dum harum in specie orificium linteis tenerioribus munitum, sinui pudoris applicatur, fundus v. vasis, cum remedio vel solido vel fluido & carbonum leni proprius admoveatur, ut concitatis hinc effluvis, uterus locaque vicina diversimodè alterentur. His ergò partim rejectis, partim ad stationes debitas relegatis, *formularum quamvis differentiam s. Classibus generalibus includemus, & specialius pertractabimus.*

fit ergò.

## CLASSIS PRIMA.

*Pulveres & iisdem subordinatas formulas sistit.*

### §. I.

**S**impliciter in his arida sive sicca, in minutiores sui partes contundendo sive terendo redacta, sive jam pulverisata prostant, simplicia ac composita, sive demum pulverisata sint, præscribuntur. Dos. general. pro una vice sit ℥j ad ℥ss. rarò ℥ij. rarissimè ad ℥j nisi in dosi quorundam speciali v. g. rad. Asari ad ℥j ascendere necesse sit. Usus eorum est tam *internus*, quam *externus*. *Internus*, ceu potior, (de quo modo dicta ferè intelligenda) est, dum capitur in vehiculo convenienti, aut *domestico*, quod privatim ægro Medicus denunciat, aut *officinali*, mistura scil. quadam tenuiori, à Medico simul præscripta,

#### *Pulvis absorbens acidum.*

℞ *Lap. 69. præp. ℥ss.*  
*Unicorn. fossil.*  
*Corall. rubr. pp.*  
*C. C. ust ana ℥ss.*  
*℞ absinth. ℥j.*  
*Nuc. mosch. ℥ij.*  
*M. F. pulv. D. S.*

*Dempfer Pulver auff etlich mal.*

#### *Pulvis absque torminibus blandissimè purgans.*

℞ *jalap. ℥ss ad gr. xv.*  
*Nit. purissimi. ℥ss.*  
*scamnum pp. gr. ij.*  
*Ol. Destill. anis. gutt. ij.*  
*M. F. pulvis. D. S.*

*Exier Pulver auff ein mal.*  
*loco solius Nitri etiam Nitri gr. vi.*  
*Nit. Tartari gr. xv. recipi possunt.*

*dos.*

*dos. quant.*  
*capere potest.*

*Pulvis*  
*pochondria*

℞ *Crem. T.*

*fol.*

*zing.*

*cim.*

*M. cap.*  
*in principio*  
*te prandium*  
*cupis.*

*Cran.*

*fol.*

*ful.*

*M. detur.*

*Sende*

℞ *▽ pœonia*

*cim.*

*gr. fl.*

*M. D.*

*Wasser*

*Siccis hujus*  
*medicæ, ut*  
*verb. gr.*

℞ *C. C. ust*

*M. f. pulv.*

*§. 2.*

*aromatibus*

*Tragea voc*

*integrum, a*



dof. quantum largior cultri, cuspis  
capere potest.

*Pulvis laxativus antihy-  
pochondriacus.*

R. Crem. Tart.

fol. fenn. s. ft. ana ʒʒ.

zingib. anis.

cinamom. cubeb. ana ʒj

M. capiatur in jusculo calido l.  
in principio prandii vel hora 1. an-  
te prandium : dof. largior cultri  
cuspis.

Cran. human. viol. oecis,

ana gr. v.

⊙ fulmin. pr. j.

M. detur. in 2plo. S.

Sonderlich Pulver.

R. ▽ pæonia. ʒʒ.

cinamon. spirituos. ʒj.

fyr. fl. tunic. ʒʒ.

M. D. S.

Wässerlein zum Pulver.

Siccis hujusmodi, interdum & consistentiæ vel fluidæ, ut Ol. Destill. vel  
mediæ, ut theriac. extract. in dosi tamen exigua, sive infracta, addi solent :  
verb. gr.

*Pulvis Puerilis, in Torminibus c. alvi  
fluxu.*

R. C. C. ust. ʒij. unicorn. fossil. ʒj. Terr. sigill. ʒʒ.

theriac. gr. iv. extr. castor. gr. iij. Ol. Destill. macis. gutt. ij.

M. f. pulvis. D. S. Anhaltend Ruhe-Pulver.

§. 2. Subtilissimè tritus pulv. alcool. aliàs dicitur, grossior verò ex  
aromatibus & analogis subjectis, non aded exacte tritis, cum saccharo mistis  
Tragea vocatur. Hujus secundum praxin olim usitatam cochlear semis vel  
integrum, aut ita in formâ siccâ, aut panî Vîno malvatico imprægnato inspersâ,  
malt-

*Pulvis febrilis laxativus :  
ante Paroxysmum.*

R. Corall. rubr. pp.

Nit. absinth. ana gr. xv.

scammon. pp. gr. iv.

M. D. S.

Eröffnend Stieber Pulver.

*Pulvis Contra Epilepsi-  
am infantum : ex consensu  
abdom :*

R. ras. unicorn. ver.

*Pulvis contra Variolas &  
morbillos, præsertim in incre-  
mento.*

R. C. C. s. Δ. ʒij.

Unicornu fossil. ʒj.

⊙ card. bened. gr. xv.

myrrhæ el. gr. xii.

M. divid. in. 3. p. aq. D. S.

Aufreibend Pulver.



masticando successivè assumebatur præsertim à pastu, pro corrigenda digestionè primâ, inflatione ventriculi, flatibus hinc crebrioribus, & in genere, quibusvis malis chronicis, in quibus ventriculus frigidus, & hepaticum calidum, passim inculari solent, & exinde alias quoque *peptici* dicuntur: exempla vid. in *Horst. Observ. l. 4. obs. 38. p. 210. it. lib. 5. obs. 3. p. 266. & obs. 4. p. 268. it. Sennert. Instit. l. 5. p. 3. f. 3. c. 14. p. 1415. 1417. & lib. 3. prax. p. 1. f. 1. c. 5. p. 24.* Sed comptior hodierna praxis, pro puerorum potius delectamentis, præsertim dum confectiones saccharatæ subinde permiscentur talia destinat. Loco eorum enim, ex quibus necesse est ut subdigestione prius ventriculus medicinam præparet, potius spiritus aut  $\Theta$ ia vol. aromatica sive Oleosa in usu sunt, sive quovis in pastu, sive brevi post eum absolutum assumantur: in quem finem aptissima eorum videtur præparatio, si aromata selecta, præsertim simul carminantia, cum s. q.  $\Theta$  & Calx viv. mista, hinc  $\nabla$  commun. humectata, mediocri  $\Delta$  rigore per Retort. destillentur, acquiritur sic spiritus sive  $\Theta$  vol. Oleos. in formâ humida, quod dos. gutt. 20. l. 30. ab istis trageis sperata auxilia multum si non superabit, certè æquè præstabit. Quod si tragea quædam delicata, variis condimenti loco inspergenda aut addenda, desideretur: præscribatur talis perquam grata:

*R. Cinamom. p. iij. Cardamom. p. ij. caryoph. p. j.  
Sacchari q. pl. M. asservetur usui.*

*S. 3. Externum quod attinet pulverum usum, varius equidem & multiplex est, pro partis affectæ, & usus differentiis, ast præscribendi modus ubique est idem:*

*Pulvis ad Intertriginem: Pulvis ad ulcera Inveterata,  
& similes externas exco- rationes.*

*R. C. C. ust. ℥ij.  
Creta alibi. ℥jss.  
ceruss. ℥ss.  
pulv. ros. rubr. exsic.  
q. s. pro gratiâ coloris.  
M. f. pulvis. D. S.  
Ein streu Pulver.  
nodulo raro includitur & ita insper-  
gitur.*

*R. Croci & ex Vitriolo præcip. ℥ij.  
Lact. Lun. ℥jss.  
Terr. sigill. ℥j  
myrrha.  
aloës.  
macis. ana Dj.  
camphor. ℥ss.  
M. f. p. D. S.  
Euserlich reinigend Pulver.*

*Conf.*

*Conf. Major  
sipelatodes M  
Pro oculorum  
speciatim Ar*

*Ad o  
rantem.*

*R. off. sep.  
facc*

*Vin  
Tm*

*M. f. p.  
Au*

*Pulv  
ad in*

*R. rad. heli  
facc*

*Ol. D  
anis.*

*M. D. S*

*Pulv  
Mobilita*

*cruentati*

*R. fl. rubr.  
C.*

*On  
nu*

*M. f. p*

*quo post  
tium puri*

*gingiva:*

*S. 4  
ximam par  
saltem usur*



*Conf. Major. Diff. de Lact. Lun. c. XI. §. 2. & 6. pertinet huc etiam pulv. eryspelatodes Mynsichti: Armament. sect. 5. p. 436.*

Pro oculorum usibus pariter pulveres externi adhibentur, sed subtilissimi, & speciatim Arabico nomine, *Sief*, appellantur, & modestè oculis in sufflantur.

*Ad oculum Ungue laborantem.*

*R. off. sep. pulv. ℥j.  
sacch. cand: ℥j.  
Vitrioli alb. ℥ss.  
Tutia pp. ℥ss.  
M. f. pulv. subtilissimus. D.  
Augen-Pulver.*

*Pulvis sternutatorius.*

*ad imitat. Helmont.*

*R. rad. helleb. nigr. non prepar.  
sacch. albiss. ana. ℥j.  
Ol. Destill. majoran;  
anis. anagutt. ij.*

*M. D. S.*

*Niese-Pulver.*

*Pulvis dentrificius, ad Mobilitatem, Putredinem, cruentationem, gingivarum.*

*R. fl. rubr. malv. arbor. ℥ss.*

*C. C. ust. ℥ij.*

*Ousti.*

*nuc. mosch. ana. ℥j.*

*M. f. pulvis subtil. D. S.*

*Zahn Pulver.*

*quo post oris collotionem & dentium purificationem, bene fricentur gingivæ:*

§. 4. Pulveres si excipiantur Conserva, & cum fluido quodam maximam partem, syrupo, pro meliori miscela subigantur, pro una dosi, interne saltem usurpanda, dant

*Vid. Poterius, felix Practicus Cent. 2. cap. 8. p. 16. ex quo suppresso Autoris nomine abstulit Riverius Prax. l. 2. c. 18. p. 184.*

*vel ad hodiernum morem*

*R. pulv. tabac. Indic. Virgin. ℥ss.  
majoran. ℥ij.  
Ol. Destill. lavendul.  
anis. ana gutt. vi.  
ambra. gr. x.  
mosch. gr. x.*

*M. F. pulv. S. D.*

*Haupt und Niese-Pulver.*

*Pulvis pro suffumigio.*

*R. Sandarach. f. gumm.*

*junip. ℥vj.*

*Succini ℥ss.*

*styrac. calamit. ℥ij.*

*thuris.*

*mastich.*

*benzoës ana ℥ij.*

*M. f. pulv. gressus. D. S.*

*Neucher Pulver.*



## Bolos.

qui cum ita simpliciter saltem deglutiendi sint, & quantitate quantum fieri potest exigua. ℞. ad ℥j. raro ad ℥ij, gratia veto majori præscribendi.

## Bolus Emeticus.

℞. Conf. fl. tunic. ℥j. ad ℥ss.  
Sulp. ꝑ. c. lixiv. detonat.  
Tart. & U per decoct.  
parat. gr. vi.  
Crem. Tart. gr. v.  
M. f. Bolus D. S.  
Wrech. Zucker.

## Bolus in Vomitu nimio.

℞. Conserv. ros. Vitriolat. ℥j.  
Terr. sigill. ℥j.  
laud. opiat. gr. i. ad ij.  
Ol. Destill. Cinamon. gutt. j.  
c. f. q. miv. cydonior.  
F. l. a. Bolus miscendo & expectan-  
do, donec aliqualis turgescencia ces-  
saverit. D. S.  
Magen stärkender Zucker.

Nempe usitatissimè istis modis præscribuntur boli, loco tamen Conservæ, etiam Pulpæ quædam spissiores, ut *tamarind.* it. Electuar. gratior. ut *Rosat.* quin & *Theriaca*, ut in postremo exemplo, sed hæc rarius solent recipi. Dum enim vulgus inter euporista sua Rob. Sambuci, vel juniperi cum C. C. f. Δ aut nisto, pro scopo diaphoretico, in Erysipelate & similibus malis porrigit, quid aliud, quam bolum ordinat? Sicuti ex opposito Confectiones, extract. gratiora aliave, conjungi aptè in boli formam possunt.

## Bolus Laxativus contra vermes.

℞. Conf. fl. persic. ℥ij ad ℥j.  
ꝑ. dulc. gr. xv. ad ℥j.  
pulv. jalap. gr. viii.  
vel  
Scammon. pp. gr. ij.  
c. f. q. syr. fl. persicor.  
F. Bolus D. S.  
Laxier Zucker gegen die Würmen.

## Bolus Diaphoreticus febris expertus, sed nonnihil ingratus.

℞. Theriac. ℥ij. ad ℥j.  
specif. febril. Strobelb. ℥ss.  
Ol. Destill. caryophyll. gutt. ij.  
M. c. f. q. syr. card. bened.  
F. l. a. Bolus. S. D.  
Fieber Latwerge.

Bolus

Bolus

Ventrici

℞. Pulp. tamarind.

Tart.

bez.

c. f. syr. v.

℞.

quin & si c.  
syrupus rec.

℞. pulv. hy.

S. j.  
res, hoc est

quod modo  
opio, vel p  
aut ad eoru  
Matthiol. a  
seant. Qu  
entia est in  
remedium  
lumis. U  
amplius in  
incertitud  
æqualiter  
potest. C  
rum, præ  
Conserv.  
usus inval  
huc elegar



*Bolus alterans, in astu**Ventriculi & hypochondr.*℞ *Pulp. tamarind. ℥ij.**Tart. Vitr. Tachen gr. xv.**bezoard. min. simpl. ℥ss.**c. syr. violar. F. Bolus D. S.**Kühl Larverge.**Bolus Analepticus Hypno-**ticus.*℞ *Conf. fl. borrag. ℥j.**Conf. alkerm. ℥ss.**Land. opiat gr. j. ad iss.**M. f. bolus. D. S.**Sterckender Ruhe-Zucker.*

quin & si copiosior paulo pulvis fuerit, Conservæ Constituentis loco solus  
 syrupus recipi potest, q. f. pro consistentia debita.

*Bolus Purgans.*℞ *pulv. hypochondr. laxativ. supra. §. i. descr. ℥j.**scammon. pp. gr. j. ad ij. c. f. q. syrup.**ros. solutiv. f. mucharrof. F. l. a. Bolus.**D. S. Purgier Zucker.*

§. j. Quod si simili modo, sub mole tamen majori, tractentur pulve-  
 res, hoc est si formetur bolus pro pluribus dosibus, erit

*Electuarium.*

quod modernis subinde *Conditum*, veteribus verò *Opiatum* audit, & hoc ab  
 opio, vel principali vel universali eorum ingrediente. Veterum ista Opiata,  
 aut ad eorum similitudinem confecta alia, v.g. *Diascordium Fracast. Antiod.*  
*Matthiol.* aut *Orvietana*, *Theriaca cœlestis Greiffii* &c. ceu officinalia tran-  
 seant. Quoad *Electuaria magistralia*, proportio ingredientium ad constitu-  
 entia est in genere vel 8pla, vel 6pla, 4pla: &c. prout potentius vel debilius  
 remedium, dosi majori aut minori, idque crebrius aut rarius, capiendum vo-  
 lumus. Usus est tantum internus, isque alterativus, solutiva *Electuaria* haud  
 amplius in usu, idque ob purgantium partim horridum saporem, partim ob  
 incertitudinem doseos, & consequenter operationis, siquidem nec subigi  
 æqualiter per totum purgantia, nec *Electuarii* dosis tam accuratè observari  
 potest. Quin talium loco in officinis vel *Passularum laxativarum*, vel *pruno-*  
*rum*, præsertim ad *Timæi* imitationem præparatorum, it. *Cydoniati laxativi*,  
*Conserv. ros. vel violar. laxativ. c. mannâ. Timæi*, & similis compositionum  
 usus invaluit, quæ pro unâ vice determinata dosi optimè assumuntur: Pertinent  
 huc elegantis compositionis *electuaria purgantia*, tam *cholagogum*, quam



hydragogum Sylviil. 1. prax. c. 2. §. 46. & c. 7. §. 55. quæ facillè pro dispensatione ordinaria in officinis præparari possint.

§. 6. Quoad Electuaria Alterantia ergo:

*Electuar. Antihypochondr.*

℞. Conf. cochl.  
fumar. ana. ℥ij.  
Ebor. s. Δ. ℥ij.  
Lap. 69. pp.  
Corall. rubr. pp. ana. ℥j.  
Vitrioli ♂ Div. ad ℥ij.  
c. f. q. syr. borrag. F.  
l. a. Elect. D. S.

Alterativ Latwerge.

Loco Vitrioli ♂, etiam extractum ♂ cum succo velpomorum, vel acetosell, vel tamarindorum ad ℥ij. vel ℥ss. recipi potest.

De his electuariis, bis l. 3. de die capitur, magnitudin. castanea vel nuc: ingland. & amplius, aut quantum binis ternisve cultri latioris cuspidibus capi potest.

Interdum sive conservis, solo syrupo convenienti excipiuntur, aut c. Rob. sambuc. subiguntur, & hoc in compositionibus quasi theriacalibus, loco Venterum mellis, quibus tamen aliquid fluidi pro meliori miscelâ affundendum.

*Electuar. contra Nimum Mensum  
fluxum.*

℞. Corall. rubr. pp. lap. hæmatit. pp. boli armen.  
Unicornu ver. pp. ana. ℥ss.  
sem. plantag. ℥ij. O crud. ℥ij.  
land. opiat. gr. v. c. f. q. syr. plantag. F. Elect.  
D. S. Anhaltende Latwerge.

Hiscæ ceu ordinariis Elect. ingredientibus, interdum etiam rad, conditæ, confectiones, extracta, succi inspiss. it. spiritus &c. pro circumstantiarum ratione & respectu baseos, item constituentis, infractâ, proportionatâ tamen dosi commiscuntur.

*Electuar. stomachalè.*

℞. Conseru. menth. crisp. ℥ij.  
anthos.  
metiss. ana ℥j.  
rad. zingib. in Ind. condit. ℥ss.

*Elect. ad fluorem album.*

℞. Conf. fl. anthos. ℥ij.  
Ebor. crud. ras. pulv.  
magist. succin. c. S. V. ana ℥ij.  
lap. osteocoll. ℥ss.  
putamin. avellanar.  
pulv. ℥ss.  
c. f. q. syr. ros. rubr.  
F. Electuar. D. S.

Dämpffende Latwerge.

*Electuar. pro semibus ab  
Apoplex. metuentibus.*

℞. Conf. fl. anthos.  
menth. ana. ℥j.  
fl. tunic. ℥ij.

pulv.



pulv. Zedoar. ℥ss.  
cinamom.  
caryophill. ana. ℥j.  
Theriac. Andr. ℥ij.  
c. f. q. syr. menth. F.  
Elect. D. S.  
Erwermende Magen- & Latwerge.

Electuarium contra Dy-  
senteriam.

℞. Conserv. ros. rubr. ℥iij.  
Diascord. Frac. ℥vj.  
Tinctura f. Ess. Cinamom. c. S. V.  
Tartif. ℥iij.  
ras. priapi Ceti subtiliff.  
pulv. ℥ss.  
troch. de carab. ℥ij.  
Corall. rubr. pp.  
Off. sepia pulv. ana. ℥j.  
Extr. tormentill. rit. parat. ℥ss.  
c. f. q. succi cydonior. vel mivæ cydo-  
nior; aromatic. F. electuar. D. S.  
Anhaltende und Schmerzstillende  
Latwerge.  
de quo creberrime pro lubitu ager ca-  
piat.

zingib. in Ind. condit. ℥ss.  
sem. sinapi.  
Eruca. ana. ℥ij.  
Corall. rubr. pp.  
succini. pp. ana. ℥j.  
cardamom. ℥ij.  
cinamom.  
caryophill. ana. ℥j.  
Θ vol. succini. ℥j.  
c. f. q. spiritus ceras. ingr.  
F. Electuar. D. S.

B. D. Michaelis, aliquando seni cui-  
dam non sine iudicio pro analepsi præ-  
scripsit.

℞. Conf. anthos.  
salv.  
tunic. ana. ℥ss.  
Conf. alkerm. ℥ss.  
ambra. gr. V.  
mosch. gr. iij.  
laud. opiat. gr. issad. ij  
c. f. q. syr. fl. tunic.  
F. Electuar.  
irretetur ∇ cinamom. spirituos.  
D. S.

Stärckende Mistur.

In Hemorrhagia narium habituali, juniorum,  
ex hypochondriis, &c.

℞. Pulp. passul. min. vel Conf. ros. rubr. ℥iij.  
rhabarb. el. Corall. rubr. pp. ana ℥ss.  
Ebor. f. ∇. ℥j. Dent. equi marin. ℥ss.  
M. c. f. q. extr. ∇ c. f. pomor. ℥ss. ad ℥iij.  
M. c. f. q. syr. ros. rubr. F. Elect. D. S.  
Stillende Latwerge.



§. 7. Quod si pulveres, loco constituentis consistentiæ mediæ, excipiantur saccharo, in liquore conveniente soluto & denuð inspissato & in plannum per vasculum ad instar infundibuli cum parvo quasi pistillo in medio projecto, emergunt.

### Rotula.

seu ut aliis audiunt, *Orbiculi*, it. *teffella*: tali ferè proportionæ, ut pulverum sit p. 7. sacch. excipient. p. iii. iv, ad vi. prout potentiores aut mitiores, effectu medico easdem expetimus: quibus jam confectis subinde una, alterave Olei cujusdam Destillati aut suavioris essentiæ aromaticæ gutta inspergi potest. Usus tantum est internus, isque alterativus, solutivus ferè in desuetudinem abiit: quin usitatissimè in faucium à lymphæ acriori quacunque occasione læsarum affectibus præscribi solent, ut demulceant istas, dum in ore detentæ successivè liquescunt. Quod si præterea in aliis usibus ordinentur, crebrius masticaudæ & deglutiendæ veniunt v. g.

*Rotula contra tussim siccam, nocturnam, faucium asperitatem, conceptam earum Phlogosin: &c.*

R. Splc. Diatreosusit. ʒiij.

boli armen. pp. ʒi.

Succ. glycyrrh. hisp. ʒss.

c. f. q. sacchari, vel huius ʒiij. ad ʒiij. in ▽ papav. rhead solut. F. Rotula. D. S.

Dust. Rücklein.

confer. hic Rotul. Sylvi l. i. prax. c. 20. §. 37.

*Rotula bibitoria quibusdam dicta.*

R. sem. coriandr. pp. ʒss.

fenicul. anis.

carvi. petros. ana. ʒij.

nuc. mosc. ʒiv.

*Rotula contra inflationem ventriculi, ructus, it. Colicam, &c.*

R. Ebor. ust.

Corall. rubr. pp. ana ʒss.

Spec. diatr. pipercon. ʒj.

Extr. Zedoar.

cortic aurant. ana

ʒss.

c. f. q. sacchari in ▽ fenic. solut. F. Rotula aspergenda in fine Ol. Destill. feniculi, macis ana gutt. iv.

D. S.

Zertheilende Rücklein.

*Rotula Confortantes.*

R. Spec. diamb.

diamosch. d. ana ʒss.

macis



macis. ℞ij.

zingib. cardamom.

cubeb. cariophyll. ana ℞ij.

piper. alb. long. ana. ℞ss.

c. f. q. sacchar. in ∇ carminativ. Dorn-  
erell. soluti F. Rotul. S.

Magen. Küchlein.

c. f. q. sacchari ad ℞ij. in ∇ ros. solut.

F. Rotula: sub. finem mixtionis ad-  
dendo, confect. alkerm. ℞ss. vel quan-  
tum potest, irroretur Ol. Destill. ci-  
namom. D. S.

Sterckende Küchlein.

Nempe interdum præter pulveres, & extracta graviora, confect. Ol. Destill. & similia, proportionata dosi recipi possunt. Sic ex solis Oleis cum saccharo, loco Eleosaccharorum, quibusdam usitatorum, rotulas carminativas præparat. *Mynsicht. Armam. f. 7. p. 163.*

Quod si denique delicatis admodum l. pro Pueris, orbiculi purgantes præscribendi sint, hi methodo vel *Sylvii. prax. l. 1. c. 2. §. 44.* vel *Timai cas. p. 427.* præscribi poterunt.

§. 8. Quod si præter Pulveres & alia, ad Electuaria recipi solita, dosi quam in his minore, simili modo saccharo inspissato excipiantur, & in formam oblongam, quadratam, planam, (in quem finem jam certi moduli lignei aliivè fabricati sunt) redigantur, communiter.

## Morsuli.

quia mordendo quasi assumantur, it. ob ingredientium identitatem, *Electuar. solida*, aut *confectio solida* it. à figura *Tabellæ* appellantur. De cætero ut Boli cognati sunt Electuariis, ita Rotulæ Morsulis & contra, item, ut Boli se habent ad Rotulas, ita Electuaria ad Morsulos, & contra. Res in fundamento quasi eadem. In horum adeoque Morsulorum præscriptione, proportio observanda ea, ut pulv. p. 1. ana vel duplum reliquorum, conserv. condit. confect. respondeant simul, ad splum, 6plum, imò 8plum sacchari. Pro usu saltem interno, eoque alterativo, & potissimum confortativo, rarissimè aut nunquam hodiè solutivo, & rationes supra §. 5. allegatas.

## Morsuli contra Sodom.

℞ spec. Diacret. Myns. ℞vj.  
vel loc. harum

℞. Creta. ℞ij.

ebur usti. ℞j.

lap. ʒ. pp.

Unicorn. fossil.

corall. rubr. pp. ana ℞ij.

## Morsuli stomachal.

℞ Conf. anth. l. menth. ℞ss.

rad. zingib. in Ind. condit.

℞ij.

Spec. Imperat. ℞ij.

extr. zedoar. ℞ss.

c. sacchari ℞viii. in

∇ fœniculi soluti; F.

nuc.



nuc. mosch. ℥j.

c. f. q. sacchari, h. e.

℥iv. vel ℥xj in ∇ portulac. solut.

F. Morsuli. D. S.

Dämpfende und kühlende  
Morsellen.

l. a Morsuli. D. S.

Magen Morsellen.

Quod hos diacretæ Morsulos annoto, quod pulv. ex latere cœcto, intensius rubescente, c. f. q. sacchari in morsulos redactus præstantissimum sodæ sit remedium: possit & nucis moschatae aut macis aliquantulum addi. Vis hæc consistit in substantia Marciali, unde color, (etiam quando ab illo sebarabilis) in crocum potenter absorbentem per calcinationem ignis mutatâ.

## Morsuli Præservativi in Malignis.

℞ Conserv. pulp. Citri. ℥j. theriac. ℥iij.

C. C. f. Δ. &amp; diaphor. Terr. sigill. ana. ℥ij.

c. f. q. sacchar. in ∇ scord. solut. F. Morsuli. irrorentur tempore usus, aliquot gutt. Ol. Destill. Henif. &amp; usurpentur.

§. 9. Cæterum hæ & similes formulæ, sub hodiernâ praxi, multis suspectæ sunt medentum, quia hostiles manifestò pluribus ægrorum, idque ob sacchari abundantiam, paucissimis nostrorum ægrotum, aliquid hypochondriaci ut plurimum patientium, cujuscunque fuerint sexus, aut ætatis, tolerabilem, quin fermentando & acescendo, mucaginisque tenacioris forma adhærendo, quibusvis ita chronicis morbis symptomata aut exacerbare, aut magis complicare, aut morbum ipsum procrastinare solent. Crebrior adeoque sach. usus, ut non convenit Ventriculo, autore *Helmont.* *Dispens. Mod. S. 30. & 57.* Ita ceu perquam noxium pulmoni notatur à *Garenzler de Tab. Anglin. p. 98. & 95.* adeoque à crebriori ejus usu, & præscriptione, in Climate ægrisque nostris, merito abstinendum. Accedit & hoc, quod hæ remediorum formulæ, sub tenebris ignoratæ Pyrotechniæ natæ, blandimento potius palati ægrorum, aut aliquali remedii varietate, quam efficacis medicinæ intentione, ordinatæ primitus videantur.

Quin potius concinniores pulveres, essentia, extractavè, spiritus, Etiaque vol. tam minori ægri ventriculi labore ac tædio, majori verò cum euphoriâ pro praxi elegantiori adhibeantur.

CLAS-

A Parvæ  
Aterum  
quarumvis  
que cruda,  
natam ad  
redactam,  
Concinnio  
totius molis  
minores, e  
alia majore  
viii: & lu  
dicuntur.  
centiorum  
terdum &  
randæ ord  
tur. Idqu  
dividendi  
potest, je

Pilm

℞ MP. a

c. f. q. Ol.

Purg

Pilm

Eticæ a

tentum

℞ MP.

Tart.



## CLASSIS II.

## Pilulas exhibet.

## §. I.

**A** Parvæ pilæ similitudine, aliàs *Catapotia*, ab assumendi modo, dictas. Veterum inventum, quo amarissima sua purgantia, ut aloë (apud illos quarumvis pilularum basin) scammonium & colocynthidem propinando, eaque cruda, mellis ope palliata, palatum melius fallerent. Massam ita concinnatam ad ʒj. ferè præscribebant, eamque in majores aliquot gr. v. l. vi. l. vii. redactam, quales apud Belgas fere adhuc in usu sunt, deglutienda offerebant. Concinnior hodierna praxis, sub frequenti Pilularum usu, ʒj. in præscriptione totius molis vix excedit, adeò ut vix gr. i. attingant singulæ Pilulæ, siquidem quæ minores, eò gratiores. Nisi ingredientia, sub parvâ mole ponderosiora, ut *Si*, alia majorem dosin admittant. Usus nobis est tam *alterativus*, quam *laxativus*: & hujus quidem respectu Pilulæ vel *extraordinariæ* vel *ordinariæ* s. *usuales* dicuntur. Purgantes *Extraordinariæ* vel 1. ex officinalibus Veterum cum recentiorum massis additis consuetis stimulis scammonii & troch. alhandal, interdum & aliis appropriatis, mediante liquido, v. spirituofo, Oliofo &c. præparandæ ordinantur: vel 2. ex Extractis purgantibus, additis iisdem præscribuntur. Idque pro una vel pluribus dosibus, ibi numero indefinito, hic verò pro dividendis dosibus, bene determinato. Capiantur manè, quacumq; ratione fieri potest, jejuno ventriculo, vel post haustum jusculum tenue.

*Pilulæ Purg. Cathol.*

℞ MP. de hier. c. agar.

ammoniac. Qu.  
ana ʒss.

scammon. pp. gr. ij.

troch. alb. gr. j.

c. f. q. Ol. Destill. macis.

F. Pilul. D. S.

Purgier. Pillen auff einmahl.

*Pilul. Emetico - Cathartica* antè Paroxys. intermittentium.

℞ MP. de ʒb. Ruff. gr. xv.

Tart. Emetic. gr. j.

*Pilulæ ad Luem Veneream.*

℞ Extr. panchym. Croll.

gr. xii. ad xv.

℞ dulc. ʒj.

Extr. troch. alb. gr. ij.

c. f. q. Ess. lignor.

F. Pilul. D. S.

Pillen.

*Pilul. Anti-hypochondriac.*

℞ MP. Tart. Querc. ʒj.

Vitrioli ♂ ad albed.

lenit. calcin. gr. v.

† s

scam-



scammon. pp. gr. j.  
 c. f. q. Ess. cent. min.  
 F. Pilul. S.  
 Eröffnende Stieber-Pillen.

scammon. pp. gr. j.  
 c. f. q. Ess. gumm. ammon.  
 F. Pilul. capiantur.  
 bibendo desuper largum haustum ca-  
 lidum.

### Pilula Hydropica.

℞ Extr. Elater. rit. parat. gr. xv. ꝯ. vii. gr. ij. ad iij.  
 vel hujus loco  
 ꝯ. dulc. cum. ꝯio Vir. ad imit. Hartmann. gr. x.  
 extract. troch. alband. gr. j.  
 c. f. q. Ess. absinth. F. Pilul. D. S. Pillen.

Interdum soli pulveres, vel assumtu ingratiore, vel periculosiores, debito corpore excepti, in Pilulas compingi possunt: v. g.

### Pilul. contra gonorrhœam inveterat. malignam. Scabiem ferinam, guttam rosac. contumac. &c.

℞ Thurbith. minerale Croll. gr. v. ad vi.  
 c. f. q. theriac. F. Pilul. D. S.  
 Sonderliche Pillen: sed vix, nisi pro robustioribus.

### Pilula in desperatâ alvi obstructione.

℞ ① fulmin. c. spiritu ② \* pp. gr. vi. ad ʒß.  
 c. f. q. extr. helleb. nigr. F. Pilul. D. S.  
 Eröffnende Pillen.

§. 2. Atque tales sunt pilulæ, quas pro scopo sensilius commovendi corpus, & repetitis evacuandi vicibus, subinde sub morborum cursu, præscribere cogitur Medicus. Cogitur dico cum speciosus purgationis titulus, ingentem tegat imposturam, cum quævis, præsertim fortior purgatio, tantum noceat, quantum proffit. Cum vero in plurimis morbis chronicis, generali Cachexiæ & affect. hypochondr. & scorbuti titulo comprehensis, copiosior talis evacuatio ferè nociva manifestò esse soleat, cum talia subjecta, à leniori etiam evacuante facili exolvantur, ut loquuntur Practici: ob id ut saltem primæ viæ, quasi per epicrasin, à mucò vel pituita plus minus viscidâ, ac acida liberentur, & ita producta morbosa, si non æquè semper radix morbi (h. est à

postea

posteriori, G  
 vias non tran  
 bentibus, præ  
 præscribunt  
 vesperti, unâ  
 audiunt, aff  
 mas vias (sal  
 in exili licet  
 intersiat, hi  
 magis quâ  
 usuales, pa  
 Hoffman. C  
 Pharmacia  
 it. majoris ap  
 Pharmacia. c.  
 ammon. it.  
 constructis  
 Verum hæc  
 content, f  
 dico privati  
 pertinent.  
 ℞ A

Quod si v.  
 pilulæ usua  
 quadrâ, in  
 hiscè ferè n  
 ℞ Aloës, si  
 olar. ʒi. c  
 xiii. num  
 Vel sine al  
 xeos Sylv  
 ℞ Galba  
 troc  
 sca  
 f. c. q. Ol  
 Pil  
 pro 3. dof



posteriori, si non à priori) removeantur, lenioribus, siue quorumvis primas vias non transcendit, ex evacuantibus, nunc solis, nunc appropriatis vel absorbentibus, præsertim *Gyalibus*, vel incidentibus præsertim *gummatibus*, sociatis, præscribuntur, pilulæ vel quavis septimanâ vel quovis interlunio semel, atque vesperi, unâ alteravè horâ ante cœnam, unde & Pilulæ ante cibum quibusdam audiunt, assumendæ, ut ita sub chyli vehiculo innoxie distribui, & circa primas vias saltem suo officio fungi queant. Cum verò aloës parte sui gummosâ in exili licet dosi, leniendi tamen huic scopo, dicto modo usurpata, optimè inserviat, hinc crebrius ex hac solâ, ita tamen præparata, ut pars ejus gummosa magis quasi extravertatur, resinosa v. infringatur, vel separetur, tales pilulæ usuales, parari solent: quales sunt v. g. *Angelic*, *Francofurt*, *Glassianæ*, vid. *Hoffman. Clav. Schröder. l. 2. c. 73. p. 105. Gl. 4. f. 4 p. 635. it. Ludoviciana: Pharmacia: p. 179. it. de Tartari. p. 79. Tilemanniana. Mater. Med. p. 214. it. majoris apparatus istæ de aloë violata, de aloë rosata, de quibus Schröderus, Pharmac. c. 4. cl. 3. p. 253. ut nihil dicam de aliis huc suo modo revocandis, ut de ammon. it. Tartar. Querc. aloë phangin c. scammon. de tribus Ruffi, & ex his constructis Pilul. Balsamicis Cnôffeli, Misc. A. N. C. anno 6. & 7. app. p. 19. Verum hæ omnes, siue ex aloë solâ, siue ex aliis magistrali compositione natis, constant, ferè ceu officinales vel pluribus in locis introductæ sunt, vel à Medicoprivatis dispensantur, adeoque ad magistraliter præscribendas minus pertinent. v. g.*

℞ *MP. de aloë rosat. gr. vi.*

*F. Pilul. minim. D. S. Eröffnende Pillen.*

Quod si v. paulo efficaciores, tam pro alterandi, quam pro abstergendi scopo pilulæ usuales ordinandæ, quales ferè omni menstruo spatio sub ultimâ Cæquadrà, in hodiernâ luxuriosâ diætâ, dicto modo ante Cœnam capiendæ: hiscè ferè modis præscribi solent.

℞ *Aloës succotrin. lucid. ℥ss. gum. ammon. c. † scyll. emollit. ℥ij. Tart. Vitriolat. ℥ss. c. q. Ess. & F. Pilul. minores, aut saltem mediocres, quarum no. ix. xi. ad xiii. numero scil. ex vulgi superstitione, impari, capiantur.*

Vel sine aloë, ex solis alterantibus cum stimulo sensiliore ad imitationem Præxeos Sylvianæ præscribuntur:

℞ *Galban. c. † depur. ℥ss.*

*troch. alband. gr. iv.*

*scammon. pp. gr. iii.*

*f. c. q. Ol. Destill. carvi F.*

*Pilul. unc. xxxv.*

*pro 3. dos. vespertinis.*

℞ *gumm. ammon. c. † dep. ℥j.*

*Vitrioli & ad albed. calcin. gr. v.*

*troch. alb. gr. ss.*

*scammon. pp. gr. i.*

*c. f. q. Ol. Destill. fœnicul.*

*F. Pilul. minor. pro una dosi: quovis mense capiendæ.*

*vel ad imitationem Cnôffelianarum supra allegatarum*

† s 2

℞ *MP.*



Rx. *MP. de 3b. Ruffi. Extr. helleb. nigr. ana* ℞.  
*Vitrioli & ad albed. calcin. gr. v. scammon. pp. gr. j.*  
*c. s. q. Ess. gum. ammon. F. Pilul.*

*Atque tales hypochondriacis nostratibus ferè præcua existunt: quibus tamen & pulvis supra præscriptus multum conferre solet, siccioribus nempe istis, magisque exhaustis.*

§. 3. Pro alterandi denique scopo, pilulæ præscribi ferè solent ex extractis, it. ex pulveribus solis, syrupo vel alio corpore in consistentiam debitam redactis, vel ex utrisque simul, pro varia intentione

*Pilulæ febriles in chronicis  
 pro infringendo rigore & in-  
 tendendo æstu.*

Rx. *Extr. gentian. imperat.*  
*cent. min. absinth.*  
*ana gr. v.*  
*c. s. q. Ol. Destill. caryophill.*  
*F. Pilul. capiendæ*  
*Ante Paroxysmum.*

*Commodè etiam hisce febrilibus Extr. troch. alband. gr. ij. ad iij. tam pro alterandi, quam laxandi scopo addi possunt: ut ut sub debita diaphoresi levior laxatio accidere soleat.*

*In Phthisi confirmatâ pro  
 tussi, sudore & c. nocturnis  
 inhibendis.*

Rx. *antihect. Poter. ℞j.*  
*sacch. Hni ℞ss.*  
*extr. Croci gr. v.*  
*laud. opiat. ferm. gr. ij. ad iii.*  
*c. s. q. bals. copayv. F. Pilul. pro 2. dosi-  
 bus: bihorio ante cœnum sumendis.*

§. 4. Internus hic fuit Pilularum usus; modernj enim quidam easdem etiam usu externo, loco ferè trochiscorum Veteribus usitatorum, adhibere amant,

*Pilulæ sudorif. anodyna.*

Rx. *Extr. card. bend. ℞j.*  
*lignor. gr. v.*  
*theriacal. gr. ij.*  
*laud. opiat. gr. ij.*  
*c. Ess. lignor. F.*  
*Pilul. D. S.*  
*Schweiß. Pillen.*

*In Tussiferina nocturna ex  
 lymphâ acriori.*

Rx. *Extr. Sulp. pulv. gr. xvii.*  
*myrrha gr. iv.*  
*Extr. croci gr. ij.*  
*laud. op. gr. j.*  
*c. s. q. papav. rhcad. syrup.*  
*F. Pilul. vesperti capiendæ.*  
*conf. Pilul. de styrac. it. ad Tussin.*  
*Schröder. Pharmac. l. 2. c. 73. p. 252. vel*  
*de styrace Sylvii: l. 1. prax. c. 20. §. 36.*

amant, sed ra-  
 talgia, ex extr-  
 tur pilula, de  
 dolentil, cav-  
 feræ Myns  
 cian. c. pauc  
 solutæ, pro

Tertia C  
 fluidis.  
 variis conc  
 inservientes  
 appellantur  
 patet earum  
 nisi interdu  
 deat: Ut  
 semper del  
 capiendo:  
 procuranda  
 præsertim i  
 dendum, n  
 dientia mu

Δ simpl. 1  
 ∇ stupos. 3  
 succi.  
 Elix.  
 Vol. in  
 Uri  
 acia  
 syrup. 3j.  
 Extrac. 3  
 pulv. ℞j.



amant, sed rarius hoc, nec nisi specialibus quibusdam in casibus: v.g. in odontalgia, ex extr. ligni quajac. & laud. opiat c. Ol. Destill. organ. Cretici formantur pilulæ, denti dolenti l. cavæ applicandæ: quo etiam pertinent Pilulæ, denti dolenti l. cavæ applicandæ: quo etiam pertinent Pilul. de Cal. viv. it. odori-feræ *Mysf. Armament.* f. 7. p. 145. Sic apophlegmatizantes ex Extract. nicotian. c. paucio & dulci, e. syr. nicotianæ it. ex & dulc. c. f. q. gumm. tragac. Vros. solutæ, pro juvante salivatione sub ptyelismo & eo, &c.

## CLASSIS III.

*Misturas Varias depromit.*

## §. I.

**T**ertia Classis Misturas varias sub se complectitur, ex liquidis primariis & fluidis, secundariis etiam minus fluidis & aridis quoque, omnibus multis variis concinnatas, & artificiosè compositas, usui tam interno, quam externo inservientes. Internè quæ usurpantur, ordinario ab assumendi modo *portiones* appellantur, externæ v. potissimum Epithemata audiunt. Internè latissimè patet earum usus, cum quo vis fere in morbo adhiberi pro quovis scopo possint, nisi interdum atonia Ventriculi ac intestinorum moderatum earum usum suadeat: Usurpantur vel determinatis vicibus, *auss 2. oder 3. mal* / interjectis semper debitis intervallis, vel indeterminate, pro lubitu, cochlearia aliquot capiendū: illud ubi subitanea magis alteratio per sensiliorem operationem procuranda, viribus utcumque constantibus, hoc v. ubi successiva mutatio, præsertim in debilioribus, aut in casibus, in quibus cautius nonnihil procedendum, magis locum invenit. Duo in Mistura a. distinguenda 1. ipsa ingredientia multiplicia 2. constituens fluidum qualecunque fuerit: proportio

horum observatur p. p. talis, ratione sc. doseos generalis, quæ tamen per specialem cujusvis ingredientis dosin, ratione facultatis specificæ, huiusque sub præparatione magis vel minus concentratæ, determinanda ulterius venit. Compositio portionis ordinariæ *℥iv.* ad v. vel, *℥vi.* ad summum vix excedere solet: cui si arida & faciliè subsidentia simul permisceantur, sub usu probe agitanda imperatur.

△ *simpl. Destill.* ℥j

▽ *spuos.* ℥. ad ℥ij.

*succi.* ℥ij.

*Elix.* ℥j

± *Vol. inflam.* ℥j. ad ℥ij.

*Urinosi* ℥℥.

*acidi. gurr.* iv. ad v.

*syrup.* ℥j. ad ℥ij. l. iii.

*Extract.* ℥j. ad ℥℥.

*pulv.* ℥j.



Essen. ℥ss. ad ℥j.  
 Tinctura. ℥ss. ad ℥j.  
 ☉ vol. ℥ss. ad gr. xii.  
 Ol. Destill. gutt. ij. &c.

## Potio Antipleuritica.

℞ ∇ card. bened.  
 papav. rhæad. ana. ℥ss.  
 V. benè camphor. ℥ss.  
 mandib. luc. pisc.  
 dent. apri pp. ana. ℥ss.  
 ☉ vol. cuius vis: v. g.  
 mandib. Luc. pisc. gr. xv.  
 Laud. opiat. gr. issadii.  
 syr. papav. rhæad. ℥vi. ad ℥j.  
 M. f. l. a. Potio. D. S.

Dertheilend Träncklein auff erliche mal  
 capiatur pro lubitu cochleatim semper  
 benè agitando.

## Potio febrifuga intermitt.

℞. ∇. card. bened. ℥j. ad iss.  
 Cinamom. ℥i. ad ℥ss.  
 Extr. gentian. ℥ij.  
 ☉ \* simpl. ℥ss.  
 syr. card. bened. ℥ss. ad iij.  
 M. f. Potio. D. S.

## Träncklein auff einmal.

Biborio ante paroxysmum, moderatè  
 regendo corpus: urgente magis frigo-  
 re, ut in 4tanis, extracti dosi augeri,  
 it. c. extracti theriacali acui potest:  
 magis v. torrente aestu, ut in 3tanis  
 ordinariis, spiritus ☉ \* aucta dosi  
 permisceatur.

Prout aut. specialis dosi ingredientium subinde attendenda venit, etiam po-  
 tionis particularis formula subinde variat.

## Potio Antidysenterica.

℞ ∇ scordii.  
 plantag. ana ℥j.  
 Cinamom. ℥ss.  
 \* Vini. ℥ss.  
 Diascord. Frae. ℥ij.  
 Extr. tormentill. ℥ss.  
 Corall. rubr. pp. gr. xv.  
 syr. cydon. aromat. ℥ij.  
 M. f. l. a. Potio. D. S.

## Anhaltende Stärck. Mistur.

capiatur cochleatim crebrius, bene  
 agitando.

Mistura alterans, in in-  
cremento & statu, febrium  
continuarum, plus minus ma-  
lignarum.

℞ ∇ scordii ℥iij.  
 theriacal. l. simpl.  
 l. moder. camphor. ℥iij.  
 C. C. f. Δ, ℥ij.  
 bezoard. min. ℥j  
 ☉ vol. C. C. vel viperar.  
 gr. xv.  
 conf. alkerm. ℥ss.  
 M. f. potio capienda cochleatim.  
 D. S.

## Stärck. Träncklein.

Potio



## Potio Emetica.

℞ Jalap. ros.  
 syr. Emetic. sal.  
 ana ℥ss.  
 ▽ Cinamom. ℥j.  
 M. D. S.

Brex. Träncklein.

loco talium tamen vina infusionis praeparatorum Gialium, aque commoda videntur.

## Potio diuretica.

℞ ▽ alkekeng:  
 petroselin. ana. ℥ss.  
 Malvatic. juniper. ℥vj.  
 spiritus lumbric. Terrest. per  
 putr. ℥j. ad ℥ss.  
 Ol. Destill. therbinth. gutt. iij.  
 syr. heder. Terrest. ℥iij. ad vi.  
 M. S.

Eröffnender Tranc.

Pro temperandâ acrimonia bilis, h. est corrigendo acido volatili plus minus Oleoso in sanguine.

℞ ▽ portulac.  
 acetos.  
 fl. papav. rhaad. ana. ℥j.  
 Diascord. Frac. ℥ss.  
 spiritus D. dalc. l. D. dulc.  
 ℥ss. ad ℥j.

syr. portulac. ℥iij.  
 M. D. S. Alterativ  
 Träncklein auff erliche mal.

## Potio Cathartica.

℞ resin. jalap. gr. ix. ad ℥ss.  
 O Tartari. gr. v. ad vi.  
 syr. ros. solutiv. ℥ss.  
 vel. q. s. M. S.  
 Exier Sâfflein.  
 vel.

℞ resin. scammon. ℥ss.  
 sacch. cand. ℥j.  
 pulveris. exacte paulatim  
 affundendo succi citri ℥j.  
 M. F. Potio grata. S.

Purgier Sâfflein.

## Mistura Theriacal. sudo-

riferâ.

℞ ▽ fl. sambuc. ℥j.  
 + sambuc. ℥ij.  
 Theriac. ℥j.  
 ras. Unicorn. ver. gr. xv.  
 bezoard. min. ℥ss.  
 camphor. gr. iij.  
 M. f. potio pro dosi una.

Potio digestiva præmittenda purgationi in aff. hypochondr. & melanchol. in subjectis præsertim siccioris & squalidi magis habitus.

℞ Seri lactis ben. depur. ℥iv.  
 Ess. fumar. ℥j.  
 solut. Sc. s. pom. ℥j. ad ℥ss.  
 syr. fumar. simpl. ℥vj.

M. S.

Digestiv Tranc: pro 4. vicibus, dosi  
 unam manè, alteram vespèri per bi-  
 duum capiendo.

Mistura



*Mistura s. potio Analep-  
tica, sub E post sudorem in  
febris acutis.*

℞ ▽ borrag.  
bugloss.  
rub. ideei ana ℥j.  
Cinamom. ℥iii.  
succ. citri. rec. ℥vi.  
ad ℥i.  
Conf. alkerm. ℥i℥.

*M. S. Sterck. Franc.*

pertinet huc inprimis *mistura Sylvii*  
ex Xc. lap. Corall. pp. Ec. reverain  
Praxi polychresta; qua videantur  
in eius Prax. l. i. c. 9. §. 20. c. 13. §. 53.  
Ec. c. 7. §. 13. c. 30. §. 135. Ec. 182. Ec. passim  
alibi.

*Vel in formâ infusi.*

℞. H. masturt aquatic. m. iv.  
acetosell. c. flor. m. ii.  
contund. in mortario c. s. q. feri lactis,  
stent in loco tepid. vel in MB. per noct.  
Colat. manè.

℞. ℥ii. D. S.  
dos. ℥iij. l. iv. quolibet dosi prolu-  
bitu edulcorari potest.

§. 7. Pro usu externo, non minus varix quoque sunt *misturae* ex iis-  
dem quidem ingredientibus pariter compositæ, sed pro varietate partium &  
usus subinde variandæ, in quo post experientiam iudicium Medici omne fert  
punctum. Si externæ saltem corporis partium superficiæ, mediante linteami-  
ne vel simplici vel multiplicato, aut panno scarlatino, calidè, tepidè, frigidè,  
repetitis vicibus applicantur, in genere.

*Mistura Antiscorbutica.*

℞ Lactis caprill. vel  
seri lactis depur. ℥ij.  
adde.  
succ. cochlear.  
nasturt.  
fumar. express.  
Ec. depur. ad ℥ij.

*M. D. S.*

*Schorbutische Milch / auff eeliche  
mal. dos. ℥iij.*

ad v. edulcorari potest saccharo pro  
lubitu, & melioris penetrationis  
ergo, cuilibet dosi Ess. fumar. com-  
pos. c. cochlear. parat. gutt. 30.  
instillari.

*Vel in decocti formâ.*

℞ Lactis caprill. ℥i. ad i℥.  
fol. cochlear. m. j.  
nasturtii m. j.  
contusa & mista parum ebulliant in  
olla clausa, exprimantur & colentur  
D. S. in scorbutico admodum proficuum  
Colat. ℥iv. ad vi. bibat æger calidè  
manè, & bihorio ante canam: quod si  
iuncta sit febris potius serum lactis re-  
cipiatur.

*Epithe-*

vocatur:  
specialibus i  
lyria humid.  
dentifricii,

*Epith-*  
stum san-

℞ succi sen-

✠ Vi-

Qide

M. D.

En-

applic. v. g.

mo, it. in Eb

narium: ad

vel mamm

item region

vel fronti

tiplicatis.

*Epit*  
*Chol*

℞. S. V.

Theria

M. pro



## Epithemata.

vocantur : quæ subinde pro specialium quarundam partium varietate etiam specialibus insigniuntur nominibus : ut pro Fronte, *Frontale*, pro oculis, *Collyria humida*, pro naribus *Errhinaliquida*, pro dentibus & gingivis *Liquores dentifricii*, &c. &c.

*Epithema refrigerans æstum sanguinis, polychrestum.*

℞ succi semperviv. major. ℥i.

✚ Vini acerr. ℥j.

Ⓢi depur. ℥ij.

M. D. S.

Eusserlicher Umbschlag.

applic. v.g. scroto in æstu corporis minio, it. in Ebrietate, it. in hæmorrhagiarum : addita præsertim camphorâ : vel mammis, in hæmorrhagia uteri, item regioni pubis : vel plantis pedum, vel fronti &c. frigide cum linteis multiplicatis.

*Epithema pro ventriculo in Cholera.*

℞. S. V. camphor. ℥iii.

Theriac. ℥iſs. ad. iii.

M. pro Epithemate,

vel.

*Epithema contra dolorem capitis, in febrium æstu s. Frontale.*

℞ succi ☿ fluviatil. rec. ℥iii.

▽ fl. sambuc.

betonic.

fl. papav. chæad. ana. ℥i.

S. V. Camphor. ℥iii.

M. D. S.

Umbschlag zum Haupte.

applicentur cum linteis multiplicatis tepide fronti & temporibus : sed à nimio camphoræ usu in agrypnis abstinendum, ne somnus magis odoris penetrantia impediatur.

vel aliud contra.

*Cephalalgiam c. Agripina in febris contin.*

℞. ▽ fl. sambuc. ℥iii.

apoplect. usit. ℥vi.

Philon. Roman. ℥iſs.

M. D. S.

Eusserliche Mistur zum Haupte.

† t

In



*In Vomitu februm malignarum & Pestilential.*

℞ S. V. rectif. vel ∇ apoplect. ℥iii.  
Theriac. ʒiʒ.  
camphor. ʒʒ.

M. D. S.

Eufferlich Wasser zum Magen.  
calescant in Vasculo clauso & intincta  
lintea celeri manu applicentur: idque  
crebrius,

*Epithema in Cephalalgia  
ex causa frigida: &c. he-  
micrania. Verticis pertinaci  
dolore, &c.*

℞. ∇ serpill.

rosmarin.

salvia ana. ʒij.

theriacal. simpl. ʒj.

℞ C. C. l. ☉ \* c. Cal. viv. à. ʒʒ.

M.

S.

Stillend Wasser zum  
Haupte.

*Frontale contra Hæmorrhagiam narium  
nimiam.*

℞. ∇ papav. rhæad. vel  
spermat. ranar. ʒiv.

✥ rosac. ʒj.

Beli com. prob. exsic.

pulv. ʒiv.

Opii ✥ sol. ʒj.

M. pro Epithemate.

℞ spermat. ranar. c. ☉ & ☉ asserv.  
℞ʒ.

sacch. ʒni. ad ʒii.

Camphor. ʒj. ʒj. ad ʒʒ.

M. pro Epithemate. D. S.

Anhaltender Umbschlag.

collo, item fronti, nec non testibus in nimia narium hæmorrhagia applicabilia,  
it. mammis in hæmorrhagia uteri, ac regioni pubis: Hepatis pariter regioni  
talita frigide applicari iubent, sed præter alterationem sanguinis subitanæam,  
forsan & nimiam, visceris læsio, experientia hoc ferè confirmante, metuenda,  
netali occasione diarrhœa quibusdam superveniat, vel in aliis dispositio p. n.  
hepatis scirrhusa, aliæve chronica inducatur: haud ergo, quam casu ferè extre-  
mo huc recurrendum.

*Epithema contra tumorem  
testis inflammatorium c. in-  
signi dolore ac ardore,*

Non rarum est, ex perverso ʒii ☉  
externo usu, sub cosmetici titulo, phlo-  
gosin, tumorem, dolorem, cum summo  
cruciatu, interdum & periculo partibus

℞ ∇



℞ ∇ Cal. viv. rec. ℥i. ad ℥iſſ.  
 S. V. camphor. ℥ſſ. ad ℥j.  
 ceruſſ. ℥iſſ. l. ſacch. ℥ni.  
 M. F. Epithema D.  
 urgente dolore etiam Opii  
 † ſol. ℔j. addi poſſit.

externis induoj: optimum hic epithe-  
 ma, lac tepidum, crebrius, applica-  
 tum, poſt cuius uſum, vel etiam ſub  
 illius defectu mox in principio.

℞. ∇ Cal. viv. rec. ℥j.  
 V. ℥j.  
 ceruſſ. ℥iii. M. applicentur  
 calide

D. S.

ſinderender Umſchlag.

Occaſione ∇ & Cal. viv. non omittendum Epithema polychreſtum, ad ulcera  
 quævis, dyſepulota, ad ſcabiem ferinam, herpes excedentes, imminentem plus  
 minus gangrenam, &c.

℞. ∇ Cal. viv. ſ. decoct. rec. ℥j. ♀ dulc. ℥j. M.  
 vel magis compoſitum

℞. ∇ Cal. viv. recent. ℥iſſ. S. theriacal. camphor. ℥iii.  
 ſacch. ℥ni. ℥j. ♀ dulc. ℥ſſ. M. probè c. l. ſine ebullitione:  
 D. ſine l. c. Colatura laxiore. S.

Sic pariter ∇ Deſtillata ex pomis putridis, cui l. ♀ dulcis, l. ſacch. ℥ni pro cir-  
 cumſtant: ratione permixtum, in caſibus chirurgicis plurimis, ſpecialim ulceri-  
 bus telephiis, ambuſtis, &c. remedium multi uſus exiſtit.

§. 3. Quod ſi Epithemati immediatus c. parte affecta concedatur  
 contactus, ut in ſcabiæ, ulceribus &c. mixturæ, pro indicationum ratione  
 componi poterunt. Aſt ſi pro commodo partium internarum, & princi-  
 paliter viſcerum, hepatis, lienis, Ventriculi, cordis &c: adhibenda veniunt  
 obſi. cum alius penetrare ſequè inſinuare debeant, non niſi ex ſubtilioribus,  
 aut ſimilibus particulis, quæ vehementiori paulo motu operationes ſuas ex-  
 erant, conſtantibus ingredièntibus, non vero adſtringentibus, Aeris, fixiori-  
 bus &c. componenda eadem eſſe. 2. Cum applicata pro partium internarum  
 commodo, ferè aut ſanè ut plurimum calide, minus diu calorem aſcitiuum  
 conſervent, quin facilè intepeſcant, ne dicam refrigerentur, verendum omni-  
 nò ne cutis contactu humido tepido aut ſubfrigido offendatur, quod quili-  
 bet in ſe experiri poteſt, unde fibrarum ſtrictura, pororum contractura, in-  
 terdum per conſenſum totius quaſi horripilatio; adeoque non ſolum in-  
 ſenſilis tranſpirationis notabilis imminutio, quin & meſtataſeos, quam Na-  
 tura in acutis ſubinde intendit, ex univerſo ad membra particularia cohibiti-  
 o.

† t 2

Unde



Unde in malignis, cum excretionē cutanea conjunctis, Epithemata præcordiis applicanda, meritò hodie suspecta, imò rejecta sunt. Conf. quæ §. 2. de Epithemate Hepati applicando, in alio sensu locuti sumus. Missis itaque epithematis, alias misturas externas consideremus. v. g.

### Collyrium pro Oculo polychrestum.

℞. ▽ solani  
Cyani.  
calcatrippe ana ℥i.  
Vitrioli alb. ℞. ad gr. XII.  
solut. filtretur per chartam.  
adde  
Tutia pp. ℞. ad gr. XII.  
M. D. S.

Eussertliche Augen Mistur.  
applicatur tepidè cū linteolis, vel resu-  
pinato corpore canthis oculi instillatur.

### Mistura Pharmica.

℞. ▽ majoran. ℥ii.  
Vitrioli alb. gr. xv. ad ℥i.  
solut. filtretur. D. S.  
Abziehend Wasserlein.  
vel guttatim in nāres, in sufflan-  
do, ut vocant, ex volā manus re-  
cipitur: vel linteum eo leniter ma-  
defactum, contortum, naribus im-  
mittitur.

### Mistura contra Prunellam febrim acutarum.

℞. ▽ semperviv. maj. ℞ss.  
succo S. fluviatil. rec. ℥iv.

### Collyrium contra Inflam- mat. Oculorum.

℞. ▽ plantag.  
fl. Cyani. ana ℥i.  
album. ovor. no. i.  
O. gr. v. ad VIII. l. x.  
(modo non spissior paulo ex coagulo  
nascatur consistentia) conquassen-  
tur & agitentur invicem, & hinc  
linreis duplic. applicentur oculis.  
D. S.

### Mistura contra Ozæ- nam.

℞. ▽ majoran.  
plantag. ana ℥ss.  
mell. rosat. ℥vi.  
V. rectific. ℥iii.  
M. & applicentur, vel modo dictis  
modis vel etiam cum parva syringâ:  
in deterioris conditionis malo, ali-  
quantulum S. ti, gr. vi. ad ix. ℞.  
addi potest.

### Alia magis composita.

℞. ▽ S. fluviat. contus. aliquamdiu,  
Destill. at ℥iii.

⊙ \*

⊙ \* d  
M. D.  
Ba

Colluitur cr  
interdum g  
tepidiuscul  
detineatur.

Obirejecta  
butyro, re  
si crusta li  
biss. butyro  
mirumque i  
potest.

hac ipsa den  
\* in ▽ solut.  
tollit: sicut  
plurimis m

℞. ▽ fed  
pru  
spiritus  
mell. r  
spiritus  
pore M  
Mistur



☉ \* depur. ℥i℥.

M. D. S.

Wasser gum Munde.

Colluitur crebrius eodem os, quin & interdum gargarisatur fauces, aut tepidiuscule in ore aliquamdiu saltem detineatur.

spermat. ranar. ℥ii.

semperviv. maj. ℥i.

Phlegm. Vitrioli rorid. ℥i℥. ad ℥ij.

℥r. violar. ℥i.

ros. rubr. ℥i℥.

☉ c. alcali depur. ℥i℥. ad ℥ij.

M. D.

Ubi rejecta denudò mistura tales fuerint, lingua palatumque blande illinantur butyro, recenti non salito, spermate ranar. aut ejus ∇ crebrius lota: quod si crusta lividonigricans illam simul obduxerit, aliquantulum sacchari albi. butyro addi potest: lardum pariter non salitum, quin & salitum, sed utrumque in sperniola ista, probe diuque maceratum, butyri loco recipi potest.

Mistura pro dentibus & gingivis, à variis affectibus praeservativa.

℞. ∇ plantag.

sedi min. ana. ℥ii.

☉ \* ci. ☉ Tartar. ana ℥i℥. ad ℥i.

M. filtra. D. S.

Zahn Wasserlein.

hàc ipsa dentes ab omni pastu abluantur & gingivae blandè fricentur: Sanè ☉ \* in ∇ solut. pro dentium ab omni pastu ablutione, foetorem eorum imprimis tollit: sicuti matutina mundificatio c. Urin. human. dentes & gingivas a quam plurimis malis praeservat.

Mistura contra Stomacacens, scorbutum oris.

℞. ∇ sedi minor.

prunell. ana. ℥i.

spiritus Cochl. ℥ii.

mell. rosat. ℥vi.

spiritus ☉ q. s. pro grato acidulo sa-

pore M. D. S.

Mistur gum Scharbock des Mundes.

℞. ∇ prunell.

salvia. ana. ℥i.

mell. rosat. ℥vi.

O usti ℥i℥.

spiritus Cochlear. ℥i.

M. D. S.



*His ipsis humectetur linteam, & fricentur eodem gingivæ ac aliæ oris partes, ex scorbuto male habentes.*

§. 4. Superest specialis, eaque duplex Misturarum differentia, ulterius consideranda, quorum prior diffusior, adeoque majori in quantitate præscribi solita pro pluribus dosibus, unde & potando crebrius assumi solet, est

### *Julapium.*

Arabum inventum. Potissimum v. in febribus, pro compescendâ clamosâ siti, temperando præcordiorum æstu ac ardore, & mitiganda eorundem anxiam molestiâ, ipsis ægris non satis explicabili, potiones tales ordinari solent, unde ob crebriorem usum, præ aliis, *coloris*, in primis rubelli, *saporis*, suaviter aciduli & leniter in recessu quasi pungentis & *odoris* jucundioris, gratia, in iis attendi debet. De cætero quo simpliciora, eo meliora talia sunt julapia: adeo ut in eorum locum, vel  $\nabla$  simpl. aut Cerevisia secundaria, cum zia vel quarta Vini parte diluta, cum infusione cortic: aut tale olorum citri, quibus & sacchari parum pro lubitu addi potest, subinde substitui queant. Cum enim quavis in febre humorum quorumvis p. n. commotio perturbatusque in iisdem, in specie sanguine observetur motus intestinalis, vitari hi ulterius à Julapiis magis compositis, & ita faciliè fermentantibus, sicque vim digestivam debilem eludentibus, syrupis præsertim aut saccharo copiosius imprægnatis, poterunt. Undè si corpus julebi decoctum vel infusum quoddam constituat, cætera addenda & pauciora & diluta magis esse debent. Quo simplicior ex opposito fuerit, minus ventriculum gravat, nec præcordia inflat, facile transit, primas vias diluit & abstergit, acriora contenta temperat, & diureseos ac diaphoreseos negotium faciliat. Præscribuntur eodem modo, ac aliæ potiones, saltem quod tenuioris debeant esse consistentiæ.

### *Julebus in nimio siti & æstu Tertianæ cujusvis.*

℞.  $\nabla$  fontan. ℥ii.

Cinamom. ʒß.

succi citri rec. ʒß.

Spiritus  $\odot$  parum. q. s.

pro grato sapore. D. S.

Rühlund stärck. Julep.

vel

℞.  $\nabla$  endiu.

acetos.

cichor. ana. ʒvj.

succi cydon. ʒiß. ad ʒiii.

Tinctura fl. bellid ʒiii.

Syr. violar. q. s.

pro sapore.

M. D. S.

Ju-

Julep  
℞. Decoct.  
Tinctu  
violar  
bellid.  
syr. ro  
in Vi  
sapore M.  
Rühl.

Interdum  
ingrata v.



*Fulepus in Causo.*

℞. Decoct. rad. scorzon. ℥iſſ.

Tinctura ros.

violar.

bellid. ana ℥i.

syr. ros. rubr. ℥iii.

Vitrioli q. s. pro grato

sapore M. F. Julapium. D. S.

Rühl. Zulep gegen die Nixe.

*Fulepus in Febr. Mali-*

gna.

℞. decoct. C. C. ℥iſſ.

▽ Cinamom. ℥vi.

Gelatin. C. C. rec. ℥iſſ.

succ. citri.

rub. ideci.

ribium. ana. ℥i.

syr. papav. alb. vel rhead.

vel berberum. q. s.

pro gratiâ.

M. D. S.

Stärck. Zulep.

*Fulebus in Febre scorbutica, quæ alvum simul  
apertam servat.*

℞. feri lact. depurat. ℥i.

decoct. Tamarind. ℥iſſ.

succ. citri rec. ℥vi. l. ℥i.

syr. de toto citro. q. s. M. F. julebus.

Interdum etiam per modum infusi magistralis præscribuntur Julapia non  
ingrata v. g.

℞. fl. papav. rhead. rosâr. ana. mſſ.

Infund. in s. q. vel. ℥iſſ. ▽ comm. aut

▽ fl. papav. rhead. aut feri lact. depur.

acidulate leniter c. spiritu Sulph. per campan.

stent. in loco calido, in MB. ad extract. Tinctura.

Colat. ℞. adde

syr. injubin. ℥ii.

Violar. ℥i.

M. pro Zulebo D.

Item



De Prescriptione Formularum in Genere.

Item secundum alios ex Conservis.

R. Conf. fl. tunic. rosar. violar. ana. ℥ss. ad ℥i.

succi ribium. ℥vi. ad ℥i.

affund. s. q. v. commun. l. Destillat. cujus vis: dissolvantur in mortario c. pistillo, clausoque vase leniter ebulliant. Colat. Hiss. adde,

Tinctura fl. bellid. q. s. pro grato sapore

F. Julapium. D. S.

Stärck und kühl Julep.

§. 5. Caterum duo monenda hic restant. 1. potius v. fontana vel decocto quoddam C.C. eadem parato, pro corpore juleporum, quam v. tis utendum esse, cum hæ pluribus ferè nauseosæ sint, quin & crebriori usu, manifestam Ventriculi atoniam inducant. 2. Acidula Julebis commiscenda, vel esse succos vegetabilium, vel spiritus mineralium. Spiritus hi texturæ sunt firmioris, minus & tardius ob id in nobis alterabiles, potentius tamen resolvunt, & abstergunt, magis diuretici sunt. Ast nimis à constitutivis nostris aliena sunt, vix citra ventriculi laborem & primarum viarum alterationes, nisi cautè administrentur, ferri possunt, adeò temperata in praxi semper sunt optima. Succiv. isti Vegetabilium, Sulph. medicati, ac ita ab alteratione quavis præservati, & qui sponte sua, quicquid est contentorum fermentescibilium seposuerunt, adeò ut saltem acor natus, Phlegmate sufficienti dilutis supersit, longè suavius & blandius, absque mali cujusvis suspitione ferri à nobis possunt, unde horum potius, quam illorum, sub frequentiori Julapiorum repetitione rationem habendam existimo.

§. 6. Altera specialis misturæ differentia est contractior, & quæ pro aliquot saltem dosibus, ad ℥iv, vi, vel ad summum ℥viii. præscribi solet: & à colore albo opaco, sapore subdulci aut saltem insipido dulci, substantià ingredientium pingui & Oleosa, & usu temperandi, potissimum acrimoniam ôlam, Lacti similis cum sit,

Emulsio.

dicitur. Scil. semina & nuclei, pulpa candida ac Oleosa turgida, mediante tritu subiguntur c. v. appropriatis, illorum ℥i. pro harum ℥i: edulcoratur mistura pauco saccharo & ita administratur, usu & interno & externo: illo ad Potiones, hoc ad Epithemata refertur v.g.

Emulsio



*Emulsio Analeptica & Hypnotica.*

℞. amygd. d. ambros. ℥ij.

sem. papav. alb. ℥ss.

melon. ℥i.

c. ∇ fl. sambuc. fl. acac. & nymph.  
ana, ℥ii. F. Emulsio edulcoretur  
parum rotulis manus Christ. perlat.

D. S.

Stärkende Ruhe-Milch.

*Emulsio nephritico-Cathar-  
etica: it. in suppress. Urin.*

℞. sem. violar. ℥ss.

lithosperm. contus. ℥ii.

c. f. q. ∇ fragor. F.

Emuls. ad. ℥iv.

edulcoretur paucis saccharo

D. S.

Eröffnende und Harn-treibende  
Milch.*Emulsio Epithematis modo, ad agrypniam &  
Cephalalgiam applicanda.*

℞. sem. papav. alb. ℥iii. ad ℥vi.

c. f. q. ∇ Hypnotic. Dorncrell. F. Emulsio.

D. S.

Eusserlicher Umschlag.

praestantior erit, si solutionis opii c. S. V. ℥i. ad ℥ss. addatur, & ita tepide ap-  
plicetur: sicut omisso opio, addito v. S. V. camphorato, ℥ss. l. camphora ipsa ad  
gr. ix. ad maniam magis accommodata foret.

§. 7. Manifestum ex dictis est, impropriissime emulsionis appellatio-  
nem illis tribui misturis, quas soli pulveres candidi ingrediuntur, cum præter  
succum nil emulsionis adsit: quo pertinent superstitionis basi superstructæ dic  
Perlmilche: Talis emulsio impropria est.

*In statu variolar: & Morbillorum.*

℞. ∇ napi. aquileg card. benedict. ana. ℥i.

Cinamom. spirituos. ℥ss.

C. C. f. Δ ℥ss. bezoard. min. ℥j.

Unicorn. fossil. ℥ss. sacchari albiss. q. s.

M. D. S. Stärk. Milch.



Cum vero suo usu non careant hujusmodi misturæ, hinc hodiernâ consuetudine, quæ legis vicē fungitur, uterque modus commodè jungitur, adeoque emulsioni propriè dictæ jam paratæ, isti pulveres pro efficaciori medicinâ adduntur: sic si in dato exemplo ex sem. aquileg. ℥iii. napi, card. bened. papav. alb. ana ℥i. c. istis ∇ in duplo assumtis fiat emulsio, & ist. pulv. proportionē ℞. ad ℥i, cuius ℥ emulsionis addantur, foret formula ad variolas hodiè usitatissima.

*Emulso ad Gonorrhœam benignam.*

℞. sem. agni casti. ℥ss.  
cannab. ℥ii.  
℞. s. q. ∇. nymphaea. F.  
Emuls. adde  
Oss. sepia pp.  
succin. pp. alb. ana ℥ss.  
ad ℥ii.  
edulcorentur parum c. sacch.  
D. S.  
Anhaltende Alterativ-  
Misch.

*Emulsio temperans lympham Osam acrem, pectus affligentem, c. natâ inde febre symptomatica.*

℞. amygd. dulc. ambrosin. ℥iii.  
sem. melon. ℥ss.  
℞. s. q. ∇ scabios. F.  
Emuls. adde  
mandibul. luc. pisc. ℥ss.  
antibect. Poter. rit. par. ℥i.  
Unicorn. fossil. ℞.  
edulcorentur parum. M.  
D. S.

pertinet huc liquor alexipharmacus Zuvelseri in Pharmacop. Reg. p. 209. sanè in variolis egregius: ad cuius imitationem & alii similes præscribi possunt, ut ut saporis ratione ad strictè dictas emulsiones minus pertineat.

§. 8. Observandum autem sub Emulsionum usu, i. quod facillimè alterentur, corruptionem ac acescentiam incurrant; unde minori quantitate præscribendæ, & loco minus calido asservendæ, 2. quod ventriculi tonum multum resolvant, & facili rancescencia multum ejus functionibus noceant.

§. 9. Adjungendæ his quædam misturæ emulsionibus cognatæ, ex resinosis imprimis constantes, & ferè laxantes: Præter emulsionem seminis *Carthami*, additione vel rad. mechoacannæ, vel resin. scammon. aut jalap. acueudam, passim notam, resinæ c. ∇. artificiosè sociatæ, & ita resolutæ emulsioni conformes potiones potenter laxativas reddunt.

℞. sem.



℞. *sem. melon. excortic.* ℥℥. ad 3j.  
*resin. jalap. gr. vii. ad ʒ℥.*  
*scammon. pp. gr. i.*  
*misce in mortario marmoreo, sensim.*  
*affundendo ʒulep. Rosat. ʒi.*  
*F. Emulsio. D. S.*  
*Purgiet. Mith.*

℞. *Resin. jalap. ʒ℥.*  
*dissolv. in s. q. Vitell.*  
*ovor: ʒc. v. fenicul.*  
*F. Emulsio: adde*  
*v Cinnamom. ʒii.*  
*edulcorentur pauco saccharo.*  
*D. S.*  
*Laxet. Mith.*

Potentius operatur, quam ejusdem resinæ eadem dosis alia sub forma, dissolvente illius texturam Vitellio ovi, cujus medio minutis sub particulis, undique fluidis corporis permiscetur & associatur.

### Emulsio Cosmetica.

℞. *v. rosar. vel spermat. ranar. ʒi℥. aut q. V.*  
*instilla Essent. benzoës q. v. F. Mistura lactea:*  
*quam profaciei ac manuum leni ablutione cum spontaneâ exsiccatione adhibere*  
*poteris: quin & præterea de Cosmetico ex marcasita aliquid addere.*

## CLASSIS IV.

### Infusa & decocta comprehendit.

#### §. I.

Quarta specialis formularum differentia Infusa & Decocta, quæ Græci, *Apozemata*, complectitur, quorum latè admodum patens est usus, internus pariter ac externus. Nempe ut purum impuro, respectu nostri, ubique junctum, tam in alimentis, quam medicamentis: ita, quod hodiernæ *Artis Spagyricæ* primarius ferè finis est, purum ab impuro in medicamento separare, nucleum à corticibus Q. E. ab involucris elementalibus sive materialibus, idque Tincturarum, Essentiarum, Extractorumque ferè sub titulo, ita jam Veteres idem, rudilicet Minerva per infusiones & decoctiones tentarunt, mediantibus quibus vim rerum medicamentosam & in apto liquore, sive menstruo extrahente & solvente, loco crudorum simplicium acquirerent. Adeoque in Infusis ac Decoctis, sive seorsim, sive conjunctim, ita ut altera alteram



excipiat, instituuntur, (differunt enim saltem in eo, quod pro infusione, sufficiat specierum incisione, rasione, contusione, pulverisatione præparatarum, *maceratio* sive *digestio* in loco tepido, vel speciatim MB. cui in decoctione ulterius supervenit super ignem actualem concitator omnium *agitatio* & *ebullitio*, & penetrantior solutio) ad duo semper attendendum, 1. ad *Objecta* infundenda, 2. ad *Subiecta* s. *menstrua*, cum quibus fit infusio ac decoctio. Mutuus omnino requiritur hic respectus, tam *quantitatis*, quàm *qualitatis*; quantitatis quidem, ut sibi mutuo sufficiant, qualitatis v. ut invicem appropriata sint: *In his duobus enim primarium decocta & infusa medicata præscribendi, consistit artificium conf. Zwelferus pharm. R. p. 31. & 84. it. animadv. in Pharmac. August. p. 146.*

§. 2. *Objecta* ergo quod attinet, ex omnibus hæc desumuntur regnis 1. *ex animali*: partes solidæ duræ & sicciores quævis v.g. C.C. Ebor. priapus C. Ceti, splen bovis, Viperæ, stercus equinum: ex quibus omnibus (exceptis excrementis) elicitur gelatina, quæ præter generalem nutriendi ac temperandi, adeoque confortandi & blandè refrigerandi usum, de vi specificâ sui concreti omnino participare videtur, cum magnam illius substantiæ partem contineat, quæ sub rigore *de. in*  $\odot$  vol. & Ol. larva se sistunt. 2. *Ex Vegetabili*, quævis plantarum partes & fructus, ut plurimum siccata. Resinæ saltim ac gummata minus his præparationibus, præsertim sub magistrali præscriptione, inserviunt. Elicitur sic ex Vegetabilibus, gummeo-in recessu, resinosa substantia, in cujus complexibus potissima vis medicamentosa, quasi concentrata est, ut ex decocto lignorum vel absynthii inspissato, manifestum 3. *Ex Regno Minerali* varia desumi solent.  $\odot$  candefacti in Vino vel  $\nabla$  extinctionem magnificat *Burrhus*.  $\odot$  rem Vino infundimus & decoquimus salubriter, eodem candefacto Lac dysentericis appropriatum reddimus,  $\Phi$  is infusio pro oculorum vitiis laudatissima. Huius infusio aut decoctio, usui Chirurgico multum inservit, & in qua crebrius  $\Phi$  fusum extinctum fuit, alvum laxare solet, aqua  $\Phi$  non solum præparatum, sub Vitri, reguli, croci &c: formâ, infusioni apprimè inservit, sed vel crudum idem hodie decoctis pro diæta sudorifera additur: quin & ejusdem crudi subtiliss. triti  $\mathfrak{z}\beta$ . macerata per noctem in  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . l. iv. Vini aut aquæ pro dosi una, supra & infra purgare, asserit *Poterius*. De Mercurio res nota, quoad  $\nabla$  m sic dictam *Hermeticam*, it. decocta lignorum antiveneræ. Vitrioli, O.  $\odot$  \*, Calcis vivæ, pro usu externo decoctiones & infusiones, in decocto nigro *Myns*. &c. it Sulphuris in  $\nabla$  Calc. viux vel lixivis, passim pariter notæ sunt.

§. 3. Circa hæc v. ingredientia, præter superius §. 1. monita, in specie attendendum 1. ad texturam eorum specificam: quæ volatilioris sunt naturæ, infusioni saltem: aut cum juncta Destillatione decoctionibus inserviunt: ut  
antiscor-

antiscorbu  
decoction  
rum mace  
donec cat  
ora &c: n  
spissius, &  
quia dige  
Contra a  
3. Quæ d  
copiosius  
pressione  
neralem d  
terdum 3p  
stantia pro

§. 4  
ingredien  
simplex,  
compositu  
decocta ja  
Volatile, n  
Vinum S  
bus plus in  
nistrabit r  
simplici m  
penetranti  
dium: H  
sultum ob  
ctione, q  
Tart. præ  
nibus inse  
denud co  
paulò larg  
§.  
hactenus  
poteft.

lignor.  
cortic,  
rad.  
herb.



antiscorbutica acria, aromatica, sassafras lignum &c: nullam vel mediocrem decoctionem ferunt. Unde sub Volatiliorum cum fixioribus mistura, horum maceratio & hinc decoctio vel ad medias vel ad finem ferè præcipitur, donec cætera illa simul adjiciantur. 2. quæ sunt solubilia, molliora, porosiora &c: minus diu infundenda, parcius coquenda, cum alias ingratum, quia spissius, & facile alterabile, quia densius imprægnatum & ventriculo hostile, quia digestionem ejus proprio motu magis reluctans, reddunt medicamentum. Contra atque in durioribus, & macerandis & diutius coquendis, accidit. 3. Quæ denique vi medicamentosa sunt ditiora parcius, quæ v. pauperiora copiosius &c. recipiuntur, & paratum sic remedium, nunc cum, nunc sine expressione colandum præcipitur: Et sic specialis dosis, ut ubique, ita & hic generalem determinat: observandum v. quoad specialem dosin, fere duplum, interdum 3plum hic pro decoctione aut infusione recipi, respectu ejus, si in substantia propinaretur.

§. 4. *Subjectum sive Menstruum* Infusionum & decoctionum, pro ingredientium Natura & Medici intentione variat. Communissimum est, & simplex, hinc Vinum,  $\text{✚}$ , serum lactis &c. Idem vel simplex, vel compositum, hydromel, posca, cerevisia, juscula, Urin. lac: it. infusa & decocta jam præparata &c. Circa hoc observandum: 1. si menstruum est Volatile, minus decoctioni, infusioni saltem, & huic circumspectæ intervit: ut Vinum. S. V. 2. quo tenuius & dilutius fuerit menstruum; eò cæteris paribus plus imbibendo, potentius & substantia medicamentosa saturatius subministrabit remedium. Hinc Cerevisia præ aqua, decoctum vel infusum pro simplici minus huic negotio apta existunt. 3. quo denique interioris & minus penetrantis erit textura, eò debilius fiet, minusque medicamentosum remedium: Hinc enim Vinum præ  $\nabla$ , ex quamplurimis longè plus elicit. Consultum ob id acuire interdum menstruum, pro meliori penetratione & extractione, quin & interdum aliquali ingredientium correctione: quibus usibus Tart. præ aliis inservit, ejusdem crystalli,  $\odot$  &  $\odot$  essentielle. Crystalli decoctionibus inserviunt, cum sine ebullitione non solvantur, ut ut post refrigerationem denuò coagulentur,  $\odot$  Tartari magis in infusis convenit,  $\odot$  v. essentielle in dosi paulò largiori utrique aptissimè jungitur.

§. 5. Proportio ingredientium, ad menstruum, ob circumstantias hæcenus insinuatæ, & alias plures tantum non infinitas, vix determinari potest. Pro aliquali tamen Ideâ, tali proportionem sibi invicem respondere possunt. Liquoris quantitas, 4pla,

lignor.  $\mathfrak{z}$ i.  
cortic.  $\mathfrak{z}$ ss.  
rad.  $\mathfrak{z}$ vi. ad  $\mathfrak{z}$ j.  
herb. m. i. ad ii.

6pla, in mollioribus, aut volatilibus, in densioribus aut fixioribus, 8pla & 12pla, esse potest. Dum totius remedii moles, ordinario  $\mathfrak{ss}$  i $\mathfrak{ss}$ .



flor. p. ii.  
 bacc. ʒss.  
 sem. ʒ ii. ad ii.  
 aromat. ʒi.

ʒb ij. vix excedit. Absumptio in decocto ad medias, vel ad ʒas h. e. partes menstrui residuas, interdum saltem ad 4ta partis consumptionem præcipitur, aut post colaturam demum

ejus quantitas determinatur, modo tamen non adeo certo, nisi prius menstrui quantum determinatum fuerit, siquidem ad medias, item ad ʒas decoctio instituta esse potuerit, & ita nunc debilius, nunc potentius remedium obtineri.

§. 6. *Infusa* ergo, vel simpliciter menstruo infunduntur, & ita pulveris formâ c. liquore hauriuntur, vel nodulis linteis raris includuntur, à quo successivè, cum aut sine expressione liquor hauritur: vel infusum paratum à speciebus colando separatur, & nunc ita solitarium, nunc sociatis iis, quæ decoctis addi solent, propinquantur. *Decocta* verò ebullitione absolutâ colantur per pannum vel linteum, & quia ingratiore ferè, quin & interdum incompleta sunt medicamenta, tam pro *efficacia*, quam pro *gratia* addenda subinde quædam veniunt: pro *efficacia* quidem, Electuarium, spiritus, extractum, syrupus, aut aliud quid, à Medico pro intentionis ratione ordinandum, proportionem ferè illa, quæ supra de potionibus monita fuit. Pro *gratia*, præter colaturam subinde *clarificatio* cum albumine ovi instituitur, ut oculis, quin & ventriculo magis arrideat: sicut pro eodem scopo & *aromatizatio* superadditur, adjectis aromatis ventriculo gratis & medicamenta plus minus, corrigentibus: Ut nihil dicam de addendis dulcibus aut dulcoacidulis, pro gustus suaviori alteratione, simili ratione ac supra in julepis vel misturis factum. Sed omnia hæc distinctius ex particularibus constabunt exemplis, per quæ brevissimum iter, præsertim cum totum hoc negotium & minus *difficultatis* hodie ac olim habeat, præsuppositâ solutionum & extractionum doctrinâ spargyricâ, & minus etiam *utilitatis*, siquidem decoctis rarius præ quotidiano veterum abusu, internè uti soleamus.

*Infusa Antifebrilia, in specie contra Quartanas.*

R. pulv. Chin. Chin. ʒvi. ad ʒi.  
 rad. gentian. ʒiii.  
 fl. cent. min. p. iv.  
 piper. long. ʒi.  
 ☉ Tartari. ʒss.  
 M. f. pulv. D. S.  
 Species in Wein.

R. Cortic. chin. chin. ʒvi.  
 quajac. ʒii. l. iii.  
 Comar. Cent. min. m. i.  
 cinamom. ʒii.  
 caryophyll. ʒi.  
 Lap. ☉ pp. ʒi.  
 ☉ Tart. ʒiii.  
 M. F. pulv. D.

*Infusum*

*Infundatur  
 agitando  
 idque ad in  
 Chin. Chin  
 Cortic per  
 Delicatio  
 hauriri po*

*No*

*Infund. V  
 sine expre  
 præmisso  
 solet omit  
 nullam ext  
 do Vini in  
 promoven  
 Limatura  
 Vini hanc  
 præcipitat*

*ix. li. rec*

*rad. rap  
 contus. &  
 deo infusa  
 l. iii. feri*



Infundatur in Vini vel absinthii, vel gallici, vel Rhenani, m. iß. subinde agitando. Tempore usus omnibus benè commixtis, capiat bonus haustus idque ad imitationem Gallorum præsertim D. Monginot. Tr. de Cura Febr. per Chin. Chin. Ritè usurpata, rarè fallunt, signa coctionis ubi præcesserunt. Loco Cortic. peruvian. & lignum Colubrin. amariss. præsertim in Tertianis recipi potest. Delicioribus inclusus nodulo pulvis ita infundi, & prævia expressione infusum hauriri potest.

*Nodulus alterativus & laxativus, in morbis chronicis  
vernali tempore usurpandus.*

℞. Comar. absinth. fl. cent. min. h. cochl. rec. ana m. ß. ad m. i.  
rad. armorac. rec. ʒi. gentian. ʒß. tarax. ʒii.  
fol. senn. s. fl. ʒvi. ad ʒi.  
rad. helleb. nigr. non pp. ʒß. esul. non pp. ʒiß.  
sem. fœnicul. ʒiij. anis. ʒiß.  
cinnamom. Zingib. caryophyll. ana. ʒi.  
⊖ Tartar. ʒiii. incis. & contus. includantur.  
Nodulo. D. S. Püschel in Wein.

Infund. Vini Rhenani mens. iß. capiat bonus haustus c, vel sine expressione, prout fortius vel debilius se exferit: isque vel calidus, vel præmisso tantillo juscule frigidus. Jalapa, quæ ordinariò aliàs una infundi solet omittenda, hæc enim & alia resinosa, ceu non appropriata menstruo, nullam extractionem patiuntur. ⊖ Tart. partim pro usu proprio, dum c. acido Vini in ⊖ essentielle abit, partim pro scopo corrigendi solutiva, ac simul promovendi solutionem additur. Loco ejus in hypochondriacis interdum Limatura & additur, quicquid dicat Geigerus in Kelegraphia, acidum enim Vini hanc sufficienter rodit: sed nunquam simul, ⊖ Tart. enim & alioquin præcipitat.

*Infusum Antiscorbuticum.*

℞. H. rec. nasturtii aquatic. cochlear. vel  
ana m. ii. ℞. H. cochlear. m. ii.  
rad. raphan. rustic. ʒi. rad. helen.  
contus. & conquass. in mortario lapi- armorac. ana. ʒi.  
deo infundantur in s. q. hoc. est ʒii. bacc. juniper. ʒvi.  
l. iii. feri lactis depurat: stent in loco passul. min. ʒi. M.

repid.



tepid. per noct. in vase clauso. mane R.  
Colatur. adde

▽ Cinamom. ℥ss. ad ℥vi.

M. D. S.

Scharbocks, Trancf.

ant huius locolac antiscorbuticum vid.  
supra §. 1. Class. III. Addi potest pro lu-  
bitu vel de saccharo, l. syrup. de succo  
Citri, vel scelotyrb. Foresti, non tamen  
copiosa, ob facilem alterationem dos.  
℥iii. l. iv.

*Infusum Purgans pro una  
dosi.*

R. fol. senn. s. st. ℥ii.  
rad. helleb. nigr. non pp. ℥ii.  
zingib. ℥ss.

⊖ Tart. ℥i.

Infund. in f. q. ▽ com. l. fumar. stent  
in loco tepido pernoct. manè.

R. Colat. ℥iii.  
adde.

▽ Cinnamom. ℥ss.  
syr. de pom. ℥iii.

M. D. S.

Purgier, Trancflein.

*Infusa Emetica.*

R. fol. asari rec. no. viii. ad x. minu-  
tim incisa infundantur per noct. in ▽  
card. benedict. ℥iv.

manè R. Colat. add.

M. D. S. Brech, Trancflein.

succum sint contrita: tunc adde ▽ card. benedict. ℥ii. ad ℥iv. M. F. hau-  
stus. D. S.

infund. in Vinum vel serum  
Lactis.

Potentior est succus, si speciebus istis  
prioribus sub contusione affundatur seri-  
lactis saltem q. s. pro meliori conqua-  
satione, & ita succus exprimatur, qui  
vel ita c. paucis saccharo edulcora-  
tus, absorbeat: vel illius ℥ss. sub  
usu seri lactis q. s. addatur, & ita  
hauriatur.

*Infusum Emeticum.*

R. ℥ii Vita.

vel.

Croci metall. absinth. q. v.

Infund. in Vinum Rhenanum: stent  
in loco tepido per noct. manè.

R. filtrati liquoris per chartam em-  
poretic. ℥ss. ℥i. ad ℥. iss.  
pro consideratione agri.

D. S.

Brech, Wein.

Nempe quantum Menstrui sive Vini  
hic ante omnia attendendum, ut rectè  
monet Walaeus. Meth. Med. p. 59.

*fortius.*

R. fol. asari rec. no. ix. conterantur in  
mortario lapid. c. pistillo ligneo, affun-  
dendo sensim oxymell. simpl. ℥ss. ad ℥i.  
tamdiu terendo, donec in potabilem

*Infu-*



*Infusum passulatum laxativum, pro hypochondriacis, aliisque qui siccioris sunt alvi.*

℞. passul. min. ℥ii. ad iii. fol. senn. s. st. ℥vi.  
cinamom. ℥ss. caryophill. ℥j. Crem. Tart. ℥ss.  
concisa & conquass. infund. in s. q. v. com. v. g. ℥bii. ad iii. stent in loco calid. per  
noct. l. per 24. horas, vase clauso: ubi omnia refrixerint colentur per linteum  
densum. D. S.

*Eröffnender Trancé.*

*Pertinet huc infusum purgans ex semina pro delicatulis, à D. Michaeli olim laudatum.*

℞. fol. senn. s. st. pulv. ℥i. passul. min. lotar. ℥ii.  
Contunde omnia in mortario lapideo, ut fiat pasta, adde Cinamom. ℥iii. caryo-  
phill. ℥ss. hinc in vase fictili affund. v. ferventiss. ℥xv. misceantur optimè, &  
asserventur vase clauso in loco tepid. vel in MB. per 6. l. 8. horas (alias sapor  
ingrator redditur) liquor siltretur & leni digestionem feces separentur, & cla-  
rus liquor per declinationem decantetur & usui asservetur: dos. infant. ℥iii. ad  
℥ss. adult. ℥iii. robusto. ℥v. quin & alia minus nauseosa purgantia una infundi  
poterunt, pro subiectorum ratione: sicuti & de Tart. puro aliquid simul propter  
sennam addi possit.

Pertinent huc Vina infusione aromatum & sacchari medicata, Clareta it. à  
repetita per manicam Hippocratis sive marsupium laneum colatura, Vina  
Hippocratica dicta, apud nos ferè rariora, pro scopo l. analeptico, vel alte-  
rativo, vel simul laxativo.

*Vinum Hippocraticum sive Claretum laxativum  
pro sene.*

℞. Bacc. juniper. rec. ℥vi. rad. acori ver. ℥ss.  
fol. senn. s. st. ℥iii. rad. helleb. nigr. ℥ss.  
Cinnamom. galang. cubeb. Zingib. ana. ℥i.

† x

Crem.



*Crem. Tart. ℥ii. Infund. in Vinirhenani optim. q. s. v. g. ℔i. stens in loco tepid. per triduum colentur, edulcorentur c. s. q. ℥ss. ad ℥ii. sacchari: Coletur iterum bis vel ter per manicam Hippocratis. D. S.*

*Stärckend Laxier. Claret.*

§. 7. Hisce modis simplici specierum per menstruum, extractione præscribuntur infusa: est tamen, quando præterea fermentatio intercedit, quâ mediante in textura gummeo-resinosa melius recluduntur species, ac ita exactius menstruo uniuntur, & sub minori digestionis primæ labore, altius partes corporis subeunt & alterativas impressiones undique exferunt. Species infundenda, saltem in majori quanto, habitâ ratione liquoris in quem fit infusio, præscribuntur, & hinc v. g. Cervisiæ recenti & æcoctura ferventi, vel musto recenter expresso, infunduntur, vel ita nuda, vel nodulo raro inclusa, ut & in medio liquoris suspensa, ut sub alterutrius fermentativo motu, potus medicamentosus emergat. v. g. talis est Cerevisia antiscorbutica *Timai: in Epist. l. 6. epist. 14. p. 428.*

*Cerevisia Medicata, anti-cachectica & antihypochoendr.*

*℞. rad. Cichor. rec. ℔ss.  
helen. rec. ℥iii.  
h. scolopendr. ℔ss.  
card. bened. m. iii.  
bacc. juniper. rec. ℔iii.  
Incis. & contus. D. S.*

*Species zum Kräuter-Bier.*

*Mens. 30. ad 40. quorum qualibet ℔iii. Medicas constituit, infundenda ante fermentationem, & ita in liquore relinquenda, donec liquoris peracta fermentatione fiat transfusio.*

*Vinum medicatum absinthiacum.*

*℞. h. absinth. ℔iiss.  
card. benedict.  
rosmarin. ana. ℔ss.  
Com. cent. min. ℥iii.  
rad. caryophyll. ℔ss.  
fl. sambuc.  
Cortic. citri.*

*aurant. ana ℥iii.*

*Incisa & contus. D. S.*

*Species zum bittern Wein.*

*pro amphora, (60. mensurarum) una, vel cum semiss. Musti, in quo debet fieri infusio.*

§. 8. Differendi hinc prolixius daretur occasio depotibus medicatis fermentatis, ex succis & liquoribus vegetabilium parandis, in quo artificio Angli excellunt: sed quia ad officinales potius labores, quam magistras præscriptiones pertinent dimittimus. Unicum saltem potum medicamentosum



tosum fermentatum, Viennæ & Austriæ quibusdam in locis usitatum, hypochondriacis imprimis ac lumborum renumque phlogosi & æstu correptis, crebrius l. loco potus ordinarii hauriendum.

℞. bacc. juniper. ℥i. passul. min. ℥i. ℥iii. Tartar. Venet. ℥ss. ad. ℥i.  
fruct. cynosbat. c. arill. m. i. fruct. acacia. c. nucl. m. i.

infund. in ▽ commun. ℥xvi. in vase apto ligneo & prope fornacem, l. loco quodam in calido fermentare permittuntur, hinc transvasantur, & pro potu non ingrato asservantur.

§. 9. Simili modo ac infusa præscribuntur etiam decocta, differentia enim saltem in præparat. accidentalis. Usus est ferè Alterativus, adeò rarò hodiè, ob ingratas proprietates, doses incertas, & operationes diversas, pro scopo solutivo ordinantur: nisi mitius quoddam sennatum aut helleborinum, pro una dosi capiendum, &c.

℞. Rap. polypod. ℥iii.  
helleb. nigr. ℥ii.  
fol. senn. s. st. ℥i.

⊖ Tartar. Di. ad ℥ss.

Coq. s. q. ▽ commun. leniter.

Colat. ℞. ℥iii.

adde

syr. de fumar. comp. ℥iii.

☞ Cochlear. Di.

M. S.

Purgier Tranc wieder den  
Scharbock.

℞. rad. polypod. ℥ss.  
fol. senn. s. st. ℥ii.  
ad iii.

Crem. Tartar. ℥ss. ad Di.

c. s. q. ▽ com. l. feri lactis depurati  
leniter ebulliant ad dissol. Tartari.

Colat. ℞. ℥iii.

adde

▽ Cinamom. ℥ss.

syr. de pom. ℥iii.

M. D. S.

Cum tamen Clinico volupe fuerit, adhuc decoctum purgans  
pro pluribus dosibus, ad Imitationem Veterum abli-  
guire, tale præscribi poterit. Decoctum  
purgans in scabie.

℞. rad. lapath. acut. ℥i. helen. polypod. ana ℥ss.

h. fumar. m. ii. scabios. m. i.

fol. sen. s. st. ℥i. rad. helleb. nigr. non. pp. ℥ss.

Crem. Tartari ℥i. ⊖ Tartari Di.

† x 2

Coq.



Coq. in  $\nabla$  com. ℥ii. ad ℥iiss. clauso vase leniter, Colat. R. ℥iiss. clarif. & aromatiz. c. cinamom. addendo

syr. violar. solutiv. ℥i. de fumar. compos. ℥ss.

M. D. S.

Purgier Trancet auff eeliche mat.

de quo capiat omni mane haustum ad ℥iv. l. v. calidè

vel.

R. decoct. aperitiv. ℥iii. l. q. f.

in quibus dissolv. Elect. catholic. l. diaphœn. ℥i.

vel Elect. de succo ros. ℥vi.

vel Conf. Hamech. ℥ss.

Colat. R. adde syr. ros. solut. ℥vi. ad ℥i. M. Dum colantur post dissolutionem, in paulo majori dosi præscribenda electuar. cum multum residui post se relinquant.

§. 10. Alterantia ergo sunt decocta, quæ ordinario præscribenda veniunt.

### Decoctum ad Dysenteriam.

R. rad. tormentill. ℥ss.

fol. plantag.

h. heder. Terrestr.

sanguisorb. ana. m. i.

fl. ros. rubr. p. iii.

Ras. priap. Cervi vel.

ceti. ℥iii.

incis. & contus. coquantur in  $\nabla$  com.

℥iii. l. iv. ad medias

Colat. R. adde

syrup. cydon. aromat. ℥ii.

ad ℥iii.

$\nabla$  Cinamom. ℥i.

M. D. S.

Anhaltender Steret. Trancet.

### Decoctum adstringens ad hæmorrhagiam uteri, ex vasorum laxitate.

R. rad. tormentill.

Bistort. ana. ℥ss.

h. consolid. maj.

sannicul.

pyrol.

summit. hyperic. ana. m. i.

Coq. in  $\nabla$  chalybeat. q. f.

Colat. R. ℥xv. ad ℥iiss.

adde

syr. de symphyt. Fernel. ℥iii.

$\nabla$  Cinamom. ℥ss.

M. D. S.

capiantur ad ℥iii. tepid.

sapius de die.

Deco-



*Decoctum Vulnerarium*  
internè & externè usurpan-  
dum.

℞. *astacor. fluviatil. no. xx.*  
*rad. aristoloch. rotund. ʒi.*  
*h. bugul.*  
*alchimill.*  
*sannicul.*  
*betonic. ana. m. i.*

*Coq. in s. ∇ comm. & Vini. Colat.*  
*D. hoc externè vulnera & ulcera elu-*  
*untur, l. etiam plagule in eo madefa-*  
*ctæ imponuntur: internè adduntur,*  
*syr. de symphyt. Fernel. ʒiv. & hauri-*  
*untur bis in die ʒiii. ad iv. horis aliquot*  
*ante pastum.*

*Decoctum refrigerans,*  
*sive temperans bilem, ut vo-*  
*cant effervescentem.*

℞. *rad. Cichor. rec. ʒiii.*  
*fl. ros. rubr. m. is.*  
*santal. rubr. ʒii.*  
*succi Citri rec. ʒi.*

*Coq. in s. q. ∇ comm.*

*Colat. ℞. edulcorètur pauco sac-*  
*charo D. S.*

*Kühlender Alterativ. Trancè.*

*Coqui etiam possunt in sero lactis, &*  
*si succus Citri omissus fuerit, accipi-*  
*potest serum lactis, cum Plegmate*  
*Vitrioli acidulo.*

§. xi. Interdum Infusa & decocta simul eandem formulam ingre-  
diuntur.

*Decoctum Vulnerarium in*  
*Renum exulceratione, &c.*

℞. *rad. Consolid. sarac. c. tot. m. ii.*  
*fol. vinca pervinca.*  
*alchymill.*

*heder. Terrestr. ana. m. i.*  
*summit. hyperic. m. ss.*  
*ras. glycyrrhiz. ʒss.*

*Coq. in s. q. ∇ simpl.*

*Colat. ℞. ʒss. ad ii.*

*adde*

*syr. de symphyt. Fernel. ʒss.*

*theriacal. simpl. ʒi.*

*M. D. S.*

*Heilender Trancè auff etliche*  
*mal.*

*Aliud simplicius.*

℞. *seri lactis ʒii.*

*succi citri rec. express. ʒii. ad iii.*

*ebulliant parum: &c. album.*

*ovi clarificata & pauco saccharo edul-*  
*corata Colentur:*

*D. S. prodest in febribus pro alie-*  
*ratione, sicuti simili modo, cum succo*  
*pomor. bursdorf. maturor. ad ʒiv. l. vi.*  
*tractatum, convenit hypochondriacis*  
*astuantibus, obstructis, melancholiâ*  
*affectedis, &c.*



**Decoctum alterans & laxans, quod etiam loco Junepi usurpari potest.**

℞. fl. ros. rubr.  
bellid.  
papav. rhead.  
ana. m. ℥.

Tamarind. rec. ℥i℥.  
▽ comm. l. feri lactis depurat. ℥i℥.  
ad. iv. Ebulliant invicem: decocto ferventi infunde

Cons. ros. rubr. rec.  
violar.

papav. rhead. ann. ℥vi.  
facta digestionem in loco tepid.  
Colentur. D. S.

**Eröffnender alterativ-Tranck auff etliche mahl.**

de quo bibat ager vel pro lubitu, vel quotidie bis mane, & bihorio ante coenam.

§. 12. Volatilia ubi decoquenda sunt, jungatur destillatio, sicuti hoc imprimis urget, quoad aromatica carminantia *Zwelferns Pharmac. Reg. p. 87.*

**Decoct. antiscorbut.**

℞. Rad. raph. rustic. rec. ℥i℥.  
H. cochlear.  
nasturt.

piperitid. rec. ana. m. i.  
sonquass. in mortario lapid. c. ▽  
com. vel feri lact. caprill. ℥ii, decoquantur in cucurbita suo alemb. munita, & destillentur simul ad medias:

Colat. clarificat. ℞. ℥i.  
adde ▽ m. simul Destillatam  
in quibus dissolve

**Decoctum Diureticum.**

℞. ras. ligni juniperin. ℥i℥.  
macerentur per noctem in MB. in  
℥i℥. ▽ comm.

mane ebulliat ad 3/4 partis consumptionem: decocto ferventi infunde  
bcac. juniper. rec. ℥i℥.  
rad. fanicul. ℥i℥.

stent in infuso in loco tepid. per 24.  
horas, mane facta leni ebullitione  
℞. Colat. ℥ii.

adde.

syr. de 5. rad. ℥i℥. l. iv.

℞. dulc. ℥i. ad ℥i℥.

vel hujus loco potius acidi ex nucleis persicorum & dactilor. Destillat.  
℥i. ad ℥ii.

M. D. S.

**Harntreibender Tranck.**

**Decoctum in affect. chronicis capit:** & pector. catharral. c. tumoribus glandularum colli & faucium insignibus, ex lymphæ motu & crasi vitiatis.

℞. ras. ligni juniper. ℥ii.

fassafr. ℥i℥.

cortic. lign. quajac. ℥i.

h. rosmarin. m. iii.

Bacc. juniper. ℥i℥.

solut.

solut. & c.  
sacchari a  
M. D.

**Deco**

℞. ras. ligni  
h. rosmarin.

Bacc. juniper.

lauri

Coq. in 5.

Cucurb. c.

ad medias

℞. Colat.

℞. bacc.

syr. fl. T.  
M. D.

vesperi, &  
bonus haur

§. 13.

menstruo

Proprie au

tur simplic

**Hydrom**

dens ped

℞. h. ma

hyssop

rad. hel

sem. fo



*solut. & c. s. pom. 3vi.*

*sacchari albiss. parum.*

*M. D. S.*

*Scharbocks. Trancf.*

### Decoctum Paralyti.

*Rx. ras. ligni sassafr. 3ii.*

*h. rosmarin. rec. m. ii.*

*Bacc. juniper.*

*lauri. ana. 3i.*

*Coq. in  $\nabla$  & V. ana. 1bii. in*

*Cucurb. c. alembic. operta :  
ad medias.*

*Rx. Colat. & Destillat. adde*

*— bacc. juniper. ferm. 3iv.*

*⊗ \* simpl. 3ß.*

*syr. fl. Tunic. 3iv.*

*M. D. S. de quo bis l. ter manè,  
vesperi, & sub introitu lecti capiatur  
bonus haustus.*

§. 13. Pertinent ad Infusa & decocta etiam Hydromelita, it. Oxymelita, à menstruo ita dicta, in affectibus pituitosis, vel pectoris vel senum proficua &c. Propriè autè dicta *Mulsa medicata* fiunt, dum melli c.  $\nabla$  fermentanti, infunduntur simplicia medicamentosa, ad instar Vinorum medicatorum, de quibus supra.

### Hydromel resolvens & incindens pectorale.

*Rx. h. marrub.*

*hyssopi ana m. i.*

*rad. helenii. 3ß.*

*sem. fœnicul.*

*Infund. in  $\nabla$  & V. ana. 1bii. ad 1ß. macerentur per. 24. horas in MB. vase suo alemb. munito, & decoquantur & Destillentur ad medias : Colat. & Destillat. Rx. adde*

*— ⊗ \* simpl. 3iii.*

*syr. fl. calendul. 3iii.*

*M. D. S.*

*Zertheilender Trancf auff etliche mal.*

### Decoctum pectorale, ad tussim à frigore externo natam, it. restituens lesiones pulmonum, &c.

*Rx. ras. lign. sassafr. 3i.*

*macerentur in  $\nabla$  com. mens. ii. s. 1b vi.*

*adde*

*rad. levistic. 3ß.*

*helen. 3iii.*

*h. heder. Terrestr.*

*scabios.*

*pulmonar. ana m. ii.*

*sem. anis.*

*fœnicul. ana. 3iii.*

*Coq. ad tertias, addendo circa finem*

*ras. glyzyrrhiz. 3ß.*

*passul. min. conquass. 3vi.*

*Colat. D. S. Brust. Trancf.*

### Hydromel. Paralyticum.

*Rx.  $\nabla$  com. 1bvi.*

*mell. optim. 1bß.*

*despumentur sedulo, coquendo leniter  
ad 4ta part. consumptionem :*

*Colat.*



anif. ana. ʒiʒ.  
 Terr. fol. Tart. ʒii.  
 Coq. in  $\nabla$  simpl. p. vi. f. ℥lii. mell.  
 despum. p. i. f. ℥ss. bulliant simul ad  
 consumt. ʒia l. 4ta partis: in fine  
 infund.  
 pulv. Cinamom. ʒi.  
 Croci gr. xv.  
 Colat. R. D. S.  
 Löfender Brust, Tranch.

Colat. R. adde  
 h hyssopi.  
 puleg.  
 salvia. ana. m. i.  
 fl. anthos. m. ʒ.  
 stent in infusi. per 12. horas, manè  
 ebulliant leniter, addendo  
 Cinamom. ʒiii.  
 cardamom. ʒʒ.  
 cubebar. ʒʒ.  
 Colat. D. S.  
 Glieder, Tranch.

### Oxymel Diureticum Laxativum.

R. Rad. vincetox. ʒi. belleb. nigr. ʒʒ. ad ʒvi.  
 H. heder. Terrest. parietar. ver. ana. m. i.  
 bacc. juniper. ʒvi. ad ʒi. gran. alkekeng. ʒʒ. ad ʒvi.  
 concis. & contus. infundantur. in  
 $\nabla$  com. ℥iv. mell. colat. ℥i.  $\times$  Vinii ℥ʒ.  
 stent in infuso in Vitro clauso per aliquot horas,  
 manè ebulliant leniter: Colat. clarificetur: aromatiz. D, S.  
 Eröffnender, Misch.

pertinet huc Oxymel de Peto Quercet. quod & pectorale est. egregium & simul  
 vim purgandi appropriatam in hydrope obtinet: it. Oxymel absinthites: Eupori-  
 ston Prevotii in morbis chronicis, Fehr. de absinth. p. 40. it. Oxymel ad Asthma  
 Poterii: Cent. 2. c. 44. p. 50.

§. 14. Referenda & huc hordeata, sive ut alias audiunt *Prisane*,  
 quæ tamen aliæ apud Veteres, aliæ apud Modernos: ibi partim alimen-  
 tum, partim potus: hic ut plurimum corpus pro Julebis, interdum, sed  
 rarius ex hordeo ad crepaturam cocto, emulsio paratur, cujus paradigma  
 exhibet Syrius: l. i. prax. c. 14. p. 157. Ast hordeata hæc non adeo frequenti  
 hodiè apud cultiores Practicos sunt in usu: 1. quia cruda sunt & ventriculum  
 crudum reddunt. 2. fermentando flatulenta sunt: unde nunquam sine sem.  
 anif. aut cortic. citri decoquenda. 3. primis viis & hypochondriis utroq; modò  
 inimica: sitamen pro Julebo alterante expetatur *Hordeatum*.

R. Hord.



℞. Hord. mund. m. i. rad. scorzon. ℥iſſ.

raſur. C. C. ℥i. cortic. Orant. ℥iſſ.

Coq. lento Δ ad crepaturam hordei : edulcor. paucisach.

D. S.

Alterativ-Transf.

§. 15. Quæ frequentiffimè adhuc sub hodiernâ praxi uſurpantur decocta, ſunt ſudorifera, pro chronicorum morborum curâ ferè in uſu, quæ cum ex ſubjectis fixioribus ferè præparanda, diutiusque continuanda veniant, omninò & fortius decoquenda, & majori quanto ordinanda. Cum verò ſub uſu illorum ſtrictum diætæ regimen obſervandum omninò ſit, in ſpecie *Diætæ*, apud nos *ſudorifera*, dicitur, idque ad differentiam *Lactææ*, ſub cura ſcorbuti interdum neceſſariæ. Veteribus ex uno vel pluribus 4. famoſiorum hydroticorum parabantur, quæ ſunt *lignum quajac. ſ. ſanct.* ejusque *cortex*, *ſaffaſras c.* cortice, rad. *Chin.* & *ſarſaparil.* quibus in cura luiſ Quæ, iſti principaliter uſu fuerunt. Hiſ vero ceu exoticis, & ob id ſubinde ſuſpectis, ligna noſtratia, radicesque commodè à modernis adjunguntur : v.g. *lignum juniperinum*, *buxum*, ſimul anodynum, *ſarmenta periclymeni*, rad. *tormentill.* *bardan maj.* &c. ex quibus nunc ſolitariis, nunc aliis additis, decocta primaria pro eliciendo ſudore, & zſaria ſi bocheta, pro potu ordinario ordinantur. Præſcribendi rationes tam Veterum, quam modernorum, præter *Morellum de formul. Remed.* hic & prolixum & accuratum, apud luiſ Quæ ſcriptores imprimis videatur : ſufficiat ſaltem in præſenti Idea, formam præſcribendi recentiorum, quibus & & ſuperaddere placuit, ſubjungere.

*Decoctum ſudoriferum primarium, Zuvelſero  
communiter adſcriptum.*

℞. Raſ. ligni ſanct. ℥vi. cortic. ejusdem, ℥ii. ad iii.

rad. ſarſaparill. ℥ii. ad iii. lign. ſaffaſr. ℥i. ad ℥iſſ.

℥ vivi per alcali depur. & in pet. ligat. ℔i.

℥ crud. gr. mod. contuſ. in pet. ligat. ℔i.

incifa & contuſ. macerentur in ∇ comm. menſ. xii. per & p. hinc coquantur ad 3ias Colat. ℞. D. S.

Schwelſ & Transf.

de quo ℥iv. ad ℥vi. : capiantur manè, & unâ alterâve horâ præliciatuſ ſudor, &c.

† y

Deco-



## Decoctum secundarium.

℞. Resident. decoct. prior. totam. l. ubi aliud quid addendum,  
mediam :

affund. ▽ comm. mens. xviii. macerentur per 12. horas, coq. ad  
consumt. 3tia partis.

adde

Passul. minor. major. enucleat. contus. ana ʒi. ad ʒiʒ.

rad. glyzyrrhiz. polypod. ana. ʒvi.

coriandr. pp. ʒʒ.

Colentur per manicam Hippocr. aut aromatizentur c. cinamom. F. Decoctum  
2darium. D. S.

## Ordinari Tranct.

§. 18. Verum præter Luis & curam, quibusdam in locis hodierno  
more receptum est, ut, qui corpora habent impuriora, ut vocant, & variis inde  
pathematis obnoxia, aut qui chronicis ac lentis, plus minus complicatis affe-  
ctibus confluantur, viribus tamen utcumque constantibus, item qui luxuriosa  
inordinatâque, cum effreni potandi libidine, utuntur diæta, & succulentioris  
hinc fiunt habitus Diæta hujusmodi sudorifera quotannis verno, (vocatur et-  
ne Frühlings Schwitz. Cur) interdum & autumnali utantur tempore, pro di-  
gerendis congestis cruditatibus, excernendis heterogeneis impuritatibus, fir-  
mando tono viscerum, & mundificando ac roborando universo corporis ha-  
bitu. In quem finem, præmissa primarum viarum abstersione, omni manẽ  
decocto primario utuntur, expectantes in Conopeo largum sudorem, quem  
in lecto calefacto decumbentes sensim exsiccare permittunt: Decocto 2dario  
loco potus consueti utuntur: Vesperiente pastum, aut saltem sub introitu lecti  
repetentes decoctum primarium, citra sudoris tamen profluvium. Alimenta  
sint moderata: aërem externum vident. Continuat hoc per aliquot septi-  
manas, & vegeti inde ac alacres ferè redduntur. Praescribendi modus hæc de-  
cocta, coincidit cum prioribus.

## Decoctum Primarium.

℞. Raf. lig. sanct. ʒi.  
sassafras. ʒvi.  
rad. Chin. ponderos.  
scorzon. ana ʒi.  
Ering. ʒʒ.

## Decoctum Secundarium.

℞. Rad. Chin. ponderos.  
scorzon. ana. ʒiʒ.  
Cinnamom. acut. ʒiii.  
passul. min. ʒiii.  
sem. fenicul. ʒʒ.

sassa-



sarsaparill. ℥iii.  
sem. fenicul. ℥ii.  
Preparat. l. a. coq. in ℥xii.  
▽ comm. ad medias.  
Colat. D. S.  
Schwis. Tranch.

resid. decoct. superior.  
Coq. in ℥xxv. ▽ simp.  
ad remanent. ℥. xvi.  
Colat. D. S.  
Eisch. Tranch.

§. 17. Sed præter usum per diaphoresin evacuatorium, etiam pro scopo alterativo, in affect. Chronicis, ex visceris cujusdam interioris læsione, præsertim exulceratoria dispositione natis, v.g. in Phthisi pulmonali, ex sanguine aut lymphâ acrioribus nata, quàm alias defluxionibus à capite catarrhalibus tribuunt, it. exulceratione renum, abscessu mesenterii, aliorumve viscerum mundificandis & consolidandis, & similibus, non nimis confirmatis malis, decocta similia ex iisdem lignis & radicibus, potissimum radice Chinæ, additis aliis vel vulnerariis, vel abstergentibus more & methodo hactenus insinuata præscribuntur, & quotidie bis l. 3. haustus bonus ut capiatur, ordinatur v.g.

*Decoctum alterans, exsiccans & putredinem inhibens.*

℞. Raf. lign. sanct. ℥iii.  
rad. sarsaparill. ℥ii.  
scorzoner. ℥i℥.  
fragar.  
consolid. maj. min.  
glyzyrrhi. ana. ℥vi.  
h. Veronic. m. ii.  
coriandr. pp. ℥ii.  
passul. min. ℥iv.  
preparat. l. a. Coq. in s. q.  
▽ simpl. l. mens. V.  
s. ℥xv. ad medias s. Colat.  
D. S.  
Alterativ. Tranch.  
dos. ℥iv. l. v.

*Aliud magis temperatum & consolidativum, &c.*

℞. Rad. chin. gumm. ponderos. non carios. ℥iii.  
sarsaparill. ℥i℥.  
scorzoner. ℥ii.  
caryophyllat. ℥i.  
macerata per noct. in s. q.  
▽ simplic. ebulliant manè, addendo  
h. scabios.  
alchimill.  
heder. Terrest. ana. m. i.  
fl. ros. rubr. m. i.  
violar. m℥.  
sem. fenicul. ℥i.  
passul. min. ℥ji.  
decoct. trajiciatur per Manicam Hippocr. Colat.  
Sterc. und hellender Tranch.



§. 18. Pertinent huc denique decocta ex Cymis, it. ex cortice abietis, contra affectus nervorum scorbuticos, speciatim athritidem vagam, paresin, stuporem : v.g.

℞. Cymarum s. turionum pingv. ac resinos. pinastri  
it. Abietis. ℥iii.

rad. Chin. in tal. incis. ℥i℥.

bacc. juniper. ℥i.

incis. & contus. coq. in ▽ comm. ℔viii. ad 3ie

partis consumptionem l. ubi fortius desideratur, ad medias :

Colat. D. S.

Capiatur bis, manè in lecto, expectando blandum sudorem : & vesperi l. sub introitu lecti citra sudorem. Si subjectum patiens constitutionis sit humidioris ac serosioris vel succulentioris, loco Chin. radic. ras. lign. sassafras ℥i. ad ℥i℥. recipi potest. Quod si ingrator sit decocti sapor, nam therebinthina proprietates, non nihil repræsentat, in fine decoctionis aliquid passul. min. conquassat. addi potest.

§. 19. Fuerunt hæc decocta & Infusa, prout usui interno inserviunt, considerata jam pariter earum præscriptio, pro usu externo : circa quam quidem nulla essentialis occurrit differentia, ut ut ex partium affectuum, ipsorumque affectuum varietate, accidentalis quædam diversitas subinde occurrat.

### Infus. ad aff. Paralyticos, aut dolores fixos scorbut. artuum.

℞. Fol. Nicotian. H. salvia, ana. m. i.

rad. angel. ℥ss. Aron. pyrethr. ana. ℥ii.

fl. anthos. lavendul. stœchad. arab. ana. p. ii.

sem. Eruc. ℥vi. castor. ℥iii.

contus. & concis. infund. in ▽ V. p. 2. & lumbric. Terrestr. p. i. fient in loco tepido, vase probe clauso per aliquot dies, liq. filtratus  
D. S.

### Euseltlicher Glieder. Spiritus.

quo ipso tepido aut moderatè calefacto artus, vel loca dolentia benè fricanda & illinenda veniunt : vel idem infusum cum vel sine spiritu lumbricorum, pro scopo discutendi, resolvendi, attenuandi vario, instar foci humiditatis tepidi crebrius usurpari & reiterari poterit.

Deco-



Decoctum discutiens & Resolvens ad Cephalalg.  
accident:

Rx. Rad. rhodia ꝑß.  
fl. papav. rhead. rosar. ana. mß.  
capit. papav. no. iii.  
prepar. coq. in f. q. ∇ simpl. Colat. D. S.

Eusserlicher Umschlag.

Epithematis instar tepidè fronti ac temporibus applicatur.

Infusum pro Oculo, sive Collyrium multi usus, ad rubedi-  
nem, maculas, albugines, nebulas, ulcera, pustu-  
las, scabiem oculorum, &c.

Rx. decoct. Cal. vivæ c. ∇ calcatripp. parat. ℥ß.

⊕ \* depur. ꝑß. mittantur in pelvim aneam per noctem vel ipsi  
mistura parum limat. aurichalci immitatur, donec saphirinum ex cupro colorem  
contraxerint, filtrentur celeri manu.

Augen. Wasser.

vel instillatur oculo, vel cum linteo tepidiusculè applicatur: nunc ubi acrior fue-  
rit, pauca ∇ feniculi diluta, &c. Sanè solum ⊕ \* c. ∇ appropriata solutum,  
ita ut citra insignem sensum oculi illud ferre queant, ad maculas & albugines  
oculorum delendas, etiamsi à Variolis relicta fuerint, multum confert.

Infusum ad oculos à causa  
externa, v. g. Aere pluvioso  
ac ventoso læsos, &c.

Rx. mucilag. sem. cydonior.

fenugr.

hormini.

per infus. in ∇ fl. cyani extractæ  
ana. ℥iii.sacch. Feni. gr. ix.  
diluantur. c. f. q. ∇ euphrasie

D. S.

Augen Mistur.

Infusum ad Oculorum E-  
piphoram, Lippitud. &c.Rx. Tormentill. rad. ros. mod.  
pulv. ℥i.

O. gr. v.

∇ plantag.

cyani ana. ℥i.

stent. in loco calid. per 24. hor. filtrentur.  
D. S.

Augen. Wasserlein.

Deco-



*Decoctum Polychrestum, ad Erysipelata, Inflammationes, Exulcerat. humid. in metu gangræne. &c.*

℞. *Lythargyr.* ℥ss. fl. ros. rubr. m. ii.  
*Oliban. myrrhæ. mastich. ana.* ℥ss.  
*Decoct. f. v. Cal. viræ rec.* ℥iv. ✕ ℥ss.

*Coq. simul, usque dum lythargyrium ferè sit solutum, in fine addendo camphor.*  
 ℥ss. Colat. D. S.

*Eusserlicher Umbschlag.*

*calidè cum linteis multiplic. bis l. 3. & crebrius applicetur in die. Conf. Zuvelfer. Pharm. Reg. p. 91.*

§. 20. Sed hujusmodi infusa & decocta externa, quæ ad Epithemata revera pertinent, alias proprio nomine

*Fotus.*

appellantur, quia eisdem pars affecta suaviter afficitur & blandè quasi fovetur. Idem horum, ac internorum decoctorum præscribendi ratio, saltem quæ ad gratiam his adduntur, in illis omittantur. Triplici modo adhibentur: cum enim species decoquantur, decoctum cum linteis, spongia (non cum vesicâ, nihil enim substantiæ medicamentosa hanc penetrat) applicatur, & dicitur *Fotus humidus*, vel decocti saltem vapor ac suffitus parte affecta excipitur, & dicitur *Fotus Vaporosus*. Species sacculo lineo interpassato includuntur, uno vel pluribus, qui nunc ita siccus, aut saltem spiritu quodam penetrantiori irroratus, probe tamen calefactus, nunc in liquore convenienti coctus & ita humidus applicatur, & in genere *Fotus Siccus* it. *Sacculus* appellatur. quantitas liquorum pro fotu humido, item specierum pro fotu sicco, ex partis & usus ratione variat: v. g. pro oculo: liquor. ℥iv. ad vi. pro ventric. ℥j Species v. pro Capite, in *Cucupha*, ℥ii. pro stomach. ℥iii. ad iv. & amplius pro abdomine.

*Fotus contra Tenesinum.*

℞. fl. chamomill. verbasci ana. m. ii.  
*H. verbasci, linaria. ana. m. j.*  
*Incisa Dentur ad Chartam. S.*  
*Species sur Behung.*

*Coquun-*



Coquantur in lacte & ager in sella perforata decocto ferventi insideat, & fumum  
exsurgentem ita excipiat. vel

Incis. Coq. in s. q. lactis Chalybeati.

Colat. R. ℥iij. D. S.

### Eusserliche Behung.

Decoctum hoc calefactum, cum linteis multiplicatis eidem immersis, & leni-  
ter expressis, frequenti repetitione parti affectæ applicatur.

vel

Incis. includantur sacculo interpassato laxiori.

D. S.

### Säcklein zur Behung.

hic l. calefactus, ita siccus applicatur, unde tamen in hoc casu parum alleviamen-  
ti sperandum, vel lacti incoctus, & leniter expressus, calidè admovetur, aliquo-  
ties hoc ipsum reiterando.

Fotus Vaporosus ad promo-  
vendo menses, lochia, foetum  
mortuum. &c.

R. H. matricar.

puleg. ana. m. i.

sabin. m. ii.

bacc. lauri.

juniper. ana. ℥i.

pos. Colocynth.

℥i. ad. ℥i℞.

incidantur gr. mod. D. ad chartam. S.

Species zur Behung. hac ipsa ebul-  
liant in  $\nabla$  comm. cujus vapor fer-  
vidus excipiat per infundibu-  
lum in sellâ undique clausa, idque  
ita aliquamdiu continuando, &  
crebrius repetendo: sin citius de-  
ferveat liquor iniectione silicum  
candefactorum, vel chalybis igniti  
intrusione deniq̃ calefieri potest:  
eadem species etiam sacculo inclu-  
sa, post fotum hunc vaporosum,  
vel in formâ sicca, vel (in decocto

Fotus humidus

In contus. oculorum: aut Li-  
vore.

R. Fl. cyani:

calcatrip. ana. m. ℞.

summit. hyssop. flor. m. i.

rad. symphyt. maj. ℥vi.

sigill. Salomon. ℥iij.

Coq in s. q. Vini Colat. R. ℥iv. l. vi.

adde

S. V. camphor. ℥℞. ad ℥vi.

M. D. S.

### Eusserliches Wasser.

applicetur calidè c. linteis  
multiplicatis.

Fotus humidus pro mem-  
bro fracto, luxato, distorto, an-  
te & post repositionem.

R. H. betonic.

chamomill.

rosmarin. ana. m. i.

summit. hyperic. flor. m. i℞.



macerata & expresse, ) humidâ  
regioni hypogastrica applicari pos-  
sunt.

rad. aristoloch. rotund. ʒvi.  
symphyt. maj. ʒß.  
sem. 4. calid. maj. ana ʒiß.  
Coq. in ∇ simplic.  
Colat. R. ʒiß. adde  
Vini infus. fl. hyperic. ʒß.  
M. D. S.

Glieder Behung.

Fotus pro scroto, intestinis  
repleto in Herniâ.

R. Stercoris Ovilli q. v. coq. inf. q. la-  
elis vaccini:

Colat. R. & c. linteis eidem immersis  
fomentetur scrotum aliquamdiu sub-  
calide: remanentia postmodum cata-  
plasmatis formâ desuper imponi potest.  
Sicuti alias sacculus, ex stercore asini-  
no c. ʒi subactio pubi impositus, cre-  
brius reiteratus, in hamorrhagia uteri  
nimia egregius est.

Sacculus contra dolorem  
capitis à causa externâ, in spe-  
cie à frigore.

R. milii ʒß.

© comm. ʒiv.

b. verben.

fl. chamomill. ana.

m. i.

rad. rhod. ʒi.

M. ©. & milium primum torresiant  
in sartagine, & protinus calidè sacculo  
cum aliis prepar. induuntur: F. sacculi  
interpassati nro. 2. & ita calidi capiti  
imponuntur. S.

Säcklein zum Haupte.

Sacculi contra Dysente-  
riam.

R. Fol. quercus.

furfurum ana. m. iii.

includ. sacculis no. ii.

uno rotundo majori, & quadrato, al-  
teri minori:

D. S.

Güllende Säcklein.

Sacculi hi ʒi Vini incocti applicantur,  
major quidem umbilico, minor verò  
podici.

Sacculus pro Ventriculo.

R. H. menth. crisp. m. ii.

nuc. mosch. ʒß.

macis.

Cinamom. ana. ʒi.

caryophyll. ʒii.

F. pulv. qui excipiat Cotone &  
includatur sacculo interpassato ro-  
tundo: irroretur largiter S. V. the-  
riacalil. ol. destill. menth. ac juni-  
per. & c. D. S.

Magen Säcklein.

Pertinent



Perrinent huc *Cucupha*, h. e. pulv. aromatici Cotone excepti & mitræ capiti imponendæ ita insutæ, præsertim pro senibus, sed quia in desuetudinem ferre abierunt ob levia & brevia emolumenta, cum præterea in præscribendi ratione nil peculiare occurrat, præstat de iis tacere,

§. 21. Major fots dicitur *Balneum*, quod corporis partium respectul. *Universale* vel *particulare*: illud vel simpliciter tale, cui totum corpus ad collum usque immergitur; vel secundum quid, respectu medietatis saltem corporis inferioris, & *Inseffus* vel *Semicupium* alias vocatur, quia ad umbilicum saltem aut regionem hypochondriacam eidem insideri solet. Particulare est vel Capitis, vel manuum, vel pedum, quod propriè *Lotio* appellatur. Nulla hic nisi in quantitate ab aliis fotibus aut decoctis præscribendi est differentia.

*Balneum in scabie.*

R. rad. lapath. acut. ℥ss.  
bryon. ℥iii.  
b. parietar.  
saponar. ana. m. ii.  
lapath. acut. m. iv.  
Sulph. pulv. ℥ij.  
C. v. rec. ℥ii.

Incisa & contus. D. ad  
Chartam. S.

Species sum Bade.

Coq. in f. q. ▽ dulc. addendo parum lixivii: huic decocto moderate calenti insideat ager, vacuo ventriculo: possunt ante ingressum capitis sudorifera, ut Ess. lignor. Tinctura Tart. Giata, Tinctura Sulph. &c. sub egressu v. illiniri blande corpus linimento appropriato, minus viscido aut glutinoso.

*Inseffus s. Semicupium pro gravida, ad facilitandum partum.*

R. H. malv. alth. meliss. fl. chamomill. ana. m. iii.  
fl. malv. melilot. ana. m. i.  
sem. lini. foenugraci. ana. ℥iii.  
rad. alth. ℥iv.

† 2

Incisa

*In Ictero.*

R. H. saponar.  
parietar. ana. m. iiij.  
rad. bryoniæ ℥ss.  
sigill. Salom. ℥iv.  
pulv. pisorum. ℥ss.  
Incisa. D. S.

Balnea hujus decoctionis aliquoties ager insidere poterit, novam semper ▽m recipiendo: tunc pisorum pulvis nodulo laxiori inclusus esse debet.



*Incisa D. ad Chariam, S. Species zum Bade.*  
 decocto harum gravida infideat, quamdiu c. euphoria fieri potest, idque ferè alternis diebus, imminente partu: deterfo madore in lectum se componat, illinendo postmodum lumbos, regiones umbilici & lumborum, Linimento ex mucilag. sem. lini. fœnugrac. alth. ol. amygd. d. lil. albor. &c. Ha ipse species, modo additione bacc. juniper. magis quasi appropriata reddantur, pro semicupio in quibusvis doloribus nephriticis commode eodem modo adhiberi possunt: ungendo postmodum partes dolentes ungu. de althæa: ol. scorpion. ol. destil. the-rebinth. &c.

Pertinet huc etiam infessus Vinaceorum, vel per se ex fermentationis motu, vel insperfa C. vivâ sensilius incalescentium, in malo Ischiadico, doloribus crurum scorbuticis præsertim nocturnis, aliisque contumacioribus, & inde paralytica dependente dispositione, perquam proficius.

§. 22. Quoad Balnea particularia s. Lotiones, nulla & hic ab aliis præscribendi modis differentia.

*Pediluvium ad firmandos articulos, podagrâ debilitatos: simul à crebriori recidi vâ præservans.*

*R. bacc. juniper. ℥ss.  
 b. rosmarin. m. vi.  
 serpill.  
 salvia ana. m. ii.*

*D. S.*

*Species zum Fußbad.*

*Coq. in s. q. Lixirii comm. non adeo acris, decocto decantato, cum vel sine colatura immittuntur pedes, coëreendo balitus, integumento, vasi super imposito: conservando æstum, vel novum decoctum fervidum, vel silicem candefactum superaddendo: pedes extracti probè abluti, calidis linteis involvantur & quies ipsis concedatur. Species hæ 3. l. 4. coqui dicto modo & adhiberi possunt.*

*Lotio Manuum contra Maculas & pustulas, à scabie, variolis &c. relictas.*

*R. ∇. C. viva. ℥ii.  
 Sulph. pul. ℥i.  
 ebulliant invicem  
 Colat: adde ∇ rosar. ℥i.  
 M. D. S.*

*Reinigend Wasser.*

*additione & mistione simplici sacchari ℥ni. ℥ii. ad iii.: erit lotio appropriata ad maculas hepaticas.*

*Lotio*



*Lotio contra foetorem axillarum, pedum, aliorumve locorum.*

R. *H. scordii.*  
*plantag.*  
*fol. quercus ana. m. i.*  
*Coq. in f. q. ∇ comm.*  
*Colat. R. f. i. s.*  
*adde*  
*solut. lythargyr. Q. c.*  
*\* fact. 3 iii.*  
*M. pro Lotione. D.*

R. *Fol. quercus m. iii.*  
*summit. organ. m. ii.*  
*fl. ros. rubr. m. i.*  
*Ois 3 ss.*  
*D. S. Species.*  
*coquantur in ∇ comm. adhibeantur pro*  
*lotione sed semper caute.*

*Lotio Capitis in Casu Capillorum.*

R. *Abrotan. mar. capill. Q. maj. ana. m. i.*  
*fl. ros. marin. lavendul. ana. p. iii.*  
*rad. lapath. maj. peucedan. ana. 3 i.*  
*urtic. maj. sem. fenugraec. ana. 3 ss.*  
*ladan. cl. 3 iii.*

*affund. f. q. lixivii, stent in digest. per aliquot dies ebulliant leniter & expri-*  
*mantur: hoc ipso caput abluatur & linteis tepidis detergatur: illinatur postmo-*  
*dum Ungu. Bucretii experto: &c. Dum vero horum beneficio denuo crescunt*  
*pili, loco lixivii in Vino dilutiori vel modice adstringente species pro lotione ca-*  
*pitis coquenda. Facit huc decoct. h. & rad. malvæ c. pisis in Urina humana,*  
*quod pro lotione capitis infantum in tinea, etiam gravissimâ: it. furfuratione*  
*capitis multum valet.*

§. 22. Hæc sunt balnea propriè dicta, humida scilicet, sunt & impropriè dicta, fotuum vaporosorum instar, quæ speciali nominè *Balnea Laconica*; it. *Stufe*, it. *Sudatoria*, appellantur. In his Vapor saltem calidus plus minus medicatus, vel universaliter vel particulariter corpus aut partes quasdam afficit: idque pro scopo vel sudandi universaliter, vel discutiendi & leniendi particulariter. Vapor usitatissimè hodie in Laconico excitatur, vel ex ∇ fervente simplici aut decoctione certâ medicata, vel ex Sp. V. incenso, quorum hoc præferendum illi: mirum quantum penetret universum corporis habitum Sp. V. calor, d. subjectis humidioribus & succulentioribus, item quæ atonia Viscerum laborant magis, quam qui siccioris sunt habitus con-



venit, his enim prior modus magis appropriatus : perficitur utrumque in domunculo peculiari ligneo, notæ jam passim formæ, in qua æger ad col- lum usque erectus sedeat, dum ex fundo vapor exurgens totum alterat. Eminent hæc inter balnea sicca medicata in specie balneum ex suffitu deco- cti *cubilis formicarum*, in artuum dolore, paralyti, rigiditate & simili- bus malis : scorbuti apud nos familiari progenie, admodum laudatum : præter hoc v. cum rara sint balnea sicca Universalia medicata, saltem par- ticularia interdum vapore medicato instrui solent ; Sed nil à fotuum præscriptione differente. Saltem exempli gratia quoddam peculiare ad- dam :

*Laconicum particulare, Cruribus dolore padagrico affe- ctis : it. in doloribus illorum scorbuticis fixioribus.*

*℞. Lixivii Coriariorum, jam ab ipsis usurpati ℔ii.*

*Ur. human. ℔iii, M. D. S.*

*Euserliche Behung.*

*Ebulliant, & fiat inde suffitus pro membris dolentibus desuper situatis, & for- nicatim integumentis aptis munitis.*

§. 23. Efficacioris fotus species est.

### *Cataplasma,*

dum massa medicamentosa pultiformis parti cuidam applicatur prouso mul- tiplici. Siquidem non rarum, ut post præmissum fotum humidum, Ca- raplasma applicetur, imò ipsa decoctionis pro fotu remanentia, non raro capitur, & l. a. tractata, ut Cataplasma applicatur. Ordinario nempe sunt cataplasmata, dum subiecta appropriata, mediante lacte & oleo, ubi e- molliendum, Vino & Aceto; ubi discutiendum & attenuandum, Urina, li- xivio, ubi resolvendum ; &c. Ad talem rediguntur consistentiam, ut per fetaceum, pulpæ aut pultis forma trajici possint quæ puls Cataplasmatum cor- pus, majus vel minus, pro partis affectæ & applicationis ratione, constituit, cui pro re natâ interdum & alia desuper addi solent, oleum, mel, pulveres, Electuar : &c. eorumque plus minus, prout vel baseos vel adjuvantis locum obtinent.

*Cataplasma*

Cata  
suppurat  
flamm.

℞. Nid

excrem

leis, &

albi gr

rad. lil.

alib

fi. chan

melilor.

sem. fax

pl

al

ficun

cepa

incis. &

l. Thord

vel seri la

tionem) u

pa per seta

ol. li

ck

Cro

Vitell. ovo

M. f. Cata

D. S.

Erwelche

calide ap

teretur.

NB. femi

mitti,

lect. fari

ana. 3℔.

sunt.



**Cataplasma emolliens & suppurans abscessus & inflamm.**

℞. Nidi hirundinum interior c.  
excrement : abjectis stramine ; paleis , & ceteris quisquiliis , no , i.  
albi graci. ℥i.  
rad. lil. albor.

althea ana ℥ii.

fl. chamomill.

melilot. ana. m. i.

sem. fœnugræc.

psyllia ana. ℥ii.

althea. ℥ss.

ficuum. pingv. no. iv.

cepar. ℥ss. ad ℥vi.

incis. & contus. eoq. in s. q. ∇ com.  
l. ∇ hordei vel cerevis. vel lactis  
vel feri lactis ( pro indicationum ratione ) ad consistentiam pultis : pulpa per setaceum trajecta : adde

ol. lil. albor. ℥ii.

chamomill. ℥i.

Croci Orient. ℥ss. ad ℥ii.

Vitell. ovor. no. iii.

M. f. Cataplasma :

D. S.

Erweichender Brey : de quo q. s. calidè applicetur & quoties opus reiteretur.

NB. semina ista decoctioni addita omitti , & illorum loco pulti traject. farin : sem. lini. fœnugræc. ana. ℥ss. rad. althea. ℥i. adi possunt.

**Cataplasma contra tumorem brachii , expertusa in V. S. venâ & læso nervo.**

℞. H. agrimon.

chærefol.

chamomill. ana. m. i.

rad. symphyt. mal. ℥iii.

figill. Salomon. ℥i.

sem. lini.

fœnu. ana. ℥ss.

Coq. in s. q. ∇ ad consist. pultis : trajectatur per setaceum. D. S.

Brey wider die Geschwulst.

Instillato prius ol. destil. terebinthinae vulnuscule , applicatur calidè , addendo cuilibet portioni sub applicatione theriacali. vel simpl. vel camphor. ℥ia. q. s.

**Cataplasma ad suppressionem Urinae , in puerperâ , ob admissum incantius frigus externum à partu.**

℞. H. parietar. m. ii.

chærefol. m. i. ss.

Coq. ad mollit. pulpa per setac. trajecta , adde butyri rec. ℥ii.

oleum scorpionum. ℥ss.

M. pro Cataplasmate : calidè regioni pubis admovendo.

Subinde pulpa fructuum coctione emollita , ceu cataplasma applicatur , cui & alia addi possunt v. g.



**Cataplasma ad Bubones Pestilenciales.**

℞. H. parid. m. iii.  
rad. lil. albor. ℥i℥.  
ficuum pingv. no. iii.

Coq. inf. q. ▽ comm.  
pulpa trajecta

adde

Theriac. ℥ii.

pulv. bufonum. ℥i℥.

fuligin. Camin. ℥i.

saponis Venet. ℥vi.

c. s. q. ol. arancar. F.

Cataplasma.

D. S.

Interdum soli pulveres liquore conveniente excepti, cataplasma formant; v. g.

**Cataplasma ad tumorem testium ex contusione.**

℞. farin. fabar. ℥iii.

pulv. sem. cumin. ℥ii.

Coq. in posca s. oxycrato q. s. ad consist. pullis.

D. S.

Gertheylender Brey.

sin scrotum ab aceto pruritus aut  
rosionem sensiliorem incurrat, partum  
lythargyrii sub decoctione addi po-  
test.

Imo ipsa interdum ingredientia, propria sub consistentia aut mistione mutuâ  
in Cataplasmatibus formam coeunt, citra aliud artificium, succulenta scil. plus  
minus si fuerint

**Cataplasma contra tumores serosos, & hydropes particulares.**

℞. Cochlear. c. suis test. contus. ℥i. pulv. sem. carvi. ℥ii.

stercor. caprill. ℥iv. M. & si opus c. s. q. Vini aut posca redigantur  
ad Consist. Cataplasmatibus.

**Cataplasma contra vulnera, dolorem, percussionem oculorum.**

℞. pulp. pomor. dulc. ad mollit. coctior.  
℥iv.

mucilag. sem. cydon. c.

spermat. ranar. extr. ℥i. ℥i℥.

sacchar. albiss. ℥i℥.

camphor. parum.

M. D. pro Cataplasmate conf.

Timeus in Cas. l. i. cas. 21. p.  
48.

**Cataplasma ad hæmorrhag. Narium.**

℞. argille usta sive calcinat.

ex furno pistorio v. g. extract.  
m. ii.

† acerrimi q. s. commixta redigantur  
in form. Cataplasmi.

D. S.

Euserlicher Umschlag.

frigide immediatè fronti c. tempo-  
ribus, ac nucha cum linteo ap-  
plicatur.

Pertinet hu-  
matis form-  
ribus ac tun-  
impositum:  
taplasmatibus  
ma ex simo  
est contra

14.

Ex fermenta-  
plasmata,  
ut vocantur

Cataplasma  
pius r

℞. Fa-  
c. s.

possunt, ubi  
s.  
mis laudatu-  
Armam s.  
habet, sum-  
emolumentu-  
ca Epithem-  
Cataplasma  
cessario ex-  
spiratione  
ri loco gan-

s.  
quando a-  
unde

Per-



Pertinet huc stercus vaccinum, quod recens, seu singulare anodynum cataplas-  
matis forma imponitur, v. gr. podagrâ dolentibus: succurrit pariter aliis dolo-  
ribus ac tumoribus, præsertim cuius doli inflammatorio, vel solū c. ol. rosar.  
impositum: Sic stercus suillum, cum  $\nabla$  fervid. subactum, & abdomini instar Ca-  
taplasmatibus infertur, egregio successu, sub nimio mensium fluxu. Cataplas-  
ma ex simo equino in Vinococto, vel succus ejus c. micâ panis, secretum  
est contra Gangranam: conf. Cataplasmi compos. Barbette: Chir. l. i. c.

14.  
Ex fermento pariter solo, additis aliis quibusdam extemporanea fiunt Cata-  
plasmata, eaque propter acrimoniam vel vesicantia, vel rubificantia, adeoque  
ut vocant attrahentia & derivantia.

Cataplasmi. rubific. contra dolorem Syncipitis insignem, sæ-  
pius recurrentem, c. gravi oculorum dolore: occipiti  
s. nuclæ applicandum.

R. Ferment. acerrim.  $\mathfrak{z}$ i sem. sinapi contus.  $\mathfrak{z}$ ss. ad  $\mathfrak{z}$ vi.  
c. f. q.  $\nabla$  V. subigantur ad pulvis consistentiam  
D S.

Enstetlich aufzulegen.

possunt, ubi opus est, sem. eruc.  $\mathfrak{z}$ ii. adhuc pro stimulo addi.

§. 24. Pro Ventriculo, in ejusdem quibusvis symptomatis, pluri-  
mis laudatur cataplasma ex fermento c. aromatibus, ad imitationem *Mysf.*  
*Arman* f. 37. p. 520. & 524. sed quamdiu hæc omnia probe calent, res bene  
habet, simul verò ac parum intepuerint, offenditur tactus & cutis, unde nil  
emolumenti: expertus hæc scribo, sane eadem difficultates, quas supra cir-  
ca Epithematum usum insinuavi, premunt pariter sæpius & fatus humidus &  
Cataplasmata. Siquidem hæc tumoribus, præsertim calidis applicati, ne-  
cessario ex allegata causa pororum constipationi occasionem præbent, & tran-  
spirationem, adeo in iisdem necessariam, impediunt, repellunt, & nervosio-  
ri loco gangranam citius accerunt. &c.

§. 25. Communissimus usus externus, Infus. & Decoctor. est,  
quando aptis instrumentis certis quibusdam cavitatibus injiciuntur,  
unde

In-



*Injectiones sive Enemata.*

it. *Lavamenta* s. *Clysteres* & *Clysmata*, ibi secundum Latinos, hic secundum Græcos dicuntur, quamcunque in partem injectio fiat. Cum v. à potiori ac usitatiori fieri soleat denominatio, propter infusionum talium in anum ac intestina; ceu generalem corporis cloacam, crebritatem, *Clysmatis* ac *Enematis* vox ferè his saltem hodie tribuitur, cui consuetudini & nos cedimus. In *Clysmate* ergo 2. considerata, 1. decoctus liquor, 2. addenda, vel dissolvenda in eodem, ex quibus emergens compos. ad ℥i. p. p. ascendat in adulto, rarò ulterius ad ℥xv. infanti ℥ii. ad ℥iii. pro corporis ratione sufficiunt. Decoctum ipsum, præ supra dictis, nil peculiare obtinet. Addenda sunt: Electuar. alterativ. aut laxativ. ab ℥i. ad ℥ii. mellia a ℥vi. ad ℥i. ol. coct. vel infus. ab ℥℥. ad ℥℥. ol. destil. à ℥i. ad ℥i, ☉ stimulaus vel alterans à ℥℥. ad ℥i. subinde etiam Vitell; ovor. no. i. l. ii. adjiciuntur. Quod si plura addenda simul fuerint, & horum respectiva proportio attendenda, ut ex omnium miscela una dosis completa pro usu intento exsurgat: qui in genere est triplex: *vel* intestina stimulare & plus minus purgare, *vel* eadem demulcere, *vel* contenta in iisdem temperare ac alterare: Quibus ceu 2darius ac accidentarius accedit, aliis partibus variis, ob consensum, diversimodè prodesse: superstitiosus de cætero est delectus cephalicorum pectoralium, nephriticorum, hysteri-corum &c: qui in clysmatum præscriptione subinde instituitur; cum per consensum saltem aut deuteropatiam, vel per quandam consequentiam aliis parti-bus auxilium ab iis afferatur. Injiciuntur tepidè, vel una, vel duplici vice pro excrementorum; flatuum, podicis plus minus dolentis &c; respectu, semper tamdiu si possibile retinendo, donec usui satisfecerint. Instrumenta ferè sunt triplicia: Vesica suilla, cum parva fistula, apud nos Germanos, siphon amplius, apud Gallos, Instrumentum *Graffii Tr. de usu Clyster.* apud Belgas, magis usitatum. Optimum videtur hoc Graffii instrumentum, ab eo tamen non descriptum: forsan imitandum, si intestinum quoddam longius & æquale avis cujusdam, debito balsamo vel therebinthinato, vel ☉ ☿ vinofo &c. condiatur & aprè tractetur, hinc filo æneo & panno sericeo obvolvatur &c. Clyster ex fumo Tabaci Anglorum, ceu Anomalus, huc non pertinet. De fumo Tabaci dico, nam qui ex decocto Tabaci; aliis additi, parari posset, sum-mè periculosus est, cum usum ejus subitò: ac modo applicatus fuerit præcor-diorum anxietates, lypothymias, sudores circa frontem frigidos, totius fera-lem quasi pallorem, aliaque similia symptomata insecure fuisse, nove-rim.

Cly-



*Clyster Carminativus in Colicâ flatulenta.*

℞. H. chamomill.  
menth. ana m. j.  
bacc. laur.  
juniper ana ℥℥.  
sem. fœnicul.  
anif.  
carvi ana ℥ij.  
℞ tart. ℥ijj.

incis. & contul. coq. in f. q. ▽ simpl. vel ubi ℞ tart. non additum fuerit  
in f. q. □ human.

Colat. ℞. ℥ ix. adde.  
Elect. de bacc. laur.  
℥vj. ad. ℥j.  
mell. rutac. ℥℥.  
℞ destil. bacc. laur. ℥℥.  
ad ℥j.

M. pro Clysmate. D.

*Clyster fortiter stimulanſ v. g. in Apoplex passion.  
hyst. graviore &c.*

℞. H. salu.  
fl. chamomilana. m. j.  
rad. pyrethr. ℥℥. ad ℥vj.  
pulp. Colocynth. in pet. lig. ℥j.

(alias subtiliss. ramenta, horrenda tormina inferunt, & aliquandiu post  
se relinquunt: quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuisset)

Coq. in f. aq. Comm. Colat. ℞. ℥ ix. adde  
Elect. hier. picr. ℥j.  
mell. anthos. ℥vj.  
castor. ℥j.  
℞ gemm. ℥℥.

M. pro Clysmate. D.

De Electuar. Purgant. Clysmatis additis dubitatur merito, an cujusdam usus  
sint: siquidem antequam textura crudorum purgantium resolvatur ita, ut se  
commode explicare & insinuare parietibus intestinorum queant, diu erit, quod  
jam Clyisma rejectum denuo fuerit. Ob id potius ipsa fortiora purgantia in-

† aa

fun-



fundantur, vel decoctum Croci metall. in vino, aut  $\nabla$  bened. officinal.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . syr. aut emeticus sal. ad  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . decocto jam colato adduntur, præsertim ubi præsentanea magis ope opus fuerit.

*Clyisma anodynum, antidyfenterium.*

$\mathcal{R}$ . fl. verbasci. m. ij.  
sambuc. m. j.

Usitatio hic fuit Clysmatum præscribendorum modus: interdum verò sola fluidorum miscelâ, clyster conficitur, citra alios labores v. g.

Cap. papav. cum sem. no. iij.

concis. & contus. coquantur in f. q. lactis bubuli chalybeati :

Colat.  $\mathcal{R}$ .  $\text{lbj}$ .

adde

sevi Cervin. l. hircin.

in Vitell. ovi dissol.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . ad  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .

M. f. Clyisma.

Loco Capit. papaveris commodè etiam Philon. Rom.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . aut theriaces non adeò vetust.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . addi possunt.

*Clyster temperans & anodynus polychrestus.*

$\mathcal{R}$ . Lactis bubul.  $\mathfrak{z}\text{ix}$ . ad  $\text{lbj}$ .

therebinth. Venet. in vitell. ovi dissol.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

ad  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .

mell. rosat.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . ad  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .

M. pro Clysmate.

Sane therebint. additio, plus in recessu habet, ex tali enim Clysmate paulo diutius retento,  $\square$  intensè violas spirasse, in puerpera olim notavi. Imò solum lac, cum pauco addito saccharo, vel cinere clavellato aut pro ratione, Elect. lenitiv. vel de bacc. lauri, jam pro Clysmate anodyno, in scorbuticis præsertim abdominis malis, inservire potest. Ut nihil dicam de Clysmate ex solis oleis, sub secum induratione, aut pertinaciori alvi occlusione usitato.

$\mathcal{R}$ . ol. rapar. lini. ana  $\mathfrak{z}\text{iv}$ . ad v.

diacolocynth.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . M. pro Clysmate. D.

§. 26. Juxta injectiones in Intestina, frequentiores cæteris sunt istæ in os, pro regionis hujus, & faucium, ac partium conterminarum levamine, variis sub eorum malis, & in genere

Garga-

dicuntur,  
adduntur,  
di modus,  
notus est.  
clymatis i  
partem aff

Garg

Sanè loco  
vel avenac  
aut calefa  
superat.  
Colatur.  
ac contra  
 $\mathfrak{z}\text{j}$ . addi

Cog.



## Gargarismata.

dicuntur. Fiunt frequentius ex decocto appropriato, cui pro re natâ adhuc alia adduntur, omnia in quanto mediocri, nisi crebrius eodem uti conveniat. Uten- di modus, sive eluendo, sive gargarizando, sive cum siphone injiciendo fiat, notus est. Præscribendi aut miscendi modus præ aliis decoctis in genere, aut clymatis in specie, nil singulare obtinet, nisi in quantum judicium Medici ista ad partem affectam specialem certo applicare norit.

*Gargarismus resolvens & discutiens in principio inflam-  
mat : faucium, aut tonsillarum, &c.*

℞. rad. levistic. ℥vj.

apii. ℥ij.

fl. sambuc. m. iß.

fol. malv. m. j.

passul. maj. incif. ℥iß.

Coq. in f. q. ▽ comm. l. ▽ hordei:  
valis opertis.

Colat. ℞ ℥ß.

adde

☉ \* depur. ℥ß. ad ℥j.

M. pro Gargarismate.

D. S.

*Bertheilend Gurgelwasser.*

Sanè loco gargarismatis domestici optimè in his casibus convenit decoct hord. vel avenac. in quo parum ☉ \* dissolutum est, imò soli ☐ humana, calida aut calefacta loco gargarismatis adhibita, subinde artificiosissimè composita superat. Superior gargarismus magistralis mutari etiam, & loco passul. maj. Colatur. Mell. ꝑal. ℥j. ad ℥ß. spir. V. theriacal. ℥vj. ad ℥j. (aut si malignum ac contagiosum videatur malum, spir. V. camphor. ℥ß.) spir. ☉ \* ℥ß. ad ℥j. addi possunt.

*Gargarisma anodynum & maturans in statu  
istarum inflammata,*

℞. H. malv.

melilot. ana. m. j.

rad. altheæ. ℥j.

ficuum pingv. no vj.

Coq. in f. q. Lactis, aut ubi ardor & inflammatio intensior, in sero lactis.

† aa 2

Colat.



Colat. ℥. ℥i ss. ad ℥i j.

Et vel nudè ita usurpetur, vel addito syrupo violaceo, aut mell. despumato paucò, adhibeatur. Sin suspicio sit materiam suppurandam pituitosiorē ac viscidiorē existere, saponis Veneti nonnihil una incoqui potest: quod etiam locum habet ubi citius maturare abscessum est animus.

*Gargarismus in loquela amissa post Apoplexiam.*

℥. H. saly. rosmarin. majoran. ana. m. j.  
rad. pyrethr. ℥iij. ad ℥ss.  
sem. Eruc. sinapi ana ℥i ss.  
caryophyll. ℥i Coq. in s. q. aq. comm. Colat. ℥. ℥x. ad ℥i j.  
adde

☞ Ceraf. nigr. vel bacc. juniper ℥i ss.  
☉ \* c. ☿ a. ℥iij. mell. anthos. ℥vj.  
M. D. S.

Misturæ sum Munde.

*Gargarismata, contra scorbutum oris.*

℥. h. saly.  
cochl. ana. m. ij.  
Coq. in s. q. lactis vel ejus seri.  
Colat. ℥. ℥i j.  
adde  
succo Coch. ℥ij.  
syr. aquileg. ℥iv.  
M. pro collutione oris.

℥. h. saly. m. i ss.  
fl. malv. hortens. rubr. m. j.  
rad. polypod. ℥ss.  
Coq. in ℥i j. ∇ fontan.  
Colat. adde  
mell. rosat. ℥i ss.  
☉ usti. ℥i.  
☉ iat. l. ☉ depur. ℥i ss.  
M. D. S.

si serum lactis sumtum fuerit, spir. sal. ℥j. vel q. s. addi poterit.

Subinde

Subinde v  
bilium ex  
gargarism  
faucium i  
faucium  
sufficit:

☉.  
res, præte  
neribus,  
in genere  
per Cath  
do differ  
selectum

Imò sol  
saccharo  
ventioni



Subinde verò citra laboriosam præparationem simplex liquor, aut saltem miscibilium extemporanea unio,  $\nabla$  is destillatis hic potissimum inservientibus, ad gargarismum constituendum sufficit: nam decoctum raparum siccarum in faucium inflammationibus, in incremento & statu optimum. Lac in asperitate faucium, earumque phlogosi cum paucò saccharo, vel  $\odot$  interdum abunde sufficit: vel

*Gargarisma in nimia salivatione.*

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  prunell. semperviv. ana.  $\text{℥ss}$ .  
tinctura bellid.  $\mathcal{Zj}$ . alum. ciud.  $\mathcal{Zss}$ . ad  $\mathcal{Dij}$ .  
styr. rosar. rubr. l. myrtill.  $\mathcal{Zss}$ . ad  $\mathcal{Zj}$ .

M. pro Gargarismate.

§. 27 Fuerunt hi modi præscribendi injectiones in Praxi frequentiores, præter quas alijs partibus, earumque cavitatibus vel naturalibus l. p. n. vulneribus, ulceribus sinuosis, fistulis: &c. injectiones variæ adhibentur: nunc in genere *sphonis*, ope, nunc in specie in uterum per *Metrenchytem*, in Vesicam per *Catheterem* &c. in quibus omnibus nulla ab antecedentibus in præscribendo differentia, nisi in quantum partis affectæ, & affectus ipsius ratio, materiæ selectum & quantum determinate plus minus solet.

*Injectio in Vesicam exulceratam, it. in mictu cruento & purulento. &c.*

$\mathcal{R}$ . h. Agrimon. plantag. ana. m. j. liquirit. mund.  $\mathcal{Zss}$ .  
Coq. in  $\nabla$  ferratior.  $\mathcal{Zix}$ . ad  $\text{℥ij}$ . ad  $\mathcal{zix}$  p. calum.  
Colat.  $\mathcal{R}$ .  $\text{℥ss}$ . ad  $\mathcal{Zviij}$ . adde  
Mell. rosar.  $\mathcal{Zj}$ . Ess. resin aloës cum spir. V. extr.  $\mathcal{Zss}$ .

M. pro Injectione S. Hestende Einsprügung.

Imò solum lac, cui therebinthina cum Vitell. ovi soluta permistâ, cum paucò saccharo sufficit: pro leniendi scilicet scopo & temperandi, dum istud magis intentioni purificandi inservit.

*Injectio in Penem, in Gonorrhœa Malignâ.*

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$   $\Psi$ æ  $\mathcal{Zij}$ .  
aloës hepat.  $\mathcal{Zss}$ .  
vel ejus loco

†aa 3

Essent.



*Idea prescribendarum Formularum.*

Essent. aloës ℥iii.  
mell. rosat. ℥ss. ad ℥vi.

M. S.

*Essentielle Mistur zum Einsprühen.*

Malum ubi pertinacius fuerit cum vel sine aloë & dulc. simul. addendus, ℥i.  
℥i. ad ℥ss. imminuendo mel ad ℥iii. p.p.

*Injectio in Uterum: tam hæmorrhagiâ nimia, quam  
fluore albo affectum.*

℥. Visci quercini. ℥i.  
cortic. granator. ℥i.  
alum. thuris ana. ℥ss. mastich. ℥ii.  
balauft. fl. ros. rubr. ana. m. ss.

(in fluore albo ligni sancti ℥iii. illius loco capere amant.

Infund. in ∇ comm. ℥ii. macerentur per 24. horas, ebulliant lento Δe ad medias, addendo sub finem Vini rubri, austeri, ℥bi. Colat. D. S.

*Anhaltende Einspritzung.*

Pertinet huc injectio in nares, in nimia earum hæmorrhagia, vid. Misc. Acad. Nat. Cur. ao. 2. p. 323. In quem Narium usum de facili decoctum magistrale præscribi posset, simile decantato illi liquori Styptico de la Vigne Galli, v. g.

℥. alum. ℥li. ana ℥i. Phlegmat. ℥li. ℥i. ad ℥ss.  
ebulliant ad dissolut. contentor. Liquor. filtratus  
Spir. ℥li. aliquot gutt. adhuc aciduletur: D. S.  
Blutstillendes Wasser.

*Vel in mistura extemporanea.*

℥. alum. crud. ℥ss. terr. ℥li. dulc. gr. xv. ad ℥i.  
Phlegm. ℥li. spir. ℥li. nonnihil acidul. ℥ss. ad ℥ii.

M. D. injiciantur naribus. &c.

Sed forsan spir. V. per se rectificatus, naribus paulo profundius injectus, omnibus his præstat: siquidem ab illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus & adhuc recens, citissimè, mirabili c. spectaculo coagulari solet.

Pro auribus denique similes injectiones fiunt, nunc laboriose ex decoctis, nunc simplici modo concinnatæ: v. g. injectionem contra Vermes, ex decocto, v. Barbette: Anat. Pract. l. 2. c. 1. p. 110: vel sola ☐a, aut Phlegma spir. ☐æ, in ulceribus aurium crebrius injectum confert: in malo v. graviori:

℥. Aristoloch. rotund. cortic. granator. gallar. ana. ℥ss.  
Coq. in ana. V. & ∇ ferratæ: ad ℥ss.  
Colat. adde succi plantag. polygon. ana. ℥i.  
mell. rosat. ℥ss.

M. &

M. & injic  
requiratur  
poterit.

U  
nistra  
externis a  
ut Ungu.  
obs. 22. p.  
Basil & C  
constituun  
plus minus  
fella, refina  
cabilia. C  
plura amph  
struis solub  
incluso co  
tates respo  
sæ, ut pix  
quod ob v  
trionale au  
existit: ade  
resinam ha  
piceam pa  
terdum, u  
dinaria &  
non raro p  
tallici & m  
& ✕ pete  
nec quicq  
cularem te  
cessu, aqu  
optimè so  
butyro an  
ur. Misc



M. & injiciantur pro deterfione & cicatrificatione: fin potentius deterfivum requiratur, Vir. Aer. parum v.g. ʒss. ad ʒi. addi, & repetita colaturâ adhiberi poterit.

## CLASS. V.

## Inunctiones varias comprehendit.

## S. I.

Ultima Classis generalis præscriptionum usitatarum externa saltem subministrat, illa, quæ inunguntur, & unguinosa ac glutinosa consistentia partibus externis adhærent: paucissima enim talia sunt, quorum internus etiam sit usus, ut Ungu. rubr. potabil. ballamus Fœniculi *Horstii obs. l. 2. obs. 42. p. 109. & l. XI. obs. 22. p. 558.* Sed hæc particularia & planè singularia nos non remorantur: *Basin & Constitutum* omnium externarum inunctionum, ferè ☉ & Cera constituunt: illi cujus 3plex alias nota est differentia, analoga sive congenera, & plus minus miscibilia censentur butyrum, pinguedo, medulla, axungia, sebum, fella, resinæ molliores, saponēs, utpote facili Δe liquabilia, & ☉ instar applicabilia. Cera v. accensentur colophonia, resinæ spissiores, gummata, quorum plura amphibia videntur, dum & in Δ & ∇ vivunt, s. ☉is ac ∇os is menstruis solubilia existunt, quod ex mistione duplicis substantiæ gummosæ, cum incluso copioso nucleo resinoso accidit, tamen ob consistentiam, & proprietates respectu Δ & nostri ad ceram referuntur, non secus ac aliæ resinæ spissæ, ut pix quævis &c. Therebinthina medio intercedit loco, & præter hoc quod ob vires suas egregias, ob quas merito balsamum Europæum s. septentrionale audit, polychresta sit, utrisque & ☉is & cereis subjectis sociabile existit: adeò ut gummatiss, & reliquis unniendis optimè interserviat: ut taceam, resinam hanc, & copiosum subministrare ☉, ceram duriusculam, & quasi piceam pariter suggerere: vinculi ergò instar, hæc interdum considerari, interdum, ubi ingredientis primarii vice defungitur, ad ☉a referri debet. Ordinaria & potiora hæc inunctionum sunt ingredientia, quibus extra ordinem, non raro penitus supervacaneè alia adduntur, ut pulveres varii, primariò metallici & minerales, hinc & vegetabilium, quin & succi vegetabilium, (quo & ✕ pertinet) tamdiu ob ∇ei cum ☉o incompatibilitatem, coquendi, donec quicquid fuerit aquei, exhalaverit. Denique & mel, concretum, ob particularem texturam, respectu hæctenus recensitorum, sui generis, ☉sum in recessu, aquosum tamen & gummosum in superficie, ob id vegetabilium succis optimè sociabile. Mucilagines denique Vegetabilium quorundam, quæ & butyro animalium, adeoque ☉ vegetabilium hoc in passu analoga ferè habentur. Miscentur hæc ingredientia, vel sine vel cum igne: Sine igne simpliciter

per



per tritum, species cum ol. in mortario subigendo, sensum ol. affundendo, & ita tritum continuando, donec debitam consistentiam acquisiverint, quod nutritum alias dicitur: & in Empl. Tria Pharmaco Mesue locum invenit: cum igne, ol. & ceræ invicem liquatis alia addendō, miscendo, interdum etiam ubi opus est colando: cujus exempla passim præstant.

§. 2. Prout jam variat ingredientium horum proportio, etiam coalescens inde variat inunctio: Dum enim  $\text{℞}$  sola, aut cum illorum  $\text{℥i}$ . ceræ  $\text{℥i}$ . pulverum  $\text{℥ss}$ , miscentur, *Linimentum* dicitur: dum vero 2plum modo dictorum ad  $\text{℥i}$ .  $\text{℞}$ lorum sumitur, *Unguentum* appellant. Ex opposito ubi Ceræ est præ eminentia, ita ut Ceræ  $\text{℥i}$   $\text{℞}$ ,  $\text{℞}$   $\text{℥i}$ , pulveris  $\text{℥i}$   $\text{ss}$  ad  $\text{℥ii}$  coeant, *Ceratum* audit: sin v. Ceræ &  $\text{℞}$  ana.  $\text{℥i}$ . pulv.  $\text{℥ss}$ . in genere misceantur, *Emplastrum* habebitur, cui tantum non omni therebinthina, proportionē moderata solet addi: quod si emplastro liquefacto immergatur linteum, cujuscunque figuræ, ita ut utrinque eodem obducatur, *Spanadrapum* dicitur. Uno nomine, magna hic, dere exili, fabula: promte enim ex Unguento Linimentum, ex utroque additione Ceræ, Ceratum, hinc cum therebinthina emplastrum, & ex hoc per copiam olei unguentum fieri potest. Quod si pix baseos locum occupet in Emplastro, egregiè hinc penetrante & resolvente, *Picatio*, it. *Dropax* appellatur.

§. 3. Linimenta facilimæ sunt præscriptionis, quæ si ex ol. fiant destillatis, convenientē corpore exceptis, ( alias acrimonia sua pruritum, pustulas, ardorem excitant ) quod usitatius est oleum nucistæ expressum, balsami magistrales vocantur, ad officinalium differentiam, quæ fere olea destillata composita esse solent.

### *Linimentum s. Balsamum Stomachale.*

℞. Ol. destill. juniper.  $\text{℥i}$ . menth.  $\text{℥ss}$ .  
macis, caryophyll. ana.  $\text{℥ss}$ .  
cinamon. gutt. v.

e. l. q. ol. nucist. express. F. Balsamus.

D. S. Magen Balsam.

Inungitur siue alio apparatu regioni ventriculi, præsertim isti, quam scorbiculum cordis vulgo appellant & latere probe calefacto desuper imposito, vis penetrativa oleorum destillatorum animatur, ut eò citius & potentius interiora versus penetrarent. Non est particularum volatilium harum interior penetratio de nihilo. Memini aliquando, ex tali balsamo applicato, ob crebriorem vomitum, ægrum à me interrogatum, cujus qualitatis & saporis sint ista rejecta, respondisse, percipere se in iisdem eundem saporem, qualem odorem ex Linimento applicato, alias perciperet.

*Lini-*



*Linimentum contra gravedinem & narium obstructionem.*

℞. Ol. irini. Nicotian. ana. ℥i.  
nigell. per express. ℥℥.  
destill. majoran. anis. ana. gutt. ii.

M. F. Linimentum. D. S. Eröffnend Sälblein zur Nasen.  
Quo nares crebrius internè inungantur. olea, quodocunque absolute praescribuntur, per infus. aut decoct. intelliguntur.

*Linimentum contra dolorem Pleuriticum.*

℞. Pingued. murment. ℥℥.  
liquefact. adde  
oleum chamill. ℥ii.  
absinth. ℥i.  
destill. cumin. ℥℥.  
croci. ℥i. camphor. ℥℥.

M. F. Linim. D. S. Linderend Sälblein.

*Litus Carminativus.*

℞. Ol. chamomill. anethi. ana. ℥ii.  
destill. chamomill. anis. carvi. lauri. ana. ℥i.  
c. f. q. ol. nucist. express. F. Balsamus: vel  
c. f. q. ceræ: aut Empl. de bacc. laur. F. Unguentum.

quibus si addatur gumm. Tacamah. c. f. q. thereb. malaxata, F. Emplastrum. D.  
Non rarum est unguenta recipi officinalia, & additione olei appropriati, aliorumve, redigi in linimenta.

*Linimentum somniferum.*

℞. Ol. express. papav. alb. ℥ii.  
hyoscyam: ℥℥.  
M. D. S. Euserlich Delzum Schlaff.  
vel c. f. q. Ungu. alabastrin. ℥iii.

F. Unguentem D. S. Schlaff Sälblein.

*Linimentum in dolore Nephritico.*

℞. Ungu. de althea. ℥i ℥.  
ol. lil. albor.  
amygd. dulc. ana. ℥℥.  
scorpion. ℥iii.  
petrol. alb. ℥i ℥.  
ol. dest. juniper. ℥℥.

M. F. Linim. D. S. Stillend Sälblein.

† bb

Inter-



Interdum alia, modo sub mistione debitam consistentiam acquirant, in Lini-  
menti formâ præscribuntur.

*Linimentum ad pediculos.*

℞. pulv. Coccul. de Levante,  
vel

rad. gentian. ʒiʒ.

helleb. alb. ʒʒ.

c. f. q. ol. nicotian. F.

Linimentum. Irrorentur sub mistione aliquot gutt. ol. destill. spicæ.  
F. Linim. D. S.

*Sâiblein gegen das Ungeſteffer.*

*Linimentum contra Lumbricos.*

℞. Aloës hepat. ʒii.

myrrhæ. el. ʒʒ. ad ʒii.

c. f. q. fell. tauri subacta D. S.

*Wurm Sâiblein.*

Frustulæ vesicæ bubulæ l. suillæ, palmæ magnitud. superinducitur, & ita um-  
bilico applicatur: relinquendo quandiu adheret.

*Contra Odontalgiam & junctam Hemicraniam.*

℞. Theriac. Androm. Tacamah. c. 4ta sui parte balsam.  
peruvian. malax. ana. ʒʒ. D. S.

*Stillendes Sâiblein.*

Inducitur in mediocri consist: super linteum & applicatur universæ malæ dolen-  
ti: quod si phlogosis quasi erysipelacea adsit, omiſſa Tacamah. & absinth. ad ʒi.  
c. Theriac. ʒʒ. vel ʒvi. subigi & ita admoveri possunt.

§. 4. Unguenta quod attinet præscribendi modum, cum hæc majoris  
subinde sint apparatus, ac tardius ob id perficiantur, ordinariò ferè unguentum  
quoddam officinale recipitur, & aliorum additione proportionatâ, affectui  
conveniens redditur:

*Unguent. contra scabiem expertum.*

℞. Ungu. Enulat. ʒi. fl. æ. ʒii. & tart. ʒi.

c. f. q. ol. nicotian. F. Unguent. D. S.

*Reintgend Sâiblein.*

Quod si loco p̄is, & sociandi ipsi semper alcalisati recipiatur & dulc. ʒi. ad ʒii.  
iisdem & longe pluribus usibus, in affectibus cutaneis hoc ipsum inserviet.  
Utrinque saltem articulationi crurum, circa genua & poplitem, ac brachiorum,

circa

circa cubit  
illinitur: id  
manè v. m.

Melli ad ig  
illinitur  
vel alio si  
sufficiente  
Deckers. c  
contra (con  
magistrale

§. 5  
fiolem ap  
dientibus  
(Parchen  
buntur, v  
jus Arche  
cenda. I  
medicati  
quibus un  
pustulæ, e  
piolius re  
v. prius a



circa cubitum & carpum, in graviore malo, etiam circa digitorum interstitia illinitur; idque saltem vespere sub introitu lecti, partes à frigore bene muniendo, manè v. manum ☐ à calidâ abluendo.

*Unguent. in dolore caput febrili.*

℞. Unguent. alabastrin. ℥iii.

Philon. Rom. ℥ß.

ol. nucist. expressi gr. ix.

M. F. Ungu. D. S.

Salblein zum Schlaffen.

*Ungu. contra scorbutum oris, aut cognata symptom.*

℞. Pulv. rad. bistort.

fl. balauft.

ros. arbor. ana. ℥i.

myrrhæ. el.

O ust. ana. ℥i. ad ℥ß.

mell. rosat. q. s.

Melli ad ignem liquefacto calenti inspergantur sensim pulveres, M. F. Unguent. illinuntur gingivæ hoc ipso bis l. ter de die præsertim à pastu, deinde Vino rubro, vel alio simplici abluantur. Imo mel solum depuratum aut rosat. c. ☐ ☉ ad sufficientem acorem tinctum, ceu optimum Linimentum laudatur. vid. Deckers. comm. in Barbette l. 3. c. 3. p. 156. ubi de scorb: elegans ibi Linimentum contra scorbutum oris: Sicut ipse Barbette. l. 3. Chir. c. 6. elegans unguentum magistrale per fritionem in butyro contra ambusta describit.

§. 5. Emplastrorum par ferè, ac Unguentorum est ratio: Ob laboriosorem apparatus Officinalia recipiuntur, & vel sola, vel additis aliis ingredientibus, oleo vel liquore simili, ut eò commodius alutæ vel linteo crasso (Parchend) superinducantur, malaxata, in sua massa, pro repetito usu præscribuntur, vel certâ sub figurâ, aut notâ, ex partis affectæ ratione, aut ignotâ, cuius Archetypus in charta simul transmittitur, ad cuius imitationem alutæ inducenda. Ipsum Emplastrum vel cuti immediate applicatur, pro meliori odoris medicati penetratione & operatione, vel mediatè, idque nunc in delicatioribus, quibus unguinum cuti adhesio molesta est, nunc in neutris, & quibus pruritus, pustulæ, excoriatio, phlogosis &c. per emplastra, præsertim quæ gummata copiosius recipiunt excitatur: Sin posterius, syndone obducenda præcipiuntur, si v. primus, absque syndone: Mihi ferè media placet via, ut saltem circa margi-



nem, ad latitudinem digiti transversæ syndo assuatur, uti ita intentioni Medici therapeuticæ, & Cosmetices ægri studio satisfiat: ut ut supra allegata incommoda minus hoc modo evitari queant, minus tamen defluere hoc modo molliora emplastra à partibus, & facilius separari, quæ tenacius adhærent, solent. Calidis postmodum linteis vel lateribus operatio promoveatur.

### Emplastrum stomachale.

℞. Empl. stomach. Craton.

gumm. tacamah. ana. q. s.

malax: c. s. q. ol. stomachal. Crat. inducantur super alutam, fiat scutum stomachale in formâ usit: absque syndone: irroretur ol. destill. menthæ D. S.

Magen Pflaster.

### Contra Cardialgiam, Emplastr. Magistr. & ob id simplicius.

℞. Gumm. Tacamahac. vel Carennæ: ʒi. s. l. q. s. l. part. iiii.

bals. peruvian. ʒss. l. part. i.

malaxata probè inducantur super alutam. F.

Scutum stomachal: obduc, syndone rubr.

D. S.

Berthellend Pflaster.

### Emplastrum ad passionem hystericam.

℞. Empl. matric. de galban. usit. p. ii. s. ʒi.

gumm. galban. in ✱ solut. p. i. s. ʒss.

malax. c. s. oleum castorei, inducantur super alutam F. Emplastr. rotund. in forma orbis medii vel paulo amplius, absque syndone: irroretur ol. destill. succini. D. S.

Mutter Pflaster.

### Aliud magistrale.

℞. Gumm. galban. in V. l. ✱ ad pult.

consist. liquef. q. s. l. ʒi ss

extract. castorei.

croc. ana. ʒi.

ol. destill. succini.

spicæ. ana. ʒi.

M. in consist. Emplastri induc. super alutam. &c.

Em-

malax. c. s.  
Empl. in

℞. Minii  
tur cum o  
benè mite  
subacta. q

℞. Minii  
diu in dig  
tione, in e  
mento sup

℞. picis  
chamom

M. indu  
vel, in fo

Egregiun  
onerum  
nus læde



*Emplastra pro Splene, dolente, tumido. &c.*

℞. Empl. splenetic. us.

de Ran. cum duplic. ꝯ ana. q. s.

malax. c. s. q. ol. destil. succini aut galban Paracels. inducatur super alutam F.

Empl. in forma pro splene usitata absque syndone. D. S.

Mist. Pflaster.

℞. Empl. de Ran. cum ꝯ dupl. ʒj.

gumm. ammon. cum acet. ad pult. consist. red. ʒss.

Opii in acet. sol & inspiss. ʒss.

Malax. c. s. q. ol. destil. juniperi vel Philosophor. F. Em-  
plastrum &c.

*Emplastrum Huiusmodi pro usu externo vario.*

℞. Minii vel Huiusmodi calcinati q. v. ebulliat in s. q. ✕ quod calidum ita misceatur cum ol. amygdal. d. l. rapar. l. lini recent. continuò agitando, & nutritus benè miscendo: F. Unguentum (addendo circa finem camphor. cum ol. simili subacta. q. s.) cum cerâ v. unâ liquefacta. Emplastrum.

*Aliud, rudiori Minerva elaboratum,  
sed usu præstans.*

℞. Mini. ceruss. acet. vini, ol. comm. ana q. v. mista invicem stent aliquan-  
diu in digestionem crebrius agitando, tandem calore aucto sub continuâ agita-  
tione, in emplastr. consist. inspissando, & dum liquidum adhuc erit à crassa-  
mento superfluo in fundo removendo.

*Emplastrum ex Pice seu Dropax, contra dolo-  
Ischiadicum.*

℞. picis naval. ʒij. therebinth. ʒij. liquefactis & ubi opus fuerit adhuc cum ol.  
chamomill. q. s. subactis, adde successive inspergendo & benè agitando  
pulv. succini mastich. ana. ʒj. fl. ꝯ. ʒii.

M. inducantur super alutam aut linteum crassum in forma quadrata oblongâ:  
vel, in formâ transmissâ: absque syndone. D. S.

Zertheilend Pflaster.

Egregium in Ischiade, ut & in doloribus circa os sacrum, ac Ischium, ex nimia  
onerum gestatione, aut simili causa externâ internum partium nexum plus mi-  
nus lædente, natis, præscriptum ad Imitat: Poterii, Cent. 2. c. 13. & c. 58.

† bb 3

§. 6. Equi-



§. 6. Equidem hæc ita pauca satis esse videntur, quoniam verò vix ulla in compositione plures errores committi videntur, quam harum inunctionum, pauca quædam adjicere allubescit. Usus omnium harum inunctionum, seu Topici saltem remedii, adeoque particulari tantum cujusdam privatae usui destinati in genere triplex esse videtur: 1. Robur partis Vitale, in spiritu infundatum, vi quasi balsamica firmare & roborare. Ab illo enim efficienter, ut nutritionis medio, partis conservatio ita & restitutio, unde vulnere ulcerum, fracturarum, plurium tumorum curationes. Nil vero magis huic inimicum est, quam transpiratio prohibita, undecunque oriunda hæc enim ipsius tertiæ digestionis sordes principaliter evacuantur, quibus retentis, æconomia partis turbatur, spirituum motus sufflaminatur, tandem ipsis quasi suffocatis, gangræna inducitur. 2. Robur partis: animale in *Eutonia* Fibrarum, mediante spiritu infuso conservare, quin imò, *relaxatam* illam, roborare, & appropriatis humiditatem lymphatico-serosam discutere & absumere: nunc *contractam* blande lenire, & quasi rigidiores fibras emollire, & denique *vitiatam* in dolore, cui semper aliquid spasmodici plus minus solet esse junctum, demulcere, & spirituum sedato, undecunque nato Orgasmo, in naturalem tonum restituere: unde emollientia & anodyna, sæpius solent esse reciproca. Rarum est, quod irriteretur tonus fibrarum acrioribus, unde ex illarum strictura & pororum contractura modificato contentorum motu, effectus attractionis, rubificationis, vesicationis &c. ferè insequi solent. 3. Heterogeneum istud, aut p.n. topicorum affectuum occasionalem causam, corrigere & alterare, sive temperare & coquere, hinc & plus minus remove per illa, quæ humectare, resolvere, attenuare, maturare, suppurare &c. dicuntur: in quo puncto, acidum quæ corrigunt, & hinc viscidum resolvunt ac attenuant, tantum non primatum obtinent.

§. 7. Quibus præsuppositis, 2. in legitimâ inunctionum, si non omnium, saltem usitatorum compositione, & præscriptione, observanda moneo. 1. ut ex Volatili sive faciliè resolvable consistant materiæ: 2. nihil iis admisceatur, quod nequeat per totum homogenealiter resolvi, id quod *Hellmont.* imprimis inculcat: *Pharmac. & dispens. modern. §. 57.* Prius quod attinet, agunt in nos inunctiones vel mediate, vel immediate: ibi odorum instar penetrantium, hic contactu suo corporali: ibi in affectibus externis vel internis, sed profundius radicatis: hic in externis. Hinc enim passim pro ventriculi &c. malis, ol. destil. recipere consuetum est, cum externa in inflammatione, hunc quoddam emplastrum, aut pulv. ex Creta Hno &c. ut in Erysipelate inspersus, magis in usu sint. De prioribus E. ut imprimis intelligendum axioma, tamen & in posteriori quantum possibile observandum. Siquidem cujuscunque intentionis gratia applicantur inunctiones, semper pororum occlusio præcavenda, qua superveniente necessario Oeconomia vitalis partis privata turbatur.

Ergo

Ergo vitæ  
nunt & pe  
tim ipsa  
pediunt.  
aperientia  
ciendo su  
Burrho fa  
hujus epis  
ut unguen  
quod crass  
in agris n  
quibus m  
nempe in  
verum. ob  
resolubili  
inveniti p  
simul hinc  
te, sub det  
citra fixat  
cujusvis a  
causam, p  
presso, pu  
illud este  
promptius  
& potenti  
randi, var  
Comment.  
cum thet  
cum spir  
crassamen  
quod cur  
bit, & a  
terit: ten  
L. o vo  
tariolo la  
citationi  
cii, succe  
idque faci  
cum ol. r



Ergo vitanda sunt nimis, unctuosa, viscosa, glutinosa, tenacia quæ poros obli-  
nunt & pertinaciter infarciunt, unde præter modo inlinuata incommoda, par-  
tim ipsa agere interius aut operari quicquam nequeant, partim juncta alia im-  
pediunt. E contra, quæ subtiliora sunt, penetrantia magis, & ita poros potius  
aperientia, præter hoc, quod nullum nocumentum parti inferant, saltem in fa-  
ciendo suo officio, & speciatim alteranda causâ occasionali erunt optima.  
*Burrho* sane hæc debetur laus secundum *Borrichium ad Bartolin. Cent. 3. Epist.*  
*hujus epist. 89. pag. 387. omnia ipsius Emplastra ex volatili materiâ constare, adeo,*  
*ut unguentum pridie illitum postridiè vix appareat usquam: damnatque medicos,*  
*quod crassa illa corpora in emplastri formas compingant, quæ pororum angustias*  
*in aegris nequeant subire.* Ac sane notabile est hoc ipsum in affectibus talibus, in  
quibus minus locum habere hic modus externorum remediorum videri queat,  
nempe in Hernia intestinali, tamen proficuum perquam observatum fuisse: *Ri-*  
*verius. obs. commun. prope finem obs. 14. p. 371.* Modi Unguentorum ex  
resolubilibus adeo, ac tantum non volatilibus componendorum forsan varii  
inveniri possint, modo consideremus, glutinosum, ac viscosum, ac quod tenax  
simul hinc existere solet, materialiter ex acido & pingui, illo agente, hoc patiente,  
sub determinata formali texturâ coalescere: unde modo corrigatur acidum,  
citra fixationem, oleosum seu pingue eo ipso simul resolubilius, diffusibilius, &  
cujusvis acis potentius temperativum, effective refrigerans evadet. Ob hanc  
causam, pluribus in Ungu. & Empl. butyrum recens non salitum, oleo ex-  
presso, præsertim olivarum communi longè præferendum puto, præ hoc enim  
illud est tenerius, minus acido occulto concentratum, adeoque minus viscidum,  
promptius penetrat, citius discutitur, magis est temperativum, præsertim si,  
& potentius alterativum. Scopus ergo iste, Unguina talia resolvable præpa-  
randi, variis forsan modis obtineri possit: suggestit jam quendam *Deckers*  
*Comment. in Barb. tt. Prax. l. 2. c. 2. p. 59.* Alius ulteriori scrutinio dignus, fit  
cum therebinthina pura, cum  $\Theta$ ibus vol.  $\square$ os. in s. q.  $\nabla$  destil. solut. aut  
cum spir.  $\Theta$   $\times$ ci, in mortario trituræ ope benè miscendo, coeunt mutuo in  
crassamentum album, moderatè spissum, ita ut emplastri modo induci possit,  
quod curi admotum, promte vim suam, citra insigniorem remanentiam exerce-  
bit, & additione oleo destillat. non adeo acrium ulterius determinari po-  
terit: tentaminis ergo, in pleuritide notha, cuidam graviter affecto præscripti,  
 $\mathcal{R}$ .  $\Theta$  vol.  $\square$   $\mathcal{Z}$ ij. solve in s. q.  $\nabla$  destillatæ therebinthinæ  $\mathcal{Z}$ i. misceantur in mor-  
tariolo lapideo successive, celerius tamen paulo solutionem affundendo, & con-  
citatori tritu subigendo: adde (pro meliori saltem sub tentaminis primi auspi-  
cii, successu) Empl. de melilot. parum: q. s. pro consist. emplastr. applicetur:  
idque factum successu non contemnendo. Facere huc quoque videtur  $\nabla$   $\Psi$ æ  
cum ol. rosato, quæ ambo ritè mista, coeunt in consistentiam butyri. ad ambulta  
præfer-



præsertim, vulnera, ulcera &c. egregii: cujus applicati vestigia pariter nulla sunt conspicua: huic pro aliis usibus etiam sacch. Hni aliquantulum addi, & inspergendo sub tritu in mortario uniri potest, v. g.  $\nabla \Psi \alpha$ .  $\zeta j$ . oleum rosat  $\zeta i s s$ . sacch. Hni.  $\zeta i$ , M. Hno licet obscuris suis vestigiis se prodente. Sed aliis alios hæc persequendi modos relinquamus.

§. 3. Alterum quod attinet axioma, sanè in genere, quæ vel misceri nequeunt, ut  $\nabla o s a$  & oleosa, vel quæ mista se invicem obviunt, ut pulveres varii, Cera ac ol. inviscati, frustra omninò compinguntur, cum vires debitas exserere nequeant. Officinalia E. Unguina, aut passim à Practicis usitata, quanta egent correctione? Unde & non rarò simplicia quædam, & à Rusticis plebeisve levi artificio conflata unguenta subinde artificiosissimè compositis & selectis officinalibus præstant. Sanè ol. ex vegetabilium Decoctione & infus. parum valent, cum de gummosa horum substantiâ nil, de aromaticâ resinosa in illa quasi concentrata, parum capiant. Pulveres vegetabilium ac mineralium, oleosis pinguibus, & glutinosis inviscata, parum vel nil omninò præstant, adeo ut plures tales compositiones de *Nihili* dicendæ forent: cum e contra, sub libertate sua inspersi, inflammari erysipel: cuti exulceratæ, quæ Emplastr. ferre nequit, ulceribus manantibus & similibus affectibus externis, suū quod est faciunt, ut v. g. de lap. calamin: lacte Lunæ, creta. C. C. ust. nuc. mosch. aloë &c: notum est, quæ incarcerata squalent sine usu: simili ferè modo, ac farinæ Vegetabilium, foruum aut Cataplasmatum sub forma subinde proficiuæ existunt, quæ ol. ceraque susceptæ, inermes redduntur. Unde & omnes inunctiones, quæ adstringendi, firmandi, exsiccandi &c. scopo, in herniis, imminente abortu, prolapsu uteri, ulceribus &c. applicantur, ceu contradictoria rejicienda: pulveres styptici inviscati sunt frustranei, aut saltem ad extimam cutis superficiem sphaera activitatis eorum terminatur: pinguibus interea calore actuatis, fibrarum, etiam profundius sitarum resolutione ac emollitione contrarium intentioni Medici operantibus. Observarunt hoc jam plures, & quæ mutua solutionis actione in se agere plus minus, & se invicem unire, & ita citra impedimentum operari mutuo possunt, inunctionum in formam univerunt. Singulare quid Hnus hic obtinet, qui 4ta Chirurgiæ hodiernæ videtur columna, quod vel in se solus, vel  $\pm$  subactus promtè cum acido olei cujusvis, intercedente præsertim coctione coëat, ac ita emplastra polychresta constituat, dum ipsum in se atrosus quidè, sed nondum saturatum acido suo compari, acidi p. n. tumorum, vulnere, & ulcerū patratore pessimi, potentioris spicula recipit & secum retinet, dum pingues & oleosæ particule, à concentrante in viscidum acido liberatæ nonnihil, magis alcalinæ fiunt, & resolubiles, magisque penetrativæ & temperativæ. Ex quo fundamento, tanta Hninorum emplastrorum & compositio & varietas plus minus concinna enata fuit. Quæ tamen, vel obiter saltem, cum præparationem ferè magis officinalem, quam præscriptionem magistralem sapiant, ceu à scopo nostro aliena, insinuasæ sufficiat.

PARVA



# PARVA MAGNORUM MORBORUM INITIA.

## EXORDIUM.

### §. 1.

**E**A est Almæ Matris, Naturæ, consuetudo atque Lex quasi con-  
nata, ut per minima initia gradu successivo magnos molitur  
atque producat effectus. Luculentur hoc ipsa ostendit in se-  
minibus, parvis sanè magnarum generationum fundamentis. Quan-  
tilla hæc, quæto, corpuscula, si cum Mole ex iisdem succrescente con-  
ferantur? Intuere, Lector Benevole, Plantarum semina, κατ' ἐξοχήν  
cum Accuratiores sic dicenda, quæ sat profectò sunt exigua, etiam  
cum externis, quæ communiter iis accensentur, considerata involu-  
cris; cum tamen, seminis quod propriè meretur nomen & in Gem-  
mula saltem continetur, quæ albæ instar lenticulæ in summitate ipso-  
rum apparet, longè minimam, & compato plurium, vix 2800. capsu-  
læ illius constituat partem, referente Bekio in experimentis circa natu-  
ralia rerum principia pag. 264.

Quemad-  
modum  
ex mini-  
mis initiis  
oriuntur  
1. Plantæ;

§. 2. Hanc enim solam pro vero semine habendam, varia com-  
monstrant. Primò namque annotante jam Harveo de Generat. Ani-  
mal. Exerc. §1. p. 233., læsa eadem vel deficiente, reliquum quod est  
Corpusculi illicò sterilefcens, quacunque ratione tractetur, nullo mo-  
do ad germinationem deduci potest: quemadmodum hoc in Pis-  
cis experimento domestico ipsemet didici, illis, quæ gemmulâ gaudebant  
integrâ, vel ex sola aqua, manu ductore Helmontio, feliciter propul-  
sulantibus, fatiscientibus contrâ, quibus spem illam sobolis vel incle-  
mentia Naturæ negaverat, vel manus curiosa violaverat. Accedit hi-  
sce alterum, non exigui ponderis argumentum, quod in gemmula illa  
sive Medullâ sub cortice reliquo contentâ, integræ jam Plantæ Con-  
formatio, mirando Naturæ in Minimis artificiosâ actu delitescat, osten-  
dente hoc Josepho de Aromatariis, tum Epistolâ de Generat. Plantar.  
tum oculato Teste, Guilielmo Harveo, cui ipse hic, in Exerc. XI. p.  
92. C. L. de feminis Jaseoli tali configuratione ab Aromatario Vene-  
tiis sibi ostensâ, ultrò fatetur.



§. 3. Simile quid à Botanico Amstelodamensi in Tulipæ bulbo sibi ad oculum demonstratum, *Excellentiss. Dn. D. Bohn, Anatom. & Chirurg. in hac Alma Professor longè Meritissimus, iudiciosissimus, Preceptor atque Patronus devotiori cultu suspiciendus.* Ipsum hoc multiplicatâ & universali magis Experientiâ confirmant, oculo armato potissimum edocti, *Borellus in Obs. Microscopis obs. 17.* ubi *ἡ χείρ* etiam subnectit, Oculatissimus etiam *Malpighius* primum in Epistola, ac ipso nunc edito *Opere Anatom. Plantar.* nec subticendus tandem *D. Grev. in the Anatomy of Vegetables.* Quorum iâprimis Malpighius stupendâ industriâ ac perspicacitate in omni ferè Vegetationem sive Ideam, Radicis, Trunci & Foliorum binorum delineatione ut plurimum conspicuam, detegit atque delineat, sed & secundinas atque colliquamentum, sub cortice eorum contenta, deprehendit, non dispari ratione, ac in Animalium conceptibus videre licet, sicque vetus illud Empedoclis & posthac Harvæi dogma, Plantarum semina Ova esse, ab iisdem decidua, non omni probabilitate analogicâ destitui, luculenter confirmavit.

§. 4. Gemmula hæcce in istis Seminibus, quæ ratione molis sensui nudo adhuc proportionatæ sub conspectu omnium facilè cadunt, si minutæ adeò quantitatis est, quantilla erit in minutissimis illarum Plantarum Seminibus, quæ non paucis propter exilitatem sine prorsus semine oriri videntur? Quibus tamen contrarium evidenter ostendit per *ἀντοψίαν* in dorso Plantarum Capillarium *Borellus C.L. observ. 2. & Jungius in Doxoscop. Phys. P. 2. S. 3 Trasm. 4. C. 4.* qui non solum, nullam Plantam sine semine oriri, sed & semina, quod magis mirandum, quò minora, eò fertiliora esse, egregiè docet.

§. 5. Ad Semina Plantarum & exilitate principii sæcundi, & huic inexistente jam conformatione analogâ, proximè accedunt Ovula sæcundata Animalium, Oviparorum pariter ac Viviparorum conceptus constituentia, qui demum rectè ab *Aristot. de Gener. Animal. L. 1. c. 1. & Harvæo C.L. Exercitat. 63.* Animalium ac futuri fœtus Semina dicuntur, ac differentiam Genituræ utriusque tam Maris, quàm Fœminæ, separatim adhuc existentis.

§. 6. Ab Ovo, quod dicunt, principium Originis elementale, aut partem minimam ratione ortus primariam, in conceptu Animalium perquirentes Curiosi, in ipso Ovo ac parva hujus Nebecula sive Cicatricula, Gemmulæ in semine Plantarum correspondente, Animal integrè

2. Anima-  
lia quo-  
cunque, ac  
imprimis  
ipse  
Homo.

integrè jan-  
trio de rel-  
Ovo.) mit-  
etiam incul-  
culam Cit-  
Gential.)  
datus de 2

§.  
oculis, eri-  
vante hoc  
mnum di-  
scilicet à  
liquoris ul-  
assimilatio-  
adauger, p-  
rali vel cot-  
tis colorat-  
dum Le G

pag. 247

§. 8

Ovipara,  
magis mi-  
carum, &  
Bombycu  
34. nec no

§. 9

dipta, pr-  
recentis  
Schvram  
observati-  
minutissi-  
præexisten-  
coitu fœ-  
pianas (C  
propulla-  
fœtum m-  
tem atqu  
brevissim



integrè jam conformatum ferè, secundinis atque colliquamento nutritio de reliquo circumdatum, cum *Malpigio* (in *Epist. Form. Pulli in Ovo.*) mirari necesse habuerunt; ita ut in Ovo Gallinaceo, nondum etiam incubato, *Theodorus Aldes* (in *Obs. in Ovis factis.*) Cicatriculam Circulos suos jam ostendentem, & *Grafius* (in *Defens. Part. Gential.*) omnes Pulli partes jam conspexerit; quod idem etiam *Laudatus de Aromataris L. C.*

§. 7. Dicta partium verò conformatio successivè intuentium oculis, etiam nudis tunc, manifestior evadit in Ovo incubato, [observante hoc jam tum *Aristotele*, *Hieron.* *Fabricio*, *Volchero Coiter*, & omnium diligentissimè accuratissimeque Immortali *Harvaeo L. C.*] dum scilicet à calore foyente Motor in Ovo Spiritus excitatus, motu suo ac liquoris ulteriore præparatione, ad partes circulatione, appositione, assimilationeque, Stamina Corporis minuta magis evolvit, explicat, adauget, perficit, conspicuasque nonnullas citius reddit, prout naturali vel conformatione aut breviori exornatione majores, vel contentis coloratis ac evidentius intra eas commotis pleniores, quemadmodum *Le Grand* in *Instit. Philos. P. 6. A. 2.* & *Velthuisius de Generat.* pag. 247. annotat.

§. 8. Nec recensitam delineationem in Ovis Majorum inter Ovipara, ut ita loquar, Gentium reperire saltem licet, quin, & quod magis miraberis, in minutissimis insectorum, Araneorum puta, Formicarum, & quæ mutuò ex se invicem generantur, Papilionum atque Bombycum ovulis eadem observant *Borellus Obs. Microcosp. 20.* & 34. nec non *Malpigijs Tr. de Bombyce p. 65.*

§. 9. A Minoribus ad Majora, vulgo Philosophorum perfectiora, progredior Animalia, Vivipara scilicet. In his simili modo, ac in recensitis, rem se habere, ex modernorum, *Harvaei*, *Hornii*, *Grafii*, *Schvvammerdammi*, *Ruysschii* &c. ac quotidianis Anatomicorum observationibus, apparet. Ex Ovulo quippe, sive mavis, vesicula minutissima, liquore seminali plena, [quales in Testibus fœmininis præexistere solent, docente hoc Fallopio,] ab evibrato eò usque, in coitu fœcundo, spiritu Maris genitali fœcundata & per Tubas Fallopianas (Observatore *Grafio* in Brutis, *Ruysschio* in Homine) ad uterum propulsa, fit conceptus, initio satis minutus & puncto saltem saliente fœtum manifestans, reliquis hujus partibus, propter fluxilitatem, exilitatem atque quietem, vix omnibus adhuc conspicuis, quæ & ipsa tamen brevissimè arctius connexæ & in majorem molem adauctæ, totum



Embryonis corpusculum egregiè exhibent, *Confer Harvaum Exercit. 69. p. 444. 445. & alibi passim, Kerkringium in Anthropogenia Ichnographia C. 2. & seq. nec non Graefum de Organ. Genital. Mulier. C. 15.*

§. 10. Adducta hæcenus exilitatem primordii fœtus passivi potissimum spectarunt; activi moventis formantisque subtilitatem si melitatus fueris, diviniore admiratio mentem subibit. Necessitatem hujus ac materialitatem inferiùs paulò probatum videbis, nunc saltem considera, quantillum ejus ad conceptum excitandum concurret.

§. 11. Requiritur Germen masculinum ad verum conceptum constituendum, omnes ultrò largiuntur, eò quod sine hoc nullus unquam talis contingat, nec proles sexûs virilis generari posset, nisi accederet aliquid ideam hujus possidens, quod in Muliere frustra quaesiveris. *Vid. Bek. C. L. p. 191.* Semen autem hoc virile nec membraceum Mulieris ovulum, quod fœcundum reddere debet, propter viscosam sui crassitiem penetrare, imò ne quidem ad illud usque sub crassiore istâ consistentiâ, semper & in omnibus Animalibus ascendere potest, v. g. in Gallinis propter anfractuosum Oviductum, item in imperforatis, qualem tamen puellam ex solo Hastæ Virilis (ignoscas autem, quòd Naturæ ductu apertius scribam, cum Castis mihi res est) affrictæ concepisse apud Graefum l. c. legimus, ubi sanè præterquam Spiritus, nihil aliud ad surgere poterit.

§. 12. Sequitur ergò ex hisce, quod ratione alius cujusdam principii subtilissimi & exilissimi, spiritûs scilicet activi, facile penetrantis, σπέρμα Viri saltem concurret: quantillam verò hujus esse poterit in modica adeò seminis fœcundi quantitate, unico coitu ad plures fœtus nonnunquam sufficiente, excreta? Ut taceam, per experientiam nonnullos, ac doctâ cum aliis conjecturâ Excellentissimum Dn. D. Barnerum, Inchyti Collegii Medici Augustani Adfessorem, Præceptorem devenerandum, in Collegio Physico, quod semestri præterito sub eo habuimus, sect. 1. §. 18. docere, prævias saltem seminis masculini guttulas, quas sub primo eruptionis impetu altius ejaculari dicunt, vim hancce plasticam continere, reliquo, quod subsequitur, magmate seminali, extremitatem urethræ vix transcendente ac sine usu iterum diffluente. Sic ut non ineptè Marcus Marci, in Philos. Veter. restituat. P. 3. f. 8. Subsect. 2. §. 10. dixerit: Tàm fœminæ (utpote cujus Spiritum genitalem suo modo & genere ad fœtum formandum quoque concurrere, non negamus) quàm Maris Genituræ portionem minorem, quam ut sensu percipiatur, ad conceptum sufficere.



§. 13. Ex quibus ipsis, plus nimis longâ forsan serie adductis, abundè patet, quàm exigua sint Magnorum in Natura Productorum atque effectuum primordia. Nascitur ex tantillo seminis apice ingens Arbor, annosa quercus, lata expandens brachia, & producta quævis ex triplici Naturæ Regno altitudine facilè transcendens. Oritur ex Cicatricula, Milli semine minori, Gallus, Animal magnanime ac superbum, & ex tantillo spiritu gentiali hujus, unâ vice omnia, vel centena si essent, Gallinæ ovula fecundantur, teste cum Harvæo experientiâ. Expuncto prodit Homo, Magni hujus Mundi non minoris momenti Microcolmus. Ita ut exindè *Scaligeri* illud, dari inter minima maxima, & quod *Harvæus* habet, Creatorem Omnipotentem ex minimis initiis maximum apparere voluisse, oppidò pateat.

§. 14. Tacitus hæcce, ac parvum imprimis mirandæ Homi- *Ita & à*  
nis Machinæ exortum, mecum agitati, ultro deprehendi, quemad- *parvis*  
modum ea à parvis suscitatur primordiis, ita exigua non minus initia *Morbo-*  
destructionem ejus moliri, & vel ex tantillo primum causæ morbificæ *rum pri-*  
errato maximos ei accrescere morbos. In quæ ipsa penitiùs non nihil *mordiis*  
inquirere, cum haud parvæ videatur utilitatis, speciminis qualiscunque *destructio*  
gratia pro Ingenii Modulo de his agere constitui. *ejus proce-*  
*dit.*

## TRACTATIO IPSA.

### §. I.

**S**ub initium verò statim annoto, me per tantillum Magnorum morborum initium intelligere Causas proximas eorum, tum ratione molis, tum subtilitatis admodum exiles, idque imprimis respectu Producti ac Morbi exindè succrescentis sat magni; quæ Magna voco intuitu improporcionatæ partim coacervationis ac extensionis per plures corporis partes, partim longæ plus justo durationis, ac partim etiam periculositatis majoris, si cum tantilla sui causâ primitivâ conferantur.

§. 2. Rem ipsam si attentius paulò intueor, omnium tantum *Morbo-*  
non Morborum initia hujusmodi parva deprehendo. Proxima quippe *rum Ma-*  
formalis cujuscunque ferè morbi Causa ac ratio in spirituum vitato *gnorum*  
consistit motu, ita ut horum etiam intuitu sublimiora saltem ac univer- *Causæ exi-*  
salia vocata. medicamenta plerosque morbos compescere, omnes uno *giæ, ac l.*  
ore consentiant. Cum enim omnes ferè Morbi cum inolesta quadam *Proxima*  
consensatione videantur esse conjuncti, sensatio autem à spiritibus prima *formalis,*  
nō fiat, manus enim spiritui absente non sentit, spiritus centè Morborum *spiritus*  
*noster.*



plerorumque, si non omnium causa immediatè ultima erunt, quæ, ut Morbum percipiamus, efficit.

§. 3. Idem proinde nobis (ut cum *Charletone in Oecon. Animal. Exerc. l.* loquat) inest & Vitæ principium & Mortis; nec à causis occasionalibus morbificis solummodò excitati spiritus nostri motores, morbos nobis intentant, quia & naturali suâ inquietudine ac avolandi conatu pereanni corpora nostra successivo ætatum decursu ita atterunt atque immutant, donec ruinosam tandem ejus Machinam penitus conficiant atque exanimant.

§. 4. Quàm verò subtilia hæc sunt tantarum in corpore turbarum initia? Adeò ut exinde multi hodieque sint, qui earum existentiam, eò quòd in oculos non incurrant, penitus in dubium vocare, alii autem ob easdem rationes materialitatem eorum negare non dubitant. Quibus proinde contrarium persuadere, dubiumque hoc pro vitili declinare, pro meliore dictorum pariter ac dicendorum robore, omninò convenit.

§. 5. Falsa sanè in Naturalibus est Conclusio, quodcunque non videmus immediatè, illud non existit, nec Corporeum est. Ne quidem ab omnium sensuum negata à priori perceptione ad negationem existentiae alicujus rei naturalis valet Consequentia; quemadmodum Laudatus supra *Excell. Dn. D. Bohn in Epistol. de insuffic. acid. & alcal. p. 10. & 11.* egregiè ostendit, idque exemplo imprimis particularum Mercurii vivi omnes sensus in quodam liquore, cui Mercurius prius fuerat infusus & iterum ablatus, effugientium, effectu tamen suo, quem à Mercurio liquor ille mutuaverat, dum æquè ac hic postmodum Vermes necaret, in existentiam suam satis comprobantium. Optima sic & subtilissima quæque, conquerente *Sanligero de subtil. Exerc. cit. 23.* eludunt aut fallunt sensum.

§. 6. Rationem hujus rei reddere conatur *Tattinghof in Clav. Philos. Nat.* Non mirum esse, innuens, quod Corpora valdè minuta sentire nequeamus, cum ipsi Corporis nostri nervi, qui tamen ab objectis pro sensu excitando moveri debent, à talibus verò, quæ iis ipsis minora sunt, moveri non possunt, non sint minutissimi, sed objectis ejusmodi subtilibus crassiores; undè & qui subtiliore nervorum texturâ, vel naturâ, ut *Gynæcea*, vel ex accidenti, ut atoniâ aliquali & fibrillarum in minores partes dilaceratione propter progressam aliquando læsionem affecti, gaudent, levissimum subtilioris objecti contactum, e.g. aëris exiguum mutationem, longè faciliùs ac citiùs aliis persentiant, qualia exempla lectu non indigna vide apud *Illustrem à Boyle Tr. de Atmospher. & Efflu. p. m. 128. & seq.*



§. 7. Hujus verò quicquid sit, apparet sanè ex adductis solos sensus externos Naturalium perceptioni & judicationi non semper æquè sufficere, &, vel in ipsis experimentis sensibilibus, dum illud, quod quæritur, non semper in sensum externum incurrit (optimè hoc annotante, quanquam minus rectè applicante *Leichnero in Exerc. Anti-Harvean. de motu sanguinis*) libero sanoque Rationis judicio, quod cum experimento, cui superstruitur, rectè cohæreat, insuper opus esse, junctâque horum operâ multa deprehendi posse, quæ neutri separatim paterent.

§. 8. Omnibus proindè sensibus quod denegatum, multò minus soli visui concessum erit, adeoque nec illud statim in dubium vocandum veniet, quod ab hoc non percipitur. *Primò* namque multa Majores nostri non viderunt, quæ per utilissimum hodiè Inventum Microscopii ac Telescopii detecta sunt, ac proindè reverâ existisse se, licet ab illis visa non fuerint, testantur; qualia sunt: Nova in Cælo Sydera, Satellites Jovis; in Terrâ Corpora, Semina Plantarum sine semine veteribus oriundarum, conformata jam integra proles in Seminibus, Plantulæ ex situ & mucidis Librorum maculis propullulantes, Corporum inflammabilium, Silicum, Sulphuris, Carbonum &c. particulæ minutissimæ inflammabiles sub forma, punctulorum & linearum argentearum egregio spectaculo apparentes, Vermiculi in Aceto, Insectorum minutissimorum partes distinctæ, pili, oculi, squamæ, pedes Teredinis; Dentes Aranearum, Muscam oculorum pluralitate Argum inter insecta repræsentantem Bombycis pulmones, Tracheæ &c. Ductus adiposi in piscium felle, Viscerum Corporis nostri artificiosa & intimior structura antea incognita, unguium venulæ, & quamplurima alia, de quibus videantur passim Authores, *Cartesii Dioptrica, Borellus in Historia Conspicilliorum & obs. Microscop. Hookii Micrographia, Robaulti Physica Capite de Elementis, & alii.*

§. 9. Deinde, quod alterum est, multa adhuc in rerum naturâ subtilia existunt, quæ sub nostrum conspectum vel prorsus nunquam, vel (altem sub statu disgregationis non cadunt. Aerem non videmus, existere tamen eum, inter alia testatur Flamma Ellychnii, foribus in conclavi de subito apertis vel clausis, hinc inde commota. Musculos, Nervos in Teredine de qua paulò antè memini, etiam per microscopium visu assequi aut distinguere haud possumus, ex motu tamen corporis & pedum ejusdem, supponere hos omninò convenit, siquidem non solum in Conspectoribus Animalibus, sed & insectis non-

nullis



nullis *Bombyce* &c. observante *Malpigio* in *Tr. de eodem*, illos adesse & motum partium organicum mediantibus his contingere, manifestò apparet; quidn̄ E. etiam in *Teredine* Natura eadem analogiâ uteretur?

§. 10. Corporum electricorum succini, æris, effluvia oculis nostris non apparent, testari tamen de eorum satis coagmentatâ vibratione videntur Corpora levissima, paleæ, Crines, minuta papyri segmenta, quæ, si frustum v. g. succini, pro excitando copiosiore & fortiore miasmaturum egressu affriccione prius nonnihil calefactum, in proportionatâ distantia sub iis firmâ manu detineantur aliquandiu, ex loco, cui incumbunt, ad succinum usque elewantur & huic adherent, dum priora succini effluvia propter alia, quæ continuo ac presso tramite insequuntur & subjectum Corpusculum leve æctius circumcirca cingunt, repercussa quasi iterum ascendere & paleam v. g. in medio cingentis reliquæ atmosphæræ simul secum sustollere, coguntur, quæ deinceps tam diu succino adheret, quam diu, adæquatus effluviis hujus effluxus durat. Vi *Magnetis ferri* attractivæ similem lubesse causam & effluvia striata, hodiè perspicaciore Naturæ *Consulti*, *Cartesius*, *Boyle*, alique non immeritò suspicantur.

§. 11. Porro exhalationes spiritus ☉ & aliorum Corporum odoratorum sub visum non cadunt, optimè tamen naribus deprehenduntur. Nec est, quod idè ad qualitates intentionales hîc confugiamus, cum hodiè constet, nullam etiam ex his contingere absque subjecti (à quo qualitates cunctæ non nisi sola ratione & respectivè ad quintuplicem sensuum nostrorum differentiam differunt) materialium particularum emanatione; cum vel ipsi *Peripathetici* concedant necesse est, accidens, adeoque & qualitatem extra subjectum non posse subsistere. Alia quæ probant, effluvia hæc, odorata materialia esse & experimenta statica eorum effluxum propter ponderis, quod inde percipitur, decrementum confirmantia, vide juxta *Boyleum de Effluviis*, interea, quæ infra de Odoribus atque Contagiis adducta sunt.

§. 12. Sub disgregationis statu visum, imò & reliquos sensus effugiunt multa, e. gr. Vapores & exhalationes ex Globo Terraqueo dum elewantur, quæ tamen, ubi in Nubes collectæ, oculos nostros omninò feriunt, & reverà prius elevata se fuisse ostendunt. Simili modo effluvia vaporosa, quæ halitu Oris emittuntur, dum disgregata v. g. tempore astivo, non videmus, unita verò postmodum ubi fuerint, vel in speculo, vel extra hoc ab ore saltem dimissa ac fri-

ac frigori  
Corpora  
partium  
atomis pe  
annotan  
cit, Car  
ted ab e  
quibus  
ret, sub  
libus eff

§.  
potius a  
motum  
nomena  
Corpora  
sophis C  
tur. M  
ponendu  
tentem  
tale ac n  
que secu  
ficandi  
Tr. Blay  
liquidu  
Phyfica  
dinario  
bault, in  
velimus

§.  
quod a  
tim se.  
volunta  
possent  
ut doce  
oculis  
liquor  
respon  
Non en  
stram C



ac frigore hyberno constricta, nobis apparent. Sic vice versâ varia Corpora, quæ, dum unita erant, sub visum cadebant, in invisibilem partium tenuitatem redigi possunt. Si ignis flamma in minutissimis atomis per aquam & aërem dispergitur, ut videri amplius non possit, annotante *Leuchnero l.c.* Ac rectè *Scaliger, Exerc. 9. de Subtilit.* dicit, Carnem in veru non affari & tangi ab illo igne, quem videmus, sed ab ejus particulis discontinuatis magis, quæ non videntur. Ex quibus omnibus longâ serie adductis uno intuitu insimul quoque patet, subtilia & sensum nostrum effugientia non statim pro immaterialibus esse habenda.

§. 13. Dilutis igitur plenius remotisvè hisce dubiis, pergo potius ad positivam Spirituum demonstrationem. Motus, & per motum formari, actuari, vivificari atque produci Corpora ac Phænomena naturalia, oppido omnibus, vel ex sensu proprio interni in Corpore nostro Motoris, apparet, rectèque hoc à modernis Philosophis Corpulcularibus multis rationibus atque experimentis adstruitur. Moyens E. aliquod, motum hunc producens, necessariò supponendum erit. Primum movens DEUM, Creatorem Omnipotentem, reverenter agnoscamus necesse est; sed & secundùm s. naturale ac mediatum, à DEO Vitâ, agilitate & potentiâ, se ipsum aliaque secum, juxta normam & ideam quasi adjunctam, movendi, vivificandi & conservandi, instructum, non immeritò cum *Helmontio. Tr. Blas. Hum. §. 2.* aliisque Philosophis ferè omnibus, supponimus; siquidem necessariò in Naturalibus tandem ad causam efficientem Physicam aliquam recurendum est, nisi hodieque omnia, etiam ordinario cursu quæ fiunt, supernaturaliter contingere, & juxta *Robauli. in Phys. P. I. C. 10. f.* singulis momentis miracula à DEO elicere velimus.

§. 14. Movens hocce naturale respectu tùm Corporis, quod actuatur, tùm sensuum nostrorum, crassum quid esse nequit, partim sc. quia ratione Celeritatis summæ in quibusdam actionibus, e. g. voluntariis, quæ à crassiore fixioreque substantiâ tam subito fieri non possent, requiritur admodum subtile, mobile, volatile & activum, ut docet *Excell. Dn. Praeses in Colleg. Institution.* partim etiam, quia oculis non patet. Nec est, quod sanguinem (cui in vegetabilibus liquor Leffas, in Mineralibus succus Burr. *Helmontii Tr. Element. §. 13.* respondere videtur) pro hoc obtrudat *Harveus C. L. Exerc. 71. p. 469.* Non enim hunc, sed subtilius quiddam in eo latens Machinam nostram Corpoream, ipsumque etiam sanguinem, actuare, vel exindè constare,



stat, quod hic in corpore demortuo etiam præsens sit, nihilominus tamen ampliùs non moveatur, necessariò igitur principium motûs aliundè habebit, quò absumptò vel deficiente, quiescere emoriquè ipsum cum Machinâ, quam inhabitat, necesse est.

§. 15. Sed ut in viam redeam, movens hoc sensibus nostris subtilius quid esse, cùm certum sit, erit id vel immateriale, vel materiale. Immateriale esse nequit variis ex rationibus, ac primò, quia divisibile, uti benè adducit *Willis de Anim. Brut. P. I. C. 2.* Divisibile illud deprehenditur non solum in corpore integro vivente, quia plures ac diversos actus animales solum à diversis Corporis membris ac partibus obiri cernimus, e. g. eodem instanti oculus videt, auris audit, nares olfaciunt, lingua gustat, & membra quavis exteriora Tactus sensum & motum, exercent, ac interea viscera quæq; & præcordia munia sua exequuntur. Necesse igitur, ut aliquæ ejus portiones singulis illis membris ac partibus simul insint. Quin & in dissectis partibus Animalium, quorum succi viscosiores ac spiritus minus dissipabiles, Lumbricorum scil. Viperarum, Anguillarum &c. horum enim partes à toto dissectæ ac segregatæ à se invicem per aliquod tempus adhuc moventur. Ac miranda vidi præteritâ Hyeme penes nobile quoddam Par amicorum Philiatrorum, quorum in Muséo, dum cultro anatomico subiceremus Canem parvum vicinissimam, dissectis, post reliquorum examen, in Fœtibus quibusdam vasis sanguiferis nervisque majoribus, læsis vel etiam profus extractis Visceribus plerisque ac imprimis corde, Truncum nihilominus reliquum, ita evisceratum, longè etiam post horæ, ex quo hæc facta, spatium, motu conductorio adhuc convulsus, similiterque Cor, à Corpore sejunctum, motu convulsivo, tum spontaneo, tum irritatione Cultelli excitato, pluries tentatum, vidimus. Cui si subjungerem, quod Anno 73. Mense Decembr. in Muséo proprio, unâ cum Amicis quibusdam Conjunctissimis, in sciuro deprehendi, Cor scil. (postquam ultra horas 40. Animal jam esset defunctum) exsectum & intra digitorum pulpam à nobis detentum, aliqualem adhuc motum pulsatorium in profundiori centro edere visum fuisse, fidem forsan transcendere videret.

§. 16. Altera ratio contra immaterialitatem moventis est, quod alterationibus ac morbis variis hoc sit obnoxium, imò ipsi Morti, ut superius probatum, quæ tandem illud planè destruit & auferit. Hæc vero saltem Materiæ, omnium consensu, competunt, minimè autem immateriali cuidam substantiæ, cùm non legamus ullibi, quæ immaterialia sunt, e. g. Angelos bonos, vel etiam malos post lapsum



lapsum proprium, destructioni obnoxia esse. Et sanè, quod *tertium* est, si illud immateriale, adeoque, ex Decreto altissimi jam sancito & exemplis modò adductis confirmato, indestructibile supponeretur, ipsæ Brutorum Animæ, quæ in solo eodem principio movente consistunt, etiam essent indestructibiles sicque immortales, quod absurdum & sacro Textui contrarium.

§. 17. Firmiter proinde concludere licet, movens illud esse materiale. Quid verò sit, ardua magis est quæstio: quantum tamen à posteriori per certa fundamenta hariolari licet, etiam de eo videbimus. Ex supra adductis constat, esse illud admodum subtile, mobile, volatile & activum. Hinc factum, ut analogicè à Medicis spiritus fuerit dictum, quo nomine & nos illud imposterum appellabimus. Consideremus jam, qualianam inter res naturales corpuscula ad hanc subtilitatem & activitatem proximè accedant, ut per ea ad penitiorem spirituum horum cognitionem ac definitionem pervenire possimus.

§. 18. Deprehendimus verò particulas salinas & oleos. scilicet sulphureas (non crassas illas, sed in his latentes insipidas Excell. Bohnii & quasi seminales) omnium esse subtilissimas & maxime activas, hinc & ipsæ hæc tum in Corporibus, quibus continentur, tum ex iis arte educæ & cum aeris vel proprii Corporis simul phlegmate unitæ, vocantur Spiritus. Activitatem atque subtilitatem suam probant exinde, quod ipsarum particulae in continuo ferè sint motu, & vase aperto continuo odorem sui, in distans quoque, spargant, citra tamen aliis sensu perceptionem, imò brevi maximam partem avolent. Et sanè quicquid in quocunque genere Mixtorum reperitur subtile activumque aut  $\Theta$  l aut sulphur ejusmodi insipidum, aut utrumque ut plurimum combinatum est. Ut taceam spiritus  $\Theta$  nos & æeos, quæ ex subjectis trium Regnorum igne ministro evocantur, subtilitate & activitate maxime esse penetrantes: quæ naturaliter etiam & ultro subjecta illa exhibeant spirituosæ, saltem adducam.

§. 19. Odores, ex Plantarum Floribus exhalantes, activas harum esse partes, quis negaverit? Cum & extra suum Corpus, quod antè inhabitabant, tantam ostendant subtilitatem, activitatemque, quanta major ullius rei vix concipi potest. Sunt verò iidem nihil aliud, quam particulae subtilissimæ  $\Theta$  non volatiles oleosæ, ex oleo plantarum seminali fermentatione resoluta ascendentes, & certâ ratione commotæ, nares nostras eo modo afficientes, quem nos odorem vocamus. Oleo namque isto Flores si privaveris, nullam amplius spirant fragrantiam. Sunt autem olea nihil aliud, quam  $\Theta$  a volatilia cum pinguedine æreâ



ac seminali in orbem concentrata, docente hoc, præter experientiam Chymicam, eruditè Excell. Barnero in Prodtomo suo Vindic. contra Bek. p. 20.

§. 20. Fœtores ex Animalium excrementis (sit venia verbo & ad obscena Transitui) recentibus imprimis exhalantes ad molestiam usque activi, subtiles, & pariter naturæ  $\Theta$  no- $\phi$ ææ sunt, quod innotescere potest, si Alembico suscipiantur, quod experimentum à Laudato Excell. Barnero in Collegio Chymico communicatum meminimus; & æum principium vel exinde satis elucescit, quod ardeant flammâ admodum.

§. 21. Mineralia quod exhalant Gass. Vaporem, in Metallifodinis subindè conspicuum, satis activum se esse ostendit, dum adeò facile & momentaneè homines interficit. Sulphureo, verò  $\Theta$  num pariter & hoc esse, vix eget probatione. Imò levi afflictu ex Sulphure nativo prodit ejusmodi spiritus acido sulphureus, odore nares nostros notabiliter satis feriens, teste Boyleo de effluv. & propriâ experientiâ.

§. 22. Quæ cum ita sese habeant, non video, quò minus liceat nobis suspicari probabiliter, Spiritus, Corporum internos Motores ejusdem cum dictis esse naturæ, & saltem magis subtiles, sicque tandem juxta manuductionem *Collegii Physici Barneriani*, mutatis & additis paucis definire, quod spiritus hi sint particulæ Mixti Viventis ejusque subtilestissimæ salinæ & sulphureæ, sub debita ac non interrupta contiguitate ac quantitate, potentiâ motivâ, & operativâ secundum Corporis, quod incolunt, proprietates & organisationem à DEO instructæ.

§. 23. Atque ut in specie hoc jam applicem ad Animalia, ac Hominem præcipuè, utpote in cujus gratiam investigatio hæc spirituum naturæ potissimum vergere debet, quò Morbis eorum, quibus ille affligitur, eò melius succurri queat: Notandum est: in semine primoque Animalium conceptu eodem momento cum & in seminali materia, tanquam passivâ, ex quâ Machina Fœtus construitur, adesse spiritus, seu materiam activam & formantem. Passivam nihil aliud esse conjecturare possumus, quam Colliquamentum illud Chylosum, omnium partium, quas ante suam in locis genitalibus collectionem, lege circulationis, pertransit, ideâ scilicet signaturâ, juxta Bekium C L. aliisque notatum; eò quod ex hoc fœtum nutriti videamus, ex quo autem nutrimur, ex iis nos constare & ortos primum fuisse, vi illius Hippocratei, admodum probabile sit.



§. 24. Spiritus in Colliquamento hoc præsens continuo particulas idea insignitas motu suo, juxta normam, cui in corpore Parentum adfuetus est, ordine determinato connectit, ita ut, quod superius innui, materiam primigeniam foetus inquirere volentibus, cum hac statim ipse embryo integrè jam delineatus appareat. Dumque spiritus hâc ratione materiam seminalem oleosam (pingue enim oleum semini cuicunque, tanquam partem essentialem, inexistere experimenta varia docent) successivè magis magisque resolvit, ac ex particulis ejus  $\Theta$  no-sulphureis magis sic volatilifatis sese multiplicat atque adauget, colliquamenti intra vasa sua inclusi, non aliter ac ex resolutis oleis per  $\Theta$  a volatilia extra corpus contingere solet, emergit color rubicundus, ob quem adeoque illud posthac sanguis in vasis dictis appellari incipit. Novo adducto alimento particulis  $\Theta$  no-oleosis imprægnato, etiam tunc, ubi extra uterum foetus jam editus, & eò usque tandem adolevit, ut ex Cibis more Adultorum Chylum conficiat, continuo simili resolutione & volatilifatione ejusdem, quæ ab Aere quoque sub inspiratione non parum tunc adjuvatur, novi producantur spiritus, & sic usque ad Vitæ terminum, eorum proventus perpetuatur.

§. 25. Principium hoc, ex quo spiritus restaurari vel augeri dixi, aliquo modo jam eorum in animalibus naturam  $\Theta$  no volatilem oleosam probare posset; verùm alia quoque in promptu sunt argumenta hoc confirmantia. Ac primò ratione principii  $\Theta$  ni volatilis  $\square$ osi, quod notabiliorum eorum partem constituere videtur; præter ea, quæ in genere supra ob ejus summam activitatem suspicati sumus, persuadent porro ejus in spiritibus præsentiam fracedo  $\square$ osi, spiritui  $\Theta$  \*ci similis. Cerebro, in quo spiritus, pro functionibus Animalibus potissimum necessarii, separantur, inhærens, quæ satis testatur, annotante Excell. Bohnio in *Disp. physiol.* §. 18. de Naturaeorum  $\Theta$  na  $\square$ osa volatili, cerebro ab eorum transitu, vel fermento ipsorum Naturæ correspondenti juxta Willisum, affrictâ. Huic succedit copiosum sal volatile, quod elici potest ex partib. Animalium, ac ipso etiam sanguine, quorum hoc procul dubio spiritibus, sub resolutione sanguinis fermentativa intra Corpus, materiam restorationis præbet, illud verò ex  $\Theta$  e volatili spiritum sub nutrimenti in partibus assimilatione magis fixato ortum trahit, quæ vel per blandum digestionis calorem, vel per ignem fortiozem iterum volatilifata prodire videntur.

§. 26. Nec moramur hic Miso-Chymicos, corpori hæc non inesse, sed ab arte demum produci somniantes, cum  $\Delta$ is nihil ex Cor-



pore aliquo clare queat, quod huic materialiter non prius in-  
existerit, atque semper una eademque principiata, debito modo  
adhibitus, nunquam ab his diversa, educat, inò digestio-  
nis & fermentationis qui vocatur ignis, naturali prorsus modo  
& excitativè saltem in Corpora agat, quorum principium internum  
postmodum ipsam operationem promovet atque perficit. Forma-  
liter tamen nonnihil immutata esse, quæ per eum producuntur, non  
æque negaverim.

§. 27. Quod alterum principium, oleosum scil. seu æeum con-  
cernit, de hoc etiam spiritus nostros participare, varia sunt, quæ pro-  
bant, ac interea non ultimum, quod sequitur. In sanguine particulas  
pingues sulphureas negare nō possumus, partim quia calor ex ejus motu  
proveniens, cum hic sine particulis calorificis, inflammabilibus, quales in  
sulphure intimius latere solent, fieri non possit, de harum in eo præ-  
sentia satis testatur, quod item facit color ejus rubicundus à particu-  
larum oleosarum etiam minima resolutione dependens; partim quia  
pinguedo, pars sulphurea ex sanguine ortum habet, partim etiam, quia  
ejus analysis Chymica tales exhibet, & præterea ex anhelitu qui san-  
guinis ex parte proles, oleum, seu sulphur flammæ concipiens, non  
difficiliter haberi potest, docente hoc ipsum *Borrichio de Ort. & Progress. Chym. pag. 7.*

§. 28. Sulphureas verò particulas ac imprimis intimius eo-  
rum principium, quod indigito, inflammabile, insipidum, admodum  
esse volatiles, subiles & activas, constat; unde non immeritò inter  
spirituum nostrorum partes numerandæ venient: quam suspicionem  
non parum adauget, quod, cum illæ in aliis corporis partibus absum-  
mantur in pinguedinem, in iis tamen locis, ubi spiritus separari impri-  
mis solent, ut in Cerebro & Testibus, nulla unquam reperiatur pingue-  
do in spiritus forsitan ejus principiis ibidem absumtis.

§. 29. Ultimò denique notum est, quod spiritus insigni vi pol-  
leant corpora nostra condiendi & à putredine præservandi, adeò ut,  
quamdiu illi in debita quantitate ac vigore corpori ac sanguini profunt,  
ab omni putredine hæc immunia sint, recedentibus verò iis statim cor-  
rumpantur. Cum verò similem prorsus corpora condiendi virtutem  
possideant sulphurea & oleosa, dum Gas seu Fumus sulphuris Vina  
& succos vegetabilium præservat à Corruptione, Terebinthina opti-  
mum pro conditura cadaverum existit balsamum, ac præterea Olea  
destillata aromatica mirandam & momentaneam quasi foveant vim  
spiritus

Spiritus od  
hæc virtute

§. 30

et no volat  
dum, eos  
abrupi, cum  
liberioris  
teritu con

§. 31

ed quod fi  
strui soleat  
esse, super

§. 32

cuntur in d  
distinguan  
scribuntur

ter hæc ob  
rituum viti  
tione febril

tuosum illu  
hoc loco

cialius de t  
nimum sp  
quantum a

cati, à caus  
Quos inter  
Marci nun

§. 33

bet Excell  
parte mea

agente, qu  
adeò huic  
gula, ordi

tur illud, c  
necesse esse  
quam in ip

natam; qu  
jecto cogn  
adjudicare



Spiritus odore suo restaurandi, licitum erit suspicari annon eâdem ac hæc virtute ☉ no volatili oleosa hoc illi præstent.

§. 30. Verùm suppositâ licet hæc ratione spirituum Naturâ ☉ no volatili sulphureâ, non ideo tamen cum Willisio statim asserendum, eos nimium commotos ac incalescentes in flammam quandam abripi, cùm hoc in angustâ Corporis nostri Machinâ propter defectum liberioris medii, Aeris scil. fieri non possit, & cum præsentaneo vitæ interitu conjunctum esset.

§. 31. Prolixior sui in spirituum existentia atq; essentia probanda, eò quod fundamento non sufficienter firmatò, reliqua minus tutò superstrui soleant. Spiritus verò fundamentum omnium facillè Morborum esse, superius declaratum est. Nunc saltem specialius de iis videbimus.

§. 32. Morbi spirituum propriè sic dicti, dum peccare illi dicuntur in quantitate, qualitate vel motu, vix aut difficulter admodum distinguuntur ab aliis, quæ corporum contentis essentialiter inhærere scribuntur, quoniam continua quasi pericyclosis & communicatio inter hæc observatur; ita ut v. g. dubitare posses, num in subtilitate spirituum vitata, sanguis potius Cacochymia; & in sanguinis fermentatione febrili, spiritus rectius motu excedente, sanguinemque in impetuosum illum motum abripiente, peccare dicendus sit. Sed mittamus hoc loco vulgariore illos spirituum morbos, cùm ex professò & specialius de talibus agere, nostri non sit instituti, principium eorum minimum spiritus ipsos, insinuasse sufficiat. Prosequamur illos potius, quantum angusta hæc pagina permittit, qui totius substantiæ vulgò vocati, à causis occultis & το δεινόν Hippocratis fœventibus oriri dicuntur. Quos inter primò se offerunt Ideales, secundum Helmontium & M. Marci nuncupandi.

§. 33. Cum viderent Naturæ Consulti, ut, quæ ingeniosè habet *Excell. Dn. Praeses in Dissert. de Morsu Viper C. I. Punct. 5. §. 3.* ex parte mea faciam, Viventium Orius, Progressus & Interitus ab interno agente, quod spiritum supra vocavimus, perfici, tam multifarias autem adeò huic incumbere operationes, ut, nisi aliquid sit, quod, tanquam regula, ordine certo in agendo ipsum ita dirigat, ut operetur hoc, ut operetur illud, confusionem in operando, à qua tamen Natura abhorret, fieri necesse esset, dirigens ejusmodi supposuerunt. Idque ideam vocarunt, quam in ipsis spiritibus alii quæsi verunt & scientiam dixerunt hisce connotam; quam tamen, cùm supponat in iis praviā quandam de subiecto cognitionem & ratiocinium, omnibus viventibus, Plantis v. g. adjudicare, durius paulò videretur, quippe quas rectius Hippocrates fa-

*cere,*



cere, inquit, quod nesciunt & scire sibi videntur, omnia autem per divinam necessitatem. Quoniam tamen instinctus ejusmodi idealis spontaneus determinatè sese movendi & agendi spiritibus concedendus, erit certè is à posteriori saltem & ex solâ consuetudinis lege, quæ altera natura est, adeptus, ita ut hoc vel illo modo juxta ductum organisationis illius Corporis, cui primùm inditus, moveri adluctus, aliâ Corpori postmodum communicatus eosdem planè in hoc motus repetere tenter. Id quod illustrat partis cujusdam voluntario motui destinatæ citra voluntatis imperium, ex sola sæpè consuetudine spiritus, certo tempore musculos illos abbreviantis, contingens motus. Sic ex assuetudine quidam sapius cantillant citra etiam animadvertentiam propriam. Alii tempore somni manus hac ratione hinc inde jactitant, imò varia nonnunquam loquuntur citra prævium voluntatis imperium subsequam quoque facti conscientiam.

§. 34. Præter recensitos, quidam motus hujusmodi determinatum directorium in ipsa partium continentium organisatione quærunt. Quos sane per ideam hanc, quæ meritò priori jungenda, sic, ut junctim hæ ideas seminales constituent, nihil aliud intelligere ex *M. Marci Phil. Vet. restit. P. 4. S. 2. Subf. 4. p. 426.* tandem apparet, quàm Typum, aut Signaturam, vel confirmationem, Machinis Corporeis eorumque partibus singulis in prima Creatione impressam, juxta cujus limites tramitesque spiritus insiti ipsis sese movere & agere tenentur. Hanc ipsam ideam seminalem particulis succi nutritii, qui omnes partes permeat & tandem in semen colligitur, impressam, cuncta generantia individua, postquam definitam figuræ Corporis sui extensionem assecuta, in Circulum quasi redeundo, posteris suis sub specie seminis communicant sicque perpetuò propagant atque conservant, docente Bekio l. c. p. 182. ita ut etiam parentes, ac imprimis Matres, nævos, excrescentias, aliosque varios Morbos ratione idearum à singulis partibus seminali materiæ præterfluenti communicatarum, in liberos propagent. Ideas hæc in semine jam elucescere, Exordio hujus dissertationis ostensum. In sanguine verò, quo in semen latet ex eoque in testiculos secernitur, easdem vias fuisse refert *Borellus C. 4. obs. 62.* quæ tamen fides sit penes Authorem.

§. 35. Naturales hæ, & Corpori nostro propriæ Ideæ, quamdiu in statu ipsis à Natura assignato imperturbatæ relinquuntur, tamdiu spiritus ordinatè omnia in Corpore exequuntur, simulac verò eadem aliqualitè transformantur, depravatè ac formosè juxta eas ut agant spiritus, necesse est. Vitiari eadem solent à variis causis, à quibus

bus



bus conformatio partium lædi solet, quas vide in Institutionum Scri-  
ptoribus, Sennerto, Mœbio, aliis. Nobis sufficiat, hoc loco anno-  
tare illas occasiones vitiatum in Corpore nostro Idearum natura-  
lium, quas suppeditant Ideæ peregrinæ, vel imaginativæ saltem, vel  
feminales.

II. Proxi-  
ma occa-  
sionales (1)  
Ideæ pere-  
grinæ. (2)  
Imagina-  
tiva.

§. 36. Per imaginativas innuntur istæ, quæ, sine ideæ mate-  
rialis peregrinæ intra Corpus nostrum receptione, per solam imagi-  
nationem, occasione objecti externi fortius commotam & fabrican-  
te spiritu nostro formantur. Spiritus unà cum sanguine, per firmio-  
rem & inconsuetam magis imaginationem hanc ratione fortiori &  
magis peregrino, determinato tamen, motu fœtui molliusculo ad-  
huc appuli, varias figuras eidem intra uterum adhuc hospitanti affri-  
cant. Legimus in *M. Marci*, Gravidam à pomo, quod deperibat,  
prohibitam, enixam esse fœtum, è cujus malâ pomum, proprio pe-  
tiolo adhærens, pendeat. Recenset *Bekius* exemplum cujusdam ute-  
rum gerentis, quæ, cum Æthiopem inopinato accedentem exhor-  
resceret insigniter, in Animi deliquium lapsa: cum E. metueret  
fœtus nigredinem, adstantium unus (qui probè cognitum habebat,  
ideas huiusmodi, de subito & ex terrore conceptas, superveniente aliâ  
ideâ contrariâ, iterum deleri) tuasit, ut statim levaretur fœmina &  
secura redderetur, nullum post lotionem nigrorem in fœtu amplius  
observatum iri. Factum hoc, & ecce! tandem peperit fœtum can-  
didum, nigrorem tamen reverà sibi impressum fuisse ostendentem,  
dum in locis, ad quæ manus lavantis non pertigerat scil. in interstitiis  
digitorum tam in manibus, quàm pedibus, nec non in inguine ac  
uno quodam dorsi loco, nigredinis vestigia adhuc retinisset. Notum  
hinc similiter est, Mulieres gravidas, de fœtu continuo sollicitas,  
quando aliquid vident de subito, à quo abhorrent, manibus statim  
involare faciem, hincque omnium frequentissimè Nævus huiusmodi  
faciei fœtus imprimere; quod si verò statim ac hoc ipsis contigit ad  
se redeunt, antequam idea talis firmiter & perfectè ibi sigiletur, manu  
faciem iterum abstergant, hancque alii cuidam loco, oculis, non adeò  
exposito, applicent, ex contraria imaginatione nævum illum huc trans-  
ferri videbis. Porro per experientiam constat, ex frequentiore & fir-  
miore pulchritudinem imaginum aut infantum aspectu, firmiter in phan-  
tasia radicato, conceptam pulchritudinem Gravidas in fœtum deri-  
vare, quod idem ex adverso ex turpiter conformatis, labiis, leporinis  
&c. subito conspectis & firmiter animo retentis, iisdem contingit.

§. 38. Nec potis solummodo imaginatio est, spiritu & san-

† ee

guine



guine mediantibus partes certas p. n. in tœtu formare ; quin & naturales ipsi partes delere iterum valet , eos , in liquorem primigenium colliquamenti resolvendo , uti ingeniosè suspicatur *M. Marci l. c. P. 4. S. 2. subs. 1. pag. 413.* cujusmodi possibilitatem experimentum Everardi ulterius confirmat , quo embryonem in materiam seminalem iterum diluit. Extra uterum partes ejusmodi amandari , uti Helmontius vult , non probabile , & recte censet Laudatus *Marci* , eò quod nunquam extra uterum ejectione conspiciantur , & hac ratione etiam fœtum imaginatione ejici posse sequeretur , ab iis imprimis , verba ejus sunt , in quibus pudor lætus & infamiae metus phantasiâ in perniciem fœtus firmavit , quod tamen minimè procedit. Ut autem exempla partium ejusmodi intra uterum deletarum afferam , adduco eadem , quæ refert *Marci* , scil. Mulierum duarum , quarum una manum gladio , altera brachium ictu sclopeti Militibus quibusdam auferri videns , hinc horrore percussa , prior manu , posterior brachio destitutum infantem mox peperit. Imò aliam enixam esse Fœtum ἀκέφαλον postquam decollari quendam viderat , mirando magis exemplo recenter.

§. 39. Consideratis hæcenus imaginativis , ad peregrinas seminales nunc descendendo ideas , quæ materialiter ipsamet Corpus nostrum subingreduntur , & cum ratione ideæ motus in pristino Corpore consuevit , quâ spiritus pollet , tum ratione particularum seminalium & determinatè figuratarum , juxta quatum ductum spiritus ille operatur , utpote quæ ambo ut plurimum inrimè conjunguntur , vim suam corpori nostro hostilem , exerunt. Exerere autem hanc ipsam videntur dum confermentatæ cum particulis sanguineis & spirituosis subjeçti recipientis & magis sic evolutæ , extensæ , ac multiplicata temper , sanguinem cum spiritibus transfluentem in loco , ubi istæ hærent , ideâ scâ , vel etiam juxta *Helmont.* peregrinâ vitæ medæ indole , quæ in sapore aut odore vitioso consistit , sigillant ac motu suo ipsis proprio spiritus nostros in consortium quasi trahunt ; unde tot in Corpore Turbæ , tot gestuum & actionum transformationes & Conformationes pro Natura ideæ peregrinæ receptæ.

§. 40. Ex eadem cau a factum , quod Puella Uratislaviensis , de qua *Bekerus in Microcosmo Medico* refert , ex poru sanguinis felini pro epilepsia tollenda hausto , felinos mores & naturam contraxerit , ita ut sub paroxysmo felis voce , saltu , gestu imitaretur , Mures in silentio venaretur , latibulisque horum avida adstaret. Pari ratione ac alias notum est , ex eadem causâ Infantes nutricum mores imitari , quod



quod eo magis confirmatur per exemplum Infantis à Capra nutriti & exinde Caprinos saltus atque mores æmulantis, cujus meminit *Excell. Dn. Preses Dissert. cit. de Mors. Viper.*

§. 41. Morbos sic pariter ac Mores ab Animalibus rabidis læsi mutantur. A canerabido demorsus Homolatræ, ringit, omnia liquida, quod morbo Carum rabioso proprium, horret, imò eadem nonnunquam cum canibus sagacitate operis dotatur, ita ut Amicos è longinquo accedentes, licet eos non videret, solo odore effluviolorum, quæ continuò corpora emittunt, cum Aere ipsi adductorum, exactè quidam discerneret & Adstantibus hunc vel illum Amicum appropinquare prænunderet, quemadmodum observavit *Borell. Cent 3 obs. 68.*

§. 42. Vidisse se quidam testantur in saliva canum rabidorum & urinâ ab his demorsorum, semina seu ideas parvos catulos, qui reverâ se moverent, representantes, quæ sanè admodum confirmarent, per idearum huiusmodi communicationem tales affectus concitari in demorsis; quoniam tamen hæc nonnullis, v. g. *Aromatario Dissert. de Rab. Contag.* dubia adhuc & imaginationis saltem illusiones videntur, donec ulteriore experienciâ hæc innotescant, in medio ea relinquo. Id interim annoto, Veritatem huius rei non parum confirmare illam observationem, quam habet *Salmuth. C. obs. 83.* de Muliere, cujus simbram togæ Canis rabidus momorderat, nascentibus deinde in loco ambrosionis vermiculis, similitudine Capitis ad Canes proximè accendentibus. Horum verò quicquid sit, id sanè certum est, effectus ejusmodi, Brutis vi idiosyncrasie seminalis ac specificæ, saltem proprios, in Homine, postquam à bruto tali læsus, ordinariò sese exhibentes, non nisi ex simili causa feminali, proprietate specificè juxta Naturam bruti istius agendi, instructâ & intra Corpus humanum receptâ, produci posse.

§. 43. Hoc tantum paucis adhuc declarandum, quomodo nonnunquam idea huiusmodi peregrinæ ac morbosa, postquam intra Corpus receptæ fuerunt, pariter ac Venena atque Contagia nonnulla, tam diu in hoc latere queant, antequam vestigia sua ostendant. Fieri hoc videtur partim, quando communicatum *minus* est minus agile vel viscidiori nimis inclusum tegmini, ut successivè demum hoc penetraret & liberum magis evadat; partim quando subjectum recipiens ad suscipiendum illud est minus dispositum & visciditatibus copiosis lentoque humorum motu præditum, ita ut ineptitudine hæc ex parte demum ablata, istud in actum & scenam saltem prodire possit: quod imprimis ineunte de novo vere faciliè fieri potest, dum Aer activis tunc parti-



culis admodum refertus contenta Corporis magis actuari & resolvi facit, vel etiam novo quodam miasmate hostili inspirato vesus illud simul excitat, ita ut sapius anno demum exacto, imprimis post morsum canis rabidi, hoc in actum deducatur.

3. *Venenæ*

§. 44. Pergo nunc ad considerationem Venenorum, de quibus notandum, Veneni nomine quæ veniunt, respectivè solùm ad corpus, quod in minutissimâ sui quantitate insigniter lædunt, ita vocari; nulum verò in se & absolutè tale, Venenum existere. Sic namque Homini quæ sunt venena, cicuta v. g. & Helleborus, Brutis, Cornici illa, hic Capræ, existunt alimenta. Scorpii ictus, teste *Vido Vido in Operib. Medic. de Curat. Morb. T. 4. L. 2. C. 8.* nocent saltem in siccioribus, quosita vocat, locis, non æquè in humidioribus, utpote quæ venenum valdè hebetant, quemadmodum Pisis sæpius se observasse, idem testatur. Opium in nimia dosi sumptum saltem est venenum, non æquè, si circumspicere adhibeatur. Porro qui frequenti usu familiaria sibi reddunt venena quædam, ab iis postmodum non alterantur, ut in circumforaneis & iis videmus, qui generosiori cuidam & subjectis venenatis petito medicamento frequentius utuntur, qui tandem ab eo prorsus non afficiuntur. Tandem Animalia quoque, quæ venenata vocantur, minimè in statu metus, sed non nisi ad iram concitata sicque affectu inimico adversus objectum, quod mordent incensa, lethaliter illud afficiunt, observante *Severino de Viperâ Pythiâ*. Hinc est, quod Viperæ Hominem intrepidè eas persequentem, ex metu fugiant & minimè lædant, uti observat *Zuñserus*, & annotat in *Animadvers. ad Pharm. Ang. Appendic. de Salub. Theriac. pag. 276. (edit. in quarto.)* Inde etiam Cicadæ à viperis in Arcâ, pro confectioe Theriacæ, detentis, tanquam alimentum ipsarum consuetum, demorsæ nonnihil, sanguine per artem facilè represso, sine noxa lethali morsum hunc pertulerunt, referente hoc *Excell. Barnero*, qui huic experimento in Italia interfuit ipse. Sic Homo denique ipse irâ & furore actus, morsus venenatos & lethales infert, observante *Hildano C. I. obs. 84.* Et quæ aliæ sunt circumstantiæ, absolutam venenorum existentiam infringentes.

§. 45. Proin respectivè solùm, & quidem ad Corpus humanum in specie, utpote in cuius saltem usum inquisitio nostra tendit. Venena consideraturus, definitio illa, quod sint Corpuscula subtiliss. salina plus minus volatilia, in propriâ specie incontaminata, corporis tamen humani respectu ut plurimum acerrima, hinc ubi ab hoc suscepta, in minimâ etiam quantitate tantas alterationes & turbas in hujus succis ac genere nervoso inducentia, ut gravissima hinc symptomata, vel necem ipsam inferant.

§. 46. *Sub-*



§. 46. *Subtilissima ea esse corpuscula* oppidò patet. Non enim crassum istud, antimonii v.g. corpus, ut oculis subjicitur, veneni, quod in eo later, formalitatem constituit, sed longè subtilius quid in eo reconditum. Testantur hoc infusa antimonialia, corpusculis nullo sensu palpabilibus imprægnata, iisque tam paucis ac subtilibus, ut licet vel centies unum idemque frustum vitri antimonialis novo semper vino infuderis, vix tantillum ponderis, nihilque respectu molis externæ, ei decessisse animadverturus sis. Particulis tamen quibusdam Vinum ab eo fuisse imprægnatum, vomitus à singulis infusionis partibus excitati docent. In tantillâ particulâ resinosa amarâ consistit vis venenosa purgans Colocynthidis: extractâ enim hâc per lixivium Salis Tartari, pomum pristini ferè ponderis remanet, sed omni vi spoliatum, quemadmodum experimentum hocce ab *Excell. Dn. Praside* didici. Ex istâ subtilissimi in Scorpione aculei & acutissimi in vipera dentis, vix vestigium læsionis, nedum particulas venenosas mediante ejus liquore aut salivâ communicatas videre potes: subesse tamen tales, & non solâ acutie instrumenti lædentis damna inferri lubauguravit jam *Galenus 3. de Loc. aff. c. 7.* ubi Scorpii aculeum non agnoscit sufficientem, sed substantiam insuper quandam vel spirituosam, vel humidam subesse suspicatur, quæ ut mole minima, ita facultate quàm maxima fit. Quin & persuadent hoc ponderosæ rationes, quas *Excell. Dn. Prasides Dissert. cit. de Viper. C. 1. §. 1.* habet. Scil. (1) quòd diversæ maculæ varii coloris mox insequantur, non nisi à principio materiali aliquo communicato ac sanguinem dictis in locis corruptente, oriundæ: (2) quòd extrahentia, in principio statim adhibita, juvent; (3) quòd partibus carnosis ex morlu tali læsis similia nihilominus symptomata sequantur, hincque appareat, non ob læsam saltem partem nerveam gravia hæc symptomata h. l. contingere. (4) quòd dentes non æque acuti, Animalium quoque aliàs non venenatorum in statu iracundiæ, lethalem æquè tragædiam excitent.

§. 47. *Quoad alterum.* Ænæ quòd sint particulæ venenosæ, imprimis quæ ex minerali & vegetabili Regno depromtæ, *acrimonia eorum* demonstrat, utpote solis Æbus propria. De hac autem in ipsis præsentè, varia testantur, ac primò ipsæ venenorum species, quæ acridine manifestâ in sensum incurrunt, ut Mercurius sublimat. purgantia fortiora, helleborus, euphorbium &c. quorum venenositatem in Æe volat. acri consistere, *Pechlin. Tr. de Purgantibus* egregiè ostendit, atque insuper ex eorum sapore caustico patet. Et quamvis arsenicum, aliaque nonnulla, ob intimiorem veneni ejus inclusionem



ad gustum videatur dulce, ventriculo tamen immixtum rosione acrimoniæ, quæ latebat prius, satis manifestat. *Secundò* quòd cuncta vegetabilium & mineralium venena per temperantia corrigantur & mitificentur. Sic Mercur. sublimat. si, addito novo Mercurio vivo, sublimetur, evadit dulcis & innoxie sub debita dosi & circumspeditione adhibetur. Mercurium vitæ per Spiritum Vini Sylvium ita mitigasse, ut *aditro* saltem operaretur, *Venerandus Præceptor, Excell. Dn. D. Bohn in Chymico suo Collegio, novissimè habito*, retulit. Et universale quasi venenorum ore haustorum temperativum atque correctivum præstat Lac, butyrum, oleum amygdal. dulc. omniaque pingua ac diluentia quoque, ut Aqua simplex copiosè desuper hausta, dum diluendo hæc acrimoniæ simul valdè infringunt. Sic exemplum hinc loci cognitum habeo cujusdam, qui ex errore Aq. Fort. bibens, haustâ mox desuper copiosâ aquâ, ab omni noxa immunis reddebatur. De muribus res nota est, si arsenicum comederint, modò aquam desuper bibant, eos evadere.

§ 48. Acrimonia autem hæc duplex est, acida aut alcalina. In vegetabilibus venenosis consistit eadem in  $\Theta$  e volat. acri alcalino, quod aliquo modo patet ex eorum per acida castratione aut correctione, quæ tamen per alcalia fixa quoque procedit, quatenus hæc volatilitatem eorum tollunt, non tamen prorsus omni vi, quemadmodum acidâ, ratione essentialis contrarietatis, ut plurimum faciunt, ea spoliant. Mineralium venena in acrimonia acido-alcalina ac volatili consistere videntur, quod vel exemplo Antimonii patet, cujus neque substantia acida sulphurea solitariè e. g. Sulphur viridescens ex Antimonio per Aqu. Reg. soluto separatum, ad  $\Theta$  j. innoxie juxta *Tachenium* propinatum, neque ejus pars alcalina mercurialis sola, per acida, v. g. in bezoardicis fixata, sed ambæ saltem combinatæ, catharticæ sunt. Particulam limitativam, ut plurimum acerrima, addidi, eò quòd exceptio veniat faciendâ de Animalium Venenis, utpote quæ non tam in acrimonia, quàm motu spirituum affectu itæ impetuosius intenso idemque seminalibus frequenter determinato, uti per exempla superius allata constare poterit, consistere videntur.

§ 49. Volatilitatem particularum venenosarum arguit earum partim effectus ut plurimum maximè subitaneus, partim correctio earum per fixiora subjecta. In propria specie, cum *Aromatario de Rab. centag. P. 4. particulâ X. incontaminatas easdem dixi*, h. e. respectu Corporis, cui propriè insunt, naturaliter se habentes & minimè corruptas, ad differentiam contagii, de quo paulò post, quod simili ferè principio



cipio quidem gaudet, sed in se præternaturaliter jam constituto & quasi putrido.

§. 50. Cætera quæ definitionem complent, per se certa & res experientiæ sunt. Species autem venenorum & varios ea suscipiendi ac nos afficendi modos hic tractare, non est hujus instituti, sed ex *Sennerti Institut. Cap. de Morb. totius substant.* & ex *Charletone*, qui imprimis de hac materia solidè agit in *Exerc. Pathol.* §. nec non ex *Vidi Vidi* allegato superius loco, videri & dictis faciliè applicari possunt.

§. 51. Subnecto hîc saltem, multa Corpuscula in se innoxia & nec pro venenis ab ullo habita, nihilominus in certis subjectis facile mobilibus, subtilioribus, aut idiosyncrasiâ singulari præditis, æquè cum venenis gravia producere symptomata. Sic notum est de odoribus nonnullis, e. g. moschi in chirotheca eo infectâ, quod vel tantilla eorum particula suscepta fœminas haud paucas, nec non viros quosdam literatos, in subitaneas conjiciat Lipothymias, suffocationes & affectus convulsivos, hystericos &c. De qua tamen odorum efficaciâ infra plumbus.

§. 52. Progredior nunc potius ad principia morborum minuta, venenis valdè similia. Contagia scilicet, quæ in hoc potissimum à venenis differre dixi, quod in Corporis, quod naturâ inhabitant, pecie à statu naturali jam degeneraverint: De cætero in plurimis, etiam quod sub specie fermenti nonnulla venenorum agant, cum his conveniunt. Et cum *Fermenta morbosa* intra corpus nostrum genita cum contagiis valdè concordent, ipsaque hæc nil nisi fermenta morbosa extra corpus; in quo primum nata, deducta ac in aliud quoddam corpus analogum tacitè derivata, morbum planè consimilem in ipso paulatim & fermentando quasi progignunt, sint, idèò junctâ ambo opera optumè considerabimus.

§. 53. Fermentorum nomen & doctrinam ex *Helmontio* potissimum habemus, sat tamen obscurè ab eo relictam. Illustrarunt deindè eam nonnihi *Willisus* & *Kergerus* Tr. de Fermentatione, sed partim crassè latis, partim insufficienter adhuc. Re tamen longius penes me revolutâ, nihil aliud tandem ea esse deprehendo, quàm particulas volatiles (spirituosas, materiæ cuidam lentæ seminali, salino-oleosæ, tenui tamen, intimius immixtas, quam ipsam dum in minima resolvunt, ac in similem sibi substantiam convertunt, (quod suis finibus clientem qualitatem coaptare vocat *Helmontius* Tr. sextupl. Digest. §. 14.) in atmosphæram quandam odoratam cum illis diffunduntur, perque hanc in objecta vicina adæquata agentes, parvâ sui quantitate magnam

3. Contagia & 4. Fermenta morbosa.



magnam horum massam in eandem cum ipsis naturam transmutant. Crassa horum exempla habemus in flore cerevisiæ vel panis fermento rebus fermeatandis addito, quorum exigua partiuncula in massam ingentem vim distam exercere solet. Nec tamen crassum istud corpus, quod pro panis v.g. fermento habemus, sed longè quid subtilius in eo latens fermentum propriè constituit.

§. 54. Corporeitatem, liceat mihi technicè loqui, Fermentis plurimi Authorum, ac ipse imprimis *Helmontius Tr. Cause & Initia Naturalium*. §. 24 & alibi passim, denegant, ac medium quid inter substantiam (per quam corpus innuere videntur) & accidens ea esse fingunt. Quod tamen quàm difficile & vix possibile conceptu in Naturalibus sit, videant ipsi ejus Patroni ac Assertores. Rationes negandi eorum prægnantissimæ sequentes sunt, *Primò*, quòd Fermenta ejusmodi non possint converti in substantiam palpabilem; sed quoniam cum spiritibus hæc in parte coincidunt eadem, faciliè etiam, salva ipsorum corporeitate, pariter ac hi sensuum externorum perceptionem, ex superiùs probatis, eludere poterunt.

§. 55. Altera, quam obijciunt, difficultas est, quòd extensio actionis eorum in alia corpora penè multa, longè superet tantilli, si fermentum materiale statuendum sit, corpusculi quantitatem & potentiam expansivam. Id quod tamen minimè concedendum iis, propter exempla, quæ miram ejusmodi minuti corporis extensionem, antea vix conceptibilem sensuum judicio submittunt, qualia benè multa adducit *Illustris. à Boyle in Tr. de effluviis & Atmosphæris Corporum &c.* ac quidem quod primum est, stupendum Auri extensionem, utpote cujus unciam unam ad 7776000. pedes, h. e. ad 155. milliaria & plus quàm dimidium, sub deauratione fili argentei, extendi idem Author certis experimentis deprehendit. Et qui fidem his derogat, adeat Bracteatores & Ductores Auri, ac mira captumque suum superantia videbit percipietque.

§. 56. Altero loco pono ejusdem *Boylei* experimentum, quo accepit granum semis pulveris pyrii, hoc imbrici imposuit & vase vitreo satis capaci cooperuit, quod pro tegendo superiore orificio lamina cupreà erat instructum. Accenso intra hoc pulvere illo pyrio, fumus ejus totam vitri cavitatem (quæ ultra 29. lb. aquæ aliàs capiebat) replevit & operculo ablato postmodum per horæ circiter semiquadrantem continuò per orificium apertum erupit, spatio adeoque, ad quod fumus se porrigebat, computo exactè instituto quinquagies milles excedente illud, quod granum semis pulveris illius nondum accensum capiebat.

§. 57. Sit



§. 57. Sit tertio nobis loco odorum miranda diffusio. Ex unico gummi cujusdam odoriferi, e. g. Syracis, grano prunis injecto totum Conclave fumo & odore adimpletur. Annus, & quod excurrit, est, ex quo *Excellent. D. Barnerus in Chymico suo Collegio* præsente inter multos alios & me ipso, sequens tentamen instituit. Accipiebat circiter 2. guttas olei destillati anisi, subactis iisdem in mortario cum pauxillo vitelli ovorum, aqua simplici commiscuit, successive semper plus hujus superaffundendo, sicque, quantum memini, ultra sex vel septem mensuras, quarum una 3. libras circiter continet, extendit, sic ut aqua omnis odorem ac saporem anisi referret: imò asseveravit, se hoc modo unicam guttulam olei destillati aurantium ad 10. Cantharos ejusdem capacitatis extendisse. Biennium ferè est, ex quo asseveravi in vitro quodam Aquam Cinamomi spirituosam, consumptâ hac, elui sæpius vitrum hocce cum aqua simplici, interjecto nonnunquam aliquot septimanarum spatio, & aqua omnis saporem odoremque cinnamomi aliquantulum adhuc exhibuit, vitro nihilominus adhuc dum odorem cinnamomi leviter spirante; ut ad eò verum sit illud:

*Quo semel est imbuta recens, servabit odorem*

*Testa diu.*

In Chirothecis odoratis quantillum, quæso, est, quod unum eorum par possidet odoriferi, dum paucis floribus Jasmini, ut ex relatione laudati sæpius *D. Barneri* habeo, stratificatis vel centum eorum paria Venetiis inficiunt: observavit tamen incomparabilis *Boyle cit. Tr.* in quibusdam Chirothecis ultra 30. annos odorem adhuc perdurasse & hodièque perdurare, cum tamen impossibile sit, quin semper aliquid de iis exhalet. Imò, quod majori admiratione dignum, quò magis extenduntur & subtilisantur particule odoratæ, eò magis energiam suam commonstrant. Sic Ambra non, nisi resoluta saltem, v. g. cum oleo quodam destillato, odorem spargit, & ejus 3j. fermentata cum Musto, ultra 50. hujus mensuras odore suo imbutit: quod experimentum in *Laudato Collegio Physico* Lipsiæ hîc institutum fuisse, refert *Excellent. Barnerus*; simul exemplum Aquæ Rosar. destillatæ adducens, quam in Italia, ubi copiosè paratur, sub ipso destillationis, adeoque resolutionis actu majorem longè, quàm aliàs odorem, & talem quidem, qui integras plateas impleat, spargere testatur.

§. 58. Ecquid verò odores aliud, quàm corporis, ex quo prod-eant, particule minutissimæ, salino-sulphuræ, resolutæ & ad subje-ctum usque, quod afficiunt, materialiter dispersæ propagatæque. Incor-

† ff

poreæ



poreæ enim si essent, sensu minimè possent percipi, siquidem proportio inter organum & objectum requiritur, & quæ immaterialia sunt, sub sensum nunquam cadunt. Ut taceam eorum Corporeitatem exindè satis constare, quòd corporibus peregrinis occurrentibus haud paucis adhærescant, diutiusque in his persistant. Ex quo proindè patet, nec fermentis, utpote quæ cum odoribus hæc in parte cõcident, & sub odorum specie agunt, similem extensionem ac corporeitatem esse denegandam.

§. 59. Dari in corpore nostro huiusmodi Fermenta, eaque distinctæ naturæ, ut plurimum tamen acidæ vel urinosa; aut ex utriusq; mixtæ, varia ingestorum alimentorum pro partium, ad quas deveniunt, diversitate, resolutio, immutatio ac assimilatio, nec non distincta partium nonnullarum, Ventriculi Renum &c. fracedo ostendit. In Ventriculo immutantur alimenta fermentatione in Chylum acidum pro odoris, qui in dicto loco deprehenditur, naturâ. In Intestino duodeno salus idem fit à bilis fermento admixto, & particulas recrementosas paulatim ex se dimittere incipit. Sanguini ubi infunditur idem, sub successiva circulatione ac fermentatione tandem resolvitur plurimam partem in Nectar rubicundum à particulis spirituosissimis fermentativis sanguini inexistens. Partibus deinde singulis assimilatur & in earum substantiam convertitur, procul dubio quoque ratione cujusdam fermenti in iis localis ac seminalis, siquidem à sola appositione particularum, quod *Cartesius* vult, coagulatio, firmatio & consolidatio ejus in partis specificam substantiam, procedere non potest. Serum ab eo dum secernitur & quidem in Renibus, fracedinoso ac urinoso odore hisce connato, imprægnatur, sub eoque foràs excernitur, quod idem ferè fit sub ejus per cutis glandulas miliares, quæ ut plurimum aliquem odorem, fermenti indicem, solent spirare transcolatione; ut taceam de saliva, quam fermentum aliquod in se fovere patet, eò quòd rebus facillè fermentabilibus addita fermentescere hæc faciat, unde non sine causa Mulierculæ dum saccharatas confectioes parant, vel in aliquo loco asservant, pusillos salivantes ab his arcent.

§. 60. Fermentorum in corpore sapor aut odor si à quacunque causa rerum non-naturalium p.n. alteretur, aut manifestus nimis fiat, evadunt ista morborum satis subindè magnorum parva initia, *Helmontio* (*Tr. Magnum Oportet* § 25.) Vitæ mediæ proprietates peregrinæ appellatæ. Hæq; sunt potentia Hippocratica salinæ, de quibus hicce *Lib. de Prisca Medicina* dicit, quam diu temperatæ eadè sint in corpore nostro, eas hominem non lædere, mox verò ac conspicuæ s. manifestiores evadant,



dant, ita ut acidum fiat acidissimum, amarum amarissimum, dulce dulcissimum, continuo morbos nobis afferre. Ut proinde non immerito *Celeber. Francisc. de le Boë Sylvius* Praxin suam ferè ubique fundamentis hisce morborum & nis superstruat, hisque p.n. vitiatis, contrariis saporis & ni remedia summo cum Imitantium successu opponat.

§. 61. In specie verò, si alcalinum & volatile in accessu atque acredine peccet, nascuntur exinde ut plurimum, morbi breves, imprimis acuti; ardentes maligni; sin verò acidum & fixum, emergunt morbi magis Chronici. Neque enim existimandum, Chronicorum statim esse grandæ molis initium, quale in processu apparet productum, quod sanè à causa primitiva probè distinguendum. Quinimò primum eorum initium pariter parvissimum est, & in tantilla læpius causa occasionali, fermentum ventriculi fixius ac acidius nonnihil reddente, consistit, adeò ut insensibiliter proinde tales morbi, eorumque quasi Primates, Malum Hypochondriacum & scorbutus, oriantur, nec prius ferè conspectui se listant, nisi postquam profundius jam radicata, adeoque tam tarde difficilesque tunc extirpari sunt, cum tamen, si sub exordium sui statim innotescerent, tantillo medicamine auferri possent. Rectissimi hinc sano sensu dixit *Schönbornerus in Manual. Pract. p. 141.* quemadmodum lapis à gutta pluvie excavatur (primum quali excavationis initium accipit) ita à gutta quasi rerum non-naturalium successivè fieri impressionem, quæ cum morbus manifestus tandem fit, ultimo delicto præposterè impuratur. Illustrat hoc observatio, quam habet *Diemerbroecius in sua Anatom. p. 510.* collecti successivè in Lapide famulo pulveris subtilissimi lapidum in vesiculis pulmonum sicque asthma, quo ille tandem obiit, postquam coacervatus admodum esset hicce pulvis, procreantis.

§. 62. Cum *Contagii* eodem modo se res habet; eadem eorum differentia, ut alia sint alcalina, alia acidæ &c. idem etiam lædendi modus ita ut producant ista morbos breves, acutos, febres scil. malignas, pestilenciales &c. hæc verò Chronicos, ut scabiem, luem veneream, aliosque de quibus videatur *Excell. D. Maur. Hofmannus Tr. de Morbis contag.*

§. 63. Quoad originem verò Contagiorum annoto cum *Charlætone in Pathol. Exerc. pag. 192.* & *Boyleo l.c.* ex quibuscunque corporibus ferè effluere indefinenter corpuscula quædam sub vaporum forma, quæ in Aëre circumcirca velut nebulam ad extremum diffusionis suæ terminum constituunt, Athmosphæræ nomine venientem. Effluvia hæc naturam corporis, ex quo promanant, exactè



referunt, easdem ferè cum iis, quæ in corpore adhuc latent, habent vires, ita ut pro maiore earum efficacia & hæ validiorem ostendant potentiam: quæ ratio videtur, cur effluvia, quæ ab electricis corporibus ejaculantur, paleas saltem aliaque levia versus se movent alliciantque, quæ verò à Magnete, ferrum attrahant; item, quæ à sulphureis aut volatilibus aromaticis oleosis corporibus, Succino, Camphora, Moscho &c. diffunduntur, totam viciniam odoribus repleant, quæ ab aliis verò fixioribus & agilibus minus, vel nullum vel non diffusum adeò aut penetrantem odorem spargant.

§. 64. Continuum hunc particularum ex corpore effluxum *Laudatus modo Boyleus* variis experimentis confirmavit, dum exactâ bilance eadem trutinando continuò tantillum aliquod decrementum fieri observavit. Quod idem in homine ac seipso tentavit cum eodem successu *Sanctorius* pro Transpiratione hominis insensibili investigandâ, qui sella, quæ statëræ erat appenta, insidens, ex corpore leviori successivè reddito deprehendit, unicâ die per insensibilem transpirationem tantum evacuari, quantum per alvum 15. dierum cursu, quemadmodum de hoc videatur *eius Medicina statica S. 1. aph. 60.* Imò Transpirationem hanc insensibilem ulterius confirmant canes venatici, qui non solum Ferarum, sed & Heri proprii, quamvis longius, &c, quod *Boyle L. c. 132.* refert, septem milliaria jam progressi, vestigia solo odoratu exactè insequuntur.

§. 65. Quod si E. contingat, ut in certo Aëris Tractu, vel ex Mineralibus, post diuturnâ incarcerationem, terræ motum, Solis calorem nimis exaltantem, aut novas quasdam mutationes subterraneas, (à quibus novos epidemicos morbos derivat *Boyle in Cosmicis suspicionibus p. 25.*) effluvia venenata & diversimodè corrupta ac combinata exhalant, vel ex cadaveribus insepultis, locis squalidis, palustribus aut Cæno stagnante foetidoque obstitis, miasmata, putrida quasi, exsurgant; Aëremque hōc modō inquinant, inspirata cum eo simul intra Corpus Animale p. n. hoc, e.g. Peste, afficiunt, ejusque humores corrumpunt, Cumque ab Animalibus, ac ipso homine, sic inquinatis similia semper effluvia morbosa per os etiam, exhalant, faciliè postmodum ab aliis quoque vicinis simili modo suscipiuntur aut corpori horum afficiuntur; quod ipsum si in Crasi seminali cum priori Animali, ex quo contagium hoc morbosum manavit, conspiret, (unde inter consanguineos & certa genera Animalium nonnunquam effectum solummodo fortitur) simili inde morbo afficitur, sicque contagia hæc sensim multiplicantur & in plura se diffundunt subiecta.



§. 66. Ac sanè tantillum sæpè est, quod pro hujus propagatione sufficit. Etenim quàm exiguum haud rariò, nares odore peregrino molestans, totum corpus illicò inquinat? Quantillum ex manu scabiosa susceptum, similem in universo corpore luem producit? Sic tantillum sæpius est quod corporibus inanimatis, raris imprimis ac porosis, linteis &c. adhærens & per aliquot annos quiete in iis persistens, dum quacunque occasione ea de loco in locum moventur, iterum resuscitatum expirat, & novâ peste, vel morbo contagioso alios homines inficit. Exempla talia perquam multa in Authoribus leguntur, Boyleo c. l. Charletone, Diemerbroeck de Peste, aliisque.

§. 67. Quæ hæctenus adductæ morborum causæ occasionales proximæ, spiritus ac humores immediatè ferè affecerunt. Paucis adhuc partium continentium ac nervearum imprimis, tantillæ læsiones contemplandæ, ex quibus unâ cum partibus contentistorum corporis systema sæpius in consortium trahitur. Summus rerum Conditor sapientissimo consilio corpus nostrum ita construxit, ut se habeat instar Machinæ hydraulico-Pnevmaticæ, hujus rotulæ sive fibrillæ cuidam nerveæ, ad motum necessariæ, si tantillum impedimentum vel læsio inferatur, plures partes, nisi & tota Machina compatitur. Patet hoc per exempla.

§. Læsionibus exiguis partium continentium, nervearum imprimis.

§. 68. Ut à levioris momenti causis incipiam, perpendamus tantillum pulviculum oculis illapsum, vel Cili pilum intrò versus oculi bulbum deflexum aut crescentem, quantas mox creet molestias, lymphæ effluxum, sanguinis stagnationem, hinc oculi inflammationem, non omni semper periculo carentem, nî causa comprimens maturè auferatur. Vertebrarum dorsi levis subluxatio aut contorsio, Germ. das Wehthum vocata, dum nervi & vasa sanguifera leviter sic saltem comprimuntur, quanta, quæso, interdum excitat symptomata per consensum nervorum & spirituum, lipothymias, sudores syncopticos, difficilem respirationem, nauseam, vomitus, virium prostrationes, ita ut mors interdum instare videatur, meritoque proindè restitutio (das Einrücken) quantocyus instituenta sit.

§. 69. Hæcque saltem ex compressione tantilli nervorum spatii oriuntur: graviora longè symptomata superveniunt, si ipse nervus vel tendo quidam, circa articulum imprimis, aut etiam membrana quædam sensilis pungatur, aut vulneretur, unde universi sæpè corporis oriuntur convulsiones, interdum Gangræna & ipsa non-



nunquam mors, quemadmodum *Pauli in Parekhsi de Febr. Malign.* alique observant. Similiter *Boerhaave de abdit. Morb. Caus. ex cadav. dissect. revelat L. I. P. I. c. 12.* exemplum refert pertinacis & duodecennalis Cephalalgiae ex parvis diploidis internae particulis diffractis & Meninges tantillum pungentibus.

§. 70. Nec à fortuitis hujuscemodi saltem causis partes nervosae tantoperè laeduntur: idem enim & potentius longè praestant nonnunquam causae internae. Sic peregrina quaedam aciditas intestina aut plexum mesentericum rodens in colicâ convulsivâ, partes dictas haud rarò mirum quantum contorqueri, & universum corpus ex consensu convelli facit, quod praecipuè Infantibus tenellis quotidie ad oculum ferè patet, in quibus fons Epilepsiae ut plurimum circa intestina haeret. Et quae similes aliae sunt causae tantillum systema nervi irritantes gravesque sic morbos producentes, quas singulas ex professo hic adducere, diffusum nimis foret. Videri prolixius tamen de talibus potest *Willisus de morbis convulsivis.*

b) Remedia parva.

§. 71. Morborum magnorum quemadmodum exigua ut plurimum sunt initia, ita parvae sapientius quantitatis, magnae tamen efficaciae, eorum existunt medicamina. Ac parum abest, quin omnium fere morborum minima dicam esse remedia, haud dissimili ratione ac primordia in omnibus fere morboris affectibus parva asserui. Licet enim, antequam corpori ingeratur medicamentum, non omne sit minutae adeò doseos, ad partem tamen affectam non nisi sub forma minimi ut plurimum pertingit eique medetur. Ut enim ex corde in universum corpus ejusque partes unà cum sanguine, tanquam vehiculo, distribuatur, in minima sane distrahi vel discerpi illud necesse est. Propelli verò hoc ad singulas Machinae nostrae partes, circulatio sanguinis docet, utpote cujus lege huic vel illi saltem parti adduci nequit, siquidem cor pellens ad quascunque partes indeterminate se habet, & praeterea manifeste videmus, sanguinem, qui una pulsatione ex corde evibratur, & medicamentum necessarîo intime confusum sibi continet, tam in ramos Arteriae magnae, qui ad superiores tendunt, distribui ac urgeri. Si proinde medicamenta, quorum vis ac dosis non adeò concentrata, non nisi sub forma minuta parti affectae medentur, quanta erit subtilitas particularum, in quas medicamenta, etiam extra corpus minima, diffundi similiter opus est; quemadmodum reverà fieri ipsa experientia demonstrat.



§. 72. Dari verò medicamenta, sub minuta mole insignem efficaciam foventia ex seqq. patebit. Crasis medicamentosa in exiguo ut plurimum consistit principio, quod, si à quiescentibus reliquis, quæ illud in operando valde impediunt ac stomachum saltem onerant, separetur, sub dosi granulari tantum, imò plus præstat, quam integra libra totius simplicis, quemadmodum *Le Febvre Chym. P. 2. L. 1. Proæm. in fine* docet. Apparet hoc in Resinis purgantium extractis, Scammonii, Jalapæ &c. in quibus omnis vis cathartica concentrata est, ita ut ad grana paucissima propinata sufficientissimè purgent. Spiritus vitæ aureus Rulandi, qui nil aliud, quam Extractum Colocynthis, ad guttas 20. propinatus dat purgans æque validum ac portiones vel decocta purgantia ad integras libras propinata; quod remanet ab extractione, omni & amaro & vi spoliatum est, antiqui tamen ponderis ferè. Minus & insensibile prorsus est, quod ex Antimonio extractum vomitus movet, hoc in sapam vomitorium, Sylvio adeò commendatum, si redigatur, ad gr. j. ij. assumptum sufficientissimè operatur. Pro scopo diaphoretico oleum destillatum Guajaci guttis 8. 10. integris aliorum haustibus vix cedit efficaciam, nec aliquot grana & is volat. viperarum, C C. integris pulverum aliorum acervis. Quod idem affirmandum de Sp. & is ammoniaci, qui simul acidum viscidumque egregiè tollit. Contrario saporis alcalino nidoroso vel dulci aliquot guttæ spir. cujusdam aciduli, e. g. sulphuris per camp. medentur. Porro olea destillata essentialia, absinthii, cochleariæ, sub concentrata unius guttæ dosi essentia ipsorum integram unciam effectu superant. Ac olei destillati Cinnamom. unica guttula quantum in momento reficiat, narrabunt illi, qui Lipothymia prostrati, tantilla ejus in apicem linguæ illinitione iterum exsuscitati & ex orco revocati sunt. Opii granum quantillum est, quod tam divinam sæpè præstat opem, si circumspèctè adhibeatur. Et hoc ipsum *ut specialius hæc applicem*, meritò generale quasi morborum remedium esse dixeris, dum spirituum exorbitantias, in omnibus ferè morbis accusandas, tam mirè compe-scendo, naturæ ita succurrit, ut interim causa morbosa occasionalis eò melius exturbari possit: in quo ipso cuncta tantopere expetita, remedia generosiora universalia, sulphura metallica fixa, cum eo ferè conspirant, nisi quod ratione causæ morbi simul vim debeant possidere, quodcunque acre temperandi ac corrigendi.

§. 73. Hoc



§. 73. Hoc sanè affirmare omninò licebit, Initia Magnorum Morborum dum adhuc parva, utpote cum quibus saltem negotium hîc nobis est, pharimacis etiam exiguæ molis facile extirpari posse. Specialius ac prolixius tamen omnium, de quibus egi, parvorum Morbi interiorum curam ut annexam vix expectabis, Lector Benevole, cum quasi generaliter de ipsis iisdem Morbis in antecedentibus saltem dixerim, prætereaque limites hujus Exercitii nimis excreverent. At brevissimis nihilominus annoto sequentia.

§. 74. Ideæ imaginativæ, si curabiles adhuc, vix aliter, quam contrariæ imaginationis firmâ persuasione mutantur in melius; feminalium cura vix omnium promittenda est, quæ tamen morfu rabidorum communicatæ, quo & Venena ab Animalibus illata pertinent, primo sui initio tolliterum possunt, si (1.) illæ ex loco laeso mox evocentur, antequam altius in corpus progrediantur, quod sit partim ligaturis, partim scarificatione ejusdem, ac extrahentium applicatione: (2.) Per sudorifera alexipharmaca, sicubi quid massam sanguinis jam subintravit, statim eliminetur. Venena per os hausta omnium optime per vomitorum statim educuntur, ac per alexipharmaca temperantiaque, de quibus supra, corriguntur, acidæ quæ sunt, naturæ, iis alcalia, alcalinæ indolis acida, & volatilioris consistentiæ figentia opponendo. Contagiis idem fere medendi modus competit; nisi quod in morbis epidemicis; Peste &c. accedere insuper debeat Aëris per particulas odoratas antidotales, at quantæ subtilitatis corpuscula! correctio, quo in puncto fumus sulphuris imprimis excellit. Fermentorum naturam cum contagiis coincidere fere dixi, proinde nec cura horum adeò discrepabit, imprimis attendendum erit, ut sapor odorque morbosus in his per contrariæ, ac specificæ, si fieri potest, naturæ medicamina tollatur. Quoad læsiones externas partium nervolarum, curantur hæ, si spinam, h. e. causam lædentem, genitumque inde acorem hostilem abstuleris, spirituum exorbitantias per opiata & nervina aromatica nonnihil compescueris, & læsionem factam debite iterum consolidaveris.

§. 75. Minimum proinde cum peccet in recensitis morborum generibus initium, indicatio in tantilla saltem hujus ablatione consistit: quæ cum per remedia minimæ & minus adversæ molis obtineri possit, quid opus erit, ut tam frequenter & citra necessitatem ut plurimum, in jucunditatis, quæ in medendo semper spectari debet,

*Usus prægressæ Disquisitionis.*

debet, leg  
ac haultib  
seam diffi  
discant ma  
tiscunt, re  
longinqu

§. 7  
ruli. Suff  
ter ac ma  
tes tantill  
fusa, exci  
minus ab  
feci, & Te  
quæ aliò n  
juber, ex p  
num Num  
delæ, maxi



D

Præcip  
nem

S  
Præ  
eo j



debet, legem peccemus ac bicubitalibus compositionibus, decoctis ac haustibus horrendæ quantitatis, aliisque medicamentis ad nauseam diffusis, ægros oneremus ac moremur? Ægri verò ex hisce discant maturè, quando tantillum erratum commiserunt vel perentiscunt, remedia vel Medicum in usum vocare, si sumptuum & curæ longinquitatem evitare volunt. Adeò namque vetus illud verum est:

*Principis obsta, serò medicina paratur,*

*Cum Mala per longas invaluere moras.*

§. 76. Minima, fateor, de minimis, quæ proposueram, attuli. Sufficiens siquidem ac specialius de singulis acturo, non aliter ac maximi ex iis effectus, ita & maxima Speciminis hujus, limites tantilli Exercitii longè excedens, & in integrum Tractatum diffusa, excreceret moles. Condonabis igitur, Lector Benevole, minus ab omni parte curiositati Tuæ, vel etiam stylo limatori, satisfeci, & Temporis angustia, quo hæc scribere cogor, ejusque Legi, quæ aliò me vocat, & brevius, quam proposueram, abrumpere jubet, ex parte hoc adscribes. De cætero admiraberis mecum Divinum Numen, in minimis tam Naturæ, quam Morbi ejusdemque Medelæ, maximum ac admirandum, cui sit Soli Gloria.



## DE USU ET ABUSU PRÆCIPITANTIVM.

### CAPUT I.

### HISTORICVM.

Præcipitantium Remediorum in Medicinam Introductionem, eorundem abundantiam, & scopum recenset.

#### §. I.

**S**I quis alius, sanè aph. 22. §. i. Hippocratis, à quibusvis Medicis, *ὀργασ-Praxin* præsertim exercentibus, maximi semper habitus fuit; dum *μὲν hu-* eo ipso triplicem partium corporis contentarum fluidarum, siue *morum* humo. quid?  
† gg



humorum statum, scilicet, ἀνόητος, πεπασμὸς, & ἐργάσιμος insinuat, in acutum febrium curā, attentē observandum. *Oraculum*, appellavit, modō laudatum aphorismum Galenus, & in ejusdem observationem, felicitatem quā in curandis agris per 40. fere annos fruebatur, maximē referre solitus est Septalius, Mediolanensium Politer, in animadvers. & caut. l. 3. §. 48. pag. 70. Quod speciatim ὀργάσιμος attinet, consistit hic ipse in impetuosiori humorum & notabiliter exorbitante motu, tam intestino, quam progressivo, ita ut p. n. quasi effervescentes, simulque tumultuosē per vasa & conceptacula sua delati, horrendorum subinde symptomatum occasionales causæ existant; Unde non ineptē, ab interpretibus Latinis, *Turgescentiæ* inprimis, hinc & *ebullitionis*, *fermentationis insignioris*, & tantum non *effervescentiæ* nomine vertitur. Alii *ferociam materiae morbosæ* vocant; *Poterius* l. i. febr. c. 37. p. 49. *turgentis* i. e. *ferentis materia impetum*, appellat.

ὀργάσιμος  
unde dicitur,  
quid proprie  
significet.

§. 2. Equidem τὸ ἐργάσιμον Græcorum, indeque descendens ὀργάσιμος proprie, anxiam animalium & is appetentiam, & furibundum in eandem impetum, quā determinatis annis temporibus agitantur, summeque irrequieta redduntur, innuit: in quā auræ genitalis acrioris & volulioris ratione, præter genitalium pruriginosam titillationem, & hinc libidinosos & is stimulos, sanguinis & aliorum fluidorum turgescentiam, & impetuosiores agitationem ac commotionem, spirituum concitatiores impetum, intensiorem corporis æstum &c. patiuntur: Paucis negotium hoc expedit, accuratus aphor. Hippocr. interpretēs *Hollerius Comment. in aph. Hippocr. f. 1. aph. 22. p. 80. Verbum turgere, ἐργάσιμον, translatum ab animalibus, libidine titillatis, quæ ob concubitum desiderium, stare loco nequeunt.*

Similis  
observatur  
in  
menstrua-  
tione mu-  
liebri.

§. 3. Analogum quid, quoad sanguinis nimirum turgescentiam, experiuntur fœminæ, menstruationis tempore, in quibus, occasione auræ fermentativæ, à genitalibus inspiratæ, rarefcentis & præternaturæ modum turgentis, ac tantum non ferventis sanguinis impetu, dolor dorsi & circa spinam lumbosque pulsatio, ut & distendens molestia, artuum tensiva lassitudo & gravitas, dolor capitis, hypochondriorum inflatio, & inprimis ejusdem per uterinæ arteriarum anastomosin excretio, excitantur: quæ undecunque impedita, ferociens sanguis, quæ datâ portâ, per nares, os, oculos, aures, mammarum papillas, umbilicum, pedum pollicem, vesicam, & nescio quæ loca alia, impetuosē proruit. Ut taceam, menstruam febrem, in quibusdam dum lunare persolvunt tributum, observatam; Refert *Lindanius* in Coll. M. S. sup. *Hartman* se nosse matronam, jam vetulam, quæ quoties menses accederent, febrem trium dierum pateretur.

§. 4. Or-



§. 4. Orgasmus talis metaphoricus, sed p. n. cum non raro ob similitudinem morborum sub motu, praesertim febrium, in corporis fluidis observari soleat, appellationem similem & hic adhibuisse placuit medicis. Pro- pariter ad-  
dit autem se manifestissime per varias tam excretiones, quam transla- p. n. humo-  
tiones (sympomaticas dictas. Humor enim estu orgasmi, modò in hanc, rum mo-  
modò in aliam partem insiliens, nullo subsistit loco, donec tandem irru- tus appli-  
ptione facta in aliquam nobiliorem partem, exitialem inferat vitæ calam- catus.  
tatem: ut loquitur Poterius c. l. Unde & materia turgens, qua stare loco nescit, quibusdam definitur: V. Castro. Quae ex quibus l. 2. c. 1. p. 67. aliis humor mobilis instabilis, ferociens &c. appellatur.

§. 5. Turgescencia talis humorum, & inde ferè oriundæ trans- Causa Or-  
lationes & excretiones symptomaticæ, sequuntur in genere, nimiam gasmi hu-  
materiae occasionalis acrimoniam, tam benignam, quam malignam; morum ad  
sive enim ex aucta effervescentiâ contentorum, live ex irritatione par- genera, est  
tium continentium, & hanc insequente concitatori motu locali con- acrimonia  
tentorum p. n. sive ex utroque derives turgescenciam & agitationem eorum ni-  
istam humorum, sanè ubique principale peccans erit acrimonia mi-  
mia. Scilicet non moventur suo apte impetu contenta fluida, sed per  
meatus canalesque consuetos, seu organa, fibrarum eorundem mi-  
nisterio, & spirituum moventium potentiâ, tam naturaliter, quam  
praeternaturaliter feruntur. Utrobique praesupponitur stimulus,  
qui sub humorum Orgasmo est in ipsis contentis, quæ potentiarum  
Hippocraticarum beneficio cum saltem activæ existant, intempera-  
tura eorum, cujus ratione nos lædunt, nil aliud erit, quam acrimo-  
nia nimia.

§. 6. Pressius ut loquar; fermentum acidum volatile acrius, In specie,  
(plus minus tale, sub morborum inde oriundorum latitudine) tam fermen-  
benignum, quam malignum, sive intus (aut objecti, aut efficien- tum acre  
tis vitio) ex assumtis genitum, sive extrinsecus inspiratum, vel ali- acidum  
unde contagii nomine susceptum, origo est orgasmi, cujusvis humo- vol.  
rum p. n. hoc enī aut texturam sanguinis sive crasin temperatam  
pervetendo, aut chylum & lympham exasperando, aut bilem vitiosè  
acuendo, aut spiritus influos inquinando, primò motus horum inte-  
stinos, tam absolute quam respectivè tales, (in relatione nempe fluidi  
unius ad alterum, eorumq; mutua miscelæ) p. n. vitiat, & in turgescen-  
tiam ac comotionem, effervescentiæ plus minus similem concitat, hinc  
tam acrimoniæ quam turgescenciæ humorum respectu, partes conti-  
tes sensiliores irritat, quâ occasione, spiritus imperum faciens fibra-  
rum ministerio, contenta diversimodè, ac inordinatè, subinde tumul-  
tuose



tuose admodum agitat, & impellit per vasa naturalia, donec facta meatus ejusdem, vel turgescens simpliciter & rarefcentis nimis humoris, vel impeditur ejus undecunque fiat (nunc meatus angustati, nunc ejusdem à fibrarum partis irritatæ stricturâ coarctati vitio) ordinariæ transmissionis occasione, anastomosi, symptomatica illius aut *ἐκκεκταις* aut *μετάστασις* superveniat.

Motus humorum & intestinus & progressivus junctim Orgasmi humorum constituitur.

§ 7. Uterque scilicet humorum motus, tam intestinus quam progressivus, junctim in constituendo Orgasmo concurrere solent. Equidem à posteriori hoc progressivo p. n. seu sensibus manifestiori, communiter Orgasmi humorum ratio saltem desumi solet. Vid. *Plempius Fundam. Medic. l. 6. c. 3. p. 336.* sed malè. Cum hic ipse potius sit adjunctum, ne dicam effectus, Orgasmi humorum principaliter talem, concomitans. Non secus ac sup. §. 3. turgescenti sanguini excretionem variam supervenire sub menstruatione plus minus p. n. insinuavimus. Aut sicut mustum, vel cerevisia novella fermentationis sub impetu turgescunt, ac ita quasi intumescunt, aut vel vasis ora impetuoze excedant, vel arctius inclusa illud penitus dissilire faciant. Sanè altius quid, quam progressivum saltem humorum motum vitiatum per turgescentiam insinuare *Hippocrat. cit. aph.* vel ex hoc subsumere licet, quod coctis crudisque evacuationis respectu societ turgescentes succos, & eosdem quasi medio loco, inter hos non movendos, illos verò evacuandos collocet. Uti verò texturæ humorum respectu, & heterogenearum particularum vel arctius connexarum cæteris, vel commotionis febrilis, adeoque motus intestini p. n. beneficio separatarum ab iisdem intuitu, cruditatis & coctionis ratio habetur, non motus eorum localis, cujus modificatio artificialis eyacuatoria per artem, post coctionem factam demum instituenda venit, sicut à Naturâ tunc demum institui solet. Ita turgescentiæ nomine, primariò humorum crudorum adhuc, sed impetuosius sub suo ad coctionem motu ebullientium, adeoque motu intestino p. n. agitatorum status insinuat, cujus occasione & vitiatu progressivus motus adeoque excretiones aut translationes symptomaticæ superveniant, interdum à Medico, Naturæ ministro imitandæ, nunc easdem provocando, nunc promovendo: qui genuinus dicti *aphor. Hipp.* sensus videtur.

In quibus affectibus talis turgescencia humorum contingat.

§. 8. Utut verò *Hippocrati*, non secus ac superiorum seculorum Medicis turgescencia & orgasmi talis humorum, cum eorundem eruditate & coctione, saltem in febribus, tam intermittentibus, quam in specie continuis acutis, benignis pariter ac malignis, asserta fuit, cum in iisdem manifestiora illius observentur Phænomena:

Ab

Ab horum  
alio affectu  
ac hypochon  
tiones, &  
tus hyster  
borygmi  
præcord  
lores par  
subinde  
Aus, ex  
ribus, su  
lominus  
in febrib  
Etibus lo

§.  
per auxil  
Medici,  
Unde du  
tur in mo  
pitantur  
quò faci  
theoreti  
in quo d  
administ  
venire lic  
nus clara  
tationem  
confund  
sis, aut h  
nomen  
nere æq  
Passim  
da sint,  
turalia  
riantes,  
res siste  
re, quo  
subacti

§



Ab horum tamen successoribus, hodierni præsertim ævi Medicis, etiam aliis affectibus p. n. accommodata fuit. Sic enim sodæ ardores, pariter ac hypochondriacorum & scorbuticorum Phlogoses vagæ, ac æstuationes, & singulis momentis variantia symptomata, fœminarum tumultus hysterici, inflationes sublimesque hypochondriorum dolores, borborygmi abdominis, diarrhæa graviores, cholera acutiores, anxietates præcordiorum, cardialgiæ contumaces aut sæpius recidivantes, dolores partuum vagi, hæmorrhagiæ effrenæ, Ictericorum pathemata, subinde atrocia, epileptici per consensum insultus, & plures alii affectus, ex ebullientibus, turgescens, & ferocientibus contentis humoribus, sub theoretico illorum scrutinio, derivati fuerunt. Hæc nihilominus observanda videtur differentia, quod Organismus talis primariò in febribus, iisque speciatim acutis, secundariò verò etiam in aliis affectibus locum inveniat.

§. 9. Turgescens tali humorum præcipitationem eorundem, per auxilia, ab effectu supposito, præcipitantia dicta, opponere satagunt Medici, iisque minutorum symptomatum stragem maturè avertere. Unde dum crebrius ebullitio effera & turgescens humorum accusatur in morbis, sub eorum fiendi modo, frequentissima quoque præcipitantium remediorum injicitur mentio, & implorantur suppetiæ. Ast quò facilior eorundem est usus Practicus, eò jejuniùs est scrutinium theoreticum, dum vix apud quenquam distinctius evolutum reperias, in quo operandi eorum consistat ratio, & qua methodo rationaliter administranda veniant. Equidem de posteriori hoc nullibi aliquid invenire licuit, quoad prius vero istud, mirabilis confusio, & rei aliàs minus claræ major obscuratio saltem observatur, dum quidam præcipitationem cum solutione, alii cum coagulatione, alii cum unione plurium confundunt, & ita rotundis quadrata miscunt: alii effectus à suis causis, aut harum operandi modis minus distinguunt: alii præcipitantium nomen ac usum adeo latè extendunt, ut tantum non alterantibus in genere æquipolleant, adeoque lusum saltem in vocabulo committunt. Passim de eorum usu & actione quæ occurrunt, si in pauca contrahenda sint, huc ferè recident, remedia præcipitantia fermenta præternaturalia destruere, ferocientes humores quosvis, tam in primis viis luxuriantes, quàm in vasis & visceribus sanguiferis & lymphaticis ebullientes sistere eorumque impetum sedare, & Crasin viciatam simul corrigere, quo alterati vel naturalem in Crasin & texturam coëant mutuo, vel subacti per convenientes vias debitè evacuari queant.

§. 10. Primarius scriptorum, & ferè quoque primus, qui præ-



A quibus  
autoribus  
primitus  
ac maxi-  
mè intro-  
ducta.

cipitationis & præcipitantium mentionem ac usum pressius inculcat, est *Sennerius* l. 2. de febr. c. 17. p. 259 ubi de specificis intermittentium febrifugis disserendo ita inquit: *Ut quod mihi videtur, dicam, talia medicamenta præcipitatione quadam, vim illam effervescenti, & paroxysmum excitandi in humoribus tollere videntur. Cujus rei documenta passim occurrunt; Ut jam non dicam de eo, quod cerevisia ac recentis vitium cretâ injectâ à vulgo emendatur, & acetum cretâ injectâ aciditatem amittit, ac spiritus Oli cum sale Tartari mistus aciditatem perdit: manifestum hujus rei argumentum est in ardore stomachi, quem Germani den Good nominant, cum à bilis in ventriculo ebullitione vapor quidam, & status ardens attollitur, & dolorem ac ardorem in orificio ventriculi & Oesophago excitat. Ad quem affectum tollendum cretam, oculos cancri, bolum armenam, & similia, quæ acerbis & acutis liquoribus acrimoniam præcipitatione quadam adimunt, usurpari, vulgò etiam notum est. Succenturiatur huic strenuè, si quis alius, *Kergerius*, tr. de fermentat. f. 3. c. 3. q. 249. & sq. Dum optimam & omnibus febribus salutaribus solam sufficientem esse præcipitationem, asseri ita ut in inquinamenti febrilis sive fermenti præcipitatione, totius curationis cardo vertatur, unde & unico ferè medicamento præcipitante, ultra mille febricitantes, sine aliis remediis, sine aliarum circumstantiarum quatumvis consideratione, curasse se asserat: p. 250. In malignis quoque optimum esse, aut præcipitantia cum alexipharmacisnectere, aut istiusmodi alexipharmaca eligere, quæ præcipitandi virtute simul polleant, ut hac ratione, utriq; scopo, & maligna qualitati, & fermentationi satisfiat. p. 251. Accedunt his alii: Sic enim *Mynsichtus*, in *Armament. Medic. Chym.* p. 115. Species diacreta, Tartarum in orificium ventriculi sublimatam, efficaciter resolvunt & præcipitant. Peculiarem præcipitandi furias æstuantis sanguinis vim habent oculi *Di-nitilissimi* itaq; in pleuritide iidem à Præcticis adhibentur, notante *Sachso* *Gammarol.* p. 662. & 719. Oculi sive Lapilli Cancrini etiam in aliis febribus adhibuit salutem sperare jubent. Quâ ratione id præstent si queratur, respondendum agere id vi præcipitatoria: id p. 732. Rectè moderni medici, novo sed aptissimo vocabulo operationem oculorum cancrorum, in ardore ventriculi seu sodâ præcipitatione dicunt fieri: & p. 736. & 737. In dysenteria, ubi fermentatio acrimie humorum pulv. testarum Cancror. in solet. & præp. valet, imò oculi *Di-crudi* propter bezoartica vi additam præcipitandi facultatem, non secus, ac ut ad eundem effectum cortices ovorum induratum, ossa hominis philosophicè calcinata, ossa sepia calcinata, C. C. f. & c. & præp. commendantur: sicissima enim hæc omnia, imbibendo humores orgasmoturgentes sive fermentantes, acredine spoliant. Testa itaq; *Di-crudi* oculi in dysenteria præcipitando conducunt.*



§. 11. Tot autem prostant præcipitantiæ medicamenta, ut  
 potius de selectu laborandum, quàm de defectu & inop à quærendum  
 sit. Adeò liberali manu omnibus in tribus regnis polychresta hæc me-  
 dicamenta nobis Natura suggerit. Animal quidem in Regno, quævis  
 animalium partes duræ, ut in genere cornua, dentes, ossa & ungulæ: v.g.  
 C.C. Ebor: Dens apri, cranium humanum, ungula aleis, glossopetra.  
 Quibus etiam associantur concreta alia lapidea, in quacunque corporis  
 parte reperta, v.g. lapid. ex cysti bovis fellea, bezoardici orientalis, &  
 occidentalis ex ventriculis capricervarum extracti, & qui his vix cedit  
 vi bezoardicæ, calculus humanus: item aliis in corporis regionibus re-  
 perti lapides, sicut mihi est lapis ex teste castoris, castaneæ magnitu-  
 dinis, durus, & fortiter castoreum spirans. Marina speciatim & omnia  
 ostracoderma huc pertinent, eorumque testæ, aut coagulata lapidea, v.g.  
 Ostrearum testæ, & gammarorum, speciatim horum chelæ, & lapilli,  
 oculi & communiter dicti. Conchæ qualibet, & harum fructus per-  
 læ, cochlearum testæ, ossa capitis Lucii piscis, spina mustelæ piscis, Oss.  
 sepia. Quibus adde & Ovorum ex Volatilibus testas, & speciatim il-  
 las Struthionis.

Præcipi-  
 tantia ex  
 regno ani-  
 mali.

§. 12. Vegetabilium luxuria suggerit nobis concreta styptico-  
 terrea, plus minus aromatica, speciatim cortices, ut fraxini, quercus, qua-  
 jaci, & qui primo loco nominandus fuisset, corticem arboris peruanæ  
 Gannanaperide, dictæ, qui communi nomine, China Chinæ aliàs au-  
 dit: cortic. Cinamomi, & quasvis Canellarum species, quo & cortex  
 Winteranus, Anglis in scorbuti cura adeò usitatus, pertinet: it. rad. tor-  
 mentillæ, fl. ros. rubr. fructus istos anomalos quercinos, gallas, it. frutices  
 ex arboribus crescentes, scilicet visca, in specie quercinum, tiliaceum, &  
 cæteris quod præstat, corylinum. Item Nucleos osseos, mespilorum,  
 daetylorum, aut nucleorum esculentorum involucria, quasi ossæ, ut cor-  
 tic. avellanarum, nucl. persicorum, &c. quibus addantur inter vegeta-  
 bilia & mineralia, mediæ quasi naturæ, de utroque scilicet participantia,  
 coralia qualibet & his cognatos poros ac madreporas, quin & al-  
 cyonia, &c.

Ex regno  
 vegetabili.

§. 13. Mineralia denique regnum, divissimos suos prodendo  
 thesauros, subministrat quasvis terras fossiles medicatas, per artem ferè  
 sigillatas, tam Europæas quàm Asiaticas, & quæ ad has pertinent, mar-  
 gas, creram, Lac Lunæ, medullam saxorum, unicornu fossile, bolos: Lap.  
 plures minus pretiosos tyncis, osteocollam, crystallum, Lap. calcarium,  
 speciatim dialis quæ sunt prosapia, fossilia, ut hæmatitem, magnetem,  
 rubri-

Ex Mine-  
 rali.



rubricam fabrillem, quin & laterum coctorum pulverem; metalla ferè quælibet, speciatim ☿, ejusque ☿-l, & Hnum, & hinc ☉, item ♀ & ☉, & qui integræ pharmacopœæ vices suppleant ☿ & ☉.

Eadem  
Prepara-  
ta.

§. 14. Præparata horum nativorum artificialia, speciatim mineralium sunt varia ac multiplicia. Pertinent ergò huc omnia illorum præparata, in specie sic Pharmacopœis appellata, ut Corall. Lap. ☿ hæmatit. præp. it. omnia calcinata, ut C. C. ustum, specif. febrile Tertianarum Strobelberg. aut Crollii, calx viva lota, ejusque ☿, it. ☉ ia fixa per vegetabilium calcinationem producta, horumq; ☿ per deliquium, aut ex iis concinnatus Liquor præcipitans *Clauderii, tr. de balsam. Corp. l. 7. §. 8. p. 208.* Sane ut ☿ tart. per deliqu. um appropriatum præcipitationis instrumentum quibusdam dicitur, ita idem liquor, inter præcipitantia, & quæ hac in classe eminent, febrifuga, pariter excellit: quin & ☉ ia vol. quælibet, tam vegetabili, quàm animali ex regno petita, ut ut aliàs præcipitantibus minus associata: ex mineralibus Terra ☿-li dulc. ☿ ialia fixata quælibet, simplicia & composita, electra minora quibusdam dicta, ut ☿ Diaph. ☿ ial. Ludov. antihect. Poter. ut & ☿ ialia, quæ quò magis talia, eò præstantiora; hinc quædam *sublimata*, ut fl. Lap. hæmatit. & ex his arroph *Zwelfer. Mantiss. p. 338. it. fl. ☉ \* ☿ ial.* & ex his sedativum Archei ejusdem, p. 339 ut & primum ens ☿ Boylei, *Usefulness of Experim. Philos. p. 2. l. 1. app. p. 330.* cum quo conspirat ☿ ☿-li Philosoph. *Cnöselli Misc. Acad. Nat. Curios. ann. 6. & 7. app. p. 36. & 70.* Ut & alia præcipitata, ut ☉ fulminans, & plura ex ☉ parata remedia, quavis sub formâ aut consistentiâ, it. ☿ ialia, in specie ☉ vitæ dicta, plus minus composita, ad quæ & Febrifuga Riverian. pertinet: It. particulares plures, mineralium præsertim præparationes, ut tot Croci ☿ iales, it. Tinct. ☿ tis, dictæ aperitivæ, Liquor ☿ ☉: ☉ ☿ compos. seu Tinct. ☿-li ☿ Zwelf. in formâ siccâ, tot tart. ☿ ales, & Tinct. ☿ ales cum tart. præparatæ, ut Tinct. ☿ aperitiv. ☿ lata *Ludovici, Misc. Acad. Nat. Cur. anno. 3. p. 453.* Syrupus ☿ tartarificatus *Lemery Chym. p. 157.* (à *Willisano* artificio ☿ præparandi, haud multum abludens,) it. *Febure. Chym. p. m. 773.* uti & tot adstringentes, quos inter eminent quæ vulgò Tinct. tart. ☿-li dicitur: hinc crystalli mineræ Hni, magist. Hc. spiritu ☐ præcipit. Saccharum Onis &c.

Et compo-  
sita.

§. 15. Ex quibus simplicibus plus minus talibus, ingens compositorum turba emergit, quæ tamen facile à prudenti Medico, Naturæ simplicium gnaro, & qui eorundem ad causas morbosas applicationem artificiosam perspectam habet, ex tempore diversimodè misceri possunt.

possunt.  
Medic. d  
pag. 114  
661. & l  
pulveres  
Cornach  
pete lau  
rios. ann  
appellat  
nucem  
& flores  
Clauder  
c. l. p. 1  
§.  
tantum  
hæc ipsa  
sic putat  
dimetien  
tes duræ  
natæ, m  
gentia,  
ut Lap. ☿  
pharmac  
§.  
sius calefi  
non proc  
saltem p  
diacrist  
fiendiqu  
tius Nat  
rotechni  
quædam  
ma. textu  
titativis,  
mutatio  
genere, &  
liter. pe  
medican  
sent: un



possunt. Illa inter sunt v. g. *pulvis antifebricitus perlatus Timai*, in Medic. descript. Cal. annex. p. 425. *Species diacreta Mysi*, in armament. pag. 114. *pulveres antipleurici*, it. *bezoardici à Sachsi* Gammarol. p. 664. & s. it. 715. descripti *pulv. dysentericus Crollii*: in Basilic. p. 344. tot *pulveres Cathedici*, basi & superstructi, *pulv. Comitum de Warvick* s. *Cornachinus*: *Tinct. antiphthisia Lapis Chymicus*, à Glauhero tanto-  
pere laudatus per experientiam confirmatus, in Misc. Acad. Nat. Curios. anno 2. p. 227. hæmatites artificialis quibusdam non adeò ineptè appellatus. *Elix. præcipitans* quorundam, ex aloë, myrrha, croco, nuce mosch. c. *Tinctura tart. extractum*, cui spiritus ✱ it. c. calce vivâ & flores & debitâ proportionem sociantur. it. *Elix. propriet. aperitiv.* *Clanderis*: de balsam. Corp. c. 7. p. 204. aut *Essentia purificans* ejusdem c. l. p. 195.

§. 16. Veteres apud Medicos, nulla penitus horum præcipitantium, tali quidem sub consideratione, occurrunt vestigia, cum hæc ipsa ab iisdem remediorum vires saltem secundum manifestas, sic putatas, præsertim primas, & hinc secundum occultas qualitates dimetientibus, modò inter *refrigerantia* & *siccantia*, ut animalium partes duræ, tam crudæ, quàm cum aut sine  $\Delta$ e præparatæ ac calcinatæ, modò inter *aperientia* ut *Sialia* & *G-lata*, modò inter *adstringentia*, ut cortices vegetabilium, O, Terra  $\Phi$ -li, modò inter *diuretica*, ut Lap.  $\Theta$ -rum, crySTALLUS, testæ ovorum, modò inter *sudorifera* & *alexipharmaca*, ut Lap. bezoardic. & fixata: Terra sigill. recensita fuerunt.

§. 17. Sed cum hoc nostro seculo, Chymicorum furni intensius calefieri, & pyrotechnia studiosius excoli cepisset, ita quidem, ut non processum, quos vocant, nudæ elaborationi, aut remediorum saltem præparationi, sed Phænomenon, sub concretorum syncrifi & diacrifi artificiali, considerationi accuratiori & causarum eorundem, fiendique modi scrutinio, inserviret, sanè insigniter mutata fuit, ut totius Naturalis scientiæ, cujus Clavigera est, & thesaurorum custos Pyrotechnia, ita inprimis specialissimæ ejus partis, & quæ illius Praxis quædam existit, Medicinæ, facies, dum ex Concreti, secundum minimam, texturâ horumque affectionibus Mathematico mechanicis quantitativis, actionum & passionum in corporibus vicissitudines variæque mutationes, *formaliter*, ex minimorum syncrifi, diacrifi & metastasi, in genere, & ex minimis  $\Theta$  inis, seu cæteris portionibus, in specie, *materia-liter*, per motus efficientiam, clarè magis & distinctè explicatæ, & medicamentorum quoque in ægrotis operationibus applicatæ fuissent: unde fieri aliter haud potuit, quin & operationes plures arti-

Quorespe-  
ctu à vo-  
teribus ad-  
hibita fu-  
erunt.

Ocasione  
Chymia  
magis ex-  
cultâ, à  
modernis  
in Thora-  
peusim in-  
troducitur.



ficiales seu pyrotechnicæ, ut functionibus partium corporis naturalibus, ita & p. naturalibus accommodatæ, sed & pro explicando remedium agendi modo adhibitæ fuerint, nunc quidem dextrè, nunc verò sinistrè, ut de fermentatione & effervescencia, præparatione, circulatione, solutione, fixatione, volatilisatione, filtratione &c. manifestum est: quas inter & præcipitatio, operatio si quæ alia sub chymicis laboribus frequentissima, respectu alterationis determinatæ, fluidis corporis per remedia quædam inducendæ, tantum non omnium suffragio recepta fuit, & quæ præcipitationis modo, aut huic proximè simili activa existere putantur remedia, præcipitantia dicta fuerunt.

## CAPUT II.

## THEORETICUM.

Præcipitantium Naturam, usum & Operandi modum  
evolvit.

## §. I.

*Præcipitatio Chymica quid & quotuplex.* **P** Ræcipitatio, (quantum quidem ad præsens negotium ejus consideratio pertinet) ceu separationis quidam modus, in genere accepta, opponitur propriè & formaliter heterogeneorum plurimum arctiori unioni, & effectivè ut plurimum præparationi. Estque talis motus, quo unita antea exactius, separantur ab invicem, ita ut hæc, quæ ita separata fuerunt, proprio impetu deorsum ferantur. Arctior talis nexus & unio, cui præcipitatio opponitur, haud melius quàm solutionis nomine vocari potest, ita ut in specie præcipitatio talis sit motus, quo soluta, à menstrui, vel propriè talis, l. huic analogi, compedibus liberata, proprio nisu subsideant. Effectus cujus ratione, & præparationi rectè opponitur, ut ut non adeò universalis sit hic præcipitatorum ad imum descensus, quin & ad superiora interdum ferantur, pro respectivâ nempe gravitatis præcipitatorum ad corpus, cui unita fuerunt, proportionem. In Vino fermentante, eodem præcipitationis actu & feces ad fundum descendunt, & flos spumofus, ceu cremor quidam supernat; Si alcohol. Vini vegetabile quoddam resinofum, una cum camphorâ infusum fuerit, pro illius quidem extractione, hujus verò solutione, & postmodum medio, factâ præcipitatione, camphora reviviscens summa petit,



petit, resinâ ad imum descendente. Talis tamen separatio, in quâ superiora petit præcipitatum, non nisi in latiori vocis præcipitationis acceptione locum habere videtur. Præcipitatio omnis vel perfecta est, vel imperfecta respectu separationis est pariter vel spontanea, vel quatenus ab addito perficitur violenta: fit denique vel viâ humidâ, vel viâ siccâ; illud frequentius, hoc rarius. Sub  $\text{Hn}$  calcinati scil. cum  $\text{☉}$  vel silicibus vitrificatione,  $\text{☉}$  &  $\text{☿}$  cum  $\text{Hno}$  unita præcipitantur, &  $\text{☿}$  beneficio regulus ex  $\text{☿}$  fusione separatur, & infra scorias præcipitatur.

§. 2. Fundamentum cujusvis præcipitationis in genere (prolixâ doctrinâ in pauca verba contrahenda venit) consistit formaliter in mutatâ texturâ mechanica vel corpusculorum continentium (unionitium, solventium, voca ut lubet) respectu particularum præcipitatarum, vel contra harum respectu continentium, vel denique fluidi intermedi, respectu alterutrius, aut utrorumque. Textura consistit in particularum figurâ, magnitudine, situ, ordine, pondere, motu vel quiete, & hinc dependente respectivâ ad se invicem proportionem, unionem & nexum, quorum uno aut pluribus mutatis, mutatur subito textura & cohesio, fitque vel quarundam separatio, vel earundem in novum concretum coalitio, vel alia plures similes mutationes. In musto, ex mutata per attritum mutuum sub fermentationis labore minimorum texturâ, retentâ ac solutâ antea communi unionis vinculo, particulae plures separantur & secum forma descendunt, ipsis cæteris in novum concretum se contextentibus, vini nomine notissimum, & hoc omne sub specifici acidi dominio.  $\text{☿}$  in  $\text{V}$  soluta, per laminas  $\text{Q}$ is præcipitatur, hæc per bacillos  $\text{☿}$ . hic per Cincum, hoc per alcali fixum vel volatile: quatenus in omnibus his, acidæ  $\text{V}$  particulae, mutato situ, & ordine promptius se uniant, cum aliis metallicis vel alcalisatis particulis, ob majorem figurâ, magnitudinis, ponderis &c. cum istis congruitatem, unde  $\text{☿}$  res sic dimittuntur, seu potius ab aliis extruduntur, quæ derelictæ ad fundum descendunt: idem effectus, ex  $\text{V}$  salsa infusa observantur, quatenus  $\text{☉}$  inâ hujus particulae arctè & copiosè simul adhærescunt  $\text{☿}$  solutæ mechanicâ ex congruitate (formaliter) undè hujus particulae figurâ, mole, pondere &c. auctæ, retineri ab istis  $\text{V}$ is nequeunt, quin  $\text{☿}$  corneæ nomine subsideant. Fluidum denique tam  $\text{A}$ eum, quàm præsertim aqueum, tam quantitate, quàm qualitate, aut consistentia, aut motu, secundum minimorum coalescentiam mutatum, pariter ex mechanicâ necessitate, præcipitationem nunc promovere, nunc impedire observatur: dum multa in frigido loco

Ejusdem  
funda-  
menta me-  
chanica.



præcipationem patiuntur, quæ in calido, sub æquabili unionis texturâ subsistunt. Ac in magisteriorum resinolorum ex Vegerabilibus quibusdam præparatione, menstrui S. V. ad medietatem abstractio prævia requiritur, si cum  $\nabla$  com. præcipitatio commodè succedere debet.

*Præcipatione in fluidis nostris, in statu sano.*

§. 3. Præcipitatio, eaque tam spontanea, quam violenta, perfecta, in viâ humidâ, quin in machina corporis nostri, ejusque actionibus plurimis purè mechanicis, locum inveniat, haud quisquam facile dubitabit, siue naturalem, siue p. n. consideret statum. Quæ in primis intestinorum viis, secum, ceu excrementorum digestionis primæ, fit secretio, haud sine præcipationis modo, bile & lymphâ pancreaticâ mediantibus, evenire, denegatus horum succorum eò confluxus, obstructis, aut undecunque impeditis excretoriis vasis, & inde nata cæliacæ affectionis ista species, in quâ alvi excrementa chylola prodeunt, persuadet. Sub sanguificationis motu, præcipitantur pariter crudiores chyli partes, &  $\square$ o latice absorptæ, ceu excrementum secundæ digestionis, forâs emissæ, contenta in sanorum  $\square$ is constituunt, siue separata, in illò fluctuent, siue soluta in illo dispareant, facile tamen per alcalisata præcipitabilia.

*Eadem in statu aegro.*

§. 4. In statu morbofo, totum istud materiæ, ut vocant, morboficæ coctionis, sub febrium, præsertim acutarum, cursu, anceps negotium, in quo & salus & interitus ægri versatur, & quod unicum Crisium, tam per ecclisim, quam per apostasim fundamentum existit, non nisi præcipationis spontaneæ modo, mediante commotione minimorum in sanguine fermentativâ, hoc est, acidi fermentativi saturatione, & cum aliis heterogeneis particulis, ex cæterarum consortio extrusione, accidit,  $\square$  Phænomenis, secundum tincturæ, consistentiæ, opacitatis, & subsidentię vicissitudines successivas, id attestantibus. In malignis pariter, petechialibus, purpuratis, cutaneæ excretiones & efflorescentiæ separationem heterogènei & corrupti, ab alimentitio & vitali, præcipitatoriam præsupponunt, cum sine hac præviâ secretio aut excretio laudabilis fieri ulla nequeat. Scilicet, ut paucis multa complectar, sicut in mechanicis, ita & nostro in corpore, nulla heterogèneæ materiæ, fluido cuidam commistæ, per quodvis colatorium aut filtrum secretio fieri potest, nisi eadem prius, solutâ unionē firmiori, separatam fuerit, hoc est, plus minus perfectè præcipitata, in illo fluctuet. Non ineptiunt illi, considerato scilicet Naturæ motu ordinario, qui ebullitionis & excretionis tempus in Variolis præsertim discriminant, cum ibi fermenti acidi morbofi specifiçi, cum corruptis sanguini-



sanguinis particulis saturatio in acido ☉ sum, & ex aliorum nexu exclusio, h. e. præcipitatio, hinc præcipitata substantiæ intra pororum & meatuum cutaneorum impedimenta retentio, & sic demum ex sanguine & lymphâ secretio obtineat: ut ut certis temporum ac dierum momentis, non adeo strictè alligandum sit. Chronicis in morbis, cachexiis, ejusque speciebus, chlorosi, Ictero, scorbuto, & similibus crudæ ☉æ, h. e. tenues, plus minus, si crassescant, aut turbidæ, si copiosa sedimenta seponant, & sub horum secessu ad naturalem successivè redeant faciem, præcipitatorium heterogenearum particularum ex sanguine secessum, cum euphoriam ægri, ostendunt.

§. 5. Sed missa istâ naturali præcipitatione, de artificiali, per medicamenta in corpore nostro perficiendâ in præsentiarum speciatim disquiritur, adeoque violentâ, per medium nempe præcipitans, externum, in viâ humidâ instituendâ, plus minus perfectâ. Qualis scilicet arte in *Cerevisiæ acescentis, cretâ injectâ emendatione, aut ardoris stomachi per cretam, ocul. ☉ bolum armenam, quæ asribus & acutis liquoribus acrimoniam præcipitatione quadam (ut vocant) adimunt, curatione, ut verbis & exemplis Sennerti, de febr. lib. 2. c. 17. p. 255. utar, contingere putatur. Aut quando specificum antifebrile Crollii, horam unam ante paroxysmum febricitanti Tertianario propinatum, materiam febrilem in vasis ac cavitatibus quasi oberrantem separat, figit, & ad fundum secum deducit. Sic Creta pulverisata ardorem ventriculi compefcit: sic biliosos succos astuantes acidum ☉-li deprimit, sunt verba Schenckii Diss. de Ferment. Præcipit. §. 6.*

§. 6. Verumenimverò, uti Naturæ opera, per ista, quæ sunt artis in corpore nostro mechanico more convenientissimè explicantur, cum non solum Deus & Natura ubique geometrizen, sed talis phænomena Naturæ declarandi ratio, præ omnibus intellectui ceu clara & distincta magis, utpotè immediatè sensibus connexa, apprimè arrideant: tamen non absque cautelâ circumspectâ eadem, ne apparente similitudine decipiamur, applicanda veniunt. Quod si & hoc in negotio operationis remediorum per modum, præcipitationis suppositæ, rem accuratius paulo considerare velimus, revera ingens disparitas mox manifestabitur, adeo ut sæpius, si non semper, nil minus, quàm præcipitatio propriè sic dicta, locum obtineat, si genuinam ejus considerationem applicare velimus.

§. 7. Scilicet triplex ferè casuum morbosorum est differentia, quibus pro medelâ præcipitantia ab autoribus opponuntur. 1. *Hu-*

*morum nimia acrimonia, iisdem compefcenda. Genuinum enim præ-*

*De artifi-*  
*ciali per*  
*medica-*  
*menta, est*  
*questio.*

*Quæ vix*  
*locum ha-*  
*bet in cura*  
*morbosorum,*

*Triplex ca-*  
*suum dif-*  
*ferentia in*  
*quibus in-*  
*usum vo-*  
*cipi-*  
*cantur.*



cipitans, acida ex templo dulcificat; verius signum adduci non potest, adeo enim ✱ acerrimum hac ratione ad dulced nem vel gratum saporem reduci potest, alletente Langio: *Diss. de Morbill* addit. 11. Tartarum crudum acidum sunt qui mutato nomine hic accusant, coraliis, perlis, & piscium lapidibus præcipitandum & corrigendum. conf. *Glauberus* p. 2. *furnor* p. 55. & 56. Hinc scorbuto, ejusque pathematis gravioribus, ista & similia multi usui esse solent: non secus ac & in hypochondriacis affectionibus præcipitando edomandis extollitur, aut in dysenteria testæ cancerorum, eorumque lapilli, it. ossa humana calcinata &c. de quibus supra §. 10. commendantur. 2. *Humorum nimia turgescencia* & plus minus fermentativa ebullitio aut effervescentia istis mediantibus sopienda, & inde nata aestuatio intensior temperanda. Hinc enim præcipitantia, genuina quibusdam dicuntur refrigerantia, & furias sanguinis æstuantis in pleuritide præcipitandi vim habere *Lapillos* &c. supra §. 10. insinuatum fuit. *Febris nulla sine fermentatione aut ebullitione existit.* Hinc si v. g. nux moschata, alumen, tormentilla pulvis, aut antifebrilis *Crollii*, margarita, coralia, lapis bezoar, lapides pretiosi, & his similia simplicia febricitantibus propinentur, quandoque accidit, ut febris desinat. Cur? quia *Ære* aut ebullitio illa, per ea ita sistitur, æque ac ardorem stomachi oder die *Good* / usu solius simplicis *Creta pulverata* sisti novimus, ut dasset *Veteranus*. *Prædictus Pauli*, in digress. de febrib. malign. p. 92. 3. *Fermenta p. n. undecunque oriunda*, contenta corporis turbantia illorum ope subigenda, ac per præcipitationem destruenda. *Hoffmannus* in *Methodo medendi* p. 258. 259. existimat, omnem ferè morborum progressum vitioso cuidam deberi fermentorum ortui, &c. &c. In horum autem conversione tota curationis ratio consistit &c. &c. sic v. g. in omni febrium curatione, ante omnia fermenta febrilia ebullitionis in massa sanguinea causa proxima, ut magis urgentia figenda aut præcipitanda per specifica antipyretica diaphoretica & diuretica. *Sennertus* pariter tr. de febribus, *miasma putredinale* & *ære*, *Αίμα* *αντεδωδες*, quod instar fermenti se habeat, quod inquinamentum febrile specifica, præcipitando destruant, passim inculcat. Quibus addatur *Kergerus* de fermentat. L. 3. c. 3. p. 249. dum inquit: Si verò fermentum aliquod aliundè (ut per contagium &c.) sanguinem intraverit, fermento per præcipitationem destructo, illico fermentatio cessat, &c.

In prima  
eorum, nō  
præcipita-

§. 8. Sed rebus benè pensit. t's, in neutro horum casuum pot  
remedia, præcipitantia dicta, hæcenus quidem usitata, & per experien-  
tiam quoq; confirmata, in eorum operandi modo, præcipitatio genuina  
locum

locum ha  
mulcenda  
potius ob  
ut ossa, m  
vitiola in  
tantibus.  
istis emer  
acescentis  
id quod n  
tia hoc m  
p. 400.  
illorum te  
corpus co  
in quo spi  
tos effect  
C. C. usu  
do, horun  
ne in dyle  
cum iis den  
ritu & )  
dit, non f  
sunt; con  
pertinaci  
plus, nun  
possint.  
proportio  
Nulla hic  
crisis, cu  
prietates,  
abolition  
gendum  
locum ha  
aut mini  
debiliori  
dem cre  
aut cora  
festa est  
cipitatur  
ait, ut d



locum habet. Prima in classe, acrimonia contentorum corporis demulcenda 1.) non est salsa, quæ præcipitantibus non corrigitur, quin potius oblinentia, & inviscantia, & simpliciter temperantia requirat, ut Osa, mucilaginosa, dulcia. &c. nec. 2.) Urinosa, cui, si unquam vitiosa in nobis observata fuerit, acidis obviam eundum, non præcipitantibus. Sed 3.) acida restat, plus minus corrosiva, præcipitantibus istis emendanda sicut ✕ aciditatem creta injecta amittit, aut cerevisia acescentis vitium creta injecta à vulgo emendatur: Sennertus l. supr. cit. id quod moderni per ova recentia feliciter quoque tentant, ab acescentia hoc modo cerevisiam præservando. Vid. Transact. Philos. Anglic. p. 400. Acidum nempe rodit ista subiecta, & arctè se sociat particulis illorum terrestribus, juxta axioma, spiritus acidus rodens, rodendo aliud corpus coagulatur, novæque texturæ emergit ex ambobus concretum, in quo spicula acidi ita infixa sive incuneata hærent, ut minus consuetos effectus, sive in nostris sensoriis, sive aliis objectis edere possint. C. C. ustum notabilem etiam spiritus & vel Θ li quantitatem imbibendo, horum acrimoniam, sub nova textura penitus obliterat, qua ratione in dysenterijs & scorbuticorum vomitibus proficuum existit. ✕ cum iisdem spiritibus (non secus ac cum aliis acidis, ✕ Qato, ∇ F, spiritu Θ) in dulce concretum coit, quale & in hypochondriacis accidit, non secus ac coralia, perlæ, & Lapilli Θ eodem modo iisdem profunt; conf. Glanber. c. l. p. 54. Θ ia alcalisata quælibet iisdem acidis pertinaciter ad eò connectuntur, mutatâ aciditate in Θ sedinem, nunc plus, nunc minus sensilem, ut subinde vel fortissimis Δ cuneis divelli possint. In omnibus his unio potius acidi, cum objecto mechanicè proportionato, quam separatio, solutio potius, quam præcipitatio. Nulla hic diacrisis, sed simplex particularum in novum concretum syncretis, cujus nova textura, ab ista ingredientium diversa, novas proprietates, & attributa, in specie acrimoniæ carentiam, & corrosivitatis abolitionem ipsi communicat. Perinde autem est, sive acidum corrigendum firmiori nexu secum retineat medium præcipitans, id quod locum habet si fortius, aut concentratum magis idem existat, ut in creta aut minio ✕ Qato injectis obvium, sive hoc tandem ima petat, illo debiliore aut alias minus mechanicè proportionato existente, sicuti eadem creta, in cerevisia acescente cum ebulliente tumultu descendit, aut coralia in succ. citri soluta pariter subsident. Ibi quidem, manifesta est solutio, hic vero nulla propriè dicta præcipitatio. Cum præcipitarum, corpus acido superadditum, nunquam fluido unitum fuerit, ut denuò per præcipitationem separari debeat, quin proprio sal-

rio, sed  
unio loci  
habet.

ccm



tem pondere deorsum feratur, & absque præcipitante addito, cadat, cui acidæ particula liquoris adhærescentes pertinacius, adeoque unitæ per accidens unâ ad fundum rapiuntur, quæ fortiores alias in fluore secum retinerent. Adeoque præcipitantia remedia, acrimoniam humorum, simplici in novam texturam cum illis coalitu, absque formali præcipitatione demulcent & temperant.

*Erroris  
huius ori-  
go.*

§. 9. Prima erroris huius origo nata videtur ex eo, quod non probè distinxerunt in solutionibus per corrosiva acia factis, addito tertio præcipitatis 1. præcipitantis cum solvente unionem 2. soluti inde factam separationem. Illud causæ, hoc effectus rationem obtinet: ibi ex nova textura acidi alteratio, de quo §. anteced. & respectiva enervatio, hic simplex soluti antea invisibiliter separatio sensilis, & genuina præcipitatio contingit. Uti itaque in omni huius præcipitationis specie, acidi corrosivi sub præcipitatione quidem, non autem per aut propter præcipitationem fit quasi attemperatio, ita mala conversione, in omni acrium acidorum correctione à corrigente præcipitationem unâ induci concluderunt: aut saltem acidi saturationem, ab insequente præcipitatione minus aptè distinxerunt, hoc est, causam cum effectû confuderunt.

*In secunda  
non præci-  
pitatio, d.  
nuda at-  
tempera-  
tio.*

§. 10. Uti itaque priori illo in casu, malè acrimonie corrosivæ præcipitationem opposuerunt, cum præcipitantia dicta, etiam sine præcipitatione, simplici unione acrimoniam istam infringant: ita posteriori in casu, æque inconcinne turgescentiæ aut effervescentiæ (§. 8. ebullitioni, fermentationi, promiscuè his vocibus uti possumus) humorum præcipitationem eorundem opposuerunt. Tantum enim abest, ut præcipitando turgescentiæ & effervescentiæ, ac dependentis inde plus minus æstuationis impetus infringatur, ut sapissimè hic ipse intensissimus concitetur, ut in præcipit. buxyi & per spiritum ☉, ☉ fulmin. per ☉ pi, ☉ is per ☉ f, ac præcipitationibus tantum non omnibus solutionum per menstrua acida, ab alcalibus præsertim fixis peractis, ad oculum patet, & in primis manifestum est, in impetuosissima illa effervescentia & intensissima æstuatione, quam observare licet, si ☉ c. ☉ solvas & subito ☉ rart. per deliqui. affundas. Equidem cavendum monet Kergerus de ferm. p. 139. ab illa præcipitatione, quæ non nisi fermentescendo perficiatur, quin talis instituat saltem, quæ blande & sine insignibus turbis fermentationem confidere facit. Sed rara est talis præcipitatio, si in fluido præcipitando acrimonia acida sensilis deprehendatur. Jam verò turgescencia fermentativa & ebullitio p.n. contentorum corporis, concitatur vel occasione petegrini fermenti, aliandè



aliundè suscepti, de quo postmodum, vel occasione dyscrasie eorum & in texturâ materiali, indeque dependentibus modis qualitatis, læsionis, unde potentie eorum Hippocraticæ, quatenus debitè non fuerint contemperatæ, sed potius per se extiterint, nos lædunt. Basis potentiarum illarum Hippocr. est acidum, hujus ergò vitio læsa crassi humorum corporis nostri, p. n. orgasmi & ebullitiones, ac æstuationes superveniunt. Sed ut generalius loquar, nimia contentorum corporis nostri acrimonia, præsertim volatilis, intestini motus p. n. occasio existit, quæ quo major fuerit, eò intensior ebullitio & effervescencia, comitante æstu insigni, accidet. Confirmat hoc mechanica chymica, quæ eò majores effervescencias & ebullitiones exurgere notat, quo acriora fuerint illa, à quorum miscela, & intestino motu illa tumultuatio concitatur. Quicquid adeoque præcipitantia auxilia opis ferre possunt, in illo orgasmo, non nisi acrius quod fuerit temperando, adeoque in specie acidum corrigendo, & ita temperatam texturam per accidens sic restituendo, præstabunt: ita, ut ea, quæ antecedente §. 8. insinuatæ fuerunt, contra præcipitationem, & hic commodè applicari possint. Requiritur denique pro genuinâ præcipitatione, medii præcipitantis cum liquore ebulliente miscela sub præcipitatione, sive contactus corporalis, qui quomodo locum habere queat in M. S. orgasmo ac turgescencia febrili, qualiscunque etiam fuerit, per præcipitantia scil. fixa instituenda, sanè haud percipio. Nec facile quisquam putabit, bezoardicum minerale, aut antihecticum Poterii, aut & diaph. Gial. aut & diaphor. ex & vit. paratum, quorundam pro variolatum cui à decantatum experimentum, aut Sirobelbergeri Croliive febrilia specifica, pro sistendis febrilibus M. S. commotionibus & turgescentiis materialiter ipsi commisceri, vel pulverem dentis apri, vel capitis lucii ossa ad ipsam M. S. usque deferri, ad corrigendam ejusdem in anginâ aut pleuritide, in specie symptomaticâ intensam ebullitionem, aut unicornu marinum vel crudum vel s. Δ præp. subire miscelam M. S.æ pro sedando ejusdem in erysipelate æstu, quæ talia in primis viis saltem activa existunt, non secus ac Osteocolla fracti ossis occallescentiam, aut crystallus lactis in mammis scaturiginem, promovent, sine eo, ut materiali sui contactu ad partes affectas deferantur. Posito quoque, quod tamen haud facile asserturum quenquam arbitror, penetrare eò hæc ipsa, tamen alteratio ista in primis viis, quam necesse est, subeant, à sapore fermentativo in ventriculo plus minus acido, ita alterabit eadem, saturando plus minus illa ipsa, ut vel enervata penitus, vel parum admodum activa, nihil, quod præci-



pitationi vel simile, vel analogum videatur, efficere queant. Adeoque præcipitantia, saltem acrimoniæ humorum temperatione, ex mutata illorum, cum his coalitus ratione, textura, absque præcipitatione, illorum turgescencias, & fermentationes p. n. cohibent.

Erroris  
hujus ori-  
go

§. 11. Erroris hujus occasio prima, coincidit ferè cum ista §. 9. insinuata. Neglecta scilicet distinctio effectus, qui præcipitantis applicationem ad fluidum, plus minus fermentans & ebulliens, immediate aut mediate, ibi per se, hæc per accidens sequitur. Sistent subinde remedia præcipitantia dicta, tam in artificialibus, quàm naturalibus nimias turgescencia fermentativas, sed non quâ talia, sed quatenus acre istud dysicraliæ & hanc excipientis p. n. effervescentiæ causam materiale corrigit, & temperant, ejusque impetum, & inde intestinum ferociorem motum frenant coercunt, sine eo, ut istud præcipitando separent, aut præcipitatoriæ talis operationis ratione, effectum istum exerant. Quod si vel jungatur vel superveniat præcipitatio partium quarundam, antea in concreto cæteris colligatarum arctius, hæ erunt tales, quæ passivæ potius, quàm activæ in ebullitionis tumultu extiterunt, & quæ saltem acris, istas rodentis, & cum iisdem aliisque in novam texturam coalescentis, infracti, & per præcipitans plus minus enervati compedibus sic dimissæ, proprio pondere feruntur: quod utut propriè dicta sit præcipitatio, tamen non hujus separationis ratione fermentativa ebullitio compescitur, utut hanc, illa immediate sequatur. Hac ratione Calce viva, fermentationem Vini, & tart. fermentationem multi cessare faciunt, cum materiæ fecibus similis præcipitatione: unde & pulv. alabastrites, silices calcinari, punices usti, revera Vina depurant, & partes heterogeneous præcipitando deturbant, non secus ac ovorum cortice Vinum à fecibus depuratur, præcipitatione reali: de quo vid. *Barolinus Cent. 4. his. 23.* In specie & tartari consideremus, hoc aut ejus  $\odot$  per deliquium musto additum, fermentationem omnem ut præcavet, ita & Vino intensissime fermentanti commistum, illico hoc à fermentatione cessare facit. Jungitur simul partium quarundam utrobique præcipitatio, quæ tamen ad effervescentiæ vel præcautionem vel sedationem nihil faciunt, cum etiam iisdem retentis licet, tamen effervescentia cessaret: acidum nempe alcalisati illius tactu & unione intimiore, ex mutata hinc concreti texturâ, à motu impetuosiore cessat, & sic pacata quies. Ut ergo rectè *Becherus Phys. subterr. l. 1. f. 5. c. 2. p. 359. §. 23.* acescentiam pro principio, vehiculo, & effectui fermentationis statuit, ita eodem teste *c. l. p. 358. §. 21.*  $\odot$  aut  $\odot$  tartari cuius fermentationi, etiam fortissima

justa

justa quan-  
legata m-  
fuit senten-  
Platon. c.  
in Billich.  
proximar  
asserenti  
distincta  
explicato  
§.  
gendum  
utin cho-  
dendum  
ri, ut intr  
adedo faci  
alorum f  
suisimul  
Ex similie  
sic dicto.  
ratione d  
tamen pe  
ab Helm  
gnuntur  
insulum c  
nempe in  
litu post d  
insulum a  
corrupti  
in cellis re  
do odor  
teria mal  
tuit, & in  
summa p  
qui in la  
des corru  
rum ver  
& contin  
Sennertus  
odor scho



justa quantitate impositum in momento fermentationem sistit. Sanè allegata modo, de acido fermentationis principio antiquissima Platonis fuit sententia, cui nec illius Anatomicus, *Billichius*, in *Anat. Ferment. Platon. c. 9. §. 106. p. 531.* nec hunc exercens *Conringius*, in *Exercitat. in Billich. p. 603.* revera contrariantur, ignem fermentationis omnis proximam esse causam, omnium qui in fermentatione apparent motuum, asserentium, considerata  $\Delta$ is, seu substantiæ ab acido realiter haud distinctæ, genuina natura, & fiendi modo, à modernis alias prolixè explicato.

§. 12. Fermentum denique p. n. per præcipitantia aut corrigendum aut destruendum, sui considerationem meretur, cujus notitia, ut in cholis olim nulla junior, ita nulla utilior. Brevitati cum studendum sit, à posteriori illud obiter dilucidandum, notitia ejus à præcipiti, ut intricatissima, ita non, nisi plurimis, latius diducendis, neque id adeò facile explicabili. Minimum nempe mole, activitate maximum, aliorum fluidorum plus minus symbolizantium, alterativum, sicque sui simul multiplicativum, fermenti morborum nomine ferè intelligitur. Ex similitudine effectiva, quam cum pistorum fermento specialissimè sic dicto, habet, cujus parum, totam massam fermentat, appellationis ratione desumpta. Unde & odorum instar subtilissimorum, summe tamen penetrantium, ferè se habere videntur, & hoc nomine etiam ab *Helmontio* fermenta in genere definiuntur, quæ auræ nomine insigniuntur à *Tachenio Clav. c. 9.* Odor vasis scil. fermentativus, Vinum infusum citissime alterat & corrumpit, quod vitium alio odore, & nempe incensi, tam præservatur, quam curatur. Odor  $\chi$ i, oris halitu post dentium cum eodem abluionem, lagenæ inflatus, Vinum infusum acescere facit. Multræ odor viciosus, quam citò alterat & corrumpit Lac? Florescentis Vitis aut hordei latè diffusus odor, etiam in cellis recondita Vina, cerevisiamque alterat notabiliter. Parili modo odor talis est, qui in variolis, lue  $\phi$ ea, petechialibus, scabie, dysenteria maligna, ipsaque peste fermentum istud multiplicativum constituit, & in contagiorum, plurimum iidem venenorum in animali regno summa potentia conspicuum se exhibet. Talis odor fermentalis est, qui in labiis vulnerum & ulcerum, alimenti in pus saniem aliasve fordes corruptivum existit, & in ejus correctione primarium chirurgorum versatur negotium. Talis odor est, qui febrium intermittentium & continuarum primariarum causa existit. Subolsfecit hunc ipsum jam *Sennertus*, cujus ævo tamen nullus adhuc, aut saltem tenuis fermentorum odor scholas medicas infecerat, dum *l. 2. de febr. c. 6. p. 107.* inquit, *mate-*



ria, quæ febrî dat originem, initio sæpe exigua est, fermenti tamen instar in continuis, reliquosque humores corrumpendi & putrefaciendi vim habet: it. C. 17. p. 244. illud putredinale fermentum, in corpore post paroxysmum relictum, initium eff. rufescentiæ & putredinis dat, facitque, ut materia, quæ antea in suo foco coercita quiescebat, jam velutiurgens & exardescens multum de se & tetricum vaporem diffundat. Certe neglecta minimorum morbificorum sive fermentorum consideratio, horumque alterativæ & sui multiplicativæ potentia, insignem causæ morbosæ materialis, cum producto morbo confusione & hinc inversam penitus mendendi methodum induxit. Appositè iterum Sennertus c. 1. 2. c. 2. p. 66. Habet vitiosa talis dispositio, sive miasma tale se instar fermenti, & subinde plures vitiosos humores generat, bonosque corrumpit. &c. vide plura c. 1. huc facientia.

Ejusdem  
alteratio  
non præci-  
pitatio lo-  
cum ha-  
bet.

§. 13. Fermentum tale morbosum, mole minimum, adeoque subtile ac penetrativum, hinc summe mobile, adeoque spirituosum ac volatile, & potenter activum seu mediante determinati motus impressione, humorum quin & spirituum ad alterationem variam dispositivum, sicque simul sui multiplicativum, saporis aut si majoris odoris specifici (forlan generice acidi) præcipitatione mediante, per supra recensita auxilia corrigendum, & inde concitata plus minus humorum turgescencia sopienda. At non video, quomodo præcipitatio in genuino sensu locum commode invenire queat, circa objectum adeo subtile, activum & penetrativum, &c. Equidem odore contrario destrui potest idem, quæ ratione odor & incens, odorem fracidum fermentativum cadit, item pestis aliarumque febrium malignarum extinguere observatur, (quod posterius camphora videtur in nobis præstare) quatenus his ipsis, illi prompte associabilibus, textura inverti, & sic activitas ejus enervari videtur: similiter ac qui ex Cingulo sapientiæ tenuis odor (ut in simili termino pergam) scabiei universam corpus inquinantis fermentum, ulcerum etiam quorumvis, delet & extinguit. Absorberet etiam, ut sic dicam, ab objectis appropriatis, hinc concentrari ac quasi figi, & ita activitate sua spoliari potest, quæ ratione fixa ista ex manibus calcinatis, febrilia specifica, fermentum concentrando & figendo, & ita in textura quasi invertendo, operari videntur. Non enim febrili contentorum corporis commotioni sedanda, sed fermento morbifico coercendo, quod inserviat talia, ex eo fit probabile, quod in paroxysmo, in quo formaliter urget ista commotio, ferè noceant, ut plurimum febrem multiplicent, adeoque ante paroxysmum propinanda sint, ut fermento saporis acidi, (de quo vix quisquam amplius dubitat) frenum ma-

ture

turè inficiat  
præcipitare  
mentatione  
quod tamen  
notat unum  
gere potest  
Bezoardi  
vol. vener  
phoreticu  
tim, qui  
minus ac  
in puncto  
tim variol  
borum sp  
cua viden  
speciali na  
impetum  
novi conc  
vata torpe  
teriaz, my  
aquilegia  
viscus co  
coagulati  
brium co  
do ferment  
lescendo,  
activa exit  
te promp  
una, exch  
mobilis  
in praxi u  
bris citra  
diant, a  
expirant  
vel in ge  
specialen  
reali, co  
pescere,  
§.



turæ injiciant, & nixum ejus motivum cohibeant. Fermentum febrile præcipitare hæc, & fermento per præcipitationem destructo illico fermentationem cessare, sententia est Kergeri: de *Ferm.* f. 3. c. 3. p. 249. quod tamen durum videtur, nisi in terminis iudat, præcipitare enim denotat unum ab altero separare, quod in tali fermento febrili non contingere potest: rectè reponit Becherus *Phys. subterr.* l. 1. f. 5. c. 2. p. 389. Bezoardicum minerale pariter, ceu exhaustum concretum, & acidi vol. venenosi appetens, quale in  $\Delta$ is examine amiserat, uti &  $\delta$  diaphoreticum, (Conf. Tachenius *H. C. c.* 22. p. 164.) malignarum speciatim, quin & continuarum acutarum febrium, fermenti volatilis (plus minus acris) promptè absorptivum & correctivum videtur. Quo in puncto etiam terræ minerales, suam activitatem in malignis, speciatim variolis & morbillis exferere probabile est. Quin imò plura morborum specifica sive appropriata remedia, hoc imprimis modo proficua videntur, quòd determinatæ suæ texturæ ratione, fermentorum speciali naturæ & texturæ magis accommodatæ, horum motum & impetum ad se convertant, & hinc in iisdem concentrata, fixata, & in novi concreti moleculam invicem juncta, fermentorum activitas enervata torpescat: sic enim cruor hirci pleuritidis, priapus Ceti dysenteriae, myrrha morbillorum &c. appropriatum remedium existit: sem. aquilegiæ, Icteri, scrophularia hæmorrhoidalium dolorosa fermenta, viscus corylinus & quercinus Epilepsiæ, Lapis spongiæ strumarum coagulativum enervant. Quin in genere  $\Theta$ ia volatil. dum v.g. februm comitatarum dictarum præstantissima existunt auxilia, saturando fermenta horum acida, & in  $\Theta$  sum cum iisdem successivè coalescendo, per  $\square$ m aut sudorem eliminandum, non præcipitando, activa existunt. Denique per sudorem quoque *disenti*, aut hoc mediante promptius extra corpus, tam ipsum, quam ejus producta morbosa una, excludi potest, ipsum cum sit subtilis & volatilis, adeoque promptè mobilis texturæ. Hinc enim sudorum, & sudoriferorum frequens adeò in praxi usus, sive fixa, sive volatila fuerint eadem. Nulla propterea febris citra recidivæ metum tutò, absque sudore curari solet. Quo mediante, acidi isti odores, qui tam sensibiliter cruciant articulos, optimè expirant. Adeoque præcipitantia dicta remedia, fermenta morbosa vel in genere absorbendo & figendo, vel in specie quoad texturam specialem alterando, vel per sudores excludendo, sine præcipitatione reali, corrigere, & ab illis concitatas humorum turgescencias compescere, probabilius est.

S. 14. Prima erroris hujus origo videtur dependere ex incon-



Erroris  
istius ori-  
go.

si deratâ effectuum plurium sub præcipationibus artificialibus coinci-  
dentium confusione, qui non distincti à se invicem, communi præcipi-  
tationis notione in genere veniunt. Res exemplis fit manifestior. So-  
lutionem ¶ in ∇ præcipitat ♀, hanc præcipitat ♂. coincidunt in hac  
præcipatione, & acidi & ♂ mutua absorptio ac unio, cui jungitur si-  
multanea ♀ dimissio: hinc confusè ♂ is ista actio, qua sub acidi hy-  
pochondriaci fermenti rofione, & mutua hinc absorptio, illius noxam  
delet, patiter præcipitatio quibusdam dicta fuit, ut ut nulla præcipi-  
tatio contingat. Parili modo, dum acida expugnantur ab alcalibus tam  
fixis quam volatilibus, & contra, cujus indicium præbent imprimis  
præcipationes mutux solutionum ab alterutro factarum, destructio  
fermentorum acidorum morbosorum ab iisdem, ac alteratio eorun-  
dem, præcipationem quoque appellant. Adeo confusio uti ubique,  
ita ut hinc quoque fecunda errorum genitrix extitit.

Præcipi-  
tantia ope-  
rantur in  
genere, a-  
cidum p. n.  
corrigen-  
do.

§. 15. Præcipitatio genuina ergo in operandi modo remedio-  
rum, præcipitantia dictorum, locum nullum obtinet. Quin, si rem  
exactè consideremus, usus eorum passivus potius quam activus erit,  
cum non tam ipsa, agendo in corporis partes, quam aliorum imperum  
activum sustinendo ut plurimum, proficua sint: adeoque resultans  
inde effectus immediatè, privativus potius quam positivus existat. Aci-  
dum nempe vitiosum est, in genere, quod per specificas aciditatum  
differentias, & junctas alias proprietates varias mille modis ut variat,  
ita & mille malorum in corpore autor existit, cujus respectu, auxilia ista,  
præcipitantia dicta, tam insigniter condecunt. Mechanica scil. confor-  
matio acidi talis supponenda venit, cui aptè respondeat medicamen-  
torum istorum textura, secundum poros & meatus non solum, sed  
etiam minutorum corpusculorum configurationem, &c. ita ut promptè  
coire mutuo, & arctè plus minus uniri queant. Appropriati ergo ta-  
lis objecti occurru, acidi spicula mox i, si se insinuant. concretum fin-  
dunt, partiulis minutis se quasi insigunt, & ita potenter in illas operan-  
tur, donec mutua unione factâ, in concretum novum, idque tertium, ab  
utroque extremorum distinctum, & in quo oblitterata acidi nociva vis  
corporis partibus minus hostilis existit, coeant. Mechanica Chymica  
hoc ipsum, quoad ♂, ♀, & ☐osa, fixa & Volatilia, ostracoderma,  
gallas, ossa animalium &c. ad oculum ut demonstrat, ita in corpore idem  
evenire, vel ex effectû, eorum usum qui insequitur, abundè constar. ♂  
nempe humoris melancholici correctivum ac digestivum ab omnibus  
asseritur, qui humor acidi nomine ab Hippocr. insignitur. Sic bilis aru-  
ginosa, ac inde suscitata cholera alexipharmacum crystallus montana  
asseritur



asseritur rectè à Langio: Epist. 3. epist. 1. c. 4. in quâ acidum bili commi-  
stum imprimis dominari experientia anatomica hætenus comproba-  
tum dedit: & sic in pluribus aliis, de quibus in sequentibus.

§. 16. Rosio hic actus aliàs dicitur, quo acida agunt in ista præcipitantia unde & vulgo, *die sauren Spiritus fressen sich zu tode* / *di-*  
cuntur: sub quo actu ex societate acidi cum corpore corrosivo, & hinc *inver-*  
novo emergente concreto, acidum morbosum hebes redditur, *temperan-*  
*tiæ, it. at-*  
*temperan-*  
*tia dicen-*  
*da.*  
*num* quod erat, aut insipidum, ut in animalium partibus duris, c. vell.  
Δ præparatis & calcinatis, aut dulce, ut in *l. h.* aut *l. h.* sum, ut in  
ostracodermis, it. *l. h.* ibus *l. h.* osis evadit, *corrosivum* quod erat, adstri-  
ctorium fit, ut in terris medicatis, Lap. hæmatit: *mobile* admodum &  
activum quod erat, torpescit, & quasi incarceratum est: uno nomine  
pristinam naturam penitus exuisse videtur, adeo ut ista remedia, aptis-  
simo vocabulo, à quibusdam *Invertentia* item propter retusas, nocivas  
ex acrimoniâ nimia, & hostiles qualitates, *attemperantia* specialiori li-  
cet sub acceptione dicantur.

§. 17. Quin imò, cum dissolvendi potentia objecti appropriati *Aut satu-*  
omne acidum activum existat & esurinum quasi, quicquid potest, me-  
chanicis sub legibus, devorare & abligurire a vide soleat, donec ad sa-  
turationis punctum usque pervenerit, quo acquisito, quiescit, & quasi  
feriatur: remedia vero ista optimè huic fini satisfaciat, ob id commodè  
quoque *saturantia*, quibusdam audiunt: quale cognomen speciatim  
ibus *l. h.* osistam fixis quàm volatilibus convenit, à quibus optimè ob  
arctiorem unionem saturantur, isti acidi vapores & cum iisdem in  
l. h. sum tertium, & ipsum medicamentosum coeunt.

§. 18. Ut autem saturent aviditatem corrosivam acidi mor- *Aut ab-*  
bosi, tamen eo ipso, quo sub rosionis tali actu, hoc ipsum una plus mi-  
nus coagulatur, (prout textura objecti mechanica magis vel minus  
ipsius conformationi responderit: sic enim v. g. spiritus *l. h.* vel *l. h.* ar-  
ctius cum *l. h.* tart. quàm cum *l. h.* coagulatur, spiritus *l. h.* arctius cum  
*l. h.* e fixo quocunque, quàm volatili se unit) ita ut quasi absorberi aut  
avidè imbibi penitusque hinc occultari videatur, ob id appositè pariter  
auxilia ista *absorbentia* it *imbibentia* pluribus vocantur. Quam absor-  
bendi vim terræ minerales, animalium partes duræ, & ex his parata cal-  
cinata, præ aliis potenter obtinent.

§. 19. Cum denique activa summè existant quædam morbo- *Aut figen-*  
sa acida, adeoque summè mobilia, idque eo magis, quo subtilia & spi-  
rituosa seu volatilia magis existant, qualia in febribus acutis, pluribus  
malignis, suo modo & intermittentibus (in quibus sub paroxysmo pro-  
gressus



gressus acidi fermenti à statu fixiori ad volatiliorem esse videtur,) scorbuticis ut vocant biliosis, ac hypochondriacis manifestum est, hæc ipsa verò medicamentorum istorum actu & locietate, minus mobilia reddantur, dum mutuâ cohesionē atque ita ex texturæ mutatione emergunt corpuscula, tam ratione ponderis, quàm ratione magnitudinis & molis, quin & mutua, (ut sic dicam) implicationis respectu, ad motum concitatiorem quemvis tam localem, quàm præsertim intestinum fermentativum & elasticum minus apta, adeò ut quæ volatilia antea plus minus erant, jam incarcerationa quasi & fixata torpescant, ob id remedia eadem, quæ præcipitantia aliàs dicebantur, optimo consilio *figentia* nominari solent. Qua ratione visca fermentum Epilepticum, Cort. Chin. Chin. it. caleinata Ostracoderma, saccharum *hni* fermentum febrile intermittentium figendo, auxiliares opes præstare videntur.

*Adeoq; a-  
cidi istius  
respectu  
universa-  
lia sunt  
alteran-  
tia.*

§. 20. Eò ipso vero quo acidum vitiosum contentorum corporis corrigunt, primaria & magis universalia erunt alterantia, acido vitioso, universali morborum causa materiali & occasionali existente. Naturaliter omnia fluida corporis sunt temperata, & sub specifica cujusvis materiali textura, in genere  $\Theta$  &  $\text{sa}$  existunt, adeoque de acido & alcali, sub pinguistemperatura, variata tamen proportionē & hinc texturæ modificatione participabunt. Imò pressius si loqui velimus, non nisi ex acido,  $\nabla$  & Terra constabunt, quod tamen ceu Paradoxon hic obiter attigisse sufficiat. Infinita ergò seu sexcenta Hippocr. quorum ambitu cacochymiam sive dyscrasiam humorum determinat, ex istis derivanda erunt. Acidum verò ubivis informat alcali, adeoque illud agentis, hoc verò patientis rationem obtinebit, ita ut hoc, ab illo, plus minus vitioso, vitiari quoque soleat. Pingue temperans, ubivis ferè in rerum natura, atque adeò in microcosmo pariter acido junctum deprehenditur, quod ubi defecerit p. n. majorem illorum acrimoniam, ubi abundaverit, p. n. visciditatem inducet, viscido ex acido & pingui oriundo. In causis E. morborum occasionalibus & materialibus, internorum pariter & externorum, ad acidum plus minus peccans, ceu basin omnis cacochymia, & ex cujus aberrationibus sexcenta ista Hippoc. fundamentaliter dependent, respiciendum erit. Idque eò magis, si cum quibusdam vim rerum seminalem in acido specifico quoque fundatam asserere velimus.

*Sed quid  
de bile?*

§. 21. Si acidum ergò tantum non omnium morborum fons & origo prima, quid de bile fiet, & morbis biliosis, speciatim febribus acutioribus, æstuatione corporis p. n. siti clamosa, anxietate præcordiorum

rum chol-  
lis, simpli-  
e e ejus  
contrarii  
à veterib;  
ria maxi-  
pothese  
hujus po-  
liter in b  
quomodo  
omnia r  
bribus in  
est, quod  
superest,  
producer  
nis an ac  
argumen  
acido vol-  
tendendu  
ipsa potius  
seu effect  
bilis, ex  
in adulti  
alterata,  
dum ener  
dicitur, d  
tium, præ  
à ferment  
materiali  
earum cu  
ferè con  
seu inver  
citata nu  
tione, f  
morbofa  
se habent  
subinde a  
ulcera, t  
supelacei



rum cholericis, diarrhæis, colicâ acerbiori, dysenterijs & similibus malis, simpliciter à Veteribus à bile exsuperante aut vitata, à modernis ex  
 ☉ e ejus vol. ☉ so, vel copiosiore, vel actiore derivatis, acido reverâ  
 contrariis fiet? Sed ut paucis negotium hoc absolvam, ea quæ de bile  
 à veteribus pariter ac recentioribus prolata hæcenus fuerunt, arbitra-  
 ria maximam partem videntur. Missis istis, horum consideremus hy-  
 potheses. ☉ vol. ☐ of. bili inesse dubium, quod enim arte prolicetur,  
 hujus potius, quam Naturæ videtur opus: adeo ut probandum, forma-  
 liter in bile præexistisse, quod materialiter inde procedit. Posito hoc,  
 quomodo caloris effectum in corpore producit? ☉ ia vol. qua talia,  
 omnia notabiliter existunt refrigerantia, vel spiritu ☉ \* simpl. in fe-  
 bribus intermittentibus sensualiter hoc confirmante. Si ut ☉ sum  
 est, quod ☉ revera in bile luxuriat, calefacit, de ☉ hoc inquirendum  
 superest, an pinguedinis, an acidi occulti ratione vim caloris sensum  
 producendi obtineat: pari modo, ac de ☐ quæritur, utrum pinguedi-  
 nis an acidi ratione, sub deflagratione ardorem inducat. Sane plura  
 argumenta prostant, calorem naturalem patirer ac p. naturalem ab  
 acido volatili materialiter dependere. Porro ad duo hæc quoque at-  
 tendendum sedulo: (1) *adscribi interdum bili affectus p. n. in quibus*  
*ipsa potius passivè se habet, & ejus p. n. alterationes qualescunq. producta*  
*seu effectus morbofi potius, quàm radicales cause existunt.* Aeruginosa  
 bilis, ex qua in præcordiis, & primis viis revera interdum atrocia mala,  
 in adultis non minus quàm infantibus, ex bile naturali, ab acido p. n.  
 alterata, quod dependeat, mechanica anatomica docet: unde & aci-  
 dum enervantia, speciatim crystallus, ejus alexipharmacum à *Langio*  
 dicitur, de quo supra §. 15. Quæ rejiciuntur biliosa, in intermitten-  
 tium, præsertim tertianarum paroxysmis, vi spasmodorum intestinalium,  
 à fermento febrili concitatorum, evomuntur, sine eo, ut causa morbi  
 materialis existant, quin potius amara omnia bili symbolizantia, in  
 earum cura, sunt optima, non secus ac omnia reliqua febrifuga, in hoc  
 ferè conspirant, ut acidum fermentum febrile figendo & absorbendo  
 seu invertendo salutaria existant. Ab ☉ ialipharmaco, artificialis concitata nunc cholera, nunc Diarrhœa, in quibus pro subjecti constitu-  
 tione, subinde tot biliosa *αὐτὸ κατὰ* rejiciuntur, naturalium utur  
 morbosarum fiendi rationem docent, bile scil. & cæteris excretis passive  
 se habentibus, (☐ non semper saltem ut plurimum) [11.] *Eidem bili*  
*subinde affectus adscribi, qui ipsi penitus non conveniunt.* v. g. Vulnere,  
 ulcera, tumores inflammatorii, quo magis æstuant, rubent, & ery-  
 sipelacei quid patiuntur, à bile taliter affici dicuntur plurimis, quos



tamen refellit Hnus, medelam afferens, acidum aborbendo, docente mechanica chymicâ, quod quo magis volatile ac acre fuerit, eò magis ista symptomata producit; par ratio est podagræ, quæ calida, seu intensius rubens, ardens, & phlogosi erysipelaceâ junctâ, biliosa dicitur, ad differentiam alterius, pituitosæ dictæ. Sed utrobique simpliciter peccat acidum, in ista specie, actius & volatilius, nec synoviâ debite temperatum, in hac mitius, minusque acre, & à synoviâ viscidiori melius correctum, unde & isti sperma ranarum, aciditalis optimum corrigens, ut mechanica docet, hinc camphora, Hnâque eodem ex fundamento opem ferunt. □ intensior Tinctura in febris, & rutilans ac flammeus ejus color, biliâ plurimis adscribitur, quam tamen ab acido dependere, experientia mechanica docet, in naturaliter constitutis sanorum □is, per acida medicatis. Contenta in febricentium □is & copiosa sedimenta, biliâ plurimis, seu materiæ adscribuntur, cum tamen Galeno teste, & experientiâ confirmante, cit. *Maebio Instit. p. 343. qui ex otio & repletione febricitant, si sanitati restitui debent, necessario in □ plurimum subsidebit*, quod quomodo cum bile, aut inde productis humoribus cohæreat, ipsi viderint. Aut E. tales affectus bili falso adscribuntur seu causæ, aut ipsa ratione acidi vol. non ratione □ offi in talibus casibus peccabit.

Acid  
morbo  
origo.

§. 22. Scaturigo interna aberrantis acidi est ex ventriculo, sub cujus digestionem acidum vol. saporem plus minus contrahunt assumpta, sive ex inspirato fermento, sive ex assumtis hunc ipsum derivare velis, quoad præsens negotium perinde est. Hic in □ sum □ sum temperatum in primis viis non rite correctus, toti corpori, omnibusque ejus partibus, extra ventriculum penitus hostilis existit, & mille calamitatum, pro specifiaci acidi saporis, & partium, quas affligit proximè, differentia, artifex existit. Hinc enim in fluidis partibus earundem dyscrasiæ, turgescentiæ & effervescentiæ, indeque Phlogoses, p. n. corporis æstuationes, variæ coagulationes & concretiones &c. in solidis verò inflammationes, irritationes, rosiones, convulsiones, contracturæ dolores, alimenti proximi corruptiones &c. &c. Nec opus est, ut sensibus adeò manifestò ubique pateat, cum non torrentis modo undique diffundatur, sed odoris aut auræ instar subtilissimæ penetrando, appropriato subjecto se insinuando, in fluido quidem hujus texturam & motum intestinum pervertendo, in solido verò spiritum insitum imprimis alterando, operativum existat, id quod fermenti nomine aliàs insigniri solet, cum aptum subjectum alterando, seque in eo multiplicando, fermenti similitudinem repræsentet: qualis odor acidus fermentativus in

luc



lue & ea, ab alio haustus, & humores & partes solidas inficiendo sive alterando, seque in iisdem multiplicando, vel manu palpari potest, id quod & in scabie, variolis, &c. extra dubium, de quo jam supra § 12. scil. præter internam acidi peccantis originem supra insinuatam, etiam ab extra, tam ab inspiratis, quàm susceptis aliunde contagiis idem contrahi facile potest. Sanè quo subtilius idem, & quo facilius spiritibus sociabile existit, eò graviora & periculosiora nocumenta, & quæ omnium difficilimè curabilia existunt, infert, cum subtili tali acido compar objectum, non nisi difficulter obtineatur, hinc enim morborum hæreditariorum, item contagiosorum quorumvis & gravis nocendi ratio, & difficilis curatio dependet. Cum humorum quorumvis vitia & inepti acidi saporis facilius alterabiles existant, modò non spirituum peregrinà tali aurà contaminatorum vitio illi foveantur continuò.

§. 23. Constat ex dictis, per universam morborum Thera-  
peusin, remediorum istorum, aliàs præcipitantia dictorum, latissimè  
patens usus. Acidi enim vitiosi ratione, & tam potens quorumvis  
chronicorum morborum sub generali cachexiæ nomine comprehen-  
sorum, utroque in sexu, existit debellator. Lapillorum & latè diffu-  
sus usus, à *Sachsio* tam prolixè congestus, in *Gammarol.* hinc manife-  
stus redditur, non secus ac aliorum ostracodermorum. Cornuum  
Cervinorum acida absorbentium creberrima exhibitio exinde expli-  
canda: & alia fixata, acidi vol. acerrimi appetentia, hujus ratione tam  
polychresta remedia, & alia pariter ritè fixata, ex hoc fundamento ad  
universalem apicem propius ascendunt, præsertim si vi anodyna mine-  
rali simul imprægnentur, si scil. vera sunt, quæ *Helmontius*, ad Para-  
celli imitationem, de & io diaphoretico, it. arcano Coralino, decantat,  
& vel ex *Cnœlii* & fixo, sive arcano corallino non nihil probabilia  
redduntur. Imò ex dictis patet in primis, & vol. & osorum, ex animali  
& vegetabili regno parandorum, & v. & solius spiritus & \* usus planè  
polychrestus, quæ utut minus inter præcipitantia numerata aliàs fue-  
riat, potiora tamen fere inter illa ipsa existunt, dum altius omninò pe-  
netrando, & ipsarum partium tam fluidarum quàm solidarum textu-  
ram subintrando, multis in casibus summe activa existunt, ubi fixo-  
rum effectus fere hebescere observatur. Amica in primis sunt nobis  
& ia illa volatilia, cum tota nostri corporis machina, omnesque ejus  
partes, similibus referta sint, unde vix præiis nobis magis convenientia  
obtineri possunt medicamina, præsertim si temperata non nihil, & & sa  
reddita fuerint, adeoque nobis promptius assimilabilia.



Fixa in-  
pida ultra  
primas  
vias non  
pergunt.

§. 24. Nam fixa ista, ut mineralia terra, metallica, lapidea, & vegetabilia styptica, ac duræ animalium partes exque his parata calcinata usta, soluta &c. C. C.ustum: specif. febril. Strob. terr. Sigill. Lap. hæmatit. *Alia*: ☿ diaph. bezoard. ☉ Unicornu animale & minerale, ultra primas vias materialiter haud penetrant, quin utcumque alterata, & in primis viis præcipitata, cum scoriis recrementitiis, per ordinarias portas denuò eliminantur, ut vel ☿ exemplo patet, scorias alvianas atramenti nigredine inficientis, id quod & in Hninis, & quam plurimis Olibus remediis pariter evenire observatur: non secus ac nativa, vel artificialis ☿ li Cinnabaris, rutilante colore feces inquinare, & ita immediate per intestina excerni solet: Quæ solubilia facilius, ac menstrui medio hinc inde distribui apta nata sunt, & præter ☉ ia fixa etiam ☉ lapilli, ossa lucii, & similes animalium partes facilius solubiles, forsitan altius intra corporis recessus, extra primas vias distribui probabiliter videntur, hinc etiam talia ☉ so sub acquisito sapore diuretica evadunt. Tamen consideranti præcipationem particularum metallicarum v.g. Hni in ☿ soluti. ☉ in spiritu ☉, ☉ li ☿, in primis viis, scrupulus facile laboriri possit, an non soluta licet ista in ventriculo, in intestinis tamen, ante sui in lactea propulsionem, pariter si non ex toto, saltem ex maximâ parte præcipitentur quocumque fiat medio, & ita foras amendantur. Similiter enim & ossa à canibus soluta, aut teneriores lapilli à gallinis quasi liquefacti, excrementa eorum copiose imprægnant, etiam li à sanis, & quorum vis digestiva ac si ita loqui licet, solutiva, potens admodum existit, devorata aut deglutita fuerint.

Diobus  
tamen mo-  
dis etiam  
remotiores  
partes ma-  
le habent  
rescurant.

§. 25. Quod tamen non obstat, laudabili effectui eorum medicamentoso, qui etiam ad longè distitas partes subinde extendere se observatur. Id quod duplici ferè modo accidere solet. [1.] *quatenus vitiosum acidum fermentativum in ventriculo ☿ primis viis corrigunt, absorbent, invertunt, ☿ inde penetrantem undiq. odorem seu auram peregrinam figunt, ☿ cohibent, ac natos inde defectus morbosos ita sistunt.* Sic enim cancerorum lapis in ventriculo absorbendo acidum saporem, vulneris etiam in pede ardorem, ruborem, ac inflammationem sistit, quæ pathemata Vini tantillum mox sensibilibiter exasperat. Osteocolla fixissimus Lapis, calli generationem in ossium fracturis mirè promovet. Lac Lunæ, ut & Crystallus præparata, Lac nutricum uberius scaturire faciunt, absorbendo acorem vitiosum primarum viarum, chylumque à p. n. crasi & texturâ liberando, ut aptior sic fiat, qui & facilius & copiosius ad glandulas mammarias penetrare queat. Hæ-

matites



matites Lapis, hæmorrhagias narum scorbuticorum habituales, non secus ac unum idemque Vitale, tam excessivas, quam defectivas menstruationes corrigit, neutro horum ad partem affectam proxime penetrante, quin acre istud specifiçi saporis acidum, cujus occasione tam immediate ex sanguinis acrimonia, quam mediate, ex motus illius localis per fibrarum irritarum stricturam modificatione varia, hæmorrhagiæ, vel intenduntur vel supprimuntur, in primo fonte alterando, & plus minus enervando. Parimodo, ac *Poterius*, ☉ suo diaphoretico fixo, ischiadem, ac contumacissimas paralyses optato eradicat. Sane si ventriculus sanitatis & morborum limes est, & ex ejus errato indeque nato peregrino sapore etiam largius diffusæ partes plectuntur, pariter ex eodem sapore fermentativo aut odore primarum viarum correcto, evulsa quasi radice fructus morborum sponte emarcescent, conf. *Becherus Phys. subterr. l. 1. l. 5. c. 2. §. 98. 99.* ubi de modo quo ☿ diaph. corallia, testacea, C. C. ust. in febribus proficua & sudorifera existunt. Nec absorbendo saltem acida primarum solum viarum, remotas inde partes à morborum insultibus liberant, quin si quid similis saporis vel in corpore oberrarit, vel in sanguine aut lymphâ fluctuarit, vel quadam in parte solida certo subjecto humotoso mediante resederit, hoc ipsum per continuum humorum circulum, ad primas vias pariter delatum, promte medicamento ibidem locorum, seu appropriato magis subjecto se insinuabit, & ita successive concentratum ac fixatum à remedio, cæteris partibus minus hostile exister. Vigere talem mutuam conspirationem partium internarum, & externarum, contentorumque earundem, mediantibus humorum circuitibus, confirmat alvi per clysterem aut tantillum laxans in variolis vel purpura vel petechiis malignioribus proritatio, cujus occasione illius perniciosus fluxus, harum vero recessus, & cum sanguine ac lymphâ renovata permistio; hinc purgantia temere præscripta, criticum & salutarem sudorem sæpe inhibent, observante *Ballonio* & ex eo *Bonetto Pharos Medic. l. 3. num. 21. p. 73.* Sicut qui crebrius sudant, alvi ferè siccioris evadunt. Sudor verò ab aëre frigido cohibitus in morbis, nauseam movet: vid. *Frider. Bayle problemat. Medic. Physic. 79. pag. 122.* Hypochondriaci pariter, quo largiori fruuntur perspiratione, eò cæteris paribus melius habent, quo minus, eò circa hypochondriâ sensiliora patiuntur pathemata. Adeo *Hippocrate* asserente, perspirabile & conspirabile totum corpus existit.

§. 26. Secundo modo quoque fixa, & his cognata medicamenta, quæ materialiter ultra primas vias non penetrant, etiam remotis in



locis effectus salubres exerunt, quatenus in structura machinæ corporeæ, ratione admirandæ nervosi systematis fabrica, & inde dependentis multiplicis partium solidarum consensus, ventriculi affecto sedato, etiam aliarum partium perturbata hinc sopiuntur. Hypochondriacis jejunis, nunc caput dolet, nunc perturbatur, simplici cum Ventriculo, nervorum insignium ratione, consensu, quibus vel panis buccella citò & jucunde medetur. Parili modo senum jejunorum caput frequenter vertigine rotatur, quin & scotomiam patitur, quæ tamen Zingiberis in India conditi frustulum assumtum, vel ex ficibus c. sinapi & cardamomo parati electuarii usus brevi cohibet. Qui universum corpus in febribus intermittentibus quatunt rigores, ex præcordiis, speciatim ventriculo excitari, litus ejus cum aromaticis penetrantibus, seu optimum auxilium confirmant, unde & calcinata animalium eosdem internuo usu, multum imminuunt. Bezoardica mineralia, & animalium partes duræ, ex parte eareus existunt sudorifera, quatenus in continuis, præsertim malignis, acidum istud acerrimum volatile, cujus in primis viis irritatione, ut præcordiorum anxietates, irrationes, tensiones, jectigationes, agrypnia, ita & per consensum universæ acutis pororum strictura, absorbent & figunt, unde relaxatis hinc fibris, sub corporis quiete facilis sudoris profusio.

## CAPUT III.

## PRACTICVM.

Præcipitantium Legitimam administrandi methodum exponit.

## §. I.

*Absorbentia legitima methodo usurpanda.*

Operandi modum & usum præcipitantium dictorum prolixius, quam instituti ratio exigere videbatur, prosecuti sumus hætenus, restat, ut debitum eorum regimen, seu legitimam administrandi pro salute ægrorum methodum, etiam subjungamus. Multum sanè hic interest, cum vel ex hac ratione, diversos non rarò sortiantur effectus auxilia medica, ut quæ uni proficua, alteri nociva, tertio neutra existant, saltem ex variatâ applicandi methodo. Cujus respectu, & trivialia subinde saluberrima deprehenduntur medicamina, & sublima econtra auxilia, nil quod spei ab iis conceptæ satisfaciat, præstant. Rectè ob id olim

olim Capite  
meam met  
dum, qu  
tat, perva  
tibus idem  
thodum  
tummod  
rum, præ  
cifica eju  
que pro in  
plicatio o  
plicatorum  
solicaria, n  
sint, nihil  
instituti f

§.  
Remedia  
scilicet cura  
similium  
scrophul  
rativum,  
ruptivum  
ralis, hoc  
negotium  
mineralia  
absorbentia  
bilibus, a  
bentur tr  
tertium co  
stum Z  
forma :  
Mynsich  
rum :  
anni 8, o  
Pharm.  
aliaque  
candi ist  
conveni  
tactu, ob



olim *Capivaccium*, arcana ejus practica sciscitanti respondisse fertur, *disce meam methodum & habebis mea arcana*. Sanè unum idemque remedium, quod rite administratum, manum Dei auxiliatricem repræsentat, perverte usurpatum, gladius est in manu furentis. De Præcipitantibus idem omnino asserendum. Quorum tamen administrandi methodum rationalem in genere difficile est determinate, cum non tantummodo tam late pateat eorum usus, sed etiam in unoquoque eorum, præter generalem absorbendi & acidum corrigendi vim, vel specifica ejusdem potentia medicamentosa attendenda veniat, prætereaque pro individuorum agrotantium diversitate, diversimode eorum applicatio determinanda sit: pro morborum quoque plus minus complicatorum ratione, distinctis subinde modis dirigenda eadem, & nunc solitaria, nunc aliis sociata, nunc primo, nunc ultimo loco administranda sint, nihilominus generalibus sub axiomatis & specialium, quantum instituti fert ratio, mentionem subinde inficiemus.

§. 2. Quod itaque attinet adhibendi modum, usurpari possunt *Idque tam externe* Remedia ista absorbentia interne pariter & externe. Fundamentum *quam interne,* scilicet curæ externæ, vulnere, ulcerum, & quamplurimum tumorum, similiumque pathematum, v. g. erysipelatum, herpetum, pustularum, scrophularum, est fermentum acidum, nutrimenti partis proximi alterativum, & plus minus in pus, saniem, ichores, similesque sordes corruptivum, in cujus correctione & extinctione, balsamique partis naturalis, hoc est spiritus insiti conservatione, totum chirurgorum versatur negotium: hinc pro priori isto scopo, *H*na, *O*ia, *Q*ea, *Θ* lacea, terr. mineralia, ut bolus, creta, lap. calamin &c. utramque faciunt paginam, absorbendo vitiosa ista acida, unà cum vulnerariis quibusdam vegetabilibus, alcali occulto, sive acidi blande saturativo imprægnatis. Adhibentur triplici fere sub forma: I.) liquida, epithematis, in Vino præsertim cocta, quale est epithema ad Erysipelata & inflammat. polychrestum *Zwölferi* in Pharm. Reg. p. 91. II.) sicca: sub subtiliss. pulv. forma: qualis est pulv. Erysipelot. aut ad consolidandas variolas *Mynsichthi* p. 136. & 134. III.) Mediâ unguentorum & emplastro-  
rum: quale est emplastrum *Miraculos.* in *Miscell. Acad. Nat. Cur. anni 8. obs. 16. p. 23.* vel decantatum istud *Noribergense*, à *Zwölfer.* Pharm. Reg. 301. aut *Hoffmann. Thesaur. Pharmac. p. 69. descriptum*, aliaque plura, hinc inde obvia. De cætero quoad hos externe applicandi ista medicamina modos *obs. 1.* Epithemata, non æque semper convenire, cum facili refrigerentur, unde ex humidi & frigidi contactu, ob cutis molestiam pori stringuntur & arctantur, transpiratio insensilis



fenilis sistitur, & non raro prava symptomata excitantur: Chirurgi vocare solent, *Es wird der Schaden ersicht*: obid semper & sæpius calide tenovanda veniunt. *obs. 2.* Quoad Emplastra, quo minus composita, eò meliora, ne plurimum farragine unctuosorum, mucilaginosorum, viscidorum, obruantur & ita incarcerentur remedia ista, quo minus odor acidus morbosus ea attingere & penetrare queat. Interim non rejicienda eorundem vel crudorum, vel \* prius imprægnatorum, præsertim Hnorum, cum ☉ comm. decoctio sufficiens, quo ab acido olei arrota, eò arctius cum ☉ in æquabilem misturam coëant, dum sub præparatione tali, ☉ acido suo spoliatur & magis alcalium sic factum, sub textura hinc minus vitiosa minusq; unctiosa calibus præfatis melius inseruiat, metallica vero ingredientia hoc ipsa texturam & dulcedinem nonnihil Olam acquirant, facilius & ulterius ab acido istorum pathematum saturandam. Sed cum non rarum sit, in erosionibus aut ulceribus præsertim, vel doloris ratione, vel idiosyncrasie cutis quorundam ægrorum respectu (eorum scil. quorum corporis fluida sapore acris & ☉ fiori sunt imprægnata, ut in specie sunt scorbutici, & isti, qui teneriori simul cuti investiti sunt, quibus retentum ex ad motis unctuosus aut emplasticis quibusvis transpirabile effluvium, acrius, pruritus, excoriationem, inflammationem infert) ut quædam subiecta, non æque ferre possint emplastra, optimum est, quod *obs. 3.* sicca pulverum forma, excoriationibus, ulceribus dolentibus, præsertim inveteratis manantibus, talia saltem inspergere. Eminent hæc inter terra ista ☉ li dulcis, quæ sub præparatione ☉ oleati ad imitationem *Tachenis in Clav. c. 6. p. 101.* sponte cadit, & quæ internis usibus, æque ac terra ☉ li dulcis alia, aut crocus quilibet ☉ adstringivus inservit, quin & Tinct. ista ☉ adstringens, quæ alias falso Tinct. ꝑis ☉ titulo superbit, commode ex eadem parari potest. Hæc ipsa ritè edulcorata, & subtilissime pulverisata, elegans est absorbens, & hinc exsiccans externum, plurimis usibus inserviens. Hinc pro re nata & alia varia addi possunt, in specie laudabilis emergit pulvis compositus, si Rec. Terræ hujus ☉ li dulc. ʒj. Ceruss. ritè paratæ. ʒʒ. C. C. ust ʒiij. myrrhæ: aloës macis an. ʒj. camphor. ʒj. ad ʒʒ. misceantur & debitis cautelis applicentur. His ipsis pro circumstantiarum ratione, usus tempore & alia addi possunt, nunc ☉ ꝑq. f. aut fl. ꝑ. a. malignioris notæ si fuerit malum, ☉ ius dulcis, aut ubi fortius agendum, nonnihil ☉ ii ꝑti communis.

Perverso  
enim ab-  
usu mal-  
tum nocet.

S. 3. Sed misso externo usu, interna eorundem administratio eò exactius consideranda venit, quo & crebrius ac simul salubrius legitimo usu in praxi medica adhiberi solent, & quo gravius perversa  
abusu



*abusu* nocere possunt. Unde non nisi quibusvis observatis artis legibus, ac debito cum regimine in usum vocanda. Tria autem primaria sunt capita, ex quibus, quidquid nocementi sub perversa illorum exhibitione metuendum est, ferè exsurgit. I. *Omnia gravant Ventriculum, idque plus minus, prout magis vel minus fixa, facilius vel difficilius resolvable &c. existerint, & laborem ferè tædiosum eidem facessunt*, dum assumptorum instar, more naturali, conficere eadem aut alterare gestit, quæ ventriculi offensio eo sensibilior erit, quo debilior vis digestiva morborum sub conflictu existere solet. Quin & irritando subinde eundem, ex fibrarum ejus pertinaciori structurâ, præsertim in tenerioribus ac sensibilibus, manifestus gravativus ac compressivus sensus ab usu eorum percipitur: Imò vel crustæ mucosæ ventriculi, vel hujus plicis pertinacis inhaerendo, diversimodè tam particularem ejus Oeconomiam, quam functionem publicam turbare valent. Vomitorio sanè propinato, interdum copiosa talia rejecta fuerunt, diutius in Ventriculo quæ substituerant. II. *Digestionis primæ arduum negotium, in quo vita sana & agra longa & brevis cardo vertitur, subinde, præsertim sub immoderato usu impediunt, sui que permistione chylo consistentiam & proprietates plus minus vitiosas conciliant, unde & impedita ejusdem distributio, & p. naturalis secum ex eodem separatio subinde contingit. Scil. ex quamplurimis (qualia sunt calcinata animalium, terrea mineralia, &c.) dum acido saturantur, concretum novum, quasi Osium, adstrictivæ & incrassativæ facultatis exsurgit, quod sui cum chylo miscelâ, aut hujus aut secum consistentiam spissiore, simulque alvum contumaciorem reddit. Sin ex quibusdam eorum (ut Osis, it. marinis, testis &c.) cum acido concretum Osium emergat, absterisivum ac diureticum, citata nimis chyli & secum hinc distributio, ac per alvum exclusio, vitiosa pariter harum ex illo præcipitatio supervenit. Quoties observare contigit, ex Chinæ Chinæ abusu febrifugo, vel intempestivo, vel in subjecto teneriori, pertinacissimam alvi inductam adstrictionem, cum abdominis tumore ac tensione molestissima. Repetitis quoque vicibus observasse me recordeo, ex intermittente tertianâ, inordinato usu specifici Strobelberg. vel solius vel cum Lap. S. tandem oppressa, febrem continuam lentam, cum virium prostratione, præcordiorum gravativa anxietate, muci copiosi glutinosi in osfecaturigine, & subinde crebriori excretionem supervenisse, ex chyli impedita fermentatione & volatilisatione oriundam, præmissis vomitu materiæ viscidæ, per incidentia & attenuantia præsertim tartarea & Osium cum, hinc &*



aromatica curandam. Idem in continuarum cura observare licuit, quæ copiosioribus hujusmodi absorbentibus & figentibus, speciatim ex animalium partibus duris & fixis fixatis, tandem curatæ, diuturnum languorem, ex spirituum inopiâ, ob digestionis primæ impedimenta, comitem post se traxerunt. III. *Acidum morbosum concentrant, an nimis figunt*, indeque motum ejus, licet corporis partibus p. naturalem, ac dependentes ab hoc fluidarum alterationes, vel in solidas impressiones, præmature sistendo, simul Naturæ medicatricis conatum, illius occasione suscitatum, sub morbofo statu (qui nihil aliud est, quare *Natura conamin, materia morbifica exterminationem in ægri salutem, omni ope molientis*, ut rectè hoc asserere videtur Sydenham in *Observat. circa morb. acut. Sect. I. c. I. p. I.*) hoc ipso cessare intempestive faciunt. Concentrant & figunt plus minus acidum morbosum absorbentia & invertentia illa, vel immediate, vel mediate. Immediate cœundo materialiter cum illo, unde novum concretum, utriusque ex coalitu emergit, cui ubi subiectum humorosum accesserit, hoc una in coaguli consortium assumtum, aliquid tertium, texturæ & proprietatum peregrinarum, consistentiæ plus minus (pro elementorum sive ingredientium diversitate) viscidæ ac glutinosæ inde producitur. Simili modo, ac acidum podagricum ab alcali synoviarum articulorum saturatum, in hac ipsa in calce vel cretæ simile corpus figitur, mutuoque omnia coagulantur: vel sicut acidum in calce vivâ, cum terræ substantiâ  $\nabla$  mediante, sub illius per hanc saturationem in Lapideum ferè concretum coagulatur, quod longè firmitus fuerit, albumem ovi si accesserit. Mediatè verò figitur & concentratur acidum morbosum, si hoc in partè quadam solidâ, ceu minerâ delitescens, partibus suis subtilioribus promptè remedio se insinuet, vel modo supra §. 23. insinuato, vel isto, à Tachenio curioso cryptographiæ exemplo in *Clav. cap. 9. pag. 237.* illustrato, & ab hoc absorbeatur, dum cæteræ in subiecto materiali (sive materia occasionalis antecedens, sive productum morbosum consequens fuerit) magis irritatæ, cum eodem firmitus coagulantur, & intimius eidem uniuntur. Qua ratione Sialia, lienosis aut hepaticis, ad scirrhiolosam constitutionem vergentibus, subtilius quod fuerit acidum absorbendo, residuum ad majorem indurationem ac coagulationem disponunt, ut rectè annotat Tachenius. *Clav. c. 8. p. 181. 192.* de quo plura infra. Est enim Volatilitas & fixitas modus quoque rerum saltem respectivus, qui uti texturam earum mechanicam insequitur, & vel  $\triangle$  vel  $\nabla$  Aëris vel utriusque respectu ita dicitur, ita, mutatâ quoque undecunque textura,



textura, cum & sine additis, & variata particularum vel mole vel pondere vel implicatione mutua, etiam proprietatum harum mutatio: Prius ita in  $\Delta$ e est volatilis, tamen mutata simpliciter sub hujus artificio textura, multum volatilitate perdit, & ad notabilem fixitatis gradum perducitur, ut in  $\Phi$ io per se præcipitato patet, qua ratione & quæcumque in  $\Delta$ e alias Volatile, fixum tamen reddere nititur *Poleman. de æe Philos. p. 201.*

§. 4. Ex quibus ulterius patescit, quare sub illegitimo usu, hujusmodi absorbentia (nisi specifica fuerint) sæpius saltem morbum palliant, non eradicant, quin *vel* crudelior ejusdem recidiva superveniat denuo, *vel* prioris in alium, subinde aut deteriorem, aut magis chronicum mutatio accidat. Prius illud quidem, acido utcumque oppresso & fixato, successive, idque ferè rerum non naturalium occasione, denuo resolutum & in motum pristinum concitato: postea hoc verò, eodem partis cujusdam vel per essentiam, (materiali sui præsentia,) vel per consensum functionem impediens, aut vitians, indeque novas p. n. læsiones inducens. Idem ferè accidere hinc mihi videtur, (simili quodam rem illustrare liceat) atque in automaton aliarumve machinarum elateribus in motu suo elastico oppressis aut impeditis, qui, ubi qualicumque occasione, motionis restituendæ datur libertas, aut celerrima agitatione, ac geminato vel triplicato impetu pristinos motus quasi compensant, aut saltem vitiatos motibus, machinæ ordinarios motus ac usus turbant & lædunt. Concentratum sanè acidum morbosum, dum motionis reiterandæ datur occasio, multiplicata quasi vi elastica, ex concentrata sui & mole, & nixu motivo &c. ferocius resurgit, unde & irritata Natura intensiori conatu ipsi reluctatur, adeoque atrociores recidivæ exsurgunt. Aut si utcumque alteratum, pristinos motus ac actus repetere nequeat, nunc alienis saltem motuum rationibus initis, nunc naturalibus partium corporis motibus & functionibus plus minus læsis & hinc vitiatas, novorum p. n. motuum morbosorum, in machina corporea, occasionem subministrat. Sapiissime ex Chin. Chin. aut spec. Strob. & Croll. similibusve abusu palliatæ, duplicatæ aut triplicatæ resurgunt febres intermittentes simplices: aut iisdem fixioribus copiosius tractatæ, præter languorem totius, dispositionem ad Ictericum relinquunt; quin etiam fermento, in fomite materiali concentrato & fixato, utcumque denuo resolutum, aut in motum aliqualem concitato colicæ convulsivæ atrocissimæ excitantur. Qualem gravissimam cum ordinariis stipatam contumacibus symptomatibus, ex  $\Phi$ o destillat. juniperi, pro tertianâ chronicâ curandâ, continuato

*Speciatim  
Recidivæ  
prioris,  
aut gene-  
rationem  
novi mor-  
bi infe-  
runt.*



aliquando ulu ante paroxysmum pro hac quidem intentione felici, bis observasse me memini: idque ut suspicor, quatenus  $\odot$  destillat. cum acido febrili, in chronica febris quavis ex causa paulo fixiori, in concretum quasi resinolum, sed acre admodum coalluit, simili ferè modo, ac spiritus  $\odot$  li rectificatus cum  $\odot$  is pluribus destillatis in resinam coire solet, quod pertinacius vel intestinis agglutinatum, vel glandulis mesenterii infixum, vel circa nervos hujus plexus depositum, irritatione continua, occasionalis causa torminum dictorum exitit. Simile dolorosum infortunium ex sacch. Hni cum Lap.  $\odot$  crebriori ulu & copiosiori, ante quartanæ chronicæ accessiones usurpatæ, agrum quendam nobilemprehendit, quo licet denuò sedato, nihilominus tamen statu sub paroxysmorum periodo, aliquandiu vestigia torminosa adhuc perseusit, quibus post aliquot peridorum intervalum, nihilominus ejusdem febris Recidiva supervenit. Rectissime Schenckius Diff. supr. alleg. §. 13. *Præter materiam, termini motus huius, ( præcipitationis, ut cum vulgo appellat ) sunt spectandi, ne plus absimus, quam proximis, materiam morbosam præter necessitatem figendo, veluti persæpe accidit, ut à datis huiusmodi præcipitantibus  $\odot$  propinatis, epileptici quidem motus sistantur, mitescantque paroxysmi febriles, verum postea quod præcipitatum fuit, circa nobiliores partes sedem figens, circulationem sanguinis sistat,  $\odot$  mortem inopinatam inferat:  $\odot$  §. 15. Sic vidimus à præcipitantibus uterinis ortam fuisse dyspnoeam; à tertianâ intermittente cohibita per specificum febrile cotidianam  $\odot$  quartanam. Motuum Epilepticorum præcipitantibus sive figentibus talibus inhibitorum mentio à Schenckio facta, in memoriam revocat puerum ingenuum X. annorum, epilepsia habituali particulari, diaphragmâ saltem primariò, hinc & secundariò partes vicinas quatiente, correptum: qui præmissis præmittendis alterantibus & evacuantibus usu pulveris ex Visc. corylin.  $\mathfrak{z}$ ij. Corall. rubr. præp.  $\mathfrak{z}$ j.  $\odot$  destill. succin. gutt. XVij. M. aliquandiu omni mane continuato à malo penitus liberatus videbatur. Sed corripiebatur post aliquot septimanarum intervallum febris continua acuta gravi, cum exquisitis abdominis convulsivis circa umbilicum doloribus. Suspicabar, fermenti morbosâ spiram ( secundum simile supra insinuatum ) concentrantibus istis & figentibus nimis quasi intortam, & in motu ordinario impeditam, data occasione eò concitatiore impetu, motus, s; non eosdem, saltem novos instituisse, sicque vehementius Naturam ad extraordinarios morbosos motus stimulasse, idque partim, solidas quibus*



quibus pertinacius affixum erat partes, sensibilibus irritando (idque pro-  
ut adhuc fixatum) partium M. S. texturam & Crasin vitiando ( prout  
ex parte resolutum,) donec extraordinariis his moribus remittentibus  
adeoque præfatis malis curatis, ordinarios in motus rediret & pristi-  
num Epilepticum malum, eodem tenore denuò affligeret. Curabatur  
hoc ipsum insequente demum anno perfectè, idque usu acidularum  
egranarum, & fermentum acidum absorbente & enervante, spiritu  
acido minerali undique penetrante, & fomitem morbosum sive mate-  
riam occasionalem potenter resolvente & abstergente.

§. 7. Juvat hæc ipsa, ceu magni in praxi ponderis, paulò spe-  
cialius per 3. materiæ medicæ regna considerare, idque præsertim, quo-  
ad intermittentium febrifuga, quibus præcipitationis effectus primariò  
ferè assignatus fuerit, ac quorum nocumenta ex illegitimo usu, mani-  
festius patere solent. Superius dixi, *corticem peruvianum*, seu Hispa-  
norum *Palo de Calenturas* h. e. lignum februm, fugare suo usu quasvis  
intermittentes, id quod verissimum arbitror: nec has solum, quin à  
modernis is ipse ad continuas quoque, tam benignas quam malignas,  
quin etiam plures symptomaticas lentas sive accidentales, item, quæ ex  
decubitu materiæ peccantis in quandam partem oriuntur, successu ab  
illis laudato adhiberi soleat. Sed hoc simul observari solet, quod ordi-  
nariò ferè alvi occlusio pertinax, tumor abdominis, ejusque durities ac  
dolores tensivi insequi soleant, quibus vel successivè remittentibus vel  
perpurgantia propinata, aut spiritum ☉ ✱ exhibitum, non nihil irri-  
tatis, eadem febris, simili, interdum intensiori furore recurrat. Sanè  
aliquoties cum tædio contigisse memini, profligatas, ut videbantur illo  
remedio febres ex spiritus ☉ ✱ usu promptè recidivasse: adeò ut casu  
hoc in consilium mutato, quibus ex corticis illius usu, vel proprio ausu,  
vel Medici præcoci consilio, febris ità palliata esset, ut evanescentibus  
licer in sultibus, vel supra dicta abdominis pathemata, vel artium osto-  
copos quasi lassitudo, vel virium deficientia cum nocturnis sudoribus,  
pertinaciter superessent, adeòque quibus pro tuta, simulque cita cura,  
febriles Naturæ motus revocandi essent, iis per spiritus ☉ ✱ propina-  
tionem, mox eadem febris resuscitata fuerit. Adeò infidum sapius  
est, decantatissimum aliàs Chinæ Chinæ contra febres auxilium, etiam si  
præmissis sedulò præmittendis, & accuratâ methodo eadem adhibea-  
tur, ut frequentissimè recidivam comitem post se trahat, ut *Willisus. de*  
*febr. c. 4. p. 153. Chiffletius de pulv. peruvian. c. 4. Bartholinus. cent. 5.*  
*hist. 50. Sydenham. Meth. curand. febr. p. 82. & observ. circa morb. acur.*  
*p. 96.* quoque notantur, quin interdum frustra, & absque paroxysmè

Confirma-  
tur per ex-  
empla: 1.  
ex regno  
vegetabili.



levamine adhibeatur, conf. *Piens de febr.* p. 2. cap. 12. p. 275. ut taceam singulare istud, quod refert *Sydenham. Meth. cur. febr.* p. 82. quosdam pulverem illum, immediate ante paroxysmum exhibitum, & vitâ sustulisse. Vix adeoque tutius exhibetur, nisi vel declinante jam febre, quod revera tardius fit in quartanis, vel robustioribus subjectis & laudabili Viscerum eutonia præditis, in specie mechanicis, & laboriosam vitam agentibus, & qui post ejus usum motu corporis vehementiori exercentur, propinatum fuerit, instituendo simul, aliquot abhinc diebus summè necessariam purgationem. Obtiner hoc de cortice dicto, ante paroxysmum, more hætenus recepto exhibitio, quacunque etiam subministratur formâ vel pulveris ad ℥j, vel infusi in Vino generoso à ℥j. ad ℥ij, vel decocti cum ꝥ Vini, cum & sine substantia, vel essentia, cujus præter *Rosincium de Chym.* p. 207. & *Zwölferum Pharm. Reg.* p. 76. optimam præparandi rationem docet *Blegny in Zodiac. Gallic. anno 1. obs. 1. p. 2.* cujus præscriptâ ratione diligenter præparatâ & ad ℥ß ante paroxysmum exhibitâ, quin & intermittentibus diebus continuatâ usu, nihilominus tertianas recidivasse haud absque radio expertus fui. Concinnior adeoque ferè, ac tutior ista videtur exhibendi methodus, quâ post paroxysmum, & intermissionis tempore, idque præsertim in infuso cum Vino, repetitis tamen crebrius vicibus exhibetur. Videtur enim sic minusturbari Naturæ motus, minusque intempestivè concentrari, saltem non uno impetu quasi incarcerationi & figi fermentum febrile, quin successiva hujus correctione, & blandâ sanguinis aliorumque humorum alteratione, citâ rata & jucunda magis videatur cura. Docet hanc methodum prolixius Autor Anonymus, in *Tract. De la Guérison des fieures, par le Quinquina*, nuperrimè Parisiis edito, de qua ulterior tamen consulenda venit experientia. Saltem recorder, in quartana contumaci, *Elektuarium* ad imitat. *Sydenham: obs. de morb. acut. c. 5. p. 99.* diebus intermittentibus propinatum, spem meam fefellisse; sicuti in alio, similiter quartanâ diuturnâ confliâtato, post repetitam crebrius cum ꝥ diaphor: permistâ Chinæ pulveris usum, idque diebus intermittentibus quotidie bis vel ter, ut & ante paroxysmum, profligatam apparenter febrim aliquandiu siluisse, donec datâ levi occasione post aliquot septimanas, pristinâ ferociâ resurgeret.

§. 6. Modus curandi, & suppressendi febres in hoc Cortice, est pomum Eridos. Præcipationem fermenti febrilis, multi afferunt. Non ineptè dicitur in *cent. 2. Epist. 42. Bartholin. p. 530. Fermentum istud quartana hoc medicamento quasi vinclum, & in unum compactum,*  
nisi



nisi apti cuiusdam & appropriati purgantis beneficio à corpore educatur, vim suam fermentativam tandem exferaturum, unde perpetuum quartana fomitem derivare possemus. Si liberius paulò, in re aliàs intricata, philosophari licet, duplex substantiæ materialis differentia in cortice hoc observanda venit, prima particularum acrium insigniter amararum, & aromaticarum: altera particularum ferè insipidarum, (aut saltem subausterarum) stypticarum, adstringentiarum, quasi magis terreatum, & ex hypothese Tachemi H.C. c. 17. & 19. ad similitudinem gallarum & malicorii (quorum effectus colcotharis ex  $\Theta$ -lo præcipitatorius pariter in aliis adstringentibus radicibus & corticibus, v.g. cort. tamarisc. fraxin. quajac. rad. tormentill. fl. rosar. rubr. &c. observatur) alcali occulto, quod vicinius est fixo, imprægnatarum. De  $\Theta$  e enim essentiali, quasi  $\Theta$ -lato, ut vocant, ex subjectis talibus eliciendo, it. de vi vegetabilium adstringentia, in sapore austeriusculo, & textura quasi Osa fundata, vitandæ prolixitatis ergò, nil attinet dicere. Uti itaque hæc posteriores, fermentum febrile acidum absorbendo, illud figunt, & concentrant, & ita quasi in unum compactum reddunt, (unde pathemata ista abdominis, ex fibrarum & membranarum, occultè quidem, sed pertinaciter irritatarum spasmo scilicet, oriri videntur) ita illæ priores attenuant fomitem materiale plus minus viscidum, resolvuntque eundem, detergunt simul nonnihil primas vias, & hac ratione, præter insignem, quem provocant appetitum, Mass. Sangu. & speciatim genitæ inde bilis acrimoniam volatilem apprimè acuiunt, eorundem dyscrasiam sub febrilibus paroxysmis contractam corrigunt, vique diaphoreticâ eosdem depurant. Uno nomine, Dispositionem istam in ægro, cujus occasione semper recurrunt paroxysmi, conf. Sennertus de febr. l. 2. c. 2. p. 66, & 69. 70. & in quâ fundamentum quorumvis morborum chronicorum ponitur à Galenicis, vid. Ballonius in suis scriptis, in specie l. 1. conf. 106, & de Virg. & mulier. morb. c. 7. annot. 13. quam per specificum fermentum non inconcinne explicat Tachemius Clav. c. 9 p. 240. id quod & Sennertus jam subodoratus est, ut loc. cit. constat, tollere videntur. Uti ergò proficius pro febrium fuga cortex iste utroque expuncto existit, ita ratione prioris illius figendo nimis, & intempestivè concentrando plus minus febrile fermentum, febri persistit, sed non semper extinguendo penitus, nec perfectè saturando acidum specificum febrile, recidivæ occasionem relinquit. Posterioris verò ratione evenire arbitror, quod mox melius multò, sibi habere videantur ægri, & famem tantum non caninam subinde contrahere, quin & recidivæ quæ superveniunt, ut plurimum, (nisi aliud quid



quid obster) facilius curatu existere soleant, quam ipsa febris prima-  
ria, antea saltem suppressa. Dubitare itaque licet, utrum præter singu-  
lorem acrimoniam amaricantem tam speciale quid in hoc cortice re-  
conditum sit, quod per similes cortices ac radices, quin & per Viscā  
non æque commodè suppleri queat. Si non ex toto, ob specificam  
cujusvis simplicis seminalem crasin, saltem maxima ex parte. Sanè uti  
saporis similitudine gentiana ipsi propius accedit, de quo paulò infra,  
ita suspicari licet, costum Arabicum seu Syriacum, cum & ipse de cor-  
tice sit familia, prout in officinis hodiè receptus est, illius vice fungi  
posse. Alios quod attinet cortices, sanè ex nuperrima amici relatione  
habeo, se ob præcium peruviani hujus corticis carius, corticē ligni qua-  
jaci in quartana, parili utendi modo, & æque felici successu substituissē.  
Id quod sanè haud improbabile videtur, præsertim si cortex ligni acio-  
ris accipiat. Deprehenditur scilicet interdum quajacum, cujus de-  
coctum piperis instar acerrimum est, quod etiam jam Hoffmannus ob-  
servavit, de Medicam. officin. l. 2. c. 128. p. 380. & in hoc ferè diffe-  
rentia quajaci & sancti lignorum consistere videtur. Cortices tamar-  
isci & fraxini, ac gentianæ (credo quod hujus radix intelligenda sit)  
cum ̄ibus additis fixis, illius Peruviani, loco cum fructu usurparit  
Pienstr. 2. de febr. c. XI. p. 259. & c. 12. pag. 275. Non secus ac Deckers,  
comment. super Barbette Prax. l. 3. c. 3. p. 112. illius loco pulverem com-  
positum basi cortic. quajac. & fraxin. superstructum, substituit. De  
Viscis par ratio, quæ cum cortice hoc peruviano permutabilia quasi  
videntur: uti enim per viscum quercinum ʒj. dos. ante paroxysmum  
robustioribus propinatum, intermittentes aliquoties curatas novi, id  
quod pariter Primrosius seu contra quartanam proficuum observavit,  
de febr. l. 3. c. X. p. 300. quæ aliàs, in specie corylinum, de quo supra, ad  
Epilepsiæ medelam specificā laude cluent, ita & hodie peruvianum  
illum corticem in Anglia ad Epilepsiæ curam auspiciatò adhiberi pro  
certo relatum fuit: non secus ac ad hypochondriaca, ut hysterica pa-  
rhemata, it. pallidos colores & Mentium suppressiones, à quibusdam  
in Gallia, per experientiam confirmatis, commendatur. Gentianæ  
denique radix, debito usu, ad illius corticis (qui gentianæ Indicæ fru-  
ticis, respectu nostræ herba, esse videtur D. Glanz. apud Hoferum in  
Herc. Medic. p. 291.) vires propius accedit, sine eo, ut abdominis illa,  
de quibus supra, pathemata ejus usum insequantur. Siquidem illa  
ipsa, saltem pulveretenus assumpta, ad tormina abdominis, it. ad pas-  
siones hystericas, egregii usus existat. Quantum v. febrifuga vi  
pollent, notharum præsertim ac chronicarum tertianarum &c. spe-  
ciatum

ciatum (suc-  
gentiana:  
Chiffusio  
dem, in  
infusum a  
ne, reite  
brifugos  
cio adul  
rogando  
pro amar  
ipsi pulv  
̄is cuju  
ʒss lociat  
in specie  
propinatu  
Equipoll  
pertus L  
alcalifata  
c. l. p. 112  
violentar  
tionem,  
brile, &  
eo ipso R

̄s.  
que nunc  
hæc acida  
promtè a  
ximè cal  
ista Crol  
berg, ex  
Sanè hæ  
center p  
mista,  
adeò sit  
te cuius  
tenter fi  
usu, spe  
tibira,



ciatim succus ejus inspissatus, dos.  $\mathfrak{zj}$ . vid. in *Schrod. Pharmac.* ubi de gentiana: *Gesneri Epist.* l. 2. p. 62. *Augenio.* l. 7. *Conf. & Epist.* 8. p. 173. *Chiffutius de pulvere peruvian.* c. 4. p. 35. Certè  $\mathfrak{zj}$ . pulverisatæ ejusdem, in Vino generoso aut Vino ablinthite macerata, sicque totum infusum ante paroxysmum propinatum, quin & pro necessitatis ratione, reiteratum, eosdem ferè, cum illis corticis Peruviani, effectus febrifugos exserere, observare licuit. Unde etiam radicis hujus beneficio adulterari jam corticem peruvianum fraus institutorum dedit, surrogando ejusdem loco corticem quercinum, decocto radic. gentianæ, pro amaritie acquirenda ebrium & imprægnatum. Præfero tamen ipsi pulveri extractum ejus cum spiritu V. factum, à  $\mathfrak{z}\beta$  ad  $\mathfrak{zj}$ , cum  $\Theta$  is cujusdam  $\square$  osi, vel fixi, ut absinthii,  $\mathfrak{zj}$  vel volat, ut spiritus  $\Theta$   $\ast$ ,  $\mathfrak{z}\beta$  sociatum, variatâ tamen dosi ingredientium, pro symptomatum in specie caloris ac frigoris ratione, in  $\nabla$  a appropri: ante paroxysmum propinatum, ceu non contemnendum, etiam in quartanis remedium. Equipollere cortici Chinæ, gentianam ejusque extractum asserit expertus *Ludovici in pharmac.* p. 253. & 278. præfert v. eidem  $\Theta$  ia alcalisatâ, pro febrium cura *Barbette*: multi usus practicus, in *Prax.* c. l. p. 112. Utraque ergò hæc juncta, inprimis proficua erunt, contra violentam, ut sic dicam, fixationem, aut intempestivam concentrationem, attenuando fomitem materialem, saturando fermentum febrile, & per sudorem ac Urinam depurando massam sanguineam, unde eo ipso Recidivæ simul præcavebitur insultus.

§. 7. Animale regnum primariò partes duras suggerit, eas- (2) *Ex re-*  
que nunc  $\Delta$  e calcinatas, seu ustas, nunc sine  $\Delta$  e præparatas. Omnia *gno ani-*  
hæc acida fermenta, & inde producta morbosa similis saporis vitiosi, *mal.*  
promtè absorbent, & ità concentrant ac figunt: idque omnium maximè calcinata marina, quæ inter famosiora sunt, specifica febrilia ista *Crollii*, ex testis longis *Cochlearum*, in *Basilic.* p. 297. & *Strobelberg.* ex matre perlarum calcinatis, *Introduc. Remed. pro febr.* p. 13. Sanè hæc ipsa ad Calcis vivæ naturam propius accedunt, unde & recenter parata  $\nabla$  æ affusione effervescent & incalescent, ac  $\Theta$   $\ast$  ci commista, hoc subito  $\Theta$  vol. eructat, absorpto promte acido  $\Theta$   $\ast$ , aded sitientissima acidorum existunt, & ceu exhausta corpora, promte cuivis acido accessum admittunt, illudque intimè imbibendo potenter figunt, ac ità paroxysmos febriles inhibent; Ac sanè legitimo usu, speciatim temporis & doseos ratione, firmioribus subjectis exhibita, ut rectè hoc notat *Hartmannus super Croll. Basil.* p. 300. quia



infirmi talia non ferunt, sapissimè febrim feliciter profligant; Sed eo ipso, quo potenter adeo figendo, Naturæ motus suspendunt potius, quàm quod fermentum febrile exstarent, crebrius non absque nocumento propinantur. Nil familiarius, quàm caleibus talibus recidivas supervenire, nunc simplices, nunc idque crebrius, multiplices, & hæ ipsæ prioribus febribus fere contumaciores, nisi bene tractentur, quarum rationes, ex supra dictis, facile erui possunt. Siminus hoc contingat, sane abusu suo diuturnos languores, & interdum lentas febriculas, hæcticis quodammodo similes post se trahunt, ut supra insinuat. Aliquoties etiam contigisse recordor, quod languores illi, haud prius cesserint, quàm scelerus quidam supervenerit, isque cum ægrorum levamine, qui non tam ex hepatis bilisve vitio, saltem non primario, quam ex læsa digestionē prima, ejusque in intestinis deficiente perfectione oriri videntur, quā chylus sanguificationi ineptus loco rubedinis, flavedine saltem vitiosā inquinatus, tandem spontaneā per motum intestinum separatione & præcipitatione à reliquā massā seceret, Ictericam descædationem induxit, volatilibus cum junctis amaris, v. g. spiritu ☉ \* cum Essent. cent. min. ac absinth. facile curabilem. Potius ergo, saltem tutius usurpantur non calcinata sed saltem vel simplici tritura, vel prævia cum ☿ secundum *Mynsicht. armament. p. 97.* aut cum lixivio acris secundum *Rosfinccum in Chym. p. 379.* extractione præparata. Aut si ustis nihilominus, certas ob circumstantias, utendum, terrestria calcinata C. C. ust. aut Ebor. ust. præferrem, insigniter quoque absorbentia & attemperantia, ast non adeo concentrantia, nec figentia, ac illa marina, quorum calces, ad mineralem naturam ferè propius accedere videntur.

(3) Extr-  
gno mine-  
rali.

§. 8. Minerali in regno excellit, & frequentioris est usus ☿, ipsique affinia subjecta plurima, de quo cum sapius in his thesibus de- tur agendi occasio, subjectum aliud, ☉ lo ejus cognatum, multi pa- riter usus, consideremus, & hoc sit Oen. Simplex, ut inter febrisfuga admodum decantatum, imò magis universale, utpote quod intermit- tentes præter, & continuas & hæcticas debirā sub præparatione dicatum est, ita etiam quibus vis in morbis Laxis, à methodicis stricto oppositis, & huc pertinentibus imprimis fluxibus quibusvis, non contemnendi usus, qua ratione in diarrhæis, dysenteris, uteri quoque hæmorrha- giis revera utiliter adhiberi solet. Quoad vim præcipitatoriam in fe- bribus, equidem ad intermittentes vel crudum adhiberi potest, conf. *Exeges. Chym. Tenzelis in salam. p. 664.* in specie in quartana laudare istud satis nequit *Hartmannus in Prax. Chym. c. 238. §. 4. p. 324. &*



novi hanc ipsam contumacem, à Medico per plures Menses tractatam, tandem pulvere, ab empirico, ceu universale febrifugum decantato, ex Ois,  $\odot$  depurat: & nuc. mosch. ad  $\mathfrak{zj}$ , cum paucis sanguinis draconis, pro fuco tincto, pro tribus dosibus, mox primâ ejus dosi, ante paroxysmum propinata, profligatam: quod idem videtur esse remedium, quod alia licet sub compositione, super basi tamen Ois, ad quasvis laudat intermittentes *Rhumelius in sacro Chym. C. 13. p. 427.* conf. potio febrifug. *Piens. de febr. l. 2. c. XI. p. 259 & c. XII. p. 276.* ut ut crudo tali præferendum videatur, ob causas, quæ ex infra dicendis, sponte patebunt, magisterium illud *Schröderi Pharmacop. p. 479.* præterea ad scorbutum, quin & Epilepsiam nonnullis laudatum. Continuas verò quod attinet tam acutas, in quibus etiam simile artificiale Osium concretum, scil. sacch. Hni, aut crystalli mineræ hujus cum spiritu  $\odot$  i parati, quibusdam multum extollicur, quam lenras Hecticas, in his præparatio, & digestio sive coctio artificialis, ut dulcedo O sive ejus saccharum, ut vocant, acquiratur, necessaria videtur, de qua consulendus *Poterius, Pharm. l. 2. c. 9.* & speciatim *Darivotti de præpar. Medic. pag. 245. c. 24.* ut & *Hoffmannus in Clav. Pharmaceut. p. 349.* cujus tamen processus descriptio, manca ex parte existit, ejusv. (ut obiter hoc interferere liceat)  $\odot$  crystallisatum abstersivum, p. anteced. 348. nil aliud est, quam coagulum liquoris, qui Oi in  $\nabla$  solut. & cum  $\odot$  tartari præcipit, supernatat, &  $\odot$  tertium, tartaro  $\oplus$  lato æmulum constituit. Ac sanè in diætimalis, & præterea aliis plurimis, in quibus præcipitatione, ut vocant, opus est, lege artis præparatum & exhibitum Oen, nobile est simplex, de quo mirari ferè liceat, quod rarius in usum hæctenus vocatum sit, cum debet, ut dixi, præparatum, sacch. Hni præferendum ferè videatur.

§. 9. Est O decompositum naturale, ex acido universali minerali, & is embryonati, rodente terr. petrosam s. calciformem, & ita cum hac ipsâ, mechanicâ necessitate in crystallos octaëdricos coalescente genitum. Sicuti enim  $\oplus$  lum ex acido simili & embryonati & vena metallica  $\odot$  vel  $\mathfrak{z}$ , ita O eodem ex acido & petroso corpore in pellucidam & inam coaluit substantiam, pari modo, ac  $\oplus$  lum, gallarum decocto præcipitabilem, adeoque spiritus sive acidum  $\mathfrak{z}$ ,  $\oplus$  li Ois essentialiter coincidunt, qui tamen intimius longe in Oe quàm in  $\oplus$  lo concentratus, adeoque magis fixatus existit, vel  $\Delta$  e magistro sub destillatione docente. Unde etiam multum O ubi generatur, ibidem quoque  $\oplus$  lum &  $\mathfrak{z}$  plerumque reperitur: nec rarum est, ex una eademque vena  $\oplus$  lum & O excoqui, sicuti quoque Ois sub præpa-



ratione ☐ humana multis in locis adjicitur, pro ☐li separatione, & O concinniori crystallisatione, ex qua spiritus ☐ & ☉ vol, quod ex Ois cum alcalisato quodam destillatione prolicetur, natales suos derivat. Quæ omnia artificialis O productio excreta cum spiritu ☐ soluta & crystallisata confirmat, qui spiritus cum ☐ aliàs & cum ☐e in ☐lum artificiale coagulatur. Usus E. præcipitatorum & Organismi humorum, quibusvis ex causis concitati correctivum quod attinet, non præstat hunc Oen sapore & textura sua adstrictoria; Adstringere enim partibus solidis saltem, ratione fibrarum plus minus laxarum, canalium ac pororum vitiosè hiantium, competit, non fluidis concretis, qui coagulari aut saltem grumescere ejus usu solent, uti in Lacte, non secus ac albumine Ovorum conspicuum est; & qui effectus ab acido ejus primario dependet, sicut adstrictoria vis, à specifica ejusdem cum terreis particulis textura oritur. Interno ergò sub usu, utcumque præparatum, præcipitatur mox in primis viis, ab effluviis & contentis partium ☉ sis volatilibus, parili modo, atque extra corpus ab ☐a ☉ si ipsi acciderè solet, & quale fatum ☐lata ☐alia assumpta pariter experiuntur, adeoque acidum ejus volatile, sub ☉ so sic acquisito sapore, vi absterfiva, & incisiva, ac alterativa, quod suum est agit, dum acidus morbosus odor vel sapor, plus minus fermentativus corporis, ☉ præcipitatum aggreditur, à quo absorptus & concentratus, sive ut vocant præcipitatus, potenter adeò figitur, ut ceu incarceratus ac vinculus, inermis penitus reddatur. Uti itaque O compositionis & texture ratione, cum ☐lo multum conspirat, ita etiam quoad mutationes, quas recipit in primis viis passivas, & inde resultantes in corpus alterationes, cum eodem coincidit, ipso ☐ ejusque ☐lo, vi adstrictivâ it. febrifugâ, præsertim intermittentium, haud multum O cedente. Dum verò nimis figendo acida, intimius fermenta morbo la in suis mineris concentrat, quin & adstrictoria vi, motum humorum plus minus remoratur, sanè illegitimo usu palliare saltem morbos videtur, & vel diuturnos magis eosdem, vel recidivantes, vel in alia pathemata degenerantes reddere, id quod de sacch ☐ni, concreto artificiali Ois simili, supra §. 4. relata observatio illustrat. Adeò legitimâ administratione saluberrimum quod existit, perverso abusu, & in sufficiente præparatione, nocivum esse solet. Legitimam administrandi methodum docebunt sequentia; quod verò præparationem attinet, hæc eò dirigenda venit, ut saturata nimis, adeoque fixior & austerior terra petrosa ceu calciformis separetur, à subtiliori vel facilius solubili, quæ vel proprio acido minerali, vel ejus loco ☒ ☒ suavi solutione, concretum



cretum magis  $\ominus$ inum, minus stypticum, minusque adstringens & austerum, sed acidi quasi extraversi & potentioris ratione, magis resolutivum, terræ subtilis verò respectu absorptivum blandius, & acidi morborum exactius saturativum evadat.

§. 10. Quoad legitimam ergò absorbentium horum adhibendi methodum pro usu interno, sequentes Cautelæ specialius observandæ veniunt. *I. Rite præparata, non verò saturata propinanda sunt.* Præparatio variat, *partim* pro ipsorum simplicium præparandorum textura varia, sic enim alio modo partes animalium duræ, sive terrestrium, five marinarum, alio modo mineralia & metallica præparanda veniunt, *partim* pro subjectorum, quibus exhibenda sunt, constitutione diversâ; Sic enim  $\sigma$  crudus, simpliciter pulverisatus, ut in pulvere simplici Cachectico *Harm. Prax. Chym. c. 171. §. 5.* robustiori qui sunt ventriculo, aut in quibus potentius dominatur acidum, convenit, conf. *Hanpman. Wolekensteinischer warmer Bad und Wassersehaß. p. 221. it. Glauber. p. 2. furnor. p. 57.* aliis delicatioribus infusionem ejus & solutionem mitiorem, cum succo quodam vegetabili acidulo factam requirerentibus. Non secus ac Liquor  $\sigma$ olis, seu solutio ista  $\oplus$ li naturalis ritè parata, ac sanè multi usus, quibusdam sensiliori Ventriculo præditis perquam molesta observatur, quibus Tinctura  $\oplus$ li  $\sigma$  Zvvölteri, minus  $\sigma$  saturata, sed  $\ominus$  essentiali magis turgida, optimè contulit. Scopus ergò præparationis omnis eò collimet, ut (1.) commodè, respectu ipsius remedii, (2.) tutò ac jucundè, respectu subjecti ægri, (3.) efficaciter, respectu usus propinari possint.

§. 11. Cum verò usus eorum in enervando p. n. acido imprimis consistat, manifestò sequitur, acidis sub præparatione sui non nimis tractanda esse, quia exuuntur aliàs vi suâ absorptiva & inversiva, adeoque frustra propinantur, quantum enim extra corpus saturantur magis acidis, eo minus intra corpus inserviunt, iisdem corrigendis. Quin imò, acidis extra corpus tractata diversimode, subinde ex mutata textura, novas facultates, pristinis plus minus immutatis, acquirunt, sæpius absterivas aut diureticas, adeoque alienæ indicationi inservientes. Rem exemplis quibusdam illustrabimus. Priori ex fundamento meritò hodie rejiciuntur magisteria sic dicta, ex animalium partib<sup>9</sup> duris parata, tam præcipitata, quàm abstractitia. Præcipitata quidem, dum solutio per acidum facta, præcipitatur ab alcali vel fixo vel volatili, vel à spiritu  $\oplus$ li. Priora n. sunt calces terræ, penit<sup>9</sup> insolubiles, occultè  $\ominus$ sa, acido



acido solventis & alcali præcipitantis tam arcto connubio particulis terreis coherrentibus, ut nullo edulcorationis artificio penitus liberari possint, exinde enim & ponderis augmentum. Dealbatur talibus asfumentium Ventericulus, citra usum alium. Coralia cum acidis, speciatim cum spiritu  $\Theta$  li blande effervescento, hunc absorbent, qui talium magisterio affusus, sine motu, sine alteratione ulla observatur. Non secus ac perlæ cum quovis acido effervescent, quorum magisterium sine motu illis additur. Posteriora verò styptici quid in concreto suo possident, & dum exactè  $\Theta$  li acidum elui minimè potest, gustui licet minus pateat, utpote in subjecto præcipitato, particulis alcalinis vol, plus minus imprægnato, intimius concentratum, tamen vi absorptiva, concretis istis alias apposite convenienti, ferè privata existunt. Nec est, quod dicas, posse ex his magisteriis denuò recuperari  $\Theta$  vol, si scilicet addatur eisdem alcalisatum quoddam seu  $\Theta$  fixum, sic enim in examine  $\Delta$ , successive ascender  $\Theta$  vol, quod hac ratione acquiritur, cum maxima ejus pars, ab acidis aut solventis aut præcipitantis enervata, ac destructa sit: Requisita pariter hæc artis, alcalisatum &  $\Delta$  impetus, dum deficient in nobis, neque illorum resuscitatio in corpore nostro expectari poterit. Altera differentia comprehendit abstractitia, per spiritum  $\Phi$ , it,  $\Theta$  li, a. Vir, ær. parata, quæ utut solubilia, quin & quædam eorum, usibus diaphoreticis aut diureticis convenientiora, quædam scopo adstrictorio accommodatiora, attamen, cum sub solutione ista ab acidis, crasis & textura concreti multum immutata sit, impossibile quoque, acidum solvens penitus adeò separare, quin ejus multum, insensibiliter licet concreto cohareat, quicquid etiam de suo Vir, ær. spiritu jactitet *Zvvölferus*: app. ad animadv. p.66. hocque exinde novam plus minus, interdum solventibus  $\Theta$  latis non exactè rectificatis, ingratis, aut nauseose  $\Theta$  lici ac  $\Phi$  ei saporis texturem acquirat, adeoque crudorum suorum simplicium absorbendi & invertendi vim, nullatenus exserere valeat, ob id præparata talia, simpliciter, eorum magisteriis longè præferenda erunt. Præparanda ergo veniunt potius vel simplici pulverisatione & levigatione, qualis in Coraliis, perlis, aut Lap.  $\Theta$ . obtinet, vel  $\Delta$  aut  $\nabla$  adjumento, ceu duorum magnorum solventium, ut apposite audiunt Willisio, quibus & tertium illud, ær scilicet, merito sociandum fuisset.  $\Delta$  adjumento quæ sit præparatio, suggerit calcinata seu usta, vi absorptiva & inversiva, cum effectu adstrictorio efficacissima: quibus tamen ob junctum usum potentius & positive magis diaphoreticum, præferenda philosophica magis, quibusdam in secretis habita, calcinatio, dum v.g.

ralur,



rafur. C. C. aut ebor. aut unicornu :  $\text{ʒij}$ . vali circularorio, cuius forma, aut cucurbitæ duplici vel simplici, sed alembico cæco munitæ, inclusa, digestionem blandæ, ne ingratum, quod ex neglecto  $\Delta$  regimine facile fit, empyreuma contrahant, vel  $\text{ʒ.}$  vel cinerum exponuntur : resolvitur enim sic phlegma spirituosum, particulis  $\Theta$  inis  $\square$ osis nonnihil aculeatum ; & proprium circulationis motu recludit corpus ac penetrat, ita ut post  $8$  vel  $10$ . dierum moram, hoc promte pulverisarian in alcohol redigi possit, eo quod nondum adeo resolutum est, vel solo, vel novo denuo addito, digestionem iterum exposito, donec totum ita calcinatum fuerit. Quoad præparationem horum subjectorum, quæ  $\nabla$  fit beneficio, hæc vel  $\nabla$  simplicis vapore instituitur, modò à *Rollincio in Chym.* s. f. 2 c. 22. p. 336. descripto, vel elegantius per lixivium perficitur, modò primitus in A. M. H. Vol. 3. p. 126. & 127. insinuato. Iisdem ex causis supra allegatis, meritò etiam suspectus videtur crocus  $\text{♂}$  quorundam aperitivus, ope lixivii nempe ex cineribus vegetabil. crebriori irroratione paratus. Inest scil.  $\text{♂}$  proprium acidum, facile vel simplici  $\nabla$  a, adjuvante tamen aëre mobile, & quod in crocum sub vulgari rubigins nomine, proprium corpus arrodit. Huic dum additur alcali fixum, acidum istud rodendo  $\text{♂}$  corpus simul arripit alcali, & ita coagulantur in  $\text{♂}$  corpore, emergitque exinde corpus occulte  $\Theta$  sum, terreum, iners, vi absorptiva maximam partem destitutum, nisi in quantum particulæ quædam  $\text{♂}$  crudi, aliquantulum adhuc usibus his inserviunt. Nec immerito rejicere videtur *Glauberus furn. Philos. p. 2. p. m. 57.* crocum  $\text{♂}$  per calcinationem fusoriam, mediantribus magdaleonibus  $\text{♀}$ , illius laminis vel bacillis scintillantibus admotis paratum : rodit enim acidum  $\text{♀}$  liquefacti  $\text{♂}$ , sed simul concentratur pingue  $\text{♀}$  eum, non defragans, adeoque pulvis ex  $\text{♂}$  &  $\text{♀}$  compositus hujus ob accretionem penitus insolubilis obtinetur, nulliusque adeo in corpore usus, eo, quod acidi  $\text{♀}$  putioris ratione.  $\Theta$  li modo solubile & alterabile in nobis existit, in  $\nabla$  supposita soluto & abjecto.

§. 12. Ut itaque saturantur ab acidis, absorbentia plura remedia, adeoque primario scopo inepta redduntur, ita quædam eorum ab iisdem, mutua ex connexionem, novaque sub textura, novas vires medicamentosas acquirunt.  $\Theta$  si suggerit nobis exemplum, quod vel in sicca, vel per deliquium solutum, humida sub forma, nobile absorbens, & acidi vitiosi corrigens subministrat, speciatim intermittentibus in febribus, sive solitario sive per infusionem sennæ sociatum, ad imitationem *Riv. vii. cent. 1. obs. 39. 40. cent. 2. obs. 66. cent. 3. obs. 22. cent. 4. obs. 84.* administretur. sane utroque modo, tum  $\text{♂}$  per deliquium

Quadam  
enim sic  
alienas  
vires ac-  
quirunt.



quium facie ad 30. vel 40. gutt. bis in die, quam cum senna infusum, alternatim usurpatum, ut in chronicis quibusvis febribus intermittentibus, ita speciatim quartana proficuum admodum ejus usum expertus sum, triplicem quartanam aliquando hyemali tempore hoc ipso profligando. Sed si sub artificiosa præparatione, acido, vel  $\oplus$  Natî pro tartari regeneratione, sub nomine terræ sol. tartari, vel  $\oplus$  i, in tart.  $\oplus$  lato, vel  $\oplus$  i, pro  $\ominus$  febrili quorundam, revera  $\oplus$  o regenerato, vel  $\ominus$ , in spiritus  $\ominus$  \* destillat. pro  $\ominus$  e hypochondriaco, saturatur, vi acidorum saturativa & fixativa penitus deposita, incidens, abstergens, diureticum evadit concretum, sordibus primarum viarum resolvendis, inprimis dicatum. Lapides  $\ominus$ , uti absorbentium, usu & effectu non postremi existunt, ita  $\oplus$   $\Omega$  soluta, sub abquisita hinc textura  $\ominus$  sa, multum de facultate hac perdunt (utut à fortiori acido in corpore occurrente, præcipitata ex debiliori, illud imbibant plus minus, adeoque quavis saturativa facultate haud penitus careant,  $\oplus$   $\Omega$  juncto, viscidas sordes incidente & resolvente) & diuretica magis evadunt. Notabiliter quoque hoc patet, ex ovorum, inprimis struthionis, testis, egregiè absorbentibus, spiritu  $\ominus$  in tertium  $\ominus$  tum solutis, citra insignem vim saturativam, potenter incidentibus, & diureticis redditis. Terræ minerales sigillatæ, absorbendo & figendo excellunt, sed spiritu  $\oplus$  li vel  $\oplus$  solutæ & saturatæ, in liquoris styptici, seu ut *Bartoleto: de Respirat. diffic. pag. 586.* audit,  $\oplus$  potabilis ex terræ sigillatæ præparatione, texturam Olam acquirunt, & stypticæ ac potenter adstrictoriæ existunt.

Non tamē  
quavis per  
acida præ-  
paratio  
rejicienda.

§. 13. His ipsis tamen, quamvis absorbentium pro acida præparationem haud rejectam volumus, sed saltem illorum, perfectam plus minus ab his saturationem. Tantum enim abest, ut istam penitus excludamus, ut in quibusdam subjectis omninò requiri videatur, præsertim mineralium quæ sunt ex familia, partim ut jucundius & tutius propinari, partim ut usui destinato melius satisfacere, partim ut præter effectum absorbendi, aliis simul intentionibus medicis satisfacere queant. Pro quibus scopis assequendis, Benigna mater Natura hic ducem se effert, quæ præter copiosa subjecta  $\Omega$  ialia, ne horum crudorum usu, teneriora quorundam lædantur Illia, soluta eadem, & quasi  $\oplus$  lisata acidularum sub forma nobis haurientia offert. Jucundius longe præ crudo  $\Omega$ , hæ ipsæ assumuntur, minusque præ illo, præcordia gravant, quin & spiritus acidus & embryonati sociatu, incidendo attenuandoque viscosiores, aut hincinde coagulatas sordes, quasvis obstructions, revera tales, interiorum corporis viscerum potenter referat,

& ca-

& canales  
vol. 10, un  
sionem, p  
acidum m  
bet & imb  
mare elim  
 $\Omega$ , Terr  
promissu  
ut vocan  
ultimuse  
in vitriol  
commoc  
ad albedi  
nempe E  
pag. 105.

§. 1  
tia, & in  
considera  
netrant,  
novum c  
Sunt eco  
jectis ad  
per præ  
destinati  
redditu  
tionis nec  
sive radi  
in exemp  
manifest  
oli & ol  
porest;  
emergit  
ita, ut v  
separat  
& ex ter  
chanica  
Quant  
lutione  
timi<sup>o</sup> lo



& canales meatusque quosvis eluit, & abstergit: dum præcipitatus à sale vol. flo, undique in nobis præfente,  $\sigma$ , per præviam istam in acidulis arro- sionem, quasi prædispositus, & in minutias exiles redactus, acrius occurrens acidum morbosum quodvis p. n. nostris interaneis hostile, promptè absor- bet & imbibit, illudque secum coagulatum, sordium nigricantium sub sche- mate eliminat. Non secus, ac ex vitriolo, per alcali quoddam præcipitatus  $\sigma$ , Terræ cujusdam mineralis, aut Ochreæ facie cadens, cujusvis acidi promptissimè absorptivus existit. Ad imitationem ergò Naturæ, pro scopo, ut vocant, aperitivo seu potius absorptivo, inter tot præparata  $\sigma$ ialia, non ultimus est Liquor  $\sigma$   $\sigma$ is dictus, ex magnesia vitriolata, sponte suâ in aëre in vitriolum efflorescente, qui in locum acidularum naturalium surrogari commode poterit. Sicut in formâ siccâ, sit paratum exinde vitriolum  $\sigma$ , ad albedinem, aut aliqualem saltem rubedinem calcinatum, ad imitationem nempe *Excell. Cnæselii, in append. anni 6. & 7. Miscell. Acad. Natur. Cur.* pag. 105.

§. 14. Quantum ergo differant, tam acida, quam simplicia absorben- tia, & imprimis qualem ad se invicem respectum mutuo foveant, probè considerandum venit. Sunt enim acida, quæ subjecta quædam intime pe- netrant, & arctissimâ ex minorum corpusculorum associatione, partim novum concretum constituent, partim vim absorbendi penitus deleant. Sunt è contra alia, quæ saltim arrodant, ut superficiali contactu passivis sub- jectis adhæreant, facile ob id, quocunque fiat modo, potissimum tamen per præcipitationum modos, separabilia à se invicem, itâ, ut utrumque destinationi suæ debite satisfacere queat, quin & pro hac magis dispositum redditum sit. Differentiæ hujus fundamentum, in mechanicæ conforma- tionis necessitate formaliter, & proximè consistit, cui interdum & essentialis sive radicalis seminalibus ex principiis, materialiter & remotè subest. Ut in exemplis, iis, quæ hætenus considerata fuerunt, subjectis, analogis, iisq; manifestioribus insistamus, quàm arctum connubium ineunt, spiritus vitri- oli & ol. tartari per deliqui. quod vix, ac ne vix quidem, arte penitus dissolvi potest; hinc mutatur utriusque textura, & novum, novorum attributorum emergit concretum. Quam laxè verò  $\sigma$ i, idem vitrioli spiritus adhæret, ita, ut vel facili  $\Delta$ e, vel levi præcipitatione separabiles invicem existant,  $\sigma$ e separato, vi absorptiva, ob sui, particulas in minutissimas confractionem, & ex textura metallicâ, in magis apparenter terream alterationem, ut me- chanica Chymica ad oculum docet, promptiori & potentiori sic instructo. Quanta differentiâ inter ejusdem  $\sigma$  à spiritu vitrioli & spiritu nitri factas so- lutiones, & hinc separati ejusdem denuò notabilis alterationis diversitas. In- timi<sup>9</sup> longè penetrat & dissolvit nitri spiritus, idq; tantâ cum violentiâ & im-



petu, ut insignis æstus exinde exfurgat, & tam arctè socientur solventis & soluti particulae, ut vix ulla vi divelli penitus queant, quin magna illius portio, huic arctissime infixæ cohæreat. Vitrioli e contra spiritus aut oleum, arrodit potius corpuscula & alia, idque lento magis (respectivè scil.) motu minusque intimè invicem cohærent. Unde ibi quidem emergunt concreta texturae perquam adstringentis, & saporis insiniter styptici, scopo positivè adstringendi convenientissima, absorbendi usu minus apta. Hic verò vitriolum dulce concrevit, scopo ut vocant aperitivo, sive acidorum vitiosorum correctivo, etiam præ crudo & longè aptissimum. Imò essentia utur convenient, sulph. & vitrioli acidæ stigmata, tam n cum sulphure, sive viâ sicca, calcinando, sive humidâ, illius spiritum recipiendo, paratum vitriolum, præferendum videtur eo, cum vitrioli spiritu factò. Accuratè enim si rem considerare velimus, purius & quasi virgineum magis existit sulphuris acidum, & quod in corpus & facilius penetrat, ejusque particulas subtiliores exactius dirimit, & quod interno usu, amicum etiam magis nobis, & melius resolutivum & abstersivum existit. Vitrioli spiritu, ob liquaminis metallici, plus minus sulphurei societatem, nec rectificando quoque penitus separabilis, (nisi ante vitrioli distillationem, artificiosâ depuratione mediante, prius removeatur) minus puro, minusque subtili, nec & adeo exactè penetrativo existente. Vix itaque assensum mereri videtur *Zwelferus* in *Mantissa spagyrica*: p. 1. cap. 3. p. 337. dum crocum & Cachecticum, adeoque aperitivum, hoc est, acidi absorptivum cum nitro, detonando parare docet. Equidem labor ipse, ob alias quibus artem præbet, speculationes, nec inutilis, nec injucundus existit, præsertim dum sulph. & externum sic manifestum redditur, in deflagratione ac alcalisatione nitri, effectu planè eodem, qui alias ex simili nitri cum sulphure, & tartari, carbonibus, sanguine animalium, ossibus aut cornibus animalium tractatione, accidit, adeo omnium trium regnorum sulphura, hoc in effectu, & operandi modo conspirant: quin & amici relationi debeo, in deflagratione ista, flores & & nitri simul elevari, qui in ret. tubulata si instituantur operatio, pro eleganti colligi queant remedio, de quo experientia consulenda. De cætero, qui isto modo obtinetur crocus, non secus ac cum spiritu Vir. ær. exinde parata Tinctura, revera terreæ, styptica, exactè saturata, & minus aperitiva, acidive correctivæ est textura. Affusus huic croco spiritus 4, lente, & non nisi longo intercedente tempore tantillum ejus dissolvit, unde ruberrimam quidem contrahit Tincturam sed saporem exhibet horride vitriolicum, potenter adstrictorium, & manifestæ adhuc aciditatis suæ participem. Saturatus scil. & jam sufficienter, alio ab acido imprægnari recusat. Præparatio E, absorbentium plurium aut saltem commistio cum quibusdam acidis, nunc necessaria,

nunc



nunc pro certis intentionibus etiam utilis omnino existit, prout in acidulis §. 13. vitriolo & c. l. Lap. Strum: §. 12. testis struthionis. c. l. haecenus illustravimus, modo saturationem perfectam, & hujus ratione virtutis absorptivæ destructionem evitemus.

§. 15. Pergendum ulterius, in debita absorbentium usurpandi methodo, ubi *Cautel. II. Non nisi moderata dosi exhibenda sunt.* Peccatur hinc frequentissime in excessu, dum aut sæpius reiterantur, aut diutius continuantur, aut copiosius una vice ingeruntur. Determinat doses rationem in genere acidi morborum quantitas & exsuperantia major vel minor, quin & ejusdem qualitas sive acrimonia corrosiva, potentior aut debilior. Posterioribus in casibus, uti minor omnino sufficit quantitas remedii, ita in prioribus, major indicatur copia. Moderandus tamen ita eorum usus, ut partitis potius vicibus, quam semel, idque eò succincta magis dosi, quo diutius iisdem insistere cogimur, adhibeantur: intermittendo subinde eorum usum, quamdiu symptomata non nimis urgent eundem. Observanda quoque morborum vel continuorum vel intermittentium differentia, in istis, cum continuato sæpe usu administrantur, minori dosi unâ vice, in his verò cum interpolatis vicibus, adhibeantur, copiosius unâ vice propinare licet. De cætero, uti semper in p. n. cujusvis remotione, festinandum lentè, cum quævis subita mutatio sit periculosa, ita in his auxiliis quæ intenditur alteratio, tutior est successiva, quam repentina. Utur enim minus nocere videantur, cum passivè potius se habeant, & privativo modo proficua sint, quam alia alterantia, quæ positive magis, sensilius vel contenta immutando, vel solida afficiendo, operantur, immoderata tamen dosis, etiam sua infert incommoda, de quibus supra, §. 3. utut ob modo insinuatam rationem, magis lenta, quam acuta, seu magis successiva, & diuturna, quam subitanea, sed exinde etiam minus citò denuò corrigibilia inferant nocumenta. Nempe idem mihi videtur, sub inconsideratâ horum dosi accidere, quod picanibus usu venit, qui moderato rerum ardentius desideratarum usu, seu alimento medicamento, saturando specifici saporis acidum stomachale, levantur & melius habent, ast nimio eorundem abusu, anorexias, dyspnœas, cachexias, febres lentas, & mille mala incurrunt. Stolidi quarundam virginum fert opinio, cretæ, precipitantium sive absorbentium non postremi, usu, candorem faciei se sibi conciliaturas, quæ tamen, quantum continuatâ ejusdem ingestione lædantur, quoad primæ digestionis, & dependentium inde reliquarum, negotium, quotidiana loquitur experientia. Quod si ex pica stimulo, vel cretam, vel calcem viv. vel similia devorent, modò non nimio fiat excessu, auxilium potius exinde, quam nocumentum experiuntur, quod iisdem sanis, haud æquè impune



licitum foret. Ast si & in pica quoque excedant in dictorum usu, supra enarrata mala pariter effugere nequeunt.

Cautel. III.  
debitus selectus  
instituendus.

Isque vel  
respectu  
Remedii.

§. 16. Præter dicta, in rationali absorbentium & saturantium usu, sit Cautel. III. *Curiosus selectus eorum instituendus.* Haud enim omnia æque omnibus conveniunt. Nec postrema prudentiæ medicæ pars est, acutè hariolari, quale remedium ægro, præ alio simili magis conveniens sit. Cum itaque tanta luxuria sit, absorbentium remediorum, meritò eadem curiosè discernenda, & quid convenientius sit eligendum. In selectu tali instituendo, respectus habeatur tam ad ipsa remedia quàm ad ægros. Remedia quod attinet, selectus sub eorum usu instituendus triplici ex ratione: (1.) *Propter eorum insignem varietatem;* supra c. 1. §. 11. 12. 13. 14. 15. enarratam. Sunt enim vel nativa vel præparata, hæc vel simplicia vel composita: utraque à textura & proprietatibus nativis plus minus abeuntia: Sunt insipida terrea, aromatica, amara, austera dulcia, urinosa, eaque tam fixa, quàm volatilia &c. quæ universa & singula æqualiter adhiberi nequeunt, cum ubiq; certus respectus agentium & patientium omninò requiratur. Speciatim unam saltem notabilem urgebo, & quæ ad præsens negotium magis facit, differentiam. Acidi peccantis enervationi dicata sunt illa omnia, sed diversimodè hoc præstant, tam respectu acidi in genere, quàm hujus aut illius in specie. In genere acida enervantur, sub rosionis actu, sed quædam cum insigni plus minus, quædam sine ulla effervescencia: & quando effervescencia contingit tumultus, acida quædam in specie insigniter, alia minus hos ipsos cient. De urinosiscu acrioribus nihil dicam, quæ sine effervescencia motu cum acidis hæud facile coeunt, celeriori quidem & breviori volatilia, vehementiori & longiori fixa, ut ex spiritus vitrioli cum spiritus  $\theta$ \*, & cum ol. tart. miscela constat. Saltem insipida consideremus. Hamatites cum acido nec vitrioli nec nitri commotionem ullam observabilem exerit, ast  $\sigma$ , ejusdem licet radicis fructus, cum iisdem validissimo impetu congregitur, idque, longè vehementius cum spiritu nitri, quàm vitrioli, adeò ut explosivo quasi impetu intensissimè cum illo ipso exastuet: id quod tamen multo remissius erit, si  $\sigma$  cum sulphure præparatus seu calcinatus recipiatur. Ut itaque crudus  $\sigma$  efficacior longe erit, vi absorptivâ, & acidi promptius alterativa, ita hic præparatus blandius, minoribusque cum turbis, sed simul debilius ac tardius idem præstabit. Bolus armena, terræque plures figillatæ absorbent acida promptè, tam vitrioli quàm nitri, & in Osa concreta, cum priori illo coalescunt, ast sine effervescencia conflictu: qui impetuosis admodum notatur. Cretæ si associantur, ut sub præparatione phosphori *Balduni* conspicuum est. C. C. crudum ebullit cum spiritu vitrioli, intensius cum spiritu nitri: intensior erit conflictus, si sine  $\Delta$  e calcinatum recipiatur, cum



cum usto verò adhuc vehementior observatur. Testæ quævis cum spiritu vitrioli, intensius adhuc cum spiritu nitri effervescunt, sed utrumque diversimodè, pro illarum varietate: & testæ quidem insigniter, sed sine strepitu, aut fumorum elevatione, ostrearum è contra intensius multo, notabili cum strepitu ac fumis, unde harum pulvis quibusdam sub nomine præcipitantis magni adhibitus fuit, qui aliis pro intermittentium fuga inservit. Coralia eodem spiritu vitrioli tractata, moderato impetu, cum illo congregiuntur, citra æstuationis aut effumationis insignioris apparentiam, unde & blandius mitiusque in nobis operari probabile est. Sabulum urinarium, calculique renales, ab ol. vitrioli ne tantillum alterantur, spiritus verò nitri solvit eosdem, nunc (pro ipsius specialis texturæ ratione) cum nunc sine effervescentiæ vestigiis, nunc in loco saltem calido, nunc etiam in frigido, nunc penitus dissolvendo, nunc in substantiam molliusculam convertendo, quæ & alia frustra à spiritu sulph. aut  $\theta$  expectantur: analogum quid in lapide ex cystifelleâ notatur, cum spiritu nitri successivè ebulliendo, non verò cum spiritu vitrioli. Sed quotidie cum talia occurrant, non est, ut prolixius diducam. Saltem in selectu absorbentium attendendum, facilius an difficilius effervescentia in nobis sint contenta p.n. vitriata, illud quo acriora, hoc quo mitiora; non secus an citius aut tardius acidum peccans infringere, quo magis vel minus effervescentiam cum eodem excitare conveniat, quo talium sub respectu circumstantiarum, appropriata magis seligere queamus. Quin etiam, uti acidi sapes sub morbofo statu variant, ita & absorbentia quædam iisdem corrigendis aptiora existere, evidens est, unde artificiali stochasmo ut specialem illorum differentiam subinde scrutari necesse habet Medicus, ita & horum selectum debitum instituere.

S. 17. II. Propter speciales proprietates, quibus præter generalem corrigendi acidi morbofi usum, ulterius prædita sunt. Salia enim volat, præterea vim diaphoreticam, fixa diureticam, terræ minerales insigniter adstrictoriam, obtinent. Viscum Corylinium vim antiepilepticam, cortex fraxini diureticam, Winteranus antiscorbuticam, cinamomi (post destillatum ol.) contra fluores alvi, cort. avellanarum, contra fluorem album, ossa sepia contra gonorrhœam, medulla saxorum, contra stranguriam, osteocolla ossium agglutinativam, Lap. & vulnerariam, Densapri, aut Ceti Narhual, aliàs unicornu marinum, antipleuriticam, & contra quasvis inflammationes partium internarum erysipelaceas, Cran. hum. violenter interreniti, antiepilepticam, & alia anticachecticam, Zialia ac Hna, antihecticam &c. præterea speciatim exerunt. Talia ob id seligantur ubique, quæ præter generalem invertendi usum, specifica simul proprietate, aut affectui speciali appropriata, aut symptomati urgenti convenientia existunt. Sic enim variolis,



cum diarrhœa symptomaticâ complicatis, Terræ minerales, cum Epilepsiâ affligentibus salia vol. &c. appropriata magis existunt. *III. Propter texturas novas, quas vel sub præparatione, vel sub compositione, vel sub sui inprimis viis alteratione acquirunt, ratione quarum, qualitativis & proprietatibus à nativis plus minus distinctis, his vel enervatis vel retentis instruuntur.* De Præparatione & alteratione peracida, jam supra §. 12. locutus sum, præter quam tamen & aliæ, modò insinuata circumstantiæ quoque attendendæ. Alia sanè est ratio, C. C. usti, ab eodem sine  $\Delta$  calcinato, illud potentius longè absorptivum, hinc etiam adstrictivum, præ hoc magis diaphoretico existit. Testæ concharum,  $\mathcal{S}$ , aut ovorum calcinata, à seipsis non calcinatis, quin & istis terrestrium animalium ustis, multum differunt: Calcis viv. enim texturam exhibent, unde & recenter parata effervescunt  $\nabla$  æ attactu; acido smarini, in ostracodermis, aut arenarum silicumve deglutitorum, in ovorum testis,  $\Delta$  ope resoluta, & cum particulis terrestribus laxius nonnihil sociata, per  $\nabla$  additionem resoluta. Sanè potentius longè effervescere, & promptius absorbere acida observantur, præ illis non calcinatis, idque eò magis, quo diutius calcinationis  $\Delta$  i expositæ fuerint. Febrifuga in specie sunt talia, quæ citra calcinat: cum spiritu  $\theta$  composita, falso sub sapore, egregia sunt diuretica. Quam vim, uti sub texturæ mutatione cum spiritu  $\theta$ , quæ ad alcalium fixorum naturam propius accedere videntur, inprimis acquirunt, ita si eadem cruda saltem pulverisata propinentur, prout cum acido primarum viarum, magis vel minus acri &c. in saporem plus minus salum coalescunt, etiam unâ plus minus absterfiva ac diuretica evadent. Terra sigill. & cretaceæ, quo potentius sibi occurrens invenient acidum, eo Olam magis acquirunt texturam eoque potentius adstrictoriam.  $\sigma$  prout magis vel minus sub præparatione multiplici acidis saturatus fuerit, eò facilius aut difficilius hypochondriacorum & cachecticorum acida corrigit: sicutis ipse, pro acidi, quod sibi obviam venerit, varietate, sub hujus alteratione, vim nunc hæmorrhoidalium affectuum curativam, nunc mens. suppressorum aperitivam, nunc eorundem nimis fluentium restrictivam, acquirit, etiam si unum idemque ex eo adhibitum fuerit remedium. Antihecticum Poterii, prout sub præparatione ejus. sulph.  $\mathcal{Z}$  is externum, vel certa enchirisi separatum, vel communi more relictum fuerit, unde color ejus subcœruleus, hic simul vim laxativam, interdum emeticam, ibi verò diaphoreticam saltem exhibet. Absumpto scil. sulphure  $\mathcal{Z}$  is externo per deflagrationem, sub legitima præparatione, calx  $\mathcal{Q}$  ialis maximam partem, sive alcalinæ profapiæ, exhausta quasi aut vacua remanet, promptè acidi vitiosi Hecticarum & continuarum acutarum absorptiva, ut peregrini hujus accessu, defectus



fectus acidi sulphurei, quod sub præparatione perdiderat, utcunque restau-  
retur.  $\odot$  crudum, acidi intensioris melancholico-hypochondriaci absorpti-  
vum est & correctivum, vid. *Moghni Vellus aureum* p. 8. & 9. quod cum  
salibus compositum, respectu  $\Delta$ , vim novam fulminantem, resp. ctu cor-  
poris, vim potenter resolutivam, abstersivam & laxativam, & in infantibus  
peculiariter antiepilepticam acquirit.  $\text{Ca}$  magisterium, artificiosè paratum,  
uti acidi melancholico maniaci, speciale correctivum suggerit, unde & ex  
effectu, quibusdam das *Marren-Pulver* / appellatum est, ita eadem  $\text{Ca}$   
cum acido nitr. imprægnata, interne potens hydragogum, externe pene-  
trans elcharoticum exhibet. Sub selectu adeoq; absorbentium horum, præ-  
ter nativas facultates & ad adscitias, sub præparatione & compositione,  
aut in primis viis alteratione oriundas, plus minus statui ægro accommoda-  
tas, respectus sedulo habendus est.

§. 18. Ægium quod spectat, hujus consideratione selectus inter re- Vel respe-  
media absorbentia accuratius instituendus pariter, triplici ex fundamento: ctu Ægri.

I.) *Propter individuorum ægotantium varietatem.* Dum non hominem  
in genere, sed hunc vel istum in specie tractandum habeat Medicus, ad  
*Τεκμαρσι* in curationibus quibusvis descendat, vel *Hippocrate* monitore.  
In omni verò subjecto tali, præter generales, quoad temperamenta, ætates,  
sexus &c. rationes, specialis cujusvis individui *Idiosyncrasia* vel maxime at-  
tendenda venit, sive eadem nativa, sive adventitia fuerit, sive in spiritu insito  
aut influo, sive humorum corporis speciali Crasi, sive partium solidarum  
differenti texturâ radicata existat. Nam hujus ratione, ut ad diversas ægri-  
tudines plus minus declinat ager, ita etiam remedia, quædam plus, quæ-  
dam minus appropriata existunt. Sunt qui saccharum  $\text{H}$  ni admodum  
horrent, aliis nil inde sentientibus. Mulierem novi, quæ liquorem  $\odot$   
non bene ferre porest, Tincturâ vitrioli  $\odot$  Zvvölferi, aut solut.  $\odot$  cum succ.  
pom. ipsiatica, idque ut suspicor, ob delicatam magis fibrarum ventricu-  
li texturam, earundemque exquisitam sensilitatem. Sed cum frequentissi-  
ma sunt similia Idiosyncrasias exempla, ob id non nisi ista adhibeantur ab-  
sorbentia, quæ individuo ægro, ut tali conveniunt, & speciatim Idiosyn-  
crasie ratione, ipsi non contrariantur. II.) *Propter acidi peccantis distin-*  
*ctas proprietates:* quod uti in artificialibus, v. g. sub præcipitationis nego-  
gotio, pro sui varietate, subindè aliis magis appropriatis alcalibus, aut his  
cognatis absorbentibus saturandum venit, ita etiam in therapeuticis, aliis  
atque aliis subindè corrigendum venit invertentibus. Quo magis enim ap-  
propriatum saporis acido saturando fuerit auxilium, eo perfectius illud  
extinguitur & tutius citra vel recidivam, vel alius affectus epigenesiam  
curabitur morbus: uti enim mechanica ex figuratione, spiritus vitrioli à

θ. rar-



tartari exactius saturatur, quam à  $\odot$ , &  $\nabla$ . fort. à  $\Phi$  quam à  $\mathcal{C}$ , ita & sub-  
 ordinatio talis saturantium, respectu acidorum diversorum in contentorum  
 statu morbofo, omnino locum habet. Nunc enim acrius existit idem, nunc  
 mitius: illud quale in scorbuticis, ac quamplurimis hypochondriacis, for-  
 tioribus absorbentibus, in specie metallicis enervandum, huic quale in vul-  
 nere, vel stranguria, Lapillis Drum sufficientibus. Molestiam pluribus  
 creant salia urinosa tam fixa quam volatilia, in quibus scilicet acrius luxuriat  
 acidum, idque ob effervescentiæ motum, quibus insipida & terrea magis  
 appropriata existunt. Fixius quorundam observatur acidum, in alio, quod  
 volatilius; Tertianarum fermentum acidum, præ ardentium continuarum  
 fixius est, volatilius verò præ illo quartanarum; cujus mutati status respec-  
 tu, non rarum, permutari invicem has febres, adeò, ut quæ continua fue-  
 rit, in tertianam intermittentem mutetur & contra, prout tertianæ in quar-  
 tanam, & contra, vel sponte æquinoctiorum sub mutationibus, & hinc  
 contentorum fluidorum, mediante aëre inspirato, ad majorem vel minorem  
 resolubilitatem & volatilitatem dispositione, degenerare solent. Unde ab-  
 sorbentia nunc fixiora, nunc volatiliora, & hæc nunc macra, nunc oleosa  
 conducibiliora. Gialia scil. fixa, in ardentibus potius conducunt, quam  
 quartanis, & in his spiritus  $\theta$ \*ci aromaticus potius, simplici pro tertiana  
 sufficiente. Ante omnia autem specificus acidi peccantis sapor, & inde de-  
 terminatæ dependentes, determinatarum quoque partium læsiones, accura-  
 tè considerandus. Aliud enim acidum vexat hypochondriacos melanco-  
 licos, aliud Ictericos, aliud variolis vel morbillis correptos, aliud pleuriticos  
 & hepatiticos, aliud podagricos, aliud gonorrhœa affectos, idque distin-  
 ctum in benignâ, ab illo in malignâ, & sic tantum non in infinitum. Hisce  
 ergo specificis saporibus, appropriata, superius insinuata opponenda reme-  
 dia, utut à priori, non secus ac saporum vel fermentorum morbosorum na-  
 tura, imperscrutabilia, adeoque à posteriori, per experientiam saltem com-  
 prehensibilia. III.) *Propter affectuum p. n. in agris multipliciter*: quæ  
 sive connexi sive separati existant, selectum absorbentium ita determinat,  
 ut nonnisi talia, quæ nocere non possunt, respectu juncti affectus alterius  
 p. n. adhibeantur. Saccharum Hni, & super ejus basi constructa Tinctu-  
 ra antiphthifica it. Liquor alterans ex Oe, sudoribus nocturnis plus minus  
 colliquativis, tam post febres diuturnas; quam scorbuticorum aut phthi-  
 sicorum optimè profunt, sed iis vix adhibentur tutò, qui siccioris sunt alvi,  
 seu hujus obstructionibus obnoxii, hanc enim constipant, propterea in  
 diarrhœis colliquativis, ut & dysenteriis proficua existunt. Gialia Cache-  
 cticis, Ictericis, & inde Hydropicis sunt optima, non tamen quibusvis, quin  
 noceant siccioris, & (apparenter) calidioris qui sunt constitutionis, vel quo-  
 rum



rum hepar aut lien, aliavè abdominis viscera infarcta, ad scirrhosam constitutionem degenerant. ut jam supra ex *Tachenii Clave* p. 181. & 192. indicavimus; sed illis saltem profunt, qui magnos lienes, & si non  $\nabla$ , saltem *amurcâ sanguineâ nigricante tumidos ac turgidos habent*, ut dicit *Borrichius: Hermet. Egypt. Sapient. p. 303.*  $\theta$  volat. & spiritus urinosi multi usui sunt saturativi, plurimis in affectibus, speciatim hysterice dictis, nominetenus spiritus  $\theta$  simplex aut aromaticus aut Liqueor C. C. succin. qui tamen nimio mensium fluxui obnoxii, non absque mali hujus irritatione, aut gravidis, vix absque abortus periculo, propinantur. Sicuti idem spiritus  $\theta$ , qui debilioribus sunt oculis, interno usu inimicus ferè videtur, sensibilibiter eosdem lædendo, quod plus una vice observasse me, visus sum, de quo tamen uberior consulenda experientia. Eadem  $\theta$ ia volatilia, primum uti ducunt in febrium malignarum curâ, tamen sub hæmorrhagiâ, faciliè inde concitandæ metu, ut benemonet *Borrichius. Vol. IV. Act. Med. Hafn. p. 166.* prudenter propinanda sunt. Recordor juvenis, generosi spiritus, splenetici tamen, & hæmorrhagiâ habituali, subinde enormi, præsertim Vini sub usu, obnoxius, qui uti  $\theta$ ialibus ab iisdem præservatur, in specieliquore  $\theta$  Ori, ita spiritus  $\theta$  usu, eadem provocantur. Hypochondriacorum vaga, præsertim quæ abdomen affligunt. pathemata, absorbentibus pluribus, in specie marinis, animalium partibus duris, it.  $\theta$ ibus alcalifatis sopiuntur, cavendo ab istis, quæ adstringendi vim vel habent, vel facile acquirunt, ut terris mineralibus, quo magis enim talium clauditur alv<sup>o</sup>, eò deterius affliguntur hypochondria, aliæque per consensum partes. Talia adeoque eligantur ubiq; præcipitantia, quæ ab aliis simul permittuntur indicantibus, ne tantum ex una parte noceamus, quantum possumus ex alterâ.

§. 19. Pergendum ulterius, & notandum pariter IV. quod, in exhibitione eorum, *debitus Ordo non negligendus*. Sub insigni scilicet remedium talium Varietate, uti primò selectus debitus, ita postmodum eorundem Ordo probè observandus. Hujus ratione, triplex illorum differentia inprimis notanda, dum sunt vel *temperata* sive insipida, vel *acria*, qualia sunt urinosa  $\theta$ ia, & hæc vel *fixa* vel *volatilia*. Scil. non rarum est, adeo contenta acriora acida in quibusdam ferocire, ut cum urinosi in efferatam effervescentiam, contentorum insigniter alterativam, continentium sensibilibiter irritativam, coëant. Præterea motus morbi ratio hic ante omnia habenda est, celer is ipse sit, an verò tardus, & chronicum an vero acutum sit malum, quod affligit. In *chronicis* enim præstat omnino, temperata ista insipida præmittere, quorum attactu frangantur, ut sic dicam, dentes aculeati acidi efferati, quo minori cum tumultu ab urinosi postmodum saturetur. Semper enim insipida illa sive temperata, præ acrioribus tutiora observantur, minori

Caut. IV.  
Ordo debi-  
tus obser-  
vandus.



saltem cum tumultu proficua. Sed absorpto & fixato acido, ferè aut saltem maximam partem ulteriori usu carent, dum acria sive urinoſa, præter hoc quod acidum ſaturent, in ſibi texturam cum eodem coeunt, & ita obſterſiva, reſolutiva, & diuretica ſimul evadunt. Cum etiam nunc primas vias magis occupet acidus ſapor, nunc altius intra corpus, hujusque partes tam continentes quam contentas, odor ejus penetrarit, utut ex iſta regione ferè primario ſpirans, ob id fixis præmiſſis, in primo ſui fonte corrigantur prius acida, quibus volatilia, id quod altius penetraſſet ſaturando, & diaphoreſeos beneficio eliminando, auſpicato ſubjunguntur. Sapius hoc in ægrotorum, chronicis morbis laborantium viſitatione, obſervare contingit. Haud ita pridem curæ meæ ſe obtulit mulier mediæ ætatis, hyſtericoſcorbutica, ſimulque ſplenetica, præter ſenſibilia eaque ſpaſmodica abdominis pathemata, ad melancholiam declinans, una cum menſ. ultra 3. menſes ſuppreſſione. Hæc ab exhibitio ſpiritu  $\theta \times$  p. iij. cum ſpiritus Cochlear. p. i. mirè offendeſſetur, omnibus ſymptomatis notabiliter exaſperatis: ſed ſepoſito tantisper hujus uſu, & præmiſſis abſorbentibus,  $\theta$ ialibus, Coralliatis, ſibus fixis, interpoſitis paucis laxantibus, & ſic ſaturatis ac edulcoratis acrioribus primarum viarum contentis, repetito ejusdem ſpiritus uſu, mirè recreabatur, & cum ſenſili levamine per plures dies ejusdem uſum continuabat. Quartanæ, quæ omnium Prædictorum conſenſu, in principio blandius tractandæ ſunt, niſi ſubjecta robuſtiora &  $\epsilon \nu \alpha \nu \lambda \alpha \gamma \chi \nu \alpha$  eadem corripuerint, quam facile ac inſigniter acrioribus iſtis irritatæ, multiplicato ſurore reſurgunt, de quo minus metuendum, ſi  $\theta$ ialibus (aliis ſimul, præſertim attenuantibus & incidentibus non omiſſis) amaris ſociatis intermiſſionis die ſucceſſivâ alteratione temperentur contenta acriora, quo tutius ante paroxyſmum urinoſa iſta, acriora licet, ſed etiam nunc inſipidis plus minus maritata propinentur. Scilicet *Acutus* in morbis, aut ſaltem *chronicorum gravioribus paroxyſmis*, fauſto cum ſucceſſu, inſipidis acria, item fixis volatilia ſociantur, & urgente præſertim affectu, quo plurimis indicationibus ſatiſſeri queat, junctim propinantur, idque ſpeciati in caſu, quo liberior diaphoreſis una promovenda. Hyſtericis ſanè & hypochondriacis inopinatis non rarò paroxyſmis, & quæ his propius accedunt, Colicis convulſivis, epilepticis internarum ac externarum partium convulſionibus, vagis ſcorbuticorum pathematis, & pluribus ſimilibus malis, ſpiritus  $\theta \times$  ci & quælibet ſia volatil. cum fixioribus abſorbentibus juncto opere optimè ſuccurrere ſolent. Nec inepte plures (pec ſic febrile Strobelberg. it. Coralia præparata, cum ſe abſinthii in Tertianarum cura copulant: aut huic ipſi ſi fixo, ſpiritu  $\theta \times$  ci porionis formâ, pro quibusvis intermittentibus

pro-

proſigant  
ment. ad B  
parior vi  
ſtalia, c  
& forma  
maturata  
riter obſ  
mentativ  
da corpo  
quoque,  
febres co  
lis fixoru  
tamen im  
omnino &  
tentorum  
emendan  
lixus ſim,  
Pharmac  
febr. mali  
ſ.  
rum uſu,  
ſio enim  
anima.  
ſcribitur  
ſervation  
tæ hujus  
quid, qui  
ſedulo ju  
to aut tu  
dijudican  
ſ.  
rum rer  
videtur  
abſterge  
recipien  
tate mar  
felleoru  
tis, dicat  
re ſolen



profigandis, jungunt, quam methodum & observavit Deckers in *Comment. ad Barberr. Prax. l. 3. cap. 3. pag. 113.* Saltem quod spiritus  $\times$  dosis, parciore videtur. *Continuus in benignis*, absorbentia Cervina, & figentia Gialia, cum  $\theta$  volatil. aut Cervino aut Viperino, debitâ sub proportionem & forma eleganter propinantur. Id quod in pleuritide, hepatide, & maturata operâ, in anginâ, & quibusvis comitatis sic dictis febribus pariter observari debet. *Malignas* verò quod attinet febres, quarum fermentativus odor, mole subindè minimus, adeoque insensibilis, minus fluida corporis, quam spirituosa inquinat, quo ex fundamento, contagiosa quoque, si non omnes, pleraque sanè existunt, (non secus ac ceteri extra febres contagiosi morbi) alia ferè harum est ratio, in quibus, utut & similis fixorum cum volatilibus copula, haud adeò inepta existat, volatilium tamen imprimis, idque sub principio, etiam solitariò exhibitorum, potior omninò & ratio, & operatio esse solet, id quod agendum restitit, pro contentorum, febrilibus sub turbis, plus minus vitiatorum alteratione p. n. emendandâ, fixis temperatis ferè absolventibus: de quo, ne nimis prolixus sim, conferendus multæ experientiæ, magnique Laboris *Ludovici in Pharmac. p. 237. 261. 283. 284. & de  $\theta$  vol. tartari. p. 86. it. Pauli digress. de febr. malignis &c.*

§. 20. Præter dicta, in rationali absorbentium & saturantium horum usu, sit *Cautel. V. Convenienti tempore administranda veniunt.* Occasio enim, quæ aliâs præceps, ritè observata, medicationis cujusvis est anima. Adeò & hic, in tempore venire, multum est. Triplici circumferibitur termino, præteriti, præsentis & futuri. Debitâ ex quorum observatione, legitimus agendorum ordo emanat. Quem triplicis differentia hujus respectu, Institutionistæ communiter insinuant, dum *quid ante quid, quid cum quo, quid post quid, agendum atque curandum sit*, attendere sedulò jubent. Omnia hæc primario ex motu Naturæ plus minus ordinato aut turbato, & acidi morboosi impetu, vel imminente, vel nimis urgente, dijudicanda veniunt.

§. 21. Quodsi differentia hæc temporis, & hinc administrandorum remedium occasio debita consideretur, ante omnia monendum videtur (1) *ratione temporis præteriti* quòd non, nisi præmissis primas vias abstergentibus & purificantibus usurpanda sint. Naturæ ex jussu intestina recipiendis & excernendis sordibus, tam naturaliter ex assumtis, necessitate materiæ natis, quam p. n. ex venoso genere per abusum quasi vasorum felleorum ac pancreaticorum, quin & glandularum intestinalium eò derivatis, dicata sunt: unde hæc loca nunquam colluvie, plus minus vitiosa carere solent: ut taceam, p. n. sub digestionis errato, quot vitiosa relicta in

Cautel. V.  
Convenienti  
tempore  
usurpanda.

Præmissis  
primas vias  
mundifi-  
cantibus.



ventriculo & intestinis, ipsisque mesenterii glandulis subinde stabulentur. Harum præsentia ne vel foveantur accidentaliter præsentis morbi, vel varia saltem excitentur symptomata, vel successivâ harum resolutione factâ, per vasa lactea ad interiora corporis penetrent, vel impediatur remedium absorbentium actio, id quod relicta mucosa seu pituitosa, hoc est, crudioris chyli portiones inprimis præstant, vel illa cum istis in novum concretum dictis partibus hostile, aut functiones earum impediens, coëant, propterea consultum est, ut abstergentibus & blandè istas partes irritantibus, hoc ipsa maturè expurgentur & mundificentur. Quin etiam, cum non rarò foveatur morbus à mucosâ, seu pituitâ viscidiorè, fermenti morbosum subinde subjecto, sive materia occasionalis antecedens sive productum morbosum consequens fuerit, hujus attenuationi, resolutioni, ac repetitâ evacuationi, sedulò opera danda, (sicut hoc quoad quartanas in specie urget Sylvius: l. 4. prax. Tract. 10. §. 434. 875. 877.) antequam absorbentia hæc, præsertim fixiora & minus solubilia adhibeantur, quia aliàs aut morbi, v. g. febris multiplicatio, aut inevitabilis diuturnitas, aut ejusdem major pertinacia, istis scil. cum acido absorpto & subjecto fomite viscido, in concretum magis tenax coëuntibus, ut probabil. supra §. 3. declaratum fuit. Perinde autem est, sive vomitu, ut in plerisque febribus, tam benignis quam malignis obtinet, sive secessu, negotium hoc expediatur: modo eò quò maxime vergunt, per loca convenientia ducantur evacuando, aph. 21. §. 1. sane ex cautionis hujus neglectu, quoties febres intermittentes vel multiplicantur, vel typum mutant, vel in Chronicos morbos degenerant? non secus ac continuæ acutæ in lentas abeunt &c. aut dysenteria benigna ac diarrhæa contumaciores redduntur, aut palliato licet effectu subinde crudelius recidivat &c.

Idq; ut plurimum, sed non semper.

§. 22. Ut plurimum scil. hoc ipsum observandum, siquidem in pluribus simpliciter necessarium est casibus, haud tamen universaliter, aut rigorosè nimis huic insistendum axiomati. Sæpè enim axiomatum nostrorum prætextus speciosus, ac mordicus facta observatio in præcipitiis quedam pericula agros, magno damno conjici, ut notat magnæ experientiæ Practicus Ballonius, lib. 1. observ. 30. Hinc & stultum esse axioma, præmittenda semper esse Universalia h. e. purgationes &c. V. S. nes, in morborum curationibus, asserit Lindanus super Hartman: scil. leviori in malo, v. g. ardore ventriculi, ut istorum præmissio, est supervacanea, ita è contrario graviore, vel subitaneo quodam urgente paroxysmo, suffocationis videlicet hypochondriacæ, aut concitatoris cordis palpitationis, aut enormis sanguinis bullientis profusionis, eadem foret summè periculosa, in ancipiti subinde statu versante agro. Adeoque de præservatoria potius, quam curatoria



toria indicatione, morbis habitualibus & chronicis debita methodo eradicandis, non subitaneis affectibus, aut paroxysmis compescendis, agris saltem cacochymicis plus minus, non quibusvis intelligendum venit axioma istud. Præterea duo sunt, quæ purgationes quasvis vel impediunt, vel difficiles, interdum quoque frustraneas reddunt, materiæ evacuandæ visciditas, & ejusdem acrimonia acida & pontica, quæ commota in scorbuticis, hysteris, colicis convulsivis, quartanis &c. quas non turbas subinde excitat, quibusvis si tantillum irritetur evacuantibus. In talibus adeoque ab his curationem auspicari, minus rationale foret, quin absorbentibus in genere saltem talibus præmissis, aut etiam ipsis purgantibus additis, de quo infra, tuta & jucunda magis reddenda evacuatio. Adeoque de absorbentibus fermenti special. alterativis, non materiæ evacuandæ digestivis seu præparativis, deque illis specificis magis & particularibus, minus de universalior. axioma istud explicandum.

§. 23. Præsens porrò quod attinet tempus, dum actu subministranda sunt absorbentia sive præcipitantia, circa hoc motus Naturæ, circa causæ occasionalis correctionem, quæ in fermenti vitiosè acidi contemperatione, & saturatione, fomitis verò plus minus viscidæ resolutione & attenuatione, utriusque correcti per convenientes vias exclusionem, consistit) occupatæ attendendus: ratione cujus vel continui vel intermittentes existunt morbi, ex quo emergit ista differentia, quod in istis tempora saltem morborum universalialia in his præterea uniuscujusvis insultus particularia observanda veniant. Notandum ergò: (1.) *In continuis minus in principio, sed incremento saltem. aut potius in statu locum inveniunt absorbentia ista medicamina.* Fluit hoc ipsum ex supra dictis; Dum enim fomes morbosus materialis, prius attenuandus, & resolvendus, primæq; viæ expurgandæ sunt, vix præterquam in incremento, ac statu locum habebunt. Nisi talis illorum vel selectus vel miscela instituitur, ratione cujus talia exhibeantur, quæ modo insinuatæ scopis simul plus minus interserviant, qualia vel bina, vel facilius solubilia erunt. Præterea ministras operas Naturæ benè agenti ferre debet Medicus, id quod præstat attemperando successivè acre morbosum fermentum, quo eò facilius superari morbo sub conatu à Natura ac saturari queat, id quod non nisi sub incremento, & omnium maxime in statu locum habet. Alias in principio si adhiberentur ista fermentum acre præposterè figendo & concentrando, mala, quæ supra §. 3 & 4 insinuatæ fuerunt, necessariò supervenirent. Nimium tamen Orgasmus humorum hic probè considerandus, cujus intuitu, & inde imminenti malorum, subinde etiam mox in aut post principium, morbo acuto tali celeriori motu principii & incrementi tempora absolvente, remedia talia figentia & invertentia subministranda veniunt.

In acuto-  
rum incre-  
mento &  
statu.



In Inter-  
mittentibus  
autè paro-  
xysmos.

§. 24. In Morbis verò intermittentibus, si præmissa fuerint præmittenda, adeoque status morbi fere appropinquat, attendendum periodicum an sint isti, an verò vagi. In illis enim *Periodicis*, not. (2.) ante *Paroxysmos exhibenda sunt*. Præstat enim occurrere adveniendi hosti, quam admissum demum profligare. Saturandum nempe & figendum plus minus est acidum morbosum fermentativum, quo ab impressione motuque hostili desistat mature. Antequam E. motus ejus & hinc Naturæ inchoaverit, adeoque ante Paroxysmum, auxilia ista opponenda. Frustra est, aut insufficient, quicquid in Paroxysmo his ipsis tentaveris, interdum quoque nocivum. Qui semel concitatus est spirituum motus, humorumque orgasmus, nullâ arte perfectè & subito sopiri potest, non sufficientibus tanto operi remediis, utut attemperando, & successivè saturando fermentum acre, mitiores, (sed ut plurimum simul diuturniores) paroxysmi reddi queant. Sin verò vel immoderatâ sub dosi aliorumve associatione, vi quasi organismum compescere velis, alterutrum horum expectandum erit, quod vel ex non sufficienti effectu, nimis jam progressâ humorum turgescentiâ, multiplicatura paroxysmorum insequatur, vel ex concentrato & fixato minis fermento morbofo, aut chronicum sive lentum continuum malum, aut multiplex saltem recidiva hoc ipso excitetur: quæ ex supra §. 4. dictis jam constant. Quod si vero paroxysmi nullas statas observent periodos, sed erratico ac vago motu affligant, not. (3.) ita *modificandus venit præcipitantium dictorum usus*, ut *partitis sed repetitis vicibus eadem*, sub legitimo doseos moderamine propinentur, jungendo simul. quæ blande & successivè per convenientes vias evacuent, sic enim quicquid mali metuendum foret, præcavebitur.

Ventriculo  
vacuo.

§. 25. Denique sive continuus, sive intermittens fuerit affectus, ita dirigatur eorum usus, ut, not. (4.) *saltem jejuno ventriculo ingerantur*. Adeoque nec in pastu alimentis permiscenda, nec immediate, ante autem post eundem propinanda: nisi forsan acida nimis assumpta, aut undecunque concitata sôda, interdum eorum usum, in aut post pastum urgeant. Ut enim hoc ipsum tantum non de omnibus medicamentis obtinet. iis saltem exceptis, quæ digestionis primæ, ejusque debitæ perfectionis turbatum ac p. n. vitium negotium concernunt, ita & absorbentia hæc, eò magis proficua, eò minus nociva erunt, quò magis vacuum subintrabunt ventriculum. Potentius sic attemperare & absorbere acidum valent, minus verò turbabunt digestionem primam, adeoque minus metuenda erunt ista mala, quæ circa chylicationem supra §. 3. eorum abusum insequi diximus, & ex iisdem, alimentis permistis multò magis pertimescenda forent.



§. 26. Futuro denique in tempore & post eorum usum, ita porro dirigenda medendi methodus, ut *blanda purgantia & primas vias abstergentia subjungantur*. Idque speciatim si fixiora, ac minus resolubilia, adstringentia item, vel in se talia, vel quæ in corpore, ex texturæ mutatione talia evadunt, usurpata fuerint. Ea siquidem horum est conditio, ut plus minus saturata circa primas vias, nunc in peristromate ventriculi & intestinorum mucoso, nunc plicis & cellulis eorundem delitescant, idque subinde satis pertinaciter, forsitan per ductus Lacteos primi generis penetrando, in glandulis mesenterii infixæ hæreant. Recordor hac occasione mulieris annose, hystericae &c. quæ acidularum Egranarum, ad nos adveniarum potu, debito sub regimine usæ fuit: quæ purgata licet sub potionis fine, nihilominus tamen, pluribus abhinc septimanis denuò evacuata, copiosas nigerrimas, adeoque & intensè tinctas dejectiones exhibuit: adeò quoque tamdiu intra primarum viarum anfractus stabulari potest. Ex ista verò in primis viis subsistentia, præter mala supra §. 3. recensita, & impedita, ac depravata chyli transcolatio & distributio, & fecum p. n. retentio metuenda erit. Quin & hoc modo tumorum ac abscessuum in mesenterio variæ species, ac inde oriundorum lentorum, ac symptomatum multiplici varietate intricatorum morborum, prima fundamenta subinde poni videntur. Sicuti etiam Colicæ convulsivæ pertinaces non minus quam crudæ es, his ipsis ex occasionibus inducuntur, non secus ac recidivis crebrioribus occasio subministratur, ut sup. §. 4. monitum. His ipsis procellis, ceu prudens Nauclerus, in tempore occurrat Medicus, & blandis laxantibus ac mediocri stimulo primas vias expurgantibus, sociatis solventibus ac abstergentibus binis vel gummosis, quicquid moris instar, dictis in locis relictum fuerit, removeat. Una ac alterâ vice institutum hoc negotium sufficit, post acutorum, remediòrum talium ministerio curationem, nominatim febrium ardentium ac similium, ut & tertianarum intermittentium. Successivis verò & partitis vicibus, sive ut vocant per epicrasin, sub chronicorum tardiori progressu, idem tentandum, adeòque absorbentibus talibus subinde interponenda, aut interdum socianda veniunt: ut in quartanis, hypochondriacis, cachecticis &c. Tutius sanè sub declinatione morborum dictorum, enervato plus minus acri acido per ista figentia, & concentrantia, instituuntur purgationes, quàm in eorundem principio, ob rationes ex §. 22. colligendas. Præstat tamen blandioribus evacuantibus, & quæ potius stimulo primas vias, quàm colliquando contenta corporis operantur, uti quævis enim copiosior ac vehementior purgatio plus nocet, quàm prodest, & imposturæ instar, activæ quidem in Medente, passivæ verò in patiente, mihi videtur: adeò *omne solutivum* (potentius paulò ac propriè

Subjun-  
gantur  
purgantia.



Cautel. VI.  
fluidis con-  
citatio mor-  
tus concili-  
andus.

proprietate) depradatur de viribus & substantia corporis nostri, ut optime docet Hippocrates. Regimen porro tale circa ægrum, ab exhibitione eorum instituendum, quo effectus eorundem promoveatur. Adeoque sit Cautel. VI. sub illorum Vsu motus concitatio contentis corporis fluidis conciliandus. Non solum scilicet in fodinâ suâ primarum viarum acidi sapes & odores p. n. delitescunt, sed etiam altius penetralia corporis subeunt, ut aliquoties jam insinuatum, & morboſi effectus variis in locis palam illud profitentur: sive ut Helmont. loquitur, *Paradox. V. §. 9. p. 554. in nobis non raro oberrat & quoddam resolutum, minerale, planè excrementitium, cartarum inquam resolutus &c.* Illud ipsum pariter per absorbentia ista plus minus saturandum venit, etiam si hæc primarum viarum tramites, fixiora scil. & minus solubilia, non transcendant. Jam verò ut totum corpus secundum Hippocratis Oraculum, sit conspirabile & perspirabile, sive immediatè, per insensiles cœcosque meatus & poros partium, prout illustratur à Tachenio: *Clav. p. 237. supra §. 3. allegato, sive mediatè, per ductus & vasa, nunc magis, nunc minus oculis patentia, mediante continuo humorum circulo, de quo supra §. 23. c. 2. adeò, ut etiam remotiori ex loco, hostilis aura acida à remedio in primis viis hærente, absorberi & corrigi queat, nihilominus, ut faciliter hoc ipsum negotium, & acceleretur confluxus hostilis acidi ad suum compar medicamentosum in primis viis, concitatio humorum motus progressivus & celerior in circulum raptus, multum omnino contribuet.* Ob id scil. tam studiosè Practici ab usu & alium motum corporis injungunt, non quidem, ut celerius sic descendant, hoc enim frustraneum foret, & absque sperato effectu, (ut congruè sub explicatione, seu usu accidentalis concedi queat) sed ut promoveatur acidi exorbitantis motus, ad appropriatum magis activitatis suæ objectum, adeoque ab eodem promptius & uberius ita absorbeat. Cum verò illum progressivum rapidiorem, intensior etiam motus intestinalis particularum fluidi heterogenei comitari ordinario soleat, quâ ratione agitatione vasorum, cerevisiæ & musti turgescientiam fermentativam, aut concussionem vasculorum, effervescencias commistorum artificiales augeri insigniter observamus, ob id sub isto rapidiori humorum circulo, dum acido peregrino, texturam ac motum intestinum plus minus vitiantem liberantur illi ipsi, simul sub ista celeriori commotione intestinâ in novam texturam eò facilius se component, & ad naturalem eucrasiam se ipsos, secundum syncriseos, & diacriseos & metastaseos minimorum leges restituunt. Adeò & quidem secundario, intestini hujus motus ratione, & ejus medio redindegrandæ texturæ ac Craseos humorum causâ, post absorbentium usum,



usum, motus illorum concitator progressivus, quovis modo adjuvandus veniet.

§. 28. Motum hunc humorum progressivum, circularem, duo- Quot & bus modis accelerari licet, primo quidem beneficio motus naturalis artuum, quibus & hinc totius corporis localis, deinde citra hunc, beneficio artificialis su- modis, doris, aut madoris saltem sensilioris provocationis. Utroque in casu rapidior per vasa imperus contentorum, & concitator progressio omninò contingere solet, ex causis vel sponte patentibus. Ille quidem ægris paulò vegetioribus, adeoque chronicis ferè in malis, & quamdiu Orthostadia in iis locum habet, magis convenit. Hic vero in acutis, chronicorum item gravioribus paroxysmis, dum lecto surgere vel nequeunt ægri, vel minus consultum hoc ipsum videtur, magis obtinet. Utrumque uti in fixioribus & minus solubilibus absorbentibus utile admodum, subinde necessarium quoque existit, ita posterior modus in solubiliorum, ac inprimis volatiliū, vel solitariā vel fixis sociatā (secundum dicta §. 19.) exhibitione, summe proficiuus existit. Excernitur autem hoc ipso simul, quicquid motus intestini aucti & restauratæ plus minus texturæ naturalis humorum beneficio, ceu heterogeneum secretum fuerit, & depuratio quorumvis humorum vitiatorum, attenuatio eorum, quavis ratione condensatorum, & celerior progressio, quovis ex impedimento nonnihil stagnantium, hoc ipso obtinebitur. Patet ex his, quare ordinario post quæcunque febrifuga, fixa inprimis Terrea, sudoris excitandum esse profluvium, tam sedulò inculcent Practici, præsertim si fieri potest, eo tempore, quo aliàs recrudescere solet Paroxysmus, cum sic certiori planè juvamine propinentur eadem, ac minori cum recidivæ metu, quam si vel nullus sudor superveniat, vel hic ad paroxysmi finem saltem expectetur.

§. 29. Haud postremum punctum rationalis absorbentia admini- Caut. ult. strandi methodi fert, concinna eorum cum aliis copulatio. Adeòque fit Aliis reme- Cautel. VII. ne saltum solitaria, sed etiam aliis sociata remediis propinentur. diis socian- Utrumque exhibendi modum & ratio primitus docuit, & experientia post- da, modum confirmavit. Indicationes prout variant, causarum p. n. & symptomatum ex varietate & complicatione, componenda etiam cum aliis, vel sola exhibenda absorbentia hæc, ostendunt. Utut autem larga seges aliorum sit auxiliorum pharmaceuticorum, quibus misceri commodè possunt, speciatim tamen ad quatuor classes commodè redigi possunt, purgantium scil. diaphoreticorum, anodynorum, & appropriatorum.

§. 30. Purgantibus commodè sociantur, ubi acriora fluida moventur Purganti- da veniunt, quo temperata horum & inversa corrosivitate, citra gravio- bus. rum



rum symptomatum syndromen, jucundius & tutius evacuatio succedat, sicuti eundem in finem & præmitti interdum iisdem, supra §. 22. insinuavimus. De sennæ & tartari sociatæ infuso laxativo polychresto, jam supra §. 12. locuti sumus. Speciatim huc exempli loco, pertinet famosus iste *Cerberus triplex à Cornachino* adedò peculiari scripto decantatus, alias *pulvis febrifugus Comitis Dudlei de Warwick Angli dictus*: à *Spigelio de semiteriana*, l. 3. c. 8. & *Kergero, de fermentat. s. 3. cap. 3. p. 250.* laudatus. Remedium profectò polychreston, præsertim, si scammon. sulph. loco, ejusdem resinam recipias, ut rectè hoc urget *Maxwellus, in Medicin. Magnet. l. 2. c. 2. p. 68.* idque propter vim aromatico-alterativam, solutivæ sociatam, nec acido sulph. fumo castratam vel inversam. Sicuti etiam præ §. diaphor. simplici, & diaphor. oriale, ceu præstantius absorptivum, isti addendum, sive §. istud cachecticum *Ludovici*, prout tam in *Pharmacîa*, p. 330. quàm *Miscell. Acad. Nat. Curios. anno 8. p. 108.* autor ipse parare illud docet. Pertinet huc pulvis iste multi usus, quibusdam in secretis habitus, qui fit ex §. nitr. ana. libr. β. or. §j. invicem detonatis, & hinc cum triplo nitr. calcinatis, & hinc edulcoratis. Habebitur sic pulvis flavus, qui cum ana resin scammon. mistus, vel illius p. ij. cum hujus p. j. paucis crem. tartari gran. additis, suggerit polychrestum remedium, ad quasvis febres intermittentes, continuas, pleuritidem, obstruct. Mensium, choleram &c. dos. §j. ad ʒβ. propinandum, & cuiusvis ætati tutò, limitando saltem dosin, porrigendum. Placet de cætero ista methodus, quâ in intermittentium paroxysmis solutiva blanda febrifugis connectimus, ut juncta operâ, dum Natura movet, & Medicus moveat, idque præsertim viribus utcunque constantibus. Quibus paulò de bilioribus existentibus, præmittantur ita laxativa Paroxysmo, quo maturè ante hujus invasionem suo fungantur munere, pro specificis tempestivè propinandis. De cætero, quam fausto radio & recreet hypochondriacos & scorbuticos, ac cachecticos, laxativis sociatus, tot pilulæ hypochondriacæ, aperitivæ, cachecticæ, electuaria chalybeata laxativa, Vina orialia solutiva, malè à *Geigero in Microcosmo Hypochondr. cap. 23. p. 294.* rejecta, apertè loquuntur. Omnium loco sufficiat vitriolum or ad albed. calcinat. gum. ammoniaco cum debito stimulo solutivo sociatum & Pilularum in formam redactum, ad imitationem formularum à *Sylvio in lib. 1. Prax. passim præscriptarum*; vel si Mass. Pilul. de tribus Ruffi, extr. helleb. nigr. sã. ʒβ. vitrioli or ad albed. calcin. gr. V. cum essent. gum. ammoniac. in Pilulas redigantur & ita propinentur. Pertinet huc pariter ☉ fulminans, concretum mirabile, ex ☉ per §. depurato, cum spiritu ʒ\* præcipitato, paratum: vi incisivâ, & viscidissimorum resolutivâ, ac absteriva, simulque singulariter laxativa instructum. Hoc in infantibus Unicorni verò sociatum, in Epi-

Epileptici  
laudatissim  
hinc ætati  
latum, gr  
merito al  
veteratur  
fuerit.  
ebori fin  
est. N  
quasi int  
inprimis  
num dup  
scammon  
vis, inter  
mis vis d  
enervabit  
idque tut  
§.  
ex rationi  
tia hæc, n  
terrea, q  
bilior ver  
volatilibu  
tum. I  
admiscent  
rentia: au  
tium sive  
supra §. 1  
aromatic  
maximè  
resinam  
ol. destil  
quasi ter  
ubivis ja  
spiritu v  
unitus,  
maligna  
invertem  
rigore m



Epilepticis eorum insultibus, convulsivis torminibus, similibusque malis laudatissimum remedium existit, accuratâ tamen dosi, pro lactationis, & hinc ætatis ratione exhibendum. In Adultis pariter Coralis præp. copulatum, gr. vi. ad ix. pondere, in quartanis egregium est remedium, non immerito ab *Hosero in Hercul. Medic. l. 6. p. 292.* laudatum: modò non inveteratum nimis fuerit malum, nec ipse æger robustæ adeò constitutionis fuerit. Non secus, ac in intermittentium recidivis, arcano duplicato & ebori sine  $\Delta$  additum, ante paroxysmum circumspecto usu, planè egregium est. Nam convenientissimè absorbentibus cum laxantibus mistis, simul quasi intertextuntur vel attenuantia, v. g. gumm. ammoniac. in pilulari imprimis formâ, vel abstergentia & resolventia  $\theta$ ina, ut tart. vitriolat. arcanum duplic. &c. v. g. arcani dupl. Corall. rubr. præp.  $\alpha\alpha$ .  $\theta\beta$ . ad gr. xv. scammom. more Brendelii præpar. gr. ij. ad iij. M. Sic enim absorbentis vis, interdum nonnihil adstrictoria, sive formaliter eam obtineat, sive imprimis viis demum ex alteratione passiva acquirat, vim solutivam additi minus enervabit, hoc ipsum verò sub minori dosi, illorum adjumento sufficienter, idque tutius ac jucundius quod suum est, perficiet.

§. 31. Cum sudoriferis imprimis salubrem ægris societatem ineunt, Sudoriferis. ex rationibus jam supra §. 27. & 28. insinuat. Sunt equidem absorbentia hæc, maximam quoque partem sudorifera, tam privativè, ut insipida ac terrea, quàm positivè, ut  $\theta$ ina urinosa fixa; ac imprimis volatilia. Laudabilior verò effectus ferè observatur, si privativa ista, positivis, præsertim volatilibus sudoriferis copulentur, uti & supra §. 19. quatenus indicatum. Duplex autem volatiliium sudoriferorum, absorbentibus commodè admiscendorum, materialem quoad eorum texturam, observatur differentia: aut volatil.  $\theta$ ina sive urinosa macra existunt, quæ & ipsa ad saturantium sive præcipitantium aliàs dictorum, classem pertinent, ut modò, ac supra §. 14. c. 1. dictum fuit, aut volatilia oleosa sive sulphurea; ut amara & aromatica, hisque plus minus cognata, (quorum farrago in Theriacalibus maximè conspicua est compositionibus) & pro basi virtutis sudoriferæ refinam plus minus acrem, libero in  $\Delta$ e inflammabilem, in clauso vero in ol. destillabilem, ferè obtinent: ex quorum duorum artificiali connubio, quasi tertium compositum, spirituum aut  $\theta$ ium volat. oleosorum nomine, ubivis jam cognitum emergit, quale v. g. exhibet spiritus theriacal. cum spiritu vel  $\theta$  volat. C. C. aut viperarum debita proportionem & destillatione unitus, ac camphoræ s. q. imprægnatus, potentissimum sudoriferum, malignarum febrium nobile auxilium. Quibusvis horum absorbentia & invertentia fixa commodè sociari possunt: ut quando in Tertianis graviore rigore molestis, cum successu ordinatur, Rec. Theriac,  $\theta$ ij. ad  $\zeta$ j. specif.



Strobelberg. ʒß. ol. destill. caryophyll. gutt. ij. M. F. Bolus, fortiter sudorem movens: aut quando pleuriticis proficua admodum existit Mistura, ex ▽ papav. rhead. ʒiij. spiritus theriac. camph. ʒiij. Mandibul. Luc. pisc. ʒj. θ volar. cujusvis: gr. xv. ad ʒj. Laud. tartarif. gr. iij. syr. papav. rhead. ʒj. M. sicuti etiam nobile illud balsamum Loimicum Hlenisianum, unicornu vero & bezoardico minerali, aut hujus loco Cinnabari ʒ, vel nativ. select. feliciter jungitur; in malignarum febrium medelâ. Cum vero insignis sudorifera hæc inter volatilia sit differentia, selectus rationem determinabit status ægri, & symptomatum conditio, in specie major vel minor sanguinis commotio & æstuatio: Hæc enim aut imminuenda, & plus minus temperanda, aut excitanda & augenda venit; illud in nimia spirituum, & particularum sanguinis oleosarum (in recessu, ut probabiliter statuitur, acidarum) volatilium turgescencia, & fermentativa quasi ebullitione, hoc verò in deficiente tali spiritu impetu, & fermentativa commotione. Utroque ergo in statu, cum nulla heterogenei aut vitiosi fermenti, ab homogenea humorum texturâ secretio, nec prævia ejus correctio aut saturatio fieri queat, ob id arte subinde eadem moderanda venit. Infringunt autem æstuationem sanguinis nimiam, sudorifera inter volatilia, omnium optime urinosa macra, quæ sane sensibilibus febrientium æstum compescunt, adeo, ut experientia teste, pro tertianarum v. g. nimio ardore compescendo, spiritus θ\* simplex in ipso paroxysmo subinde usurpatus, sit perquam proficuus. Intendunt e contra ardores, volat. oleosa, quovis tempore usurpata, sicuti eadem ex absinthio, cent. min. gentianâ, piperibus, ante intermittentium paroxysmos, debito cum regimine adhibita, horrores & frigoris mitigationem, ardoris intensiorem ordinario efficiunt. Cum itaque intendendus subinde veniat sanguinis æstus, ut in Cachecticis pituitosis, hisque cognatis, pro crudioris chyli correctione, bilis verò interioris acuatione, item in petechialibus, præ aliis malignis, ut plurimum minori æstu comitatis, adeoque respective quasi lentis, pro fermenti maligni, hujusque corruptivâ operatione geniti producti morborum evacuatione, hic quidem alexipharmacis fixis, it. sibus volatilibus, diaphoretica oleosa optime permiscuntur, ibi verò præmissis ut plurimum absorbentibus & ialibus, illa optimo cum consilio subjunguntur, interdum etiam permiscuntur; quâ ratione aliquando in quartana Tincturæ vitrioli & Zvvel. ʒj. cum Elix. febril. D. Mich. ʒß. permissionem ante paroxysmum proficuum observavi: uti eadem cum essentis aromaticis amaris, quibus vel defectuosè vel laboriose fluunt menses, sociata, optime propinantur.

Anodynis.

§. 32. Anodynis denique jungenda veniunt hæc nostra absorbentia, sive ex minerali, quæ rariora, sive ex vegetabili, quæ frequentiora, d. sumantur



mantur regno. Urgent scilicet interdum adeo symptomata quædam, ut aut vitæ, nunc immediate, ut hæmorrhagia aut cholera effrenis, nunc mediate, ut dolores atrociore, periculum intendant, aut saltem morbum primarium insigniter exasperent, ut dolor in pleuritide ophthalmia, quibusvis inflammationibus, aut ejus curam periculose impediunt, ut in ardentibus acutis, it. variolis &c. coctionis scilicet negotium, cui unice incumbit Natura perturbando. Cunctatio omnis in his funesta. Absorbentia itaque & figentia qualibet, cum nonnisi debita interjecta temporis mora, effectus intentus insequi soleat, anodynis socianda, quo ab his spirituum perverso refrænato impetu, à quo omnia symptomata urgentiora dependent, & suspenso hoc ipso aliquandiu nato inde paroxysmo, illorum ope, occasionalis tantarum procellarum materialis causa inverti & alterari queat. Modificando nempe spirituum impetum, & diaphoresin liberiores, etiam læpius sensiliores reddendo, in quo omnia anodyna, tam vegetabilia quam mineralia conspirant, quorumvis symptomatum urgentium (soporosis forsan, idque saltem in tantum, non in totum exceptis) panaceæ existunt, & ita propriè sic dictæ, sobrieque explicatæ Panaceæ & universalis remedii ideam quasi repræsentant, & possibilitatem suo modo confirmant. In cholera, dysenteria, scorbuticorum vomitibus enormibus, hypochondriacis suffocationibus, catharralibus repentinis faucium ac asperæ arteriæ affectibus, catarrhis suffocativis vulgo dictis, convulsivis quibusvis paroxysmis, pleuritide atrociori & pluribus aliis vel gravioribus vel subitaneis pathematibus, tantum non semper istorum, Opiatorum quidem usitatissimè, sociatam invertentibus & figentibus opem imploramus. Sicuti verò, quo generosius seu efficacius est remedium, legitimo usu, eò periculosius & gravius quoque nocere solet perverso abusu, cum vel *Galeno* assertore, nil magnificè profit, quod non multum nocere etiam queat, ob id & anodynorum, speciatim opiatorum, de quibus ceu usitatoribus inprimis loquuntur, cautus sit & circumspèctus cum istis congressus. Sistendo enim hæc ipsa spirituum impetum, contentorum quorumvis motum simul plus minus imminuunt, adeoque materiæ peccantis, sive occasionalis antecedens, sive productum morbosum consequens fuerit, alterationem & remotionem hoc ipso sufflaminant, eamque immobiliorem reddendo, simul quasi figunt. Propterea sub mutuâ societate, volatilibus tutius quam fixis, & hæc inter potius binis quam terreis copulantur. Illorum enim sub consortio diaphoresin ferè copiosiores reddunt, & fluidorum motus minus refrenant. Hinc enim Essent. Opii tartarifata, Liquori C. C. succinato aut spiritui  $\theta$  anisato maritata, multum in effectuum catharralium cura præstant, non secus ac Colicis in convulsivis, &



huic cognatis hypochondriacis suffocationibus, eadem mistura, aut huic analoga ex spiritu  $\theta \times$  ci, essentia castorei & opii, debito in vehiculo dilutis, potiuncula, utramque absolvit paginam. Sicuti & spiritus iste  $\theta$ uo-volat. oleosus, supra §. 31. ad febres malignas laudatus, eidem Essentiaë auspiciò jungi potest. Sinis fixis commodè etiam jungi potest laudatum Opium, cum vim horum absterisivam ac diureticam, saturativam junctam, minus inhibeat. Fixis denique insipidis aut terreis pariter subinde jungitur, tamen ob nimiam hinc metuendam fixationem & concentrationem acidi morbo- si, ac materiae peccantis pertinaciorem immobilitatem, paulò circumspicius idem faciendum. Hinc patet ulterius, non nisi urgente malo gravius, aut graviore adhuc imminente, ibi curationis, hic præservationis gratia commercium tale instituendum, quo prima in herbâ suffocentur, ut sic dicam, tribuli ac spinæ morbosæ. Speciatim in Acutis, atrocioribus symptomaticis comitatis, sed saltem sub incremento morbi, dum turbantur subinde præposterè ordinarii naturæ motus, ob materiae orgasmum, conveniunt, quâ ratione bezoardico minerali, Unicornu fossili & similibus pulveribus bezoardicis compositis, cum vel sine Cinnabari, extractum theriacale, aut theriaca cœlestis Greiffii, aut Laudan. Opiat. commodissimè, e.g. in variolis malignis, aut purpuratis &c. sociantur. In Chronicis verò affectibus, saltem in gravioribus eorum paroxysmis, tanquam tot parvis morbis acutis, sub lento illorum motu intercurrentibus, locum inveniunt, idq; imminente potius paroxysmo, adeoque præservationis gratia: similibus ferè ex rationibus, quæ supra §. 24. allegatæ fuerunt.

Sed ritè  
correctis.

§. 33. Observatis hisce, jucundissimus anodynorum quorumvis, speciatim Opiatorum, cum absorbentibus, & saporum ac odorum acidorum alterativis est concursus, modo hæc debitâ correctione, vi narcoticâ plus minus exuta, nobisque sic amica magis reddita fuerint. In quem finem pro acutis quidem, cum  $\dagger \Omega$ , extrahendo, in chronicis ac aliis quibusvis, cum alcalisato tartari digerendo, commodissimè præparantur. Cum verò præstet, catholicum magis ex Opio semper in promptu habere præparatum, quo tanquam unicâ fideiâ, omnes dealbari queant parietes, hoc ipsum  
 (( optimè obtinebitur, si Opii &  $\theta$  tartariana, cum  $\dagger$  q.  $\nabla$  comm. irroratis, ad  
 (( pultis liquidioris consistentiam, blandoque digestionis calori aliquandiu ex-  
 (( positus, pro concreti, gummeo resinosi meliori penetratione, & dissolutio-  
 (( ne, affundatur successively & suspensa manu  $\dagger \Omega$ , fiet sic ebullitio cum forma-  
 (( li quasi fermentatione, continuetur hæc affusio, ad punctum saturationis  
 (( usque, denuoq; aliquandiu digestionis leni exposita, filtrentur, & phlegma-  
 (( tis exhalatione inspissentur, cum spiritu Vini per se rectificato extrahen-  
 (( da, & ad debitam vel fluidæ essentiaë, vel spissioris extracti consistentiam  
 redi-



redigenda. Habebitur hoc modo anodynum vegetabile, ut mihi quidem, ob rationes hic speciatim haud recensendas, videtur, correctissimum, adeoque tutissimum, quibusvis in casibus adhibendum. Simplici labore, magnoque temporis compendio obtinetur hoc modo, quod per tædiosam cum succis vegetabilium, & quidem horum potius, quam additi, sed non soluti Opii, fermentationem vix acquiritur. Remedium est, promte in quovis corporis nostri fluido solubile, adeoque ipsi facillane commiscibile, & hinc latissime diffusibile, citra diuturnam inprimis viis moram, aut ullum ventriculi tædium. In quo haud postremum, legitimæ vegetabilium, præsertim resinoforum præparationis momentum consistere arbitror, ut reddantur contentis corporis nostri promte commiscibilia, & longe lateque in parva licet mole diffusibilia, citius sic, & ob minorem circa primas vias molestiam, quam aliàs ibidem præcipitata, sub resinosa sua & viscida textura, inferunt, *jucundum*, quin & ob parvam vel nullam, quam dictis in locis aliàs sustinent alterationem, *potentius*, & minus sensibili in partes solidas impressione vel immediatâ vel mediâtâ (intercedente alteratione fluidis inductâ) *intius* operativa existunt. Quo in negotio, alcalisata præsertim illud & tartarati principalium instrumentorum loco inserviunt.

§. 34. Ultimum locum eorum, cum quibus societatem pro felici Deniq; Appropiatis, ciori praxi amicam ineunt Invertentia nostra, obtinent *Appropriata*, in genere ita dicta. Sunt enim absorbentia hæc, maximam partem, prout supra c. 2. §. 20. & 23. dictum, generalia, & magis universalia alterantia, adeoque specialibus p. n. affectibus, haud adeo directè opposita. Utut verò partim per debitum eorum selectum, secundum §. 16. & seq. partim per sudoriferorum & anodynorum concinnam associationem, secundum §. 31. & 32. specialius determinari queant, haud adeo tamen sufficere hæc videntur, quin pro acidi specifici varietate, ejusque fomitis materialis plus minus glutinosi, distinctâ conditione, partium item vel primariò vel secundariò, unius vel plurium, solidarum vel fluidarum affectatum diversâ habitudine, & in specie humorum, unâ plus minus alteratorum, contrariâ subinde dispositione, morborum item diversorum complicatione, & symptomatum plus minus molestorum aut periculorum syndrome, his ipsis frequentissime, ceu coindicantibus, per appropriata & quasi particularia auxilia occurrendum veniat, & hæc ipsa illis absorbentibus dextrè adjungenda sint. Sed tanta cum hîc occurrat varietas, siquidem negotio huic, tota specialis Praxis innitatur, adeo ut certis regulis, ceu tot limitibus circumscribi commodè nequeat, exemplis saltem quibusdam illustrare illud, sufficiat. Dum Hypochondriaci vagâ phlogosi toties æstuant, Ebori sive  $\Delta$ , & Coraliis, nitri.



nitr. vitriolatum, aut nitr. fixatum addendum: sicut in suffocatoriis eorundem Paroxyfimis, absorbentibus tam fixis quàm volatilibus aut potius utrisque, secundum §. 19 commistis, castoreata speciatim addenda. Bezoardicis dictis pulveribus, diversarum licet compositionum, in variolis & purpuratis myrrha, in malignioribus camphora, auxiliatrices jungit copias: quibus præterea, nervoso genere gravius patiente, adeoque in convulsionibus imminentibus, Cinnabarina adjungenda, non omisis sibus volatilibus. Aperitivis, ut vocant, & anti cachecticis Virginum non menstruarum & alibus remediis, vix absque croco & Cinamomo utimur. Quæ sodæ ebullitionem figit Creta, aut C. C. ust. societate nucis moschata, hoc in affectu inprimis gaudet, idque præsentaneo magis successu, si conservæ aut syrupo summitatum sive gemmarum quercinarum in foliola se explicantium, Electuar. sub formâ permisceantur: quæ modò ex quercuum foliolis parata euporista, & dysentericorum remediis temperantibus & absorbentibus eodem modo recipiendis inserviunt. Gonorrhææ dum succurrit Os sepia, ol. destill. succini, vel bals. copayvæ societatem ambit: simili modo, ac idem ballamus aut ejus loco ol. destill. cortic. aurant. Lapid. percarum & cancris calcinatis invicem mistis, pro stranguriæ curâ additur. Febrifugis fixis quibusvis, rigore graviore sub paroxysmi initiis urgente, aromata acriora, in specie plebis istud contra intermittentes euporiston, debito usu, non rejiciendum, piper album, aut potius longum, ad plura grana, aut ejusdem vel caryophyllorum ol. destill. ad aliquot guttas, commiscetur. Lentis in febribus, præsertim aliis non benè curatis supervenientibus, Poterii antihectico, & xum consultò jungitur. Vix quoque apud nos debellare licet scorbutum melancholicum (ut cum Willisio loquar) nisi absorbentibus quibusvis, inprimis & alibus, appropriata ista, & volat. acriori & penetrante imprægnata, vel adjungas, vel præmissis subjungas, quæ tamen in eodem bilioso minus tutò, & propterea majori longe cum circumspectione administrantur, nisi cephalalgias, aut insigniores sanguinis

Orgasmos, eo ipso concitare velis. Sed ubi finis foret, ulterius si pergere vellem? Hic ergo pedem figimus  
tribuendo.



## CAPUT I. THEORETICUM.

## PUNCTUM I.

*Morsum vipera esse venenosum asserit.*

## §. I.

**P**aradoxa admodum prima fronte videtur Cornelii Celsi sententia, dum libro V. Medicinae cap. 27. expressè asserit, *omnem fera morsum habere quoddam virus*: quod effatū, licet de propriè dictis feris indomitis, iisque homini singulariter infestis intelligi possit, sicut hoc sensu illud interpretatur Sennertus lib. V. Prax. Past. IV. c. 19. Antecedentes tamen lineæ & subsequens generalis medendi methodus, ad omnia animalia, hoc assertum accommodandum suadent: Cum in primis in aliorum Autorum lectione occurrens experientia, idem satis confirmet. Notanter interim, *quoddam virus habere* ait, innuens hoc ipso varietatem graduum, dum intensius modò sit idem modò remissius, modò insignioribus comitatum sit symptomatibus modò levioribus, ita ut in genere quilibet morsus cujuscunque animalis furore tamen vel irâ concitati præter læsionem externam, veneni unâ inducat metum.

§. 2. Ast inter feras morsu venenato inquinantes, præ aliis serpentum & reptilium eminet genus, inter quæ verè primum meretur locum vipera, *animal in totum perniciosissimum & venenosum*, ut loquitur Amatus Lusitanus Cent. I. Cura I. Scholio. 10. Quod quò notius est omnibus ferè Europæis, eò vehementius lædit mordendo testantibus hoc Symptomatis, quibus catervatim stipatur hic morsus. Sed in quo venenositas hujus consistat, omninò controversum est; necesse ergò, ut de natura veneni morsusque venenati prius constet, quò eò certius de veneno viperino possit ferri iudicium.

§. 3. Venenorum essentia, si quæ alia, in toto Naturæ theatro ut maximè est obscura, ita ob id perdifficilis in Medicina eorum curatio est. Vide elegantissimum discurs. Joh. Fabri Lyncei Exposition. in nomina, & imagines animalium nova Hispania pag. 783. In primis monendum insignem vulgò hic animadverti abusum, dum quodlibet corpus naturale ejusve quædam pars, lædens quocunque modo corpus humanum, cujus læsionis ratio adeò manifesta dari non possit, aut licet reddatur, ab altero ob præconceptarum



opinionum vim, non accipiat, mox venenosum, lætioque à veneno oriunda dicitur. Sic Opium sæpius vocatur venenosum ob vim suam Narcoticam, cum tamen magni ipsius Theriacis Antidoti constituat basin, unde & Hyosciamus, Solanum, Mandragora, ipsumque salutiferum Papaver, sub venenorum vulgò rediguntur classem, cum tamen horum legitima præparatio & usus, divinas medentibus porrigat manus, & nunquam satis de prædicandam ægris ferat opem. Sic similem sortem subit ob similem vim *Datura* dicta planta, ex cuius tamen semine, quam elegantissimum Pharmacum phantasticum doctissimus elaboret *Fabritius Bartholetus*, ad quæcunque deliriorum melancholicorum inprimis genera efficacissimum, videri potest in *lib. V. Method. in dyspnœam Part. 1. cap. 1. pag. 392.* Quod ipsum medicamentum manu ferè nos ducit ad penetrandam intimius medicamentorum vim, eorundemque spiritus & archetum corporis nostri, afficiendi modum. Miror interea cur non & pares ob causas vinum inter venena relatum fuerit, postulante hoc delirio ebrioso, post nimium ejus usum, nunc melancholico, nunc Maniaco &c. pro varietate individuum inducto: Sicut ob vires hujusmodi stupefactivas, vapor ex musto fervescens exhalens venenatus dicitur, cum tamen mustum, in larga quoque copia haustum, nullas veneni inprimat notas. Solent similiter sanguis menstruus, lac in ventriculo coagulatum ob quædam symptomata, ex stomachi gravedine oriunda, Unguium segmenta, ob vim emeticam vel purgantem excedentem, cantharides ob vim suam inprimis vesicam exulcerantem &c. venenorum appellari nomine. Ut & Calx viva, item Gypsum, vitriolum assumptum, Aqua fortis, venenata dicuntur, ob repentinam suam læsionem &c. Ceterum si simili modo pergere debeat, vereor sane, ne omnia medicamenta, & alimenta ex perverso usu fiant venena, & horum usus legitimus easdem in medicamenta permutaret. Aliud namque est noxium, aliud verò venenatum.

§. 4. Venenorum interim propriè sic dictorum quod attinet naturam, ante omnia præscindendus est conceptus usurpationis, & præparationis, ab eorum interna essentia, quia sub illo respectu venena sunt non venena, hoc est legitimo usu, & commoda præparatione, abeunt in saluberrimas medicinas; propriam verò consideratam essentiam, conceptu quodam generali omnibus univocè competente exprimere, res videtur ferè impossibilis, tum ob insignem eorum varietatem, tum etiam ob unius, ejusdemque venenivariam operandi rationem. In genere tamen in hoc omnia convenire videntur, quod agant, vel ratione fermenti cujusdam peregrini. Massæ sanguineæ, tanquam Nectari vitali, omninò exotici, vel ratione speciei, seu

Idea

Idea  
procillas  
lætio à  
Quas læ  
deleteria  
à Kronl.

§.  
hendim  
rationer  
matum  
vitæ per  
tremor,  
re super  
culæ & l  
variant;  
possunt,  
tur. N  
lætio; na  
natum pl  
sistunt, it  
ubi de lig  
nisi celer  
tur, aper  
conjunct  
Alexiphar  
instituitur  
pellendo

§.  
mum ven  
dromen,  
spiculis,  
positione  
nonnum  
Et D. Pa  
hac sese  
acumen  
fero, & S.



Idea cujusdam Archæo hostilis, cum in varias agitantis perturbationum procellas, unde enormis actionum læsio, & perversio contingit: Ita ut læsio à veneno partim ad corpus, partim ad actiones ejusdem pertineat. Quas læsiones communiter, à qualitate quadam maligna & toto genere deleteria oriri ajunt, contra quos tamendisputat *Johannes Marcus Marci à Kronland in Philosoph. vet. restit. Part. IV. Sect. 3. pag. 431.*

§. 5. Hujusmodi veneni operationes & operandi modos,prehendimus inprimis in moribus venenatorum animalium, quando præter rationem partis affectæ, & læsionis continui modum, supervenit Symptomatum miserandorum, & horrendorum cohors, hinc certum imminens vitæ periculum, cum morbi acumine seu brevitate, ut sunt, totius corporis tremor, item exhorrescentiæ syncope lævissimo vulnere remota licet in parte superveniens: Sudor frigidus synopticus, corporis intumescencia, maculæ & livores hinc inde erumpentes, quæ pro varietate mordentis etiam variant: in genere tamen vulnere tali ut tali nullo modo per se cohærere possunt, sed omnino τὸ Θεῶν Hippocratis hujusmodi læsionibus inesse videtur. Non sufficit autem, ut à venenato habito vulgò animali contingat læsio; nam & venenatum citra veneni sui vim lædere, & contra non venenatum plagam venenosam infligere potest, pro alio atque alio, in quo consistunt, statu. Hujusmodi porro crudelia symptomata (de quibus postea, ubi de signis) cum præsentaneo vitæ periculo, cujus linea ultima imminet, nisi celeri manu feratur auxilium, conjuncta, quæ morsum viperæ insequuntur, apertè ostendunt à posteriori licet, venenum & hujus lethiferam vim conjunctam esse cum isto morsu. Unde tutissima quoque curatio per Alexipharmaca, seu communia, seu appropriata, experienciâ duce inventa instituitur, seu intus assumpta, sudoris beneficio, naturæ conatum juvent, expellendo, seu foris admota eandem levent attrahendo.

§. 6. Sunt equidem nonnulli, qui morsum viperæ licet vel atrocissimum venenatum negant, sed omnem supervenientem symptomatum syndromen, tum ex acutie, & summò dentis lædentis acumine, ejusque relictis spiculis, & tenuis biliosi liquoris sociatione, tum ex partis læsæ nervosâ compositione oriri volunt. Non secus ac ex aciculæ punctura in partibus nervosis nonnunquam superveniat mors. vid. *Barthol. de angina Puerorum p. 111. 112.* & *D. Pauli digressio de febril. malignis p. 45. Hildanus Cent. V. obs. 11* Sed ut ut hæc sese recte habeant, non tamen omnem absolvunt paginam: multū facit acumen dentis, unde sine eo invalidæ sunt viperæ demonstrante hoc *Zvvölfero, & Severino*: multum quoque pars læsa, ut majora sequantur sympto-



mata, liquor etiam effusus maximè est ponderandus, & in hoc ipso id, quod venenatum reddit vulnus cæteris paribus residere existimo, cum in minima quantitate maxima ejus sit vis. Cur enim hujusmodi morsus maculæ & livores, & intumescencia corporis, cur horrendæ lipothymia, & cordis anxietates sequerentur? aliàs in similibus non obviæ læsionibus: cur in partibus carnofis eadem adessent Symptomata? Cur applicata externè alexipharmaca & proprio ex subjecto, & etiam ex alieno, item volucres viventes, attrahendo relevarent ægrum? Cur interna alexipharmaca curarent maximè, si ab omni venenatæ læsionis suspicione, esset liber viperae morsus? cur denique tam brevis relicta sit vitæ usura de morsu? taceo hic Suctionem partis læsæ cum ore, accelerare mortem promovendo venenum ad interiora ex *Amato*, licet rejiciatur hæc hypotesis à *M. Sever. de Vipera Pythia. part. II. cap. 8. p. 36.* Cujus exsuctionis veritatem vide apud *Lynceum loco sup. citat. p. 778.* Cur denique aliorum animalium vulnera levia ob veneni tamen quandam labem sunt lethalia? ut infra patebit. Perplacent ergo mihi *Sennerii* verba lib. *V. Prax. Part. II. cap. 21. Vulnera à venenatorum moribus vel ictibus illata plus nocent vi venenata quam vulnere, quæ per se plerumque non sunt magni momenti:* Concluserunt ergò veteres viperam esse venenatam, sed quæsitum ulterius, cur sint venenata, dixere, quia earum licet exiguus morsus sit lethalis, idque propter venenositatem animalis, & ita vitiosum commiserunt circulum; quem ut effugerent tandem respondere, vim inesse ipsis peculiarem, toto genere præter naturam, & uno verbo occultam. Sed hoc ipso dixere, se ignorare istam vim venenosam, quia ipsis sit occulta, quod namque, occultum est, hoc ignoro. Pergendum ergò jam ulterius & ad naturam veneni viperini ejusque per morsum communicationem est progrediendum.

## PUNCTUM II.

*Autorum de veneni viperini natura sententiam perpendit.*

## §. I.

**V**iperam ejusque inprimis morsum, maximè esse formidandum, ob veneni noxam, experientia edocti, statuere veteres; Cæterum & eandem viperam insigniter prodesse ad profligendas multorum morborum phalanges, eadem ipsos informavit experientia. Sic vinum, in quo suffocata vipera,



re, præsentissimum ad horeneam Elephantiasin Græcorum, seu lepram Arabum esse Alexipharmacum demonstrat *Galenus lib. VI. Comment. Aphorism. 47.* Quas tamen historias in dubium vocari videtur *Poterius*, contraria experientia fretus *Cent. 2. obs. 81.* Et musto, in quo similiter extincta vipera, spontaneo nisu, talis æger non tantum perfectè curatus, sed præterea quoque omninò in Juventutem quasi restitutus fuit; exutis crinibus, unguibus & pelle hisque omninò renovatis: referente *Areteo lib. II. de Sign. & Caus. diuturn. morb. cap. ult.* quarum historiarum explicationem vide in *Zacuto Lusitan. lib. VI. Medic. Princ. Histor. II.* Unde etiam à *Galen* antecessore *Andromacho* theriacæ tanquam basis fuere immixti ex viperis parati trochisci. Cæterum cum deficeret ratio, propter quam tam perniciosum venenum & rursus adeo salutare pharmacum consisterent in eodem subiecto, res tandem eò pervenit, ut dixerint, non totam viperam esse venenatam, sed tantum quasdam ejusdem partes: has recenset *Bald. Angl. Abbatius de Vipera. Cap. IV. V. & VI.* & ait esse dentes, Gingivas & vesicam felleam: in dentibus quidem venenum esse à natura inde manifestum ait, quoniam ab iisdem dentibus vipera jam dudum mortua, si quis tangatur, lethale est. Quare hac in parte, & mortua & viva, semper apta nata est ad ledendum; in Gingivis porro, & vesiculis earum, esse collectam venenum ex usu & cibo venenatorum animalium, attractum à vesica fellea, vagum & spirituosum, translatum ad Gutture partes, tanquam in sentinam deponi à natura, & facultate viperea perfici. Hanc autem fellis virulentiam toto Capite V. probat ex eo, quod impositum felictui viperino, venenum à vipera ictu projectum, similitudinis ratio attrahat.

§. 2. Hæc veterum fuere asserta, ab *Abbati* explicata, quæ ex parte vera esse certâ ratione, dummodo legitime explicentur, inferius patebit: Merentur interim examen. Videntur enim omninò ex nuda, eaque falsa hypothese oriri: observarunt scilicet veteres, morsu tantum lædere viperas venenosæ, hinc dentes esse venenatos conclusere, cumque præterea vesiculas observarint in gingivis, easque liquore quodam plenas, confirmati ulterius in sua opinione, & hunc venenatum statuerunt, cum ex fellis derivetur vesicâ, affirmantes, felleum liquorem, pessimum corporis in quocunque animali virus. Sed superiores restant difficultates; si tam pretiosus pro vita humana & conservanda & prolonganda est reconditus balsamus in viperis, unde hæc eorum venenositas in dentibus? in liquore felleo? & in vesiculis gingivarum? In quo consistit hoc ipsum venenum? Hinc qua ratione dentes sint venenati, omninò probandum, & explicandum fuisset, non ex nudo effectu, morsu venenato, de dentium malignitate judicandum: ad hæc etiam



post mortem laedere posse ex se & venenosa sua vi, quam dicti modò Aurores illis attribuunt, vana est mentis persuasio, cum nulla vera hujus rei unquam observata sit experientia, & licet exemplum, quod mortuae viperae dentis tactus sit lethalis, habeat *J. C. Claudinus de ingressu ad infirmos*, huic tamen & etiam *Abbatio* abundè satisfacit doctissimus *Severinus*, & ratione & experimento confirmatus, de vipera *Pythia* cap. 8. Part. II. p. 359. & 360. inter alia inquit: *Vipera aut dens integer, aut comminutus & uti libuerit voratus, ne dum non lethiferus, sed neque detrimens experimento comprobabitur tibi, seu nuper mortuae denticulus, seu vivens, seu dum diguis tribus contineatur coercitus anoris capite, in animantis cuiuspiam carnem, tum ipsius operam per vim adauctus, seu per arbitrium vipera fuerit defixus, quod duplex nos experimentum in pullo Gallinaceo fecimus. Quod vesiculas attinet sub dentibus, ex Ambrosini Anatomica observatione constat, quod viperae præter 34. dentes maxillarum (48. numerant Hodiernus & Spontonus) habeant quatuor caninos, inprimis femellæ, semper tamen duos tantum, se observasse ait Locatelli theatr. arcanor. p. 263. Qui conspiciuntur perforati & vesicula liquore plena muniti, quod tamen de duobus tantum asserti sunt à quibusdam (& in specie inter hos quodam medio) quæ novo quotidie repletur humore, dum primus in ictu, consumtus fuerit: Ad has dentium vesiculas ex corde & hepate venæ seu arteriæ ascendentes deferunt hunc liquorem. Videatur *Fontanus lib. 1. histor. Nat. de Serpente lib. 1. cap. 1.* Sed hanc ipsam *Ambrosini* & antecedentem *Abbatis* sententiam, licet nec autopsiam confirmare, neque rationem ullam comprobare ostendat *Veslingius*, describens Anatomem viperae *Marco A. Severino Part. 1. Cap. 12. p. 234.* Horum tamen effatum sub *Plinii* defensione confirmatur à *J. B. Hodierno in descriptione dentis viperini ad Severinum misso pag. hujus 258.* Qui observavit vesicam felleam hepatis colligatam in mediam propè caudam propagari atque istius filamenta quædam mira subtilitate per spinam ad os perducere, & virus per ejusmodi filamenta quasi per venulas ad dentis cavitatem perducere: ubi dentium harum accurata structura eleganter describitur, cujus brevem quasi summam dat *Veslingius in sua Anatome Viperae*, dicens, quod recondantur intra laxas veluti vaginas, liquore felleo plenas, ex quibus ad libitum ferè celerissime efferruntur. Hos lethale discrimen & pernitiem asferre de morsu, tenuisque fistula, veluti Scorpionum aculei, perforatos infundere venenum tam experientia censura, quam Autorum scriptis seriò confirmatum est. Sed Salivalem hunc, in & propè dentes humorem per se consideratum, expe-*

experientia  
pag. 360.  
volutum  
noxæ per  
ventricul  
euisse: i  
euisse:  
quid no  
felleæ no  
bar hoc  
Class. XI  
malignit  
alia carn  
ipsa sine  
Philosoph  
pag. 11.  
si humor  
& pag. 11  
mentum  
deprædic  
perit Sed  
immissur  
prolos re  
teste Zve  
capite &  
lignitas?  
vena hæc  
guinem  
stipatum  
tionum  
xipharm  
petenda  
stis: pr  
ciconiæ  
malculis  
seunt an  
spermat



experientia edoctus similiter ab omni veneni suspitione liberat *Severinus*  
*pag. 360.* vidit nempe *Johannem Branchinum Theriacopam Senensem*  
 virosum hunc liquorem de viperae viventis dente collectum, nihil exinde  
 noxae perpeffum, qui retulit, & de Gingiva viperae mortuae viventis ore  
 ventriculo captatum, alii praeter se nulli ex aqua vel vino potatum no-  
 uisse: nec succum hunc gallo gallinaceo immisum in os quicquam no-  
 uisse: nec famulo super manu perpuncta virus hoc inficatum ali-  
 quid nozarum intulisse: & licet ex felle vesicula oriatur, cum vesicae  
 felleae non sit venenatus liquor, nec hic exinde ortus erit malignus, pro-  
 bat hoc meum assertum *Zwölferus animadvers. in Pharmacop. August.*  
*Class. XII. pag. 211.* Qui in his partibus nullam unquam deprehendit  
 malignitatem, & abscessa capita, vesiculas felleas, & caudas, earundem  
 alia carne obvolutas felleis & canibus devoranda objecerit, qui haec  
 ipsa sine nullo vitae discrimine consumsere, videatur *Boyle experiment.*  
*Philosoph. experiment. II. pag. 58.* item *Bartholinus* de angina puerorum  
*pag. 111.* refert: capita resecta canes devorant nulla mortis mulcta, &  
 si humorem suspectum ex capite de mortuo promas, innoxium senties,  
 & *pag. 113.* aliis vesicula fellea est suspecta, quae tamen canibus in ali-  
 mentum cedit; quam ipsam potius ceu ad qualibet venena antidotum  
 deprædicat *Borell. Cent. IV. Observ. 19.* & certa observationis fide com-  
 perit *Severinus parte II. cap. I. pag. 288.* quod pulli gallinacei stomacho  
 immisum fel nil offecerit: praeterea si vipera integra in vino extincta le-  
 prosos restituit, & sceminae Anglicae tali vino pro cosmetico utantur,  
 teste *Zwölfero* eodem loco; si tota vipera in retortam immissa, cum  
 capite & cauda, dent saluberrimum & volatile, ubi eorum erit fellea ma-  
 lignitas? obijciunt quidem venenatis vesci alimentis viperas, hinc ve-  
 nena haec secerni in felleis vesicam, salutes v. partes in succum & san-  
 guinem converti. Sed ut taceam merum esse effugium, nulla ratione  
 stipatum, huiusmodi animalia venenosa cur non eodem veneno in dige-  
 stionum officinis afficiunt partes? cur non inquinant sanguinis vim alexi-  
 pharmacam, antequam in vesicam colligantur biliaria? item unde  
 petenda origo virtutum alexipharmacarum, si venenatis vescuntur be-  
 stis? praeterea & anates bufonibus & ranis delectantur venenatis, sicut  
 ciconiae, similibus ranis, serpentibus, bufonibus aliisque toxicatis ani-  
 malculis (unde haec aves per putrefactionem in similia denuo revivi-  
 scunt animalia, non secus atque ex indusiis humanis fiunt pediculi, ex  
 spermate & sanguine humano fiunt muscae & pediculi, ex pane & melle  
 fiunt muscae & pediculi, ex melle & lacte fiunt muscae & pediculi)



fiunt formicæ, ex Basilicone & siacedine lapidis scorpiones &c. videatur *Helmontius de Potestate medicaminum* §. 37. quale Scorpiones ex ocymo exemplum observavit *Magnificus D. D. Michael.*) tantum tamen abest, ut venena colligant, ut potius efficacissima exhibeant alexipharmaca: hinc *Theophrasti Paracelsi* arcanum ad quavis veneni genera ex sanguine Ciconiæ notissimum est, videatur de hoc *Crollius in sua Basilica Chimica* p. 450. cuius felicissimum effectum in principe refert *Hartmannus comment. in citat. loc. p. 252.*

§. 3. Nec quicquam obtinet *Abbatius* ex eo, quod venenum attrahat denuò fel impositum; nam aliæ viperarum partes similiter impositæ idem præstant: ad hæc columbæ vel gallinæ vivæ dissectæ, calentes adhuc morfui impositæ, virus extrahunt, quæ tamen ab omni veneni exemptæ sunt suspitione: non secus ac pulli gallinacei vel columbini, circa anum deplumati, buboni pestilenti applicantur, extrahunt namque tam fortiter venenum, ut ipsi etiam cum salute agri moriantur: Quod ipsum quoque præstat stercus humanum bufonibus pestilentialibus applicatum, sicut *Saaer in seinen Ostindianischen Kriegesdiensten refert*, esse in Indiæ Orientalis Insula quadam, ex Insulis Celebes, arborem quandam vel levissima læsione summè venenatum, cuius venenata plaga alio non possit curari modò, nisi proprio subito excreto stercore, eoque calido affecto loco applicato: qualem vim alexipharmacem assumptum idem stercus habet, contra animal lacertiforme, *Guarid dictum in India Occidentali, teste Zacuto Lusitano lib. 3. Prax. admirand. observ. 93. p. 117.* tandem & passeris vivi circa ventrem deplumati & parotidibus malignis impositi, attrahendo venenum, moriuntur. Sed hæc omnia licet venenum attrahant, non tamen sunt venenata. Quod ergò humorem in vesiculis dentium contentum attinet, æstimo eundem per se minimè esse venenatum, ut supra ostendi, non magis quam aliæ viperarum partes, sed arbitror potius eundem respondere salivæ in faucibus aliorum animalium obviæ; de cuius usu non est, ut sim sollicitus, primariò inservit præparationi ciborum in ore ut subacti melius, & volatili hoc liquore imprægnati, felicius in stomacho deponant suum succum nutritium, & si quid insit iisdem venenati, à Sale Volatili alexipharmaco subjugetur & corrigatur; quod a copioso constet sale insigniter volatilato, tum aliis quoque partibus spirituosis aquæ copiosæ nexu copulatis, sicque in consistentiam quandam reductis, nemo dubitet, qui ingentem harum partium copiam, in destillatione viperarum prodeuntem perpendit, simulque analogiam, cum saliva propriè sic dicta, & usum in alimentis præparandis, ut taceam facilem huius liquoris in iracundis viperis effervescentiam, de qua inferius erit dicendi



cendi locus. Ast licet vipera nihil mandat, sed omnia transvoret integra, nudas nidorum præpetes, aves plumosas, lacertas, mures, ranas, bufones quæ exsiccata diu, nil comminuta reddidit, per membrum sui secessus, ut autor est *Severinus* *part. 1 cap. 7. §. 5. p. 104.* Attamen cum dentium copiosum habeat numerum, osque saliva madens, cum eodem *Severino* dico, dentes minutulos, & sub maxilla latentes ei usui destinatos, ut perpungant tantummodò solidiores escas, atque has fermento suo peracri tabefaciant propè, præsertim quod exserti quidem Natura, verum gingivis obducti dentes, cum alimenta conterunt, sic virus è vesiculis exprimunt. Abutitur tamen hoc liquore vipera, dum per fistulosum dentem, simul ejiciendo, maximum toxicum sit subjectum.

§. 4. Pervenio nunc ad doctissimum *Marcum Aurelium Severinum*, qui tantà viperam *Pythiam* pertractavit sedulitate, ut nil deesse videatur, unde etiam sententiam ejus intimè fovet *Kircherus* in *Mundo Subterraneo*, ubi quasi compendium continetur eorum, quæ fusiùs suo tractatu toto pertractat *Severinus*: Hic ergò in eo est totus, ut vipera naturam totam esse alexiteriam defendat, venenum verò quod attinet ejus, hoc non agnosci proprium aut intrinsecus concretum, verum adscititium, & aliundè irrepere consuetum, quod pluribus in locis vipera veneno, & venenandi vi careant, sed immutentur tantum occasionibus locorum, cœli, vitium &c. ut etiam si vipera sit plurimum veneni, tamen adscititia sit affectio, & materiam quidem veneni esse per acrem & biliosum sanguinem, qui à virulentis escis proficiscatur, bestiolis nempe sulphureis, quæ sunt scorpiones, bubrestes, aranei, bufones &c. ex quibus paratum Chylum læva cordis fornax miris modis reddat retorridum & fumidum. Ex quo loco sursum arteriæ sanguinem spiritualem devehant, ad retiformem plexum in ventriculis cerebri, à quo plenius hic spiritus vitalis elaboratus reddatur animalis, & ad cerebri fumosi arteriis extenuatus adducatur ad summam *Pyrosin*, qui succus spirituosus, quem ore ac dentibus recipiat vipera, venenum à vulgò æstimatum, venenum reverà non sit, sed tributum ob id viperis, ut tot sensuum viriumque bonis gauderet agrestis fera hunc porro succum cum morsu dentis conjunctum reddere vulnus malignum & inficere hominem, ita ut definiat infecturam, actum fera, de figentis in aliud animal dentem, & inde virus emittentis, pro sui ipsius tuitione: ut nec dens per se, nec liquor hic plagam inferat venenatam, sed utrumque simul. Non adeò absona est hæc *Severini* sententia, quam ob id quoque amplexus est *Kircherus*: & modò attendatur fermentationis, vel effervescentiæ ratio in vipera laceffitâ, quam inculcat *Kircherus*, *Severinus* verò hinc inde parvam facit mentionem, nil culpabile videtur in hoc ejus



dogmate; hoc saltem videtur incongruum, quod veneni materiam, liquoremque virosum statuerit talem, qui ad vigorem, & alacritatem viperæ, adeoque ad ejus actiones & usus, vel maximè sit necessarius: cum probabilius videatur, esse saltem salivam in particulares collectam asservitamque usus: quâ abutatur postea vipera irata in perniciem humanam; & cum ob istum nobilem usum communis sit omnibus viperis, cur non omnes viperæ ubique erunt venenatæ? quæ Severini est assertio; nam videtur ratio, locique mutatio non omne absolvit punctum, cum Ciconiæ nullo modo sint venenatæ, sed potiùs alexiteriæ; cum denique originem hujus liquoris derivet ex cerebro in cujus elaboretur plexu, adductus eo per assertum *Johannis Trollii* pag. 289. Non video quid respondere possit *Hodierno*, quia autopsia similiter fultus, ex fellis vesica derivat ductus veneniferos. Tandem & cauda quibusdam est suspecta, unde in medicamentis ex viperis parandis abjicitur. Sed nulla similiter ratione *Marco Aurelio Severino* innocentiam caudæ satis demonstrante *Part. II. cap. 1. p. 284.* Sed his relictis ad alia pergo.

## PUNCTUM III.

*Viperam mortuam nullo modo esse venenatam affirmat.*

## §. I.

**A**liorum perlustratis opinionibus propiùs ad scopum accedam: necesse est: considerandæ autem sunt viperæ sicut & reliqua omnia animalia dicta venenata, in duplici statu & quando vivunt, & quando sunt mortuæ. Mortuas viperas ab omni veneni labe absolvo, & potiùs esse divinas in iisdem medicas opes, quas vix in alia reperias creatura, statuo; docet hoc ipsum experientia, veritatis magistra, quæ nullum suggerit fide dignum exemplum, ex vipera reverà mortua quocunque modò usurpata, veneni noxam cuidam esse inflictam, notandum hinc venit *Helmontii* Adagium, *Tractat. d. Ideis morb. §. 34 Mortala bestia, morio il veneno*; cui fortasse germanicum illud respondet, ein todter Hund beißt nicht / unde nec pulli gallinacei à vipera commoriti mactati, & esitati postea lethales sunt, sed quartanam potiùs, Medicorum alterum scandalum, feliciter profligant, teste *Severino* pag. 366. & *Barbolino* 110. mitto jam superius enarrata



rata exempla, aliquot saltem adhuc adnotasse sufficiat: quas vires habeat per retortam artificiosè propulsus spiritus, cum  $\theta$  volatili, ad febres malignas & pestilentes, insultus epilepticos, scabies leprosas, aliosque malignos affectus, quotidiana loquitur experientia, & quia spiritus ferè omne quod agit, agit ratione  $\theta$ is volatilis, de hoc sciendum, quod omnia encomia, stupendæque dotes, quas veteres adscripserunt suo  $\theta$ i theriacali, nostro omninò convenient Sali volatili, non verò eorum fixo, per tam fortem calcinationem parato, cujus aut nullam, aut minimam in se continent quantitatem viperæ, non secus ac alia animalia. Fixari equidem etiam solent per artem, sed si hoc contingat per acida, est potius enecatio  $\theta$ lium volatilium, quàm vera eorum correctio: Acida namque omnia, effervescenti & præcipitando immutant  $\theta$ ia volatilia, unde non possunt non diversas postmodum edere operationes, manent enim invicem adeò postmodum juncta, ut vix nisi beneficio cujusdam  $\theta$ is Alkali fixi, cum quo libentiùs inire soles conjugium acidum, quàm cum volatili, denuò separari queant; noviter inventus est modus in Italia, sine hujusmodi per acida destructione figendâ  $\theta$ ia volatilia viperina, modumque callent, non tantum D. D. Tackenius, cujus recentissimè editus vid. Hippocrates, Chymicus, qui novissimi viperini  $\theta$ is, antiqua fundamenta ostendit, sed præterea quoque Antonius de Sgobbis Pharmacopæus Venetus sub signo Struthii, cujus hæc sunt verba: Di poi per mezzo del loro proprio menstruo, cordiale & alestisfarmaco acqueo (accio vedano, che non sia questo menstruo imbevuto, d' altra facultà  $\theta$ ina,) ho cavato il vero  $\theta$ e sisso viperino, ch' è una gioia pretiosa, per salute humana: & novissimè alius nomine Harras Venetiis, ita fixare novit hæc Salia volatilia viperina, idque sine acido, ut etiam per chartam tuto hinc inde transportari possint. Est ergò verus reconditus balsamus in viperis, eorumque  $\theta$ e volatili, qui totius corporis renovat œconomiam, fermenta viscerum effœta jam renovat, & sanguinis vitalem fermentationem fortiter conservat, & masculè restaurat: hinc est, quod ex viperino vino sequuntur ferè sit elegans rejuvenescentia, quod ex Brodio decoctionis viperarum mulier leprosa quadragenaria, sterilis antea, post curatam lepram facta fuerit fœcunda, teste Helideo Padoano in Curationibus pag. 294. à Magistro Joh. Wuttich. edit. non secus ac Galli gallinæque viperis nutriti, docente Zvvölfero, animad. Class. 12. admodum fiant fœcundi, quæ animalcula postmodum viperinas vires possidentia, esu, ad eadem conferunt mala, at quæ ipsæ viperæ, in specie ad Elephantiasin, & ipsi cognata mala, Scabiem fœdam, luem veneream &c. tum ad fœcunditatem, vitæ pro-



prolongationem, corporis nitorem, & oculorum claritatem concilian-  
dam: de quibus videatur *Joh. Fab. Lynceus expositionem in Rechem. pag.*  
780. Ad hæc itidem valent partes atque essentia viperinae, secundum ar-  
tem paratae, siquidem *Magnif. D. D. Michaelis*, Essentia sua viperina Luem  
Gallicam aliquando curavit tam prospero effectu, ut agro hinc sanato,  
cuticula ex universa decideret cute, Strigmentorum facile, instar serpen-  
tum, exuvias suas exuentium. Sed pagina deficeret si omnia proponere  
vellem.

§. 2. Quod partes in specie viperarum attinet, eas in mortuis omni  
veneni carere suspicione, multa illustria ostendunt exempla. De Regio cor-  
dis viscere ut incipiam, quinque corda exsiccata una vice assumpta, tantum  
valere in Juvene quodam, ut nullum amplius ipsi nocere potuerit vene-  
num Serpentes nullos timuerit, quin potius eos amaverit, & semper tra-  
ctare voluerit. Hos verò eum admodum timuisse Autor est *Joh. Fabr. Lynceus loc. citat. pag. 786*. Ex corde & hepate viperino egregium & pul-  
verem & aquam Bezoardicam animale parare vocet *Zuvv. ferns pag. 213*.  
Intestina exsiccata, & in pulverem trita admodum commendat *Hartman-  
nus Comment. in Crollium pag. 456*. ad omnis generis affectus epidemicos,  
magorum & minorum animalium, imprimis ovium & equorum: Sed cur  
non & hominibus imprimis in intestinorum affectibus prosint? cum He-  
pata viperina pulverisata sint sanè præsentissimum remedium in Dysente-  
riis, præprimis Epidemicè grassantibus; Fellis viperini exsiccati gr. j. ab  
omnibus venenis liberare ait *Borellus Cent. IV. observ. 19*. Spinae, exinde  
que paratus pulvis aut secundum quosdam magisterium, ad eosdem pro-  
sunt usus Medicos, ad quos caro; non est ergò, ut caudam ob constitutio-  
nem osscam, sicut facit *Abbatius*, formidemus, cum præterea eadem cauda  
vel nudo contactu tollere Odontalgiam dicatur: Caput verò appensum,  
ad febrim arcendos paroxysmos laudatur; quale ergò in his reconditum  
erit venenum? firma potius manet mea assertio, post mortem viperas non  
esse venenosas: ex quo notanter elicio, venenum viperarum, si quod ha-  
bent, non consistere in quodam principio materiali, post mortem residuo,  
sed in quodam intentionali, vel certè tali, quod pereunte vita, & ipsum esse  
desinat.

§. 3. Confirmat me in hoc ulteriùs consideratio reliquorum ani-  
malium venenatorum, quæ cum in vivis esse desinunt, & innoxie tractan-  
tur & intra corpus assumuntur. Apparet hoc vel maximè in bufone, ani-  
mali pl. no veneno, ut non immerito terrestres toxici, & contagiosæ vi u-  
lentia bursa magnetica dici possit, loquente sic eleganter *Kirchero in Scrui-*  
*tinio*



*vinio Pests pag. 341.* tanto in hominem odio est, ut suspensus & verberatus ab eo præ nimia in illum rabie moriatur: unde ipsi, inprimis in terrorem actum, quæcunque potestratione insidiatur: nunc labiis scabris eundem fortiter mordendo, nunc habitu virulento, saliva venenata, lotiove toxicato indissitum à se hominem evibrando, vel herbas saltim inquinando, aliave corpora inficiendo, quibus mediantibus noceat homini, videtur. *Kircherus citat. loc. pag. 342. & 207. Sennertus lib. VI. Prax. Part. VIII. c. 22. p. 345. 346. Johnstonus historia de quadrupedibus lib. IV. tom. I. cap. I. pag. 188.* Sed eneca bestiam & liber eris ab ejus veneno. Non usum externum ad anginam, pestiferamque luem commendo, sive sub propria forma, cum vel sine aceto applicentur bubonibus, & tumoribus pestilentialibus, sive sub trochiscorum facie, ex vermiculis vomitu ejectis & ipsa substantia bufonum tragacanthi beneficio paratis, de quibus *Helmontius in tumultu pestis*, aliique passim Autores inprimis *Crollius in sua Basilica, & Hildanus in suis Centuriis*: sed quoad usum internum, sal ex eorum cineribus calcinatis extractum, internè ʒʒ. ad ʒj. pondere in ∇ Cardui benedicti usurpatum, ad omnem pestem è massa sanguinea eliminandam, eamque ab omnibus venenis vindicandam, mirificè commendat *P. f. Faber Panchym. lib. V. cap. 8. p. 631. & libro primo My. ohec. cap. 24.* & tanquam egregia sudorifera animalia extollit & fixum bufonum & aranearum: *Glauberus Furnor. Philosoph. p. 3. c. 22. pag. 177.* vel usurpetur saltem bufonis exsiccati pulvis ad ʒʒ. & habebis experimentum ad Hydropiseos aquas educendas certissimum, teste *Wiero in observat. Petrus Nosfol. Part. I. dissertat. de hydrope. Harim. in Croll. p. 420.* quem usum similiter vel externa solum ad renes applicatione præstat. *Borellus* quoque bufones innoxie voratos refert *Cent. IV. observ. 56. & Cent. II. observ. 37.* Pergo ad scorpionum, cujus aculeum in caudæ extremitate eminentem lethale vulnus ob veneni perniciosam vim, inferre constat: sed mortuus Scorpio, magnus licet non tantum cum haustu gelidæ in os citra noxam illapsus fuit, *f. F. Lynceo. pag. 781.* sed præterea hic ipse cauda ex scorpione viva abscissa, spontè se vulneravit, sine ulla noxa: sic devoratum scorpionum offum à circulatoribus, plus semel vidit *Bacsius* sine vitæ detrimento; & *Branchinus* referente *Severino pag. 366.* Nec ignotum est, quod egregiè valeat ad eiendam urinam, & provocandum lottium suppressum non externa solum sub olei specie applicatio, sed interna quoque pulveris vel calcinati vel solum exsiccati, assumptio. Araneas esse venenatas, sed non omnes communiter asserunt; ego interim telarias



venenatas esse arbitror, tum quia eorum oleum venenis resistit externo illi-  
tu admodum aliorum venenatorum animalium, tum etiam quod morsu  
vel potius ictu laedat, non contemnendis insequentibus symptomatis,  
sicut ex araneæ morsu epilepsiam suscitatum refert *Salmuth. Cent. III. Obs. 35.*  
Et ex araneæ morsu duos mortuos *Panarollus Pent. I. Obs. 45. p. 27.*  
Nec minus calidos liquores in quos incidunt venenoso contagio in-  
quinent, teste eodem *Salmuth. Cent. II. Obs. 22. Sennerto lib. 6. Prax. p. 348. &*  
*prava ex deglutita aranea Symptomata, vide Salmuth. Cent. II. Obs. 48.*  
*Borellus Cent. III. Obs. 19.* sed telæ non solum internè ad sedandos inter-  
mittentium febrium æstus usurpantur, sed ipsæ quoque araneæ mortuæ ex-  
siccatae, & pulverisatæ, ad similem usum non sine successu propinasse ru-  
sticum quendam, certò constat. Multos præterea esse serpentes venenatos,  
qui mortui pretiosissima dant Pharmaca, cum vita exuta omni veneni labe,  
notissimum est & serpentes innoxie vorari, & in cibis usurpari cum sanitatis  
commodo, videatur *Borellus Cent. IV. Obs. 65. & Secunda. Obs. 37.*  
Quidam quoque serpentem pro anguilla comedit nil mali inde perpeßus,  
sed cum cognovisset postmodum fuisse viperam, ex phantasia in morbum  
illapsus, obiit, *Libavius Alchimia Pharm. 12. Zuvölferus p. 273.* Similem  
imaginationis vim, vide apud *Salmuth. Cent. II. obs. 93.* Ex quibus simile  
etiã de viperis esse ferendum Judicium omninò existimo.

§. 4. Exclusa tamen hic volo animalia ea, quæ peculiaris rabies sub  
venenatorum redigit classem, cujusmodi sunt canes, feles, lupi, aliaque ani-  
malia interdum rabie, quæ corripuntur, hæc enim in Statu præternaturali  
sunt, adeoque venenatis reliquis in statu naturali constitutis nil derogant,  
nam rabiosa ut in vivis dum sunt, & morsu & saliva etiam nuda inficiunt,  
ita mortua & esitata similem rabiem inducunt, exempla vide apud *Bauhi-  
num tractatu de rabie. Kircher. de Peste, de fele rabiosa comesta pag. 206.*  
De sue rabie tacta, esitata *Borellus Cent. I. Obs. 75.* Videntur enim mihi hu-  
jusmodi animalia laborare quasi febre quadam maligna, cum insaniam ma-  
niaca conjuncta, ex effervescencia massæ sanguineæ à fermento peregrino  
peculiaribus idæis insignito oborta. Quod verò hydrophobiam attinet,  
hæc quidem tanquam inseparabile ferè adesse solet symptoma, rabiei, utut  
contrarium referat *Salmuth. Cent. III. Obs. 90.* Non tamen proprium est  
rabiosis, cum etiam sine rabie, & in specie in febribus malignis, citra ullam  
contagii rabiosis suspicionem observata sit, testibus *Schenckio lib. VII. Obs.*  
*de venenis anim. Sanchetz in Obs. p. 378.* Ubi tantus citra ullam animalis  
rabidi morsum adfuit aquæ timor, ut ne ferre quidem præsentiam ejus, aut  
manus abluere potuerit æger, simile exemplum habetur, *p. 379. Salmuth.*

Cent.

Cent. II. Obs.  
communican-  
cis Archeum  
ibus, insigni-  
mat: Suntq  
verò affectu  
Phil. Vet. re-  
modi affectu  
à peculiari d  
primat, etia  
nec in alio co  
Sed cum ve  
tes, non tam  
demonstrabo  
valebit.

Viperam

Viperam  
vibus t  
venenum ejus  
affero, quonia  
tius in quoda  
vens, per se est  
ejus est malign  
de duplex vip  
acta affectib  
nat, aut met  
rore ab exter  
erit, Priori  
dit, Posteriori



*Cent. II. Obs. 52.* Animalia ergò rabiosa per Morsum, vel etiam per salivam, communicant furibunda quasi fermentum suum febrile. Ideis morbificis Archeum corporis læsi, seu spiritum ejus insitum admodum perturbantibus, insignitum, quod totum corpus, in mores quasi brutales transformat: Suntque hujusmodi idæ in fermento quidem radicaliter, in homine verò affecto non nisi radiativè, de quibus vide elegantem *Marc. Marc. Phil. Ver. restit. Part. IV. Sect. III. sub Sectio. I. p. 435.* Cum ergò hujusmodi affectus sit peregrinus ipsis brutis rabiosis, sitque præternaturalis, & à peculiari dependeat fermento, in quod Archeus Ideas suas seminales imprimat, etiam post mortem superstes manere potest, licet sopitum ferè, donec in alio corpore vivente exsuscitatum denuò, similes concitet tragædias. Sed cum venena aliorum sanorum animalium sint eis naturales quasi doctes, non tamen nisi imaginationes vi traducantur in actum, ut postea demonstrabo, canis rabidi exemplum, hujus puncti veritati, nil detrudere valebit.

## PUNCTUM IV.

*Viperam totam esse Alexiteriam, nec nisi laceffitam  
esse venenatam aut venenosè quendam ledere,  
ostendit.*

## §. I.

**V**iperam mortuam insontem pronunciavi, ex cujus egregiis medendi viribus totam eam alexipharmacam & Bezoarticam concludo: nec venenum ejus, quod in morsu percipitur in quodam materiali consistere assero, quoniam alias, & hoc post mortem semper esset superstes: Sed potius in quodam intentionali vel spiritali, à furore concitato: nec tamen vivens, per se est venenata nullibique teste *Severino*, duce experientia, obvia ejus est malignitas, quam non nisi laceffita, vel provocata morsu exerit. Unde duplex vipera perpendendus venit status, unus quo nullis gravioribus acta affectibus, tractabilem se offert, vel saltem nullo lædendi conatu se armat, aut metu, terrore vel acta, fugam querit, alter quando iræ concitata furore, ab externo provocata læsione vindictæ inhiat, & spicula dentata exerit. Priori in statu est innocens, & nulla culpabilis malignitate, nec lædit. Posteriori verò, truculenta est fera, feros infert morsus; Vino quo maxime



ximè delectatur, suffocata licet, loco veneni salutiferas infundit dotes, ut supra dictum: Nec vivens Vipera, stomacho recepta detrimenti quicquam attulit, sed sine noxa vivens per alvum fuit expulsa, teste *Gaimaria de suffocatione matris*: hinc nudos & dormientes non lacessit spontè, quod sibi etiamnum puero sapissimè contigisse perhibet *Olavi Magnus*: Ad hæc mulieres non paucas viperis insidiis struentes, videre contigit, quæ serpentem hunc manibus liberè contrectarent & amicè, dicit *Bartholinus de Angina puerorum pag. 111*. In metu posita omnis quoque malignitatis deprehenditur expers, hinc eos, qui eo audaciæ procefferint, ut eas alacriter adeant non lædunt, sed terrore percussa fugiunt: indidit namque provida Natura serpentibus metum quendam & timorem, ut homines, qui eos intrepidè persequuntur, fugiant, teste experientia *Zvölseri pag. 273*. Unde eodem Autore qui serpentes in capite & collo prius arripere ausit, itaque tractare novit, ut in prima invasione mordere non audeant, is sanè postea, ad lubitum cum ipsis ludere potest, modo caveat, ne eos ad iram provocet. Sed objicere possis Lector sub illo statu esse venenatas viperas, ac serpentes; licet non lædant suo veneno, aliud nempe esse actum primum, aliud esse actum secundum. Benè: Sed unde quæso probabis hoc tuum assertum? ex absentia enim effectus, quo modò demonstrabis præsentiam causæ, hoc est, ex defectu læsionis venenata, unde ostendes venenum, nisi ex præconcepta opinione de Veneno ejusque principio materiali, dicere velis habere in se quoddam venenum, quia sint animalia venenata, hoc est, nisi petere velis principium, & probationis loco substituere id, quod est in quæstione: supra enim probavi, venenum hoc non consistere in quodam materiali, quia non sit superstes in mortuis, aut si fortè velis comparare cum veneno animalium rabiosorum, quæro cur post mortem per carniem esum, non similiter fiat activum, potius cum *Bartholino* dicam: *Ingenue fatebor minus in vipera recondi veneni quam vulgo persuasum, de Angina pueror. p. 110.*

§. 2. Idem observare licet in aliis bestiis, venenatis vulgò licet habitis, quæ non lacessitæ, aut ubi metu fuerint percussæ, non lædunt, seu ictu, seu morsu: e contra non venenata animalia ubi irrita, ex irâ vehementer efferbuerint, ut feles, equi, homines, &c. venenatis non absumiles inferunt plagas: Romæ Scorpiones quidam sine damno deglutivit, prius commode complicatis chelis, caudæque spiculo; in Italia sæpè iidem dormienti accubere, sed non læsi innoxii fuere *Bartholino Cent. IV. Obs. 95. p. 418*. Rusticus aliquot centena Scorpionum vivorum manibus apprehendendo, digitisque revolvendo, non aliter quam nummos aureos numerare, vidit

Lyn-

*Lynceus* l. 1. p. 1. vras devorab  
quasdam fec  
viro degluti  
aucta fueri  
Obs. 19. &  
summo cu  
hic facile a  
les hujusm  
arana, qu  
decebit D  
Mulieris, q  
noxie gelta  
Sect. IV.  
loco citato  
culum desc  
tum tander  
fordes vent  
de butonib  
in ventricu  
vomitur  
9. p. 9. Ba  
cap. 11. pag  
valere & t  
fura percit  
nis tamen h  
lestia conc  
quæ natur  
serpentes  
flata odio  
specie infi  
lem, num  
vel halitu



*Lyncem* *Isopr.* citat. pag. 781. Fatuus quidam, Batavii araneas omnes ob-  
vias devorabat, citrà noxam: *Barthol. citato loco.* Quod itidem mulieres  
quasdam fecisse refert *Borellus*, ubi insimul observandum, quod aranea à  
viro deglutita, sine noxa per duos menses retenta, & mirum in modum  
aucta fuerit, tandem malignitatis suæ irritata forsan, prodidit vim, *Cent. III.*  
*Obs. 19. & IV. Obs. 56.* Taceo hic puellam Coloniensem vulgò notam,  
summo cum appetitu araneas capientem, & devorantem: & quanquam  
hic facile aranearum diversitatem quis protendere possit, quia etiam lethales  
huiusmodi aranearum observatæ sint deglutitiones, tamen Communis  
aranea, quæ parietes telis investit, non sine malignitate esse, saltem irritetur  
decebit *D. Pauli Parechasi de febribus.* Vulgaris porrò notitiæ est Historia  
Mulieris, quæ serpentem vivum, mamillas sugentem, per decem menses in-  
noxie gestavit: Quæ tamen vocatur in dubium, à *D. Horstio Epist. med.*  
*Sect. IV. & Sebizio Jun. respons. in dictum locum,* notandum tamen, quod  
loco citato refert *Horstius* de Serpente mulieri dormienti per os in ventri-  
culum descendente, ibidemque per aliquot menses morante, & per vomitum  
tandem expulso, nulla graviora inferendo symptomata, quam alias  
fordes ventriculo adhærescentes inferre solent. Similes prostant Historiæ  
de bufonibus, quorum semina quacunque ratione assumpta, vivificata sunt  
in ventriculo, ibique in bufones perfectos adolevere, sine noxa insigni per  
vomitum rejectis, historias insigniores vide apud *Græling. Cent. II. Cur.*  
*9. p. 9. Bartholinus Cent. IV. histor. 19. M. A. Severinus d. vipera part. I.*  
*cap. II. pag. 29.* & similem rationem de omnibus venenatis animantibus  
valere æstimo: ut placido in statu nulla vi venenata sint formidabilia, aut  
si iræ percita fuerint æstro, vel quovis toxico sint perniciosiora. Irritatio-  
nis tamen habenda diversitas, dum nunc ab externa tantum læsione & mo-  
lestia concitantur, nunc interno agitantur stimulo, his nempe in brutis  
quæ naturalem quandam cum homine gerunt inimicitiam, ut bufones,  
serpentes quidam, & si quis est, basiliscus, &c. quæ ex nudo aspectu in-  
flata odio iræ effervescentia intumescunt, & venenato fermento furoris  
specie insignito inficiunt, quod nunc per contractum saltem fit corpora-  
lem, nunc vero indistans. Illud morsu, ictu, hoc per salivam, vel urinam,  
vel halitum.



## PUNCTUM V.

*Viperam irritatam & ad iram provocatam concepto  
furore morsum inferre venenatum declarat.*

## §. I.

**S**it vipera animal summe bezoarticum, sit thesaurus alexipharmacus, sit libera ab omni veneno mortua, sit insons non irritata, laceffita tamen insigniter, morsus infert venenatos, brevis lethales. Histor. vide quamplurimas in *Schenckio lib. VII. Obs. de Ven. animal.* Vipera iracundiae astro percita, canem ubi morsu fauciverit, intra decursum aliquot horarum, vel citius, mortem inducet *Zuvölferusp. 212.* & *Severinus p. 365.* inquit, qui remor debetur canis aut felis, vix hora, pullus vero demorsus, vix tamdiu tum recitabitur angelica saluatio, detinebitur in vita: hinc *Aldrovandus*, viperam collotenus jam pridem ex secta caput, quod integrum sic, posse demorsum a se animal perdere veneno: cujus rei capto experimento vidit horae semisse mortuum gallum gallinaceum *Severinus citat. loc.* Simile refert *Lyncus p. 782.* de famulo Pharmacopaei a capite viperae, jam post tertium diem abscisso, cum manibus apprehendisset, lethaliter morso, ut vix vel efficacissimis theriacalibus curatus fuerit. Nec ignota est *Matthioli* historia, referentis de Rustico a vipera fortè secundum caput discessa, pro mortua habita, apprehensa, lethaliter morso &c. Symptomata denique de morsis ab iracundis viperis supervenientia eandem venenositatem palam testantur de quibus infra. Mordet ergo per dentes acutissimos, fistulosos, ex quibus ejicitur liquor salivalis; venenat, verò per summam, qua tunc ardet, iracundiam. Dentes isti sunt acutissimi, Authoribus quibusdam quatuor, quibusdam duo, quibusdam medius quidam inter hos insignior, aduncus & acutus, omnibus tamen sunt fistulosi, ut per eorum canales, derivatus liquor salivalis, cum impetu dentium in animali irato interat lethalem veneni vim. Liquorem hunc simul ejectum vocat virus *D. Severinus*, innuens eo ipso, ab hoc imprimis dependere virulentiam vulneris, sed in quo virulentia hæc consistat quaeritur? dicit in vi liquoris pyroica, sulphurea & arsenicali quæ vincatur tanquam valentiore. calor noster vitalis. Rectè: Sed cur in speci. adjumentum dentis requiritur? cur non in vipera mortua est talis? cur etiam ex vivæ ore extractus est insons? hujus ratio, ex iracundia



dia animalis petenda, quâ furens Archeus & effervescentes saliva, similes motus, similesque Ideas per morsum inferunt morso. Ut ita formaliter vipera sit venenata, quatenus est irata: & infert morsus venenatos, quatenus ab irato infliguntur animali.

§. 2. Iræ ergo quam maxima hic pensitanda natura, qua vix validior, nisi amoris excipere velis vim, reperitur affectus. Considerandus hic & impetus animi, & sanguinis reliquorumque humorum motus. Impetus animi vehementissimus furibundusque ex præsentia mali maximè infesti concitatur; Ad quod amovendum tota insurgit natura, eademque omniconatu amovere à se tentat, objectum enim odiosum per suam speciem movet animæ vim cognoscentem, per sensuum organa operantem, quæ ex ejus inconvenientia, & odiosa præsentia perimota abhorret eandem, & amoliri à se conatur, urgente hoc, se conservendi, omnibus innata concupiscentia, & hic actus iræ nomine vocari solet: Ex hoc ipso horroris actu, nascitur species, ut sic dicam, irascibilis, & Idea amovendi, & propulsandi molestum, quæ non tantum recipitur in memoria & asservatur, sed etiam totius corporis partibus fluidis, imprimis sanguini, spiritibus mediantibus confusæ, in specie verò membro cuidam, cui modestiam propulsandi munus committitur, distinctè imprimitur, & insculpitur: adeoque in viperis hoc animi impetu permotis, species hæc idealis, ut totius corporis erga stulo, ita in specie ori ejusque partibus, & maxime dentibus imprimitur percussoribus, simulque liquor salivæ in eorum confiniis asservatus, pingitur hæc ipsa furoris impressa idea. Rem ita circa affectus se habere, præter auctoritatem *Helmontii*, *Marci Marci*, *Zwölferi* & aliorum modernorum, testantur permulta quotidie in medico foro obvia: Cruor Tauri potantem strangulat, non cruor bovis aut vacæ, idque propter tauri furorem, cum cupidine vindictæ morientis: Canis rabidus vel vivens, per salivam & morsum, vel mortuus per esum, laesos transformat in mores caninos. Felis rabida, in mores felinos, non secus ac nuperrimè in oppido vicino Torgavia, mulier maniaca, & quidem ut putabatur ex Philtro, licetorem in custodiam se abducentem, mordendo propè axillas, in similem conjecit calamitatem, ut postero die similiter ac ipsa fureret, muliere meliusculè sese habente: Sic felis sanguis haustus à puella, eam in mores felinis similes transformavit: Ossiculum certum bufonis cum tremore scilicet & terrore ut conjuncto aliquantisper furore morientis, mederi vel nudo contactu odontalgia, certo experimento novi: (hinc catholicum anodynum ex bufonibus parari posse, experientiâ quorundam celebriorum constat Medicorum) prodest idem ad epilepsiam infantum, ex nutricum imprimis im-



moderatis affectibus oriundam, ut ad paroxysmos febriles: bufo exsiccatus & applicatus quancunque hæmorrhagam ex interna sanguinis ebullitione & effervescentia ortam, certissimè sistit. Sanguis leporis, pavidissimi animalis, curat Erysipelas Dysenteriam: Pellis caudæ, lepori vivo detracta, ceu amuletum, idem curat Erysipelas, admota verò, omnes sanat ambustiones: Sanguis asini, torpidi illius bruti, post aures collectus maniacos coërcere & placare meo dubitet; rasura cornu tauri, in coitus ardore abrasa, mire armat in venerem; quod alias non facit. Cerebrum passeris in veneris actu transfossi, potentius longè stimulat eandem, quam si nudè interficiatur alio tempore: filum quo strangulata vipera, medetur anginæ: mores nutricum bibuntur cum lacte earum à tenellis infantibus, sicut infans à caprâ nutritus, caprinos miris saltibus. & variis petulantis, imitatus est gestus: terror, anxietas, & tremor, paventibus Podagricis suam curant podagram: terror, tremor, ira lapsus cerasi in Corpus, visio capitis à lanio per medium fissi &c. simili modo signant foetum: & alia hujus farinae exempla plurima vagantur obvia: hinc optimè acutissimus Marcus Marci, non parum referre, in quâ dispositione animalia moriantur, quorum partes ad usum medicum queruntur.

§. 3. Sed has & similes operationes, per species quasdam intentionales, recentioribus Ideæ dictas, ex quarum directione tanquam in speculo quid agendum cognoscat natura, peragi, paucis ostendam, dum harum in omnibus viventibus præsentia & directrix vis, ex veterum inprimis Philosophia, observare datur; Agentia sunt diversorum generum in rerum natura, præ cæteris observanda viventia, quæ varias edunt operationes, tam vegetabilia, quam bruta & homines: Horum omnium ortus processus & interitus variis mutationibus, iisque naturalibus, ut est subjectus, ita ab interno agente perfici assolet: Sed cum huic variæ incumbant operationes, necesse est, ut certò modò determinetur, ut operetur hoc, ut operetur istud, ne fiat confusio, quam abhorret natura. Hoc verò quod determinat in agendo, sunt species Intentionales dictæ veteribus, recentioribus Ideæ: Hæ dum determinant hominem in ratiocinando, dicuntur intelligibiles, dum bruta in sentiendo, Sensuales in actionibus per appetitum mortis, appetibiles, dum omnia viventia in actionibus vitalibus, naturales. Sic cicuta per Ideas proprias crescit, adolescit, & assumpta nos in anseres, anates, & merges quasi transmutat: Canis operatur in actionibus propriis, per proprias Ideas, quæ à rabioso nobis communicat, nos ferè in canes transformant, aut certè ad caninas actiones, moresvè determinant: Homo intelligit per Ideas intellectuales, quæ quod probè notan-

tandum dom  
bant naturale  
extrinsecus &  
quidem ord  
eò magis est  
manio, & ad  
que confusio  
recta sunt i  
specie: nec  
terminatur  
in genere di  
& etiam in  
ut valguis va  
firmationis  
sanè est red  
extructum d  
servat, & pe  
impedita in  
mis per affect  
species, und  
laesiones: d  
ex speciebu  
Ideas & ad  
cies, quæ ve  
tura ita resti  
modus agen  
ceptibilis est

§. 4.  
te, pergend  
ne. Hica  
scencia, in  
cor definit  
muniter qu  
divere Me  
similiter ac  
ut supra di



tandem dominantur sensualibus, & hæc imperant, aut certè sæpè perturbant naturales. Natura ergò per Spiritum seu Archeum corporis nostri extructrix & conservatrix, ejus diligens minister est Medicus, agit, & quidem ordinatè, semperque, quæ sua est prudentia, eodem modo, id quod eò magis est mirabile, quo stupenda magis totius microcosmi est conformatio, & actionum tot, tamque mirandorum varietas ordinata, minimeque confusa, nisi à quodam superveniente perturbentur; quæ omnia directa sunt in conservationem totius in genere, & uniuscujusque partis in specie: necesse est ergò sciat quid agat, & cur agat, sed quo mediante determinatur, & specificatur: hoc fit per species naturales, seu Ideas: Hæ in genere dirigunt ejus agendi vim, ut hominem homini formet similem & etiam in specie filius Patri, filia matri &c. respondeat in lineamentis, ut valgus valgum, blæsus blæsum generet, & quæ hujusmodi alia à confirmationis vitio oriunda, errata: Harum namque rationem impossibile sanè est reddas, nisi directrices Ideas seu species afferas; dumque præterea extructum domicilium & omnium partium actiones, factas tactasque conservat, & perturbatas restituit, ex eodem hoc promanat fonte. Verum impedita in suâ ordinariâ agendi vi, per sex res non naturales dictas, imprimis per affectus animi, mirè transformantur, vel obfuscantur naturales species, unde ataxiæ, & variæ Archei perturbationes, variæque actionum lusiones: depravatè ergò dum agit natura, non cæco fertur impetu, sed ex speciebus pravis oriundæ, corriguntur, aut removendo occasiones, Ideas & actiones perturbationes aut contrarias ipsi subministrando species, quæ vel deleant priores corruptas, vel easdem corrigant, &c. ut natura ita restituta suæ integritati per naturales suas ideas denuò agat. Hic est modus agendi superiorum medicamentorum, alius ne mente quidem conceptibilis est. Sed longius deducere hæc prohibeor.

§. 4. Considerato sic animi impetu in vipera irritata, & mordicante, pergendum nunc ad motum humorum in tam furibunda perturbatione. Hic autem consistit, in impetuosa sanguinis ebullitione, & effervescencia, in Iracundis omnibus obvia, veteribus exinde iram fervorem circa cor definientibus, indeque iratus fervere & totus in fermento esse communiter quidem sed appositè dicitur, unde & iram fortitudinis cotem dixere Medici, si non ut duce, sed ut milite ea quispiam utatur: Ira hæc similiter acuit viperam, fugientem alias hominem & pertimescentem, ut supra dictum, eundem ut forti aggrediatur conatu; Fermentatio hæc



sanguinis nimia, ex spirituum impetu, variis motibus cordis pulsatile corpus. moventibus & commoventibus oritur, indeque nimia sanguinis rarefactio, incensio, effervescencia & ebullitio, ex rarefcente imprimis bilis pingui ac oleosa parte, & salina volatili ejus substantia in motum & volatilem impetum concitata, proficiscitur. Agitatum sic sanguinem similis salivalis sequitur agitatio liquoris, sive enim ex felle *cum Hodierno* sive ex sanguine & cerebro cum *Severino* derives, perinde est, dum partes ejus spirituosae & salinae volatiles, in motum effervescenciae similiter rapiuntur: non secus ac homines irati spumare saepius ore assolent, ex simili salivae motu; Et quidem eo magis hoc locum habet in vipera, quo volatilibus & facile fermentes cibilibus eadem ditata est partibus, videatur *Severinus*, qui parte 1. cap. VII. in eo est totus, ut calidam viperam defendat temperatam, eamque sulphureis calidis & spirituosos & vesci alimentis & constare partibus: Unde & recte ex sulphureis spirituosos, & volatilibus hujusmodi partibus virulentiam ejus oriri defendit: *parte tota secunda.*

§. 5. Hisce consideratis, patet, quid de venenositate morsus viperini habendum, consistit ea partim in Idea furoris Archei impressa dentibus & salivae, sicque per morsum una parti laesae & consequenter reliquis partibus communicata, spiritum seu Archeum corporis similiter perturbante, & in furorem concitante: partim vero in parte salivae fermentescente, per fistulam dentis in vulnus evibrata, & beneficio circulationis sanguinis totius massae communicata, in similem fervorem & impetuosum motum, eandem concitante: in hisce consistit venenum morsus viperini. Confirmant hoc multa tum in viperis obvia, tum in aliis animalibus observanda: ratione Ideae dens humanus alias innoxius, venenatum infligit vulnus, nam redditus talis per imaginationem, & inde concitatum vehementem irae passionem, teste *Marco Marci Phil. Rest. p. 430.* Meticulosos & expavescentes fortius laedit, & periculosius vipera, ob Ideam furoris Archei trementi contrariam altius impressam. Quo calidiores terrae regiones incolunt viperam, eo venenosiores, fortius scilicet vel levi ex ira effervescentes: Quod item magis inhiat Veneri, eo virulentior ejus est morsus, agitata jam sponte sanguinea massa per spiritum genitalem, hincque fortius eadem effervescente; Ast quo fortior effervescencia, eo altius furoris inprimitur Idea, nam & effervescencia vim furoris intendit imperis & Ideam contra major effervescencia fortificat, commota tota sanguinis massa, unde & salivae altius furoris inprimitur species: quod acutiores sunt dentes, eo malignior est morsus, ob faciliorem salivae penetrationem, & altiore ejaculationem, quae solo contactu externo nil nocet; hinc circulatores diffra-

diffra-  
dis jam  
ter ferunt, qu  
nusque sic  
lvalis liquo  
viris, quod  
noxie manu  
tulit. Na  
data efferve  
impressa, si  
ente sanguin  
dem in aequ  
brevi tota e  
mefacit cor  
inprimis bili  
effervescen  
vomitus: S  
experturbat  
agrum.

§. 6.  
observamus  
Qui ut alteri  
morsum; d  
medicabile,  
eosdem arm  
serv. 24. 85  
gangrana bi  
Chr. Obser  
Lusitan lib  
russi venena  
co. Marci pa  
fert, ex po  
gravioribus  
tus, vel alia  
Cauda Sco  
teste Marco  
ejaculat vir  
re, demonst  
nua tauri, ac



diffra-  
 fractis jam dentibus viperinis & mutilatis, ut mordeant eadem, patienter ferunt, quia sine noxa, minus penetrante, hebetere earum acumine, minusque sic noxii infundente. Extra hanc effervescentiam innoxius est salivialis liquor, referente namque Bartholino de angina pag. 110. ipse Neapolitani viri, quod in chartam irritata viperæ bilioso colore simile ejaculaverant, innoxie manibus trivi & ab aliis devorari Florentinus ibidem Pharmacopola retulit. Nam evanescentibus partibus spirituosus & volatilibus, sicque sedata effervescentiâ innoxium est virus. Idea furoris Archei partis læsæ impressa, similiter eum perturbat, hinc intolerabilis verè dolor: ast affluente sanguine inopinatus tumor, saliva fermentescibilibus particulis eandem in æqualem effervescentiam cogentibus; Circulationis beneficio, brevi tota ejus afficitur massa, quæ eodem ebulliens modo ad modum tumefacit corpus, febremque accendit acutam: humores circa præcordia inprimis bilis volatilis, & fixus pancreatis succus una quoque commoti effervescendo, qua data porta ruunt, & regurgitando sursum atroces dant vomitus: Speciebus furoris interea in cerebrum allatis, vertigines primò experturbato spirituum motu, hinc deliria ex speciei impressione infestant ægrum.

§. 6. Quod in vipera contingit iræ percita cæstro, idem & in aliis observamus animalibus; Ab homine omnium princepe duco exordium: Qui ut alteri solet esse lupus, imo diabolus, ita etiam vipera; idque per morsum; dentes equidem ex se innoxii, ut & saliva, his tamen sæpè immedicabile, aut certè periculosum infligi vulnus constat, ubi ira vehemens eosdem armavit in perniciem: Exempla vide apud Hildanum Cent. I. Observ. 84. 85. item Cent. IV. Observ. 87. ex morsu levi hominis in digito gangrana brachii ad cubitum usque idem Cent. Epist. 73. Glandorp. Specul. Chir. Observ. 49. pag. 239. Panarolus Pentecost. II. Observ. 42. Zacutus Lusitan. lib. 3. Prax. Admirandæ Observ. 88. Imò sanguinem hominis ruffi venenatum perhibent, si ira exacerbato detractus fuerit Autore Marco Marci pag. 433. Sicut Zacutus Lusitan. lib. III. Prax. adm. Observ. 82. refert, ex potu sanguinis hominis ruffi, per venæsectionem sine affectibus gravioribus emissi, perpetuam secutam fatuitatem. Si ira fuisset percitus, vel alia vehementiori passione, alia certè secuta fuissent symptomata. Cauda Scorpionis viventi ex improvise amputata, innoxium facit vulnus, teste Marco Marci pag. 430. & Lynceo pag. 782. Ast irritata pessimum ejaculat virus, cujus vim in effervescentiâ à Sale volatili oriunda consistere, demonstrat Pauli de greff. de febr. malign. pag. 50. 51. 52. Similiter cornua tauri, ac dentes apri, quando irritantur & efferantur plagam inferunt magis



magis venenatam quam si casu eadem fiat, inquit *Marcus Marci pag. 430.* cuius ratio in sola iracundiæ consistit Idea. Sic mentionem facit vulneris virulenti ab apro in furam inflicti *Salmuth. Cent. III. Obs. IV.* ut & trium vulnuscutorum à cercopitheco inflictorum, per bientium durantium, ut & vulneris difficulter curabilis à mure minore inflicti: hinc rectè concludit, non dubito, quin ejusmodi animalium, irritatorum imprimis morsus, malignitatis quiddam obtineat: cuius sententiæ est quoque *Lyncæus p. 781.* dum inquit: cum sciam venenosa animalia, qua pungendo aut mordendo vulnerant, vix nobis virus suum inferre, nisi irritata, adeoque vel à nobis, vel aliis, vel à se ipsis ad iram eadem provocata fuerint: id sæpe in felibus, canibus, & gallis gallinaceis, iracundia flagrantibus animadverti, ut vulnera tunc infligerent cacoetica prorsus & agrefanabilia, cum tamen quando placidè nobiscum agunt, & fortè nos sauciant, vix quicquam detrimenti inde percipiamus &c. Qui ipse discursus per placet quoque *D. D. Pauli in Digress. propè finem:* similiter discurret *Febure traité de la Chimie tom. 1. part. 2. lib. 1. cap. 8 pag. 421.* item *Boyle of experimental Philosophie Part. 2. experiment. 2. pag. 52.* Porro ex Equi morfu in tibia epilepsiam observavit *Salmuth. Cent. III. Obs. 35.* & Gangrænam ex equi morfu *Hildanus Cent. II. Obs. 86.* Qui licet venenata simpliciter non habeat hæc vulnera, malignitatis tamen expertia non æstimat. Morsum lupi non rabidi, sed saltim irati malignitatem habere conjunctam, in eodem vide *Hildano Cent. IV. Obs. 50.* Confirmatur à *Schenckio in Obs. lib. VII. de Venen. animal.* qui similiter luporum licet non rabientium morsum venenatum probat: Sed non satisfacit ratio, quam affert, quia scilicet in renibus eorum plerumque nascantur serpentes, Millisui apes tantum abest, ut scateant ubique melle, ut iracundiæ quoque prodeant fel; Hinc ab apum ictu ortam gangrænam observavit *Zacutus lib. III. Prax. adm. Obs. 83.* ex punctura vespæ circa carpum dolorem ingentem totius & lipothymiam *Hildanus Cent. IV. Obs. 77.* Sicut ex simili punctura circa juncturam mandibulæ, ulcus insanabile secutum, idem *Obs. 78.* & dolorem horrendum aliaque symptomata ex ictu vespæ secuta, theriacalibus internis & externis curata, *Riverius Cent. III. Obs. 88.* & *Obs. 6. Commun. à Pacheco:* Sicut alias eadem læsio curari solet per vespam super impositam, & per oleum ex vespis per infusionem applicatum, sicut, Scorpions ejusque oleum proprio medentur ictui. Nec alteri solum speciei infligunt labem, & noxam venenatam hæc animalia, sed se mutuis quoque interimunt ictibus: vipera namque à vipera atrociter demorsa vitam cum morte commutavit, *Autore Zuñvölfero:* Scorpiones irritatos permistos invicem, se mutuis transfigere ictibus, testatur *Lyncæus:* Araneas insignio-

signiores in  
sum testis, ali  
pallim ob  
tamen plus  
renda: age  
nunc magi  
si est men  
rare, & di  
rium fit si  
massa sang  
unde etiam  
læsa nunc e  
nobili parti  
venenatoru  
§. 7.  
Celsi senten  
conclusion  
ictus infert  
esse venena  
naturum vuln  
affectuum  
scit: Sed v  
congruum  
nec quod a  
arbitror, s  
autem tale p  
dens ira &  
vel simile q  
nenat, id q  
venenum a  
& ejus qui  
esse.



signiores in vitro conjunctas se mutuis petere aculeis, & enecare, oculatus sum testis, alia ut taceam: Persuadent hæc ipsa, & multa alia apud Autores passim obvia, venenatos esse hujusmodi animalium iratorum morsus, unus tamen plus alter minus: differentia ratio & in agente, & in patiente quaerenda: agens nunc magis est irritabile, & irritati instrumenta nunc minus, nunc magis sunt acuta, & majori in patiens flagrat odio, vel minori. Pariens si est meticulosum & pavidum, venenum morsu receptum multum exaggerare, & diffusioni in totum corpus portas patentes aperire potest, contrarium fit si animosum & intrepidum; nunc dispositum est magis ratione massæ sanguineæ, ad recipiendum venenosum fermentum, nunc minus, unde etiam nunc atrociora sequuntur symptomata, nunc leviora. Pars læsa nunc est nervosa, nunc est carnosa, nunc nobilior aut ignobilior, nunc nobili parti propior aut remotior &c. Variant hæc omnia magis & minus venenatorum morsuum & ictuum vim & energiam.

§. 7. Ex modò allatis confirmata videtur sufficienter primitus allata *Celsi* sententia, omnem animalis morsum quoddam habere virus, ex quibus conclusionis loco elicio, si ob id animal dicendum est venenatum, quia ictus infert venenosus, vel morsus, sequitur omne animal, etiam hominem esse venenatum, quia fervente iræ stimulis animali inflicto tunc est venenatum vulnus, ut demonstratum, idque eo magis, quo magis vehementia affectuum rapitur brutum, quod rationis regimine eosdem refrænare nescit: Sed vix sine absurditate hoc dogma concedi potest, inprimis cum incongruum sit, id vocare venenatum, quod non semper habet venenum, nec quod aut vivum aut mortuum est tale, nisi in certo casu; Potius ergò arbitror, statuendum nullum animal revera & per se esse venenatum, fieri autem tale per accidens, dum abreptum impetuosæ animæ passionibus, frendens ira & ferociens, vindictæque anhelans, per effervescentem salivam, vel simile quid, Ideam iræ conceptam, per morsum communicat, & ita venenat, id quod innuit *Lyncæus* p. 782. dicens: *In hanc devenerim sententiam, venenum absolutum nullum dari, sed relatione solummodo habita ad obiectum, & ejus quidem naturam, modumque insciendi, imperscrutabilem verè nobis esse.*



## CAPUT II. PRACTICUM.

## PUNCTUM I.

*Signa Morsus viperini & Diagnostica & Prognostica pertractat.*

## §. I.

**V**iperam per dentes duos caninos læsisse, ex ægri relatione peroptimè addiscitur. Notanda interim sunt & adjuncta ipsius morsus & supervenientia symptomata, ut & de qualitate ejus & instituenda cura certior reddatur Medicus. Morsum ergò ipsum quod attinet apparent in loco demorso duo foramina parva, invicem spatio discreta, vel etiam plura pro quantitate dentium, fluitque ex his sanguis primò purus, hinc humor saniosus deinde oleosus spumofus, hinc æruginosus: prout magis magisque sanguis partis læsæ à fermento venenoso immutatur; Symptomata, quæ superveniunt, sunt vel ex genere actionum læsarum, vel qualitatum corporis mutarum, vel excretorum depravatorum; omniaque habent originem vel ex furibunda Idea, vel per morsum impressa, vel ex præternaturali effervescentia, per fermentum venenosum inducta. Quæ sicut se invicem sequi solent, enarrare placet; Pars demorsa miserandum dolet, adjuvantibus hic non parum spiculis acutissimis, ex dentibus viperinis in parte relictis, non secus ac spinulæ ex urtica planta, vel opuntia seu ficu Indica, præptimis majore, relictæ, dolorem ad modum acerbant. Dolor hic adeò sensim accrescit ut totum quoque corpus dolore tandem dicatur, unde subitaneo tumore, pars insurgit horrendam in magnitudinem, & sensim sensimque totum similiter corpus inflatur; quod si ore admoro haurire patiens conetur & exugere venenum, mox labra linguamque mirum in modum intumescere videas, ut os ipsam vix amplius capere queat, hinc purilagine correpta, brevi ulceribus scatet, teste oculato *Lynceo pag. 177.* Color partis læsæ primò quidem rubicundus, sensim alterato per fermentum veneni sanguine, subruber, donec livescat, & obrepente gangrana, Sphaceloque nigrescat, corporis similiter natus nitor perit, & pro fermenti efficacia, & sanguinis certa mistione, ac inde orta alteratione, nunc rubescit, nunc viridescit nunc purpurascit, nunc nigrescit, sanguineæ massa tinctura rubinaceo sic corrupta: quales alterationes observare est in sanguine eorum, qui post iræ nimiam incandescentiam eundem arte evacuant, quibusdam mire flavescit, aliis viridescit vel etiam omninò livescit; Confusa

ex



ex inordinata effervescencia debita sanguinis missione, indeque obfuscata & obtenebrato splendido ejus rubore. Calor præterea totum exurit corpus intensus, incensa febre periculosa à peregrino & hostili fermento: Unde arescunt fauces, ardetque larynx, accedunt vomitus biliosi admodum molesti, anxietates cordis, lipothymia & syncopes terribiles invadunt ægrum: hinc & Palladis arcis fit afflictio supervenientibus scotomiis, deliriis, tandemque amentis: labescente jam spiritu regimine, tremores agitant artus, & disfluente ac quasi omnino liquecente sanguinea massa, ex sufflata propemodum flammula vitali, cum horroribus quibusdam ultimi Naturæ afflictæ sed relictæ conatus indicibus, per poros penetrat frigidus, pessimi ominis sudor, ac stagnante tandem, & subsistente sanguine in partibus vitali aulæ vicinis, & impedita sic ejus circulatione, adsunt refrigerationis extrema, respirationis difficultates, tandemque totius animæ expiratio supervenit.

§. 2. Ex quibus vel spontè patet, qualis eventus tandem expectandus veniat, quo modò enim tanto symptomatum insultui par esse perterritus æger queat? non tamen præcipitet se Medicus in prognosi, quia ut variant viperæ, pro varietate locorum, victuum, irritationis, &c. ita etiam variat eorum venenosa vis, quod ipsum parili ratione de parte læsa tenendum; quibusdam in regnis aliquot horarum spatio, in quibusdam tribus diebus, in aliis longiori tempore conficiuntur ægri; hoc generaliter interim notandum morsum hunc tanquam ut plurimum lethalem, subitanæ medicaminis postulare opem. Aetius hoc proponit τελευτηριον, Centaurium cum vino tritum bibendum præbeto; Siquidem enim Pharmacum evomet homo morietur, si non, viveret. Quod sexuum diversitatem attinet, litigant adhuc dum inter se autores, Maris an Fœminæ periculosior sit morsus: Sententias & auctoritates vide apud Severinum pag. 414. Et sanè ab utraque parte stat ratio, maribus major effervescencia competere videtur, fœmellis efficacior Ideæ vis, ob iracundiam, ad quam in omni fermè animalium genere fœminæ sunt promptiores, utut vana non rarò sit sine viribus Ira. Sed quicquid sit hujus controversiæ, parum aut nihil interest Medico, ut scias animalis lædentiis sexum. Hæc tandem ultima prognoseos signa Eustachius Rudius libro tertio de morb. acut. cap. XVIII. collegit, & sunt: Si Viperæ percussus in syncopè incidit, si illi sanguis è naribus profluit, si labia virore adscivere, si digiti extremi gelidi redditi fuere, si corpus omne concussus est tremore, & ut Nicander ait, veluti grandine percussus sibi videtur, certum est mortem esse propinquam.



## PUNCTUM II.

*Methodum medendi morſui vipera præſcribit.*

§. I.

**D**ilpiciendum tandem quid valeat ars operoſa medendi, quid ferre recuſet; Maturam ferat opem Medicus, ne elapſa occaſione, quæ ſecundum Dictatorem noſtrum Summum, ſolet eſſe præceps, ſimul ſperata ægri conualeſcentia evaneſcat. Indicatio quam præfixam habet Medicus, eſt, remove venenum, quod præſtat vel ex vulnere extrahendo, vel ex corpore expellendo. Conſiſtit namque iſtud in parte ſalivæ efferveſcente, Idea furoris inſignita, ſublata ergò miasmate hoc, & inquinamento, ſecuritatſ ſpes affulget. Quæ extrahunt venenum ex parte læſa, ſunt Topica & exterius admoventur, idque mox agendum in *primò* principio, antequam pernitioſa veneni celeritas, beneficio ſuæ volatilitatis, inprimis cum ſanguinis circulari motu, ad intimiora penetret, totamque ſanguinis maſſam conſpurcet, ejusque Idea ubique ſpiritus ſigillet. Abſciſſo hinc continuo membro læſo, abeſt noxa, teſte experientia *Galeni* in ruſtico, qui remorſus à vipera ſecundum digitum, hunc ſibi per ſalcem fructuoſè & ſalutariter amputavit, videatur *Zacutus Luſitanus lib. V. Med. Prim. hiſtor. I.* Sed truculentum nimis eſt hoc remedii genus, ad mitiora ergò accedamus. Hoc interim ſemper obſervandum ut injiciantur vincula, & ligaturæ, partibus ſuperioribus, firmæ & valentes ne vi doloris concitatus ſanguis, nimio impetu per arterias affluat, nec citò nimis unâ cum veneni inquinamento per venas reſſuat. Teſtificati ſunt *Pyſylli Maſſique* noſtri inquit *Severinus p. 249. vid. Panciroll. p. 178.* Cum fortè per viperas incautè mordentur, ſi continuo morſam particulam exaſperent ſcalpris, adedò ut tingatur caro, multo cruore, quem diligenter expreſſerint, fieri ſic, ut nulla ſequatur noxa. Bona equidem hæc eſt medendi methodus. Sed dum conſideramus vulnuſculi anguſtias, & ſpontaneam partis extumefcentiam, vereor ne plus attrahatur ſanguinis, ſine eo, ut convenienter evacuari poſſit, ita ut præter veneni celeriore propagationem, ex ſanguinis in tumore extravafatione, coagulatione, & à fermento maligno mortificatione, ſubitaneus gangrænæ ingruat metus; melius ergò faciunt illi, qui partem commorſam ſcarificant, idque pro circumſtantiarum varietate nunc levioribus nunc profundioribus incifuris applicando poſtea tam ſanguifugas naturales. hirudines dictas, quam artificiales, ſeu cucurbitulas, quæ ſanioſum illum & tabe manantem ibique conculcatum ſan-



sanguinem exhauriant. Commendat hic *Severinus* pag. 451. Exsuctorem, quicunque sit & quacunque ratione fiat, eumque ab omni labe securum promittit: Cujus tamen non fuero imitator, deterrente me observatione *Lyncæi* pag. 778. Sed duo omnium efficacissima, & absolutissima commendat *Severinus* media, Ignem nempe & Sulphur. Ignem quidem expeditissimum esse auxilium, cum cæterorum præstet viribus, sicuti etiam *Hildanus* in *Observationibus* suis ignem ad canis rabidi morsum vel maximè commendare solet. Adhibendum autem pro Ustione suadet, rombum unum alterumvè fimi caprilli incensi, quos imponendos suadet, donec cinerescant, fimum namquè hunc in se & ignem servare & flammam reddere, idquè ratione copiosi, quo imprægnatus sit, sulphuris. Ceterum quis non formidet hinc dolorem intentum, qui per moram longè fieret crudelior, vereor ut patiens tunc tantam exhibiturus sit patientiam, quantam dolorificum hoc requirit remedium: Et hoc ipsum similiter obtinet de ferro ignito, loco affecto impresso: Horrent ægri mentionem ferri, nedum ignis, quid facient in hujus applicatione? commendo potius hic per elegantem modum *Domini Boyle* in *exper. Philos. idiom. anglico conscript.* pag. 59. Qui etiam fit per ignem, sed sine ustione, per quem extrahitur venenum, sed sine corporali ad partem læsam applicatione. Modus est hic: Ferrum ignitum admoveatur parti affectæ eo usque, quo ferre potest æger sine dolorifica læsione, idquè tam diu, donec per hunc ignis contactum virtuales, extrahatur quicquid est in parte veneni, sic namq; interdum in marte observari maculam quandam flavam. Experimentum factum in homine quodam vulgari, qui statuto pretio, ab irritata insigniter vipera sustinuit morsum in manu, undè in continenti mirum in modum eadem tota intumuit, ita ut vix ob temporis angustiam sufficienter incalescere potuerit ferrum, sed hoc per 10. vel 12. minuta admoto, incrementum tumoris omninò remisit, & licet adhuc aliquandiu continuasset, spontè tamen postea evanuit, qui postea sapius hoc medio pecunias lucratus fuit. Quoad efficaciam hujus medii, non dubito, de quadam veneni extractione, qua ignis sulphureas volatiles & auctuosas ejus partes alliceat: Sed forsan adhuc aliud quid in recessu habet; dictum enim est supra. fermentum venenosum insignitum præterea quoq; esse Idea furoris, quæ ipsa perturbando Archeum admodum exasperet malum. Sed huic nil magis contrariatur quàm terror, quo per ferri igniti præsentiam incusso, extincta priori Idea Archeus contrarium fabricet, sicquè veneni vim non parum enervet. Observare datur simile quid in procidentia uteri, quæ ut ut per solam ligamentorum aut laxationem contingat, aut ruptionem, optimè tamen incusso certo modò terrore, idem restituitur in suum locum:



teste enim *Roderico à Castro lib. II. de morb. mil. cap. 16.* cauterium actuale igni tum si teneat medicus manu, simuletque ac si vellet uterum tangere eundem subito retrahi: quod ipsum in intestinis pro lapsis obtinere quoque affirmabat. Simile stratagemata expertus est quoque feliciter *Zacutus Lusitanus lib. II. Prax. adm. obs. 95.* Idque ex manu ductione *Avenzaris*, per mures cruribus alligatos, quorum transcurso perterrita foemina, uterus in propriam reductus fuit sedem. Alterum generosum quod commendat *Severinus* remedium est Sulphur, cujus varia est applicandi ratio, vel enim guttulas accensi sulphuris instillare, vel olei sulphuris per campanam complures guttulas in plagam demittere, eamque specillo tenuissimo refricare protinus, vel ol. vitrioli similiter immittere, vel acetum adhibere jubet. Præter autoritates, quas apud eum vide, experimentum reddit hoc: Quod ol. sulphuris effusam in abaco viperæ infecturam, confestim coagulet, & fixet. Perplacent hæc, cum amice hic conspiret theoria & Praxis, illa effervescendo agere dicit venenum viperæ. Hæc ergo medicamentum postulat, quod præcipitando coërcere queat istam immorigeram vim. Cum itaque venenum viperæ consistat in sale volatili, Spiritibus sulphureis juncto, hoc est, ut loquitur *Severinus*, sanies viperæ sit pyrotica spirituosâ sulphurea & arsenicalis, optimè conveniet acidum, vel sulphuris vel vitrioli vel aceti, quod præcipitat omnem salem volatilem & figit, & coagulando blandè sulphur, fermentum venenosum omninò mortificabit. Hinc internè spiritus hujusmodi acidus vel etiam acetum Bezoartica, juncti Theriacalibus medicamentis tam laudabilem præstant opem, dum illa præcipitando vim veneni fermentativam hebetant, hæc verò si quid inest Heterogeni in massa sanguinea, per cribrum cutis porosum excludant: de quibus postea. Sed cum acidum hoc in oleum concentratum, vulneratæ applicatum parti corrodingo atroces excitare valeat dolores, forsan per manu ductionem *D. Boyle* fumus ex incensis tædis sulphureis propè applicatis erit utilis: ut tum ratione admoti ignis tum ratione vaporum acidorum sulphuris, junctis quasi viribus subjugetur venenum. Usitata sunt & alia extrinsecus applicanda pro veneni extractione, ut Aves, inprimis Gallus & Palumbus deplumati circa podicem, & admoti, vel dissecti per medium, & calentes adhuc applicati: Alii theriacam vel solam, vel aceto subactam commendant, vel ex theriaca cum cepis aliis & caricibus paratum cataplasma admovent, *Lyncæus* unguentum ex majore parte olei Scorpionum mediocri theriacæ & minore aceti compositum cum fructu adhibuit. Tormentilla exterius applicata, salutem de mortis attulit teste *Fracastrorio lib. III. de morb. contag. cap. 2.* *Aetius* admodum commendat stercus caprinum, cum aceto applicatum, vide *Zacuthm. lib. V. med. Princ. historia 2.* Hinc alii ex stercore capræ cum aceto, pice, cera & sul-

sulphure,  
ratione  
vel pulve  
ne eo effi  
cunque,  
impositu  
rorem &  
da opera  
bitam sup  
S.  
jam ferme  
tiones sit  
stinam mi  
Marcu M  
bi medela  
nitius mis  
Ideas alo  
alexiphari  
communi  
ubivis no  
Scorzone  
sunt fixat  
seu quod l  
sal amm  
nudam ag  
ex cervo  
datur aut  
ex quo cu  
tura simpl  
lebris Tin  
proficua  
mendo, c  
tamen mi  
sceatur,  
Archeo I  
peræ me  
pulveres  
perino.  
Zovölfer



sulphure, utuntur mistura: nec inutile erit emplastrum magneticum *Sala*, ratione magnetis ex sulphure Arsenico & Antimonio conflati, cui si addas vel pulverem viperinum vel earum bilem aut subigas cum earum pinguedine eo efficacius reddes. Viperarum namque partes externè applicatæ quæcunque, exoptatissimam ferunt opem, imprimis fel illitum, & caput mortuæ impositum, quod utur furore prius ardeat, immo inente tamen morte in terrorem & tremorem sensim facessente furore, obit. Extracto sic veneno, danda opera, ut si quid inest sanguinis adhuc corrupti & congrumati, per debitam suppurationem evacuetur, postmodumque consolidetur.

§. 2. Quod interna attinet remedia, ea sint talia, quæ conceptum jam fermentum venenosum foras excludant, intestinas sanguinis commotiones sistant, & discussis fuliginum per poros cutis nebulis, serenitatem pristinam microcosmo inducant. Specialius Antidotorum vim determinat *Marcus Marci* p. 434. inquit *Antidota* *in principio* & *in progressu morbi medelam præstant, quia nimirum vel à veneno Ideas noxias exigunt, vel penitus mistum istud destruunt, vel demum Archeum vulneris per amicabiles Ideas alloquuntur, & solando furorem sensim exuere procurant.* Sint ergo alexipharmaca vel præcipitantia, hæc tam positiva quam privativa, illa tam communia quàm contra vipersas appropriata, communia alexipharmaca ubivis nota, tam simplicia quàm composita, inter simplicia Scordium, Scorzonera, Ruta, centaurium minus &c. ex mineralibus antimonialia profunt fixata, ut diaphoreticam acquirant vim, imprimis sulphur ejus aureum, seu quod Mercurii sublimati beneficio ex antimonio eruitur, seu quod per sal ammoniacum sublimatur & figitur, ut sine vomitu secessuque per nudam agat blandissimam diaphoresin; Ex animalibus omnia profunt ex cervo parata. Theriaces quoque insignis vis apud omnes commendatur auctores, indeque Essentiæ theriacales, Spir. Theriacal. Camphorat. ex quo cum spir. vitrioli & Tartari (his imprimis volatilibus) parata mixtura simplex, de cujus usu jam præcedenti paragrapho, atque etiam celeberrima Tinctura Bezoardica *Magnif. Dn. D. Michaelis*, admodum erunt proficua. Opiata quoque cum theriacalibus maritata, admodum commendando, cum theriaca communis maximam verè vim fortiat ex opio, eo tamen minus correcto, quod si correctum legitime cum Bezoardicis miscetur, sedando sanguinis impetuofum motum, & delendo furoris in Archeo Ideam, maximè foret proficuum. Appropriata ad morsum viperæ medicamenta ex ipsis copiosè hauriuntur viperis. Pertinent huc pulveres viperini, de quibus videatur *Spontonus tractatu de pulvere viperino*. Item essentiæ earum & Tincturæ, quarum quamplurimas & in *Zwölfero* & *Severino* invenies; & quod instar omnium est, sal  
ejus



ejus volatile, quod si ritè absq; acido figere nescias, in id saltem incumbas, ut legitimâ edulcoratione urinosum & nauseabundum tollas saporem, è contrâ verò suavem ipsi, dulcem & aromaticam omninò concilies & fragrantiam & dulcedinem, quod facilè secundum ductum *D. Boyle tract. supr. citat.* fieri potest. Ratio operationis horum medicamentorum, consistit in similitudine, quæ simile attrahit suum simile, assumpta ergò vel admodum viperina, fermentum venenosum & salinum suæ naturæ omninò simile, attrahunt, illud alterant, vim fermentativam sopiunt & placant. Parili ratione atquè pili canis rabidi impositi, ejusdem morsui, relevant ægrum: & jecur ejusdem comestum eundem curant. Aut sicut Scorpis vel apes impositi, suis ictibus iisdem medentur, eliciendo id, quo nocent. Inter appropriata commendari vulgò solet fraxinus, utpotè cujus vel nudam umbram vipers & serpentes fugere autumant, hinc succum foliorum admodum commendat *Zacutus Lusitanus libr. III. Prax. adm. Observ.* sed rejicit hoc ex *Plinio* haustum dogma *Severinus pag. 264.* Et licet *Amatus Lusitan. Cent. I. Cur. I.* Puellæ à vipera demorsæ propinaverit succi fraxini  $\zeta jv$ , cum juvamine, hoc factum est ratione tremoris adjuncti, cujus specificum est in fraxino, & aqua ejus destillata egregia hic est medicina. An ex corylo parata medicamenta assumpta aliquid afferant commodi, nondum certò expertum: attractu quidem virgæ columnæ torpescere & stupefieri serpentem & vipers fama est, & circulum virgæ columnæ circa viperam factum hanc non transgredi, quidam, qui se hoc experimentum vidisse dicebat, retulit. Non E. ejus internus usus omninò videtur improbabilis: cum præterea in corylo quamplurima abstrusissima lateant arcana, & ol. heraclinum ex eo paratum stupendas possideat vires: ut taceam corylinum viscum ad morbos ab incantatione & beneficiis oriundos potestates obtinere omninò singulares: *Renalmus Observ. CLV. CLVII.* Morsam à vipera jam ferme conclamata, restituit per decoctam ex Verbasco & cortice Sambuci interno, cum parte sexta baccarum acathalidis assumptum & partibus læsis scarificatis extra applicatum. Galegæ seu rutæ capraræ vis, & hic specifica est egregia,  $\nabla m$  ejus destillatam non inferiorem æstimat  $\nabla$  Scorzonera *Lyncem pag. 786.* & cum hoc Galegæ succo curatum juvenem ex vipera veneno infectum, vide in *Schenck lib. VI. de ven. anim.* Et Historiam Lacertæ cum vipera pugnantis, & cum galega contrâ vim veneni viperini se munientis, vide in *Forestio. II. de incert. urin. jud. pag. 209. v. 136.* Inprimis felicissimum expertus est usum urinæ humanæ ejusq; potus, in morsu viperæ, *Zacutus Lusitan. lib. VII Prax. eos adm. Observ. 94.* Sicut eadem prodest ad præservationem ipsius quoquè pestiferæ luis, jejuno si hauriatur ventriculo, spir. ergo

urina



urinæ volatilis, cum Essentiis theriacalibus vel potius viperinis mixtus, foret hic saluberrimus. Saliva hominis jejuni serpentes & vipers enecare, communiter assunt; sicut etiam sanatores dicti per sputum suum aquis injectum & ebibitum, quamplurimas ægrotudines, etiam à viperis inductas noxas sanare solent, cujus exemplum vide *J. M. Marci pag. 554. §. 16.* qui licet hanc vim Naturalem esse, & ex sola imaginatione sputum certò modò sigillante in quibusdam subjectis provenire asserat; tamen amicus quidam fide dignus retulit, esse donum quoddam divinitus concessum & proprium esse quibusdam in Italia, qui festo Divi Pauli nati, signum serpentis vel viperæ sub lingua aliòve in loco gerant, cujus se oculatum testem, sanctè affirmavit. De Diætâ non est ut multa moneam, cum eam præfens medicus dirigere facillè sciat, temperantiæ medium ubiq; est optimum, quare ne & ego mediocritatis nimia prolixitate excedam limites, facio finem.

## Medicina Hippocratis Chymica.

Q. D. B. V.

**H**ermeticorum Chorus pleno gutture decantat suam *Tabulam Smaragdynam*, in qua omnis sapientia veraque Philosophia mirâ brevitate deprehendatur, ita ut instar Lydii lapidis omnium Philosophantium & sit & esse debeat. Idque eò magis, quod totum Mysterium Sophorum, & gloriosissimum Lapidis Benedicti artificium in eadem depictum pariter ac descriptum repetiatur. Linquamus iisdem hac vice Smaragdynam Tabulam, suspendendo hujus loco Cedrinam, in quâ *Divina HIPPOCRATIS Oracula*, cedro sane immortalis quæ inscribantur dignissima, exarata conspiciantur: qualia sunt, quæ *lib. de præcâ seu veteri medicinâ* nobis reliquit, dicendo: *Nihil igitur utilius, neque magis necessarium, quam hac cognovisse: quod & probè & convenienti ratiocinatione investigantes, juxta hominis Naturam hac primi inventores invenerunt. Judicaveruntque artem dignam, quæ DEO adscriberetur, quemadmodum etiam est receptum. Non enim sicum neque humidum, neque calidum neque frigidum, neque aliud quicquam ex his putaverunt hominem ledere, neque aliquo horum homini opus esse opinati sunt, sed quod in unoquoque forte & humanâ Naturâ potentius est, quodque non possit superari, hoc ipsum ledere duxerunt, & hoc auferre quasiverunt. Fortissimum autem est inter dulcia dulcissimum, inter amara amarissimum, inter acida acidissimum, & in omnibus adeo rebus vigor ipse ac summum. Hac enim & in homine esse viderunt, & hominem ledere. Inest enim in homine & amarum, & salum, & dulce, & acidum,*

† uu

Secundum

Editionem

Op. Hipp.

Ioh. Ant. v.

d. Linden:

quum etiam

in sequenti-

bus allegat.

retinebi-

mus.

C. 24.

4. 1. p. 27.



c. 25. dum, & acerbum & fluidum & alia infinita, omnigenas facultates habentia copiamque & robur. Atque hac quidem mixta ac inter se temperata, neque conspicua sunt, neq. hominem ledunt. Ubi vero quid horum secretum fuerit, atque ipsum in se ipso fuerit, tunc & conspicuum est & hominem ledit. De hac Hippocratica sententia, cum exercitii gratia quaedam exarare sit animus, faxit summus Archiater, ut fiat Feliciter.

## CAPUT I. QUALITATUM ELEMENTALIUM HIPPOCRATICA CORRECTIO.

### §. 1.

**U**T cautos reddat suos filios Hippocrates in prudenti instituenda prognosi, si quid in morbis divini insit, acutè perpendendum, accurateque pernoscendum hortatur. Quod divinum quid sit, ut intelligatur, Divino opus habet Oraculo, cum tot de eo sint sententiae, quod interpretes id explicare aggressi sunt, & ipse Hippocr. vix alio in loco apertam prætereà mentionem ejus faciat. Sunt qui occultarum qualitatum seu totius substantiae, ut vocant, morbos hic intelligunt: alii omne virus abditum & insolens occultumque in morbis huc vocant: alii Ideam morbificam & ab eadem productos morbos ideales seu archeales substituunt. In genere Divini nomenclatura ab Hippocrate quibusdam indita videtur morbis, vel quod singulari Superum potentia inducti videantur, vel quod eorum Natura obscura non nisi à Superis sit dignoscenda & curanda. Ob id ergò quod sint divini & obscuri, adeoque sublimioris conditionis, & non superficialiam requirant considerationem, raram eorum facit mentionem, quin potius reliquos ex manifestioribus deducendos rationibus hinc inde, præprimis in aureo de Veteri Medicinâ libello, accuratè & perspicuè pertractat.

§. 2. De his nota sunt dogmata, longâ annorum serie in scholâ Galenicâ mutuâ interpretum subscriptione confirmata, quod nempe corpus humanum ex quatuor Elementorum mistione compositum, ex primis horum qualitatibus certam obtineat temperiem quatuor humoribus nutritiis Elementis analogis sustentatam: quibus vitatis, non tantum varii excrementi oriantur humores, non nisi elementaribus qualitatibus definiendi, sed præterea læsâ istâ naturali temperaturâ diversi intemperiei resultent morbi, quaternioni Elementorum similiter superstructi: unde & remedium vires non nisi per qualitatum elementarium varias graduationes determinantur, universaque ferè medendi methodus his circumscriptur  
limiti-



limitibus: si quid superest, his primis qualitatibus non declarabile, qualitatum occultarum vasto inscribitur catalogo.

§. 3. De his quid judicandum, ingenuè nos informat *Hippocrates*, non tantum in proximii loco suspensa *Tabula*, sed præterea dum *libr. de Veteri Medicina* ita inchoat: *Quicumque de Medicinâ dicere aut scribere aggressi, dicendi scopum ac fundamentum sibi ipsis supposuerunt, calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum, aut aliud quodcunque voluerint, rens in compendium contrahentes, principium causæ tum morborum, tum mortis hominibus idem, unum aut duo proponentes: hi in multis quidem quæ dicunt, manifestè errasse deprehenduntur: Et s. 27. no. 30. ejusdem libri, pèrgit dicere, frigiditatem Et caliditatem ego omnium facultatum minimè potentes esse in corpore existimo.* Adjungo his accuratissimum scientiarum restauratorem & augmentatorem *Franciscum Baconem, Baronem de Verulamio*, (cujus vestigiis tam feliciter sui conterranei Angli insistant, per accurata minimeque fallacia experimenta Naturam ad promovendam Medicinam artesque mechanicas, scrutantes) qui quodam in loco apertè asserit: *Elementorum commentum, quod avidè a Medicis acceptum, quatuor humorum, quatuor primarum qualitatum conjugationes post se traxit, tanquam malignum aliquod Et infaustum sidus infinitam Et Medicinæ, nec non compluribus mechanicis rebus sterilitatem attulisse.*

§. 4. Pervetustum sanè esse hoc dogma, quod augustum Naturæ palatium quatuor qualitatibus primis, ceu angularibus lapidibus superstruit, minimæque gentium à Peripateticâ tantummodò schola primò fundatum, quin potius Hippocratis tempore magno applausu receptum fuisse, totus citatus tractatus de *Vet. Med.* unicè contra hoc dogma conscriptus, testatur. Nam *Hippocrat.* tempore *Artaxerxis Longimani* centum & aliquot annos ante *Alexandrum Magnum*, & ita etiam ante *Aristotelem* vivens, *Democrito* familiaris & amicus, sine dubio hujus accuratæ Naturam interpretandi crebris firmisque experimentis, in quibus totus fuit *Abderita*, confirmata dogmata hausit, iisque innixus, vulgatam tunc temporis elementarium qualitatum doctrinam ceu Medicinæ aut non sufficientem, aut inutilem rejecit, & atomorum variè conformatorum corpora componentium, indeque ortarum sensualium qualitatum & aliarum proprietatum, beneficio, tam macro quam in specie microcosmi mirabilia exposuit, cum ex hoc *Abderita* volumine præter scholam *Epicuream* tam *Cartesi materialis*, quam modernorum quorundam *Corpuscularis* Philosophia primos suos radios hausisse quodammodo videantur. *Aristoteles* vero Elementorum istam & qualitativam hypothésin, à majoribus traditam, in specie ex *Ocello Luciano* excerptam posteris ceu suam proposuit,



fuit, & quantum possibile antiquos Philosophos oppressit, utpotè qui secundum *Illustr. Verulamium d. augment. scient. l. 3. p. 228. more Ottomanorum regnare se tutò haud posse putaret, nisi fratres suos contrucidasset.* Hujus postmodum tam à *Galeno*, quam hunc insequentibus *Arabibus* arcepta Philosophia, in Medicorum scholas, neglectis limpidis Hippocraticis fontibus derivata & copiosâ Commentariorum fœturâ multiplicata fuit.

§. 5. Caterum tota Physica Periparetica specialis, & huic à *Galeno* superstructa Medicina ex eo nutare videtur, quod quaternio iste Elementorum nunquam & à nemine adhuc vel uilâ apertâ ratione demonstratus vel certâ quâdam experienciâ confirmatus fuerit: quin potius Natura rerum ubique ipsi repugnare videatur, ut hoc sufficienter declarant *Dominus Boyle in Chymista Sceptico*, & *Helmontius* hinc inde in suis scriptis: in specie *Tr. Mist. Compl. Elem. Figm.* Et hoc ipsum curiosioribus ingeniis primum subministravit calcar, reformandi vulgatam de Natura rerum doctrinam, & vel antiquam *Democriteam* & *Epicuream*, vel *Hermeticam* dictam resuscitare Philosophiam, vel novam quandam per experimenta ab ipsâ Natura ejusque æmula Arte subministrata, illam interpretandi investigare rationem. Nam quatuor istas primas quod attinet qualitates, hæ ipsæ non secus ac cæteræ, secundæ aut tertiæ appellatæ, modi saltem sunt materiæ, ex ejus particulis corpora componentibus variè conformatis & contextis & diversimodè motis resultantes. De quo vid. *Boylei lib. de Origine formar. & qualit.* Anglicè conscriptus.

§. 6. Non rejicit verò ex toto *Hippocr.* has ipsas qualitates, aut tanquam inertes contemnit, utpote cum ubique in suis scriptis eosdem adducat, sed tantum ceu minus efficaces eas considerat, & non sufficientes, ut ab iisdem insigniter corporis machina alteretur, adeoque Medico convenientem medendi rationem subministrant: quin potius iisdem semper potentiores facultates annexam asserit, à qua imprimis activitas & energia promanet, cui alia ex primis instar pedissequæ adhareat: *Non enim propter calidum simpliciter homines febricitant, sed est amarum & calidum idem, & calidum, ac acidum & salum ac calidum, & alia infirma, & rursus frigidum cum aliis facultatibus conjunctum.* Hæc itaque sunt quæ adunt: si simul adest autem calidum robore participans, nimirum ducens, & exacerbans, & augens simul cum illis, verum nullam potentiam majorem quam convenit videlicet habens cit. loc. p. 30. Terunt pressò pede hæc in parte Divini Senis vestigia *Paracelsistæ* & *Helmontistæ* qualitates istas primas relollas vocantes, i. e. non procedentes immediate ex fermentis & seminibus rerum. Unde etiam fermentis & fermentationibus transmutationum autoribus tribuuntur ea munia, quæ calori alias fuere adscripta, cum hic non effectivè sed tantum dispositivè operetur.



§. 7. Rationes autem quas profert Hippocr. ut insufficientiæ arguat istam qualitatum Elementalium hypothesein, *cit. libr. conscriptæ*, & ex observationibus quotidiano usu obviis haultæ, (paucis ut repetam eas) sunt ferè sequentes: 1. à *Diatæ* f. 22. f. 23. quod alimenta, v. g. triticum caro, aqua, vel inordinatè ingesta, vel non ritè præparata, nos lædant, & contra hæc præparata aut aliàs mutata nos denuò sanent, sine ullâ per qualitates elementares inductâ aut sublatâ alteratione. De quo plura infra. 2. ab *autoritate majorum*. f. 24. §. 22. novum modum artem medicam quærendi esse, ex elementaribus qualitatibus: primos enim artis inventores has ipsas rejecisse vires, & potius sapores, tanquam morborum autores observasse. 3. ab *alimentis medicamentosis*. f. 25. 26. Nam alimenta temperata esse, quæ nos nutrant, & corpus sanum conservent: sin vero nos alterent alimenta nonnulla, hoc ab ipsis fieri, non quatenus calida aut humida &c. licet tales proprietates attribuantur iisdem à quibusdam, sed quatenus sint amara, falsa, acida &c. 4. à *methodo medendi*. f. 27. Curam nullam fieri per calidum aut frigidum simpliciter, cum multa sint calida licet diversissimarum virtutum: quædam scil. calida acerba, calida tenuia, aliasque subcontrarias vires sibi ipsis habentia: cum autem his indiscriminatim adhibitis, contrarii sequantur effectus, necesse esse, ut potius ad vires adjunctas calido, quam ad ipsum calidum respiciatur. 5. à *subitâ permutatione unius extremi in alterum*, *istarum qualitarum*. f. 28. §. 29. sive à frigore in calorem, sive à calore in frigus, tam vitâ communi, per mutationem loci & vestimentorum, quam in febribus in quibus extremis rigoribus acutissima febris subitò succedat: & post sudores adeo subitò ægrum denuò frigere, ac si nunquam febricitasset. Cui igitur, inquit, brevi adeò contrarium accedit, cuique vis adimuitur suâ sponte, quidnam ab hoc magnum aut grave fiat? aut quid opus est multo auxilio? 6. à *duratione morborum*. f. 30. cum qualitates istæ sint adeò faciliè mutabiles, in quibusdam verò morbis, febribus ardentibus, peripneumoniis &c. calor sæpè sit diurnus, eo ipso non solum esse calidum, sed amarum & calidum idem, & calidum & acidum, & falsum & calidum, & alia infinita. 7. à *desfluxionibus*. f. 31. 32. 33. in quibus æger malè se habeat, quamdiu materia sit acris, quam calores & ardores, febrisque insequantur, temperatâ verò materiâ acris, & inspissata nimis tenui, idque ex sola permissione, & ægrum sanari, & calorem spontè cessare. 8. à *nocentibus*. f. 34. humores peccantes esse tales, ratione saporum, qualis v. g. bilis flava sit ratione amaritudinis: bilis verò æruginosa sit adeo anxiosa ratione acrimoniæ. 9. à *coctione* & *cruditate*. f. 35. humores scil. concoqui & alterari per omnigenas species, à quo ratio crasium dependeat;



deat: hoc aut calidum aut frigidum perpeti i. e. coqui nunquam contingere.

§. 8. Sed ut pergamus in examine dogmatis vulgati; viscerum quod spectat temperiem vitalem, hæc tota depender à sanguine, spirituque vitali, qui æqualiter per sua vasa iustitia distributiva in partes effusus & circulatus, ipsis debitam largitur temperiem: unde eodem æstuante in causo, & totum corpus ardet, eodem vero in senibus defervescente, totum corpus similiter tepet: unde & viperarum corpus ad tactum friget, cum sanguis eorum & cor actu in iis vigentibus frigeant, non minus quam in ranis aut piscibus. Quid verò per temperamentum revera intelligendum veniat, malo verbis J. M. Marci declarare, qui in *Philos. vet. restituta* p. 2. f. 4. p. 133. ita inquit: per temperamentum intellige non qualitates primas, aut harum symmetriam, verum constitutionem cuiusque radicalem, ex qua veluti effectus procedunt dictæ qualitates: cuius potissima vix in sanguine: qui est proximum subjectum animæ & primum vivens, cuius gratia corpus universum videtur factum, vitamque ex eo participare, humidum vero radicale, aut sanguis est, ut vult Harveyus, aut certè in eo radicitur: & corpus sanguine destitutum confestim friget, nihilque manet in eo de temperamento &c. Inest scilicet omnibus mistis sua determinata crasis, in semine radicata & in corpus inde genitum necessitate seminali, qua semina omnes suas energias in productis explicant, & hæc rursus ea in nova semina concentrant, propagata: hujus enim medio corporum tam in specie, quam in individuo mirandæ idiosyncrasie per generationem multiplicantur, ex Elementis earumque qualitatibus nullatenus explicandæ, utut primariam craseos seu temperamenti partem constituent. Prout E. radicalis ista sanguinis & spiritus variat crasis, (cujus ratio ex certa particularum materialium imprimis salinarum, corpora ex seminum directione componentium habitudine, & textura, indeque mutua activitate dependet,) etiam variat animalium Natura, ipsaque temperies.

§. 9. Sanguis E. proportionaliter distributus in partes, proportionatum quoque calorem aliasque nobis apparentes qualitates iis imperit: unde facile patet, quid habendum de decantata ista intemperie viscerum inæquali, nempe ventriculi frigida & hepatis calida, ex qua tanquam *Pandora* infausta pyxide tot contumaces affectus v. g. cruditates, ructus acidi, flatus & tormina, cachexiæ, catarrhi, & tantum non omnes morbi chronici surgere dicuntur. De hac apertè pronunciat *Joh. Ant. v. d. Linden*, in *Colleg. M. Sto. in Hartmanni Prax. Chymiat. c. 124.* Hoc mera est fabula; partes non habent calorem ex se, sed ex sanguine hunc accipiunt, qualis enim sanguis est, talis quoque est calor in parte: quomodo E.

idem

idem calor  
se calidum  
generat

§.  
tali casu i  
machi ca  
volatilis,  
stomachi  
testinor  
tenus prin  
quam a  
fallum vo  
cremorem  
prater von  
Martialia,  
coagulata  
qualia sunt  
stantibus  
mantur, ite  
abstinthum  
nullibi tali  
ditate stom  
ter l. 3. de  
stomachi a  
pendeant.

N On si  
aliquid  
vnius nost  
sum, & du  
facit res h  
quatur Hy



*idem calor, qui hepar calefacit, potest ventriculum frigesacere? dein si hepar sit calidum, quomodo ventriculo incumbens, non calefacit eum, sed refrigerat?*

§. 10. Ut quod probabilius videtur, proponamus, revera in tali casu intemperiei putatæ inæqualis, tota mali radix plantata est in stomachi cavo, cujus succus fermentativus nimis acidus & fixus, minusque volatilis, cum copioso mucō viscido ex *βερδυπείλῃ* coacervato junctus, & stomachi inflationem, & ructus acidos, & vomitus similes, & tormina intestinorum, & phlogoses aliasque symptomatum myriades producit, quatenus primam alimentorum digestionem perniciose depravat, eaque in liquamen acidum & viscidum corrumpit loco ejus, quod in subdulcem seu falsum volatilem, aut saltem moderatè acido volatilem transmutare debeat cremorem. Unde & in tali casu, indeque consecutivè ortis affectibus, præter vomitoria profunt ea, quæ *vel acidum absorbent*, ut Saturnina & Martialia, it. fixa Antimonialia, ut ex animalibus cornua & ossa, eorumque coagulata lapidea: *vel quæ idem temperant*, & sensim denuo volatilifant, qualia sunt vegetabilia gustu acria, ut allia & porrum, ab Hippocr. acida eructantibus commendata; & antiscorbutica, quæ sale volat. acri turgida æstimantur, item aromatica, aut revera talia aut his affinia v. g. mentha, acorus, absinthium sale volat. oleoso temperato dotata. Hippocr. quod attinet, nullibi talis inæqualis intemperiei meminit, sed ista symptomata ceu ex cruditate stomachi oriunda exponit *l. de affection. s. 44. n. 14. § 15.* & specialiter *l. 3. de dietâ s. 20. 21. § 22.* apertè deducit, quomodo à cruditate hac stomachi acida quamplurimi affectus in specie cachexiæ & anasarcæ dependeant.

## CAPUT II.

## FACULTATUM SALINARUM

## HIPPOCRATICA ASSERTIO.

§. 1.

**N**on ficcum, neque humidum, neque calidum, neque frigidum, neque aliud quid ex his, hominem magnoperè ledere. hæcenus nos docuit Divinus noster Coss. *s. 24.* sed e contra inest in homine *§ 1. dicit, § amarum § salsum, § dulce, § acidum § acerbum, & fluidum § alia infinita, omnigenas facultates habentia copiamque § robur.* Mirum sanè quam apertè hic loquatur Hippocrates, & quam formidulosum exercitum in campum educat,

ita,



ita, ut *μυεῖα* (quod vulgò infinita vertunt, Foësius verò numerum determinatum pro indeterminato sumens, sexcenta, Junius decem millia interpretatur) talia contra nos armet, & hæc ipsa *f. 27. c. l. cum in homine, tum extra hominem, sive edantur sive bibantur, sive forinsecus illinantur, & quomodocumque formata adhibeantur.* En totam Hippocratis Pathologiam Medicam, quam non recentem aut novam, indeque quibusdam futuram nauseosam, sed ut ipse *cit. loc.* fatetur, à primis artis inventoribus acceptam, graphicè tanquam in synopsi nobis delineat.

§. 2. Inesse verò in nobis tales sapores & facultates, experientiam quoad assumpta, quam quoad retenta & excreta ubertim confirmat. Panis secalinus, quo nullum frequentius est alimentum, his facultatibus Hippocratis turgēt: moderato igne enim fundit spiritum acidum volatilem (cum quo etiam aliquantulum salis volatilis in rectificatione unà ascendisse, apud amicum me vidisse memini) brevi temporis spatio, absque Vulcani adjumento, aut Veneris aut Martis tincturas, aut corallorum aut hæmatitis solvens & extrahens, & in nonnulla corpora mineralia potentius ferè agens, ipsa aq. forti. Præter panem assumimus acida, amara, acria, aromatica, dulcia, insipida, acerba, salia &c. eaque variis salibus imprægnata, quæ utut sub stomachi digestionē, in homogeneam quoad sensum salinam aut acidulam abeant massam, retinent tamen adhuc nonnulla suæ craseos vestigia, quod effectus medicamentosi talium alimentorum non rarò confirmant. Dissolvuntur hæc assumpta in stomacho à succo salino sæpius acido, teste namque experientia, omnia assumpta etiam saccharum & mel, primum in stomacho acescunt, quod tam ructus, quam legitimo tempore provocatus vomitus, antequam scilicet alimenta per fermentationem in chylum transmutata fuerint, manifestant. Quam fermentationem non modernorum saltem inventum, sed jam Hippocrati cognitam fuisse, palam est ex *f. 20. libr. de Vet. Med.* ubi ita disserit; *Et sanè puto his, qui cibum sumere consueverunt, quod non expectaverunt tempus iustum, donec ipsorum venter pridie ingestos cibos perfecte consumisset, & exsuperasset, evacuatusque esset, & quievisset, sed in ferventem adhuc & fermentatum novos ingesserunt &c.* Hinc simili menstruo acido volatili chylum artificialem ex alimentis in vitro producere novit Tachenius in suo *Hippocr. Chym. cap. 13. pag. 78.* & Boyle menstruo ex vitriolo artificiosè parato, idem perficit, *Usefulness of. experim. Philos. P. 2. p. 20.* Acri vero nimis reddito hoc succo, appetentia canina exurgit, in qua copiosa acida vomitu rejecta, affectum aut leniunt, aut tollunt, sicut pingua in tali casu, acorem vitiosum obtundunt, aut fixa terrea eundem absorbent, Balsamicus bilis sapor ama-



rus insigniter omnibus notus. Pancreatica lymphæ, nunc subacida, nunc salsa deprehenditur, ita tamen acris, ut anno & quod excurrit elapso in Anatome publicâ mulieris decollatæ sanæ, intrusus stylus argenteus in ejus canalem, & ibidem aliam ob causam ad aliquot horas relictus, colore intensè cæruleo ex corrosione inchoatâ, tinctus extractus fuerit, tincturâ ipsi pertinaciter adhærente. Reliqua lymphæ, lymphaticis comprehensa vasis, ut plurimum subacida, instar diluti citri succi gestatur. Chylus ejusque frater germanus lac dulcescunt, sicut & ipse sanguis, qui tamen Sale volatili copiosissimè turget. Urina salsa est, i. e. acido & alcali volatilibus in salsum volatile junctis, fœta: cujus spiritus non adeo violento paratus igne, crudum cupri corpus in tincturam intensè cæruleam solvere valet. Insensilis transpiratio, & sensilis pedum sudatio salsa est adeo, ut orichalci limaturam calceis impositam, in viridem crocum dissolvere valeat.

§. 3. Ast quam excessivos sapes morbofo in statu non rarò contrahunt hi succi? Vomitus sæpè insigniter amaricantes, non rarò austeri, dentibus stuporem inferentes, molestant ægros. Scorbuti & hypochondriaci, tam corrosivos rejiciunt per gulam liquores, ut præter hujus & faucium dolorosam excoitationem pelvim æneam item argenteam æruginè obducant: ipsum horum sanguinem hæmorrhagiâ narium rejectum, adeo acrem, ut lintea quibus exceptus fuerit eraserit, observavit *Döringius de Med. & Med. p. 109.* (similem vim corrosivam linteorum Lunari mulierum tributo etiam assignat *Helmont. cit. tract.*) unde & horum urina observata fuit interdum adeo acris, ut paulò diutius in matula vitrea detenta, eam corroderet, & nonnihil absumeret, utut fortissimis menstruâs, vitri compages resistat. Quam facultatem dissolvendi non obtinet interdum stomachi menstruum, dum præter gallinas *Helmontii*, in quibusdam gulonibus & vitra obterat, & consumat, item coria, testas, ligna, carbones &c. exempla vid. in *Amato Lusitano cent. 2. cur. 69. Schol. it. in Sennerti Paralipom.* Non minus rarum est quod refert *Boyle supra cit. tract. p. 68.* de milite lapides & frustula horum devorante & ita consumente, ut alvi excreta arenosa exinde fuerint rejecta, lapidibus in stomacho in arenulas resolutis. Notum alias est omnibus, duram ferri limati compagem in hypochondriacis aut etiam virginibus cachecticis non sine sanitatis optatæ emolumento dissolvi: quia & numismata ænea deglutita, attrita prius & nonnihil consumpta per inferius guttur reddita tandem fuerunt, teste *Amato Lusit. c. 1. & Kerckringio in specul. observat. Anatom. obs. 1.* Urinæ salsedo in acidum p. n. mutata in stranguriis & dysuriis sufficienter se monstrat, Sudores sæpissimè (quod



in declinatione Tertianæ cum arthritide vago conjunctæ aliquando obfervavi) insigni acore sunt tincti, unde præter molestum & manifestum acidum odorem, & cutis intensum pruritus, & cuticulæ erosionem inferunt. Ulcerum corrosiva & acida sanies, quas non torturas agris multiplicat? quæ ossium robur in cariem eadem erodendo, infirmat: imò argentea etiam & ferrea Chirurgorum instrumenta levi contactu non raro dissolvere inchoat, hincque indelebili macula eadem inquinat. Quid cancerum memorem, teneram mamillarum corrosivo suo Sale, arsenico autem quibusdam comparato, exedentem substantiam? pustulæ cutaneæ & ipsæ non carent vitioso tali sapore: Patavii familiarissimus mihi erat juvenis, & ipse Germanus, scabie inferiorum inprimis partium circa genua vehementer afflictus, cujus pruriginosa ulcuscula scalpando aperta, liquorem serosum odoris apertissime acidi instar subtilis cujusdam & penetrantis aceti fundebant. Saliva naturaliter ferè est insipida, quæ tamen in scorbuticis corrosivo acuta sale gingivas manifestò depopulatur, & dentium ossa erodit: vidi adolescentem scorbuticum, qui matutinis horis jejunos adhuc adeò acrem sanguinolentam in chartam duplicem firmam expuebat salivam, ut hæc exinde breviteroderetur. Hanc ipsam icterici, & multi febricitantes amarore molesto inquinatam percipiunt, quæ in hydropicis nimis falsa gustatur. Catarrhales denique affectus, ex lymphâ nimis acri, sive per nares sive per oculos moveatur, oriri, unde interdum istarum partium ulcerationes sequantur, fatetur Hippocrates noster c. l. §. 31. & 32.

§. 4. Merito ergò Hippocrates, manifestaturus & status pacati & turbati Reipublicæ Microcosmicæ autores, (in tali casu, ubi nihil divini immiscet.) sub saporum notionibus eos nobis declarat, idque propterea, ut (cum in præfatis qualitatibus gustabilibus profundior & potentior plerumque lateat dynamis) iis quasi manu nos ducat, ad investigandas occultas salium proprietates & energias, cum salia sub saporum formâ præprimis se nobis manifestent. Licet enim affirmare nequeam, ex solis salinis particulis sapes dependere, hoc tamen certum est, vix corpus esse magis sapidum, quàm salinæ quod est prosapiæ, ipsaque salia nullum organum sensitivum potentius afficere, quam gustui quod inservit, & pro salinarum inprimis particularum mutatione, & diversâ cum aliis texturâ, sapes specialius variare. Ignis ergò Spagyricus est consulendus, qui in manu artificis & alterat variè & etiam resolvit concreta naturalia. Sed cauto hic opus est, ne Chymicorum ingredientibus laboratoria, ab inconditâ Salium, Sulphurum & Mercuriorum turbâ, instar vesperilionum in tenebris,



bris, circumvolitante obruamur, utpote ex confuso Paracelsi chao mentali exclusâ. In genere duo se offerunt salia quasi fundamentalia (quæ ab uno summo sale primitus oriri, sunt qui existimant) acidi & alcali seu urinosi quæ veniunt nominibus, ex quorum mutuâ conjunctione tertium falsum emergit, neutrum existis, de utroque tamen participans. Sub hoc genere infinita specialium Salium se offert varietas: nam *acidum* aliud est ferri, aliud auri, aliud vitrioli, aliud nitri, aliud aceti, aliud ligni quercini &c. *alcali* contra, aliud *fixum*, aliud *volatile*, aliud *animalum*, v.g. lumbricorum, cancrorum, cervi, hirci, urinæ, ossium, fellis, aliud *vegetabilium*, saporis *aromatici*, ut fœniculi, menthæ, *acris*, cochleariæ, sinapi, *amari* absinthii, gentianæ, chelidonii, *adstringentis*, gallæ, malicorii, *insipidi*, sempervivi, solani &c. sed quis finem inveniret, qui omnia hæc distinctè enarrare vellet? nam & Hippocr. sexcenta nimis angusta videntur. Plura qui vult, adeat *Tachenium in Hipp. Chym.* & ejus *Clave, Zuvölferum*, in append. ad animadv. p. 71. & seq. & videat ea, quæ *Svvalbe* de acido & alcali conscripsit.

§. 5. Considerandum modò ulterius venit, quod omnis Salium potentia ex eo radicaliter dependeat, quod alcalida & acida ubicunque sibi (medio imprimis aqueo vel fluido) occurrerint, tanquam contraria in se invicem agere, sese contemperare, destruere & tandem arctâ concordia unionem sese in Sal tertium conjungere satagant. Prout verò diversus est Salium status, dum ea rarò pura aut solitaria, quin potius semper aliis concretorum particulis intermixta existunt, etiam effectus reciproca istius actionis & mutui concursus est varius: Nunc enim *effervescentiam* impetuofam cum bullis & strepitu, & insigni non rarò incalescentia, ubi eadem sunt acriora, nunc verò *fermentationem*, ubi eadem adhæsione aliarum particularum materialium sunt temperata, nunc *coagulationem* & novorum concretorum productionem, ubi mutuò amplexu alia simul adhærentia sibi uniunt, nunc *separationem* seu præcipationem rerum non benè cum iis unibilium producant. In genere ex salibus istis cum aliis particulis materialibus diversimodè concurrentibus, junctis, separatis, variè situatis & contextis &c. non tantum ipsa eorum varietas, & Protei instar mutabilis facies, sed omnes ferè insigniores in natura alterationes, forsan etiam generationes & corruptiones proficiuntur, quas specialiter excutere, non est hujus loci.

§. 6. Quod si ulterius rationem istius mutua salium in se actionis, indeque adeò diversorum Naturæ inde surgentium phænomenon investigare velis, in promptu erunt conditiones minutorum corpusculorum seu particularium salinarum mechanicæ, in specie determinatæ eorum



figuræ, & texturæ, magnitudines & inde exsurgentes diversæ motiones: istæ enim sunt tales, ut acidum & alcali ex figuræ & texturæ proportionem certo modo sibi adhærere & mutuo amplexu se continere queant: antequam verò ad debitum unionis situm perveniunt, medio fluido, cujus particulæ sunt in continuo motu, permixta, unum impingit in alterum, hoc trudit, istud repellit, acidum rodit alcali, hoc aborbet acidum, idque tandem, donec diuturnâ affrictione & hinc inde contorsione in legitimo situ unita firmiter sibi adhæreant, & ita figuræ & texturæ mutatione in falsum abeant, aliasque concretorum alterationes (ratione aliarum particularum unâ concurrentium, & vel simul connexarum, vel separatarum vel translocatarum) inferant: Qua texturæ ipsorum salium mutatione, & ipsa variè exasperantur, mitigantur, alterantur, & ita infinita ista *Hippocr.* constituunt. Sic enim oleum acidum vitrioli, cum oleo tartari urinoso mutua texturæ mutatione vel falsum leviter vel insipidum tertium produciunt. Sic ex alcali fixo cum silicibus calcinatis in ignis vehementi tortura per violentum & continuum particularum motum, ob mutatam earum texturam, novum & plane mirabile ens nempe vitrum produci-tur, cui simile Natura nullibi, nisi in lapidibus pretiosis constituit. Sic mutatione figuræ & texturæ particularum materialium Sal commune nudis in igne fusionibus, in aqua solutionibus & coagulationibus repetitis, in terram inspidam abit, teste *Borrichio, d' ortu & progress. Chem. p. 82.* Sic Oleum Sulphuris vel Spir. Vitrioli, sali communi vel nitro affusus, mutatione certâ utriusque texturæ dat Sal istud mirabile seu enixum *Glauberi*, quod figit & solvit, & ex Sale communi paratum referabit claustra auri, aliorumque subjectorum sulphureorum, ex nitro verò Luna. Sic alcalia vegetabilium volatilia sub ignis torturâ concurrente cum Sulphure concreto, in quo latet acidum, & mutando texturam, abeunt in Sal fixum falsum, quod fortiori concrematione & in igne fusionem abit tandem in perfectum alcali. Sic aqua fortis nuda texturæ ejus per Sal communem vel Sal armoniacum additum mutatione, aurum solvit, & Lunam antea amicam spernit. Nam in hoc menstruorum consistit diversitas & simul etiam potestas, ut correspondeant particularum suarum figuris, poris & meatibus corporis solvendi, & particulis solutis. Unde Alcahesticum menstruum ob summam penetrantiam & subtilitatem quaquaversus penetrat, & omnia dissolvit, teste præter *Helmontium* experto *Starkey Pyrotechn. c. 9. 10. & 11. & seq. it. Becheri in Phys. subterr. l. 1. f. 3 c. 4.* Hinc nihil repugnat dari etiam menstrua insipida, modo ita sint constituta, ut v. g. auri poris exactè respondeant iisque se subtiliter & promptè infi-

influen-  
ri, sic  
munis aq  
talla solv  
montio  
aquam  
glaciei in

Naturæ  
porum  
bilem fla  
nosam d  
morb. f.  
quodque  
rum & l  
ram dete  
bile, ign  
volatilis,  
beneficio  
lem a fto  
volatile  
eum ting  
tiâ, cru  
sed alime  
stomach  
tium usu  
macho v  
verlam ef  
bus, orig  
colorem  
147. un  
acescent  
manifest  
usto it. c  
driacis f  
juncta a  
murmur  
res, effe



insinuent. Nam nihil impedit, corrosivissima mutata textura insipida fieri, sicut è contra teste *Bechero Phys. subterr. l. 1. f. 5. c. 2. §. 23.* ipsa communis aqua multoties destillata & rarefacta; ita corrosiva redditur, ut metallà solvat: quæ aqua alia sub præparatione in acetum transit, teste *Helmontio tr. opl. digm. alim. §. 59.* *Laurei bergius* sanè asserit, se talem vidisse aquam seu liquorem, in quâ aurum sine ulla corrosivitate liquefcat, instar glaciei in aqua calida: *aph. §. contra Salam.*

§. 7. Per tales salinas facultates adeò potentes in administrandis Naturæ negotiis, definiendas esse causarum morbificarum energias, sub saporum ceu per se notissimorum formâ, inculcat *Hippocrates.* Ob id & bilem flavam nomine amari designat, acutam verò & acrem bilem æruginosam definit, *lib. cit. f. 34.* generationem verò illius descripturus *l. 4. de morb. f. 8. num. 3.* ita differit: *postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodque alias biliosum & leve est, copiosior bilis fit in hepate: & ita per amarum & leve seu volatile, ut hodierna loquendi fert consuetudo, bilis naturam determinat.* Non enim calidum aut siccum est, quod præpoller in bile, ignea ob id vulgò appellata, sed acre & amarum i. e. alcali insigniter volatile, temperatum tamen sulphure seu oleo, in seipso, rubro: ut prioris beneficio chylum balsamico imbuat vigore, simulque acorem ejus volatilem à stomachi digestionem nonnunquam superstitem, in perfectum salsum volatile transmutet, posterioris vero ratione tincturâ sulphuris invisibili eum tingat, pro futura sanguificatione. Flava bilis sic dicta, excrementitiâ, cruditatem stomachi nidorosam, & ita neque calorem, neque frigus, sed alimentorum corruptionem ex nimio pinguium & similium succum stomachi hebetantium & depravantium, ejusque salinam vim enervantium usu nascentem. Æruginosa bilis acris & acuta, aut ex alimentis in stomacho vitioso acore depravatis, aut ex vitiosè acido pancreatis succo, perversam effervescentiam cum bilis sale volatili oleoso in intestinis excitantibus, originem ducit, nam & spiritus vitrioli, bili ex vesiculaeductæ admixtus, colorem ex atro virescentem producit, teste *Graffio diff. de succo pancreat. §. 147.* unde & talia æruginosa infantibus sunt familiaria, ex lacte corrupto & acësciente enata, quæ post molesta ab acido nimio tormina rejecta, & acidum manifesto spirant, & acidum absorbentibus v.g. ocul. cancer. ebor. a. C. C. ulsto it. creta, sem. anisi & similibus curantur. Talia æruginosa ab hypochondriacis superius rejecta, & manifesto linguæ acore dentes stupefaciunt, & adjunctâ austeritate, fauces & gulam fortiter adstringunt. His adjunctæ ventris murmuraciones, flatulenti borborygmi, & intestinorum convulsivi dolores, effervescentiæ illius p. n. in intestinis inseparabiles sunt comites.



§. 8. A bile ad succum melancholicum deflecto, qui vulgò frigidus, siccus, & ob id terrestris statuitur. Sed ut taceam, nullitatem talis succi (prout vulgò quidem explicari solet) sufficienter esse demonstratam à *Conringio* *tr. de sanguin. generat. & mor. cap. 12. 13. 14.* certè ea, quæ de hoc humore obscurè dicuntur, perspicuè per acidum, item acerbum in corpore nostro secundum *Hippocr.* reperibile, explicantur: sive sit succus fermentativus stomachi nimis acidus, sive succus pancreaticus nimis austerus, sive lymphæ nimis acida, sive in particularibus membris, ex corruptione alimenti proximi talis acor peregrinus v. g. in ulceribus & abscessibus generetur. Ob id convenienter admodum, aceto comparat melancholiam *Sennertus* *l. 2. de febr. cap. 20.* manu ductore tamen nostro *Hippocrate*, qui verè chymicè *lib. de vict. acutor. f. 28.* differit: *aciditates ex aceto, amarâ bile abundantibus magis conferunt, quam atrabiliaris: amara enim dissolvuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur*, (i. e. ut terminis usitatis explicetur, acida præcipitant alcali volatile in bile, & simul transmutantur effervescendo, quod forsan attolli vocat *Hippocr.* in tertium falsum vel omnino insipidum, instar pituitæ aquosæ seu insipidæ) *Nigra verò fermentantur & attolluntur, ac multiplicantur: acetum enim nigra sursum ducit, vel interprete Sennerto l. 2. de febr. c. 20. p. 296. nigra exaltat.* (i. e. nigra seu melancholica aut atrabiliaria, quæ bili amaræ opponit *Hippocr.* ab aceto augmentantur, & in sua qualitate nociva per fermentationem, acriora & volatiliora facta, exaltantur. Exaltatione ista acidi generatur bilis, quam vulgo vocant atram, acris admodum & corrosiva ex acidi in gradu & volatilitate augmento nata, furia corporis pessima, nam & lenia spernit remedia, & validioribus in deterius ruit. Consideremus pro exemplo cancrum exulceratum, ab omnibus ab atra bile derivatum, hujus acidum & volatile fermentum instar aquæ chrysulæ corrosivum se monstrat, corrodendo & depascendo vicinas partes: hic acor uti medicamenti Saturninis, quæ acidum absorbent & dulcescere faciunt, aliquantisper mitescit, ita contraria mitiora alcalia spernit, à validioribus vero & acrioribus propter subitam effervescentiam & hinc vicinæ partis colliquationem plurimum exacerbat, superveniens febri & totius ardore, partis ulceratæ horrendo dolore, similibusque ægrorum tormentis. Imò verò vulgaria ulcera, acrioribus paulò tractata in cancrasas malignitates similiter degenerant exasperato & volatilifato eorum fermento.

§. 9. Paracelsistarum idolum Tartarus microcosmicus, propter aliqualem similitudinem cum propriè sic dicto Tartaro Bacchi filio, ab acore vini propria fece saturato & cum eadem in Sal compositum, ipso  
patre

patre Vi  
tis suam  
huic inde  
lo peregr  
est acor,  
quam su  
dem coac  
fecum vi  
hospitan  
driaci es  
inprimis  
appellat  
thiticas  
pitatione  
inprimis  
strum, qu  
liculo, e  
putredini  
concretio  
conforti  
axungia  
corrump  
lerabili n  
ctus muc  
coagulat  
rhorum d  
usurpan  
latis seu  
destruunt  
§.  
pidum no  
ratum &  
dem pro  
matibus  
modica n  
ba, & ex  
de dicta  
antia succo



patre Vino nobilius, coagulato, ita dictus, non nisi ex Hippocraticis potentiis suam obtinet auctoritatem: sive enim resolutus in forma liquida fluctuet, huic inde dolores, lancinationes & torsiones inducens, sive jam sub coagulo peregrino seipsum coerceat, ubique principium omnis ejus operationis est acor, partibus hostilis. Est scilicet Tartarus propriè loquendo, nil aliud, quam succus acidus, facilè in subjecto idoneo coagulabilis, aut jam in eodem coagulatus, vitio primæ digestionis, ob hujus cruditatem acidam, & secum vitiosæ segregationis genitus. Acor ergo talis vitiosus in stomacho hospitans & graviorum ejus symptomatum & successivè mali hypochondriaci est autor: in intestinis torminum colicorum sæcunda est genetrix, imprimis si subjectetur, in copioso intestinorum mucos, pituita acida tunc appellato: lotium imprægnans, stranguriam infert, sicut in articulis arthriticas torturas: massæ sanguineæ inquinans dulcedinem, & cordis palpitationes & scorbuticos infert affectus. Sin aptum inveniat subjectum, imprimis de alcali participans, cum eo coagulatur, in Gorgonium monstrum, quale est omne duelech, seu calculus, tam in renibus quam felle folliculo, ex ejus coalitu ibi quidem cum urinæ volatili sale per fermentum putredinis resoluta, hic verò cum alcali volatili bilis genitum, sub qua concretionem quicquid coagulabile simul deprehenderit in novi concreti consortium trahitur. Sic synoviam articulationes ossium instar cujusdam axungie oblinentem coagulat in tophos, arthriticis cognitos, & ossium corrumpens alimentum, cum eodem in gummata Gallica, ossa cum intolerabili nocturno tormento perforantia, concrevit. Sin viscidæ conjunctus mucilagini angustias vasorum permeare nequeat, sed circa easdem coagulatus subsistat, oppilationum & obstructionum, omniumque scirrhorum & scrophularum est artifex. Contra hunc acidum p. n. Tartarum usurpantur medicamenta & ipsa tartarea, seu sit spiritus tartari perfectè volatilis seu urinosus, sive sit Sal ejus volatilissimum; hæc enim & acorem ejus destruunt, & producta jam coagula dissolvunt & referant.

§. 10. Præter enarratos hæcenus saporès, dulce denique & insipidum non raro memoratur Hippocrates, innuens hoc ipso statum temperatum & blandam dulcedinem nutriti corporis nostri succi, chylosi quidem pro partibus spermaticis, seu nervinis, sanguinei verò pro parenchymatibus sanguineis. *Dulcia enim & pingua ac oleosa replent, quia ex medicâ mole multum diffunduntur: at vero acida & acris & austera & acerbæ, & ex toto collata & succa non replent: seu nutriunt, docet Hippocrates l. 2. de dieta. s. 33. num. 19. 23 &c.* Hinc si blanda & temperata dulcedo nutriti succi pervertatur, ut acrimoniam vitiosam, in specie salis acqui-

rat,



rat, unde asper minusque mitis reddatur, & exinde nutritioni ineptus fiat, subinde tabe & atrophîâ emaciatur corpus, vivum sceleton repræsentat. Succus talis nutritius minus in stomacho ex alimentis resolutus, & volatilifatus, sed visciditate p. n. tenax & glutinosus, pituita p. n. nomine vulgò venire solet, sive ullo excessivo sapore careat, sive acrimonia salsa sive etiam aciditate peregrinâ deprehendatur inquinatus.

### CAPUT III. FACULTATUM HIPPOCRATICARUM AD HYGIENAM ET THERAPEUSIAM APPLICATIO.

#### §. 1.

**Q**Uæcunque mala homo patitur, omnia à facultatum potentis proficiuntur, inquit Hippocr. cit. lib. f. 34. quæ facultates, ipso interprete f. 39. humorum nostri corporis summas vires & robur designant, istis saporibus ab eo definitas. Sed cum eadem & naturalem nostram administrent & conomiam, & tanquam negligentes aut inobedientes ministri simul eandem non raro pessundent, propterea distinctum earum & statum & effectum declarat Divinus noster Senex f. 24. & 25 & lib. de natur. hum. f. 6. *Hæc quidem mixta inter se & temperata, neque conspicua sunt, neque hominem ledunt: ubi vero quid horum secretum fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicua sunt & hominem ledunt.* Superius scilicet monitum fuit, salinas potentias continuo reciproce actionis motu seipsas fatigare, & in æquilibrio positas, aliis permistas blandâ & æquabili fermentatione agitari, sub qua seipsum tanquam mutuo activa & passiva ita temperent, quo minus aliquod nocuum in corpus redundare possit. Ipsum hoc est, quod corporis machinam sartam tectamque conservat, si scil. sanguineum vitale nectar debitâ fermentatione circulatur, quâ & chylus ipsi assimilatur & spiritus volatilis volatilifatur, simulque reliqui succi debitam crasin & proportionem tam ad se invicem v. g. bilis ad succum pancreaticum, quam ad subjecta externa, v. g. succus stomachi fermentativus ad alimenta obtineant. At vitiatâ hac facultatum proportionem, & læsâ earum temperaturâ, sin vel in gradu una excedat alteram, vel à naturali crasi degenerent, cujus infiniti sunt modi secundum Hippocratem, non potest non rebellio atrox turbare microcosmum.

§. 2. Origo læsæ temperaturæ, indeque ortorum morborum, partim ex diætiis, partim ex spiritu quem attrahentes vivimus, est, autore Hippocr.



Hippocr. de nat. human. f. 18. n. 11. Diætæ partem primam constituunt al-  
 sumta, de quibus nos ita informat *Oraculum Coum. lib. cit. sect. 25.* *Quin*  
*et ex cibis, quicunque nobis incommodi sunt, et ingesti hominem ledunt, ho-*  
*rum unusquisque aut amarus est meracius ac intemperatus aut salus, aut acidus,*  
*aut alius quis intemperatus et fortis: et propterea turbamur ab ipsis, quem-*  
*admodum etiam ab his, quæ ex corpore excerauntur. Omnia autem quæ*  
*edit aut bibit homo talia edulia palam est, minimè hoc intemperato et dissi-*  
*dente ac excedente succo participare, velut sunt panis et maza, et his similia,*  
*quibus adfectus est homo plurimus et semper uti. Jam verò edulia ista ho-*  
*minis sunt vegetabilia, aut animalia illis ipsis antea saturata: in quibus terræ*  
*nascentibus suas facultates maturè considerat Cuius noster, dum lib. de natur.*  
*human. f. 11. ita scribit: quemadmodum ex terra nascentia, et in ipsam plan-*  
*tata ac seminata, ubi in terram pervenerint, unumquodque trahit id, quod*  
*natura sua familiare in terrâ existit: inest autem in terrâ et acidum et ama-*  
*rum et dulce et salum et omnigenum etc.*

§. 3. Scilicet ut idem nos informat Hippocr. f. 26. *Robur et augmen-*  
*rum ac alimentum præsertim per nihil aliud contingit, quam quod probe tempe-*  
*ratum est, et nihil habet intemperatum, neque forte, sed totum unum factum*  
*est, et simplex et non forte: hæc enim in naturali statu, absque ulla alteratio-*  
*ne corpus conservant, ob quam temperaturam & lac & carnes, & oryza*  
*similiaque Cerealia tam commodum suggerunt alimentum. Ast ubi exces-*  
*sivus sapor imprægnat edulium, salinam potentiam excedentem manife-*  
*stans, non potest non iisdem corporis nostri potentiis occurrendo, easdem*  
*alterare aut augmentando, aut imminuendo aut diversimodè alterando:*  
*plus minus tamen, prout aut major vel minor fermenti stomachici in illo al-*  
*terando & transmutando fuerit potestas, aut prout consuetudine ejus cor-*  
*poris nostri potentiæ salinæ magis vel minus jam antea ab eo immutata fue-*  
*runt. Sic enim & venenorum consuetudine alteratis jam corporis nostri*  
*potentiis eorum robur imbellem factum fuit, & continuata diutius eadem*  
*medicamenta, tandem in cassum adhibentur: unde non tantum loco modo*  
*citato §. 2. consuetudinis rationem habet, divinus Senex, sed ejus observan-*  
*tiam quoque diligenter inculcat f. 2. aph. 20. dum consuetudo longo tempore,*  
*etiamsi deteriora sint, insuetis minus molesta esse, pronunciat.*

§. 4. His suis potentiis determinandas esse alimentorum faculta-  
 tes, non calore & frigore, sufficienter docet Hippocr. in libris de diætâ,  
 it. lib. de affection. f. 49. ubi acrium, salorum & acidorum, dulcium alimen-  
 torum frequentissimam mentionem injicit; & hoc illustrat pariter lib. de  
 prisc. med. §. 22, & 23, exemplo cujusdam, crudo tritico & carne lassi, pane



verò propinato curandi, quem præfert tritico crudo, non ob qualitates elementares, sed ob id quia sit præparatus, sub qua præparatione diversas subeat alterationes. Præparationis cardo in legitima consistit fermentatione, quâ adjectione fermenti acidi volatilis farinæ aufertur visciditas, quæ multum stomacho alias facessit negotii, & resolutæ partes salinæ & quædam sulphureæ aliarum particularum implexu aliquantis per se extricant, fermentando volatilifantur, & in spiritum volatilem ardentem transmutantur: antequam vero totæ hoc modo fuerint volatilifatæ elibano imposita massa torretur, unde pars volatilifatorum salium in spiritum avolat, suavi odore omnia replens, quibusvis perlarum aquis virtute confortativa à *Behero l. 1. phys. subterr. s. 5. c. 2. §. 144.* præposita, cujus colligendi modum docet *Kergerus de fermentat. s. 3. cap. 1. pag. 181.* pars verò salium altera, nondum perfectè volatilifata impedito fermentationis per exsiccationem motu à reliquis particulis implicata detinetur, facili tamen Vulcano in spiritum subacidum volatilem per retortam separanda, à quo subtilis panis aciditas etiam dependet. Panis ergò stomacho ingestus propter hunc spiritum acidum volatilem, de quo supra *cap. 2. §. 1.* ex suscepto fermento productum, liquefcens in stomacho in cremorem, herbas & cibos quibus cum est masticatus, unâ colliquefcere cogit, ut rectè loquitur *Helmont. tr. tract. victus §. 15.* adeoque fermento stomachi potentes fert suppetias, & locum cuiusdam fermenti aliis cibis additi, quodammodo supplet, & propter ejus convenientiam cum stomachi succo fermentativo, nunquam nos panis continuò licet comesti capit fastidium, quin potius naribus adnotus nauseam & vomitum ab assumptorum horrore imminentem compescit, & sicut agrotantes ultimo ejus appetitum amittunt, ita convalescentes eandem primariò denuò recuperant: ut rarissimum sit, quosdam à pane omninò abhorre, qualis fuit puer iste apud *Schottum Phys. curios. l. 3. cap. 27. p. 530. & seqq.* ab imaginatione maternâ gravidatis tempore ita dispositus.

§. 5. Loco aquæ vinum supra dicto ægro propinat *Hippocr.* stomacho similiter blando acore acceptatissimum, de cujus uvarum benedicti nectaris naturâ & statu, cum ab aliis, in specie à *Celeb. Dn. Sachsio in Ampelogr.* qui instar omnium est, sufficienter actum sit, cui jungatur *Becherus Phys. subterr. l. 1. s. 5. cap. 2.* non est, quod actum agam. Hoc saltim quoad *Hippocraticas facultates* noto, observandos in eo esse & spiritus salinos volatiles sulphureos, sulphur Bezoardicum vegetabile item aurum potabile vegetabile quibusdam dictos, & etiam acidum, primo justu plus minus sensibile: ratione cujus & vinum cum unicornu fossili notho effervescit,



vescit, & ab oleo filicum in instanti coagulatur. Spiritus vini volatilis tanquam symbolizans quodammodo spiritui vitali, brevi morâ ex stomacho in vasa raptus, advocatur in hujus supplementum, levi contactu fermenti in corde perficiendus: Sin vero plus justo hic insit stomacho, ebrietas sequitur, quatenus celeri distributione totus in spiritum vitalem commutari nequit, quin spiritus animales prius in motus confusos & inordinatos actos, quodammodo sulphure suo figat, instar opii & aliorum narcoticorum indeque eos torpidos & ad debitas motiones & expansiones ineptos reddat. Quoad acidum vini benignum, hoc partim in stomacho partim in intestinis concurrente fermento felleo in salsum volatile abit: Sin verò inordinato, & in specie vini nimio abusu crudus & acidulus liquor ex stomacho elapsus fuerit, hostili sua toti corpori aciditate, cum sibi adjunctâ aquâ vitæ in intestinis tormina colica, & exinde in artibus pareses, aut contracturas, præter mala arthritica & nephritica progenerat, Tartaro tam resolutum quam coagulato superius adscripta; adeò ut sæpissimè vinum prohibendum sit ægris, non ratione spiritus sui ardentis, seu ut vulgò dicunt, ob nimium ejus calorem, quam ratione acidi sui, partibus insensibilissimis v.g. in vulneribus, articulorum affectibus &c. Sic memini mulieris, dysuriæ subinde obnoxia, cujus paroxysmus tam ab aceti, quam vini usu subito recrudescit, oleo amygdal. dulc. c. lapid. cancrorum & percarum denuò sopiendus.

§. 6. Vini vicarius est cerevisia in locis Septentrionalibus, decoctum scilicet hordei vel tritici cum lupulo ut plurimum, fermentatione exaltatum, quæ temperatior quidem est vino, indeque minus alterativa sed plus nutritiva, iisdem tamen potentiis Hippocraticis similiter instructa, utut ejus acor, non adeo purus, quin potius lupuli sale amariante de alcalium natura, nonnihil modificatus. In præparatione observanda venit hordei germinatio, cum in finem instituta, ut visciditas ejus mucilaginosâ corrigatur, quæ & fermentationem decocti impediret, & digestionem stomachi turbaret: hordeum enim parum coctum ventositates efficit, oppilationes verò si meliusculè bullierit. Ast sub ista germinatione irrorata grana, quarum inhibitione turgescunt, unde resoluta salia in iis aliarum particularum complexu aliàs irretita mutuò agere & reagere, & angustia loci conclusa, quâ datâ portâ prorumpere, & ita per gemmam secum adhærentes particulas simul protrudere incipiunt. Verum ne in liberiore aura continuatâ ista actione fermentativa omnino avolent; semineque ita emoriatur, & particulis activis salinis spoliatum pro fermentatione cerevisiæ fiat ineptum, tostione ulterior salium in germinatione



prohibetur progressus, & postquam contritum fuerit & cum lupulo conditum per cocturam, in cerevisiam per restauratam fermentationem abit. Inest enim omnibus vegetabilibus, imprimis seminibus, & ex his præ cæteris Cerealibus, substantia quædam viscida & mucilaginosa, quam eæ primarium actvitatæ suæ objectum digestio stomachi resolvit in cremorem nutritium. Hac substantia dum per fermentationem recluditur, & volatilifatur, transmutatur in spiritum volatilem ardentem, novum ens, formaliter ab eo quod erat antea distinctum: adeo ut non amplius subjaceat fermenti stomachalis imperio, nec amplius sit ita nutritiva ut antea, quin potius subito transeat, ut supra dictum de spiritu vini, ad augmentandos spiritus corporis, & ita facta est primario egregie confortativa; ob id namque liquidus potus longè facilius & felicius nos recreat, quam solidus cibus. Natura equidem neque cerevisiam neque vinum ut talia postulat, sed tantum simpliciter ut humida, quibus latex corporis absumentis restauretur, pro subministrando alimenti vehiculo, id quod bruta simplici aquæ haustu contenta sufficienter demonstrant. Verum curiositas humana, per artem subinde præsumens corrigere naturam, conjungit aquam spiritui per fermentationem, quo una vice & latex subministretur, & alimentum suppleatur, & spiritus reficiatur.

§. 7. Tartarorum potus, ut notum, est lac equinum, idque tantummodò in solennioribus vestivitibus, quod tamen ita præparare norunt, ut ebrietatem conciliet, non secus ac vinum. Modus præparandi cum sit curiosus, ex eundem Lingua Gallicâ in Latinam translatus, ex *Relation de Tartarie, par Jean Luca, Religieux Dominique, de Tartares Precopites* p. 15. & p. 19. hunc annotare libuit. Eorum potus, quem nominat Chimus & Boza, cum farina milii (forfan interdum loco hordei) inebriat instar vini nostratis, præparatur sequenti modo: Postquam equa peperit, permittunt pullum lactere per mensem, postmodum applicant naso pulli frustula ligni acuminata, eum in finem, ut quando pullus velit fugere, equa iisdem puncta, eum admittere nequeat. Interea ipsi colligunt lac, eoque vas replent, in quo vinum alias fuerit (si tale habere possunt) quod dum in vas reconditur per linteum trajicitur, & vas postmodum exactissime obturatur. Huic injiciuntur 20. vel 30. gr hordei, cum cochleari oxygalæ vaccinæ seu lactis acidæ vel ebutyratæ, aut saltem parum fermenti. Interea necesse est, collocare vas istud vel prope ignem, vel exponere idem radiis solaribus, ut lac bulliat & benè clarescat, id quod spatio 2. vel 3. septimanarum evenit: quod si addatur tantillum vini potio erit eò gratior. Lac ita benè depuratum, trajicitur per linteum purum

ante-



antequam hauriatur pro potu, qui præparatus tempore vernali, melior est omni eo, qui reliquis anni temporibus conficitur. Hæc potio longè durabit, tantum enim lactis novi semper denuò infundi potest, quantum exhauritur. Observandum & hoc, quod si lac per seipsum satis acidum fuerit, non opus erit oxygalam vel fermentum addere, sed sufficiunt hodei: utque magis tutò procedatur, in distinctis vasculis instituenda est præparatio. Potest etiam quibusdam infundi nodulus ex radicibus violarum aut foliorum coriandri. Decies quotidie equæ lac emulgetur, dum ea interea optimis herbis nutrienda est. Potio hæc est admodum salubris, & magno emolumento iis, qui sunt impotentes. Semina coriandri meliorem habent saporem ipsis foliis. Hactenus Autor Gallus, in quibusdam nonnihil obscurus.

§. 8. Post assumpta esse inspirata, quæ potentiarum Hippocraticarum proportionem & temperaturam in succis machinæ nostri corporis hydraulicæ turbant, supra §. 2. dictum fuit. Tota namque athmosphæra quam nos reciproca respiratione attrahimus, copiosissimis particulis, insignibus facultatibus Hippocraticis salinis pollentibus, & quasi tot diversis fermentis imprægnata est. Notum est, non vitrioli tantum caput mortuum aëri expositum, de novo singulari spiritu acido imprægnari, sed etiam terram tam nitri, quam aluminiis exhaustas semel aëri expositas post aliquot annos novum nitrum vel alumen suppeditare. Hinc aërem non sine ratione, oculari eoque firmo experimento confirmatus, plenum sale Hermetico universali, in distinctis matricibus determinationes varias suscipiente, statuit *Rochastr. observat. novell. des. caux. mineral. c. 1.* Nam & duris metallis in aëre quis statuerit incunabula & tamen minera plumbi Anglica ante multos annos exhausta, ab aëre novo plumbo imprægnatur: teste *Borrichio ad Bartolinum in huius Epist. 92. cent. 4.* idem fit cum scoriis stanni ab igne depauperatis, per aërem denuò fecundatis, vid. *Histoir. de Singularit. Natur. d. Anglet. p. 16.* uti etiam bismuthi vena Misnensis inanita aëri exposita argento denuò nonnihil locupletatur: antimonium fixatum ad volatilem tamen revertitur naturam, aëri ubi fuerit expositum. Vegetabilia similiter nonnulla, quæ inter principaliora sunt bulbus scyllæ marinæ, uti & aloë Hispanica in conclavi suspensa, ex aëre solo vegetantur, crescunt & ad tempus adolescunt: non minus quam viperillæ, araneæ & scorpiones ex aëris suctu, vitris arcuè inclusæ vitam trahunt. Quæ non fermenta imprægnant aërem, tempore veris, dum putris gleba resoluta exhalat copiosissima salina miasmata, admodum fermentativa, quæ massam nostram sanguineam de novo quasi inspirato fermento animant,



ut hac occasione anæsi & clandestini morborum fomites potenter subinde exardescant. Hybæno tempore tale subtili acido, de armoniacali forsan natura aërem plenum esse persuadent faciei, labiorum & manuum contractæ asperitates & superficiales fissuræ, lotionè urinæ aut saponis acris, tanquam contrario alcali curandæ. Fermenta locorum endemica aut interdum epidemica salinæ omnia nunc acidæ nunc urinosæ naturæ, quo & omnia pertinent contagia in distans operantia, aeris amplo sinu foveantur. Hic ergo inspiratus, quas non ataxias & dyscrasias in massa sanguinea, ejusque potentiis Hippocraticis, it. in aliis humoribus particulis suis salinis fermentativis inducet?

§. 9. Intemperatas ergo, & ita altero extremo excedentes istas potentias nos lædere asserit Hippocrates. Hinc enim tot frequentes febrium effervescentiæ, tot tormenta ab acido vitioso inducta, tam variformia affectus hypochondriaci & Protei scorbutici symptomata, nunc caloribus nunc horroribus comitata. Curam ob id talibus, quæ intemperatas & à legitima crassi degenerantes potentias in justam temperaturam restituere valent, instituendam monet, *tunc enim humores acres crudos dictos, ex permixtione & temperatura mutua, non calidi aut frigidi simpliciter additione & subtractione, blandiores redditos, coctos & denuò naturales fieri.* Idque monstrante viam naturâ, in defluxionibus, tam ad nares, quam ad oculos, aut ad fauces, unde anginæ, erysipelata, peripnevmonia &c. oriantur, apertum demonstrat, *cit. lib. f. 31. 32. & 33.* quæ quatenus tenues & acres nos lædunt, & hujus acrimoniæ sensu ardorem & interdum inflammationem inducunt, *restituuntur autem & curantur, ubi temperata fuerint & concocta, & ab omni acrimonia liberata, tunc jam & febres, & alia hominem lædencia solvuntur.* Temperaturam hanc ex permixtione fieri asserit Hippocrates *c. l. f. 31. n. 25. f. 32. n. 13. & f. 35. n. 16.* dum scilicet particulæ salinæ intemperatæ & conspiuæ factæ, atque exinde aciores redditæ, additione & interpositione aliarum particularum materialium in specie contrariarum salinarum, mutatâ figurâ & textura acrimoniam & corrosivitatem amittunt: qua ratione acidum acetum solutione lapid. cancrorum mitescit, corrosione Saturni dulcescit, imprægnatione salis Tartari falsescit.

§. 10. Rem ita se habere, constat ex eo, quod Mercurius sublim, sapore suo excessivo seu acore corrosivo, non minus quam arsenicum sint lethalia venena, quæ tamen coerct aut copiosum lac epotum aut butyrum largius assumtum, aut oleum amygdal. dulc. deglutitum, quatenus talia pingua acoris corrosivi obtundunt & quasi inviscant, aculeos: convenit etiam oleum Tartari per deliquium haustum, quatenus  
hoc



hoc alcali fixum excedens istorum acidum destruit, & sui complexu & permixtione in falsum temperatum transmutat. Mercurio depositâ crystallina larva, aut pulveris terrei facie sese vestiente, aut vivâ forma pro-  
 filiente: non minus utilis est crystallus montana præparata, aut calcina-  
 ta, quia hæc acidum absorbet, istudque dum in se ruit pro corrosione  
 concentrat, quo minus corpori nocere queat: qua ratione similiter æru-  
 ginosæ bilis, quam acidam valdè supra diximus, eadem crystallus est  
 alexipharmacum & choleram aut dysenteriam exinde ortas perniciosas cu-  
 rat. Eadem ratione creta, lac Lunæ, imò laterum coctilium pulvis it-  
 ebur ustum, corallia & similia ardorem stomachi ex effervescencia acidi  
 vitiosi cum regurgitante bile alioue alcali ortum extinguunt, non frigore,  
 sed vi absorbendi acidum, seu ut vocant, præcipitandi: qua ratione  
 eadem & caninæ appetentiæ sunt remedia, quatenus acidum corrosi-  
 vum temperant: acida è contra ut spiritus nitri, vitrioli, salis, succi ber-  
 berum, ribium, limonum, febrium ardentium, & diarrhæarum, quas  
 vocant, biliosarum. Item ægrorum nimis ardoribus debilitatorum sunt  
 colamina: quatenus salis volatilis biliosi in sanguine compescunt vim,  
 quod ceu contraria temperant in falsum, & ita ab eodem inductam aut  
 p. n. sanguinis effervescenciam, aut nimiam ejus dissolutionem refrænant,  
 & blando coagulo compescunt. Et sanè alterantium (nam de evacuan-  
 tibus non est dicendi occasio) omnium vis & efficacia in virtute tempe-  
 randi aut exaltandi acidum aut alcali in genere, aut corrigendi específicos  
 alios ex istis vitiatis sapes obortos primariò consistere videtur, non ve-  
 rò in calore aut frigore, nisi consequenter, in iis scilicet morbis ubi ni-  
 hil divini subest. Quæ tamen non ita intellecta volo, quasi omnem  
 simplicium operandi modum comprehendant, in multis enim multa non  
 parum differunt: cum v. g. opiatorum aliorumque narcoticorum longè  
 dispar ab his sit ratio, sed quantum ad effectus ab Hippocraticis poten-  
 tiis excitatos tantum pertinent.

§, II. Hæc ut pateant ulterius, consideremus à medicatrice Na-  
 turâ ipsa propinatos julebos acidos, ex terra acidularum nomine scatu-  
 rientes, quas non calore aut frigore aut humiditate proficuas esse, ad  
 averruncandos chronicos affectus, ex hoste Tartaro præter naturam in-  
 tus recepto & coagulato pronatos, in propatulo est consideranti, spiri-  
 tum acidum esurinum istas aquas imprægnantem dissolvere & abstergere  
 mucilaginosas sordes, in primis viis, iisque annexis visceribus stabulan-  
 tes, dum interea soluta in mineris ab hoc acido Martis vena absorbet in  
 se sapes vitiosos acidos, acerbos aliosque, salia silvestria, aut excre-  
 menti-



*De Medicina Hippocrateâ*

mentitia, it. Tartarus resolutus ab *Helmontio* appellatus, eosque secum te-  
cum nigritum formae evacuat. Nam & similiratione aut cruda ferri li-  
matura, per se semper adstrictiva, sicut omnia martialia, aut quicumque ex  
eo sine acido tamen excessivo parati croci aut tincturae profunt, quatenus  
excrementa & peregrina salia, ad ferrum ceu adaequatum suae activitatis  
objectum accurrentia absorbet, & ita ab iis illatas noxas, in chronicis af-  
fectibus, obstructionibus communiter attributis, emendat. Eadem vi  
saccharum Saturni, aceti acido non omnino saturatum, spleneticorum &  
hypochondriacorum & scorbuticorum acia salia aceto saepe potentiora,  
dulcificando, non refrigerando, innocua reddit. Id quod longè clarius,  
dum chirurgum agit Saturnus, cujus artis quantum praeber fulcrum, dum  
non tantum cum Marte sociatus in tincturam rubicundam internis ulce-  
ribus quatumcunque partium potenter medetur, sed etiam solus externè  
variis cerussa, minii, lythargiorum, &c. lavatus formis, omnia ulcerum  
etiam chronicorum & cacoethicorum fermenta acida, alimenti partis in-  
saniam corruptiva, ratione sui Mercurii copiosi paucissimo sale associati  
promptè absorbet & dulcificat, & ita non refrigerando nec abstergendo  
aut exsiccando eadem consolidat. Id quod similiter de Veneris cadmia  
factitia, & tutia asserendum venit, non minus quam de terra vitrioli dulci  
ob egregium tam in vulneribus quam ulceribus usum balsamica quibus-  
dam dicta. Sed charta nimis citò deficeret, si de salibus *vel volatilibus* vi-  
petarum, cervi, hominis, cochleariae, persiciariae, vel fixis vegetabilium, vel  
spiritibus acidis mineralium, vel salibus ex duobus posterioribus compo-  
tis, tartaro vitriolato, nitro tartarificato, arcano duplicato, it. sale ammonia-  
co in specie sulphure metallico per sublimationem, inprimis à colcothare  
imprægnato, dicere velim, quæ omnia non qualitatum primarum virtute,  
sed ratione potentiarum Hippocraticarum & agere, & easdem corruptas  
in corpore corrigere, ferè per se patet. Modò observetur, quod tam  
stagnata mineralium acida, quam alcalia vegetabilium fixa, sint quidem  
absterfiva sordium, & correctiva suorum contrariorum, sed simul stoma-  
cho insigniter nociva, dum alcalia lixiviali sapore fermento stomachi con-  
trariantur, acidi verò spiritus corrosivitate sua ipsi insigniter adversentur:  
ob id rarius sola, potius vel mutua conjunctione in tertium salum ab-  
sterfivum & diureticum alterata sunt usurpanda, vel additione alterius dul-  
cificata (v.g. alcalia per sulphur vel minerale vel vegetabile, quo elixir  
parva it. balsamus Samech pertinent, acidi verò spiritus per spiritus volati-  
les ardentes) in usum vocanda: ut talibus temperatis & temperentur ex-  
cessivi nostri sapes, & si qui horum sunt fomites sine laesione removean-  
tur.



§. 12. Sed cum omnes concretorum in specie vegetabilium saporés, singulares obrineant varietates, iisdem nobis insinuant, non ad solum acidum aut urinosum aut salsum semper & simpliciter respiciendum esse: sed præter communes acris, amari, aut acidit rationes uniuscujusque specificum saporem semini appropriatum, & ex seminali concreti crasi, eo quo supra c. 1. §. 7. dictum, modo, oriundum, maturè considerandum esse, ceu appropriatum specificis morboris corporis nostri saporibus, ex Hippocrate infinitis, remedium. Non latuit hoc nostrum Hippocratem, qui occasione alimentorum medicamentosorum hoc inculcat, l. 2. de diætâ, 7. ita differendo: *At verò ciborum ac potuum singulorum vim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet; Quicumque igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulcium aut pinguium, aut salorum, aut alterius cujusdam consimilis facultate, non recte judicant. Non enim tandem vim habet, neque dulcia inter se, neque amara, neque ulla aliqua ejusmodi; Multa enim ex talibus, quæ & alvum emolliunt & sistunt, siccantque & humectant. Similiter autem in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemque alvum movent, & urinam cient. Sunt qui neutrum horum faciunt. Similiter & ex calefacientibus ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habent.* Ex hoc enim fonte, specifico nempe sapore, omnis ferè specificorum remedium in morbis promanat efficacia: quod nempe chelidonium majus, ceu expertum, curat icterum flavum, cochlearia scorbutum, quod myrrha aut sabina Lunare mulierum tributum exigat, quod priapus cervi & ceti dysenteriam, papav. rheas pleuritidem, succus stercoreis equini colicam tam virorum, quàm mulierum, alias passionem hystericam, spiritus sanguinis humani epilepsiam, castoreum, variolas, lumbrici arthritidem vagam sanent. Hinc namque cum Helmontio omninò asserendum videtur, *in simplicibus perfectam esse curam & sanationem omnium morborum*: ut non opus sit, semper ad sublimiora provocare arcana.

§. 13. Communis equidem scholarum mos est, per saporés expiscari vegetabilium virtutes, sed duplex in eo deprehenditur error. 1. quod relictis Hippocraticis potentiis, per saporés calores & frigora dimetiri in iisdem aggressi fuerint, tanquam proprietatum cunctarum opifices: cum tamen qualitatibus elementalium cum saporibus nulla sit cognatio: 2. Quod específicos singulorum saporés neglexerint, & ita gustato communis saporis cortice, nucleum appropriati, & singularem in eo latentem energiam rejecerint: cum tamen hic ex propria eorum crasi oriundus, singulari ob eodem latentis facultatis sit index. Ex specifica enim concretionis crasi à semine oriunda specificæ simplicium dotes, eorumque indices specifici saporés prodeunt. Unde & hanc crasin ceu optimam rei partem simpliciumque nucleum in eorundem præparatione tam studiosè conservandum monet Helmont. & ablatis aut transmutatis eum regentibus nunc ma-



lignis nunc inutilibus scoriis tanquam corticibus in apertum protrahendum, ut  
*sexcentis* istis saporibus corpus nostrum infestantibus, ex dyscrasia potentiarum  
 Hippocraticarum, & varia depravatione obortis, citò tutò & jucundè mederi  
 queamus: in quo excellentia liquoris *Alkabeſt* miræ est commendationis, non  
 tantum ab *Helmont. tr. dispens. modern. §. 22.* primitus prædicata, sed præterea  
 quoque à *Starkey Tr. Pyrotechnie asserted. c. XII. p. 28.* propria experientia con-  
 firmat; qui scilicet. resolvit vegetabilia in primam eorum materiam liquidam, disci-  
 minans in iis omnes heterogenitates, donec parvus liquor crasin totius herbæ vel  
 feminis integram in se continens ab aliis separatus, sese seorsim conspiciendum  
 præbeat. Nam in quamplurimis aliis præparationibus sive per ignem fiant, si-  
 ve sine eo mediantibus solutionibus, aliisve operandi modis, in specie fermenta-  
 tionibus, simplicium crasis & hinc operandi ratio pro diversitate laborum, ad-  
 ditorum aut separatorum non parum immutatur, & alia quasi nova per artem  
 ipsis imprimitur, ita ut talia chymica sapissimè potius artis acquisita, quam na-  
 turæ finitiva agant, idque in primis minerali regno. Sic enim rhabarbarum cum  
 sale Tartari digestum, omnem purgandi virtutem amittit; asarum in aqua bulli-  
 tum, diureticum evadit egregium tardarum febrium remedium, opium per aci-  
 da virtute narcotica & anodyna omnino spoliatur: Sal Tartari volatile vegeta-  
 bilium venena, in specie napellum, levi digestionem omnino corrigit, teste *Boyle  
 experim. Philos. p. 136.* Mercurius vitæ vomituriciens per sal Tartari fit catharti-  
 cum per inferiora, per nitrum verò evadit bezoardicum, Luna per nitrum dat  
 pulv. amarissimum, parvâ 2. vel 4. gr. dosi copiosè absque ullo tamen nocu-  
 mento hydropicorum aquas educentem, facilè denuò in antiquum iners Lunæ  
 corpus reducendum: Auri dura compages præcipitatur in pulverem conitrua-  
 lem, qui tamen per sulphuris acidum omninò obmutescit, pro basi auri  
 diaphoretici Poteriani singularum virtutum remediis: Et  
 quanta hic non possint adduci, nisi respi-  
 ciendus esset finis.



ndum, ut  
arum  
e mederi  
nis, non  
d pravea  
entia con-  
m, discri-  
herba vel  
iciendum  
m fiant, si-  
fermenta-  
rum, ad-  
per artem  
quam na-  
arum cum  
qua bulli-  
m per aci-  
le vegeta-  
teste Boyle  
it catharti-  
ntrum dat  
men nocu-  
ners Lunæ  
construa-  
sauri



11.  
10.




Biblioteka Jagiellońska



stdr0029916







Ettenberg.



Ettmullerius Michael philos et med. dr.


Opera omnia theoretica et practica,  
in quibus universa praecepta medica sive  
Omnium totius humani corporis  
morborum dilucida descriptio eorumque  
causarum accurata explicatio et curatio  
per selectissima et optima medica-  
menta. Quatuor partes.

Lugdunum

1685

8.° - p. I. <sup>a</sup> - 5K. n + str. 428 - A - A<sub>3</sub> - Ggg<sub>3</sub> - Hhh.  
" II. <sup>a</sup> - str 436 - a - a<sub>3</sub> - lli - lli<sub>2</sub>  
" III. - str. 212 - A - A<sub>3</sub> - Cc<sub>3</sub> - Del.  
" IV. - str 362 - a - a<sub>3</sub> - yyy<sub>3</sub> - zz.  
opr. prog. hyp. clle 4-cll erep.c.







Ettmullerus Michael phil et med. doct.

---

Opera omnia theoretica et practica  
in quibus universa praxis medica  
sive omnium letius humani corpo-  
ris morborum dilucida descriptio  
conunq[ue] eorum accurata expli-  
catio et curatio per selectissima  
et optima medicamenta

Lugduni

1685

8°

p<sup>i</sup> - 5 K. n. str. 428 A-A<sub>3</sub> - G<sub>245</sub> - H<sub>24</sub>.

p<sup>ii</sup> - str. 436 - a - a<sub>3</sub> - 3i - 3i<sub>2</sub>

" <sup>iii</sup> - " 212 - A-A<sub>3</sub> - C<sub>23</sub> - Φd.

" <sup>iv</sup> - " 362 - a - a<sub>3</sub> - 44<sub>3</sub> - 22.

opr. pr. wpolne dla 4-u. cegic



